

02.21

125

本經逢原

本經逢原

R92.3
17

本經達原小引

醫之有本經也。猶匠氏之有繩墨也。有繩墨而後有規矩。有規矩而後能變通。變通生乎智巧。又必本諸繩墨也。原夫炎帝本經繩墨之創始也。大觀蓋類規矩之成則也。瀕湖綱目成則中之集大成。未能達乎變通也。譬諸大匠能與人規矩。不能與人智巧。能以智巧與人。達乎變通之道者。黃帝靈素之文也。能以炎黃之道。隨機應用。不為繩墨所拘者。漢長沙一人而已。長沙以天縱之能。一脈相承。炎黃之道。信手皆繩墨也。未聞炎黃而外。別有繩墨也。嘗思醫林學術。非不代有名人。求其端本澄源。宗乎本經主治者。王函金匱而外。未之聞也。長沙已往。唐逸士千金方。獨得其髓。其立方之峻。有過於長沙者。後世末由宗之。以故集本草者。咸以上古逆順反激之用。槩置不錄。專事坦夷。以適時宜。其間鎖鑰固無足論。即瀕湖之博洽今古者。尚爾舍本逐末。僅以本經主治。冠列諸首。以為存羊之意。惟仲高繆子開鑿經義。迥出諸方。而於委宛難明處。則旁引別錄等說。疏作經言。未紫之混。能無戾乎。昔三餘齋子。有本經註疏一冊。三十五年。前於念菽先生齋頭。曾一寓目。惜乎未經刊布。不可復覩。因不自揣。聊陳鄙見。略疏本經之大義。并系諸家治法。庶使學人左右逢原。不逾炎黃繩墨。足以為上工也。上工十全六。不能盡起白骨而生之。吾願天下醫師。慎勿妄恃已長。以希苟得之利。天下蒼生。確遵有病不治。常得中醫之戒。跳出時師圈繯。何繩墨之可限哉。

康熙乙亥春王石頑張璐書於雋永堂時年七十有九

本經逢原目錄

卷一

水部

諸水

火部

諸火

土部

諸土

金部

金

古文錢

蜜陀僧

鐵精

石部

玉

丹砂

靈砂

滑石

石鍾乳

附乳
公乳

葱石

雲母

銀硃

雄黃

石脂

石灰

代赭石

赤銅

鉛

錫

鐵繡

白石英

水銀

雌黃

爐甘石

浮石

禹餘糧

銅青

鉛粉

鐵落

紫石英

輕粉

石膏

無名異

陽起石

空青

自然銅

鉛丹

鐵砂

粗理
黃石

曾青

綠青

扁青

石膽

礬石

砒石

礞石

花蕊石

河沙

石燕

石蟹

蛇黃附蛇石

霹靂礬

鹵石部

食鹽

戎鹽即青

鹵礆

凝水石

玄精石

朴硝

玄明粉

風化硝

硝石

礪砂

蓬砂

石硫黃

礬石

綠礬

山草部

甘草

黃耆

人參

沙參

桔梗

黃精

葳蕤

知母

肉蓯蓉

天麻

白朮

蒼朮

狗脊

貫眾

巴戟天

遠志

淫羊藿

仙茅

玄參

地榆

丹參

紫參

紫草

白頭翁

白及

三七

黃連

胡黃連

黃芩

秦艽

柴胡

銀柴胡

前胡

防風

獨活

羌活

大麻

苦參

白蘚皮

延胡索

卷二

芳草部

貝母
細辛

山慈姑

杜衡

白茅根

白微

草龍膽

白前

當歸

芎藭

撫芎

蛇牀

藜蘆

白芷

白芍藥

赤芍藥

牡丹皮

木香

甘松香

山柰

高良薑

草薺寇

草果

白薺寇

縮砂蜜

益智子

萹荑

蒟蒻

肉苁蓉

補骨脂

薑黃

鬱金

蓬莪茂

荆三稜

香附

茉莉

排草

藿香

薰香

蘭香

澤蘭

馬蘭

香蒿

爵牀

荆芥

紫蘇

蘇子

水蘇

薄荷

隰草部

菊

艾

茵陳蒿

青蒿

羌蔚

微衡

夏枯草

劉寄奴

旋覆花

青葙子

紅藍花

臙脂

大薊小薊

續斷

漏蘆

芋根黃麻

胡蘆巴

惡實

蒼耳

天名精

鶴蝨

稀莧

箬

蘆根

甘蕉

襲荷

麻黃

木賊

石龍芻

燈心

生地黄

乾地黄

熟地黄

牛膝

紫苑

麥門冬

萱草

淡竹葉

冬葵子

蜀葵花

秋葵子

龍葵

酸漿

敗醬草

欸冬花

鼠麴草

決明子

地膚子

瞿麥

王不留行

葶藶

車前子

馬鞭草

光明草

鯉腸草

連翹

陸英

藍實以青小

青黛

蓼子

篇蓄

白蒺藜

沙苑蒺藜

穀精草

海金沙

地椒

半邊蓮

地丁

見腫消

毒草部

大黃

商陸

狼毒

狼牙

防葵

蘭茹

大戟

澤漆

甘遂

續隨子

芫荽子

蓖麻子

常山

蜀漆

藜蘆

附子

川烏

天雄

側子

草烏

射罔

白附子

天南星

半夏

蚤休

鬼白

射干

玉簪根

鳳仙子

曼陀羅花

羊躑躅

芫花

蕘花

莽草

茵芋

鈎吻

蔓草部

兔絲子

五味子

覆盆子

使君子

木鼈子

馬兜鈴

青木香

預知子

牽牛

紫葳

施花

薔薇薔實

月季花

枯萋實

枯萋根

土瓜根

葛根

天門冬

百部

何首烏

葶藶

土茯苓

白斂

山豆根

黃藥子

白藥子

威靈儂

茵草

防己

木通

通草

鈎藤

木蓮

紫葛

葎草

忍冬

清風藤

藤黃

水草部

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

蒲黃

苦草

水萍

蓴

海藻

昆布

石草部

石斛

骨碎補

石葦

景天

石胡荽

地錦

苔草部

陟釐

石藻

卷柏

馬勃

倒掛草

苔

卷三

穀部

諸米

諸麥

諸豆

胡麻

亞麻

麻子仁

薏苡仁

嬰粟殼

阿芙蓉

蒸餅

神麴酒麴紅麴

飴糖

醋

酒

菜部

韭

薤

葱

蒜

薑薑

白芥子

蕪菁

萊菔

生薑

乾薑

胡荽

懷香

靳菜

波菜

薤菜

同蒿

芥菜子

莧子

馬齒莧

翻白草根

蒲公英

落葵

蕺菜

蕨

黃獨

薯蕷

百合

茄

苦瓠

冬瓜子

越瓜

胡瓜

南瓜

絲瓜

苦瓜

紫菜

石花菜

木耳

桑耳

香蕈
雞塊

土萇

果部

李根白皮

杏仁

梅

桃仁

栗

棗

梨

木瓜

山楂

柰

林檎

柿蒂

安石榴

橘皮

青皮

橘核

橘葉

柑

橙

柚

柑椽

金橘

枇杷葉

楊梅

櫻桃

銀杏

胡桃

長生果

瑣瑣葡萄

椽實

榭皮

荔枝

龍眼

橄欖

榧子

松子

檳榔

大腹子

大腹皮

馬檳榔

無花果

枳椇

水果部

西瓜

瓜子仁

甜瓜蒂

甜瓜子

葡萄

甘蔗

沙糖

石蜜

蓮藕

蓮實

石蓮子

蓮鬚

蓮房

荷葉

芡實

芡實

烏芋

慈姑

味部

蜀椒

秦椒

椒目

豬椒根

胡椒

畢澄茄

吳茱萸

食茱萸

茗

香木部

柏子仁

柏葉節油

松脂

松節

杉

肉桂

桂心

牡桂

筒桂

桂枝

辛夷

沈香蜜香

丁香丁皮

薜檀

紫檀

降真香

烏藥

茴香

楓香脂

薰陸香

沒藥

麒麟竭

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

蘆薈

喬木部

黃蘗小藥

厚朴

杜仲

椿樗根皮

乾漆

梓白皮

梧葉皮

桐實

海桐皮

川楝子

槐實

槐花

秦皮

合歡皮

皂莢

皂角刺

肥皂莢

無患子

没石子

訶梨勒

柳華

檉柳

水楊

榆根白皮

蕪美

蘇方木

樺木皮

椴櫚

烏桕根

巴豆

犬楓子

相思子

灌木部

桑根白皮

桑椹

桑葉

桑枝

柘根白皮

楮實

枳殼

枳實

枸橘

梔子

酸棗仁

白棘

蕤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

鼠李子

女貞實

枸骨

衛矛

南燭

五加皮

枸杞

地骨皮

搜疏

石南

牡荊

蔓荊子

柴荊皮

木槿皮

芙蓉

山茶

蜜蒙

木棉

柞木

黃楊

放杖木

接骨木

寓木部

茯苓

茯神

琥珀

豬苓

雷丸

桑寄生

松蘿

苞木部

竹葉

竹茹

竹瀝

笋

竹黃

震燒木

藏器部

錦

褲襠

裏脚布

鑿柄

弓弩弦

敗蒲扇 蒲席

漆器

燈蓋油

炊單布

敗鼓皮

卷四

蟲部

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

蠟燭

蟲白蠟

紫鈔

五倍子

桑螵蛸

雀甕

原蠶蛾

白殭蠶

蠶繭

蠶退

蠶沙

九香蟲

雪蠶

蜻蛉

樗雞

芫青

蟹螯

葛上亭長

地膽

蜘蛛

壁錢

蠍

水蛭

蛆

狗蠅

蜻螳

桑蠶蟲

桃蠶蟲

蚱蟬

蟬脫

蛻螂

天牛

螻蛄

螢火

衣魚

鼠婦

塵蟲

蜚蠊 即蝨

蟾蜍

蟾酥

蝦蟇

蛙

蝌蚪

蜈蚣

蚯蚓

蝸牛

龍蛇部

龍齒

龍角

鼈甲

鯨鯨甲

石龍子

守宮

蛤蚧

蛇蛻

蚺蛇膽

白花蛇

烏蛇

蝮蛇

魚部

鯉魚

鱖魚

青魚

連魚

闊口魚

鰱魚

白魚

石首魚 白鯧

鱈膠

勒魚

鮓魚

嘉魚

鮓魚

鮓魚

石斑魚

鱸殘魚

海粉

燕窩

鱸魚

鰻魚

鱧魚

鱧魚

鱖魚

甲魚

鱖魚

鮓魚

黃頰魚

江鱗

河豚

江豚

比目魚

鮫魚

烏賊骨

鮑魚

海馬

蝦

介部

龜版 膽汁 尿

玳瑁

鼈甲

龜甲

蟹

蠶

牡蠣

蚌

真珠

石決明

文蛤

蛤蜊

蛭

魁蛤殼 即瓦子

車螯

貝子

石蚶

淡菜

海贏 甲煎

田贏

寄居蟲

郎君子

禽部

鶴頂

鶴骨

鵝鵝

鵝鵝

鵝

鴈

鴨

鳧

雞

雉

烏鴉

鶻

鷓鴣

鷄

鴿

鶯

雀卵

伏翼

五靈脂

斑鳩

伯勞

鸛鴒

啄木鳥

鷓鴣

鷹屎白

鸚鵡

鴟

鴉

鴟休

鳩

獸部

豬

狗

羊

羖羊角

牛

馬

驢

駝

酪

酥

阿膠

黃明膠

牛黃

狗寶

獅油

虎骨

象皮

犀角

熊脂

熊膽

麋羊角

山羊血

鹿茸

鹿角膠

鹿胎

麋茸

麋鹿肉

麋

麝香

貓

狸

獐

兔

狐

水獺肝

山獺莖

脰膈臍

鼠

刺蝟皮

人部

髮

頭垢

乳汁

爪甲

人牙

人中黃

金汁

乾糞灰

溺

溺白涎

秋石

紅鉛

天靈蓋

人胞

胞衣水

初生臍

胎元

水部

諸水 古人服藥必擇水火故凡湯液多用新汲井華水取天真之氣浮於水面也宜文火煎成候溫煖緩服之金匱云凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之此言治熱解毒及辛熱藥味當確遵此例一切調補藥即宜溫飲苦寒祛火藥則宜熱飲熱因寒用之法也○仲景煎實脾藥作甘瀾水揚之萬遍取其流利不助腎邪也○杓揚百遍名百勞水取其激揚以除陳積也成無己曰仲景治傷寒痰熱在裏身黃麻黃連軹赤小豆湯煎用潦水取其味薄不助濕熱也○以新汲水煎沸如麻名麻沸湯取其輕浮以散結熱也○以水空煎候熟極煮藥名清漿水取其下趨不至上涌也○服涌吐藥用釐水取其味濁引疾上竄以吐諸痰飲宿食酸苦涌泄為陰也○煎蕩滌邪穢藥用東流水本經云東流水為雲母石所畏鍊雲母用之○煎利水藥用急流水取性走也○煎水逆嘔吐藥用逆流水取其上涌痰涎也○煎陽盛陰虛目不得瞑藥用千里流水取其性之疾瀉也○煎中暑神昏藥及食楓樹菌笑不止用地漿水急掘地作坎取救垂絕之陰也○煎中暑汗藥及霍亂泄利不止用酸漿水糯米釀成點乳餅者或水磨作內點真粉之酸水亦可取收欲脫之陽也○黃雲雨水洗瘡疥滅斑痕○白露雨水洗肌面減顏色○秋露質清止瘡除煩○臘雪氣羶助陽攝火治天行時氣溫疫解丹毒○電水性暴動風發癩○夏冰陰凝發疔成疔○柏葉菖蒲上露並能明目○韭葉上露去白癩風○靈膏花上露能損人目○浸藍水解毒殺蟲吞水蛭腹面黃者吸此水蟲下即安○瓶中養花水有毒傷人臘梅者尤甚○鹵水鹹苦大毒凡蝕羸疥癬及毒蟲生子入肉者塗之即化但瘡有血者不可塗之六畜食一合當時死人亦然○生熟湯入鹽微鹹霍亂者飲一二升吐盡痰食即愈○方諸水大蚌水也向月取之得至陰之精華故能明目止渴除煩湯火瘡敷之有效○上池水竹籬頭上水也長桑君飲扁鵲能洞鑑藏府見垣一方人○

東阿井水煎烏驢皮膠。治逆上之痰血。○青州范公泉造白丸子。利膈化痰。二者皆濟水之分流也。○至若古塚廢井。澤中停水。山巖泉水有翳。及諸水經宿。面有五色者。皆有毒。非但不可服。食煎藥。即洗滌亦忌之。

火部

諸火 北方炊食。都用煤火。以地屬坎。足勝其氣。且助命門真火。人食煤火。長氣於陰。所以膂力強壯。南人食之多發癰毒。受其毒者。以薺汁解之。然煤火處。置大缸水於旁。則毒從水解。○南方炊食。都用薪火。人食薪火。長氣於陽。氣多輕浮不實。不似北方之稟氣剛勁也。○凡煎補藥。文火緩煎。瀉藥武火急煎。煎膏用桑柴火最良。抱朴子云。一切神仙藥。不得桑柴不服。然不若煎收。並用文火。則不傷藥性。○上古炊食。都用燧火。是為陽火。今皆擊石取火。則陰火也。用以炊食。猶之可也。若點艾炷。尤非所宜。灸文宜取太陽真火。否則真麻油燈。艾莖點於炷上。則灸瘡至愈不痛。○神鍼火。治寒濕痺。附骨陰疽。凡在筋骨隱痛者。鍼之火氣直達病所。○燔鍼。即燒鍼。病在經筋。所發諸痺。用之其效最捷。經云。治在燔鍼。切刺以知為度。以痛為愈。○馬矢煨。煨風痺藥。取其性緩。通行經絡也。○葦薪火。炊瀉陽藥。取其輕揚。不損藥力。者皆內經法也。○燈火。焯小兒諸驚。及頭風腦痛。風痺緩急。以油能解風毒。火能通經絡也。○燈花。治小兒邪熱在心。夜啼不止。以二三顆燈心湯。調林乳吮之。○燭燼。治疔腫。同胡麻。鍼砂等分為末。和醋敷之。治九漏。與陰乾馬齒莧等分為末。和臘豬脂敷之。取烏柏之餘力。以化歹肉也。○至於烟草之火。方書不錄。惟朝鮮誌見之。始自閩人。吸以祛瘴。向後北人。藉以辟寒。今則通行震宇。豈知毒草之氣。熏灼藏府。遊行經絡。能無壯火散氣之慮乎。近日目科內障丸中。間有用之。獲效者。取其辛溫散冷積之翳也。不可與水片同吸。以火濟火。多發烟毒。不可以藤點吸。恐其有蛇虺之毒也。吸烟之後。慎不得飲火酒。能引火氣薰灼藏府也。又久受烟毒。而肺胃不清者。以砂糖湯解之。烟筒中脂污衣上。滌之不去。惟嚼西瓜仁。搽之即淨。其滌除痰垢之力可知。世以瓜子仁生痰。不亦謬乎。

諸土 脾土喜燥惡濕故取東壁太陽所照之土引真火生發之氣補土而勝濕則吐瀉自止用以制藥皆為脾胃之引導耳昔人以東壁土調水治小兒嗜食泥土之病取土入蟲口而祛之下行也○道塗中熱土治夏月暈死取溫以散熱也若沃以冷水虛陽立鏹死不救矣○白堊土苦溫無毒本經主女子寒熱癥瘕月閉積聚取土之間氣以祛婦人間廁之積也千金治婦人帶下等疾者以土能勝濕而白則兼入氣分也惟邯鄲者為勝○黃土甘平無毒乃中央正色不占穢漬故色不黑治泄利冷熱赤白腹內絞痛下血解諸藥毒閉口椒毒野薑毒○蚯蚓泥治小兒陰囊熱腫取寒能解毒也熱病譫語狂亂無燥結可攻者蚯蚓泥涼水調服○蛻螂轉丸土治反胃吐利霍亂湯淋絞汁飲之醋調塗項上癭瘤○土蜂窩上細土王頭風腫毒及蜂螫傷醋和傅之○胡燕窩土主風瘙癢疹及惡刺瘡浸淫瘡並水和傅之小品治濕瘍疥瘡外臺治蠟螫尿瘡千金治瘰疽丹毒○鼠壤土通腎氣解毒邪取其搜風達竅也○蟻垤土下胞衣死胎炒熱搗心下自出○燒尸場上土治好魔多夢置枕中并塗關元及臍○螺螄泥主反胃吐食取螺螄一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調服○犬屎泥治妊娠傷寒塗腹保胎○井底泥治妊娠熱病塗胸臍丹田護子并治湯火燒瘡○伏龍肝乃竈心赤土本經云味辛微溫主婦人崩中吐血千金名釜月下土言正對釜臍處也然必日用炊飯者良若煮羹者味鹹不堪入藥止欬逆吐血消癰腫毒氣蓋以失血過多中氣必損故取微溫調和血脈也消癰腫毒氣者辛散奕堅也日華子主催生者取溫中而鎮重下墜也其胎漏不止產後下利並宜煮水澄清去滓代水煎藥取溫土臍和營血也千金方治中風口噤狂不識人並用攪水澄服又久利不止橫生逆產胞衣不下皆醋調塗臍腹效小兒重舌和苦酒塗之發背酒調厚敷乾即易平乃止杖瘡腫痛香油調塗灸瘡腫痛煮水熱淋皆採真人法也外臺治一切癰腫和蒜泥帖乾再易之○百草霜燒百草之煤也止血散瘀上下諸血悉主之又陽毒發斑取溫以解毒散火也○釜臍墨治陽毒發狂黑奴丸中用之千金治卒中惡卒心痛舌卒腫大等患又下死胎方

用百草霜二錢伏龍肝五錢為細末酒調童便服二錢少頃再服三服即下。○梁上塵一名烏龍尾治妊娠胎動橫生逆產。及金瘡鼻衄疔腫惡瘡小兒赤丹取其輕浮以散久積之氣也。○清煙墨灰止吐衄血逆上行。或生藕汁。或萊菔汁。或鮮地黃自然汁。磨服即止。然須燒灰出火毒用之。但勿用乾地黃和水搗磨柏葉汁。甘蔗汁。咸非所宜。往往止截後有瘀積之患。飛絲入目。及一切塵物入目。磨濃墨點之。自出。或燈心醮墨汁頻捲之。○砂鑄取年久炊食者。研細水飛治黃腫積塊。酒服五錢。潞州者佳。○孩兒茶一名烏參泥。性澀收斂。止血收濕。為金瘡止痛生肌之要藥。○白磁器研細水飛。傳癰腫可代鍼砭。又點目去翳。○糞坑底泥。治背瘡疔腫癰毒。陰乾為末。新水調敷。其痛立止。○坑垆同蟬蛻全蠍末作餅。香油煎滾溫服。以滓傳疔四圍。其疔自出。

金部

金 生金辛平有毒。金箔無毒。發明 金能制木。故可療驚癇風熱肝膽之病。然須為箔。庶無重墜傷中之患。紫雪方用赤金葉子煎水。取制肝降痰逆也。若成塊錠金。及首飾之類。非持無味。且有油膩。良非所宜。○銀箔功用與金不殊。但入氣分。不入血分。稍為不同。肘後方。治癰腫。五石湯用之。

赤銅 苦平微毒。發明 賊風反折。以赤銅五觔。燒紅。內二斗酒中。百遍服。五合。日三服。以效為度。赤銅落乃打銅。落下之屑。與自然銅同類。故亦能接骨。煨赤醋沃七次。同五倍等。則染鬚黑潤。藏器曰。赤銅屑能鐸人骨。及六畜有損。細研酒灌。直入骨損處。六畜死後。取骨視之。猶有鐸痕可驗。

銅青 酸苦平小毒。發明 銅青藉醋結成。能入肝膽二經。以醋醮。搽喉中。則吐風痰。為散療喉痺牙疳。醋調搯腋下。治胡臭。薑汁調點。爛沿風眼。去疔殺蟲。所治昏厥陰之病。

自然銅 辛平小毒。火煨醋淬七次。置地七日。出火毒。水飛用。銅非煨不可入藥。新煨者火毒燥烈。慎勿用之。發明 自然銅出銅坑中。性稟堅剛。散火止痛。功專接骨。骨接之後。即宜理氣活血。庶無悍烈傷

中。走散真氣之患。

古文錢 新平小毒 發明 古錢以生薑汁塗刮青點目去障消痰散赤腫一點即愈但初點熱淚蔑

面然終無損惟作瘡者與肝腎虛而內障生花者不可用也婦人逆產五淋者汁用之便毒初起與胡桃肉同嚼食二三枚即消便毒屬肝金伐木也

鉛一名錫 甘寒無毒凡用取未經銀治新鉛鎔淨去渣再鎔成液同硫黃煨如焰起以醋洒之候成黑灰研之不黏滯為度如煨不透服之令人頭痛以陰降太速陽火無依故也 發明 鉛稟北方癸水之性

陰極之精內通於腎故局方黑錫丹宣明補真丹皆用之得水交感即能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降噎膈反胃嘔吐眩暈諸疾又槌成薄片置燒酒中半月許結成白霜取其酒徐徐飲之降陰火最捷但性帶陰毒恐傷心腎不可多服鉛性入肉故女子以之絰耳孔即自穿

鉛粉一名粉 辛寒無毒 本經治伏尸毒螫殺三蟲 發明 韶粉與黃丹同類內有豆粉蛤粉而無硝鹽但入氣分功專止痛生肌亦可入膏藥代黃丹用本經治伏尸毒螫殺三蟲者取鉛性之重以鎮攝其

邪金匱甘草粉蜜湯治虺病吐涎心痛專取胡粉殺蟲甘草安胃蜜以誘入蟲口也陶弘景云療尸蟲彌良

鉛丹一名鉛 辛微寒無毒 本經治吐逆胃反驚癩癩疾除熱下氣 發明 鉛丹體重性沉味兼鹽礬而走血分能墜痰止瘡本經言止吐逆胃反治驚癩癩疾除熱下氣取其性重以鎮逆滿也仲景柴胡龍

丹牡蠣湯用之取其入膽以祛痰積也但內無積滯誤服不能無傷胃奪食之患傳瘡長肉墜痰殺蟲皆鉛之本性耳目暴赤痛鉛丹蜜調貼太陽穴立效

蜜陀僧 鹹辛平小毒 發明 此感鉛銀硝石之氣而成其性重墜直入下焦故能墜痰截瘡療瘡腫治驚氣入心包絡瘡不能言語者用蜜陀僧末一匕茶清調服即愈驚則氣亂取重以去怯而平肝也但

入口則漾漾欲吐以陰毒之性能傷胃氣也聖惠方鼻皴赤皴蜜陀僧細研人乳調夜則塗之丹方治背瘡初起以醋煨七次桐油調圓患處即消同枯礬治汗癩體氣合五倍子染鬚髮同鷹屎白滅癩痕水磨

本經卷之九 金部

服解砒霜硫黃毒

錫 辛寒微毒 發明 錫為砒母故新造錫器不可盛酒越宿制瓶藏藥須舊錫雜鉛乃佳昔人過飲

燒酒昏迷欲絕或令以錫器貯沸湯蓋取氣水飲之即甦此與炊單布治湯氣薰灼無異同氣相感之力也

鐵落 辛寒有毒即燒鐵赤沸砧上暴下之屑也鐵銚內煨赤醋沃七次用 本經主風熱惡瘡瘍疽加

疥氣在皮膚中 發明 素問云有病怒狂者治以生鐵落為飲清汁煎藥取其性沉下氣最疾不可過

服過服令人凜凜惡寒以其專削陽氣也本經主風熱惡瘡等疾皆肝心火熱所致辛寒能除二經之熱

也蘇恭以之炒熱投酒中療賊風癱病借酒以行皮膚中氣也

鐵砂 酸辛無毒作鐵家磨鑿細末也 發明 鐵砂寒降善治濕熱脾勞黃病於鐵銚內煨通紅醋沃

置陰處待半月結塊生黃化盡鐵性用為消脾胃積堅黃腫之專藥丹溪溫中丸用之又以製過鐵砂一

兩入乾漆反半錢香附三錢合平胃散五錢蒸餅為丸湯酒任下治瘵與溫中丸不殊

鐵精 平微溫小毒 本經明目化銅 發明 鐵之精華也出鍛竈中紫色輕如塵者佳取至陰沉重

之性得純陽火鍊而輕浮上升故可以療驚悸定風癇破胃腕積血作痛本經王明目取其鎮攝虛火之

義以其得火氣之多也但胃氣虛寒人服之往往有奪食發呃之虞以純陰鎮攝太過而傷犯陽和之氣

也

鐵鑄鐵衣 辛寒無毒 發明 陶華云鐵鑄水和藥服性沉重最能墜熱開結又能平肝消腫治惡瘡

疥癬和油塗之婦人產後陰挺不收和水片研水傳之蠮螋蜈蚣咬和蒜塗之

石部

玉 平淡無毒 發明 玉減癭痕日日磨擦久則自退研細水飛去目翳珊瑚瑪瑙寶石玻璃水晶為

屑水飛皆能磨翳不獨玉屑為然也

雲母 甘平無毒。凡用選白瑩者。擘薄片。取雨水或流水漬去砂土。更以秋露漬數十日。同露煮七日。夜磨令極細。搯指無復光明者。乃可用之。或同鹽入重布袋按之。沃令鹽味盡。懸當風處。自然成粉。弘景曰。錄之用。礬則柔爛。忘羊血者。以其能解諸藥之性也。與胡蒜尤為切。禁犯之。必腹滿作瀉。黑者有毒。傷人。本經主身皮死肌。中風寒熱。如在車船上。除邪氣。安五藏。益精明目。久服輕身延年。發明 雲母生泰山山谷。色白者良。本經言雲母甘平。詳其性升。亦應有甘溫助陽之力。故能辟一切陰邪不正之氣。主身皮死肌。以其能辟除陰毒也。其治中風寒熱。如在車船上。以其能鎮攝虛陽也。局方雲母膏。治一切癰毒。仲景方治牝瘡多寒。千金方治久利帶下。小便淋疾。及一切惡瘡。深師方治痰飲頭痛。何德揚治婦人難產。溫酒調服三錢。入口即下。金刃傷傳之止血最速。且無腐爛之虞。陰疽瘍癰亦多用之。皆取助陽之力也。久服能使身輕尸解。孫真人恒服之。但石藥性偏助陽。凡陰虛火炎者。慎勿誤與。

白石英 甘溫無毒。出泰山。以六稜瑩白如水晶者為真。林北海先生本草綱目必讀。但收紫而不及白。世鮮真者可知。本經治消渴陰痿不足。効逆胸膈間久寒。益氣除風濕痺。發明 白石英入手太陰足陽明氣分。肺癰潰久。痿痺不起者宜之。本經主消渴陰痿不足諸病。功專溫肺無疑。但石性慄悍。不可久服。仲景金匱風引湯。只令碎如米粒。不欲其滓入胃也。千金五石等方。俱鍛過水飛入丸。而五石丸專以鍾乳為君。合紫白石英。赤石脂。石膏。專溫藏氣。而石膏清胃。以解諸石之悍。且既經煨過水飛。不慮其滓之留中。益熱也。

紫石英

甘溫無毒。出泰山。以五稜明淨深紫大塊者良。浙產者塊小。亦可入藥。經火則毒。生研極細。水

飛三次用。時珍云。煨赤醋淬七次。水飛用非。

本經主心腹効逆邪氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十

年無子。

發明 紫石英入手足少陰厥陰血分。上能鎮心。定驚悸。安魂魄。攝逆氣。重以去怯也。下能益

肝。填補下焦。散陰火。止消渴。溫以暖血也。女子經阻。色淡不孕者宜之。本經治女子風寒存子宮。絕孕十

年者。服之能孕。非特峻補。兼散濁陰。留結之驗也。若血熱紫黑者。禁用。為其性溫也。千金云。婦人欲求美

色者勿服紫石英令人色黑非溫血之謂乎故婦人絕孕由於陰虛火旺不能攝精者禁用

丹砂味 甘微寒無毒研細水飛入火則烈毒能殺人急以生羊血童便金汁等解之 本經王身

體五藏百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化為汞 發明 丹砂體陽

性陰外顯丹色內含真汞不熱而寒離中有坎也不苦而甘火中有土也嬰兒姤女交會於中鎮心安神

是其本性用則水飛以免鎮墮不宜見火恐性飛騰本經治身體五藏百病安定神明則精氣自固火不

妄炎則金木得平而魂魄自定五藏皆安精華上發而氣益目明陽明神物故應辟除不祥消散陰惡殺

厲之氣仲淳繆子經疏之言也同遠志龍骨則養心氣同當歸丹參則養心血以人參茯神淡煎調入丹

砂治離魂病以丹砂末一錢和生雞子黃三枚攪勻頓服治妊娠胎動不安胎死即出未死即安又以丹

砂一兩為末取飛淨三錢於一時頃分三次酒服治子死腹中立出慎勿經火若經伏火及一切烹煉則

毒等於砒礪惟養正丹則同鉛汞硫黃煨之以永善走而火毒不致蘊發也

銀硃 辛溫有毒忌一切血 發明 水銀和硫黃煨煉成硃轉姤為嬰故專殺蟲治瘡以毒攻毒而已

今食品往往用之良非所宜觀其同蟹殼燒之則臭蟲絕跡和棗肉薰之則瘡痂頓枯其性悍烈可知

水銀一名 辛寒有毒水銀陰毒重者不可入人腹古法治誤食水銀令其人卧於椒上則椒內皆含水

銀今有誤食水銀腹中重墜用豬脂二觔切作小塊焙熟入主蜜拌食得下亦一法也 本經主疥癩加

瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹 發明 水銀乃至陰之精質重者而性

流利得鹽礬為輕粉加硫黃為銀硃煬成罐同硫黃打火升煉則為靈砂同硝皂等則為升降靈藥性之

飛騰靈變無似之者此應變之兵在用者得其肯綮而執其樞要焉本經主疥瘍白禿皮膚中蟲及墮胎

除熱傳男子陰則陰消無氣以至陰之精能消陽氣故不利男子陰器也和劑局方之靈砂丹專取硫黃

以製汞養正丹兼取伏火丹砂以製鉛深得交通陰陽既濟水火之妙用非尋常草木可以例推也千金

治白癩風癩外臺治蟲癬疥癩梅師治痔瘡作痒肘後治一切惡瘡藏器有云水銀入耳能蝕人腦令人

百節癩粉但以金銀著耳邊即出頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治

輕粉賦名 辛燥有毒 發明 水銀加鹽礬鍊為輕粉。化純陰為燥烈而陰毒之性猶存。故能通大腸

傳小兒疳疽癩癧殺瘡疥癬蟲風瘙瘡癢但以陰性暴悍。善蚶淫穢微瘡食之竄入筋骨。莫之能出。久

發為結毒致成廢人。然必仍用水銀昇鍊入三白丹。引拔毒之藥。同氣相求。以搜逐之。癘風醉仙丹。通天

再造散用以搜滌毒邪。從齒縫出。錢氏利驚丸。白餅子皆用之。取疫積從大便出。真瞑眩之首推也。

靈砂 甘溫無毒 按胡演丹藥秘訣云。昇靈妙法。用新鍋安道遙爐上。蜜搯鍋底。文火下燒。入硫黃二

兩。鎔化。投水銀八兩。以鐵匙急攪。作青砂頭。如有焰起。噴醋解之。待永不見星。取出細研。盛入水。火鼎內。

鹽泥固濟。下以自然火。斗之。乾水十二盞為度。取出如束鍼紋者成矣。庚辛玉冊云。靈砂有三。以一伏時

周天火而成者。謂之金鼎靈砂。以九度抽添。用周天火而成者。謂之九轉靈砂。以地數三十日。炒鍊而成

者。謂之老火靈砂。並宜桑皮淋醋者。伏過用之。於硃砂中鍊出者。謂之真汞。尤為神效。發明 時珍曰。

此以至陽釣至陰。脫陰反陽。故曰靈砂。為扶危拯急之靈丹。虛陽上逆。痰涎壅盛。頭眩吐逆。喘不得卧。寤

不得寐。霍亂反胃。心腹冷痛。尤為鎮墜虛火之專藥。但不可久服。凡胃虛嘔吐。傷暑霍亂。心熱鬱禁。用

雄黃 辛苦溫微毒。武都者良。入香油熬化。或米醋入蘿蔔汁煮乾。用生則有毒傷人。本經主寒熱鼠

瘰惡瘡疽痔死肌。殺精物惡鬼邪氣。百蟲。毒勝五兵。發明 雄黃生山之陽。純陽之精。入足陽明。經得

陽氣之正。能破陰邪。殺百蟲。辟百邪。故本經所主。皆陰邪濁惡之病。勝五兵者。功倍五毒之藥也。其治驚

癇痰涎。及射工沙蟲毒。與大蒜合搗塗之。同硝石煮服。立吐腹中。毒蟲。千金方治疔腫惡瘡。先刺四邊。及

中心。以雄黃末傅之。聖惠方治傷寒狐惑。以雄黃燒於瓶中。熏其下部。和劑局方酒癩丸。同蠟尾巴豆。治

酒積痛利。肘後方以雄黃礬石甘草湯煮。治陰腫如斗。經驗方以雄黃白芷為末。酒煎。治破傷風腫。家秘

方以雄黃細研。神麴糊丸。空心酒下四五分。日服無間。專消瘡母。急救良方以雄黃五錢。麝香二錢。為末

作二服。酒下。治風狗咬傷。外臺祕要雄黃敷藥箭毒。攝生妙用雄黃硫黃茱萸粉人乳調敷。酒皸鼻赤。不

過三五次愈。痘疹證治。以雄黃一錢。紫草三錢。為末。臘脂汁調。先以銀簪挑破。搽痘疔。萬氏方治。瘰癧。漫腫。色不炊赤。明雄黃細末三分。雞子破殼調入。飯上蒸熟食之。重者不過三枚即消。聖濟錄以雄黃豬膽汁調敷白禿頭瘡。○董黃治惡瘡疥癬。殺蟲蝨。和諸藥重嗽。千金方有效嗽熏法。

雌黃 辛平有毒 本經主惡瘡頭禿。疥疥。殺毒蟲。蝨身瘰癧。邪氣諸毒。發明 雌黃出山之陰。故單治

瘡殺蟲而不能治。驚癩痰疾。本經治惡瘡頭禿。疥疥。與雄黃之治寒熱鼠瘻。迥乎陰陽之分矣。其殺毒蟲蝨身瘰癧。較雄黃之殺精物惡鬼邪氣。解毒辟惡之性則一。而功用懸殊。治狂痴勝金丹用之。不過借為搜陰邪之嚮導耳。別錄治鼻中瘰肉。不宜久服。令人腦漏。

石膏 辛甘大寒無毒。清胃熱。煨用。治中暍熱。生用。一種微硬。有肌理。名理石。主治與粗理黃石相類。

本經主中風寒熱。心下逆氣。驚喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳金瘡。發明 古人以石膏

葛根。並為解利。陽明經藥。蓋石膏性寒。葛根性溫。功用詎可不辯。葛根乃陽明經解肌散寒之藥。石膏為

陽明經辛涼解熱之藥。專治熱病。暍病。大渴引飲。自汗頭痛。溺瀆便閉。齒浮面腫之熱證。仲景白虎湯是

也。東垣云。立夏前服白虎。令人小便不禁。降令太過也。今人以此湯治冬月傷寒之陽明證。服之未有得

安者。不特石膏之性寒。且有知母。引邪入犯少陰。非越婢。大青龍。小續命。中石膏。左麻黃化熱之比。先哲

有云。凡病雖有壯熱。而無煩渴者。知不在陽明。切勿誤與白虎。本經治中風寒熱。是熱極生風之象。邪火

上衝。則心下有逆氣。及驚喘。陽明之邪熱甚。則口乾舌焦。不能息。邪熱結於腹中。則堅痛。邪熱不散。則神

昏識語。等乎邪鬼。解肌散熱外泄。則諸證自退矣。即產乳金瘡。亦是鬱熱益毒。赤腫神昏。故可用辛涼以

解泄之。非產乳金瘡可泛用也。其金匱越婢湯。治風水惡寒。無大熱。身腫自汗不渴。以麻黃發越水氣。使

之從表而散。石膏化導胃熱。使之從胃而解。如大青龍。小續命等製。又不當以此執泥也。至於三黃石膏

湯。又以伊尹三黃。河間解毒。加入石膏。麻黃。香豉。薑。葱。全以麻黃開發伏氣。石膏化導鬱熱。使之從外而

解。蓋三黃石膏之有麻黃。越婢。青龍。續命之有石膏。白虎之加桂枝。加蒼朮。加人參。加竹葉。麥門冬。皆因

勢利導之捷法千金五石丸等方。用以解鍾乳紫白石英石脂之熱性。耳別錄治時氣頭痛身熱三焦大熱。皮膚熱腸胃中熱氣解肌發汗。止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱者。以諸病皆由足陽明胃經邪熱熾盛所致。惟喘息略兼手太陰病。此藥能散陽明之邪熱。陽明熱邪下降。則太陰肺氣自寧。故悉王之○精理黃石破積聚去三蟲千金錄石散醋煨水飛同白斂鹿角治石癰以火鍼鍼破傳之。

滑石 甘寒無毒色青赤者有毒 本經主身熱洩瀉女子乳難癰閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣

發明 滑石利竅不獨利小便也。上能散表下利水道為蕩熱散濕通利六府九竅之專劑。取甘淡之味以清肺胃之氣。下達膀胱也。詳本經諸治皆清熱利竅之義。河間益元散通治表裏上下諸熱。解時氣則以葱豉湯下催生。則以香油漿水調服。暑傷心包則以本方加辰砂末一分。使熱從手足太陽而泄也。惟元氣下陷小便清利及精滑者勿服。久病陰精不足內熱以致小水短少赤澀雖有泄瀉皆為切禁。而本經又言益精氣者言邪熱去而精氣自復也。

赤石脂 甘酸辛溫無毒五色石脂並溫無毒 本經養心氣明目益精

及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。血者取石脂之重瀝。入下焦血分而固脫。乾薑之辛溫煖下焦氣分而補虛。

胃也。火熱暴注初痢有積熱者勿用。本經養心氣明目益精。

目明精益矣。療腹痛腸澼等疾。以其開泄無度。日久不止。故取瀼以固之也。

去血過多無力迸下。故取重以鎮之也。東垣所謂胞衣不出。瀼劑可以下之。

非石脂所宜也。其白者斂肺氣澀大腸。金匱風引湯用之。專取以杜虛風復入之路也。

脾黑者入腎。總取治崩利水之功。各隨其色而用之。

爐甘石 甘溫無毒 發明 爐甘石得金銀之氣而成。專入陽明經而燥濕熱。目病為要藥。時珍常用

爐甘石煨飛海螵蛸硼砂等分為細末。點諸目病皆妙。又煨過水飛丸如彈圓多攢。簪孔燒赤煎黃連汁

入

淬數次。點眼皮濕爛。及陰囊腫濕。其功最捷。

無名異 甘平無毒。本經主金瘡折傷。內損止痛。生肌肉。發明 無名異。本經主折傷。內損。令人治

打傷腫痛。損傷接骨。又試效方。臨杖預用酒服三五錢。則杖不甚傷。蘇頌醋磨。傳腫毒者。亦取活血涼血之功耳。

石鍾乳 甘溫無毒。以甘草紫背天葵同煮一伏時。杵粉入鉢細研。水飛澄過。再研萬遍。磁器收之。若不

經煨煉。服之令人淋。本經主効逆上氣。明目益精。安五藏。通百節。利九竅。下乳汁。發明 鍾乳乃山

靈陽氣所鍾。故瑩白中空。純陽通達。專走陽明氣分。若質實色渝。必生陰壅。不無蛇虺之毒。誤餌傷人。惟

產乳源。形如鵝翎管者最勝。然性偏助陽。陰虛之人。慎毋輕服。內經云。石藥之氣悍。服之令陽氣暴。无形

體壯盛。昧者得此自慶。益肆淫泆。精氣暗損。石氣獨存。孤陽愈熾。久之榮衛不從。發為淋濁。及為癰疽。是

果乳石之過歟。抑人之自取耶。惟肺氣虛寒。効逆上氣。哮喘痰清。下虛脚弱。陰痿不起。大腸冷滑。精泄不

禁等疾。功效無出其右。本經主効逆上氣者。取其性溫而鎮墜之。則氣得歸元。而病自愈。五藏安。則精自

益。目自明。其通百節。利九竅。下乳汁者。皆取甘溫助陽。色白利竅之力也。昔人言鍾乳與白木相反。而千

金方每多並用。專取相反之性。激其非常之効。予嘗親試。未嘗有害。孔公孽。孔竅中通。附垂於石。如木之

孽。即鍾乳之牀。本經利九竅。下乳汁之功。與鍾乳無異。而殷孽。即孔公孽之根。又為瘡疽癰痔癩疽。濕散

結氣之用。惜乎世鮮知者。

石灰 辛溫有毒。本經主疽疔疥癩熱氣惡瘡。癩疾死肌。墮眉殺痔。蟲去黑子。瘰肉。發明 石灰稟

壯火之餘烈。故能辟除陰邪濕毒。觀本經所主疽瘍疥癩熱氣惡瘡癩疾死肌等。皆外治之用。去黑子者。

火氣未散。性能灼物。故能去黑子。瘰肉及墮眉也。本經雖不言有毒。而內服之方。從無及此。其毒可知。寇

氏治中風口喎。以石灰醋炒調塗。左塗右。右塗左。立便牽正。千金治身面疣。用苦酒浸石灰六七日。取汁

頻頻滴之。自落。又治溺死之人。用化過細灰。裹下部。以滲其水。即活。又治瘰瘡不合。古塚中石灰。厚傳之。

集玄方治面醫疣惡碱水煮滾化礦灰插糯米半入灰中經宿色變如晶以鍼微撥動點少許於上半日
汁出剔去藥不得著水二日即愈便問方治疔腮腫痛醋調陳年石灰敷之肘後方治湯火傷灼年久石
反油調敷之又治刀刃金瘡石灰裏之即痛定血止但不可著水著水即爛肉也

浮石海石名 鹹平無毒煨過水飛用 發明 海石乃水沫結成色白體輕故治上焦痰熱止嗽點目翳
傳痘癰功效最捷又治諸淋散積塊皆取鹹能軟堅之意消癭瘤結核疝氣然惟實證宜之虛者誤換患

亦最速以其性專尅消肺胃之氣也南海有浮水之石沉水之香專取物類之相反以治病氣之阻逆也

陽起石本經名 鹹溫無毒色白揉之如綿不脆者真實堅脆者即偽煨過燒酒淬七次杵細水飛用
本經主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足 發明 陽起石乃雲母之

根右腎命門藥下焦虛寒者宜之黑錫丹用此正以補命門陽氣不足也本經治崩中漏下陽衰不能統

攝陰血也又言破子藏中血癥瘕結氣是指陰邪蓄積而言用陽起石之鹹溫散其所結則子藏安和子

自成矣陰虛火旺者忌用以其性專助陽也

慈石本經名 辛鹹微寒無毒入藥煨過醋淬七次研細水飛用 本經主周痺風濕肢節中痛不
可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾 發明 慈石為鐵之母腎與命門藥也惟其慈故能引鐵千金

慈硃丸治陰虛龍火上炎耳鳴嘈嘈腎虛瞳神散大蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外移硃砂入心鎮

養心血使邪火不上侵耳目皆受蔭矣本經主周痺風濕肢節中痛洗洗酸消取辛以通痺而祛散之重

以法怯而鎮固之則陰邪退聽而肢節安和耳目精明大熱煩滿自除矣濟生方治腎虛耳聾以慈石豆

大一塊同煨穿山甲末綿裹塞耳中口含生鐵一塊覺耳中如風雨聲即通

代赭石本經名 苦甘平無毒擊碎有乳形者真火煨醋淬三次研細水飛用 本經主鬼疰賊風蠱毒

腹中毒邪女子赤沃漏下 發明 赭石之重以鎮逆氣入肝與心包絡二經血分本經治賊風蠱毒赤

沃漏下取其能收斂血氣也仲景治傷寒吐下後心下痞硬噫氣不除旋復代赭石湯取重以降逆氣滌

滌

滌

滌

痰涎也。觀本經所治，皆屬實邪。即赤沃漏下，亦是肝心二經瘀滯之患。其治難產胞衣不下及大人小兒驚氣入腹，取重以鎮之也。陽虛陰痿，下部虛寒，忘之，以其沉降，而乏生發之功也。

禹餘糧本經名曰餘糧與大餘糧功用皆同 甘平無毒。細研水淘澄之，勿令有砂土。本經主欬逆寒熱煩滿，下赤白

血閉癥瘕，大熱，鍊餌服之。不饑，輕身延年。發明 重可以去怯。禹餘糧之重，為鎮固之劑。手足陽明血

分藥，其味甘。故治欬逆寒熱煩滿之病。其性溫，故主赤白帶下。前後諸病，仲景治傷寒下利不止，心下痞

鞭利在下焦，赤石脂禹餘糧丸主之。取重以鎮痞逆。瀉以固脫泄也。抱朴子云：禹餘糧丸日再服，三日後

令人多氣力，負擔遠行，身輕不饑。即本經輕身延年之謂。

空青 甘酸大寒無毒。本經主青盲耳聾，明目利九竅，通血脈，養精神。益肝氣，久服輕身延年。發明

空青，感銅之精氣而結，故專入肝明目。本經主耳目九竅諸病，皆通血脈，養精神。益肝氣之力也。久服

輕身延年者，銅性善滌垢穢，垢穢去而氣血清純，母伐天和矣。時珍曰：空青與綠青皆生益州，及越雋山

有銅處，東方甲乙是生肝膽，其氣之清者為肝血，其精英為膽汁。開竅於目，血者五藏之英，皆因而注之

為神。膽汁充則目明，減則目昏。銅亦青陽之氣所生，其氣之清者為綠，猶肝血也。其精英為空青之漿，猶

膽汁也。其為治目神藥，蓋亦以類相感耳。但世罕得真醫，亦罕識以故俗諺有天下有空青，人間無瞽目

之說，不知此雖貴品，銅官始興、涼州、高平、饒信等處亦皆有之。出銅坎者，銅質隱隱，內涵空綠，生金穴者

金星粲粲，內涵空青。總取得肝膽之精靈，通空竅之風氣也。予嘗以此驗之，攷之張果玉洞要訣云：空青

似楊梅，受赤金之精。甲乙陰靈之氣，近泉而生，故能含潤。然必新從坎中出者，則鑽破中有水。若出曠日

久，則乾如珠矣。安有藏久不乾之理。近世必以中空含漿者為真，若爾則當名空漿，不當名空青矣。但須

驗其中空，內有青綠如珠者，即真空青，急不可得。綠青可以代用，活法在人，可執一乎。

曾青曾音其青層層而生 酸小寒無毒。本經主目痛，止淚出，風痺，利關節，通九竅，破癥，堅積，聚久

服輕身不老。發明 曾青治目，義同空青。以其並出銅礦，與綠青同一根源。曾青則綠青之祖氣也。古

方太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有曾青丸並見古今錄驗方曾青二青近世絕罕千金云當取崑崙綠代之即綠青也

綠青俗名石綠微酸小毒發明痰在上宜吐之在下宜利之綠青吐風痰眩悶取二三錢同龍腦少許

調勻以生薄荷汁合酒溫服便吐涎自口角流出乃愈不嘔吐而功速故著之

偏青俗名石青甘平無毒本經主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神發明石青

走肝磨堅積故本經所主皆肝經積聚之病時珍用吐風痰研細溫水灌下即吐肝虛易驚多痰者宜之形如縮砂者名魚目青主治與偏青無異

石膽俗名石膽酸辛寒有毒產秦州嵩岳及蒲州中條山出銅處有之能化五金以之制汞則與金無異

本經主目痛金瘡諸癩瘰癧女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣發明石膽酸辛氣寒入少陽

膽經性寒收斂味辛上行能涌風熱痰涎發散風木相火又能殺蟲本經主目痛金瘡癩瘰癧取酸辛以散

風熱痰垢也治陰蝕崩淋寒熱取酸寒以滌濕熱淫火也又為咽齒喉痺乳蛾諸邪毒氣要藥涌吐風痰

最快方用米醋煮真鴨嘴膽礬末醋調探吐膠痰即瘥又治紫白癩風膽礬牡蠣粉生研醋調摩之風犬

咬傷膽礬末水服探吐蜜調傳之立愈胃脘蟲痛茶清調膽礬末吐之走馬牙疳紅棗去核入膽礬煨赤

研末傳之追出痰涎即愈百蟲入耳膽礬和醋灌之即出千金方也

礬石 辛熱有毒久服令人筋攣煨法以黃泥包炭火燒一日一夕乃可用之惡羊血不入湯液本經

主寒熱鼠瘻蝕死肌風痺腹中堅癖邪氣發明時珍云礬石與砒石相近性亦相類但砒石略帶黃

暈礬石全白稍有分辯而古方礬石與礬石常相渾書二字相似故誤耳然礬石性寒無毒礬石性熱有

毒不可不審甄權除隔間積氣冷濕風痺癢癢積十年者仲景云生用破人心肝嚴冬以此置水中則水

不冰其熱毒之性不減砒石今藥肆中往往以充砒石而礬石僅可破積攻癩不能開痰散結是以勝金丹截瘡丹服之不效者良由誤用礬石之故按王子敬靜息帖言礬石深是可疑凡喜服寒食散者輒發

癰毒故云深可疑也以其毒烈乾汞最速故丹房目為仙藥凡山中有礬則春不生草冬不積雪而鼠食則斃蠶食則肥物類之宜忌有不可解者其特主礬石有蒼白紫桃花色金星銀星等類其毒不異惟出金穴中者名握雪礬石雖溫無毒與上迥為不同

砒石

出信州故又名信石

苦辛大熱大毒色白有黃暈者名金脚砒鍊過者曰砒霜色紅者最劣不堪入藥畏菜

豆芽茶冷水入藥醋煮用或與芽茶同用或與浸濕生菜豈仁同研以殺其毒中其毒者以生羊血解之冷水多灌亦解若犯火酒必不可救發明砒霜瘡家常用入口則吐利兼作吐後大渴則與菜豆湯飲之砒性大毒誤食必死奈何以必死之藥治必不死之病豈不殆哉然狂癡之病又所必需勝金丹用之無不應者枯痔散與天靈蓋同用七日痔枯自落取熱毒之性以枯肉天靈蓋以透骨髓散宿垢長肌肉也

礞石

辛鹹平無毒色青者入肝力勝色黃者兼脾次之硝石煨過杵細水飛用發明青礞石厥陰

之藥其性下行治風水太過挾制脾土氣不運化積滯生痰壅塞膈上變生風熱諸病故宜此藥重墜以下泄之使水平氣下而痰積通利諸證自除矣今人以王隱君滾痰丸通治諸痰怪證不論虛實寒熱藥用殊為未妥不知痰因脾胃不能運化積滯而生膠固稠粘者誠為合劑設因陰虛火炎煎熬津液凝結成痰如誤投之則陰氣愈虛陽火彌熾痰熱未除而脾胃先為之敗矣况乎脾胃虛寒食少便溏者得之泄利不止禍不旋踵若小兒多變慢脾風證每致不救可不慎歟

花乳石

一名花藥石

酸辛溫無毒出陝華諸郡色黃中有淡白點以此得名又代州山谷中有五色者制法

以花乳石五兩同硫黃二兩入煬成罐內鹽泥固濟加頂火煨過研細水飛用發明花乳石產硫黃

山中其性大溫厥陰血分藥也葛可久治虛勞吐血有花藥石散以其性溫善散瘀結也利劑局方治金

刃箭傷打撲垂死外有損處以煨過細末搽傷處血化黃水再搽即活如內有損血入藏府煎童子小便

入酒少許調灌一錢七立效婦人產後惡血衝心昏暈不省或胎死腹中胞衣不下致死但心胸溫暖者

急以童便調灌一錢。取下惡血即安。若膈上有血化為黃水。即時吐出。或隨小便出。甚效。但陰虛火炎中無痰積者。誤用必死。

河沙 微寒無毒 發明 河沙得水土之氣。故夏月發瘧子。通石淋。主絞腸痧痛。用沙炒熱。冷水淬之。

澄清服效。又風濕頑痺不仁。筋骨攣縮。六月取河沙曝熱。伏坐其中。冷即易之。取微汗。忌風冷。勞役。不過數次愈。其王田沙。夏月發麻疹良。

石燕 甘寒無毒 發明 石燕出祁陽西北江畔砂灘上。形似蚪而小。堅重於石。俗云。因雷雨則自石

穴中出。隨雨飛墮者。妄也。其性寒涼。乃利竅行濕熱之物。故能療眼目障翳。磨水不時點之。熱淋煮汁飲之。婦人難產。兩手各執一枚。即下。然不若磨汁飲之。僅似有理。

石蟹 甘寒無毒 發明 石蟹生南海近海州郡皆有之。體質石也。與蟹相似。或言崖州榆林港內土

極細最寒。蟹入不能運動。片時成石。亦妄言也。其性鹹寒。質堅。能磨翳積。故青盲目。淫膚翳。丁翳。漆瘡。皆水磨點塗。催生下胎。療熱極血暈。熟水磨服。

蛇黃 溫微毒 發明 蛇黃生蛇腹中。如牛黃之類。世人因其難得。遂以蛇含石。醋煨水飛代之。取蛇之性竄入肝也。蛇含石入手足厥陰血分。與代赭之性不甚相遠。為小兒鎮攝驚癇之重劑。脾風泄瀉者宜之。

霹靂礮 雷 溫無毒 發明 雷楔稟東南水火之氣。治小兒驚癇。磨汁服之。作枕辟惡夢不祥。鎮邪瘧。刮屑殺瘧蟲。下蠱毒。置箱篋不生蛙蟲。佩之安神。治驚邪之疾。

鹵石部

食鹽 鹹寒無毒 本經主結熱喘逆。胸中病令人吐。發明 鹹走腎走血。腎病血病人。無多食鹽。以

血得鹹則凝也。補腎藥用之。不過借為引導耳。乾霍亂及臭毒。頭疼腹痛。多用鹽水吐之。本經所主結熱喘逆者。以鹹能下氣。過鹹則引涎。水聚於膈上而涌之也。好食鹹者。人多黑色。耗血之驗也。病水腫。忌食

以其走腎助邪水之逆滿也。千金治妊婦橫生逆產先露手足以鹽摩產婦腹并塗兒手足急以爪搔之即縮入而正產。又殺蠱毒凡水蛭蚯蚓得鹽即化為水毒蠱螫者以鹽擦之其毒即解。鹽之味鹹性降下氣最速治下部匿瘡吐胸中痰癖止心腹卒痛不可多食傷肺喜欬扁鵲云能除一切大風痛炒熱熨之今人救未魚噎雷電暴雨欲死但口微動者速將鹽少許調水貯魚於中時時微動其水即活鱗尾有損處以鹽塗之即生出鹽為水之精專得涵養之力也。今人食暴雨潦水腹脹以鹽湯探吐即安其解水毒可知。

戎鹽一名石鹽俗名青鹽與光明鹽同類

鹹寒無毒

本經主明目目痛益氣堅筋骨去毒蠱

發明

戎鹽稟至陰之

氣凝結而成不經煎鍊主涯淡之陰功專走血入腎治目中瘀赤昏澀金匱茯苓戎鹽湯治小便不通取其補腎利膀胱也。又能固齒明目治目痛益氣堅筋骨一皆補腎之力。本經首主明目目痛是熱淫於內治以鹹寒又言去毒蠱者鹹能奕堅蠱毒邪氣不能浮長矣。

鹵鹼一名石鹼

苦鹹微寒無毒

本經主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚

發明

鹼味鹹性走故

能消痰磨積祛熱煩蠱毒消渴屬實熱者宜之肌膚粗者以湯洗之頑皮漸退是即柔肌膚之謂也。○水鹵乃寗反淋湯冲銀黝脚所造性能發麵故麵鋪中無不用之病人食之多發浮腫故方後每忌濕麵觀其善滌衣垢剋削可知。

凝水石即寒水石

辛鹹寒無毒近世真者絕不易得欲驗真偽含之即化為水否即是偽石膏亦名寒水石

與此不同。本經主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿發明寒水石生積鹽之下得陰凝之氣而成鹽之精也。治心腎積熱之上藥。本經治腹中積聚鹹能軟堅也身熱皮中如火燒鹹能降火也。金匱風引湯局方紫雪皆用以治有餘之邪熱也。如無真者戎鹽玄精石皆可代用總取鹹寒降泄之用耳。

玄精石

辛鹹寒無毒青白龜背者良

本經除風冷邪氣濕痺益精氣

發明

玄精石稟太陰之精

與鹽同性故其形皆六出象老陰之數也。本經言味鹹氣溫傳寫之誤其氣寒而不溫其味辛鹹沉降同。

硫黃硝石治上盛下虛收陽助陰有扶危拯逆之功來復丹用之專取一陽來復之義寒因寒用深得本經諸治之奧

朴硝 辛苦鹹寒有毒黃者傷人赤者殺人入藥必取白者以水煎化澄去滓入萊菔自然汁同煮傾入

盆中經宿結成如冰謂之盆硝齊衛之硝上生鋒芒謂之芒硝川晉之硝上生六稜謂之牙硝取芒硝再

三以萊菔汁煉去鹹味懸當風處吹去水氣輕白如粉謂之風化硝以芒硝牙硝同萊菔汁甘草煎過鼎

罐昇煨謂之玄明粉 本經主五藏積熱胃脹閉滯蓄結飲食推陳致新除邪氣向錯簡在硝石條內今

熱邪固積決非硝石所能發明 熱淫於內治以鹹寒堅者以鹹更之熱者以寒消之不出本經推陳致新之妙用

仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝更堅去實且帶微辛所以走而不守若熱結不至堅者

不可輕用小兒赤遊風以硝傾湯中取布醮濕拭之

玄明粉御藥院方名白龍粉 辛甘微寒無毒 發明 玄明粉用芒硝煨過多遍佐以甘草緩其鹹寒之性用治

膈上熱痰胃中實熱腸中宿垢非若芒硝之力峻傷血也然脾胃虛寒及陰虛火動者慎勿輕用以取虛

虛之咎

風化硝 甘鹹寒無毒 發明 風化硝甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不致於泄利者宜之并治經

絡之痰濕但重著而非痰痛者用之有效指迷茯苓丸治痰濕流於肩背之陽位而隱隱作痛最為合劑

然惟體浮氣實者為宜眼臉赤腫和人乳點之

硝石脚焔 辛苦鹹溫有毒溶化投甘草結定取用本經主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖能

化七十二種石諸家本草皆錯簡在朴硝條內詳化七十二種石豈朴硝能之 發明 焔硝屬火其性上升能破積散堅治諸寒熱交

錯之病并散三焦火鬱調和藏府虛寒除寒熱邪氣逐六府積熱不出本經主治也別錄言天地至神之

物能化七十二種石抱朴子亦云能消柔五金化七十二石其錯簡可知與硫黃同用即配偶二炁均調

陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之病蓋硫黃性煖而利其性下行硝石性煖而散其性上行一升一

降此制方之妙也

礪砂 鹹苦辛熱有毒醋煮乾刮下用番禹者良畏酸漿水忌羊血中其毒者生菜豆研汁恣飲解之
發明 礪砂大熱乃鹵液所結乘陰毒之氣含陽毒之精破積攻堅無出其右故能治噎膈反胃積塊肉
癥其性能柔金銀故錐藥用之所言化人心為血者甚言其迅利也外用治惡肉除疣贅去鼻中瘰肉最
捷但不可過用用過急以甘草湯洗之觀金銀有偽投礪砂罐中悉能消去况人腹中有久積死胎豈不
腐潰但其性毒烈苟有生機慎勿輕試

蓬砂 味甘微鹹無毒甘草湯煮化微火炒鬆用 發明 蓬砂味甘微鹹氣溫色白而質輕能去胸

膈上焦之實熱素問云熱淫於內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢膩故主痰嗽喉痺破

癥結治噎膈積聚骨鯁結核惡肉取其能柔物也含化嚙津治喉中腫痛膈上痰熱取其能散腫也眼目

障翳口齒諸病用之取其能滌垢也昔人治骨鯁百計不下取含嚙汁脫然如失此軟堅之徵也

石硫黃 酸鹹大熱有毒以萊菔挖空入硫黃蒸熟用或入豆腐中煮七次用或醋煨用或豬臍中制用

各隨本方硫是礬之液礬是鐵之精磁石是鐵之母故鍼砂磁石制入硫黃立成紫粉硫能乾汞見五金

而黑得水銀則赤也 本經主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿 發明 硫黃稟純陽之精賦大熱

之性助命門相火不足寒鬱火邪胃腕結痛脚冷疼弱者宜之其性雖熱而能疎利大腸與燥澀之性不

同但久服傷陰大腸受傷多致便血傷寒陰毒爪甲純青火焰散屢奏神功陰水腹脹水道不通金液丹

服之即效本經治陰蝕疽痔乃熱因熱用以散陰中蘊積之垢熱但熱邪亢盛者禁用又言堅筋骨者取

以治下部之寒濕若濕熱痿痺良非所宜人身陰常不足陽常有餘苟非真病虛寒胡可服此毒熱類按

有久服硫黃人漸縮小之例石頑親見李堯占服此數年臨斃縮小如七八歲童子狀正內經所謂熱則

骨消筋緩是也

礬石 酸澀微寒無毒明如鵬砂起橫樞者名馬齒礬最勝生用煨用各隨本方生者多食破人心肺

本經主寒熱洩利白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒 發明 白礬專收濕熱固虛脫故本經主寒熱泄利蓋指利久不止虛脫滑泄因發寒熱而言其治白沃陰蝕惡瘡專取滌垢之用用以洗之則治目痛漱之則堅骨齒弘景曰經云堅骨齒誠為可疑以其性專入骨多用則損齒少用則堅齒齒乃骨之餘也為末去鼻中瘕肉其治氣分之痰濕癰腫最捷侯氏黑散用之使藥積腹中以助悠久之功故蠟礬丸以之為君有人遍身生瘡如蛇頭服此而愈甄權生含嚙津治急喉痹皆取其去穢之功也若濕熱方熾積滯正多誤用收澇為害不一岐伯言久服傷人骨凡陰虛咽痛誤認喉風陰冷腹痛誤認臭毒而用礬石必殆

綠礬一名礬 酸寒無毒 發明 皂礬專除垢膩同蒼朮酒麴醋丸治心腹中滿或黃腫如土色甚效蓋礬色綠味酸燒之則赤用以破血分之痰積其效最速金匱治女勞黑瘵硝石礬石丸專取皂礬以破瘀積之血緣其未經註明書有誤用白礬潘攸殊味此理又婦人白沃經水不利子藏堅癖中有乾血白物用礬紅杏仁蜜丸納陰中日一易之

山草部

甘草一名 甘平無毒反海藻大戟甘遂芫花補中散表爰用瀉火解毒生用中心黑者有毒勿用 本經主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力解金瘡腫毒 發明 甘草氣薄味厚升降陰陽大緩諸火生用則氣平調脾胃虛熱大瀉心火解癰腫金瘡諸毒灸之則氣溫補三焦元氣治藏府寒熱而散表邪去咽痛緩正氣養陰血長肌肉堅筋骨能和衝脉之逆緩帶脈之急凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥故熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒寒熱相兼者用之得其平本經治藏府寒熱邪氣總不出調和胃氣之義仲景附子理中用甘草恐僭上也調胃承氣用甘草恐速下也皆緩之之意小柴胡有黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草則有調和之意炙甘草湯治傷寒脉結代心動悸渾是表裏津血不調故用甘草以和諸藥之性而復其脈深得攻補兼該之妙用惟土實脹滿者禁用而脾虛脹滿者必用蓋脾溫則健運也世俗不辨虛實一見脹滿便禁甘草何不思之甚耶

凡中滿嘔吐諸濕腫滿酒客之病不喜其甘。藻戟遂芫與之相反亦迂緩不可救昏昧耳。而胡洽治痰癖以十棗湯加甘草大戟乃痰在膈上欲令涌泄以拔病根也。古方有相惡相反並用非妙達精微者不知此理其稍去莖中痛節解癰疽毒條草生用解百藥毒。凡毒遇土則化甘草為九土之精故能解諸毒也。千金方云甘草解百藥毒如湯沃雪。有中烏頭巴豆毒甘草入腹即定。驗如反掌。方稱大豆解百藥毒。予每試之不效。加甘草為甘豆湯其驗甚捷。嶺南人解蠱凡飲食時先用炙甘草一寸嚼之若中毒隨即吐出。

黃耆 甘溫無毒入益氣藥爰用入解表及托裏藥生用肥潤而軟者良。堅細而枯者食之令人胸滿。

本經主癰疽久敗排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病。發明 黃耆甘溫氣薄味厚升少降

多。陰中陽也能補五藏諸虛入手足太陰手陽明少陽而治脈弦自汗瀉陰火去肺熱無汗則發有汗則

止入肺而固表虛自汗入脾而托已潰癰瘍本經首言癰疽久敗排膿止痛次言大風癩疾五痔鼠瘻皆

用生者以疏衛氣之熱性雖溫補而能通調血脈流行經絡可無擬於壅滯也。其治氣虛盜汗自汗及皮

膚痛是肌表之藥治咯血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脈不至補腎藏元氣不足及嬰兒易感風邪發

熱自汗諸病皆用炙者以實衛氣之虛乃上中下內外三焦藥即本經補虛之謂如痘疹用保元湯治脾

肺虛熱當歸補血湯治血虛發熱皆為聖藥黃耆同人參則益氣同當歸則補血同白朮防風則運脾濕

同防已防風則祛風濕同桂枝附子則治衛虛亡陽汗不止為腠理開闔之總司。又黃耆性專實衛溫補

下元而當歸補血湯曷不用地黃之屬反用此三倍於歸其義何居。蓋陰血之虛而發熱明係陽從陰元

自必峻用陰中之陽藥為君兼當歸引入血分自然陽生陰長陰邪退聽而亢熱除矣。若用純陰滋膩徒

資膠滯熱無由而散也是須黃耆同護其營不使重奪其汗而陰自守熱自除矣。昔人言無汗不得用黃

耆服之令人胸滿此指表實形瘦色蒼胸中氣盛者而言。若衛氣虛衰之人感寒雖用表藥多不能作汗

須用黃耆建中之屬始得汗解不可拘於俗見而廢聖法也。唐許胤宗治柳太后病風不能言脈沉而口

藥乃造黃耆防風湯數劑置於林下氣如烟霧一夕便得語也此義惟玉屏風肯
得防風其功愈大蓋相畏而相使者也

人參古作

甘苦微溫無毒產高麗者良反藜蘆畏鹵鹽陰虛火炎咳嗽喘逆者青鹽製之

本經補五

藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年發明人參甘溫氣薄味厚陽中微
陰能補肺中元氣肺氣旺四藏之氣皆旺精自生而形自盛肺主諸氣故也古人血脫益氣蓋血不自生
須得補陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺耳若單用補血藥血無由而生也素問言無陽則陰無以生
無陰則陽無以化故補氣必用人參補血須兼用之仲景言病人汗後身熱亡血脈沉遲下利身涼脈微
血虛並加人參蓋有形之血未能即生希微之氣所當急固無形生有形也丹溪言虛火可補參耆之屬
實火可瀉芩連之屬後世不察驟謂人參補火謬矣夫火與元氣勢不兩立正氣勝則邪氣退人參既補
元氣又補邪火是反復之小人矣又何與甘草茯苓白朮為四君子耶凡人面白面黃面青驚悸者皆脾
肺腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神強不可用也脈浮而芤濡虛大遲緩無力沈而遲濇弦細微弱
結代或右手關部無力皆可用也若弦強緊實滑數洪盛長大有力或右手獨見脈實皆火鬱內實不可
用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而嗽勿用者寒束
熱邪壅滯在肺之嗽也若自汗惡寒而嗽者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱於內宜發不
宜補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛
吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也節齋謂陰虛火旺吐血勿用者乃血虛火亢能食脈強服人參則
陽愈旺陰愈消未有不引血大脫也若自汗氣短肢寒脈虛者必用也古今治勞莫過於芩可久其獨參
湯保真湯未嘗廢人參而不用惟麻疹初發身發熱而斑點未形傷寒始作證未定而熱邪方熾不可用
耳喻嘉言曰傷寒有宜用人參入藥者發汗時元氣大旺外邪乘勢而出若元氣素弱之人藥雖外行氣
從中餒輕者半出不出留連致困重者隨元氣縮入發熱無休所以虛弱之人必用人參入表藥中使藥

七畏防風然

得力。一湧而出。全非補養之意。即和解藥中。有人參之大力居間。外邪遇正。自不爭而退舍。亦非偏補一邊之意。而不知者。謂傷寒無補邪得補。彌熾斷不敢用。而市井愚夫。乃交口勸病人。不宜服參。醫者又避嫌遠謗。一切可生之機。悉置之不理。殊失本經除邪氣之旨矣。古今諸方。表汗用參蘇飲。敗毒散。和解用小柴胡。解熱用白虎。加人參湯。竹葉石膏湯。攻下用黃龍湯。領人參深入驅邪。即熱退神清。從仲景至今。明賢方書。無不用人參。何為今日醫家。屏絕不用。以阿諛求容。全失一脈相傳宗旨。殊不知誤用人參。殺人者。皆是與黃耆。白朮。乾薑。當歸。肉桂。附子。同行溫補之誤所致。不與羌獨。柴胡。芎藭。枳桔。等同行汗和之法所致也。安得視人參為砒鴆刀刃。固執不用耶。又痘疹不宜輕用人參者。青乾紫黑陷。血熱毒盛也。若氣虛頂陷。色白皮薄。泄瀉漿清。必用也。故博愛心鑑。治痘以保元湯為要藥。人參得升麻。補上焦之氣。瀉中州之火。得茯苓。補下焦之氣。瀉腎中之火。東垣交泰丸。用人參皂莢。是惡而不惡也。治月閉用四物。加人參五靈脂。是畏而不畏也。痰在胸膈。以人參。藜蘆。同用。而取涌越。是激其怒性也。惟右手獨見脈實者。為肺經本有火。故不宜用。若右手虛大而嗽者。雖有火邪。此為虛火上炎。腎水不足。乃刑金之火。非肺金之火。正當以人參救肺。但須多用。方始得力。若少用。必增脹滿。本經言安五藏。定魂魄。止驚悸。明目。開心益智者。以藏氣安和。心神寧定。當無驚悸昏昧之慮矣。其除邪氣者。以甘溫之力。協諸表藥。助胃祛邪。譬諸坐有君子。則小人無容身之地矣。繆子經疏云。人參論其功能之廣。如本經所說。信非虛語。第其性亦有所不宜。世之錄其長者。或遺其短。摘其瑕者。并棄其瑜。是以或當用而後時。或非宜而罔投。或蒙其利。反見其害。二者之誤。其失則一。使良藥不見信於世。粗工互騰。其口說。豈知人參。本補五藏真陽之氣者也。若夫虛羸。疴怯。勞役。饑飽所傷。努力失血。以致陽氣短乏。陷入陰分。發熱倦怠。四肢無力。或中暑傷氣。氣無以動。或嘔吐泄瀉。霍亂轉筋。胃弱不食。脾虛不磨。或真陽衰少。腎氣乏絕。陽道不舉。或中風失音。產後氣喘。小兒慢驚。痘後氣虛。潰瘍長肉等證。投之靡不立效。惟不利於肺家。有熱。欬嗽吐痰。吐血衄血。骨蒸勞瘵。陰虛火動之候。蓋肺者。清肅之藏。真氣無虧。則靈謚清淨。以受生氣之熏蒸。而朝百脈。苟縱恣。

情欲虧損真陰火空則發熱起於下。火燥乎上則肺先受之。火乃肺之賊。邪氣勝則實。實則肺熱鬱結為痰。嗽癢而血熱妄行。溢出上竅。王好古所謂肺熱遠傷肺是也。若誤投之。鮮克免者。此皆實實之誤。於人參何咎哉。○產山西太行山者。名上黨人參。雖無甘溫峻補之功。却有甘平清肺之力。亦不似沙參之性寒。專泄肺氣也。○參蘆能耗氣。專入吐劑。涌虛人膈上清飲宜之。鹽味。用參蘆涌吐最妙。參蘆涌吐參鬚下泄。與當歸紫苑之頭止血。身和血尾破血之意不殊。參鬚價廉貧乏之人往往用之。其治胃虛嘔逆。欬嗽失血等證。亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精。崩中下血之證。每致增劇。以其味苦降泄也。其蘆世罕知用。惟江右人稱為竹節參。近日吾吳亦有用之者。其治瀉利膿血崩帶精滑等證。俱無妨礙。如氣虛火炎。喘嘔嗽血。誤用轉劇。昔人用以涌吐者。取其性升。而於補中寓瀉也。此義前人未發。因屢驗而筆之。

沙參 甘淡微寒無毒有南北二種。北者質堅性寒。南者體虛力微。反藜蘆。本經主血結驚氣。除寒熱。補中益肺氣。發明 沙參專泄肺氣之熱。故喘嗽氣壅。小便赤澀不利。金受火剋。陰虛失血。或喘欬寒熱。及肺痿等疾宜之。本經主血結驚氣者。因驚氣入心。心包熱鬱而血結也。除寒熱者。鬱熱解而寒熱除也。補中益肺氣者。用以清理肺胃之虛熱。則津液復而正氣受益矣。潔古言。肺寒用人參。肺熱用沙參。好古言。沙參性寒。補五藏之陰。總未達輕虛泄熱之義也。衛生方。治肺熱欬嗽。沙參一味水煎服之。肘後方。治卒然疝痛。自汗欲死。沙參為末。酒服立瘥。證治要訣。治婦人白帶。沙參為末。米飲服之。蓋沙參專開肺氣。肺氣清則木邪散而疝自除。帶自愈矣。時珍云。人參甘苦而溫。其體重實。專補脾胃元氣。因而益肺與腎。故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒。其體輕虛。專清肺氣。因而益脾與腎。故金受火剋者宜之。此即本經補中益肺氣之謂。一補陽而生陰。一補陰而制陽。不可不辨。

桔梗 本經名 辛甘苦微溫無毒甘者為蒼桔。苦者為苦梗。咬之腥澀者為木梗。不堪入藥。本經主胸脇痛。如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐悸氣。發明 桔梗上升。清肺氣。利咽喉。為肺部引經。又能開發皮膚。

故與羌獨柴胡蔚蘇輩同為解表藥。與甘草同為舟楫之劑。諸藥有此一味不能下沉也。傷寒邪結胸膈則痛如刀刺。邪在中焦則腹滿。腸鳴幽幽。辛甘升發苦淡降泄則邪解而氣和矣。其主驚恐悸氣者。心脾氣鬱不舒。用以升散之也。朱肱用桔梗治胸中痞滿。總不出本經主治。仲景治寒實結胸。同貝母已豆取其溫中。消穀破積也。治肺癰唾膿血。用桔梗甘草。取排膿而清濁氣也。治少陰證二三日咽痛。用桔梗湯。取其調寒熱通陰氣也。千金方治喉痺毒氣。桔梗二兩。水煎頓服。加甘草連翹。荆防。名如聖湯。通治咽喉諸病。桔梗有甘苦二種。甘者曰齊芎。千金治強中為病。莖長與發不交精。取其能升解熱邪於上也。又乾欬嗽乃痰火之邪。鬱在肺中。亦宜甘以潤之。痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸。則宜苦以開之。甘升而苦降也。此藥升降諸氣。能入肺使諸氣下降。俗泥為上升而不能下行。夫其用矣。痘疹下部不能起發。為之切忌。以其性升。能阻藥力於上。不得下達也。惟陰虛久嗽不宜用。以其通陽泄氣也。其蘆吐膈上風熱實痰。生研末白湯調服二三錢。探吐之。

黃精 甘平無毒。勿誤用鈎吻。鈎吻即野葛葉。頭尖有毛鈎子。又名斷腸草。誤服殺人。黃精則根紫花黃。葉似竹葉也。發明 黃精為補中宮之勝品。寬中益氣。使五藏調和。肌肉充盈。骨髓堅強。皆是補陰之功。但陽衰陰盛人服之。每致泄瀉痞滿不可不知。

葳蕤 本經名女萎 又名玉竹 甘平無毒。肥白者良。入發散風熱藥。主用入補藥。蜜水拌。飯上蒸熟用。本經王中

風暴熱不能動搖。跌筋結肉。諸不足。久服去面黑黧。好顏色。潤澤。輕身不老。發明 葳蕤甘潤性平。滋

肺益腎。補而不壅。善調厥陰久襲之風。故本經治中風暴熱等病。皆取其養正祛邪之力也。別錄王心腹

結氣。虛熱腰痛。莖中寒。目痛。背爛淚出。甄權主內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。千金治風溫自汗身重。

語言難出。葳蕤湯以之為君。其源本諸麻黃升麻湯。深得仲景之奧。時珍用治虛勞。寒熱痞瘧。不足之證。

用代參者。不寒不燥。大有殊功。不止於去風熱溫毒而已。又主小便卒淋。發熱口乾。眼黑頭眩。目赤澀痛。

其性雖潤。而無傷犯脾胃。奪食泄瀉之虞。但其性之緩耳。

知母 苦甘寒無毒肥白者良。鹽酒炒用。本經主消渴熱中。除邪氣肢體浮腫下水補不足。益氣。發明 知母沉降。入足少陰氣分。及足陽明手足太陰。能瀉有餘相火。理消渴煩蒸。仲景白虎湯。酸棗湯。皆用之。下則潤腎燥而滋陰。上則清肺熱而除煩。但外感表證未除。瀉痢燥渴忌之。脾胃虛熱人誤服。令人作瀉減食。故虛損大忌。近世誤為滋陰。上劑勞瘵神丹。因而天枉者多矣。本經言除邪氣肢體浮腫。是指濕熱水氣而言。故下文云。下水補不足。益氣。乃濕熱相火有餘。燥灼精氣之候。故用此清熱養陰邪熱去。則正氣復矣。

肉蓯蓉 甘鹹微溫無毒。酒洗去甲。及腐。切片焙用。本經主五勞七傷。補中。除莖中寒熱。痛養五藏。強

陰益精氣。多子。婦人癥瘕。發明 肉蓯蓉與瑣陽總是一類。味厚性降。命門相火不足者宜之。峻補精

血。驟用反動大便滑泄。本經主勞傷補中者。是火衰不能生土。非中氣之本虛也。治婦人癥瘕者。鹹能更

堅而走血分也。又從蓉止洩精遺瀝。除莖中寒熱痛。以其能下導虛火也。鎖陽治腰膝軟弱。以其能溫補

精血也。總皆滋益相火之驗。老人燥結宜煮粥食之。但胃氣虛者服之。令人嘔吐泄瀉。強陽易興。而精不

固者忌之。

天麻 本經名雜母一名定風草莖名赤箭 辛平微溫無毒。濕紙裏煨熟切片用。本經主殺鬼精物蠱毒惡氣。久服益氣

力。長陰肥健。發明 天麻味辛濃厚。性升屬陽。為肝家氣分藥。故肝虛不足。風從內生者。天麻芍藥以

補之。諸風掉眩。眼黑頭眩。風虛內作。非天麻不治。小兒驚痰風熱。服天麻即消。天麻乃定風草。久服則遍

身發出紅斑。是驅風之驗也。按天麻性雖不燥。畢竟風劑。若血虛無風。火炎頭痛。口乾便閉者。不可妄投。

本經言殺鬼精物蠱毒惡氣者。以其能定風鎮八方之邪氣也。久服益氣力。長陰肥健者。其性屬陽。陽生

則陰長也。

白木 一名山薑 甘溫無毒。雲木肥大氣壅。台木條細力薄。靈國狗頭木皮赤稍大。然皆栽灌而成。故其氣

濁。不若於潛野生者。氣清無壅滯之患。入諸補氣藥飯上蒸數次用。入肺胃久嗽藥蜜水拌蒸。入脾胃

痰濕藥薑汁拌晒入健脾藥土炒入瀉痢虛脫藥炒存性用入風痺痰濕利水破血藥俱生用然非於潛
產者不可生用也 本經主風寒濕痺死肌痲疽止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不饑 發明
白朮甘溫味厚陽中之陰可升可降入脾胃二經生用則有除濕益燥消痰利水治風寒濕痺死肌痲疽
散腰臍間血及衝脈為病逆氣裏急之功製熟則有和中補氣止渴生津止汗除熱進飲食安胎之効本
經主風寒濕痺死肌痲疽者正以風寒濕三者合而成痺痺者拘攣而痛是也經曰地之濕氣感則害人
皮肉筋骨死肌者濕毒侵肌肉也痲者風寒乘虛客於肝脾腎經所致也疽者脾胃虛而濕熱瘀滯也如
上諸證莫不由風寒濕而成朮有除此三者之効故能祛其所致之疾也止汗除濕進食者濕熱盛則自
汗濕邪客則發熱濕去則脾胃燥燥則食自消汗自止熱自除矣又主大風在身而風眩頭痛目淚出消
痰水逐皮膚間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津煖胃消穀嗜食得參苓大補
中氣得枳橘健運飲食本經言消食作煎餌留其滓以健運脾氣食自化矣仲景五苓散祖素問澤木麋
銜湯並用生者但彼兼麋銜以統血則汗自止此兼桂枝以通津則渴自除潔古枳朮丸祖金匱枳實湯
彼用生者以健胃則逆滿自愈此用熟者以助脾則飲食自強且以荷葉裹飯為丸取清震之氣以鼓尅
運之力也蓋白朮得中宮冲和之氣補脾胃藥以之為君脾土旺則清氣升而精微上濁氣降而糟粕輸
仲淳有云白朮稟純陽之土氣除邪之功勝而益陰之効虧故病屬陰虛血少精不足內熱骨蒸口乾唇
燥欬嗽吐血鼻衄齒衄便閉滯下者法咸忌之木燥腎而閉氣肝腎有動氣者勿服劉涓子云癰疽
忌白朮以其燥腎而閉氣故反生膿作痛也凡藏皆屬陰世人但知白朮能健脾寧知脾虛而無濕邪者
用之反燥脾家津液是損脾陰也何補之有此最易誤故特表而出之

蒼朮

本經名

苦辛溫無毒產茅山者味甘形瘦多毛最良吳郡諸山者次之楚中大塊辛烈氣燥者為

下製用糯米泔浸刮去皮切片同芝麻炒或麻油炒通黃去焦末或去皮切片蜜水拌飯上蒸用又白露
後以泔水淨置屋上晒露一月謂之神朮 本經主風寒濕痺死肌痲疽 發明 蒼朮辛烈性溫而燥

可升可降。能徑入諸經。疎泄陽明之濕。而安太陰。辟時行惡氣。因經甘浸炒。故能除上濕發汗。與白朮止汗則異。腹中窄狹者。須之。本經治風寒濕痺。死肌痲疽等證。總取性專開腠。故能發汗。而去風寒濕氣。祛濕而去死肌痲疽。下氣而消痰食飲癖。又能總解諸鬱。佐以香附快氣之藥。下氣最速。一升一降。則鬱散而氣平也。脾精不禁。淋濁不止。腰背痠疼。用以斂脾津。津生於穀氣也。同黃檗為二妙。治下部濕熱。疼痛又蒼朮一味。麻油製過。為末。煮大棗肉為丸。治脇下飲澀。許叔微患飲澀三十年。始因少年夜坐寫文。左向伏几。是以飲食多墜左邊。飲酒止從左下有聲。脇痛食減。嘈雜飲酒半杯即止。十數日必嘔酸水。暑月左半身絕無汗。服雄附礬石牽牛遂戟等皆無效。自揣必有游囊。如水之有窠臼。不盈科不行。乃悉屏諸藥。以前丸服三月而疾除。暑月汗亦周身。燈下能書細字。皆蒼朮之力也。然惟素稟肥盛多濕者為宜。若形瘦多火者禁用。○其神朮已經露製。轉燥為清。用以發散上部頭風。痰濕諸證。故治時行頭痛。有神朮湯。此得制度之妙也。

狗脊

本經名
百枚

苦平微溫無毒酒浸炒去毛用

本經主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人

發明 狗脊為強筋骨要藥。故本經主腰背強周痺寒濕等疾。頗利老人者。補益腎氣而堅強筋骨也。其性味形類與萆薢相似。而功用亦不甚相遠。四寶丹用金毛狗脊。去毛鹽泥固濟。煨紅蘇木。萆薢。川烏頭。生用等分為末。醋和丸。溫酒鹽湯下二十九。治男婦毒風脚軟。腎氣虛弱。又病後足腫煎湯洗効。

貫眾

別錄名
草鵝頭

苦微寒有毒

本經主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲

發明

貫眾苦寒而降。辟時行疫癘

不正之氣。疫發之時。以此藥置水。食之則不傳染。且能解毒。更堅。治婦人血氣。本經治腹中邪熱氣諸毒。以其性專散結積諸毒。而蟲積皆由濕熱所生。苦寒能除濕熱。故亦主之。王海藏治夏月痘出不快。快斑散用之。云貫眾有毒。而能解腹中邪熱。殺三蟲。病從內發者多効。王璆百一選方。言食鯉魚羹為肋骨所鯁。百藥不効。或令以貫眾煎濃汁。連進一咯。而出。可見軟堅之功。不但治瘡治血而已。病人虛寒無實熱者勿服。

巴戟天 辛甘微溫無毒酒浸去心焙用川產者良 本經主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中
 增志益氣 發明 巴戟天嚴冬不凋腎經血分又衝脈藥也故守真地黃飲子用之即水經治大風邪
 氣之謂以其性補元陽而兼散邪真元得補邪安所留是以可愈大風邪氣也主陰痿不起強筋骨安五
 臟補中增志益氣者脾胃二經得所養而諸虛自瘥矣又治腳氣補血海病人虛寒加用之有人嗜酒患
 脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒去米大黃一兩炒為末熟蜜丸溫水下七十丸仍禁酒遂愈惟陰
 虛相火熾盛者禁用

遠志一名小草 辛苦溫無毒甘草湯洗去骨製過不可陳久久則油氣戟人喉 本經主欬逆傷中補不足
 除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老 發明 遠志入足少陰腎經氣分非

心經藥也專於強志益精主夢泄蓋精與志皆腎所藏腎氣无九竅利智慧生耳目聰明邪氣不能為害
 腎氣不足則志氣衰不能上通於心故迷惑善忘不能閉摯封藏故精氣不固也小便赤濁用遠志甘草

茯苓益智為丸療湯服效取其為陰火之嚮導也昔人治喉痺失音作痛遠志末吹之涎出為度取其通
 腎氣而開竅也又治婦人血噤失音及一切癰疽搗鼻治腦風殺烏附毒惟水虧相火旺者禁服以其善

鼓龍雷之性也本經言治欬逆傷中詳遠志性溫助火非欬逆所宜當是嘔逆之誤以其性稟純陽善通
 諸竅竅利則耳目聰明強志不忘皆益腎氣之驗別錄云去心下膈氣非嘔逆之類乎一切陰虛火旺便

濁遺精喉痺腫痛慎用苗名小草亦能利竅兼散少陰風氣之結也

淫羊藿一名仙靈脾 辛溫無毒羊脂或酒炒用 本經主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志 發明

淫羊藿手足陽明三焦命門藥也辛以潤腎溫以助陽故本經治陰痿絕傷等證真陽不足者宜之堅筋
 骨消瘰癧一切冷風勞氣筋骨掣急四肢不仁補腰膝強氣力一味仙靈脾酒為偏風不遂之要藥惟陰

虛走精強陽不痿禁服

山茅 辛溫有毒忌犯鐵器酒浸焙乾用 發明 山茅性熱補三焦命門之藥惟陽衰精冷下元痿弱

山茅 性熱補三焦命門之藥惟陽衰精冷下元痿弱

山茅 性熱補三焦命門之藥惟陽衰精冷下元痿弱

山茅 性熱補三焦命門之藥惟陽衰精冷下元痿弱

山茅 性熱補三焦命門之藥惟陽衰精冷下元痿弱

老人失溺無子。男子稟賦素虛者宜之。若體壯相火熾盛者服之反能動火為害。叵測。按醫說云。一人中仙茅毒。舌脹出口漸大與肩齊。以小刀斨之。隨破隨合。斨至百數始有血一點出。曰可救矣。煮大黃芒硝與服。以藥搽之。應手消縮。此皆火盛性淫之人。過服之害也。然川產者少。偽充者多。不可不辯。

玄參

一名黑參

苦微寒無毒。反藜蘆。

本經主腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣。令人明目。發明。

黑參。入足少陰腎經。主腎水受傷。真陰失守。孤陽無根。亢而僭逆。咽喉腫痛之專藥。又治傷寒陽毒。汗下不解。發斑咽痛。心下懊憹。煩不得眠。心神顛倒欲絕者。俱用玄參。專清上焦氤氳之氣。無根之火。本經治腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。并可清有形熱滯。故消瘰癧結核。治目赤痛腫。本經又云補腎氣。令人明目。不特治暴赤腫痛。總皆散結清火之驗也。但其性寒滑。脾虛泄瀉者禁用。

地榆

苦澁微寒無毒。去梢。酒拌炒黑用。

本經主婦人乳產瘕痛。七傷。帶下。五漏。止痛止汗。除惡肉。療

金瘡。發明。地榆入足厥陰兼行手足陽明。體沉而降。善入下焦。理血。本經主乳產瘕痛。七傷。帶下。五漏者。是指去血過多。肝風內生之象。又云止汗止痛。除惡肉瘕金瘡者。以其能和血也。若氣虛下陷。而崩帶。及久痢膿血。瘀晦不鮮者。又為切禁。性能傷胃。誤服多致口噤不食。又諸瘡痛者。加地榆。瘡者加黃芩。以其能散血熱也。燒灰香油調敷。火燙乃借火氣引散血中之火毒。耳梢專行血。不可混用。

丹參

苦平微溫無毒。酒炒用。反藜蘆。

本經主心腹邪氣。腸鳴幽幽。如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩

滿益氣。發明。丹參氣平而降。心與包絡血分藥也。本經治心腹邪氣。腸鳴幽幽。如走水等疾。皆瘀血內滯。而化為水之候。止煩滿益氣者。瘀積去而煩滿愈。正氣復也。按四物湯治婦人病。不問胎前產後。經水多少。皆可通用。惟一味丹參散。主治與之相同。蓋丹參能破宿血。生新血。安生胎。落死胎。止崩中。帶下。調經脈之神品。然其性長於行血。妊娘無故勿服。大便不實者忌之。

紫參

即牡蒙。又名重勝。生高三五寸。逐層起臺。開紫花者是也。

三四月間。通地草。

苦辛寒無毒。反藜蘆。

本經主心腹積聚。寒熱邪氣。通九

竅。利大小便。

發明。

紫參入足厥陰。兼入足太陽。陽明血分。故治諸血病。及寒熱血痢。癰腫積塊。即本

經治心腹積聚寒熱邪氣之謂於血去則九竅利而二便通矣。古方治婦人腸覃烏喙丸中用牡蠣即紫參也。仲景治下痢肺痛用紫參湯取其散積血也。但市人罕識其真。詳痢下肺痛皆胸中氣結之故。每以紫芫代之。雖氣味之寒溫不同。疎利之性則一。

紫草 甘鹹寒無毒。色深紫而脆者良。淡紫質堅者曰紫梗不入藥。本經主心腹邪氣五癰補中益氣。

利九竅 發明 紫草入心胞絡。及肝經血分。其功專於涼血活血利大小腸。故痘疹欲出未出。血熱毒

盛大便閉澀色乾枯而毒不得越者宜之。已出而紫黑便閉者亦可用。蓋紫草涼血血涼則毒出世俗誤

以為宣發之藥非也。若已出而色紅活者不宜。或白陷及大小便利者忌之。本經言治心腹邪氣五癰者

乃活血利竅之義。發竅即活血利竅之大端也。言補中益氣者。營血和則中氣受益矣。

白頭翁 一名野人 苦微寒無毒產齊魯。苗長葉白者力優。生柴胡中短小者力薄。得酒良。本經主溫瘧

狂猖寒熱癥瘕積聚氣逐血止腹痛療金瘡。發明 白頭翁味苦微寒入手足陽明血分。本經言苦

溫者。傳寫之誤也。其治溫瘧狂猖寒熱等症。皆少陽陽明熱邪固結之病。結散則積血去而腹痛止矣。別

錄止鼻衄。弘景止毒痢亦是熱毒入傷血分之候。仲景治熱痢下重有白頭翁湯。蓋腎欲堅。急食苦以堅

之。痢則下焦虛。故以純苦之劑堅之。男子陰疝偏墜小兒頭禿鼻衄及熱毒下痢紫血鮮血。用此並効。但

胃虛大便完穀不化。痢久下稀淡血水者。勿服。以其苦寒降泄也。

白及 苦辛平微寒無毒。反烏附。本經主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌。胃中邪氣賊風鬼擊。非緩不收。

發明 白及性瀉而收。得秋金之氣。故能入肺。止血生肌治瘡。本經主敗疽傷陰死肌。皆熱壅血傷。胃中

邪氣亦邪熱也。賊風癰緩皆血分有熱濕熱傷陰所致也。其治吐血咯血。為其性斂也。用此為末米飲服

之。即止。試血法。吐水盆內。浮者肺血。沉者肝血。半浮半沉者心血。各隨所見。以羊肺肝心煮熟。蘸白及末

每日食之。其治金瘡及癰疽方多用之。

三七 一名錫石 甘微苦溫無毒。廣庭形如人參。發明 時珍云。此藥近時始出。南人軍中用為金

刀箭瘡要藥。止血散血定痛。為末搽之。吐血衄血。崩中下血。血痢產後惡血不下。並宜服之。凡杖撲傷。搗瘀血淋漓者。隨即嚼爛。卷之。青腫者。即消。若受杖時。先服一二錢。則血不衝心。杖後尤宜服之。此陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。獨用研服尤良。取其專力也。一種庭砌栽植者。以苗搗敷腫毒。即消。亦取散血之意。

黃連 苦寒無毒。產川中者。中空色正黃。截開分瓣者為上。雲南水連次之。日本吳楚為下。治心藏火生用。治肝膽實火。猪膽汁炒。治肝膽虛火。醋炒褐色。治上焦火。酒炒。中焦火。薑汁炒。下焦火。鹽水炒。氣分鬱結。肝火。煎吳茱萸湯炒。血分塊。中伏火。同乾漆末炒。食積火。黃土拌炒。○解附子巴豆輕粉毒。忌豬肉。本經主熱氣。目痛。皆傷泣出。明目。腸澼腹痛。下痢。婦人陰中腫痛。發明 黃連性寒。味苦。氣薄。味厚。降多。升少。入手少陰厥陰。苦入心。寒勝熱。黃連大黃之苦寒。以導心下之實熱。去心竅惡血。仲景九種心下痞。五等瀉心湯。皆用之。瀉心者。其實瀉脾。實則瀉其子也。下痢胃口虛熱。口噤者。黃連人參煎湯。時時呷之。如吐再飲。但得一呷。下咽便好。諸苦寒藥多瀉。惟黃連。芩。檉。性寒而燥。能降火去濕。止瀉痢。故血痢以之為君。今人但見腸虛滲泄。微似有血。不顧寒熱多少。便用黃連。由是多致危殆。至於虛冷白痢。及先瀉後痢之虛寒證。誤用致死者多矣。諸痛瘍瘡。皆屬心火。眼暴赤腫痛不可忍。亦屬心火。兼挾肝邪。俱宜黃連當歸。治痢及目為要藥。故本經首言治熱氣目痛。及腸澼腹痛之患。取苦燥之性。以清頭目。堅腸胃。祛濕熱也。婦人陰中腫痛。亦是濕熱為患。尤宜以苦燥之。古方治痢。香連丸。用黃連木香。薑連散。用乾薑黃連。佐金丸。用黃連吳茱萸。治消渴。用酒蒸黃連。治口瘡。用細辛黃連。治下血。用黃連胡蒜。皆是寒因熱用。熱因寒用。而無偏勝之害。然苦寒之劑。中病即止。豈可使肅殺之令常行。而伐生發中和之氣乎。醫經有久服黃連苦參反熱之說。此性雖寒。其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。心火偏勝。則熱。乃其理也。近代庸流。喜用黃連為清劑。殊不知黃連瀉實火。若虛火而妄投。反傷中氣。陰火愈逆。上無制矣。故陰虛煩熱。脾虛泄瀉。五更腎泄。婦人產後血虛煩熱。小兒痘疹氣虛作瀉。及行漿後泄瀉。並皆禁用。

胡黃連 苦大寒無毒。忌豬肉。犯之令人漏精。發明 胡黃連苦寒而降。大伐藏府骨髓邪熱。除婦人

胎蒸。小兒疳熱積氣之峻藥。同烏梅止小兒血痢。同雞肝治小兒疳眼。同豬胰療楊梅瘡毒。同乾薑治菓

子積。皆取伐肝腎熱邪也。小兒腎氣本實。故可當此。若脾胃腎藏不足者。服之奪人天元。為害不淺。惟微

瘡用胡黃連當歸甘草豬脬水酒煎服二劑。輒效。以其直達下焦。善搜淫火之毒也。

黃芩 苦寒無毒。中空者為枯芩。入肺。細實者為子芩。入大腸。並煮熟酒炒用。本經王諸熱黃痺腸澼

泄利逐水下血。閉治惡瘡疽蝕火瘍。發明 黃芩枯燥而堅腸胃。故濕熱黃痺腸澼瀉痢為必用之藥。

其枯芩性升。入手太陰經。清肌表之熱。條芩性降。瀉肝膽大腸之火。除胃中熱。得酒炒上行。主膈上諸熱。

得芍藥甘草治下痢膿血腹痛後重。身熱。佐黃連治諸瘡痛不可忍。同黑參治喉間腥臭。助白木安胎。蓋

黃芩能清熱涼血。白朮能補脾統血也。此惟胎熱升動不寧者宜之。胎寒下墜。及食少便溏者。慎毋混用。

丹溪言黃芩治三焦火。仲景治傷寒少陽證。用小柴胡湯。汗下不解。胸滿心煩。用柴胡桂薑湯。溫病用黃

芩湯。太陽少陽合病。用葛根黃芩黃連湯。心下痞滿。用瀉心湯。寒格吐逆。用乾薑黃芩黃連人參湯等方。

皆用黃芩以治表裏諸熱。使邪從小腸而泄。皆本經王諸熱之綱旨。其黃痺腸澼瀉痢之治。取苦寒以去

濕熱也。逐水下血閉者。火鬱血熱之所致。火降則血行水下。而閉自通矣。昔人以柴胡去熱。不及黃芩。蓋

柴胡專主少陽往來寒熱。少陽為樞。非柴胡不能宣通中外。黃芩專主陽明蒸熱。陽明居中。非黃芩不能

開泄蘊隆。一主風木客邪。一主濕土蘊著。詎可混論。芩雖苦寒。畢竟治標之藥。惟軀殼熱者宜之。若陰虛

伏熱。虛陽發露。可輕試乎。其修實者。兼行衝脈。治血熱妄行。古方有一味子芩丸。治女人血熱經水暴下

不止者最效。若血虛發熱。腎虛下寒。及妊娠胎寒下墜。脈遲小弱。皆不可用。以其苦寒而伐生發之氣也。

秦艽 苦平微溫無毒。雷公云。左文列為秦。治濕病。右文列為艽。發脚氣。今藥肆多右文者。慎勿混用。

本經王寒熱邪氣。寒濕風痺。肢節痛。下水利小便。發明 秦艽陰中微陽。可升可降。入手足陽明。以其

去濕也。兼入肝膽。以其治風也。故手足不遂。黃痺酒毒。及婦人帶疾。須之。陽明有濕。則身體痠痛。肢節煩

疾及寧急不遂有熱則日哺潮熱用以祛風勝濕則愈凡痛有寒熱或浮腫者多挾客邪用此以祛風利濕方為合劑故本經治寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛等證若久痛虛羸血氣不能營養肢體而痛及下體虛寒疼痠枯瘦等病而小便清利者咸非秦朮所宜今庸師喜用秦朮且不辨左文右文凡遇痛證動輒用之失其旨矣。

柴胡

脚莖

苦平無毒入解表藥主用清肝炒熟用

本經主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推

陳致新明日益精發明柴胡能引清陽之氣從左上升足少陽膽經之藥膽為清淨之府無出入禁汗吐下惟宜和解以其經居半表半裏本經治心腹腸胃結氣飲食積聚寒熱邪氣使清陽之氣上升而胃中留結宿滯亦得解散矣仲景治傷寒寒熱往來脇痛耳聾婦人熱入血室皆為必用小兒疳羸熱諸瘡寒熱咸宜用之痘疹見點後有寒熱或脇下疼熱於透表藥內用之不使熱留少陽經中則將來無咬牙之患虛勞寒熱多有可用者勞有五勞病在五臟若勞在肝膽心包絡有熱或少陽經寒熱則柴胡為必用藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱之藥惟勞在肺腎者不可用東垣補中益氣用之者乃引肝膽清陽之氣上行兼升達參耆之力耳瘡疽用之者散諸經血積氣聚也今人以細者名小柴胡不知小柴胡乃湯名也若大柴胡湯而用銀州者可乎按柴胡為少陽經藥病在太陽服之太早則引寇入門病在陰經用之則重傷其表誤人不可勝數其性升發病人虛而氣升者忌之嘔吐及陰火炎上者勿服若陰虛骨蒸服之助其虛陽上逆勢必耗盡真陽而後已奈何操司命之權者多所未悟也

銀柴胡

甘微寒無毒銀州者良今延安府五原府所產者長尺餘肥白而軟北地產者如前胡而軟今

人謂之北柴胡勿令犯火犯火則不效

發明

銀柴胡行足陽明少陰其性味與石斛不甚相遠不獨

清熱兼能涼血和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸中用之凡入虛勞方中惟銀州者為宜若用北柴胡升動虛陽發熱喘嗽愈無寧字可不辯而混用乎按柴胡條下本經推陳致新明日益精皆指銀夏者而

言非北柴胡所能也。

前胡 苦微寒無毒甄權曰甘辛平無毒白色者良去尾用 發明 前胡入手足太陰陽明少陽其功長於下氣故能治痰熱喘嗽痞膈諸疾氣下則火降痰亦降矣為痰氣之要味治傷寒寒熱及時氣內外俱熱按二胡通為風藥但柴胡主升前胡主降有不同耳又按前胡治氣實風痰凡陰虛火動之風痰及不因外感而有痰者禁用。

防風 甘辛溫無毒又頭者令人煩喘又尾者發人痼疾 本經主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛 發明 防風浮而升陽也入手太陽陽明少陽厥陰兼通足太陽治風去濕之仙藥以風能勝濕也其治大風頭眩痛惡風風邪等病其性上行故治上盛風邪瀉肺實喘滿及周身痺痛四肢掣急目盲無所見風眼冷淚總不出本經主治也防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引而至風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行蓋於土中瀉木也凡脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽證正當用之凡瘡在胸膈已上者雖無手足太陽證亦當用防風為能散結去上部風熱也經驗方治婦人風入胞門崩中不止獨聖散用一味防風麩糊酒調丸服然惟血色清稀而脈浮弦者為宜如血色濃赤脈來數者又屬一味子芩丸證不可混也惟肺虛有汗喘乏及氣升作嘔火升發嗽陰虛盜汗陽虛自汗者勿服婦人產後血虛發瘧嬰兒瀉後脾虛發搐咸為切禁。

獨活 辛苦微溫無毒香而紫黑者真 本經主風寒所擊金瘡止痛奔豚癩瘕女子疝瘕 發明 獨活不搖風而治風浮萍不沈水而治水因其所勝而為製也本經治金瘡為風寒所擊而痛及責豚癩瘕女子疝瘕皆邪風內賊之候獨活生益州較羌活其氣稍細升中有降能通達周身而散風勝濕與細辛同用治厥陰頭痛目眩又足少陰經伏風頭痛兩足濕痺不能動止者非此不治甄權以獨活治諸風濕冷奔喘逆氣皮膚枯癢手足攣痛勞損風毒齒痛皆風濕相搏之病也但氣血虛而遍身痛及陰虛下體痿弱者禁用南方無剛猛之風一切虛風類中咸非獨活所宜。

羌活 苦辛溫無毒香而色紫者良 發明 羌活生於羌胡雍州隴西四川皆有之治足太陽風濕相搏一身盡痛頭痛肢節痛目赤膚癢乃却亂反正之主帥督脈為病脊強而厥者非此不能除甄權以羌活治賊風失音不語多癢手足不遂口面喎斜瘰癧血癩皆風中血脈之病也蘇恭曰瘰癧宜用獨活兼水宜用羌活風能勝濕故羌活能治水濕與芎藭同用治太陽厥陰頭痛發汗散表透關節非時感冒之仙藥也但內傷元氣血虛頭痛及遍身肢節痛皆非所宜昔人治勞力感寒於補中益氣湯中用之深得補中寓瀉之意

升麻 甘苦平無毒忌見火解毒若毒 本經辟瘟疫瘴氣邪氣蓋毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘

頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡 發明 升麻能引清氣上升足陽明本藥也本經治疫瘴蓋毒取性升

上行也治中惡腹痛取開發胃氣也治喉痛口瘡者取升散少陽陽明寒熱也同葛根則發散陽明風邪

同柴胡則升提胃中清氣引甘溫之藥上升故元氣下陷者用此於陰中升陽以緩帶脈之縮急凡胃虛

傷冷鬱遏陽氣於脾土宜升麻葛根以升散其火鬱故補脾胃藥非此引用不効脾痺非此不除升麻葛

根湯乃陽明發散藥若初病太陽便服之發動其邪必傳陽明反成其害也又升麻葛根能發痘惟初發

熱時可用見點後忌服為其氣升發動蒸毒於上為害莫測而麻疹尤為切禁誤投喘滿立至按升麻屬

陽性升力能扶助陽氣捍禦陰邪故於淋帶瀉痢脫肛方用之取其升舉清陽於上也古方治噤口痢用

醋炒升麻引人參蓮肉扶胃進食大有神効凡上盛下虛吐血衄血效嗽多痰陰虛火動氣逆嘔吐怔忡

癩狂諸證皆在所禁

苦參 苦寒無毒反藜蘆 本經主心腹結氣癥瘕積聚黃痺溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚

發明 苦參黃蘆之苦寒下降皆能益腎蓋取其苦燥濕寒除熱也熱生風濕生蟲故又能治風殺蟲惟

腎水燥而相火勝者宜之若脾胃虛而飲食減少肝腎虛而火衰精冷及年高之人不可用也久服苦參

多致腰重因其性降而不升也觀本經主治皆濕熱為患之病詳補中當是補陰之誤以其能除濕熱濕

熱去而陰自復。目自明矣。然惟濕熱者宜之。沈存中苦腰重。久坐不能行。此因病齒痛數年。用苦參指齒其氣味入齒。傷腎所致也。後施昭先亦用苦參指齒。歲久亦病腰重。自後悉不用之。腰疾皆愈。或云苦參既能補陰明目。何久服反病腰重乎。殊不知苦寒之性直入心腎。內有濕熱者。足以當之。始得之則有輔陰祛邪之力。清熱明目之功。濕熱既去而又服之。必致苦寒傷腎。腰重脚弱。在所不免。理固然也。何疑之有。

白鮮皮一名白鮮 苦鹹寒無毒 本經主頭風黃瘳。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。濕痺死肌。不可屈伸。起止

行步。發明 白鮮皮氣寒善行。味苦性燥。足太陰陽明經去風濕熱藥也。兼入手太陰陽明。為諸黃風

痺要藥。本經所主。皆風濕熱邪蘊釀經中之病。千金治嬰兒風癩。熱則生風。胸中有痰。白羊鮮湯取其善

祛風熱也。世醫祇施之於瘡科淺矣。下部虛寒之人。雖有濕證。勿用。

延胡索胡索 苦辛溫無毒 上部酒炒。中部醋炒。下部鹽水炒。發明 延胡索色黃入脾胃。能活血止

痛。治小便溺血。得五靈脂。同入肝經。散血破滯。炮炙論曰。心痛欲死。急覓延胡。以其能散胃脘氣血滯痛

也。蓋當歸芍藥調腹中血虛痛。延胡五靈治胸腹血滯痛。又延胡善行血中氣滯。氣中血滯。與當歸桂心

治一身上下諸痛。及經癸不調。產後血病。往往獨行多功。雜他藥中。便緩按延胡走而不守。惟有瘀滯者

宜之。若經事先期。虛而崩漏。產後血虛而暈。咸非所宜。

貝母 甘苦平微寒無毒 反烏頭。川者味甘最佳。西者味薄次之。象山者味苦又次之。一種大而苦者。僅

能解毒。並去心用。凡肺經藥皆當去心。不獨貝母也。其獨顆無瓣者。名丹龍睛。誤服令人筋不收持。本

經主傷寒煩熱。淋瀝邪氣。疝瘕喉痹。乳難金瘡風痊。發明 貝母乃手太陰肺經氣分藥。兼入手少陰

心經。一名靈。鄰風言米其靈善解心胸鬱結之氣。故詩人以此寓焉。肺受心包火乘。因而生痰。或為邪熱

所干。喘嗽煩悶。非此莫治。詳本經主傷寒煩熱者。甘寒能解煩熱也。淋瀝者。熱結二腸也。清心肺鬱熱而

林懸通矣。山腹者。足厥陰之邪。干手厥陰也。經曰。診得心脈搏滑急。為心疝。少腹當有形也。喉痹者。熱鬱

結於上也。經云：一陰一陽結，謂之喉痹。心主三焦之脈，皆絡於喉也。乳難者，鬱熱結於手足厥陰也。風癰者，金瘡熱鬱生風而成癰。總取解散鬱結之邪也。仲景治傷寒寒實結胸，外無熱證者，小陷胸湯主之。白散亦可。二方一主熱痰內結，一主寒實內結，雖同一例，治不可混也。俗以半夏性燥，用貝母代之，不知貝母寒潤，治肺家燥痰，痰因鬱結者宜之。半夏性燥，治脾胃濕痰，痰因濕滯者宜之。二者天淵，何可代用？若虛勞欬吐血，咯血肺痿，肺癰癰疽，及諸鬱火證，半夏乃禁忌。皆貝母為嚮導也。至於脾胃濕熱，涎化為痰，久則生火生痰，上攻昏憤，僵仆蹇瀆，諸證生死旦夕，豈貝母可治乎？浙產者治疝瘕喉痹，乳難金瘡風癰，一切癰瘍，又同苦參當歸，治妊娠小便難，同青黛，治人面惡瘡，同連翹，治項上結核，皆取其開鬱散結化痰解毒之功也。

山慈姑

金燈花根也。九月開花，朱色。與葉不相見，故名無義草。

甘微辛小毒。

發明

山慈姑攻堅解毒，治癰腫瘡癤癰瘰結核

等證。紫金錠用之，亦是解諸毒耳。丹方治面上癰痕，用山慈姑末和輕粉、硼砂末各少許，先用鹼水筆塗患處，次搽上藥。太乙膏蓋，日易一次。俟疔瘡消盡後，以鷹屎白、蜜陀僧末、蜜水調護數日，勿見風日效。惟眼胞上者不可治，以其眦動不輟也。

白茅根

地筋一名

甘寒無毒，與百脈根相類。百脈根出巴西，他處罕得。

本經主勞傷虛羸，補中益氣，除痰

血，血閉寒熱，利小便。發明：甘寒能降，除伏熱，利小便，止渴，治傷寒呃逆喘噦，主吐衄便溺諸血，治黃

痺水腫，胃反上氣，五淋痰熱，及痘瘡乾紫不起，但嘔逆吐衄，亦有因於寒者，即非所宜。本經主治勞傷虛

羸者，以甘寒能滋虛熱，而無傷犯胃氣之虞也。言補中益氣，胃熱去而中氣復，是指客邪入傷中州，漸成

虛羸而言，非勞傷本病所宜。昔人攷本草功用，言白茅根與百脈根相類。今肅州不行葷貢，百脈根無從

可得，而止渴去熱之用，白茅根裕如也。其茅花甘溫，色白，輕虛，力能上升，入肺散熱，止衄，屋上敗茅，研傳

斑瘡濕爛，取其收濕之力也。

草龍膽 苦瀼大寒小毒，去蘆或酒炒，或甘草湯浸一宿用。凡用勿空腹服，令人小便不禁。本經主骨

間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五藏殺盡毒 發明 草龍膽苦寒沉降主肝經邪熱下焦濕熱酒廔黃腫
目病赤腫瘀肉小兒肝氣去腸中小蟲蓋肝膽濕熱取苦寒以瀉之時珍曰相火寄在肝膽有瀉無補故
瀉肝膽之熱正益肝膽之氣但大苦大寒過傷胃中生發之氣反助火邪亦如久服黃連反從火化之美
本經主骨間寒熱是指熱傷腎水而言熱極生風則發驚搐重則變為癇病濕熱邪氣之在中下二焦者
非此不除以其專伐肝膽之邪也肝膽之邪去而五藏安和經脈之絕傷續矣殺盡毒者去濕熱之患也
凡胃氣虛人服之必嘔脾虛人服之必瀉雖有濕熱慎勿輕用

細辛 辛溫無毒產華陰及遼東者良反藜蘆 本經主欬逆頭痛腦痛百節拘攣風濕痺痛死肌明目
利九竅 發明 細辛辛溫上升入手足厥陰少陰血分治督脈為病脊強而厥本經治欬逆頭痛腦痛

善搜厥陰伏匿之邪也獨活為使治少陰頭痛如神亦主諸陽頭痛諸風藥用之治風濕痺痛百節拘攣
去死肌明目者取辛以散結而開經脈竅隊之邪也味辛而熱溫少陰之經故仲景少陰證用麻黃附子

細辛湯辛溫能散故凡風寒風濕頭痛口瘡喉痺靈齒諸病用之取其能散浮熱亦火鬱發之之義也辛
能泄肺故風寒效嗽上氣者宜之辛能補肝故膽氣不足則肝氣有餘驚癇眼目諸病宜之辛能潤燥故

通少陰諸經又耳竅閉塞者宜之又主皮結濕火鼻塞不利凡口舌生瘡者用細辛黃連末搽之凡血虛
內熱火鬱頭痛發熱效嗽者戒用以其辛烈耗散真氣也細辛辛之極者用不過五分

杜衡俗名馬蹄香又名杜葵 辛溫無毒 發明 杜衡香竅與細辛相似故藥肆以之代充細辛亦能散頭目風

寒下氣消痰行水破血但其氣濁不能搜滌少陰經中之寒稍遜細辛一籌耳

白微 苦鹹平無毒 本經主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱痠疼溫瘧洗洗發作有時


發明 白微鹹平降泄抑陽扶陰為足陽明經本藥兼行足少陰手太陰本經主暴中風身熱肢滿是熱

鬱生風痠隨火湧故令忽忽不知人狂惑邪氣寒熱痠疼皆熱邪所致溫瘧乃冬時伏邪至春而發繆

經疏言暑邪所傷秋必發為溫瘧恐非經旨別錄療傷中淋露者女子傷犯陰中營血而成淋露之疾用

以除熱益陰則前證瘳矣。下水氣利陰氣者。總取益陰之功。真陰益而邪水下。性善降泄。故久服利人。金匱治婦人產中虛煩嘔逆。安中益氣竹皮丸中用之。千金治風溫發汗後身灼熱。自汗身重多眠。鼻息必鼾。語言難出。姜蕤湯中用之。又治婦人遺尿。不拘胎前產後。有白微芍藥湯。取其有補陰之功。而兼行手太陰。以清膀胱之上原。殊非虛寒不禁之比也。古方多用治婦人者。以別錄有療傷中淋露之功也。凡胃虛少食泄瀉及喘欬多汗。陽氣外泄者。禁用。

白前 甘辛微溫無毒 發明 時珍曰。白前入手太陰。長於降氣。肺氣壅實。而有痰者。宜之。金匱治欬嗽而脈沉者。用澤漆湯。以中有白前也。深師治久嗽。上氣體腫。短氣倚息。不得卧。常作水雞聲者。用白前湯。外臺治久嗽吐血。用白前桔梗桑白皮甘草。皆取其下氣耳。若虛嗽常哽氣者。不可用也。白前較白微稍溫。較細辛稍平。專搜肺竅中風水。非若白微之鹹寒。專泄肺胃之燥熱。亦不似細辛之辛竄。能治腎肝之沉寒也。



芳草部

當歸 甘辛溫無毒蜀產者力剛可攻秦產者力柔可補凡治本病酒制有痰薑汁制白者為粉歸性劣不入補劑 本經主效逆上氣溫瘧寒熱灑灑在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之 發明 當歸氣味俱厚可升可降入手少陰足太陰厥陰血分凡血受病及諸病夜甚必須用之本經主效逆上氣溫瘧寒熱洒洒婦人漏下絕子皆取辛溫潤血之功產後惡血上衝亦必用之別錄溫中止痛甄權治下痢腹痛女人憑血腰痛好古治衝脈為病逆氣裏急帶脈為病腹痛腰溶溶若坐水中其功專於破惡血養新血潤腸胃榮筋骨澤皮膚理癰疽排膿止痛蓋血壅而不流則痛當歸甘溫能和營血辛溫能散內寒使氣血各有所歸入手少陰心主血也入足太陰脾裏血也入足厥陰肝藏血也身能養血尾能行血同人參黃耆則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而瀉血同桂附吳萸則熱同大黃芒硝則寒血虛以人參赤脂為佐血熱以生地條芩為佐仲景治陽邪陷陰手足厥寒脈細欲絕用當歸四逆湯於桂枝湯加當歸細辛通草以通其血脈即下痢脈大氣不歸附亦用此湯以歸附之凡血虛發熱者宜當歸補血湯方用當歸三錢黃耆一兩作三服心下刺痛者一味當歸酒煎服專主血分諸病海藏言當歸血藥何本經治效逆上氣按當歸辛散乃血中氣藥故效逆上氣有陰虛陽無所附者用血藥補陰則血和而氣降矣凡衝任督帶病皆不可少惟泄瀉家疾飲家禁用

芎藭 綱目名

辛溫無毒蜀產者味辛而甘為上他處產者氣味辛烈為下反藜蘆葶藶名藜蘆本經主

中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急全瘡婦人血閉無子 發明 芎藭辛溫上升入肝經行衝脈血中理氣

藥也故本經治中風入腦頭痛等證取其辛散血分諸邪也好古言搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛又治

一切風氣血氣及面上遊風目疾多淚上行頭目下行血海故四物湯用之者皆搜肝經之風治少陽厥

陰頭痛及血虛頭痛之聖藥助清陽之氣去濕氣在頭頭痛必用之藥血痢已通而痛不止乃陰虧氣鬱藥中加芎藭氣行血調其痛立止靈苑方驗胎法以生芎藭末艾湯服一錢匕腹中微動者為胎千金方治子死腹中以芎藭末酒調方寸匙須臾二三服立出凡骨蒸盜汗陰虛火炎效嗽吐逆及氣弱之人不可服其性辛散令真氣走泄而陰愈虛也

撫芎 辛溫無毒產江左撫州中心有孔者是 發明 撫芎升散專於開鬱寬胸通行經絡鬱在中焦則胸膈痞滿作痛須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使然久服耗氣令人暴亡

蛇牀 苦辛溫無毒 本經主男子陰痿濕瘡婦人陰中腫痛除痺氣利關節癩癩惡瘡 發明 蛇牀辛香性溫專入右腎命門少陽三焦氣分本經列之上品不獨助男子壯火且能散婦人鬱抑非妙達本經精義不能得從治之法也但腎火易動陽強精不固者勿服

藁本 辛苦溫無毒香而燥者良臭而潤者勿用 本經主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色 發明 藁本性升屬陽為足太陽寒鬱經中頭項顛頂痛及大寒犯腦連齒頰痛之專藥女人陰腫疝瘕督脈為病脊強而厥亦多用之霧露之邪中於上焦須兼木香風客於胃泄瀉脾胃藥中宜加用之今人只知藁本為治顛頂頭腦之藥而本經治婦人疝瘕腹中急陰中寒等證皆太陽經寒濕

為病亦屬客邪內犯之候故用藁本去風除濕則中外之疾皆痊豈特除風頭痛而已哉云長肌肉悅顏色者外用作面脂之類是也但頭痛挾內熱春夏溫病熱病頭痛口渴及產後血虛火炎頭痛皆不可服

白芷 御香 辛苦溫無毒 本經主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚潤澤顏色可作面脂 發明 白芷辛香升發行手陽明性溫氣厚行足陽明芳香上達人手太陰為解利陽明風熱

頭痛及寒熱頭風侵目淚出之要藥其所主之病不離三經如寒熱頭風眉稜骨痛頭目齒痛三經之風熱也漏下赤白離疽頭面皮膚風痺燥癢三經之濕熱也風熱者辛以散之濕熱者溫以除之都梁凡治

崩漏赤白深得本經之旨。性善祛風。女人漏下赤白。皆風入胞門所致。辛香入脾。故又能溫散血閉。陰腫及寒熱頭風。侵目淚出。總取辛散利敷之功。其長肌膚潤澤顏色者。則有排膿長肉之力。所以外科用之。瘡疹起脹。連皮腫者。於解毒藥內用之。預杜將來發癢之患。今人用治腸癰。有敗膿淋露不已。腥穢殊甚。遂致臍腹冷痛。須此排膿。膿盡乃以他藥補之。燒烟辟蟲蛇。為末新汲水調頻灌。解蛇毒內攻。和膽礬麝香。搽蚊傷潰爛。但性溫而升。味苦而散。故嘔吐因於熱者。漏下赤白。因於火者。勿用。癰疽潰後。亦宜漸減。以其能耗胃氣也。

白芍藥 酸苦平。微寒無毒。入補脾藥。酒炒。入止血藥。醋炒。入和營藥。又下痢後重。血熱癰毒藥。並酒洗。生用。入血虛水腫。腹脹藥。桂酒制。用反藜蘆。本經主邪氣腹痛。除血痺。利小便。益氣。發明 白芍藥酸寒。斂津液。而護營血。收陰氣。而瀉邪熱。蓋瀉肝之邪熱。所以補脾之陰。即本經主邪氣腹痛。益氣之謂。故仲景以為補營首藥。入肝脾血分。及陽維寒熱帶脈。腹痛補中。下二焦。能於土中瀉水。為血痢必用之藥。然須兼桂用之。方得斂中寓散之義。建中湯之妙。用人所不知。蓋瀉痢皆大陰之病。建中專主太陰腹痛也。其治血痺。黃耆桂枝五物湯中用之。非深達本經妙理者。不能也。又得炙甘草治腹中急痛。同白朮補脾。同芍藥瀉肝。從人參補血。虛從黃連止瀉。痢同薑棗溫經散濕。在用者各得其宜耳。凡人陽氣虛衰。陰氣散漫。患腹脹滿。急於補中益氣藥中。加白芍藥一味。以收陰。則陽虛不受陰制之。脹得陽藥便消矣。然氣虛內寒者。不可用。古云減芍藥。以避中寒。誠不可忽。產後不可用。以其酸寒瀉肝。伐生發之氣也。小便不利者。禁用。以膀胱得酸收斂愈秘也。而真武湯中。又用以利小便者。深得本經之旨。蓋真武湯本治少陰精傷。而證見虛寒。非太陽膀胱癃閉之候。以其能益陰滋血。培養津液。小便自行。非通利也。至於桂枝湯中。用以護營血。使邪不得內犯。建中湯中。用以培土藏。而治陽邪內陷腹痛。此皆仲景用藥之微妙。端不外本經之義。其餘血痺。破堅積。治寒熱疝瘕。止痛利小便。皆指赤者而言。與白芍無預。因本經未分赤白。故一貫例之。

赤芍藥 酸苦微寒無毒酒洗用 本經除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便 發明 赤芍藥性專下氣故止痛不減當歸蘇恭以為赤者利小便下氣白者止痛和血端不出本經除血痺破堅積止痛利小便之首其主寒熱疝瘕者善行血中之滯也故有瘀血留著作痛者宜之非若白者酸寒收斂也其治血痺利小便之功赤白皆得應用要在配合之神乃著奇勳耳

牡丹皮 苦辛平無毒酒洗去鱗土曝乾勿見火 本經主寒熱中風痙癎驚癩邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃五藏癥癰瘡 發明 牡丹皮入手足少陰厥陰治血中伏火故相火勝腎無汗骨蒸為專藥本經主寒熱中風痙癎驚癩等證以其味辛氣竅能開發陷伏之邪外散惟自汗多者勿用為能走世津液也痘疹初起勿用為其性專散血不無根脚散闊之慮王安道云志不足者足少陰病也故仲景腎氣丸用之後人惟知黃柏治相火不知丹皮之功更勝也又癥堅瘀血留舍腸胃五藏及陰虛吐血衄血必用之藥以能行瘀血而又能安好血有破積生新引血歸經之功故犀角地黃湯用之凡婦人血崩及經行過期不淨屬虛寒者皆用又赤者利血白兼補氣亦如赤白芍藥之義諸家言其性寒安有辛香而寒者乎木香 辛苦溫無毒形如枯骨味苦色淡黃者良味鹹色黑勿用生用理氣煨熟止瀉 本經主邪氣辟毒疫強志止淋露 發明 木香氣香味厚不獨沉而下降蓋能理胃以下氣滯乃三焦氣分之藥兼入肺脾肝三經能升降諸氣故上焦氣滯膈鬱宜之者金鬱則泄之也然雖入肺而肺燥氣上者良非所宜其中焦氣滯不運宜之者脾胃喜芳香也下焦氣滯後重宜之者寒者通之也若治中脘氣滯不運心腹疼痛以檳榔佐之使氣下則結痛下散矣本經辟疫毒邪氣強志止淋露以其辛燥助陽善開陰經伏匿之邪大明治心腹一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂瀉痢健脾消食安胎甄權治九種心痛積年冷氣疝癥癥塊脹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺痛不可忍然香燥而偏於陽肺虛有熱血枯而燥及陰火衝上者勿服

甘松香 甘溫無毒 發明 甘松芳香升竅能開脾鬱少加脾胃藥中甚醒脾氣主惡氣平心腹痛滿

風疝齒蠱得白芷白附子良脚氣膝腫煎湯淋洗效

山柰 辛温無毒 發明 山柰芳香入陽明暖胃辟瘴穢惡氣治心腹冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛皆

芳香正氣之力也

高良薑 辛大温無毒煨熟用子名紅豆蔻 發明 良薑辛熱純陽上升入足陽明太陰二經為客寒

所犯則逆冷霍亂腹痛諸病生焉辛温暖脾胃而逐寒邪則胃中冷逆自除霍亂腹痛自愈甄權治腹內

久冷氣痛去風冷痺弱大明主轉筋瀉利反胃解酒毒消食蘇頌治惡心嘔清水皆取暖胃温中散寒之

功也而寒疝小腹掣痛須同茴香用之產後下焦虛寒瘀血不行小腹結痛者加用之若胃火作嘔傷暑

霍亂禁用為其温燥也○紅豆蔻辛温主水瀉霍亂心腹絞痛止嘔進食大補命門相火故正元丹中用

之然能動火傷目致眵不宜久服

草豆蔻 辛温温無毒麩裏煨熟去麩用 發明 草豆蔻性温入脾胃二經東垣曰風寒客邪在胃口

之上當心疼痛者宜之丹溪曰草豆蔻性温能散滯氣若明知口食寒物胃脘作疼或濕鬱成病者用之

神效若熱鬱者不可用恐積温成熱也然多用能助脾熱傷肺損目故陰虛血燥者忌之

草果 亦名豆蔻 辛温温無毒去殼生用 發明 草果與草豆蔻總是一類其草果治病取其辛熱浮散能

入太陰陽明除寒燥濕開鬱化食利膈上痰解麩濕魚肉諸毒與知母同用治瘴瘧寒熱取其一陰一陽

無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也然瘴亦有不由於嵐瘴氣而實邪不盛

者忌服凡濕熱痰滯傷暑暴注澀赤口乾者禁用

白豆蔻 俗名微蔻 辛温無毒忌見火去淨隔膜不爾令人隔滿凡草果草豆蔻縮砂皆然不獨白豆蔻也

發明 白豆蔻辛香上升入脾肺二經散肺中滯氣治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一

轉諸證自平古方治胃冷積氣嘔逆反胃消穀下氣寬膈進食解酒毒皆相宜也若火升作嘔蘊熱作痛

者勿服

縮砂蜜俗名砂仁 辛溫溫無毒 發明 縮砂屬土醒脾調胃為脾胃肺腎大小腸膀胱七經之氣藥能引

諸藥歸宿丹田治脾虛泄瀉宿食不消瀉利白沫腹中虛痛寒飲脹症壹膈嘔吐和中行氣止痛安胎用

之悉效同熟地茯苓納氣歸腎同檀香豆蔻下氣安肺得陳皮白朮和氣益脾惟新產婦忌之恐氣驟行

動血也今人治血刺亦多用之若積欲盡時良非所宜又血虛火炎效嗽禁用妊婦氣滯者宜服若氣虛

者多服反耗其氣多致難產南人性喜條暢食品每多用之北人性喜潛藏藥中亦罕用者

益智子 辛溫無毒去殼鹽水炒用 發明 益智行陽退陰三焦命門氣弱者宜之脾王智此物能益

脾胃理元氣補腎虛滑精胃虛多唾女人崩漏治心氣不足夢泄夜多小便及冷氣腹痛於土中益火也

集驗方縮泉丸治脬氣不足方用益智子鹽炒去鹽與烏藥等分為末酒煮山藥粉為糊丸如梧子大空

心鹽湯下七十九丹方治夜多小便取二十四枚入鹽同煎服之有驗按益智功專補火如血燥有火濕

熱暴注及因熱而遺濁色黃乾結者不可誤用也

華菱 辛大溫無毒醋浸刮去皮子免傷肺上氣 發明 華菱辛熱浮散為頭疫鼻淵要藥取其能入

陽明經散浮熱也性能溫中下氣治霍亂水瀉心腹滿者宜之然辛熱耗散能動脾胃之火多用令人喘

效目昏腸虛下重以其走泄真氣也

葇葉葇名 辛溫無毒 發明 葇葉辛熱能下氣溫中破痰散結氣解瘴癘嶺南人以葉合檳榔食取

其辛香能破瘴癘之氣也其子可以調羹故謂之醬華菱之類也

肉豆蔻俗名肉果 辛溫無毒糯米粉裏煨熟用勿犯鐵 發明 肉豆蔻辛香入手足陽明溫中補脾寬膨

脹固大腸為小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥二神丸合補骨脂治腎瀉蓋取補脾以治腎邪也按脾土性喜

芳香故肉果與脾胃最為相宜以其能下氣者脾胃得補則健運非若厚朴枳實之峻削也熱鬱暴注禁

用以其辛溫性滯也

補骨脂俗名破故紙字音相近之類也 苦辛大溫無毒鹽酒浸焙乾用與胡麻同炒良忌薑薑羊肉諸血 發明 補

骨脂屬火收斂神明能使心胞之火與命門之火相通使元陽堅固骨髓充實潘以固脫也胡桃屬水潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐補骨脂有水火相生之妙故局方青娥丸用之孫思邈言補腎不若補脾許學士言補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣衰劣不能薰蒸脾胃令人痞滿少食譬如釜底無火雖終日不熟陽衰則飲食亦不能消化濟生二神丸治脾腎虛寒泄瀉用補骨脂補腎肉豆蔻補脾加吳茱萸以平其肝加木香以順其氣使之斡旋若精傷瀉赤澀痛者去木香易五味子腰膝痠疼腎冷精流者用之屢效凡陰虛有火夢泄溺血大便閉結者勿施

薑黃 辛苦溫無毒藏器曰辛少苦多性熱不冷或云大寒誤矣有二種蜀川生者色黃質嫩有鬚折之中空有眼切之分為兩片者為片子薑黃江廣生者質粗形扁如乾薑僅可染色不入湯藥今藥肆混市誤人徒有耗氣之患而無治療之功也 發明 薑黃鬱金蓬朮三物形狀功用皆相近但鬱金入心專治心包之血薑黃入脾兼治血中之氣蓬朮入肝兼治氣中之血為不同耳古方三痹湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴元禮曰片子薑黃能入手臂治痛其兼理血中之氣可知能治癥瘕癰疽通經消腫毒功力烈於鬱金但血虛臂痛者服之病必增劇

鬱金 辛苦平無毒本草以為性寒誤矣安有辛香而寒之理蜀產者體圓尾銳如蟬腹狀發苗處有小孔皮黃而帶黑通身粗皺如梧桐子紋每枚約重半錢折開質堅色黃中帶紫黑嗅之微香不烈者真若大小不等色黃皮起細橫紋有鬚如線折之中空質柔內外皆黃其氣烈者即片子薑黃也體圓首尾相似通身橫紋發苗處無小孔折開氣烈觸鼻者染色薑黃中之小者也蓬朮則大塊色青黑最大者為廣茂與此不類蘇恭不能分別乃為一物謬矣 發明 鬱金辛香不烈先升後降入心及包絡治吐血衄血唾血血腥破惡血血淋尿血婦人經脈逆行產後敗血衝心及宿血心痛並宜鬱金末加薑汁童便同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者加入四物湯一婦患失心風癲十年用鬱金四兩佐明礬一兩為丸硃砂為衣繞服五十九心間如有物脫去再服而蘇以鬱金入心去惡血明礬化頑痰硃砂

安神故也。又能化癥瘕為水。鎮南蓋毒為害。初覺胸腹痛。即用升麻或膽礬吐之。若膈下急痛。以米湯調鬱金末三錢服之。即瀉出惡物。或合升麻鬱金服之。不吐則下。此李真岩為雷州司理鞠獄得此方。活人甚多。按以上諸治。其功皆在破宿生新。今世誤以為諸血聖藥。病者不惜重費。醫者藉為射利。咸以薑黃代充。為害非淺。凡屬陰虛失血及陰火迫血上逆。咸為切禁。

蓬莪茂脚蓬

苦辛溫無毒。入肝經。藥醋炒。入心脾藥麩裏煨熟。入四物湯調經。羊血或雞血拌炒。發

明。蓬莪茂入肝破血治婦人血氣結積痛癢冷氣跌撲損痛下血及內損惡血通肝經聚血。蓋此藥專破氣中之血也。按蓬莪誠為磨積之藥。但虛人得之。積不去而真已竭。更可虞也。須得參朮健運補中寓瀉。乃得力耳。

荆三稜 苦平無毒。生荆楚地。故名荆三稜。真者絕少。今世所用皆草三稜也。醋炒用之。發明 三稜

肝經氣分藥也。能破血中之氣。散血結。通肝經積血。主寒癖結塊。破產後惡血。血結腹痛。通月水。墮胎以其力峻。故難久服。有人病癥瘕腹脹。用三稜莪朮酒煨煎服。下一黑物如魚而愈。按潔古云。三稜能瀉真氣。虛者勿用。東垣破積諸方。皆與人參贊助。如專用剋削。脾胃愈虛。不能運行。其積元逆益甚矣。

香附脚附

辛微苦甘平無毒。產金華。光細者佳。入血分。補虛。童便浸炒。調氣。鹽水浸炒。行經絡。酒浸炒。

消積聚。醋浸炒。氣血不調。胸膈不利。則四者兼製。肥盛多痰。薑汁浸炒。止崩漏。血便製炒。黑。走表藥中則生用之。發明 香附之氣平而不寒。香而能竅。乃足厥陰肝。手少陽三焦。氣分主藥。兼入衝脈。開鬱氣。

消痰食。散風寒。行血氣。止諸痛。月候不調。胎產崩漏。多怒多憂者之要藥。治兩脇氣妨。心忪少氣。是血中之氣藥也。蓋血不自行。隨氣而行。氣逆而鬱。則血亦凝滯。氣順則血亦隨之。而和暢矣。生則上行胸膈外。

達皮毛。故能散風寒。熱則下走肝腎。外徹腰足。故能調血氣。得參朮則益氣。得歸地則調血。得木香則流滯和中。得沉香則升降諸氣。得芍藥蒼朮。則總解諸鬱。得山梔黃連。則降火清熱。得茯苓則交心腎。得茵

香補骨脂。則引氣歸元。得厚朴半夏。則決壅消脹。得紫蘇蒼朮。則解散邪氣。得三稜莪朮。則消磨積滯。得

艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司。女科之主帥也。惟經水先期而淡及失氣無聲無臭者勿用。血氣本虛更與利氣則行之愈速矣。

茉莉花 辛熱無毒。根熱有毒。發明 茉莉花古方罕用。近世白刺藥中用之。取其芳香散陳氣也。其根性熱有大毒。以酒磨一寸服。即昏迷。一日乃醒。服二三寸。二三日醒。惟接骨脫臼用以傅之。則不知痛也。

排草香 辛溫無毒。發明 芳香之氣皆可辟臭去邪惡氣。鬼魅邪精。天行時氣。並宜燒之。水煮洗水腫浮氣。與生薑芥子煎湯。浴風瘧效。

藿香 辛微溫無毒。廣產者良。但葉甚少。土人每以排草葉偽充。最難辨別。須於莖上擇去色綠未經穢壞者方效。發明 藿香入手足太陰。芳香之氣助脾醒胃。故能止嘔逆。開胃進食。溫中快氣。去瘴氣。止霍亂。治心腹痛。凡時行疫癘。山嵐瘴癘。用此醒脾健胃。則邪氣自無容而愈矣。但陰虛火旺。胃虛作嘔。內無留滯者。不可用。恐反傷正氣。引邪內入。江浙土產者。伐胃消食。其莖能耗氣。用者審之。

薰香 即零 甘平無毒。廣產者良。雲陽產者氣濁不堪入藥。發明 薰香辛散上達。故心痛惡氣。齒痛鼻塞。皆用之。單用治鼻中瘰肉。鼻鼈香以養鼻也。多服作常。為能耗散真氣也。

蘭香 辛溫無毒。菜部。移此瀕湖綱目。芳草部有蘭草。菜部有蘭香。名曰羅勒。種類不同。因攷正之。按蘭有三種。一種曰蘭草。其氣濃濁。即今之省頭草也。一種曰蘭香。植之庭砌。二十步內。即聞香。俗名香草。以子能去目醫。故又名醫子草。一種名羅勒。莖葉較蘭香稍粗大。形雖極類。而氣壘濁。以嫩時可食。僅入菜部。不堪入藥。本經利水道。殺蟲毒。辟不祥。久服益氣。輕身不老。通神明。發明 蘭氣芳香。能辟疫毒。

惡氣。楚人以為佩。又能辟汗濕之氣。故又名辟汗香。入手足太陰。陽明力能調中消食。去惡氣。治嘔嘔。

脾瘰。口中時時溢出甜水者。非此不除。按蘭性芳香。辛溫。專走氣道。故能利水調肝和脾。其功倍於藿香。

善調嘔逆。散積久。陳鬱之氣。素問云五味入口。藏於胃。以行其津氣。津液在脾。令人口甘。此肥美所發也。

善調嘔逆。散積久。陳鬱之氣。素問云五味入口。藏於胃。以行其津氣。津液在脾。令人口甘。此肥美所發也。

善調嘔逆散積久陳鬱之氣素問云五味入口藏於胃以行其津氣津液在脾令人口甘此肥美所發也其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本於此又治牙疼口臭有神功丸亦用蘭香云如無以藿香代之近世有誤認幽蘭為蘭香者大可噴飯觀本經利水殺蟲毒辟不祥之治豈幽蘭能之乎古方治癘風蘭香散取其散於胃中之濕熱毒也普濟方治反胃蘭香和甘蔗汁服之錢氏治小兒鼻疳赤爛蘭葉燒灰二錢銅綠半錢輕粉二字為末日傳三次即愈○子治目醫及塵物入目以三五顆內目中少頃其子濕脹與物俱出又主暴得赤眼後生翳膜用蘭香子一粒入皆內閉目少頃連膜俱出蓋此子得濕即脹故能染惹膜淚浮膜爾然目中不可著一塵而此可納三五顆亦不妨礙又小兒食肥甘口臭齒黑名曰崩砂漸至齟齬名曰清槽又或出血名曰息露重則齒落名曰腐根用蘭香子末輕粉各一錢蜜陀僧煨赤醋淬研末半兩和勻每以少許傅齒及齟上內服甘露飲立效○時珍曰蘭香須三月桑葉生時種之乃生否則不生常以魚腥水泥溝水冷泥水澆之則香而茂不宜糞水著糞則萎其子大如棗而褐色不光七月收之種時防蟻濕則有脂浮脹須以枯炭末掩之

澤蘭 苦甘微溫無毒取葉酒洗用 本經主金瘡癰腫瘡膿 發明 澤蘭入足太陰厥陰血分專治產後血敗流於腰肢拘攣疼痛破宿血消癥瘕除水腫牙面四肢浮腫本經主金瘡癰腫瘡膿皆取散血之功為產科之要藥更以芎歸童便佐之功效勝於益母

馬蘭 辛平無毒赤莖者良 發明 馬蘭入陽明血分與澤蘭功用相近故能破宿生新丹方治婦人淋濁痔漏有效喉痹腫痛以馬蘭根葉搗汁入米醋滴鼻孔或灌喉中取痰自開絞腸痧腹痛以馬蘭細嚼嚙汁立安水腫溺滯馬蘭一握黑豆小麥各一撮酒水煎服效蛇傷搗汁和醋擦之皆取散血解毒也香薷 主微溫無毒江西白花者良 發明 香薷辛溫先升後降故熱服能發散暑邪冷飲則解熱利小便治水甚捷世醫治暑病以香薷飲為首藥然暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病發熱惡寒頭痛煩躁口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此發越陽氣散水和脾若飲食不節勞役作喪之人傷暑發熱大

渴煩渴喘促者乃勞倦內傷之證必用清暑益氣如大熱大渴又宜人參白虎之類以瀉火益元更有汗出如雨吐瀉脫元四肢清冷脈微欲脫者又須大順漿水散等方救之若用香薷飲是重虛其表頃刻脫亡矣今人不知緊用沉冷代茶若元氣虛人服之往往致病蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者豈可漫用深師香薷丸治通身水腫以香薷蒸膏丸白朮末日三夜一服米飲下之效

爵林俗名赤眼 鹹寒無毒 本經主腰脊痛不得搖林使仰艱難除熱可作湯浴 發明 爵林善通

血脈蘇恭言瘰癧血脹下氣杖瘡搗汁塗之立瘥觀本經諸品不出活血舒筋之用也

荊芥假名 辛微溫無毒產後止血重便制黑用凡食河豚及一切無鱗魚與驢肉俱忌之食黃鱔魚後

服之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風 本經主寒熱鼠瘻癰生瘡破結聚氣下瘞血除濕疽

發明 荊芥穗入手太陰足厥陰氣分其功長於祛經絡中之風熱觀本經所主皆是搜經中風熱痰血

之病又能清頭目去瘀血破結氣消瘡毒故風病血病瘡病產後為要藥治風兼治血者以其入風木之

藏即是藏血之地故並主之華元化治產後中風口噤發瘕及血暈不醒荊芥末三錢豆淋酒調服神效

產後血暈熱重便調脈而表虛自汗陰虛而赤者禁用今人但遇風證緊用荊芥此流氣散之相沿耳

紫蘇 辛溫無毒葉紫色能散血脈之邪最良 發明 蘇葉味辛入氣分色紫入血分中有降同橘

皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥則快氣止痛同麻黃葛根則發汗解肌同芍藥當歸則和營散血同木

瓜厚朴則散濕解暑同桔梗枳殼則利膈寬中同杏仁龍子則消痰定喘然不宜久服世人真氣單用煮

汁解蟹毒若脾胃虛寒人過服多致滑泄往往不覺也其梗能行氣安胎但力淺薄難於奏效亡血家大

虛及妊婦產婦發散用莖最佳本乎天者親上取其包含子氣且氣味皆薄而無過汗傷中之患也

蘇子 辛溫無毒粗而色深紫者真細而色淡者假 發明 諸香皆燥惟蘇子獨潤為虛勞欬嗽之專

藥性能下氣故胸膈不利者宜之與橘紅同為除喘定嗽消痰順氣之良劑但性主疎泄氣虛久嗽陰虛

喘逆脾虛便滑者皆不可用

水蘇一名辛溫無毒子名荏子本經下氣殺穀除飲食辟口臭去邪毒辟惡氣發明水蘇即蘇之野生色青者其氣芳香故本經所主一皆胃病專取芳香正氣之義局方用治血病者取以解散血中之氣也氣散則血亦散矣

薄荷辛平無毒蘇產者良去梗用發明薄荷辛涼上升入肝肺二經辛能發散專於消風散熱涼能清利故治欬嗽失音頭痛頭風眼目口齒諸病利咽喉去舌胎小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥其性浮而上升為藥中春升之令能開鬱散氣故逍遙散用之然所用不過二三其辛香伐氣多服久服令人虛冷瘦弱人多服動消渴病陰虛發熱欬嗽自汗者勿施

限草部

菊黃者苦甘平白者苦辛平皆無毒野生者名苦蕒可搗塗癰腫疔毒服之傷人腦本經主諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕癩久服利血氣輕身耐老延年發明菊得金水之精英補水以制火益金以平木為去風熱之要藥故本經專主頭目風熱諸病取其味甘氣清有補陰養目之功益金則肝木平而風自息補水則心火制而熱自除矣其治惡風濕癩者以其能清利血脈之邪而癩濕得以開泄也又黃者入金水陰分白者入金水陽分紫者入婦人血分觀金匱侯氏黑散千金秦朮散俱用菊花為君時珍所謂治諸頭目其旨深矣近有一種從番舶來六月開花但有正黃而無間色豈特黃州脫瓣為異哉

艾苦辛溫無毒蘄州者為勝發明艾姓純陽故可以取太陽真火可以回垂絕元陽服之則走肝脾腎三陰而逐一切寒濕轉肅殺之氣為融和生用則性溫炒熟則大熱用以灸火則透諸經而治百病蘇頌言其有毒誤矣夫用藥以治病中病則止若素有虛寒痼冷婦人濕鬱帶漏之病以艾和歸附諸藥治之夫何不可艾附丸調經而溫子宮兼主心腹諸痛膠艾湯治虛痢及胎妊產後下血雷火鍼同丁香麝香附子寒痺掌痛若老人臍腹畏冷及寒濕腳氣以熟艾入布兜之惟陰虛火旺血燥生熱及宿有失血

病者為其有人患風癩癰疹不時熾發以絹裹擦之即消亦取其土散開發之功

茵陳蒿 苦平微寒無毒 本經主風濕寒熱邪氣熱結黃疸 發明 茵陳有二種一種葉細如青蒿

者名綿茵陳專於利水為濕熱黃疸要藥一種生子如鈴者名山茵陳又名角蒿其味辛苦小毒專於殺

蟲治口齒瘡絕勝並入足太陽本經主風濕寒熱熱結黃疸濕伏陽明所生之病皆指綿茵陳而言仲景

茵陳蒿湯以之為君治濕熱發黃梔子柏皮湯以之為佐治燥熱發黃如茵瀉則濕黃早則燥黃其麻黃

連軹亦小豆湯以之為使治痰熱在裏而身黃此三方分治陽黃也其治陰黃則有茵陳附子湯各隨燥

濕寒熱而為主治按茵陳專走氣分而利濕熱若畜血發黃非此能治也外臺治齒齩宣露千金治口瘡

齒蝕並用燒灰塗之有汁吐去宿即效而殺蟲方中一味煎湯內服外洗皆用角蒿專取逐濕化熱之功也

青蒿 苦寒無毒莖紫者真根莖子葉不可並用恐成痼疾葉主濕熱子治骨蒸俱宜童便制用 本經

主疥癩加痒惡瘡殺蟲留熱在骨節間明目 發明 青蒿亦有二種一種發於早春葉青如綿茵陳專

瀉丙丁之火能利水道與綿茵陳之性不甚相遠一種盛於夏秋微黃如地膚子專司甲乙之令為少陽

厥陰血分之藥故莖紫者為良其治骨蒸勞熱有殺蟲之功而不傷伐骨節中陽和之氣者以其得春升

之令最早也此與角蒿之性大都相類又能明目善清在上之虛熱燒灰淋汁和石灰點治惡瘡魚肉腐

癢蘇恭生搗數金瘡經驗方和桂心治寒瘡但性偏苦寒脾虛虛寒泄瀉者勿服

羌蔚 俗名益母 辛甘微溫無毒忌犯鐵器其子微炒香蒸熟烈日曝燥杵去殼用 本經羌蔚子明目益精

除水氣莖治癰疹可作浴湯 發明 羌蔚入手少陰足厥陰血分活血行氣有補陰之功凡胎前產後

所恃者血氣也胎前無滯產後無虛以其行中有補也然所謂補者是散其瘀而營血受蔭非補養血氣

之謂丹方以益母之嫩葉陰乾拌童便陳酒九蒸九曬入四物湯料為丸治產後諸證但功專行血故崩

漏下血若脾胃不實大腸不固者勿用為其性下行也近世治番痧腹痛嘔逆用以濃煎少加生薑放溫

恣飲有效取其能散惡血也其子能明目功端益精利水水虧而腫子收小者宜之若火盛腫子散大者

本經主其子能助火也白化者名整米嫩苗可食故謂之米藏器主產後腹痛今人治白帶用一味為末服之大效

薇銜 苦溫無毒素問謂之麋銜唐本曰鹿銜千金曰鹿藥草言鹿有疾銜此草即差也其葉大而面緣背紫者為真蘇恭言有大小二種保昇言葉似茺蔚叢生有毛者吳風草也 本經主風濕痺歷節痛驚癩吐血悸氣賊風鼠癭癰腫 發明 鹿銜本經專主風濕痺歷節痛素問同澤水治酒風身熱懈惰汗出如浴惡風少氣之病亦取其能除痺著血脈之風濕也又治驚癩悸氣吐咯諸血以其能走胃與腎肝血分專理血中邪濕而無留滯之患近世治吐血咯血用之以其能溫補銜督之精血也陝人名為鹿胎草言鹿食此即能成胎其性溫補下元可知今吳興山中間亦產此每於初夏羣鹿引子銜食乃去洵為確真無疑採得曬乾一味浸酒最為有益性專助陽力能走散陰精故藏器云婦人服之絕產無子良有見乎此也其子名延壽果味微澁而甘惟秦地有之不特有益於老人而嬰兒先天不足者尤為上藥惜乎南方罕得也

夏枯草 苦辛溫無毒 本經主寒熱瘰癧鼠癭頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身 發明 夏枯草本經專治寒熱瘰癧有補養厥陰血脈之功以辛能散結苦能除熱而癥結癭氣散矣言輕身者脚腫濕痺愈而無重著之患也佐以香附甘草治目珠疫夜甚者以其稟純陽之氣而散陰中結滯之熱也又能解內熱緩肝火從治之法并治痘後餘毒及肝熱目赤有效久服亦防傷胃以善走厥陰助肝木之氣耳 劉寄奴 苦溫無毒 發明 劉寄奴破血下脹又能止血故產後餘疾及全瘡血大小便血皆用之千金方治折傷瘀血用劉寄奴骨碎補延胡索水煎加童便服集簡方治大小便血劉寄奴末空心茶清調服衛生易簡方治血氣脹滿劉寄奴紅酒煎服時珍治小兒尿血取劉寄奴研末服效丹方治大便秘用劉寄奴半兩臘茶一錢烏梅半枚煎服即效但性走散不可過服令人吐利

旋覆花 本經名 鹹甘溫小毒 本經主結氣脇下滿驚悸除水去五藏間寒熱補中下氣 發明 旋

覆花升而能降肺與大腸藥也其功在於開結下氣行水消痰治驚悸祛痞堅除寒熱散風濕開胃氣止嘔逆除噎氣故肺中伏飲寒嗽宜之仲景治傷寒汗下後心下痞堅噎氣不除有旋覆代赭石湯全匱半產漏下有旋覆花湯胡洽治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花湯皆取其能下氣也但性專溫散故陰虛勞嗽風熱燥欬不可誤用用之嗽必愈甚本經言補中下氣者甘能緩中鹹能潤下痰氣下而中氣安腸下滿結寒熱驚悸水氣皆除矣

青箱即雜冠花 苦微寒無毒 本經主邪氣皮膚中熱風癢身癢殺三蟲子治唇口青 發明 青箱子治

風熱目疾與決明子同功本經雖不言治目疾而主唇口青為足厥陰經藥其明目之功可推其治風癢

身癢皮膚中熱以能散厥陰經中血脈之風熱也

紅藍花即紅花 辛溫無毒 發明 血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脈

通婦人經水活血解毒散赤腫產後血暈及胎死腹中並宜和童便服之少則養血多則行血過用使

人血行不止且性兼上行不可不知亦主蠱毒下血堪作胭脂治小兒疳耳解疔毒腫產後血悶以紅

花十斤煮湯盛桶置於橫格之下昇婦寢上薰之湯冷再加半日乃錄

臙脂 甘平無毒臙脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成一種以山燕脂花汁染粉而成一種以山

榴花汁作成者一種以紫釰汁染綿而成皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉而成可作面脂不

入藥用紫釰查名火漆匠工補水用之 發明 臙脂色紅並可為活血之藥其治痘瘡肌肉結硬用綿

臙脂同紫釰煎湯乘熱頻將臙脂擦之漸軟即能發出又痘瘡護眼黃柏膏用油臙脂調塗則痘無入眼

之患

大薊小薊 花甘溫根微涼無毒 發明 大薊小薊皆能破血大薊根生女子赤白沃下止吐血鼻衄

涼而能行行而帶補兼療癰腫小薊根專於破血不能消腫有破宿生新之功吐血血崩之用但其力微

只可退熱不似大薊能破瘀散毒也丹方治吐血不止用小薊山查生地一服即止止中寓瀉劫劑中之

良法近世醫師咸用其花總取散血之義然其性皆下行故脾胃虛弱泄瀉少食者忌用

續斷本經名屬折別錄各接骨 苦微溫無毒去根尾酒炒用 本經主傷中補不足金瘡癰瘍折跌續筋骨婦人乳

難久服益氣力 發明 續斷入肝主續筋骨為婦人胎產崩漏之良藥又主帶脈為病久服益氣力利

關節治腰痛煖子宮療金瘡折傷散癰腫瘀血療婦人乳難 本經治傷中補不足等病總取和血通經之

義又能止小便多治遺泄古方血刺用平胃散一兩續斷三錢為末每服三錢水煎服即愈寓無顧名思

義之實子

漏蘆本經名 苦鹹寒有毒 本經主皮膚熱毒惡瘡疽痔漏瘰下乳汁 發明 漏蘆苦寒解毒乃足

陽明經藥本經治熱毒惡瘡下乳汁以其能利數也為消毒排膿殺蟲要藥古方治癰疽發背以漏蘆湯

為首稱蓋鹹能軟堅寒能解毒故服之必大便作瀉使邪從下而出也昔人治癰疽瘡毒令母服此使藥

性從乳中過之每致乳子利下白沫大損元氣故氣虛及瘡瘍不起發者咸非所宜而妊婦尤為切禁

苧麻黃麻 甘寒無毒 發明 苧麻苦行滯血產婦枕之治血暈產後腹痛以苧安腹上即止清苧水

療熱渴苧根治小兒赤丹○其黃麻苦溫專散陳久瘀血取陳年者燒灰存性酒調服之絡麻根燒灰治

鎖喉風神效

胡蘆巴 苦大溫無毒 發明 胡蘆巴乃海外胡蘿蔔子聲音相近之謠耳右腎命門藥也元陽不足

冷氣潛伏不得歸元者宜之小腸奔豚偏墜及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡蘆巴丸腎氣不

歸上熱下寒厥逆嘔吐者用黑錫丹皆與金鈴子一寒一熱同用其導火歸元之功可知

惡實又名鼠黏子牛蒡子大力子皆別名也 辛平無毒 發明 鼠黏子肺經藥也治風濕癰疹咽喉風熱散諸腫瘡瘍

之毒痘疹之仙藥也痘不起發用此為末刺雄雞冠血和酒釀調胡荽湯下神效瘡瘍毒盛生研用之即

出瘡頭酒炒上行能通十二經去皮膚風消癰疹毒惟氣虛色白大便秘者不宜

蒼耳古名 實甘溫葉苦辛小毒酒浸炒用忌猪肉 發明 蒼耳治頭風腦痛風濕周痹四肢拘攣惡

肉死肌皮膚瘙癢脚膝寒痛久服亦能益氣其葉久服去風濕有效服蒼耳人最忌猪肉及風邪觸犯則遍身發出赤丹也婦人血風攻腦頭旋悶絕忽倒不知人事者用蒼耳草嫩心陰乾為末酒服其效此味善通頂門連腦能走督脈也

天名精本經名蝦蟆蓋一名地菘子名龍蟲 甘寒無毒 本經主瘀血血瘕欲死下血止血利小便 發明 天名精功

專散血有破宿生新之功故本經言下血止血又能涌吐風痰殺蟲解毒搗汁服之能止痰瘧救之止牙

疼搗之敷蛇傷煎服除淫穢邪毒從小便泄出凡乳蛾喉龍腫痛及小兒急慢驚風牙關緊急不省人事

者搗絞和酒灌之咽喉腫塞痰涎壅滯搗汁鵝翎掃入去痰之效亦治猪瘟

鶴蝮 苦平無毒 發明 鶴蝮入厥陰肝經善調逆氣能治一身痰凝氣滯殺蟲方中最要藥錄驗方

療蛇攻心痛一味丸服小兒蟲痛亦單用鶴蝮研末肥肉汁服其蟲自下藥肆每以胡蘆藟子代充不可

不辭

蕪荻 辛苦寒小毒採葉陰乾入甑中層層灑酒與蜜九蒸九曬用 發明 蕪荻苦寒略兼微辛故有

小毒為祛風除濕而兼活血之要藥蕪荻丸治風濕四肢麻痺骨節冷痛腰膝無力其效但脾胃兩虛陰

血不足而腰膝無力骨痛麻痺者大非所宜時珍曰生搗汁服則令人吐故云有小毒九蒸九曬則去風

痺故云無毒或云其益元氣不稽之言也生者搗服能吐風痰其能傷胃可知

箬 甘寒無毒 發明 箬生小竹而葉最大故可以之為笠燒灰治吐衄嘔咯及便溺諸血又能通小

便利肺氣散喉痹消癰腫每服不過一錢匕又治痘瘡倒靨以箬葉灰一錢匕入麝香酒調服之乾箬葉

煎湯治胃熱呃逆其性較柿蒂稍平取灰以香油調塗湯火傷甚良

蘆根筍名蘆蘆筍名葦蘆花名蓬蘆 甘寒無毒 發明 蘆根甘寒主消渴胃中客熱利小便治噎噎反胃嘔逆不下

食妊娘心熱時疫寒熱煩悶解河豚諸魚毒其筍尤良 蘆蘆治臍下堅癖小便不利○葦蘆中空專於

利竅善治肺癰吐膿血臭痰千金葦蘆湯以之為君服之熱毒從小便泄去最捷蘆花煮汁治乾霍亂心

腹脹痛若燒存性治吐衄諸血

甘蕉即芭蕉 甘大寒無毒 發明 甘蕉性寒治天行狂熱解消渴煩悶利小便治濕熱黃瘧和酒脈瘰

癰腫并以滓塗腫處良小兒遊風卧蕉葉上即愈治火燙以筋插入出筋瓶盛取油塗之別錄治癰疽結

熱肘後治發背腫毒聖惠治血淋瀉痛蘇頌治風痲欲飲之取吐效惟陰疽不赤腫者禁用

藜荷即芭蕉之
色白者 辛溫有小毒忌鐵 發明 藜荷有毒而能攻毒為主盡之最中盡者服藜荷汁并卧

葉上即能呼出盡主姓名其治喉舌瘡爛婦人月閉及傷寒時氣壯熱頭痛口瘡用之皆取其辛散也

麻黃 苦溫無毒去根節湯泡去沫曬乾用若連根節用令人汗不絕其根專能止汗 本經主中風傷

寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止效逆上氣除寒熱破癥堅積聚 發明 麻黃微苦而溫中空而浮

陽也升也入足太陽其經循背下行本屬寒水而又受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄其實若過

發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣禍患莫測麻黃治衛實之藥桂枝

治衛虛之藥二物雖為太陽經藥其實營衛藥也心主營血肺上衛氣故麻黃為手太陽肺經之劑桂枝

為手少陰心經之劑傷寒傷風而效嗽用麻黃湯桂枝湯即湯液之源也麻黃乃肺經之專藥故治肺病

多用之仲景治傷寒無汗用麻黃湯有汗用桂枝湯夫津液為汗汗即血也在營即為血在衛即為汗寒

傷營營血不能外通於衛衛氣閉固故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣不能內護於營營氣不固故有汗

發熱而惡風是證雖屬太陽而肺實受邪氣蓋皮毛外閉邪熱內攻肺氣拂鬱故用麻黃甘草同桂枝引

出營分之邪達之於表佐以杏仁泄肺而利氣是麻黃湯雖太陽發汗重劑實為發散肺經邪鬱之藥也

腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾

佐以芍藥泄水而固脾皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也又少陰證發

熱脈沉有麻黃附子細辛湯少陰與太陽為表裏所謂熱附配麻黃補中有發也本經治中風是主緩風

難疾而言云溫瘧係濕瘧乃傳寫之誤破癥堅積聚者表裏兼治非神而明之難效其法也

木賊 甘微苦無毒去節用 發明 木賊與麻黃同形同性故能發汗解肌升散火鬱風濕專主眼目風熱暴瞽止淚取發散肝肺風邪也多用令人目腫若久醫及血虛者非所宜傷暑或暴怒赤腫亦勿用之。

石龍芻 一名龍鬚 即席草 苦微寒無毒 本經主心腹邪氣小便利淋閉風濕鬼疰 發明 龍芻生水中

性專利水本經所主心腹邪氣亦是因水濕瀦積所致其散席治淋及小便不通昔人用以煮服莫若燒灰酒服更良。

燈心草 甘寒無毒欲入丸劑粳米飲漿磨之 發明 燈心輕虛甘淡故能瀉肺利水治急喉痺燒灰

吹之又燒灰塗乳上飼小兒止夜啼燒灰入輕粉麝香治陰疳。

生地黃 本經名地髓 又名羊音戶 甘苦寒無毒禁犯鐵忌菜菔諸血採得鮮者即用為生地黃又焙乾收者為乾地黃以法制過者為熟地黃 本經主傷中逐血痹填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚瘵折跌傷筋久服輕

身不老生者尤良 發明 生地黃性稟至陰功專散血入手足少陰厥陰兼行足太陰手太陽錢仲陽

導赤散與木通同用瀉丙丁之火別錄治婦人崩中血不止及產後血上薄心胎動下血鼻衄吐血皆搗

汁飲之以其能散血消痰解煩也其治跌撲損傷面目青腫以生地黃搗爛卷之即消此即本經治傷中

血痹折跌筋傷等證之義蓋肝藏血而主筋肝無留滯則營血調而傷中自愈筋無邪者則三氣通而血

痹自除作湯除寒熱積聚者血和則結散而諸證平矣其曰填骨髓長肌肉者邪無者而形神自復也昔

人治心痛以鮮地黃汁作冷淘食之取吐不吐則利出長蟲如辟宮而安此即本經除寒熱積聚之驗其

於服食方中用之取以輔助諸藥辟除三蟲使從幽門化出也因思千金靈飛散中生地黃急不可得鮮

者咸取乾者應用乃知本經末後續出生者尤良一語見古聖之苦心無所不用其極也愚按生地黃與

乾地黃功用不同豈可混論按徐之才別錄云生地黃乃新掘之鮮者為散血之專藥觀本經主治皆指

鮮者而言祇緣諸家本草從未明言且產處遠遠藥肆僅有乾者鮮者絕不可得是不能無混用之失昌

鮮者而

知乾地黄既經炙焙力能止血安有傷中血痺折跌筋傷等治乎。至於傷中日久積聚內形寒熱外顯並宜鮮者作湯統領他藥其裏破宿生新之功設混用乾者則於傷愈結安望其有髓充肉長之勳乎。予嘗綜覽諸方凡藥之未經火者性皆行散已經炙焙性皆守中不獨地黄為然也。

乾地黄 苦微甘寒無毒。產懷慶者丁頭鼠尾皮粗質堅每株重七八錢者力優產亳州者頭尾俱粗皮細質柔形雖長大而力薄產江浙者細軟無力僅可清熱不入補劑無問產於何地但枯槁質輕者謂之

天黃不堪入湯藥。發明 乾地黄心茶通心中黃入脾皮黑歸腎味厚氣薄內專涼血滋陰外潤皮膚

索澤病人而有熱虛者宜加用之。戴元禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰位日漸煎熬陰虛火旺之證宜

生地黃以滋陰退陽同人參茯苓石蜜名瑤玉膏治虛勞咳嗽吐血同大麥門冬。熟地人參名固本丸治

老人精血枯槁於固本丸中加枸杞熬膏名集靈膏治虛羸喘嗽乏力其瑤玉膏雖用鮮者搗汁桑火熬

膏散中寓止與乾者無異固本丸集靈膏並用乾者而集靈變丸作膏較之固本差勝易簡方曰男子多

陰虛宜熟地黃女子多血熱宜生地黃虞搏云生地黃涼血而胃氣弱者恐妨食熟地黃補血而疾飲多

者恐泥膈或言生地黃酒炒則不妨胃熟地黃薑制則不泥膈然須詳病人元氣病氣之淺深而用之若

產後惡食泄瀉小腹結痛虛勞脾胃薄弱大便不實胸腹多痰氣道不利升降室塞者咸須遠之。浙產者

專於涼血潤燥病人元氣本虧因熱邪閉結而舌乾焦黑大小便秘不勝攻下者用此於清熱藥中通其

秘結最妙以其有潤燥之功而無滋潤之患也。愚按本經地黃雖列上品而實性稟陰柔與鄉愿不異譬

諸宵人內藏隱隙外示優容是以舉世名家靡不藉為滋陰上藥止血神丹雖或用非其宜得以稍清旺

氣服之仍得暫安非若人參之性稟陽明象類君子苟有過人皆知之是以師家斂手不敢用病家絀口

不敢嘗直至瀕危不得已而用之每至下咽即斃是以左右之人靡不交口歸咎於人參曷知其為從前

誤藥所致夫藥之道患於病比比有之莫如地黃門冬之屬陰柔最甚至死不覺其非故不憚瑣屑特表

而出之

熱地黄 甘溫無毒製地黄法擇取原株重六七錢者以好酒浸入縮砂仁末拌木甃瓦鍋九蒸九曬得
太陽真火入劑方始得力。蓋地黄性泥得砂仁之香竄而通調五藏沖和之氣歸宿丹田也。發明 熟
地黃假火力蒸曬轉苦為甘。為陰中之陽故能補腎中元氣必須蒸曬多次得太陽真火。確有坎離交濟
之妙用若但煮熟不加蒸曬雖服美益好古曰。生地黄治心熱手心熱益腎水涼心火其脈洪實者宜之
若脈虛者則宜熟地黄。錢氏六味丸以之為君天一所生之源也。若命門真火素弱者必須崔氏八味丸
得桂附共襄之力。方得陰陽兼濟之功湯液四物湯以之為主乙癸同源之治也。其功專於填骨髓長肌
肉生精血補五藏內傷不足。通血脈利耳目。黑鬚髮。男子五勞七傷女子傷中胞漏下血經候不調胎產
百病滋腎水真陰療臍腹急痛病後腰股痠痛坐而欲起目眩眩如無所見。蓋臍下痛屬腎藏精傷。腰股
痠係下元不足。目眩眩如無所見。乃水虧不能鑿物皆腎所主之病。非熟地黄不除。今人治目腎內障往
往用六味丸配磁硃丸服。良非所宜。地黄禁鐵磁為鐵之母。安得不忘。予嘗用當歸代地黃借其辛溫以
助煥發之勢。火盛則用芍藥代山茱萸借其酸寒以收耗散之陰。藥雖異而功不殊也。愚按地黃本手少
陰經藥功專清熱散血非經蒸曝不能入。少陰經得水火既濟之功轉苦成甘。變紫為黑。故直入腎藏
填補真陰。兼培黃庭后土。土厚載物。諸藏皆受其蔭。是以崔氏八味錢氏六味為培養真陰真陽之總司
後人藉此各隨所稟之偏而為增減。無往非受其益。如陰氣不固則加膠膠。羨慕陽氣不充則加鹿茸河
車。中氣不舒則加沉香縮砂。下氣不吸則加牛膝車前。上氣不津則加門冬五味。肝氣內盛則減黃倍澤
精氣下脫則減澤倍黃。各得補偏救弊之妙用。其陰火旺者。如知柏於六味方中。此與鴉酒止渴無異。他
如四物湯中之芍歸。即六味丸中山茱之義。十全大補中之耆桂。即八味丸中桂附之義。方得陰陽相濟
之妙用。須知八味十全。平調血氣。且湯液性味易過。地黃與參並用。略無妨礙。六味丸中。切不可雜一味
中焦藥。如人參白朮甘草之類。咸非所宜。昔人有以六味丸加參而服。下咽少頃。輒作迷迷不爽。或令增
麥冬五味功力倍常。深得金水相生之妙用。非專工藥性者之可與討論也。

牛膝本經名 苦酸平無毒懷產者長而無傍鬚水道滲者宜之川產者細而微黑精氣不固者宜之

忌牛肉 本經主寒濕痿痹四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎 發明 牛膝氣薄味厚

性沉降泄乃足厥陰之藥本經專主寒濕痿痹四肢拘攣等病不及補養下元之功豈聖法有所未盡歟

丹溪言牛膝能引諸藥下行筋骨痛風在下者宜加用之其性雖下行走筋然滑利之品精氣不固者終

非所宜得酒蒸則能養筋生用則去惡血其治腰膝痛不可屈伸足痿之病非取其養血營筋之力歟其

治癰腫惡瘡金瘡折傷尿血淋痛婦人經秘不通非取其活血破瘀之力歟外臺以生牛膝一味煎治

積久勞瘵肘後以二斤浸酒治卒暴癱疾延年以之同葵子煎服下胞衣衛生以之搗卷折傷梅師以之

搗塗金瘡千金以之搗敷毒腫集驗以之通利溺閉皆取其性滑利數消血解毒之功雖強陰強筋而氣

虛下陷大便易泄夢泄遺精狂娠崩漏俱禁用惟川者氣味形質與續斷彷彿庶無精滑之虞蓋腎司閉

藏肝司疎泄此味專司疎泄而無固熱之功世俗妄謂益腎而培養下元藥中往往用之與延益入室何

異 其土牛膝亦能解毒利數專治血鼓一味濃煎恣意服之又鎖喉風諸治不效以土牛膝和醋搗絞

取汁蘸雞翎探吐稠痰不過二三次神驗

紫苑白者名 苦辛微溫無毒或酒洗或蜜水炒用 本經主咳逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄安

五藏 女苑治風寒洗霍亂吐利腸鳴上下無常處驚癩寒熱百病 發明 紫苑肺經血分之藥本

經止咳逆上氣胸中寒熱結氣取性疏利肺經血氣也去蠱毒痿躄者以其辛苦微溫能散結降氣蠱毒

自不能留痿躄由肺熱葉焦紫苑專通肺氣使熱從洩便去耳別錄療欬唾膿血大明消痰止渴皆滋肺

經血氣之效金匱澤漆湯用以治欬而脈沉者欬屬肺脈沉則血分之病也亦治下刺肺痛與紫苑同功

其性辛而不燥潤而不寒補而不滯善調五勞體虛止欬定喘療驚悸吐衄諸血又能通調水道故溺瀉

便血單服一兩即效然大泄肺氣陰虛肺熱欬禁用以其性專溫散而無培養之力也 白者曰女苑

大泄肺氣本經主風寒洗洗霍亂洩利腸鳴上下無常處驚癩寒熱百病一皆氣分受傷之病肘後方治

人面黑令白方。用女苑三分。鉛丹一分。為末醋漿服。一乃圭。日進三服。十日大便黑。二十一日面白。便止。過用則太白矣。千金方用酒服。男十日。女二十日。黑色皆從大便去。三十歲後不可服。以肺氣漸減不可復洩也。

麥門冬本冬

甘寒無毒。去心用。即不煩心。

本經主心胸結氣。腹中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕

身。不老不饑。發明。麥門冬。陽中微陰。人心肺腎。及足陽明之經。定心熱。驚煩。瘵。肺痿。吐膿。蓋專泄而

不專收。寒多人禁。服肺中伏火。脈氣欲絕者。加五味子。人參。為生脈散。專補脈中元氣不足。東垣云。六七

月間。濕熱方盛。人病骨乏無力。身重氣短。頭旋眼黑。甚則痿軟。故孫真人以生脈散補其天元真氣。脈者

人之元氣也。人參之甘。溫瀉陰火。而益元氣。麥門冬之甘寒。滋燥金。而清水源。五味子之酸。鹹瀉內火。而補

庚金。兼益五藏之氣也。時珍曰。麥門冬。以地黃為使。服之令人頭不白。添精補髓。通腎氣。定喘促。令人肌

體滑澤。本經主心胸結氣。腹中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。一氣貫下。言因過飽傷胃。而致心胸氣結。脈絕

不通。羸瘦短氣。故宜以此滋其津液。通其肺胃。殊非開豁痰氣。消尅飲食之謂。其陰虛羸瘦。喘效上氣。失

音失血。及風熱暴嗽。咸非所宜。恐寒鬱熱邪。牢不可破。多成虛損之疾。麻疹效嗽。不可誤用。以其性寒助

陰。固斂陽邪。不能發越也。凡脾胃虛寒。泄瀉。及痘瘡虛寒。作瀉。產後血虛。瀉渴。皆非所宜。

萱草一名宜男

甘平無毒。發明。

萱性下走。入陰。故根治沙石淋。下水氣。及酒瘰。大熱衄血。搗酒服。

治吹乳腫痛。花治酒癰。利濕熱。其花起層者有毒。勿食。

淡竹葉。甘寒無毒。發明。淡竹。隱生嫩苗。葉綠花碧。根鬚結子。與竹絕然不同。性專淡滲。下降。故能

去煩熱。清心利小便。根能墮胎。催生。

冬葵子向日葵

甘寒滑無毒。

本經主五藏六府寒熱羸瘦。破五糴。利小便。發明。向日葵。質堅耐

寒。入冬不凋。故名冬葵。性滑利。數能治藏府寒熱羸瘦。破五淋。利小便。婦人乳房脹痛。同砂仁等分為末。

熱酒服三錢。其腫即消。孕婦難產不下。專取一味炒香。為末。苦歸湯下三錢。則易生。取晨暮轉動靈活。耳

夏子益奇疾方云有人手足忽長倒生肉刺如錐痛不可忍但食葵菜即愈亦取其寒滑利竅之用也
蜀葵 甘寒滑無毒 發明 葵以蜀中最勝種類最多其子入藥皆性滑利竅能潤氣血之燥千金稱
其除客熱利腸胃是言其漿也東垣取其花之白者治白帶赤者治赤帶隨其色而為所用破狗齧者食
之瘡永不瘥

秋葵子 甘寒滑無毒 發明 葵色種種惟花於秋者獨票金氣而色黃其子性專潤下治小便淋及
催生用之與向日葵不殊其花消癰腫浸油塗湯火傷其痛即止

龍葵 脚老稿 苦微甘滑寒無毒 發明 龍葵性滑如葵言苗葉也消熱散血墜丹石毒去婦人敗血

老鴉眼睛言其子也善能續筋消疔腫與苗葉不異根利小便與木通煎服効

酸漿 一名燈籠草 俗名掛金燈 苦寒無毒 本經主熱煩滿定志益氣利水道 發明 酸漿利濕除熱清肺治欬
化痰痰熱去而志定氣和矣又主咽喉腫痛蓋此草治熱痰欬佛耳草治寒痰欬故其主治各有專

司也

敗醬草 一名苦菜又名鹿腸 根作敗醬氣敗名 苦平無毒 本經主暴熱火瘡赤氣疥癬疽痔馬鞍熱氣 發明 敗醬
乃手陽明厥陰藥善除暴熱火瘡皆取苦寒散毒之用其治疽痔馬鞍熱氣以其性專下泄也金匱薑以

附子敗醬散治腸癰固結未潰故取薑以下達敗醬苦降附子開結而為熱因熱用之嚮道深得本經之
旨若膿成熱毒勢脹不可用也而婦人下部疽蝕方中亦恒用之近世醫師罕有識者惟徽人採取芩乾
曰苦芩菜惜乎不知治療之功用也

欬冬花 辛溫無毒紫莖有白絲者真蜜水拌微炒 本經主欬逆上氣善喘喉痹諸驚癰寒熱邪氣

發明 欬冬味辛入氣分色紫歸血分雖其性溫却不燥血故能輕揚上達觀本經主治一皆氣升火炎

之病古方用為溫肺治欬之要藥潤肺消痰止咳定喘喉痹喉瘡肺痿肺癰咸宜用之有人病欬多日或
令煎欬冬花三兩放無風處以管吸其烟嚥之數日果愈發夏失合陰虛勞欬禁用以其性溫也

鼠麴草即鼠耳草又名佛耳草 甘平無毒 發明 別錄鼠耳主寒痺寒熱欬嗽東垣佛耳治寒嗽及痰除肺中

寒大升肺氣日華云大抵寒嗽多是火鬱於內寒覆於外故佛耳欬久為之必用宣明透膈散治寒鬱肺

絡之嗽用佛耳欬冬鍾乳雄黃為末並於爐中燒以筒吸烟蒸下有涎即吐去屢效

決明子 鹹平無毒別錄云苦甘微寒無毒炒研用 本經主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出久服益

精光輕身 發明 相感志言園中種決明蛇不敢入丹溪言決明解蛇毒本此入藥明目 本經治青盲

目淫眼赤淚出取其苦寒清熱也以水調末塗腫毒貼心止鼻衄貼太陽穴治頭疼作枕治頭風別錄療

口青是主肝經畜熱之驗也不宜久服久服令人患風伐肝搜風太過反招風熱也本經言久服益精光

輕身是指目疾人肝熱內滯者而言若肝虛血弱者過用虛風內擾在所必致耳

地膚子一名落蒂又名黃蒿 甘寒無毒 本經主膀胱熱利小便補中益氣久服耳目聰明輕身不老 發明

眾病皆起於虛虛而多熱則小便不利精氣日燔故本經主以清利膀胱邪熱中氣自復耳目聰明矣其

能祛熱利小便去陰火治客熱丹腫葉主老人夏秋間熱淋用此搗自然汁服之即通男子白濁用地膚

子白斂為丸滾湯下婦人白帶地膚子為末熱酒服之屢效○苗葉燒灰煎霜制砒石粉霜水銀硫黃雄

黃礪砂毒

瞿麥家種者曰洛陽 苦寒無毒 本經主關格諸癥結小便不通出刺決癰腫明目去醫破胎墮子下閉血

發明 瞿麥利小便為君主之用故本經專主關格諸癥結小便不通金匱方治小便不利有水氣其人

苦渴者用栝萸瞿麥丸古方通心經利小腸為最要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而

小腸別作病矣以其降泄太過也本經又言出刺取鮮者搗塗竹木刺也破胎墮子下閉血皆利數所致

故妊娠產後小水不利及脾虛水腫禁用以性專泄氣也

王不留行即剪金花俗名金盞銀臺 苦甘平無毒 發明 王不留行專行血分乃陽明厥陰衝任之藥能通乳利

竅其性走而不守故妊婦禁服一婦患淋臥久用此煎服再劑而愈其利小便出竹木刺與瞿麥同功

葶藶 辛苦寒小毒酒淨焙用療實水滿急生用 本經主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水

道 發明 葶藶苦寒不減硝黃專泄肺中之氣亦入手陽明足太陽故仲景瀉肺湯用之肺氣壅塞則

膀胱之氣化不通登之水注上竅閉則下竅不通水濕泛溢為喘滿為腫脹為積聚種種諸病生矣平能

散苦能泄大寒沉降能下行逐水故能療本經諸病亦能泄大便為其體輕性沉降引領肺氣下走大腸

又主肺癰喘逆痰氣結聚通身水氣脾胃虛者宜遠之大戟去水葶藶愈脹用之不節反乃成病葶藶有

甘苦二種緩急不同大抵甜者下泄性緩雖泄肺而不傷胃苦者下泄之性急既泄肺而復傷胃故以大

棗輔之然肺之水氣贖滿急者非此不能除但水去則止不可過劑金匱方云葶藶傳頭瘡藥氣入腦殺

人 車前子 甘鹹寒無毒酒浸焙用 本經主氣癰止痛利水道除濕痺久服輕身耐老 發明 車前子

入足太陽少陰能利小便而不走氣與茯苓同功本經治氣癰止痛通腎氣也小便利則濕去濕去則痺

除別錄治女子淋瀝等病專取清熱利竅之功也男女陰中有二竅一竅通精一竅通水二竅不兼開水

竅得氣化乃出精竅得火動乃泄車前專通氣化行水道疏利膀胱濕熱不致擾動真火而精氣寧謐矣

故凡瀉利暴下病小便不利而痛者用車前子為末米飲服二錢利水道分清濁而穀藏止矣又治目疾

水輪不清取其降火而不傷腎也時珍用以導小腸熱止暑濕瀉取甘平潤下之用耳陽氣下陷腎氣虛

脫人勿服 其葉搗汁溫服療火盛泄精甚驗若虛滑精氣不固者禁用

馬鞭草 一名龍牙草 苦微寒無毒 發明 馬鞭草色赤入肝經血分故治婦人血氣腹脹月經不勻通經

散瘀治金瘡行血活血生搗汁飲治喉痹腫又搗敷治下部蠱瘡及蠅蝮尿男子陰腫惟陰血虛而胃

弱者勿服

光明草 即狗尾草 發明 眼赤拳毛倒睫者翻轉目眦以一二莖蘸水裏去惡血甚良

鱧腸草 一名金陵草 甘酸平無毒 發明 鱧腸草腎經血分藥爰瘡發決血不可止者傅之立已汁

塗眉髮生速而繁皆益腎養血之驗故烏鬚髮方用之千金方有金陵煎能益髭鬚變白為黑也單用煎膏治大便下血腎主二便但脾胃虛大便易瀉者勿服

連翹 苦平無毒根名連軛甘寒平小毒 本經主寒熱鼠瘻癰腫惡瘡癰疽結熱蠱毒 發明

連翹輕清而浮本乎少陰厥陰氣分藥瀉心經客熱破血結散氣聚消腫毒利小便諸痛癢瘡皆屬心火

連翹瀉心為瘡家聖藥十二經瘡藥中不可無此乃結者散之之義本經專主寒熱鼠瘻癰腫癰疽結熱

等病皆由足少陽膽經氣鬱而成此藥正清膽經鬱熱癰疽惡瘡無非營衛壅遏得清涼以散之蠱毒所

結得辛香以解之然苦寒之性僅可以治熱腫故癰疽潰後膿清色淡及胃弱食少者禁用○根寒降專

下熱氣治濕熱發黃濕熱去而面悅好眼目明矣仲景治瘧熱在裏發黃麻黃連軛赤小豆湯主之奈何

世鮮知此如無根以實代之

陸英 一名蒴藋又一名樓骨草 苦寒無毒 本經主骨間諸痺四肢拘攣痠疼膝寒痛陰痿短氣不足脚腫 發明

陶蘇本草甄權藥性皆言陸英即蒴藋田野村墟甚多人家所植高大色赤者是陸英田野所出不紅葉

上有粉者是蒴藋二味所主大率相類外臺千金方多用之世以其賤而全置不講也

藍實 大青 小青 苦寒無毒 有二種大者曰大青苗高如蓼小者曰小青葉光如景天 向編在麻後今併此

本經解諸毒殺蠱蛟 同 疰鬼螫毒 發明 本經取用藍實乃大青之子是即所謂蓂藍也性寒至陰其

味苦寒故能入肝本經取治蠱疰諸毒專於清解溫熱諸邪也陽毒發斑咽痛必用之藥而蓂葉性味不

異主治皆同日華子治天行熱狂疔腫風疹朱肱治發斑咽痛有犀角大青湯大青四物湯皆取其葉以

治溫熱毒盛發斑之藥非正傷寒藥也蓋大青瀉肝膽之實火止以祛心胃之邪熱所以小兒疳熱丹毒

為要藥○小青搗敷腫痛甚效治血刺腹痛殺百藥毒解狼毒射罔斑蝥砒石等毒千金以藍葉搗汁治

腹中蠱瘕夏子由奇疾方用板藍汁治腹內應聲蟲陳實功以藍同貝母搗敷人面瘡皆取苦寒以散蠱

結之熱毒也○藍澱以藍浸地坑一宿入石灰攪澄去水為澱其解諸毒俱熱瘡之用則一而殺毒之功

更效。蟲為下膈，非此不除。令人以染缸水治噎膈，皆取其殺蟲也。

青黛一名藍 鹹寒無毒。發明。青黛乃藍澱浮沫攪澄掠出收乾，瀉肝膽散鬱火，治溫毒發斑及產後

熱利下重，千金藍青丸用之。天行寒熱頭痛，水研服之。與藍同類，而止血拔毒殺蟲之功，似勝於藍。又治

噎膈之疾，取其化蟲之力也。和溺白堊冰片吹口疳，最效。

葇子生水考者曰水 藥俗名葇草 鹹微溫無毒。本經明目，溫中耐風寒。下水氣，療面浮腫癰瘍。發明。葇實治

消渴去熱及瘰癧癖痞，腹脹皆取其散熱消積之功。即本經下水氣面浮腫癰瘍之用。其葇草子專治痞

積，鴉鵒丸用之。葇葉治大小腸邪氣。黃帝云：葇食過多，毒發痛，婦人月事來不可食葇。及葇善為血淋

帶下。扁鵲云：葇食之令人寒熱損骨髓，殺丈夫陰氣。

菡蓄 苦平無毒。本經主浸淫疥癬疽痔，殺三蟲。發明。菡蓄利水散濕熱，治黃瘡、霍亂、療小兒魘

病。女子陰蝕，本經專主浸淫疥癬疽痔。所主皆濕熱之病。三蟲亦濕熱所化也。

白蒺藜 苦辛溫無毒，酒浸焙焦去刺研用。本經主惡血破癥結積聚，喉痺乳難。久服長肌肉，明日輕

身。發明。白蒺藜性升而散入肝腎經，為治風明目要藥。風入少陰厥陰經者為嚮導。目病為風木之

邪，風盛則目病。風去則目明矣。本經專破惡血積聚，治喉痺乳難，以苦能泄，溫能宣，辛能潤也。此言刺蒺

藜之功用耳。久服長肌肉，明目輕身，以其入腎益精氣也。此則專主沙苑蒺藜而言。且治痰消癰腫，搜腎

藏風氣，又須刺者為破敵之先鋒。千金方治白澱風，以一味為末，湯服二錢，日二服，服至半月，白處見紅

點，至一月效。

沙苑蒺藜 甘溫無毒。產沙苑者，色微黑而形似羊腎。若色微綠，雖產秦中，非沙苑也。酒蒸搗用。藥肆中

以一種野田開紅花之土蒺藜偽充，咬之亦生豆氣，但缺處有尖鉤稍異耳。發明。沙苑蒺藜產於潼

關，得漠北之氣性降而補益腎治腰痛，為世精虛勞要藥。最能固精，故聚精丸用此佐鰾膠。天有殊功，以

之點湯代茶，亦甚甘美，益人。但腎與膀胱偏熱者禁用，以其性溫助火也。

穀精草 辛溫無毒 發明 穀精草性體輕浮能入陽明分野治目中諸痛甚良而去星尤為專藥明目退翳之功在菊花之上痘後生翳亦用之此草克性喜食故目疾家專用與望月砂功用不殊

海金沙 甘寒無毒 市鋪每以沙土雜入須淘淨取浮者曝乾燃之不沾指者真 發明 海金沙生於葉上小腸膀胱血分藥也熱伏二經血分者宜之故小便熱淋莖痛為要藥腎藏真陽不足者忌用

地椒 一名水楊梅生水邊條葉叢生似 辛溫無毒 發明 地椒制丹砂粉霜見庚辛玉冊總目名水

楊梅時珍王治疔瘡腫毒

半邊蓮 辛平無毒 發明 半邊蓮小草也生陰濕墜邊就地細梗引蔓節節生細葉秋開小花淡

紅紫色止有半邊如蓮花狀故名專治蛇傷搗汁飲以渣圍之

地丁 苦辛寒無毒 發明 地丁有紫花白花二種治疔腫惡瘡兼療癰疽發背無名腫毒其花紫者

莖白者莖紫故可通治疔腫或云隨疔腫之色而用之但漫腫無頭不赤不腫者禁用以其性寒不利

陰疽也

見腫消 酸澆微毒 發明 見腫消專消癰腫及狗咬搗葉貼之傷寒餘毒發於耳前後用此一握同

白及白欒 大黃大蘗芋根共搗成餅入芒硝一錢白蜜少許和貼留頭乾即易之

毒草部

大黃 本經名黃良一名將軍 苦寒無毒 產川中者色如錦紋而潤者良若峻用攻下生用邪氣在上必用酒浸上

引而驅熱下行破瘀血非汁製虛勞吐血內有瘀積非汁拌炒黑用之大腸風秘燥結兒莖綠蘗酒製又

尿桶中浸過能散瘀血兼行滲道妊娠產後慎勿輕用實熱內結勢不可緩酒蒸用之凡服大黃下藥須

與穀氣相遠得穀氣則不行矣 本經下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通

利水穀調中化食安和五藏 發明 大黃氣味俱厚沉降純陰乃脾胃大腸肝與三焦血分之藥凡病

在五經血分者宜之若在氣分者用之是誅伐無過矣其功專於行瘀血導血閉通積滯破癥瘕消實熱

瀉痞滿潤燥結數腫毒總賴推陳致新之功本經與元素皆謂去留飲宿食者以宿食留滯中宮久而發熱故用苦寒化熱宿食亦乘勢而下後世不察以為大黃槩能消食謬矣蓋胃性喜溫惡濕溫之則宿食融化寒之則壅滯不消以其能蕩滌腸胃食積得以推蕩然後穀氣通利中氣調暢飲食輸化五藏安和矣若食在上脘雖經發熱只須枳實黃連以消痞熱宿食自通若誤用大黃推蕩不下反致結滯不消為害不淺如瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃包絡肝脾之邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四經血中伏火也仲景治心下痞滿按之濡者用大黃黃連瀉心湯此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也若心下痞而復惡寒汗出者其人陽氣本虛加附子以溫散之病發於陰而反下之因作痞乃痰實與邪氣乘虛結於心下故曰瀉心實瀉脾也病發於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入陰分而結於膈上仲景大陷胃湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣若病本陽邪或兼停食而攻發太過正氣消之實結不解擬欲攻之而正氣不能行其藥力則如人參於桃核承氣中以助硝黃之勢如陶氏黃龍湯之製乃先輩之成則也蓋大黃芒硝瀉腸胃之燥熱牽牛甘遂瀉腸胃之濕熱巴豆硫黃瀉腸胃之寒結各有定例至於老人血枯便秘氣虛便難脾虛腹脹少食婦人血枯經閉陰虛寒熱脾氣痞積腎虛動氣及陰疽色白不起等證不可妄用以取虛虛之禍

商陸一名當陸赤者性劣色白者良

辛寒有毒銅刀刮去皮水浸一宿或醋炒或黑豆拌蒸用其赤者服之傷人令人

見鬼同生水服殺人

本經主水腫疝瘕癰腫除癰腫殺鬼精物發明商陸苦寒傷脾其性下行利

水本經專主水腫疝瘕等疾與大戟甘遂異性同功胃氣虛弱者不可用腫滿小便不利者以赤根搗爛

入麝香三分貼於臍心以帛束之得小便利即腫消或以大蒜同白商陸煮汁服亦治腫疾仲景治大病

後腰以下腫壯蠅澤瀉散用之以其病後不堪受邪故用急迫以散之也然水腫因脾虛者若誤用之一

時雖效未幾再發決不可救

狼毒 苦辛寒大毒陳者良醋炒用出東魯泰山與防葵相類置水沉者為狼毒浮者即防葵也本經

主效逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠癩疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸發明 狼毒大毒非恒用之品本經治效逆上氣惟質實氣壯暴效者宜之又破積聚飲食寒熱水氣以其迅利也性能殺飛鳥走獸其治惡瘡疽蝕蠱毒所待言肘後方以狼毒二兩附子半兩治心腹連痛脹急加旋覆蜜丸日服三丸治腹中冷痛及兩脇氣結又為散擦惡瘡疥癬愚按狼毒與防葵同根但質有輕重之別雖本經主治不同一皆瞑眩之品功用亦不甚相遠今狼毒內有輕浮者即係防葵無疑但本經條下有堅骨髓益氣輕身之說其性善走散力能攻逐三蟲故有益氣輕身之功本經不言攻蟲而攻蟲之用與狼牙無異

狼牙

本經名牙子

苦辛寒有毒以其形似獸牙故名白者良中濕糜爛生衣者殺人本經主邪氣熱氣

疥癬惡瘍瘡疔去白蟲發明 狼牙較狼毒之性稍緩而所治亦相類金匱九痛丸用狼牙局方用狼

毒方用附子三兩狼牙人參吳茱萸黃乾薑各一兩巴霜一錢蜜丸梧子大日服二三丸治九種心痛並卒

中惡腹脹滿又連年積冷流注心胸痛及冷衝上氣落馬墜車血疾皆主之本經治邪氣熱氣去白蟲蓋

心痛多有屬蟲積者故前方用之亦治惡瘍瘡疔金匱外臺千金並以煎洗陰瘡蝕瘡搗汁治射工溪毒

肘後以之搗貼金瘡外臺以之蜜丸漿水服一丸治寸白蟲皆取殺蟲解毒之功也

防葵 辛寒有毒本經主心腹腸泄膀胱熱結溺不下效逆濕痞癩癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕

身發明 防葵辛寒性善走散能治心腹腸泄膀胱熱結等證而別錄又言療五藏虛氣小腹支滿臚

脹口乾除邪強志中有火者不可久服令人恍惚見鬼二說各有主見一以治濁邪支塞驚邪狂走故

須久服開除積垢自然髓充骨堅正氣自復一以療五藏虛氣腎邪逆滿故不可久服久服恐正氣愈虛

不能制五志之火引領痰濕上侮君主令人恍惚見鬼同一防葵而有治驚邪狂走與久服見鬼之不同

也嘗攷千金方防葵為治風虛通血脈之上藥每與參朮鍾乳石莖並用取其祛逐風虛通利血脈而正

氣得復腎志自強當無助火為虐之慮矣

蘭茹 辛寒有小毒折之汁出凝黑如漆故名漆頭蘭如色白者名草蘭茹 本經主疽蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐 發明 蘭茹本經治惡肉敗瘡等病而素問四烏鯁一蘆茹丸當非此蘭茹可治也聖惠治頭風旋眩千金治小兒癰疽並用漆頭蘭茹姚僧坦治癰疽去惡血有白蘭茹丸二者皆能散血其治善忘不寐亦是因風熱侵犯心包膽府所致散其風熱則無不寐善忘之患矣

大戟 苦辛大寒有毒反甘草入藥惟用正根誤服傍株令人冷瀉素煮則不損脾胃乘軟去骨用 本經

主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疫痛吐逆 發明 大戟性稟陰毒峻利首推苦寒下走腎陰

辛散上瀉肺氣兼橫行經脈故本經專治蠱毒十二水腹滿急痛等證皆濁陰填塞所致然惟暴脹為宜

云中風者是指風水膚脹而言否則傳寫之誤耳夫大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也痰涎之為物隨

氣升降無處不到入於心則迷竅而成癲癘妄言妄見入於肺則塞竅而成效唾稠粘喘急背冷入於肝

則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入於經絡則痺痺疼痛入於筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛三因方並以控涎丹主之大戟能泄藏府之水濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外之痰

氣惟善用者能收奇功也痘瘡變黑歸腎素變百祥丸用大戟製素去戟用素以瀉肝邪非瀉腎也實則

瀉其子因腎邪實而瀉其肝也仲景云心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣者十棗湯主之其中亦有大戟夫

乾嘔脇痛豈非肝膽之病乎百祥丸之瀉肝明矣至玉樞丹同續隨子山茨菇等解毒藥則又不獨肝

膽矣其脾胃肝腎虛寒陰水泛溢犯之立斃不可不審

澤漆 本經名 苦寒小毒別錄日華陶氏皆言是大戟苗綱目名猫兒眼睛草時珍云江湖源澤多有之

搗莖有白汁粘心故名 本經主皮膚大熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足 發明 澤漆利

水功類大戟遂誤以為大戟苗本經言利丈夫陰氣則與大戟不相侔也其治皮膚大熱面浮腹大等證

兼挾表熱而言其性與大戟亦相類也金匱澤漆湯方用澤漆生夏紫參白前甘草人參桂心生薑以治

肺欬上氣脉沉大明言止瘧疾消痰退熱肘後聖惠易簡伏瘕水腫脚氣皆用之

甘遂 苦甘大寒有毒麩裏煨熟用反甘草其根皮赤肉色白作連珠大如指頭質重不蛀者良赤皮者其性尤烈 本經主大腹心腹脹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水殺道 發明 甘遂色白味苦先升後降乃瀉水之峻藥本經治大腹心腹脹面目浮腫留飲宿食等病取其苦寒迅利疏通十二經攻堅破結直達水氣所結之處仲景大陷胸湯金匱甘草半夏湯用之但大瀉元氣且有不可輕用腎主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治痰之本也不可過服中病則止仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也肘後方治身面浮腫甘遂末二錢以雄猪腎一枚分七片入末拌勻濕紙裏煨令熟每日服一片至四五服當腹鳴小便利是其效也然水腫鼓脹類多脾陰不足土虛不能制水治當辛溫補脾實水兼利小便若誤用甘遂大戟商陸牽牛等味禍不旋踵而癩癩心風血邪甘遂二錢為末以猪心管血和藥入心內縛定濕紙裏煨熟取藥入辰砂末一錢分四圓每服一圓以猪心煎湯下大便利下惡物為效末下更服一圓凡水腫未全消者以甘遂末塗腹透臍令滿內服甘草湯其腫便去二物相反而感應如此塗腫毒如上法亦得散又治肥人卒然耳聾甘遂一枚綿裹塞耳中口嚼甘草耳卒然自通也

續隨子 鉅升 辛溫有毒去殼取色白者以紙包壓去油取霜用 發明 續隨子下氣最速然有毒損

人與大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相似其功長於利水解毒故玉樞丹用之服後瀉多以醋同粥食即止若脾虛便滑之人誤服必死黑子疣贅續隨子搗爛時塗之自落或以煮線繫癭根時時繫之漸脫

莨菪 一名天 子苦寒根苦辛有毒 本經主齒痛出蟲肉痺拘急多食令人狂走 發明 莨菪入癩

狂方用然皆用其子耳故言勿令子破破則令人發狂本經治肉痺蟲墜用其毒以攻治也千金治石癰

堅硬不作膿者莨菪子為末醋和傅瘡頭根即拔出打撲折傷羊脂調莨菪子末傅之○莨菪根主治與子不殊瘡疾不止莨菪根燒灰水服一錢匕即止惡癬有蟲莨菪根搗爛和蜜傅之惡刺傷人莨菪根水

煮汁浸冷即易之前頭不出此亦主之皆千金神方也狂犬咬人葭根根和鹽日三傳之外壹秘要方也今人用根治壹隔反胃取其性走以祛胃中留滯之邪壹隔得以暫開虛者誤服為害不測時珍云葭根若之功未見如所說而其毒有甚焉煮一二日尚能生芽其為物可知矣服葭若實防葵亦商陸皆令人狂惑見鬼者蓋此類皆稟陰毒能使疾迷心竅閉其神明以亂視聽故耳

蓖麻子

甘辛溫有毒去殼取仁白者良禁食炒豆犯之必脹

發明

蓖麻屬陰其性善收能追膿取

毒拔邪外出為外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞不剩骨膠血者用之時珍云蓖麻甘辛有毒氣味頗近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開通諸竅經絡治偏風失音口喎口目喎斜頭風七竅諸病不止於出有形之物也蓋鵜鷓油能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多用之偏風手足不舉同羊脂穿山甲麝香煎膏日摩漸止研塗瘰癧疔毒癰腫即消蓋能引毒外出耳一人病手臂結塊腫痛用蓖麻仁搗膏貼之即愈一人病氣鬱而偏頭痛用此同乳香食鹽搗數太陽其痛立止一婦產後子腸不收搗貼丹田即上此藥外用屢奏奇勳但不宜內服耳

常山恒山

苦辛溫有毒川產淡黃細實如雞骨者良醋炒則不吐人

本經主傷寒寒熱發溫瘧鬼

毒胸中痰結吐逆

發明

夫瘧有六經五藏痰濕食積風邪瘴疫須分陰陽虛實不可一槩論也常山

治瘧有劫痰截病之功須在發散表邪及提出陽分之後服之得宜生用多用則上行必吐若酒浸炒透則氣少緩稍用錢許亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利蓋無疫不作瘧常山專在驅逐痰水楊士贏云常山治瘧人皆薄之瘧家多畜痰涎黃水或停豬心下或結癖脇間乃生寒熱法當吐涎逐水常山豈容不用所以本經專主寒熱溫瘧痰結吐逆以瘧病多由傷寒寒熱或時氣溫疫而致痰水蓄聚心下也夫水在上焦則常山能吐之水在脇下則常山能破其滯而下其水但須行血藥佐之如桃仁蓬朮穿山甲之類具有純熱發瘧或蘊熱內實之證投以常山大便秘滴而下似世非世須用大黃為佐瀉利數行然後獲愈常山陰毒之草其性暴悍雖有破瘴逐飲之能然善損真氣所以仲景治瘧方中從無及此而

夏傷於暑秋必痰癘及瘧在三陰元氣虛寒人則常山穿山甲輩皆為之戟

蜀漆 苦辛溫有毒 本經主瘧及效逆寒熱腹中癥堅積聚邪氣蠱毒鬼疰 發明 蜀漆即常山之

苗故本經治瘧及效逆寒熱積聚蠱毒功效與之相類金匱治吐瘧獨寒不熱者有蜀漆散用蜀漆雲母

龍骨酢漿水服之溫瘧加蜀漆一錢用酸漿者取酸收以斂蜀漆之辛散也

藜蘆 辛苦寒有毒反五參服之吐不止者飲葱湯即止 本經主蠱毒咳逆世利腸澼頭瘍疥癢惡瘡

殺諸蠱毒去死肌 發明 藜蘆服錢匙則惡吐而本經治蠱毒效逆世利腸澼是指積氣內盛者而言

積去則效與利止矣又通頂令人噫按常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆則

吐風痰者也凡胸中有老痰或中蠱毒止可借其宣吐切勿沾口大損胃中津液也若效逆世利腸澼等

證苟非實邪壅滯慎勿輕試不可因本經之言而致惑也別錄治喉痺不通鼻中瘖肉並為散吹鼻孔效

附子 辛熱大毒反半夏瓜薑貝母白欬古方以一兩一枚者為力全近時專取大者為勝用鹽過多雖

一兩五六錢製熟不及七八錢且容易腐爛若欲久藏須同窻及入罐中置近火處庶可經久其性熱有

毒必正節角少頂細臍正者為上頂粗有節多鼠乳者次之傷缺偏縴者為下有兩岐者名烏喙此稟氣

不正端主大風頑痺附子生用則散陰寒熟用則助真元生用去皮臍熟用甘草童便制若欲久藏一味

甘草濃煎汁為汁盡為度入陽虛補劑用黃連甘草制凡中其毒生菜服汁及黃連解之近時烏附多產

陝西其質粗其皮厚其色白其肉鬆其味易行易過非若川附之色黑皮薄肉理緊細性味之辛而不烈

久而愈辣峻補命門真火也 本經主風寒效逆邪氣寒濕痿痺拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕

金瘡 發明 附子氣味俱厚而辛烈能通行十二經無所不至暖脾胃而通膈壅補命門而救陽虛除

心腹腰膝冷痛開肢體脾濕痿弱瘵傷寒呃逆不止主督脈脊強而厥救寒疝引痛欲死斂癰疽久潰不

收及小兒脾弱慢驚並須製熟用之附子為陰證要藥凡傷寒陰證厥逆直中三陰及中寒夾陰雖身熱

而脈沉細或浮虛無力者非此不治或厥冷腹痛脈沉細甚則唇青囊縮者急須生附以峻溫散之本經

治風寒咳逆當是陰寒喘逆亥豕之謬詳本經所主諸證皆陰寒之邪乘虛客犯所致其主金瘡者是傷
久氣血虛寒不能收斂非血出不止之金瘡也別錄又主腰脊風寒脚氣痿痺心腹冷痛等病總取溫經
散寒之力耳附子稟雄壯之質有斬關奪將之能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥
入血分以培養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風寒引溫暖藥達下焦以祛除在裏之冷
濕附子以白朮為佐乃除寒濕之聖藥然須並用生者方得開通經絡若氣虛熱甚宜少用熟附以行參
耆之力肥人多濕亦宜少加烏附行經附子得乾薑炙甘草名四逆湯主少陰經寒證得桂枝甘草薑棗
名桂枝附子湯治風濕相搏身體痠煩不能轉側得白朮甘草薑棗名朮附湯治風虛頭重眩極得麻黃
細辛名麻黃附子細辛湯治少陰病發熱脈沉得大黃芩連名附子瀉心湯治心下痞而惡寒汗出得大
黃細辛名大黃附子湯治脇下偏痛發熱脈弦緊得參朮芩芍名附子湯治少陰病始得之背惡寒得茯
苓白朮芍藥生薑名真武湯治少陰病腹痛小便不利四肢疼痛自利得乾薑蔥白名白通湯治少陰病
利下脈微若厥逆無脈乾嘔而煩面色赤加蔥白以通陽氣此皆得配合之神妙能起死回生於及掌間
生熟各隨本方趙嗣真云生附配乾薑補中有發熟附配麻黃發中有補宜生宜熟不出此中妙用也至
於崔氏八味丸用為少陰嚮導後世認為補藥誤矣東垣治陰盛格陽面赤目赤煩渴引飲脈來七八至
但按之即散者用乾薑附子湯加人參半斤服之得汗而愈時珍云陰寒在下虛陽在上治之以寒則陰
氣愈盛治之以熱則拒而不納熱藥冷服下咽之後冷性既消熱性便發病氣隨愈此熱因寒用之法也
附子性沉著溫脾逐寒烏頭性升發溫脾去風若寒疾即用附子風疾即用烏頭二藥俱走而不守故墮
胎為百藥長然妊娠脈弦發熱胎脹惡寒小腹如扇金匱用附子湯以安其胎此神聖之妙用也若傷寒
發熱頭痛皆除熱傳三陰而見厥逆脈沉此厥深熱深之候證必先發熱頭痛七八日或十餘日後而見
厥冷脈沉此為陽厥大便必不瀉而閉及溫疫熱伏厥逆與陰虛內熱火鬱於內而惡寒者誤用不旋踵
告變矣附子乃退陰回陽必用之藥近世疑而不用直待陰極陽竭而用已遲矣且夾陰頭痛足冷上熱

下寒陰邪內盛陽氣外衰急需人參健脈以益其原佐以附子溫經散寒捨此不用將何救之

川烏頭 辛熱有毒。祛風藥。同細辛黑豆煮。入活絡藥。同甘草炮製。按烏頭乃附子之母。春生新附即

採其母。諸家本草未嘗發明。但云春採者為烏頭。故舉世誤認烏頭為春時取附子之小者。往往以側子

代用。誤人多矣。反半夏 發明 烏頭得春升之氣。故治風為嚮導。主中風惡風。半身不遂。風寒濕痺。心

腹冷痛。肩髀痛。不可俛仰。及陰疽久不潰者。潰久瘡寒。方肉不斂者。並宜少加。以通血脈。惟在用之得宜。

小兒慢驚。搐搦。涎壅。厥逆。生川烏全蠍。如生薑煎服。效。其烏附之尖為末。茶清服。半錢。吐癩癩風痰。取其

銳氣。從下焦直達病所。借茶清涌之而出也。夫藥之相反者。以烏頭半夏為最。而金匱赤丸及普濟方俱

二味同用。非妙達聖義者。難以語此。

天雄 辛溫大毒。即附子之獨顆無附。大倍附子者。制法與附子同。本經主大風寒濕痺。歷節痛拘攣。

緩急。破積聚。邪氣。金瘡。強骨髓。輕身健行。發明 天雄票純陽之性。補命門三焦。壯陽精。強腎氣。過於

附子。故本經用以治大風寒。開濕痺。歷節拘攣。諸病。陽氣衰痿者。佐人參用之。天雄附子性皆下行。若上

焦陽虛者。當用參耆。不當用此也。且烏附之尖。皆是向下生者。其臍乃向上生。苗處宗更元素。皆誤認尖

為上。惟震亨以為下部之佐者得之。肘後三建湯。治元陽素虛。寒邪外入。厥冷脉沉。及傷寒陰毒。川烏附

子。天雄炮制等分。每服四錢。如生薑十五片。溫服。金匱治男子失精。用天雄龍骨桂枝白朮為散。酒服。半

錢。淮南用天雄一枚。納雄雞腹中。煮爛搗食之。令人勇。取壯肝腎之氣也。

側子 子前 辛熱大毒 發明 側子乃散生烏附之旁。側體無定。在其氣輕揚。宜其發散。四肢充達。皮

毛為治風之藥。唐元希聲治癰瘰。有側子湯。見外臺秘要。○又附子之初生。瑣細未成者。曰漏藍。言其小

而藍不能盛。漏出藍下也。專治冷漏惡瘡。

草烏頭 一名 辛熱大毒。即烏頭之野生者。或生用。或炮用。各隨本方。有兩歧相合。如鳥之喙者。名烏喙。

本經主中風惡風。洗洗出汗。除寒濕痺。效逆上氣。破積聚。寒熱。其汁煎之。名射罔。殺禽獸。發明 草烏

頭射罔乃至毒之物非若川烏頭附子之比自非風頑急疾不可輕投此藥止能搜風勝濕開頑痰治頑癩以毒攻毒而已本經治惡風洗汗出但能去惡風而不能回陽散寒可知昔人病風癱服草烏頭木鱧子藥過多甫入腹遂麻痺不救烏附五種主治攸分附子大壯元陽雖偏下焦而周身內外無所不至天雄峻溫不減於附而無頃刻回陽之功川烏端搜風濕痛癢却少溫經之力側子善行四末不入藏府草烏悍烈僅堪外治此烏附之同類異性者至於烏喙稟氣不純服食遠之可也

射罔 苦溫大毒。人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水養虎皆可一味禦之。發明 烏喙射罔至毒之藥。雖有治尸疰癰堅痙瘡毒腫及蛇咬。先取塗肉四畔。漸漸近瘡。習習逐病至骨。瘡有熱膿及黃水者。方可塗之。若無膿水有生血及新傷破。即不可塗。立能殺人。

白附子 辛甘溫小毒。發明 白附子純陽引藥勢上行。乃陽明經藥。治肝氣風癱陰癢。洗好黑入面脂用。其性燥血耗氣。是以類中風證。雖有痰癰禁用。小兒慢驚勿服。

天南星

本經名虎掌

苦辛溫有毒。治風痰生用。須以礬湯浸。若熟用以濕紙包。於塘火中炮製。用造膽星法。

以南星磨末。篩去皮臘。月入黃牛膽中。懸當風處乾之。年久多拌者良。或兼蜂蜜以潤其燥。但色易黑。不能久藏。本經主心痛寒熱結氣積聚伏梁筋痠拘緩利水道。發明 天南星之名。始自開寶。即本經

之虎掌也。以葉取象。則名虎掌。根類取名。故曰南星。雖具二名。實係一物。為開滌風痰之常藥。本經治心痛寒熱結氣。即開寶之下氣利胸膈也。本經之治積聚伏梁。即開寶之破堅積也。本經之治筋痠拘緩。即開寶之治中風除麻痺也。本經之利水道。即開寶之散血墮胎也。夫水由血不歸經。所化蘊積於經。而為濕熱。則風從內發。津液凝聚為腫脹。為麻痺。為眩暈。為顛仆。為口噤。身強。為筋脈拘緩。為口眼喎斜。各隨身之所偏。而留者不散。內為積聚。外為癰腫。上為心痛。下為墜胎。種種變端。總由濕熱所致。蓋緣一物二名。後世各執一例。是不能無兩歧之說。即仲瀆之明尚以開寶之文。行之為疏。而本經主治置之罔聞。何怪諸家採集藥性。一皆舍本逐末乎。按天南星味辛而麻。故能治風散血氣溫而燥。故能勝濕除痰。性緊

而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜諸風口禁更以石菖蒲人參佐之南星半夏皆治痰藥也然南星專走經絡故中風麻痺以之為嚮導半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉以之為嚮導千金治婦人頭風攻目作痛掘地作坑燒赤入南星於中以醋沃之蓋定候冷為末酒服半錢易簡治面生疣子醋調南星末塗之其新生之芽曰由跋本經治毒腫結氣千金方用之取其開結熱之用耳

半夏 辛溫有毒湯浸同兒茭白礬煮熟薑汁拌焙乾用或兒茭白礬薑汁竹瀝四製尤妙咽痛醋炒用小兒驚痰發搐及膽虛不得眠猪膽汁炒人脾胃丸劑為細末薑汁拌盒作餅候陳炒用反烏附者以辛燥鼓激悍烈之性也忌羊血海藻飴糖者以甘膩凝滯開發之力也 本經主傷寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗 發明 半夏為足少陽本藥兼入足陽明太陰虛而有痰氣宜加用

之胃冷嘔噦方藥之最要止嘔為足陽明除痰為足太陰柴胡為之使故小柴胡湯用之雖為止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱也本經治傷寒寒熱非取其辛溫散結之力欬治心下堅胸脹非取其攻堅消痞之力欬治欬逆頭眩非取其滌痰散邪之力欬治咽喉腫痛非取其分解陰火之力欬治腸鳴下氣止汗非取其利水開痰之力欬同蒼朮茯苓治濕痰同栝蒌黃芩治熱痰同南星前胡治風痰同芥子薑汁治

寒痰惟燥痰宜栝蒌貝母非半夏所能治也半夏性燥能去濕豁痰健脾令人惟知半夏去痰不言益脾利水脾無留濕則不生痰故脾為生痰之源肺為貯痰之器半夏能主痰飲及腹脹者為其體滑而味辛性溫也二陳湯能使大便潤而小便長世俗皆以半夏南星為性燥燥矣濕去則土燥痰涎不生非二物

之性燥也古方治咽痛喉痹吐血下血多用二物非禁劑也按靈樞云陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰陰虛則目不瞑飲以半夏湯一劑通其陰陽其臥立至半夏得栝蒌實黃連名小陷胸湯治傷寒小結胸得雞子清苦酒名苦酒湯治少陰咽痛生瘡語聲不出得生薑名小半夏湯治支飲作嘔得人參白蜜名大

半夏湯治嘔吐反胃得麻黃蜜丸名半夏麻黃丸治心下悸忪得茯苓甘草以醋煮半夏共為末薑汁麩糊丸名消暑丸治伏暑引飲脾胃不和此皆得半夏之妙用惟陰虛羸瘦骨蒸汗泄火鬱頭痛熱傷欬嗽

糊丸名消暑丸治伏暑引飲脾胃不和此皆得半夏之妙用惟陰虛羸瘦骨蒸汗泄火鬱頭痛熱傷欬嗽

及消渴肺痿欬逆失血肢體羸瘦禁用以非濕熱之邪而用利數行濕之藥重竭其津醫之罪也喜樂之
答哉

蚤休即草紫河車金線重樓俗名七葉一枝花 苦微寒有毒 本經主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中 發明 蚤休足厥陰

經藥能治驚癇瘧疾瘰癧癰腫詳本經主治總取開結導熱而驚癇搖頭弄舌之熱邪自除元氣虛者禁
用醋磨敷癰腫蛇毒有效

鬼臼本經名九日一名天白一名馬目毒公又有水律草害母草獨脚蓮羞天花騎田草山荷葉八角盤唐婆鏡鬼藥對犀解毒等名 辛溫有毒 本經殺蟲毒鬼注

精物辟惡氣不祥逐邪解百毒 發明 鬼臼辛溫以毒攻毒之猛藥本經殺鬼疰毒毒辟惡逐邪寧無

顧名思實之意其治邪癰陰疽蛇毒用之良方一字神散治子死腹中無灰酒下一錢立效射工中人寒

熱發瘡鬼白葉一握苦酒搗汁服一升日二次效

射干本經名烏扇其葉叢生橫鋪一而如鳥翅及扇之狀故有鳥嬰鳥次鳥蒲扇翼鬼扇高竹仙人掌等名 苦辛微溫有毒米泔浸煮熟炒用 本經主

欬逆上氣喉痹咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱 發明 苦能下泄辛能上散本經治欬逆

上氣喉痹咽痛不得消息專取散結氣之功為喉痛咽痛要藥症中咽痛隨手取效以其力能解散毒鬱

也治腹中邪逆食飲大熱是指宿血在內發熱而言即別錄療老血在心脾間之謂金匱治效而上氣喉

中水鷄聲有射干麻黃湯又治瘧母蠶甲煎丸用烏扇燒過取其降微陰之相火也火降則血散腫消而

痰結自解千金治喉痹有烏扇膏中射干毒生瘡烏扇升麻煎服以淳敷瘡上效治便毒射干同生薑煎

服利兩三行即效以其性善降服之必瀉虛人禁用苗名烏尾根名烏頭又名東海烏頭千金治蠱毒方

用之

玉簪根即治 苦辛溫有毒 發明 玉簪人骨夾壁故能下骨鯁以根搗自然汁於竹筒灌入喉不可

著牙齒刮骨取牙玉簪根乾者一錢白砒三分白礮七分蓬砂三分威靈仙三分草烏頭一分半為末點
少許皮處自落

鳳仙子又名急子

苦温小毒 發明 鳳仙子性最急速故能透骨軟堅通竅搜頑痰下死胎積塊噎膈

骨鯁治狂痴勝金丹用之取其性急領砒藥吐泄也危人煮肉硬者投子數粒即易爛是其驗也性與玉

簪根同不可著齒多食戟人咽入砒點疼牙即落同獨瓣蒜搗塗瘡塊即消加麝香阿魏尤捷花治蛇傷

播酒服之即解

曼陀羅花實名風茄

辛温有毒 發明 此花浸酒治風少頃昏昏如醉動火之患也故麻藥為之首推八

月採此花七月採麻子花陰乾等分為末熟酒調服三錢少頃昏昏如醉刻瘡火火宜先敷此則不覺苦

也寒濕脚氣煎湯洗之

羊躑躅即開羊花

辛温大毒惡諸石及麩不入湯劑 本經主賊風在皮膚中淫淫痛温瘧惡毒諸痺發

明 羊躑躅治中風癱瘓性祛風寒濕邪故可以治諸痹惡毒正與本經之治相符用其毒以攻毒也然

須諒病人虛實而用和劑局方伏虎丹中用之南方治蠱毒有躑躅花散其性之猛烈可知此物有大毒

曾有人以根入酒飲遂致於斃不可近眼令人昏翳同天南星川烏草烏助虐尤甚中其毒者以棗豆解

之

芫花 苦辛温有毒陳者良水浸一宿曬乾醋炒以去其毒弘景曰用者微熬不可近眼反甘草 本經

主咳逆上氣喉鳴咽腫短氣蠱毒鬼瘡疥癬癰腫殺蠱魚 發明 芫花消痰飲水腫故本經治咳逆咽

腫疔瘰癧毒皆是痰濕內壅之象仲景治傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍

湯主之若表已解有時頭痛汗出惡寒心下水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小青龍

湯驅逐表邪使水氣從毛竅而出內經開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣從大小便而泄內經潔淨

府去菟陳莖法也芫花大戟甘遂之性逐水瀉濕能直達水飲窠囊隱僻處取効甚捷不可過劑世人真

元 芫花 苦寒有毒蒸黃用芫花葉尖如柳花紫似荊堯花苗莖無刺花細色黃與芫花絕不相似或言無

毒草如

莢花以芫花代之性相近耳 本經主傷寒溫瘧下十二經水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸中留滯飲食寒熱邪氣利水道 發明 莢花苦辛能破積聚癥瘕治痰飲逆去咽喉腫閉本經治傷寒溫瘧者即苦寒以攻蘊積伏匿之邪也言下十二經水又治飲食寒熱邪氣者以其苦寒峻利飲食之邪亦得蕩滌而寒熱自除也仲景用此止利以行水水去則利止矣又小青龍湯云若微利者去麻黃如莢花蓋亦取其利水也愚按芫花莢花雖有辛溫開表苦寒走滲之不同而破結逐水之功用彷彿本經雖無芫花利水之說而仲景十棗湯尚行利水是以藥肆皆不辨混收醫家亦不辨混用猶夫食穀得以療饑食黍亦可療饑混用可無妨礙若礬石礬石字形相類藥狀亦相類可不辨而混用耶

莽草一名莽即鼠莽本作前字此物有毒食之令人迷惘故 辛溫有毒 本經主頭風癰腫疔瘕除結

氣疥癬殺蟲魚 發明 莽草大毒善殺魚鱉其性可知本經治疔瘕結氣蕩滌在內之宿積也療癰腫

頭風搜逐在外之邪毒也但性最猛烈服之令人瞑眩千金方每與茵芋同為搜風滌惡之峻劑近世罕

能用之惟毒魚之外僅以浴頑痺濕風及煎漱蟲牙然沐時勿令人眼中具毒者惟草紫河車磨水服之

可解黑豆煮汁服之亦解以豆汁澆莽根則爛物類之相制如此至於茵芋人所未識毋怪近世醫術之

卑也

茵芋 苦辛溫有毒生泰山川谷春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南四月開細白花五

月結實今彭城海鹽杭州雍州絳州華州皆有四月採葉七月採莖陰乾用之 本經主五藏邪氣心腹

寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛 發明 茵芋大毒世亦罕用本經雖有治羸瘦如瘧狀

一語皆是五藏有邪氣心腹寒熱所致非能療虛羸寒熱也其治關節風濕痺痛是其正治時珍曰千金

外臺諸方治風癰有茵芋丸治風痺有茵芋酒治婦人產後中風有茵芋膏風濕諸方多用之茵芋石南

莽草皆古人治風妙品近世罕知

鈎吻本經名野葛紅花者名火把草 辛溫大毒 本經主金瘡乳瘻中惡風效逆上氣水腫殺鬼疰蠱

毒發明 野葛之毒甚於戈戟故有鈎吻之名而風毒盡症用之以毒攻毒苟非大藥亦難輕用紫者破血結青者破痰積其葉與黃精葉相似但鈎吻葉有毛鈎二箇黃精葉似竹葉而無毛鈎可以明辨誤食鈎吻葉飲冷水即死以死尸懸樹上汁滴在地即生菌子收之名菌藥毒於野葛蘿菜搗汁解之取蘿菜汁滴野葛苗即萎死中野葛毒急不可得蘿菜多飲甘草汁人屎汁或白鴨血白鵝血羊血灌之亦解

蔓草部

菟絲子

本經名

辛甘平無毒酒煮搗爛作餅焙乾用雷公曰凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澆

并粘也菟絲最難得真有人以子種出皆水犀草今藥肆所賣俱係此類然服亦有微功不似假石蓮子之大苦大寒大傷胃氣伐人天元也至賤之物尚爾若此况珍貴之品能無偽乎本經續絕傷補不足益氣力肥健人發明 菟絲子去風明目肝腎氣分藥也其性味辛溫質粘與杜仲之壯筋暖腰膝無異五味之中惟辛通四氣復兼四味經曰腎苦燥急食辛以潤之菟絲子五味子之屬是也與辛香燥熱之辛迥乎不同此補脾腎肝三經要藥本經言續絕傷補不足益氣力肥健人者三經俱實而絕傷續不足補氣力長令人肥健矣其功專於益精髓堅筋骨止遺泄主莖寒精出溺有餘澀去膝脛痠軟老人肝腎氣虛腰痛膝冷合補骨脂杜仲用之諸經膜皆屬於肝也氣虛腫子無神者以麥門冬佐之蜜丸服效凡陽強不痿大便燥結小水赤澆者勿用以其性偏助陽也

五味子

酸溫無毒產遼東者佳微焙搗碎用

本經主益氣效逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子

精發明

五味子右腎命門本藥本經主效逆上氣強陰益男子精心腎不交者宜之兼入肺腎二經

味酸而斂耗散之金性溫而滋不足之水生津止渴益氣強陰壯水鎮陽收腫子散大定喘欬汗加乾薑治冬月肺寒效嗽同人參門冬治夏月精神困乏而虛熱久嗽不可悞用表散須以此去核之辛溫助火但用皮肉之酸鹹以滋化之不宜多用恐酸收太過反致閉遏而成虛熱也黃昏嗽乃火浮於肺不宜涼藥宜五味子斂而降之但風邪在表痘疹初發一切停飲肺家有實熱者皆當禁之

覆盆子本經名 甘平微溫無毒酒浸一宿炒用 本經安五藏益精氣長陰令人堅強志倍力有子久

服輕身不老 發明 覆盆子乃蓬蘽之實本經言蓬蘽者藟即實也或云蓬蘽是覆盆苗分之為二殊

為未當宗更云覆盆益腎藏縮小便服之當覆其溺器故名本經專於煖子藏服之令人多子別錄言益

氣輕身令髮不白甘溫補血與桑椹同功惟秦地山中有之近世真者絕罕藥肆每以樹莓代充欲驗真

偽以酒浸之色紅者是真否即是假

使君子 甘溫無毒微煨去殼 發明 凡殺蟲藥都是苦辛惟使君子甘而殺蟲不傷脾胃大人小兒

有蟲病者每月上旬清晨空腹食數枚或為散肥湯服之次日蟲從大便出忌飲熱茶犯之即瀉凡蟲皆

脾胃虛弱飲食停滯而生此物甘溫既能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止瀉為小兒蟲積上藥

木鱉子 土木鱉苦溫小毒番木鱉苦寒大毒又附子之初生未成者曰漏籃子炮炙論名木鱉子與此

不同 發明 木鱉有二種有殼者曰土鱉去殼搗爛帛裏塞鼻起倒睫拳毛又為末唾調貼痔痛七日

即消一切癰腫醋磨塗之 一種無殼者曰番鱉治熱病喉痺作痛和山豆根青木香磨汁燕之斑瘡入眼

番木鱉半個同輕粉冰片麝香為末左目吹右耳右目吹左耳日二次斑瘡自退又能毒狗狗性大熱此

性大寒寒熱相反激之使然

馬兜鈴 苦辛微寒無毒去殼微焙用 發明 諸藥之性輕浮者皆能入肺散氣燈心馬勃之屬皆然

諸家言其性寒專於初痰定喘不知其苦中帶辛寒中帶散是以肺熱痰喘聲音不清者宜之錢氏補肺

阿膠散用之取其清熱降氣邪去則肺安矣性善湧池故纂要治蚊蠱毒一味濃煎服之探吐其毒即解

嬰兒麻疹內陷喘滿聲痞者宜加用之若肺冷金寒喘嗽失音者禁用

青木香即馬兜鈴根 辛苦微寒無毒 發明 青木香苦寒香細入足少陰善降陰氣上逆故治風濕歲時

湯用之并治癰腫痰結氣凝諸痛唐本治熱腫蛇毒水磨傅之肘後治蠱毒酒水和煎服之毒從小便出

昔人言多服令人吐利肺寒欬數寒痰作喘胃虛畏食人勿服以其辛香走竅也

預知子 苦寒無毒。大明曰溫。發明。預知子專殺蟲瘡。盡其治疰癩蛇毒。總是殺蟲之功。相傳取子二枚。綴衣領上。遇有蟲毒。則聞其子有聲。故名預知。蜀人極貴重之。

牽牛 苦辛溫有毒。東垣云。辛熱有毒。有黑白二種。名黑丑白丑。凡用。生磨取頭末。發明。牽牛專一

行水。峻下之劑。白者屬金。利肺。治上焦痰飲。除壅滯。氣逆通大腸。風秘除氣分濕熱。黑者屬水。瀉腎而兼

瀉脾胃之濕。消腫滿。脚氣利大小便秘。但病在血分。或病人稍弱。而痞滿者。不可用。東垣云。牽牛非神農

藥也。各醫續注云。味寒能除濕氣。利小便。治下注脚氣。此說氣味主治俱誤。凡用牽牛。少則動大便。多則

泄下如水。乃瀉氣之藥。其味辛辣。久嚼猛烈。雄壯所謂苦寒安在哉。夫濕者水之別稱。有形者也。若受濕

氣不得施化。致大小便不通。宜暫用之。况牽牛止能泄氣中之濕熱。不能除血中之濕熱。每見酒食過傷

病痞者。多服牽牛。散取快一時。藥過仍痞。以致久服。脫人元氣。猶不知悔也。東垣治下焦虛腫。天真丹用

牽牛。以鹽水炒黑。佐沉香杜仲補骨脂官桂諸藥。深得補瀉兼施之妙用。方見醫學發明。

紫葳 酸微寒無毒。本經主婦人產乳餘疾。崩中癥瘕。血閉寒熱。羸瘦養胎。發明。凌霄花手

足厥陰血分藥也。能去血中伏火。本經主婦人崩中癥瘕。又治血閉寒熱。羸瘦云。養胎者。以有積瘀在內

瘀散則胎自安也。與金匱桂心茯苓丸中用桃仁丹皮治妊娠癥瘕。痼害無異。癥瘕血閉。血氣刺痛。羸風惡

瘡。多用之。皆取其散惡血之功也。若無瘀血而胎息不安者。禁用。

施花 枝名。甘辛溫無毒。制雄黃。本經主面疔黑。色媚好益氣。根主腹中寒熱邪氣。發明。凡藤

蔓之屬。象人之筋。所以多治筋病。施花根細如筋。可啖。本經言主腹中寒熱邪氣。別錄言其久服不饑。時

珍自京師。還見北地車夫。每載之。云暮歸煎湯飲。可補損傷。則益氣續筋之說。尤可徵矣。筋被斫斷者。用

施花根搗汁。漚斷處。仍以渣敷。日三易。半月即續。

薔薇 酸溫無毒。本經營實主癰疽惡瘡。結肉跌筋。敗瘡熱氣。陰蝕不瘳。關節。發明。薔薇乃野生之白花。若性專解毒。其實兼能散結。結肉跌筋。敗瘡陰蝕。皆得療之。本經所主。皆言其實。根能入

陽明經除風殺毒故癰疽瘡癤常用之千金治消渴尿多以根煮飲又治口瘡之神藥聖惠治小兒遺尿酒煮服之皆取其溫足陽明而足太陽受陰矣

月季花俗名月 甘溫無毒 發明 月季花為活血之良藥搗數腫瘍用之痘瘡觸犯經月之氣而伏

陷者用以加入湯藥即起以其月之開放不失經行常度雖云取義亦活血之力也

栝萹實 甘寒無毒去殼紙包壓去油用反烏附 發明 栝萹實甘寒潤燥宜其為治嗽消痰止渴之要藥以能洗滌胸膈中垢膩鬱熱耳仲景治喉痺痛引心腎效唾喘息及結胸滿痛皆用栝萹實取其甘

寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也其性較栝萹根稍平而無寒鬱之患但脾胃虛及嘔吐自利者不可用

栝萹根御版 苦寒無毒反烏附 本經主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷 發明 栝萹根性

寒降膈上熱痰瀉心中煩渴除時疾狂熱祛酒癰濕黃治癰瘍解毒排膿本經有安中補虛續絕傷之稱以其有清胃祛熱之功火去則中氣安津液復則血氣和而絕傷續矣其性寒降凡胃虛吐逆陰虛勞嗽

誤用反傷胃氣久必泄瀉喘欬病根愈固矣凡痰飲色白清稀者皆當忌用

土瓜根御版 苦寒無毒藏器云有小毒 本經主消渴內癰瘕血月閉寒熱瘕瘕益氣愈瘰 發明

王瓜產南方者稟濕熱之氣最盛患瘡腫癰毒者食之為患轉甚產北地者得春升之氣最先患消渴內疽者用之其效頗捷其根治黃疽消渴與栝萹之性不甚相遠但不能安中補虛續絕傷調和經絡諸血

也金匱治婦人經水不調帶下少腹滿一月再見者土瓜根散主之深得本經主瘕血月閉之旨方用土瓜根芍藥桂心麝香等分為末酒服方寸匕日三服蘇頌治小兒發黃土瓜根生搗汁服三合不過三次

效又治黃疽變黑土瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水從小便出其治寒熱瘕瘕皆祛濕熱之驗南陽治陽明經熱大便不通劑之為導以下濕熱其子治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢及反胃吐食惜乎世醫

未知用也

葛根 甘平無毒。色白者良。入陽明表藥。生用。胃熱煩渴。煨熟用。本經主消渴。身大熱。嘔吐諸瘕。起陽氣。解諸毒。發明 葛根性升。屬陽。能鼓舞胃中清陽之氣。故本經主消渴。身熱嘔吐。使胃氣敷布。諸瘕自開。其言起陽氣。解諸毒者。胃氣升發。諸邪毒自不能留。而解散矣。葛根乃陽明經之宗藥。治頭額痛。眉稜骨痛。天行熱氣。嘔逆。發散解肌。開胃止渴。宣痲發痘。若太陽經初病。頭腦痛而不渴者。邪尚未入陽明。不可使用。恐引邪內入也。仲景治太陽陽明合病。自利。反不利。但嘔者。俱用葛根湯。太陽病下之。遂利不止。喘汗脈促者。葛根黃芩黃連湯。此皆隨二經表裏寒熱輕重而為處方。按證施治。靡不應手神效。又葛根葱白湯。為陽明頭痛仙藥。斑疹已見。點不可用。葛根升麻。恐表虛反增斑爛也。又葛根輕浮。生用則升陽生津。熟用則鼓舞胃氣。故治胃虛作渴。七味白朮散用之。又清暑益氣湯。兼黃柏用者。以暑傷陽。明額顛必脹。非此不能開發也。○花能解酒毒。葛花解醒湯用之。必兼人參。但無酒毒者。不可服。服之損人天元。以大開肌肉。而發泄傷津也。

天門冬 柳根 甘寒無毒。焙熟去心。用肥白者良。忘鯉魚。本經主諸暴風濕偏痺。強骨髓。殺三蟲。去伏尸。久服輕身。益氣延年不饑。發明 天門冬。主大陰肺經氣分藥。兼通腎氣。效逆喘促。肺痿。肺癰。吐血。衄血。乾欬。痰結。其性寒潤。能滋肺。肺氣熱而燥者。宜之。肺為清虛之藏。涼則氣寧。熱則氣騰。天門冬能保肺。使氣不受火擾。合地黃。麥門冬。主心。肺虛熱。欬吐膿血。又能治熱淋。同參者。定虛喘。蓋肺肅則氣化。乃能出。若脾虛而泄瀉。惡食者。雖有前證。亦莫輕投。以其降泄太過也。時珍云。天門冬。清金降火。益水之上源。故能下通腎氣。入滋補方用之有效。若脾胃虛寒。人久服。必致滑腸。反成痼疾。以性寒能利大腸故也。本經治諸暴風濕偏痺。蓋熱則生風。暴則屬火。偏痺者。濕熱所致。故治風先清火。清火在養陰也。其三蟲伏尸。皆脾腎濕熱所化。清二經濕熱。則無三蟲伏尸之患矣。又能延年不饑。故辟穀方多用之。

百部 苦微甘。小毒。肥白者良。抽去心。用則不煩悶。本經主欬嗽。上氣。火炙酒漬飲之。發明 百部為殺蟲要藥。故肺熱勞瘵。喘嗽。有寸白蟲。宜之。燒蟲。刺及傳尸。骨蒸。多用之。時珍云。天門冬之類。皆主

肺痿但一部氣溫肺胃寒者宜之二冬性寒肺胃熱者宜之脾胃虛人勿用以其味苦傷胃也又濃煎洗牛馬蟲樹木蟲蛀用填孔中更削杉木塞之其蟲即死殺蟲之功於此可知

何首烏一名夜交藤

苦澆微溫無毒其形圓大者佳須赤白並用製法以竹刀刮去皮拌黑豆九蒸九曬候

用禁犯鐵器忌菜蔬諸血勿與天雄烏附薑辛仙茅等同用為其性斂味澆也發明何首烏足厥陰

少陰藥也性稟陰中之陽產南方者最勝北地所生雖種大者殊不足珍以地偏屬陰而無陽生之力也

白者屬氣分赤者屬血分腎主閉藏肝主疏泄以此氣溫味苦澆苦走腎溫補肝能收斂精氣所以養血

益肝固精益腎健筋骨烏鬚髮為滋補良藥不寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上氣血大和則風虛斑

腫瘰癧之疾可愈生則性秉發散主寒熱瘧瘧及癰疽背瘡皆用之今人治津血枯燥及大腸風秘用鮮

者數錢煎服即通以其滋水之性最速不及封藏即隨之而下洩也與從蓉之潤燥通大便無異而無助

火之虞腸風藏毒用乾者為末米飲日服二三錢有效蓋其內溫肝腎外祛少陰風熱之驗也丹方治久

瘡用生乾何首烏一兩柴胡三錢黑豆隨年數加減煎成露一宿清晨熱服若夜瘡尤效乃散中寓收補

中寓散之法

草薺 苦甘平無毒產川中大塊色白而鬆脆者為草薺若色黃赤者即菝葜也一種小塊質堅韌者為

土草薺不堪入藥忘茗醋本經主腰痛強骨節除風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣發明草薺苦平

胃與肝家藥也入肝搜風本經主腰脊痛強骨節入肝祛風入胃祛濕故本經主寒濕周痺惡瘡熱氣等

病昔人稱其攝精之功或稱逐水之效何兩說相懸耶不知胃氣健旺則濕濁去而腎無邪濕之擾腎藏

自能收攝也楊氏草薺分清飲專主濁病正得此意又主陰痿失溺老人五緩者總取行陽之力以利關

節助健運也若陰虛精滑及元氣下陷不能攝精小便頻數大便引急者誤用病必轉劇以其溫散不利

於陰也菝葜與草薺相類別錄主腰背寒痛風痺皆取祛濕熱利水堅筋骨之義

土茯苓俗名冷

甘淡平無毒忌鐵器

發明

土茯苓古名山牛入胃與肝腎清濕熱利關節止拘攣

除骨痛主楊梅瘡解汞粉毒時珍云楊梅瘡起於嶺南風土炎熱嵐瘴薰蒸挾淫穢濕熱之邪發為此瘡今則通行海宇類有數種治之則一屬厥陰陽明如兼少陰太陽陽明發於咽喉兼太陽少陽發於頭角蓋相火寄在厥陰肌肉屬於陽明若用輕粉刮劑毒氣竄入經絡筋骨莫之能出變為筋骨攣痛發為結毒遂成痼疾方用土茯苓一兩薏苡仁久防風木瓜通白蘚皮各五分兒莢子四分人參當歸各七分日服三次忌飲茶燒酒及牛羊雞鵝魚肉麪鹽醬并戒房勞百日渴飲土茯苓湯半月全愈

白斂 苦甘辛微寒小毒及烏附解狼毒毒 本經主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癩溫

瘥女子陰中腫痛帶下赤白 發明 白斂性寒解毒數腫瘍瘡有解散之功以其味辛也但陰疽色淡

不起胃氣弱者非其所宜本經治目赤驚癩溫瘥非取其解熱毒之力斂治陰腫帶下非取其去濕熱之

力斂金匱薯蕷丸用之專取其辛涼散結以解風氣百疾之蘊蓄也世醫僅知癰腫解毒之用陋哉同地

膚子治淋濁失精同白芨治金瘡失血同甘草解狼毒之毒其辛散之功可知而癰疽已潰者不宜用

山豆根 苦寒無毒 發明 山豆根大苦大寒故能治咽喉諸疾蘇頌言含之嚥汁解咽喉腫痛極妙

或水浸含漱或煎湯細呷又解痘疹熱毒及喉痺藥皆驗蓋咽喉證皆屬陰氣上逆故用苦寒以降之開竅

言解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱效嗽善治人馬急黃殺小蟲時珍云腹脹喘滿研末湯服血氣腹脹酒

服三錢平患熱厥心痛磨汁服總賴苦寒以散之但脾胃虛寒作瀉者禁用

黃藥子 苦平無毒 發明 黃藥子治諸惡腫瘡癩喉痺及蛇犬咬毒研水服之并用外塗千金治癩

疾以黃藥子半斤無灰酒一升浸藥固濟瓶口煉火煨候香瓶頭有津即止時飲一杯不令絕三五日即

消勿飲不齋令人項細也又專治馬牛心脾熱病

白藥子葉名 辛涼無毒 發明 白藥子辛涼解毒故能治金瘡出血太多發熱用以涼血清熱則痛

自止肌自生又主喉中熱塞不通時常痛腫醋煎細呷治諸骨鯁在上即吐出在下即便出解野葛生金

巴豆藥毒又治馬脾肺熱病

威靈仙 苦辛溫小毒發明 威靈仙性善下走通十二經故能宣通五藏治胃脘積痛脚脛痺濕痛風之要藥消水破堅積朝食暮效至能散邪故主諸風溫能泄水故主諸濕而痲疹毒癰於上不能下達腰下脛膝起灌遲者用為下引立效其性利下病人壯實者誠有殊效氣虛者服之必虛瀉而成痼疾以其耗血走氣也血虛而痛不因風濕者勿服

茜草

素問名薏苡又名
如應俗名血見愁

苦辛微溫無毒

本經主寒濕風痺黃痺補中

發明

茜根色赤而性溫味

苦而帶辛色赤入營性溫行滯味辛入肝手足厥陰血分藥也本經又以治寒濕風痺黃瘰者是濕熱之邪痹著營分用以清理邪濕則脾胃健運寒濕風痺無所留者而黃瘰自除矣其治女子經水不通甚效詳素問四烏鯁一蔥茹丸治婦人脫血血枯千金翼治內崩下血皆取以散經中瘀積也病人雖見血證若泄瀉飲食不進者勿服

防己

辛苦寒有毒

本經主風寒溫瘧熱氣諸病除邪利大小便

發明

防己辛寒純陰主下焦血

分之病性劣不純善走下行長於除濕以辛能走散兼之氣悍故主風寒溫瘧熱氣諸病除邪利大小便此本經主治也別錄療水腫膀胱熱通腰理利九竅皆除濕之功也弘景曰防己是療風水要藥漢防己是根入膀胱去身半已下濕熱木防己是苗走陽踰治中風攣急風痺濕熱金匱防己黃耆湯防己地黃湯木防己湯五物防己湯皆治痰飲濕熱之要藥而千金治遺尿小便澇有三物木防己湯水腫亦有三物木防己湯總取其通行經脈之力也能瀉血中濕熱通經絡中滯塞險健之類用之不得其宜下咽令人心煩飲食減少至於去濕熱腫痛下注脚氣膀胱積熱誠通行十二經之仙藥也如飲食勞倦陰虛內熱以防己泄大便則重亡其血其不可用一也大渴引飲及久病津液不行上焦濕熱等證防己乃下焦血藥其不可用二也外感邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤此上焦氣病其不可用三也大抵上焦濕熱皆不可用即下焦濕熱又當審其二便不通利者方可用之

發明 木通蔓真根也入手足太陽手少陰厥陰瀉氣分濕熱防已瀉血分濕熱脾胃不和則水道不利乃致鬱為寒熱為腫脹為淋秘為痺痺俱宜木通淡滲之劑分利陰陽則水行火降脾胃和而心腎平矣本經除脾胃寒熱者以其通利濕熱也曰通利九竅血脈關節者以其味淡滲也曰令人不忘及去惡蟲者竅利則神識清濕散則惡蟲去以其通達九竅行十二經故又能催生下乳散癰腫結熱惟胃虛腎冷及傷寒大便結燥表虛多汗者禁服恐重傷津液耗散胃汁也時珍曰木通上能通心清肺達九竅下能泄濕祛熱豈止利小便而已哉蓋能泄丙丁則肺不受邪能通水道水源既清而諸經之濕熱皆從小便泄去故導赤散用之

通草

原名通木

平沒無毒

發明

通草輕虛色白專入太陰肺經引熱下降而利小便入陽明胃經通

氣上達而下乳汁東垣言瀉肺利小便治五淋水腫癰閉取氣寒降味淡而升仲景當歸四逆湯用以通

在裏之濕熱也妊婦勿服以其通竅也

釣藤

一名釣藤

甘微苦寒無毒取鈎用良

發明

鈎藤手足厥陰藥也足厥陰主風手厥陰主火小兒急

慢驚癇瘕癩內鈎腹痛客忤胎風大人肝風頭旋目眩婦人帶下赤白皆肝風相火之病肝木風靜火息

則諸證自除矣

木蓮

俗名鬼鏡頭

實甘平溫葉酸平無毒

發明

木蓮葶藶實也性耐風霜嚴冬不凋故能治一切風癬

惡瘡為利水治血通乳要藥古方以木蓮二枚用猪前蹄煎湯飲汁盡一日乳汁即通無子婦人食之亦

能有乳其葉主背瘡取葉搗絞汁和蜜飲數升以渣敷之後利即愈煎湯主賊風疫痛乘熱熏洗日二次

痛止為度取藤搗絞汁治白癩風癩癩瘡疥癬消腫散毒療腸痔心痛陰類但南方有瘴氣人不可用

紫葛 甘苦寒無毒生山谷中苗似葡萄長丈許根紫色今所在皆有之

發明

紫葛和血解毒治癰

腫惡瘡取根皮搗為末酢和封之千金紫葛丸用之為君以其能散寒熱結氣也

葶藶 一名勒草一名藟葶藶勒草一名藟

甘苦寒無毒發明 葶藶蔓生道傍多刺勒人故又名葛勒蔓專主五淋利

葶藶 一名勒草一名藟葶藶勒草一名藟 甘苦寒無毒發明 葶藶蔓生道傍多刺勒人故又名葛勒蔓專主五淋利

小便散瘀血並搗汁服千金專主膏淋以醋和服之

忍冬即金銀花甘溫無毒發明金銀花芳香而甘入脾通肺主下痢膿血為內外癰腫之要藥解毒祛

膿瀉中有補癰疽潰後之聖藥今世但知其消腫之功昧其能利風虛也但氣虛膿清食少便瀉者勿用

痘瘡倒陷不起用此根長流水煎浴以痘光壯為效此即水楊湯變法

清風藤辛溫小毒發明清風藤入肝經氣分治風濕流注屈節鶴膝痲痺癢癢同防己浸酒治風

濕痺痛一切風病熬膏酒服一匙將患人身上拍一掌其後遍身發癢不可當急以梳梳之欲癢止飲冷

水一口即解風病皆愈避風數日自安

藤黃酸澆有毒發明藤黃性毒而能攻毒故治蟲牙蛀齒點之即落毒能損骨傷腎可知

水草部

澤瀉甘鹹微寒無毒白者良利小便生用入補劑鹽酒炒油者伐胃傷脾不可用本經主風寒濕痺

乳難養五藏益氣力肥健消水久服耳目聰明不饑延年發明澤瀉甘鹹沉降陰中之陽入足太陽

氣分素問治酒風身熱汗出用澤瀉生朮麋銜以其能利膀胱濕熱也金匱治支飲冒眩用澤瀉湯以逐

心下痰氣也治水畜煩渴小便不利或吐或瀉用五苓散以泄太陽邪熱也其功長於行水本經主風寒

濕痺言風寒濕邪痺者不得去則為腫脹為癢閉用此疏利水道則諸證自除蓋邪干空竅則為乳難為

水閉澤瀉性專利竅竅利則邪熱自通內無熱鬱則藏氣安和而形體肥健矣所以素多濕熱之人久服

耳目聰明然亦不可過用若水道過利則腎氣虛故扁鵲云多服病人眼今人治世精多不敢用益為腎

與膀胱虛寒而失閉藏之令得澤瀉降之而精愈滑矣當知腎虛精滑虛陽上乘面目時赤者誠為某劑

若濕熱上盛而目腫相火妄動而遺泄得澤瀉清之則目腫退而精自藏矣何禁之有仲景八味丸用之

者乃取以瀉膀胱之邪非接引也古人用補藥必兼瀉邪去則補藥得力矣

羊蹄根俗名辛苦寒小毒傍莖有鈎如波稜菜狀夏末結子便枯者是也本經主頭禿疥癬除熱女

子陰蝕 發明 羊蹄根屬水走血分。為除濕殺蟲要藥。故本經治頭禿疥癬。女子陰蝕之患。新採者醋搗塗。解殺蟲加輕粉尤效。

菖蒲 辛溫無毒。解已豆大戟毒。本經主風寒濕痺。欬逆上氣。開心孔。補五藏。通九竅。明目。耳出音聲。主耳聾。癰瘡。溫腸胃。止小便。利久服。輕身。不忘不惑。延年益心。智高。志不老。發明 菖蒲乃手少陰厥陰之藥。心氣不足者宜之。本經言補五藏者。心為君主。五藏係焉。首言治風寒濕痺。是取其辛溫開發脾氣之力。治欬逆上氣者。痰濕壅滯之喘。欬故宜搜滌。若脾胃虛燥之喘。欬非菖蒲可治也。其開心孔。通九竅。明目。耳出音聲。總取辛溫利竅之力。心孔開。九竅利。則癰瘡之毒可解。腸胃喜溫惡寒。腸胃既溫。則膀胱之虛寒。小便不禁。自止。久服。輕身者。除濕之驗也。不忘不惑。延年益智。高志不老。皆補五藏通九竅之力也。又主肝虛心腹痛。霍亂轉筋。消伏梁癰。善通心脾。痰濕可知。千金治胎動不安。牛產漏下。或搶心下血。及產後崩中不止。並以菖蒲一味煎服。凡陽亢陰虛。妻寡失合者。禁用。以其性溫。善鼓心包之火。與遠志之助相火不殊。觀本經之止小便。利其助陽之力可知。

蒲黃 甘微寒無毒。筋能行血。羅去粗筋。取粉用。本經主心腹膀胱寒熱。利小便。止血消瘀血。發明 蒲黃手足厥陰血分藥也。故能治血治痛。本經主心腹膀胱寒熱。良由血結其處。營衛不和故也。又言止血消瘀血者。以生則能行。熟則能止。與五靈脂同名。名失笑散。治一切心腹疼痛。能破瘀積。消癰腫。去產婦兒枕痛。然胃氣虛者。人口必吐。下咽則利。以五靈脂性味濁惡也。宋度宗一夜忽舌脹滿口。用蒲黃乾薑末乾糝而愈。以蒲黃之涼血活血。乾薑之引火外散。深得逆從兼濟之妙。用然舌根脹痛。亦有屬陰虛火旺者。誤用煎法。轉傷津液。每致燥渴愈甚。不可不審。

苦草 苦溫無毒。發明 苦草香竅入足厥陰肝經。理氣中之血。產後煎服。能逐惡露。但味苦伐胃。氣

竅傷。腦膏柔脆者服之。減食作瀉。過服則晚年多患頭風。昔人畏多產育。以苗子三錢。經行後。麝淋酒服。則不受妊。傷血之性可知。煎湯主婦人白帶。又治嗜食乾茶。面黃無力。為末和炒芝麻。不時嚼之。

水萍 辛寒無毒浮水面小而背紫者是 本經主暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴 發明 浮萍發汗勝於麻黃下水捷於通草惡疾厲風遍身者濃煎浴半日多效 其性輕浮入肺經達皮膚故能發揚邪汗 本經主暴熱身癢者專疎肌表風熱也下水氣者兼通陽明肉理也勝酒者陽明通達而能去酒毒也長鬚髮者毛竅利而血脈榮也止消渴者經氣和而津液復也浮萍為祛風專藥去風丹用紫背浮萍為末蜜丸彈子大豆淋酒下一丸治大風癩風一切有餘風濕脚氣及三十六種風皆驗而元氣本虛人服之未有不轉增劇者至於表虛自汗者尤為戈戟

萹 甘寒無毒 發明 萹性味滑常食發氣令關節急患痔漏脚氣積聚皆不可食為其寒滑傷津也千金方治熱瀉嘔逆瀉氣澤瀉湯麥門冬湯並用之取其清胃脫之熱逆也又能壓丹石解百藥毒

海藻 苦鹹寒小毒反甘草 本經主癭瘤結氣散頸硬核瘰癧腫癥瘕瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二種水腫 發明 海藻鹹能潤下寒能泄熱利水故本經主癭瘤結核癰腫瘕瘕散十二經水及除浮腫脚氣留飲痰氣之濕熱使邪從小便而出經云鹹能軟堅營氣不從外為浮腫隨各引經藥治之凡海中諸藥性味相近主療一致雖有不同亦無大異

昆布 鹹寒滑小毒 發明 鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除能破陽邪水腫與海藻同功然此物下氣久服瘦人海島人常食之水土不同故耳凡海中菜皆損人不獨昆布海藻為然

石草部

石斛 甘淡微苦鹹平無毒酒浸用種類最多惟川者味甘淡色黃無岐可無傷胃之虞古稱金釵者為最以其色黃如金旁枝如釵故有是名近世絕無此種川者差堪代用其餘雜產味苦色晦中虛多歧者味皆極苦誤用損人凡人湯藥酒浸曬乾入丸劑薄切米漿飲曬乾磨之 本經主傷中除瘕下氣補五

藏虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃 發明 石斛足太陰少陰脾腎之藥甘可悅脾故厚腸胃而治傷中鹹能益腎故益精氣而補虛羸為治胃中虛熱之專藥又能堅筋骨強腰膝骨痿虛弱囊瘕情少下便

中鹹能益腎故益精氣而補虛羸為治胃中虛熱之專藥又能堅筋骨強腰膝骨痿虛弱囊瘕情少下便

餘港者宜之

骨碎補俗名猴薑

苦溫無毒。蜜水焙用。發明。骨碎補足少陰藥也。骨傷碎者能療之。故名。主骨中毒氣。

風氣耳鳴牙疼骨痛。破血止血。折傷接骨。又治腎虛久瀉。以之為末。入猪腎中煨熟食之。戴元禮治痢後。

骨痿。入虎骨四斤。丸用之有效。但其性降收。不可與風燥藥同用。

石韋。苦微寒無毒。凡用去黃毛。不瀦射人肺。令效不已。去梗微炙用。本經主勞熱邪氣。五癆閉不通。

利小便水道。發明。石韋蔓延石上。生葉如皮。其性寒利。故本經治勞熱邪氣。指勞力傷津。癆閉不通。

之熱邪而言。非虛勞之謂。治妊娠轉胞。同車前煎服。

景天一名慎火草。俗名火丹草。

苦寒無毒。本經主大熱火瘡。身熱諸邪惡氣。發明。慎火草性能涼血解毒。故

本經治大熱火瘡。日華治熱狂赤眼。頭痛寒熱。遊風女子帶下。千金慎火散以之為君。專主血熱崩中帶

下之病。搗汁塗小兒丹毒發熱。及遊風熱瘡。外用並效。一切病得之寒濕惡寒喜熱者。勿投。

石胡荽

即天胡荽。俗名鵝不食草。又名鵝腸草。

辛溫無毒。汁製砒石雄黃。發明。鵝不食草氣溫而升。味辛而散。故能

透達顛頂。人但知其搗鼻通而落瘰癧肉。不知其治頭風之功最捷。而除醫之功更奇。接塞鼻中。醫膜自落。

故碧雲散用以取嚏。則濁氣宣通。而醫自除。是昔人以開鍋蓋法喻之。

地錦一名地脈。

苦平無毒。發明。地脈多生庭除磚縫。莖赤葉青。繁絲如錦。故有是名。能通流血脈。治崩

中刺下功專散血止血。通利小便。千金治淋方用之。

苔草部

陟釐。甘溫無毒。生於水底石上者。蒙茸如髮。謂之陟釐。發明。陟釐與水苔同生水中。但浮於水者。

謂之水苔。千金治協熱下痢。嘔逆。溫食則吐。有陟釐丸為痢證之首方。日華搗汁治天行心悶。別錄主心

腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止泄痢。並取其性溫而能利水也。

石慈一名蒙頂茶。

甘溫無毒。生蒙山頂石面及枯株上。與木耳無異。發明。石慈明目。益精氣。潤咽喉。解熱。

化痰同生薑能解陽明頭額眉稜骨痛本乎天者親上也

卷柏 辛平無毒桐君雷公云甘寒無毒鹽水煮半日再以井水煮半日用生用破血爰用止血 本經
主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子久服輕身和顏色 發明 卷柏足破陰經血分藥也詳
本經諸治一皆女子經癸之病總厥陰與衝脈之患也千金大澤蘭丸紫石英天門冬等丸皆用之經疏
言妊婦禁用以其能寒子藏中血氣也

馬勃 辛平無毒多生竹園濕地腐脹而成凡用以生布張開將馬勃於上摩擦下以盤承取末用之

發明 馬勃輕虛上浮力能散肺中邪熱故治效嗽喉痺衄血失音諸病東垣治大頭病咽喉不利普濟
消毒飲用之然須生蜜拌投入水調散不浮方可煎服

倒掛草 苦甘無毒 發明 倒掛草生井口邊千金斷酒方於端午午時取燒研水服勿令知即惡酒
不飲其樹孔中生者千金用治癭瘤取其倒垂而根不著也

苔 甘寒無毒 發明 井中蒼苔得至陰之氣而生火瘡傷爛脫皮者以苔炙末每錢入冰片二分杵
極細搽上痛即止不過三度愈如無井中者墻陰地上者亦可用之

穀部

諸米 甘平無毒 發明 米受坤土精氣而成補五藏而無偏勝杭者曰稻糯者曰黍資生之至寶也

其南杭溫北杭涼赤杭熱白杭平晚白杭涼新杭熱陳杭涼新陳黃白總謂之梁通名曰稷雖能益人然

不可過食過食則傷中州之氣也有人嗜食生米久成米癩治之以雞屎白取其殺蟲也米經霜新米病

人所禁下痢尤忌作食動風氣陳者下氣益脾病人尤宜本草言杭米溫中和胃氣長肌肉仲景白虎湯

桃花湯竹葉石膏湯並用之皆取晚杭得金之氣居多故也○陳倉米開胃進飲食年久者治久痢甚良

○秣米俗云糯米益氣補脾肺但磨粉作稀糜庶不沾滯且利小便以滋肺而氣化下行與若作糕餅性

難運化病人莫食○泔水善消鴨肉又製二木宜之○紅蓮米入心脾補血○粳米溫中益氣除濕止瀉

○穀芽啟脾進食寬中消穀而能補中不似麥芽之削尅也○稷米苗高如蘆俗名蘆粟穗曲下垂如鈎

者良治熱壓丹石毒解苦瓠毒不可與附子同食○粟即小米利小便止痢壓丹石熱解小麥毒發熱○

稗米厚腸胃濟饑其苗根治金瘡血出不止搗傅或研末摻之其血即止○菽米即雕胡荽草之子止渴

解煩○春杵頭糠能治噎膈取其運動之性以消磨胃之陳積也然惟暴噎為宜

諸麥 甘平皮寒無毒 發明 素問云麥屬火心之穀也鄭玄云麥有孚甲屬木許慎云麥屬金金旺

而生火旺而死三說各異而別錄云麥養肝氣與鄭說合孫思邈云麥養心氣與素問合參考其功除煩

止渴收汗利溲止血皆心之病當以素問為準蘇恭云小麥作湯不令皮垢圻圻則性溫不能消熱止渴也

可知方中用麥皆取外麩之力仍取溫性內存以輔助之愚按五穀中惟麥得春升之氣最早故為五穀

之長察其性之優劣則南北地土所產之不同北麥性溫食之益氣添力南麥性熱食之助濕生痰故北

人以此代飯大能益人養肝氣去客熱止煩渴利小便止漏血唾血令婦人得孕南方氣卑地濕久食令

人發熱鄉土不同故也乾麵益胃強肝濕麵生痰助濕初夏新者尤甚新麥性柔助濕熱尤甚而收獲時
遇雨色變者食之令作嘔能傷胃氣○麩皮多筋而性寒能發肝風傷脾氣且最難化受其傷者惟草
果能消去之其治走氣作痛用醋醋拌麩皮炒熟袋盛熨之○小麥粉乃麩皮洗筋澄出積善堂方烏龍
膏治一切腫毒未潰者用陳年小麥粉炒黑醋調糊熬如漆磁罐收貯用時攤紙上剪孔貼之其腫自消
藥力盡自脫用經霜桑葉大黃末和蜜調傅尤良○浮麥輕虛象肺能斂盜汗取其散皮膜之熱也○麥
奴乃麥將熟時上有黑微者朱肱治陽毒溫毒熱渴斑狂麥奴丸用之方用小麥奴梁上塵釜底煤龜突
墨同黃芩麻黃硝黃等分為末蜜丸彈子大水化服一丸汗出或微利即愈取從火化之象也○大麥即
牟麥健胃化食主消渴除熱久食令人多力健行○大麥作藥溫中消食既經發明大能耗伐腎氣凡人
小便多者禁之王好古云麥蘗神麩二藥胃氣虛人宜服之趙養葵曰此不稽之言也今人造飴必用麥
蘗始化傷中消導可知產婦乳腫不欲乳哺用麥蘗半兩入四物湯服之即斷傷耗精血可知○雀麥一
名杜姥草益肝和脾丹方以此草同苦瓠葉醋漬炮熟內口中齒外邊熨之冷則易熱者再熨更取銅器
置水浸熟草與葉乘熱救痛齒得蟲長三分老者黃色小者白色多者得數十枚少者得二三十枚出干
金方○蒼麥甘平動風發熱能鍊腸胃滓穢積滯降氣寬胸治白濁白帶氣盛而濕熱者宜之孟詵言益
氣力者殆未然也炒焦熱水衝服治絞腸痧腹痛小兒丹毒赤腫醋調塗之然須北方者良南方者味苦
性劣不堪服食久食令人動風頭眩不可與豬羊肉食令人鬚眉脫落又不可合黃魚食其稈燒灰淋汁
即酸用化石灰能去靨痣惡肉

諸豆 甘平無毒 發明 大豆曰菽色黃入脾瀉而不補色黑入腎瀉中寓補○本經云生研和醋塗
癰腫煎汁飲殺鬼毒止痛日華云制金石藥毒時珍云水浸搗汁解砒石砒石烏附射罔甘遂巴豆芫青
斑蝥百藥之毒古方取用甚多炒熱酒淋治風毒脚氣筋脈拘攣產後中風口喎頭風破傷並宜炒熟酒
淋服之○黃大豆生泄利熟壅氣生痰動嗽諸病皆非所宜惟痘後餘毒發難炒黑研末以香油調傅之

生浸細磨和滓炒熱傳腫瘍背瘡冷則換熱者頻傳即消誤食毒物生搗研水灌吐之諸毒不得吐者
濃煎汁飲之又試內癘及臭毒腹痛並與生黃豆嚼甜而不惡心者為上部有癘膿及臭毒發痧之真候
○其生黃豆葉嚼爛罨蛇蝎傷立效○白扁豆入脾經氣分能和中止嘔得木瓜治傷暑霍亂金匱云扁
豆病寒熱者不可食之以其能帶氣也若脾胃虛寒熱不止則扁豆又非禁劑一種紫黑者入脾經血分治
失血血痢俱炒黑用之○扁豆花治下痢膿血赤白帶下葉治霍亂吐下吐利後轉筋生搗一握入酢少
許絞汁服之立瘥○細黑豆一名稽豆俗名料豆入腎經血分同青鹽草蓮草何首烏蒸熟但食黑豆則
鬚髮不白其補腎之功可知今人以製何首烏取以引入腎經也黑豆炒焦淋酒即豆淋酒也頭風脚氣
咸取用之以其直達腎經血分也○大豆黃卷黑豆發芽是也本經治濕痺筋攣膝痛除胃氣結積益
氣解毒金匱著預丸用之取其入脾胃散濕熱也○赤小豆即赤豆之小而色黯者俗名豬肝赤其性下
行通利小腸故能制水降火久食令人枯燥瓜蒂散用之以泄胸中寒實正以其利水清熱也生未敷癰
腫為傷寒發頤要藥發芽同當歸治便紅腸癰取其能散畜積之毒也○綠豆甘涼解毒能明目解附子
砒石諸石藥毒而與梔子相反誤犯傷人○綠豆粉治癰疽內托護心丹極言其效○真粉乃綠豆所作
取陳者蜜調敷痘毒痘瘡濕爛不結痂死者乾撲之良○綠豆殼治痘生目醫○蠶豆甘溫性滯中氣虛
者食之令人腹脹積善堂方言一女子誤吞針入腹諸醫不能治有人教令煮蠶豆同韭菜食之針自大
便同出誤吞金銀物者用之皆效○豌豆一名畢豆補中益氣燒灰治痘疹黑疔○神黃豆產緬甸形如
槐子近時稀痘方用之一陽日用清水磨服○淡豆豉用黑豆淘淨伏天水浸一宿蒸熟攤乾蒿覆三日
候黃色取晒下覆葉實桑葉厚蓋泥封七日取出又晒酒拌入甕如此七次再蒸如前即是主傷寒頭疼
寒熱煩悶溫毒發斑瘴氣惡毒入吐劑發汗并治虛勞喘咳脚膝疼冷大病後胸中虛煩之聖藥合梔子
治心下懊懣同葱白治溫病頭痛兼人中黃山梔臘茶治溫熱疫癘虛喘逆與甘桔姜糖治風熱燥欬
皆香豉為聖藥蓋瓜蒂吐胸中寒實豆豉吐虛熱懊懣得葱則發汗得鹽則湧吐得酒則治風得薤則治

痢得蒜則止血生用則發散炒熟則止汗然必江右製者方堪入藥入發散藥陳者為勝入涌吐藥新者為良以水浸絞汁治誤食烏獸肝中毒服數升愈○豇豆補腎健胃解毒○刀豆煖補元陽其子治病後呃逆不止燒灰存性白湯調服二錢即止亦取其降濁氣之力也

胡麻本經名巨勝子千金名烏麻子即黑芝麻葉名青蕞莖名麻藍甘溫無毒 本經主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉

填髓腦久服輕身不老 發明 胡麻甘溫質潤性燥專入足少陰血分巨勝子丸以之為君專補腎藏

陽虛兼行肝心脾肺四經益脾滋肺降心包之火滋肝木之陰平補五臟但不若附桂之雄健耳其白者

名白油麻亦能潤肺除燥下通脾約便難亦者專發腎經之毒錢氏治小兒痘疹變黑歸腎用亦芝麻煎

湯送百祥丸○青蕞巨勝苗也本經主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦堅筋骨○胡麻花為末麻油塗

生禿髮長眉毛外臺千金用之○麻莖燒灰點痣去惡肉又治小兒鹽疔以淡豆腐蘸麻莖灰食之○白

麻作油微寒解毒潤腸主產婦胞衣不落熬膏生肌長肉止痛消腫○燈蓋油吐風痰食毒

亞麻俗名藍微溫無毒 發明 亞麻性潤入陽明經專於解散風熱濕毒為大麻風必用之藥故醉

仙散用之

麻子仁抑麻甘平無毒入藥微炒研用入丸湯泡去殼取帛色煮沸湯中浸至冷出之垂井中一夜勿

著水次日日中曝乾按去殼簸揚取仁 本經實名麻仁補津益氣久服肥健不老神仙○花名麻勃治

二十種惡風黑色遍身苦癢逐諸風惡血女人經候不通 發明 麻仁入手陽明足太陰其性滋潤初

服能令作瀉若久服之能令肥健有補中益氣之功藏府結燥者宜之仲景治陽明病汗多胃熱便難脾

約丸用之取潤脾土枯燥也日華止消渴通乳汁主催生產及老人血虛產後便秘宜之麻勃治身中

伏風同優鉢羅花為麻藥破癰腫不知痛葉絞汁服五合下蛇蟲搗爛敷毒俱效黃麻破血利小便麻

根搗汁治產難胞衣不下煮服治崩中不止生走而熟守也併治熱淋下血不止根葉並治搗打瘀血心

腹滿痛搗汁服之皆效陳黃麻燒灰酒服方寸匕散內傷瘀血

甘微寒無毒入理脾肺藥薑汁拌炒入利水濕藥生用

本經主筋急拘攣不可屈伸久

風濕痺下氣久服輕身益氣根下三蟲 發明 意滋甘寒升少降多能清脾濕祛肺熱及虛勞欬嗽肺

痿肺癰虛火上乘皆宜用為下引又能利筋去濕故本經治久風濕痺拘急不可屈伸之病蓋治筋必取

陽明治濕必扶土氣其功專於利水濕去則脾胃健而筋骨利痺愈則拘攣退而脚膝安矣然痺濕須分

寒熱蓋寒則筋急熱則筋緩大筋受熱地縱則小筋縮短而學急不伸故宜用此若因寒筋急而痛者不

可用也其治虛人小便不利獨用數兩水煎數沸服之即通若津枯便秘陰寒轉筋及妊娠禁用以其性

專下泄也取根搗汁治疝攻心痛生根下三蟲又肺癰以根汁沖無灰酒服初起可消已積可斂屢效

嬰粟穀解粉 瀋溫微毒蜜炙止殺醋炙止痛 發明 粟穀性瀋刮痰嗽止下痢肺虛大腸滑者宜之

若風寒欬嗽瀉痢初起有火邪者誤用殺人如劍戒之○御米治反胃胸中痰滯

阿芙蓉俗名鞏牀 酸瀋溫微毒天方國以嬰粟莖竹針刺破青苞次早液出竹刀刮取陰乾者是也○

土鴉片亦能瀋精止瀉但力薄少效 發明 京師售一粒金丹通治虛寒百病用阿芙蓉一分粳米飯

搗作三丸每服一丸不可多服忌酸醋犯之腸斷又忌葱蒜漿水古方治瀉痢脫肛久痢虛滑用一二分

米飲送下其功勝於粟殼又痘瘡行漿時瀉泄不止用四五釐至一分未有不止者今世服餌少用惟房

中術外用之誠為瀋精助火之首列也

蒸餅 甘平無毒寒食日以單麵所造醇水發成 發明 溫中健脾消食化滯和血止汗利三焦通水

道用以打糊丸健脾胃藥良

神麴酒麴 甘微苦辛平無毒造神麴法夏日用白麴五斤入青蒿蒼耳野蓼自然汁各一碗杏仁泥

四兩赤小豆二兩煮研拌麴作麴風乾陳久者良炒香用舉世以相思子作小豆大謬 發明 神麴入

陽明胃經其功專於消化穀麥酒積陳久者良但有積者能消化無積而久服則消人元氣故脾陰虛胃

火盛當禁也○酒麴亦能消食去滯氣行藥力但力峻傷胃○紅麴乃粳米所造然必福建製者為良活

大 聖 建 京 穀 部

血消食有治脾胃榮血之功。女人經血阻滯赤痢下重宜加用之。○女麴是女人以完麥磨成黃子。消食下氣止瀉痢破冷血千金方恒用之。

膠飴即傷 甘溫無毒。白色者良。發明 飴糖甘溫入脾經氣分潤肺氣止暴嗽補虛冷益津氣除唾

血仲景建中湯用治腹痛取稼穡之甘以緩之也。治傷寒腎虛尺脈不至是實土以隄水非伐腎也。而中

滿吐逆痞病皆不可食以其生痰助火最當也。丹溪云大發濕中之熱小兒多食損齒生蟲熬焦酒服能

消食積下瘀血解附子烏頭毒。拌輕粉熬焦為丸噙化療鹹哮喘嗽大吐稠痰即愈。

醋即酢 酸寒無毒。凡制肝藥用為引導。發明 醋名苦酒專取米釀成者味帶酸苦若酒飴所造

則兼酸甜矣。然酒之與飴總皆米製但功力稍遜耳。宗奭曰米醋比諸醋最釀入藥多用穀氣全也。仲景

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之。內有半夏之辛以發聲音。雞子之甘以緩咽痛。苦

酒之酸以斂咽瘡也。調敷藥則消癰腫制藥味則斂毒性諸惡狂妄及產後血暈燒炭淬醋以辟惡寒也。

北人感冒風寒用醋湯胡椒雞翅熱食汗之則愈。以北方素鮮生發之氣但取以助方宜之不足則邪自

不能為虐耳。東南木氣用事肝火易動諸病皆當忌食。酸喜入肝酸寒收斂病邪得之難於發泄耳。

酒醱酒 辛甘大熱。新者有毒。陳者無毒。味甜者曰無灰酒方可入藥。發明 酒嚴冬不冰其氣悍以

侵明其性熱而升走醉後則體軟神昏。振寒戰慄本草止云有毒不知其溫中發熱近於相火也。酒類多

種醞釀各異甘苦懸殊甘者性醇苦者性烈然必陳久為勝其色紅者能通血脈養脾胃色白者則升清

氣益肺胃至於扶肝氣悅顏色行樂勢辟寒氣其助火邪資痰濕之性則一。醉當風卧成惡風醉浴冷水

成痺痛醉飽飲水成癖積皆宜切慎。○豆淋酒以黑豆炒焦紅酒淋之破血去風治男子中風口喎陰毒

腹痛及小便尿血婦人產後一切諸證。○燒酒一名火酒又名氣酒與火同性得火則熱其治陰寒腹痛

最捷然臭毒發劫誤用立斃又入鹽少許治冷氣心痛下咽則安其性大熱與薑蒜同飲令人生痔。○糟

性最助濕熱病水氣浮腫勞嗽吐血人忌食惟醫撰行痰止痛及浸水洗凍瘡敷蛇咬蜂叮毒有效。

韭 生子瀉熟甘溫無毒菜細根紫者良韭子入藥蒸熟曝乾飯去黑炒黃研用韭初生芽食之傷人心

氣 發明 韭入足厥陰經下散血積生用治死血留於胃口作痛及婦人經脈逆行打僕損傷搗汁和

童便飽然須善食便實者宜之有腎氣上攻心痛者宜用韭汁和五苓散為丸空心茴香湯下昔人言治

噎膈惟死血在胃者宜之若胃虛而噎勿用恐致嘔吐也其心腹有痼冷者勿食食之必加劇黃帝云凍

韭不可生食動宿飲飲盛必吐水○韭花食之動風風氣人勿食○韭子辛溫壯火治夢泄弱血白帶白

淫男子隨溲而下女子綿綿而下惟腎氣過勞不能收攝者為宜若陰虛火旺及亢陽不交獨陰失合誤

用是抱薪救焚矣大抵韭之功用全在辛溫散結子則包含少火未散故能膏精而壯火熾盛則為戈戟

今人以韭子黃鷓齒出蟲然能傷骨壞齒不可不知

薤 辛苦溫無毒似韭而葉潤者是黃帝云薤不可共牛肉作羹食之成癥韭之氣味相類功用亦相類

如無薤處以韭代之 本經治金瘡瘡敗輕身不饑耐老 發明 薤白味辛氣溫入手陽明除寒熱溫

中去水專泄滯氣故四逆散加此治泄利下重胸痺薤白白酒湯專用以泄胸中痺氣也本經治金瘡瘡

敗取辛以泄氣溫以長肉也弘景云仙方及服食家皆須之即本經輕身不饑耐老之謂諸瘡中風寒水

腫生搗敷之搗汁生飲能吐胃中痰食蟲積屢驗金匱救卒死搗汁灌鼻中效薤葉治肺氣喘急千金方

用之以薤善散結蒜能消癥各適其用也

葱 胡葱良惟葱即龍爪葱 辛平無毒服地黃常山蜜桂者犯之無効生葱无忌生葱與雞雉犬肉食之令人動血

本經作湯治傷寒寒熱中風面目浮腫能出汗 發明 葱莖白辛溫上升入手太陰足陽明經專主發

散以通上下陽氣即本經作湯已下主治故傷寒頭痛如破用連鬚葱白香豉湯少陰病下利清穀裡寒

外熱厥逆脈微者白通湯內用葱白以其辛溫通陽氣也妊娠風邪喘嗽非葱白橘皮不除且能安胎順

氣金瘡折傷血出疼痛不止者用葱連葉煨熟傅之冷即頓易其痛立止更無癢痕也以葱葉專散血氣

葱鬚專行經絡葱花主心痺痛如刀刺葱子明目補中氣不足蟠葱專主冷熱疝氣胡葱化五石消桂為水療腫毒

蒜大者曰蒜辛溫小毒服雲母人切禁胡蒜獨顆蒜尤忌發明胡之與蒜功用彷彿並入手太陰

陽明氣味薰烈能通五臟達諸竅去寒濕辟邪惡消癰腫化癥積肉食主溪毒下氣治蠱數蛇蟲沙虱瘡

此其功也夏月食之解暑多食傷氣損目養生者忌之艾火灸用獨顆蒜甚良以其力專也凡中暑毒人

爛嚼三四瓣下咽即知又鼻衄不止者搗貼足心衄止即拭去之蒜壘水頓服二升吐腹中蟲積噎膈食

不得下腹熱如火手不可近者皆效但胃虛少食者誤投是速其咎也脚氣風病及時行病後忌食為其

能鼓舞餘毒也服雲母鍾乳人勿食為其能攪散藥力犯之必腹痛泄利前功盡棄也○小蒜主霍亂腹

中不安溫中除邪痺毒氣黃帝云食小蒜噉生魚令人奪氣陰核疼不可共韭食令人身重

薑薑油辛溫無毒發明薑臺破血故產婦宜食之然須藏久者庶無泄瀉之虞若舊患脚氣者

不可食胡臭人不可食食之加劇遊風丹腫取葉搗敷如神無葉時以子代之時病瘥後不可食一切生

菜令手足腫○其子打油名香油癰疽及痔漏中生蟲以香油塗之即盡臘肉蛙孔中滴入其蟲即滅治

蟲之功可知

白芥子辛溫微毒發明痰在脇下及皮裡膜外非此不能達控涎丹用白芥子正此義也辛能入

肺溫能散表故有利氣豁痰散痛消腫辟惡之功昔有脇痛諸治不效因食芥壘而愈者偶中散結開痰

之效其治射工疰氣上氣發汗者亦取辛散祛毒力耳此雖日用常品然多食則昏目動火泄氣傷精肺

經有熱虛火亢者切忌○陳年鹹芥酒治肺癰吐盡臭痰穢毒即愈然惟初起未潰宜之

蕪菁一名蔓菁苦溫無毒發明蔓菁治熱毒風腫乳癰寒熱和鹽少許生搗塗之熱即易不過三

五次瘡子能明目千金面脂方用之令人面潔白悅顏色但不可久食令人氣脹

萊菔子辛甘平微溫無毒其子多種惟春種夏收子細面色暗者佳服地黃何首烏人忌之發明

蘇子治痰有推牆倒壁之功。長於利氣。生能升熟能降。升則吐風痰降則定痰嗽。皆利氣之效。同蘇子白芥子為三子散。治痰喘胸滿。其根生升熟降。生則尅血消痰。熟則生痰助濕。生萊菔汁治火傷垂死。灌之即蘇。打撲損傷青紫。搗爛罈之。即散。煨熟。指摩凍瘡。二三日即和。偏頭風痛。取近蒂青色者半寸許。搗汁滴鼻。孔左痛滴右。右痛滴左。左右俱痛。兩鼻皆滴。滴後卧少頃。日滴一次。不過六七日。永不復發。欲令鬚髮白者。以生地黃汁一升。合生萊菔汁一升。飲之。即白。傷血之驗可徵也。小兒丹瘤。遊風。搗塗。立消。能消麵積。解附子毒性。最耗氣傷血。故脾胃虛寒。食不化者。勿食。丹方取苗葉陰乾。治病隨色之。紅白用赤者。砂糖調服。白者糖霜調服。然惟初病為宜。若久病。胃虛畏食者。不可用也。

生薑

縮服謂薑

辛溫無毒。解半夏。夏菴。厚朴。毒。

本經久服去臭氣通神明。

發明

生薑辛溫而散肺

脾藥也。散風寒。止嘔吐。化痰涎。消脹滿。治傷寒頭痛。鼻塞。逆上氣。嘔吐等病。辛以散之。即本經去臭氣通神明。不使邪穢之氣傷犯正氣也。同大棗行脾之津液。而和榮衛。凡藥中用之。使津液不致沸騰。不獨專於發散也。煨熟則降而不升。止腹痛泄利。扶脾氣。散鬱結。故逍遙散用之。同蜂蜜熬熟。治風熱。效逆痰。結取蜜之潤。以和辛散之性也。生薑搗汁。則大走經絡。與竹瀝則去熱痰。同半夏則治寒痰。凡中風中暑。及犯山嵐霧露。毒惡卒病。薑汁和童便灌之。立解。薑能開痰下氣。童便降火也。甄權云。搗汁和蜜食。治中熱嘔逆。不能下食。取薑以治嘔。蜜以和胃也。薑為嘔家聖藥。蓋辛以散之。嘔乃氣逆不散。以其能行陽散氣也。○乾生薑溫中主噉。治脹滿。霍亂嘔吐。不止腹痛者。宜之。較生薑稍守。較乾薑稍緩。為屑和酒服。治偏風頭痛。○薑皮辛涼。能消四肢浮腫。腹脹痞滿。五皮散用之。古云。秋不食薑。令人瀉氣。而新薑尤當忌之。目疾痔瘡。勿食。患癰疽人食之。則生惡肉。妊婦嗜食。令子餘指。

乾薑

其味者白薑

辛熱無毒。或生用。或炮黑用。炮法。厚切。鐵銚內。烈火燒。勿頻動。俟銚面火然。略噴以水。急

挑數轉。入罈中。勿泄氣。候冷。則裡外通黑。而性不烈也。本經主胸滿。效逆上氣。溫中止血。出汗。逐風濕

痺。腸辟下痢。生者尤良。發明。乾薑。宣陽氣之正。雖烈無毒。其味本辛。炮之則苦。專散虛火。用治裡寒。

止而不移。非若附子行而不守也。生者能助陽去藏府沉寒發諸經寒氣。腹中冷痛霍亂脹滿皮膚間結氣止嘔逆治感寒腹痛腎中無陽脈氣欲絕黑附子為引。理中湯用之。以其溫脾也。四逆湯用之。以其回陽也。生則逐寒邪而發表。胸滿欬逆上氣出汗。風濕痺宜之。炮則除胃冷而守中。溫中止血腸澀下利宜之。曷觀小青龍四逆等方。並用生者。甘草乾薑湯獨用炮者。其理中丸中。雖不言炮。在溫中例治不妨隨緩急裁用。然亦不可過多多用。則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣也。少用則收攝虛陽。溫以順之。是少火生氣也。同五味子以溫肺。同人參以溫胃。同甘草以溫經。凡血虛發熱。產後大熱。須炮黑用之。有血脫色白。天然不澤。脈濡者。宜乾薑之辛溫以益血。乃熱因熱用。從治之法也。又入肺利氣入腎燥濕入肝引血藥。生血於亡血家。有破宿生新。陽生陰長之義。如過用涼藥。血不止。脈反緊疾者。乃陽虧陰無所附。加用炮薑炙甘草可也。陰虛有熱。血熱妄行者。勿用。以其散氣走血也。

胡荽

羌名

辛溫微毒。服白朮牡丹皮者忌食。

發明

胡荽辛溫香竅內通心脾。外達四肢能辟一切

不正之氣。酒後煎湯漱洗。則絕無酒氣。痘瘡出不快者。搗濕衣被發之。如春夏陽氣發越。時用之。反助熱毒。恐變黑隘。不可不慎。華陀云。患狐臭人。勿食。口氣蠱齒人。食之。加劇。服雲母鍾乳人。勿食。為其辛溫能解諸藥之力也。

藎香

辛平無毒

發明

草藎香入足太陽手足少陰。能開胃進食。專治膀胱疝氣。及腎氣衝脇。如刀

刺痛。喘息不便者。生搗熟酒絞服。以其辛香不竅。善降濁陰之氣也。下焦多火。強陽易舉者。勿食。

斬俗名

甘微辛小毒

本經主女子赤天下血。養精保血。脈益氣。令人肥健嗜食。

發明

按斬有兩

種。一種生平田者。曰早斬。稟青陽之氣而生。氣味辛竅。能清理胃中濁濕。故本經主女子赤沃濁。濕去則

胃氣清純。而精血有賴。令人肥健嗜食。一種水陂澤者。曰水斬。得濕淫之氣而生。氣味辛濁。有蟲子在葉

間。視之不見。食之令人為患。面青手青。腹滿如妊。痛不可忍。作蛟龍病。但服鞭腸二三升。吐出便差。大抵

是蛇蟻之毒。爾其根白盈尺者。曰馬斬。食之令人發瘡疥。以其濕熱之氣最盛也。和醋食之。損齒有鼈瘕。

人不可食

菠菱 甘冷滑無毒 發明 凡蔬菜皆能疏利腸胃而菠菱冷滑尤甚多食令人脚弱發腰痛動冷氣與鮭魚同食發霍亂取汁煉霜制砒汞伏雌黃硫黃毒

薤菜 甘平無毒 發明 薤菜幹柔如蔓而中空以之橫地節節生根南方之奇蔬也專解野葛毒生搗服之尤良搗汁和酒服治產難取汁滴野葛苗當時姜死其相畏如此

同蒿 甘溫無毒 發明 同蒿氣濁能助相火禹錫言多食動風氣薰人心令人氣滿千金言安心氣養脾胃消痰飲利腸胃者是指素稟火衰而言若腎氣本旺不無助火之患

折筴子 薤菜 辛微溫無毒 本經明目治目痛淚出除痺補五藏益精光 發明 折筴即薤之大而有毛者與薤之性不甚相遠其子專於明目千金治目暗去醫方用之亦治目中膏肉搗篩為末夜夜點之久久其膜自落甄權以薤治青盲不見物補五藏不足二薤之性總不出本經主治也

菟子 甘冷利無毒 本經主青盲明目除邪利大小便去寒熱 發明 時珍曰菟子去青盲白醫與青箱同類異種故其治目之功彷彿聖惠以菟子治大小便不利無外乎本經主治也

馬齒莧 酸寒無毒 菘曰辛溫即莧之赤色者 發明 馬齒莧功專散血消腫故能治血瘤及多年惡瘡搗敷不過兩三遍即愈解馬汗射工毒塗之瘡燒灰和梳垢封疔腫先灸後封之其根即出不可同鱉食令成鱉瘕

翻白草根 甘微苦平無毒 發明 翻白草出救荒本草楚人謂之湖雞臍淮人謂之天藕時珍曰湖雞腿生近澤田地高不盈尺一莖三葉尖長而厚有皺紋鋸齒面青背白四月開小黃花結子如胡荽子

中有細子根狀如台木兩頭尖剝去赤皮其內白色如雞肉食之有粉小兒生食之荒年掘以和飯食兒科痘瘡拔疔方用之取其涼潤解毒也

蒲公英 俗名切草苗 高尺餘者良 甘平無毒 發明 蒲公英屬土開黃花味甘解毒散滯氣然必鮮者搗汁

蒲公英 俗名切草苗 高尺餘者良 甘平無毒 發明 蒲公英屬土開黃花味甘解毒散滯氣然必鮮者搗汁

和酒脫治乳癰效速服罷欲睡是其功驗微汗而愈

落葵一名蒺葵亦名燕時菜俗名染綠子 酸寒滑無毒 發明 落葵蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟紫所在

有之揉取汁紅如胭脂女人飾面點唇及染布帛謂之胡胭脂亦曰染綠子但久即色易變別錄言滑中

散熱時珍云利大小腸子仁可作面脂和白蜜塗鮮華立見

葢草一名魚腥草 辛微温小毒 發明 魚腥草方藥罕用近世僅以煎湯薰滌痔瘡及敷惡瘡白禿又治

咽喉乳鵝搗取自然汁灌吐頑痰殊效別錄主疔毒尿瘡又云多食氣喘患脚氣人勿食千金言素有脚

氣人食之一生不愈時珍云散熱毒癰腫脫肛斷疔疾解烟毒合上諸治總不出辟諸毒瘡毒即治痔

瘡亦是濕熱生蟲之患專取穢惡之氣以治穢惡之疾同氣相感之方也

蕨 甘寒滑無毒 發明 蕨性寒滑不可生食搜神記言有甲士折蕨食之覺心中怏怏成疾後吐一

小蛇漸乾成蕨孫真人云久食成癥信與前說相符耳

黃獨即土 甘辛寒小毒不可弱灌灌之則苦 發明 土芋解諸藥毒生研水服當血出惡物便止煮

熟食甘美不饑厚人腸胃去熱嗽小兒熟食能稀痘解痘毒瘡毒其藤燒灰敷痘爛成瘡可無痕痕

薯蕷即山藥因唐代宗名預宋英宗名畧改名山藥 甘平無毒同麵食發動氣微焙用 本經治傷中補虛羸除寒熱邪氣補

中益氣力長肌肉強陰久服耳目聰明輕身不饑延年 發明 山藥入手足太陰色白歸肺味甘歸脾

大補黃庭治氣不足而清虛熱故本經治傷中寒熱邪氣補而不滯温而不熱又能益氣力長肌肉強陰

固腎止泄精小便頻數肺為腎之上源源既有滋流豈無益金匱八味丸用以強陰也薯蕷丸以之為君

而主虛勞不足風氣百病甘温平補而不礙久積之邪也其鮮者和生鯽魚腦搗敷腫又搗爛和芎藭末

白糖霜塗乳癖結塊及諸痛日久堅硬不潰但塗上奇瘡不可忍忍之良久漸止不過數次即愈○子名

零餘子補虛損強腰脚益腎○一種曰甘藷色較薯蕷稍紫味較薯蕷稍甜質較薯蕷稍膩性較薯蕷稍温補脾強腎之功較薯蕷稍勝廣人以之代糧今徽益亦多種之名曰薯音糯與藷字形切音並相類傳

久之訛耳

百合 甘平無毒。白花者補脾肺。赤花者名山丹。散瘀血藥用之。本經主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣。發明 百合能補上清金止嗽利小便。仲景百合病兼地黃用之。取其能消瘀血也。本經主邪氣腹脹心痛亦是散積畜之邪。今世所昧也。其曰利大小便者性專降泄耳。其曰補中益氣者邪熱去而脾胃安矣。然性專降泄中氣虛寒二便滑泄者忌之。○紅花者活血治婦人崩中其莖敷疔腫惡瘡按中吳紀聞云百合乃蚯蚓所化此洵有之余親見包山土罇中有變化未全者大略野生百合。蚓化有之其清熱解毒散積消瘀乃蚓之本性耳。

茄一名 甘寒小毒 發明 茄性寒利多食腹痛下利女人能傷子宮發動痼疾秋後多食損目。老裂者燒灰治乳裂根治凍瘡皴裂者湯漬之良。其白茄根入風濕藥浸酒服。其白茄蒂蘆硫黃末擦白癩風紫茄蒂蘆硫黃末擦紫癩風取其散風毒瘀血也。丹方治腦疽初起用茄蒂燒灰存性酒服未潰即消又方用茄蒂中骨七枚生何首烏一兩煎服連進三服即愈。

苦瓠即細頭葫蘆 苦寒有毒 本經治大水面目四肢浮腫下水令人吐 發明 瓠有甜苦二種甜者雖言無毒亦不利人。扁鵲云患脚虛脹者不得食之患水不差苦者尤傷胃氣不可輕試。凡苦寒藥皆能伐胃不獨瓠也。本經治大水浮腫又云下水令人吐大傷中氣今人治黃痺水氣大小便不通或浸火酒飯上蒸或實糖霜煨存性必暴病實證庶可刮之。若久病胃虛誤服必致吐利不止往往致斃可不慎歟。其子煎汁或酒浸治鼻室氣塞少少滴入。又目疾胥肉血腎藥中亦有用作苦寒以降火也。○長柄葫蘆燒灰存性腋下癭瘤研末擦之以愈為度。

冬瓜子冬瓜 甘寒子甘平無毒 本經令人悅澤好顏色益氣不饑輕身耐老 發明 冬瓜利大小

腸壓丹石毒其子治腸癰去面黧潤肌膚及作面脂即本經悅澤好顏色之用也。○瓜練絞汁服治五淋壓丹石毒。

越瓜即菜瓜俗名生瓜長可尺餘有青白二色青者尤勝 甘平小毒 發明 越瓜生於越中今湖州等處最多僅供蔬菜故名

菜瓜生食動氣令人心痛臍下癢結脚弱不能行 天行病後不可食惟解酒毒利小便宜之 燒灰敷口瘡

及陰莖熱瘡以其能解熱毒收濕氣也

胡瓜今名黃瓜張騫使西域得種故名胡瓜隋時避石勒名改呼黃瓜至今因之 甘寒小毒 發明 黃瓜甘寒故能清熱利水善解火毒

此人坐卧坑床故以此為珍品南人以此之供蔬甚不益人多食動氣發寒熱發瘡疥發脚氣令人虛熱上

逆天行後不可食小兒切忌作瀉生疳其治咽喉腫痛用老黃瓜去子以芒硝填滿陰乾為末每以少許

吹之杖瘡吹腫取黃瓜入磁瓶中河水浸之每以水掃瘡上立效火眼赤痛老黃瓜挖去瓢入芒硝令滿

懸陰處待硝出刮下磁罐收貯留點眼甚效湯火傷灼五月五日以黃瓜搗碎入瓶內封掛簷下取水刷

之皆取其甘寒以解毒也

南瓜種出南番故名 甘溫有毒 發明 至賤之品食類之所不屑時珍既云多食發脚氣黃瘡不可同羊肉

食令人氣壅其性滯氣助濕可知何又言補中益氣耶前後不相應如此

絲瓜 甘寒無毒 發明 絲瓜嫩者寒滑多食瀉人蔬菜中最不足取其老者經絡貫串房隔聯屬故

能通人經脈支絡而解熱消腫祛毒殺蟲及治諸血病故痘瘡不快用老絲瓜近蒂三寸連皮燒灰存性

為末砂糖水服甚效以其甘寒解毒而無滑瀉之虞也其立冬後小絲瓜焮入硃砂服之能稀痘其絲瓜

藤取近根三五寸燒灰存性為末治鼻淵時流臭濁水酒調日服方寸匙效其葉搗汁生服解一切蛇傷

之毒即以滓盪傷處乾即易之

苦瓜一名錦荔枝 苦寒無毒 發明 錦荔枝有長短二種生青熟赤生則性寒熟則性溫閩粵人以長者

去子但取青皮煮肉充蔬為除熱解煩清心明目之品短者性溫其子苦甘內藏真火故能壯陽益氣然

須熟赤方有殊功 紫菜 甘鹹寒無毒 發明 凡癭結積塊之疾宜常食之鹹能要堅之義多食令人腹痛發冷氣吐白

沫飲熱醋少許即消

石花菜 甘鹹寒無毒 發明 石花煮肉夏月必凍下部虛寒及脾氣不充者勿食

木耳 甘平無毒 發明 木耳稟濕土之氣而生於朽株故有稟精冷腎之患然治痔瘡放腫崩中漏

下大驗俱炒見煙為末酒服方寸匙

桑耳蘇上 甘平有毒有桑城桑雞桑黃桑巨等名 本經黑者主女子漏下赤者治血病癥瘕積聚陰

痛陰傷寒熱無子 發明 桑耳涼潤善祛子藏中風熱不但主漏下血病併可以治寒熱積聚積聚去

不難成孕本經專取黑者達腎赤者走肝補中寓瀉瀉中寓補之機具見言外矣其黃熟陳白者止久洩

益氣金色者治癖飲積聚及腸風瀉血衄血五痔下血血痺虛勞咽喉痺痛一切血證咸宜用之○槐耳

治五痔脫肛○柳耳治反胃吐痰○柘耳治肺癰欬吐膿血不問已成未成皆可用之

香草 甘平無毒 發明 諸草稟土之熱毒浮長所以有毒傷人惟香草柘木上糯米種出大益胃氣

與麩菴雞蹤性味不殊麩菴亦埋桑楮諸木於土中澆以米泔而生其長大色白柔軟中空如雞腿者名

雞腿麩菴狀如羊肚有蜂窠眼者名羊肚菜其出雲南生沙地間高脚繖頭者曰雞蹤菜皆能益胃清神

麩菴菴能化痰雞蹤兼能治痔一得桑楮餘澤一鍾山川靈氣故其性各有不同耳

土草韓通 甘寒有毒 發明 處處山中有之以其得嵐嶂鬱蒸之氣而生助長濕熱最甚過食令人

腹痛顛脹或發痰氣嘔逆其在初春蟄蟲未起之時為毒尚淺夏秋濕熱盛行之時毒邪尤甚以其多有

蛇蛻之毒也即生朽株上者除槐榆松柳杉桑及蘆葦根者食之無虞然日久蟲生味苦亦不宜食他如

皂莢苦竹茅根生者不無小毒食之多發瘡疥而生於楓樹上者食之毒攻心包令人笑不止急以苦茗

地漿或生白礬研新汲水解之諸菌之可食者首推雷驚菌次則糖菌松花菌味極鮮美若味苦或辣皆

為有毒切不可食至如光白如銀中反有光上有毛下無紋底無贈襪仰卷色赤欲爛無蟲洗之水黑煮

之不熟者並有大毒傷人中其毒者非地漿清蠱不能救之音聞有人得一大菌光潤可愛置之瓶中蠅

納撲上即死究其所得之處乃在古塚穴中洵為杪枋之毒無疑今人煮菌每以銀飾併燈心草置鍋中但驗其銀色黑者即為有毒近見食葷而死者與河豚無異特表而出之

果部

李根白皮 苦微鹹寒無毒災黃用 發明 藥性論云入藥用苦李根皮而仲景治奔豚氣黃豚丸用甘李根白皮時珍疑為二種不知仲景言甘是言李之甘藥性言苦是言根之苦但宜用紫李根則入厥陰血分若黃李根則入陽明氣分矣別錄治消渴奔豚大明治赤白痢下千金燒存性敷小兒丹毒甄權治消渴腳氣蓋說治婦人赤白帶下皆取苦鹹降逆氣也李核仁苦平入肝療僵仆瘀血骨痛又能清血海中風氣令人有子故承澤丸用之其性散結故能解硫黃白石英附子毒為末和雞子白敷面點一宿即落千金方也黃帝云李子不可和白蜜食蝕人五內

杏仁 苦辛甘溫小毒湯泡去皮尖研如泥用兩仁者有毒傷人凡果花六出者必雙仁得純陰之氣也本經主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心貴豚 發明 杏仁入手太陰經辛能橫行而散苦能

直行而降遂為散邪降氣定喘泄滯散結潤燥除肺中風熱欬總不出本經主治也千金以童便浸七日研如泥治欬寒熱仲景麻黃湯用杏仁者為其利氣瀉肺解肌也至於臨胸麻仁等圓皆熬黑研膩

如油則知此物之性愈熬黑愈潤下矣入肺寒喘逆發散藥連皮用之又能治瘡殺蟲用其毒也本經治金瘡寒心者傷處風藉內入胞絡而心下惡寒用以塗封瘡口拔散風熱之邪也言治貴豚者辛能散結

潤能下氣也元素言潤大腸氣秘之才言解錫毒別錄言殺狗毒炒香消狗肉及索粉穢故六神麴用之扁鵲云杏仁不宜久服令人面目鬚髮落耗氣之驗也今人以之混治陰虛喘嗽轉耗胸中大氣為患不

淺亡血家尤為切禁以其味辛性溫大能破血也雙仁者搗爛以車脂調塗鍼斷入肉及箭鏑在咽隔諸隱處敷之即出巴旦杏仁則甘平無毒能止欬下氣消心腹逆悶杏寔味酸傷人筋骨生者尤甚

梅桐梅 酸平無毒 本經主下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑痣蝕惡肉 發明

梅花開於冬而實孰於夏得木之全氣故其味最酸人舌下有四竅兩竅通膽液故食則津生類相感應也所主之病皆取酸收之義梅之種類最多惟糊梅最勝相傳是直武折梅枝插糊樹株而誓曰吾道若成花開果實其種從均州太和山來糊即榆樹中之一種其梅如杏而鬆脆異常故近世謂之消梅食之開胃生津清神安睡乃糊之本性也本經下氣除熱煩滿安心止肢體痛皆指陳藏者而言若青梅則凝滯帶氣決非偏枯不仁者所宜凡穀食菜果皆爾不獨青梅為然烏梅酸收益津開胃同建茶乾薑治体息痢能斂肺瀆腸止嘔斂汗定喘安蛇仲景治蛇厥烏梅丸用之蟲得酸即止用丸不用湯者欲留有形之物入於蟲口也今治血痢必用之中風驚痰喉痺腫痛痰厥僵仆牙關緊閉者取烏梅擦牙齦即開血痢不止以烏梅燒存性米湯服之漸止惡瘡腐肉亦燒灰研敷惡肉自消此即本經去死肌惡肉之驗又丹方治女人脚上雞眼烏梅肉飯上蒸爛和米醋研如糊塗上一夕即去○白梅鹹酸主中風牙關緊閉擦牙根涎出即開去腐肉方多用之竹木鍼刺在肉中者嚼數即出○梅核仁明目益氣除煩熱能清婦人子藏中風氣積滯千金承澤丸用之梅葉煮汁治休息痢及乾霍亂効以之漬水洗葛則不脆洗夏衣生黴點即去有驗

桃仁 苦甘平無毒去皮尖生用即和血連皮尖炒用即破血同乾漆拌炒大破宿血雙仁者有毒勿用

本經主瘀血血閉癥瘕邪氣殺三蟲發明 桃仁入手足厥陰血分為血瘀血閉之專藥苦以泄滯血

甘以生新血必竟破血之功居多觀本經主治可知仲景桃核承氣抵當湯皆取破血之用又治熱入血

室瘀積癥瘕經閉瘡母心腹痛大腸祕結亦取散肝經之血結熬香治癩疔痛癢千金法也○桃實甘酸

多食令人腹熱作瀉○桃奴殺百鬼精物療中惡腹痛瘀血癥堅破血酒磨服止血燒灰服○桃樹上膠

最通津液能治血淋石淋痘瘡黑陷必勝膏用之○桃葉治傳屍有水灸法方用桃葉一斗艾葉厚朴各

二兩分二囊盛置以火酒數斤煮沸更迭煮藥耐患人背脊酒盡為度不過三次瘀蟲永絕又瘡中小蟲

搗爛塗之

栗 鹹溫無毒 發明 栗腎之果也腎病宜風乾者食之若脾胃虛寒暴瀉須煨熟食之栗楔一匙三顆中扁者療筋骨風痛又能破冷瘰癧生嚼晉惡刺出箭頭栗扶肉上薄皮也燒存性治骨鯁在喉吹入即下栗殼煮汁治反胃消渴毛毯外刺包也煮汁洗火丹毒腫栗花治瘰癧栗樹皮煮汁洗沙蟲溪毒并丹毒瘡毒根治偏墜腎氣酒煎服之

大棗 甘平無毒入藥取大紅棗摩去核用多食令齒生蠱 本經主心腹邪氣安中養脾氣平胃氣通九竅助十二經補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥 發明 棗屬土而有火為脾經血分藥甘先入脾故用薑棗之辛甘以和榮衛也仲景治奔豚用滋脾土平腎氣也十棗湯用以益土勝邪水也而中滿者勿食故仲景建中湯心下痞者減飴棗與甘草同例此得用棗之法矣金匱治婦人藏燥悲愁欲哭有甘麥大棗湯亦取其助肝脾肺三經之津液以滋其燥耳本經主心腹邪氣亦是和榮衛邪之義平胃氣者以其甘溫健運善平胃中敦阜之氣也素問以棗為脾家之果故本經又主身中不足大驚四肢重用此補益脾津而神氣自盈肢體自捷矣古方中用大棗皆是紅棗取生能散表也入補脾藥宜用南棗取甘能益津也其黑棗助濕中火損齒生蟲入藥非宜生棗多食令人熱渴氣脹瘦人多火者彌不可食

梨 甘微酸寒無毒 發明 別錄者梨止言其善不錄其功蓋古人論病多主傷寒客邪若消痰降火除客熱止心煩梨之有益益亦不少近有一人患消中善饑諸治罔效因煩渴不已恣啖梨不徹不藥而瘳一婦鬱抑成勞效嗽吐血右側不得貼席者半年或令以梨汁頻熱服蓋許即時吐稠痰結塊半盞是夜便能向右而卧明日復飲半盞吐痰如前已後飲食漸增雖尋常食品單刀直入可以立破沉疴而梨之種類最多惟乳梨鵝梨消梨可以療病然須審大便實者方可與食元氣虛者不慎而誤啖之往往成寒中之患豈可概謂食之有益乎

木瓜 酸溫無毒 發明 木瓜酸收下降所主霍亂轉筋吐利脚氣皆取收攝脾胃之濕熱非肝病也

轉筋雖屬風水行脾實由濕熱或寒濕之邪襲傷脾胃所致用此理脾而伐肝也多食木底損齒及骨皆伐肝之明驗患頭風人以鮮者放枕邊引散肝風日久漸安凡腰膝無力由於精血虛陰不足者及脾胃有積滯者皆不利於酸收也

山楂御藥也 甘苦微酸溫無毒去核則不發熱童便浸薑汁拌炒黑去積血甚捷 發明 山楂入

足陽明大陰厥陰三經血分大能剋化飲食本經言其酸冷然其功長於消肉積行滯血性溫可知若胃

中無食積脾虛不能運化不思飲食者服之反剋伐脾胃生發之氣良非所宜炒黑治產後兜枕作痛亦

以其能消血也今痢疾初起多積垢者用薑汁炒治偏墜疝氣為散酒服不過半月效用核尤捷若外感

風寒兼傷飲食舉世以發表消導並進中氣寔者幸而獲痊虛者表邪乘虛陷入於府而生內變者多矣

○東魯棠棣子酒後嚼數顆良與糖作膏尤為精品

柰俗名 甘溫無毒 發明 柰生北地與南方林檎同類異種雖有和脾之能多食令人肺壅臚脹病

人尤當忌食

林檎俗名 溫無毒 發明 林檎雖不傷脾多食令人發熱以其味溫性溫也病人每好食此多致

復發或生痰涎而為欬逆壅閉氣道使然其核食之煩心助火可知

柿蒂 溫平無毒柿蟹同食則吐利腹痛木香可解 發明 柿之生青熟赤生溫熟甘渾是陰內陽外

之象獨蒂之溫始終不改故取以治陰內陽外之病濟生方治呃逆專取柿蒂之溫以斂內蘊之熱丁香

生薑之辛以散外鬱之寒深得寒熱兼濟之妙用膏考古方中有單用柿蒂以降逆氣者是以丹溪但執

以寒治熱之理而不及從治之法矯枉過矣至三因方又於濟生方中加良薑之類是真為寒而反助其

熱乎○其乾柿白霜專清肺胃之熱在元氣未瀉可勝寒潤者用之固宜但虛勞煩嗽喘乏得此鬱閉虛

陽病根日固與理新灰燼何異

安石榴 子甘酸皮溫無毒 發明 榴味甘酸具木火之象故多食傷肺損齒而生痰涎其皮溫

能治下痢滑脫一種小者曰酸石榴治痢尤捷千金治痢方皆用之酸兼收斂故能止下痢漏精崩中下血丹方以酸石榴連皮子搗汁入薑茶煎治寒熱利又久痢用榴皮燒灰人參湯下一錢屢驗○榴花曝乾研細吹鼻止衄最速干癖者更良功在山茶花之上

橘皮 苦辛溫無毒產粵東新會陳久者良陰虛乾欬蜜水製用婦人乳房癰癢醋拌炒用 本經主胸

中痰熱逆氣利水穀久服去口臭下氣通神 發明 橘稟東南陽氣而生故以閩粵者最勝其踰淮而

北則變為枳此地氣使然與人之鄉音習俗無異橘之文采煥發於外故其功用都在於皮專行脾肺二

經氣分本經主治胸中痰熱逆氣為消痰運脾之要藥留白則補脾胃去白則理肺氣同人參白朮則補

脾胃同人參甘準則補肺獨用則瀉肺損脾其治百病總是取其理氣燥濕之功同補藥則補同瀉藥則

瀉同升藥則升同降藥則降脾乃元氣之母肺乃攝氣之籥故為二經氣分藥但隨所配而補瀉升降也

同生薑則止嘔同半夏則豁痰同杏仁治大腸氣秘同桃仁治大腸血秘皆取其通滯也○橘紅專主肺

寒欬嗽多痰虛損方多用之然久嗽氣泄又非所宜按橘皮下氣消痰其瓢生痰聚飲一物而性之殊異

如此

青橘皮 辛溫無毒醋炒用割去酸水作四界者曰蓮花青皮細如豆者為青皮子中有小橙莫能辨別

發明 青橘皮古方所無至宋時醫家乃用之入足太陰厥陰破滯氣削堅積及小腹疝疝用之以疎

通二經行其氣也小兒消積多用之青皮最能發汗多汗者勿用久瘧熱甚必結癖塊宜多服清脾飲內

有青皮疎利肝邪則癖自不結也中氣虛人禁用以其伐肝太甚而傷生發之氣也

橘核 苦溫無毒去殼焙香研碎用細者為橘核粗即橙核 發明 橘核沉降入足厥陰與青皮同功

故治腰痛瘡疔在下之病不獨取象於核也然惟實證為宜虛者禁用以其味苦大傷胃中沖和之氣也

橘葉 苦平無毒 發明 橘葉苦平導胸膈逆氣消乳癰搗爛和麩熨傷寒胸膈痞滿又治肺癰絞汁

一盞服吐膿血愈

柑 辛苦微寒無毒 發明 柑皮產廣東化州者最勝與橘皮雖同為下氣之品然性之溫寒各異故開寶取利腸中熱毒解丹石止暴渴利小便皆取辛寒以散熱滯也世罕知用惟千金方中用之云甘皮者即此

橙 酸寒無毒 發明 橙性酸寒方藥少用其鮮者惟殺魚解毒和鹽貯食止惡心解酒病疔瘡寒熱禁食以其酸寒能滯邪氣也其核治閃挫腰痛炒研酒服三錢即愈

柚 酸寒皮甘辛無毒 發明 柚能解酒辟飲酒人口氣皮能下氣化痰與金橘性相類但金橘甘酸下氣尤捷

柑椀 柑椀舊作均椀 辛苦甘溫無毒 發明 柑椀乃佛手香椀兩種性味相類故綱目混論不分蓋

柑者佛手也專破滯氣今人治痢下後重取陳年者用之但痢久氣虛非其所宜椀者香椀也兼破痰水

近世治欬救氣壅亦取陳者除去穢核用之庶無酸收之患丹方治鼓脹諸藥不效用陳香椀一枚連穢

大核桃肉二枚連皮縮炒仁二錢去膜各煨存性為散砂糖拌調空腹頓服後水從臍出屢驗

金橘 金橘 酸甘溫無毒 發明 金橘形如彈丸金柑形如牛奶一皆酸甘香竅並能下氣快膈止渴解醜而圓者尤佳

枇杷葉 辛苦平無毒 刷去毛蜜炙用 發明 枇杷味甘色黃為脾家果然必極熟乃有止渴下氣潤

五臟之功若帶生味酸力能助肝伐脾食之令人中滿泄瀉○其葉氣味俱薄故入肺胃二經治夏月傷

暑氣逆最良近世治勞嗽無不用之蓋取其和胃下氣氣下則火降痰消胃和則嘔定嗽止然胃寒嘔吐

及風寒欬嗽忌之○其核大寒而伐肝脾以之同落蘇入麩醬則色青翠同蟹入鍋煮則至熟不赤性寒

走肝可知

楊梅 甘酸溫無毒 發明 楊梅為心家血分之果兼入肝脾心包能止渴除煩燒灰則斷痢鹽藏則

止噦嘔消酒但血熱火旺人不宜多食恐動經絡之血而致衄也其性雖熱而能從治熱鬱解毒其根皮

煎湯能解砒毒燒灰油調塗湯火傷核仁療腳氣然須多食以柿漆拌核爆即自裂也

櫻桃含砒 甘熱小毒 發明 櫻桃屬火而發濕熱舊有熱病及喘嗽者得之立發一種小者名山櫻

桃性味甘平而不發熱能止腸癖滑精豈以形之不材而反食之無害耶其核今人用以升發麻斑力能

助火大非所宜在春夏尤為切忌

銀杏俗名白果 甘苦平瀋無毒 發明 銀杏定喘方用之生嚼止白濁降痰消毒殺蟲毒鼻面手足去皺

炮野鷄生搗能浣油膩同水搗漿衣殺蟲去痰滌垢之功可例推矣熟則壅遏閉氣多食令人臃脹昏

悶昔有饑者薄暮食此過多次日脹悶欲死急以搗翎蘆香油探吐方可得生煮清灌之亦生取其能降

泄也

胡桃一名核桃又名羌桃 甘平溫無毒入藥連皮用 發明 補骨脂屬火能使心包與命門之火相通胡桃屬

水潤燥養血佐補骨脂有水火相生之妙胡桃肉類三焦而外皮水汁皆青黑故能通命門助相火同補

骨脂杜仲青鹽名青蛾丸治腎虛腰痛以其能補腎也同人參名應夢散治肺寒喘嗽以其能斂肺也同

生薑咀嚼亦治寒痰喘嗽若多食動風脫人眉毛詳其同錢細嚼即與銅俱化與甘蔗同嚼則蔗渣消融

其消肺燥肝可知丹方用其瓢燒令黑和松脂傅瘰癧有效又以連皮胡桃肉同貝母全蠍枚數相等蜜

丸治鼠瘻痰核總取以通鬱結也但肺有痰熱命門火熾者勿食其殼燒灰存性治乳壅取灰末二錢酒

調服之未腫即消已潰漸斂但不可以其煙薰衣即易毀青胡桃皮塗髮皆黑

長生果一名落花生 甘溫無毒 發明 長生果產閩地花落土中即生從古無此近始有之味甘氣香能

健脾胃飲食難消運者宜之或云與黃瓜相反予曾二者並食未蒙其害因表出之

貨貨葡萄 甘微鹹溫無毒 發明 貨貨葡萄似葡萄而質細故有貨貨之名生於漠北南方間亦有

之其幹類木而係藤本其子生青熟赤乾則紫黑能攝精氣歸宿腎藏與五味子功用不甚相遠凡藤蔓

之類皆屬於筋草木之寔皆達於藏不獨此味為然此物向供食品不入湯藥故本草不載近時北人以

之強腎南人以之稀痘各有攸宜強腎方用貨貨葡萄人參各一錢火酒浸一宿侵晨塗手心摩擦腰脊能助腎力強壯若卧時摩擦腰脊力助陽事堅強服之尤為得力稀痘方用貨貨葡萄一歲一錢神黃豆一歲一粒杵為細末一陽夜蜜水調服併擦心窩腰眼能助腎祛邪以此地方物專助東南生氣之不足也然惟稟質素弱者用之有益若氣壯偏陽者勿用恐其助長淫火之毒也

橡實 苦溫無毒 發明 橡寔消穀止痢厚腸胃令人強健且能治痔漏脫肛千金方治石癰堅硬如石不作膿用橡子一枚蘸醋於石上磨汁塗之乾則易不過十度即平共殼為散及煮汁服止下痢併染鬚髮

槲皮龍_{一名赤} 苦溫無毒 發明 槲皮煎服除蟲及漏惡瘡甚效能治赤白痢腸風下血肘後方治下部敗爛瘡亦龍皮散以之為君千金方治附骨疽瘰癧疾及蠱毒多用之皆取苦澀化毒也

荔枝 肉甘溫核瀆無毒治疝取建產潤肩之核良 發明 荔枝實氣味純陽能散無形之滯氣瘤贅赤腫宜之多食發熱煩渴口乾衄血而核入厥陰經行散滯氣其寔雙結而核似罌凡故治癩疔囊腫有述類象形之義時珍治癩疔氣刺痛婦人血氣刺痛小而肉似龍眼其核尖小僅堪醋磨療癬治疔無效龍眼_{俗名} 甘平無毒桂產者佳粵東者性熱不堪入藥 發明 龍眼補血益肝同枸杞熬膏專補心脾之血歸脾湯用之始思慮傷心脾皆取甘味歸脾能益人智之義然中滿家嘔家勿食為其氣壅也師尼寡婦勿用以其能助心包之火與三焦之火相煽也

橄欖_{青名} 瀉甘溫無毒 發明 橄欖先瀉後甘生津止渴開胃消痰醉飽後及寒痰結嗽宜之熱嗽不可誤食病人多食令氣上壅以其性溫而瀉聚火氣於胃也又能消酒解鯀給河豚諸魚鼈毒觀朱魚食橄欖查即斃能解毒可知故嚼汁嚥之能治魚骨鯁有效患痘瘡者宜多食以其解毒而助胃中溫和之氣令痘起發也又核燒灰蜜丸同黃獨服能稀痘但性專搜滌胎毒過服令人嘔瀉嬰兒初生胡桃肉連皮三枚橄欖核燒灰一枚硃砂雄黃各一分研細和甘草汁生白蜜絞去滓開乳前頓熱服之可代

化毒丹。但化毒丹治胎熱面赤。此治胎寒面白不可混也。又灰末敷金瘡無癰生核磨水搽癩漸滅。

榧子 甘溫有毒。本經主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒。鬼疰伏尸。發明 榧寔肺家果也。性溫散

氣故能去腹中邪氣三蟲諸疾。火炒食之引火入肺。多食則大腸受傷。小兒黃瘦有蟲積者宜食。與使君子同功。觀本經主治可知。

松子 甘溫無毒。發明 海松子甘潤益肺。清心止咳潤腸。兼柏仁麻仁之功。溫中益陰之效。心肺燥

痰乾欬之良藥也。

檳榔 苦辛溫無毒。發明 檳榔泄胸中至高之氣使之下行。性如鐵石之沉重。能墜諸藥。至於下極

故治衝脈為病。逆氣裡急。及治諸氣壅脹。腹脹後重如神。胸腹蟲食積滯作痛。同木香為必用之藥。其功專

於下氣消脹。逐水除痰。殺蟲治病。攻食破積。止瘧瘴疔。脚氣瘡癩。若虛氣下陷。人及隔上有稠疾結氣者

得之。其痞滿昏塞愈甚。又凡瀉後瘧後虛痢。切不可用也。閩廣瘴毒之鄉。人常食此。必以藟葉裹嚼之。所

云。能使之饑醉能使之醒者。以其能下氣也。云。饑能使之飽。醒能使之醉者。以藟葉辛溫能開發中外

之氣。以散瘴癘之邪也。

大腹子 即猓腹 辛溫無毒。此味與檳榔皆性堅難切。須用滾水泡漬切之。若以水浸濁滿。不但失其

性。味反有傷於胃氣也。發明 大腹子偏入氣分。體豐濕盛者宜之。夫檳榔偏主血分。腹滿多火者宜

之時。珍謂大腹與檳榔同功。似未體此。

大腹皮 辛溫有毒。鴛鳥多集其樹上。宜酒洗後。再以茱萸湯洗過。用其內粗者。耗氣宜摘去之。發

明 檳榔性沉重。泄有形之積滯。腹皮性輕浮。散無形之滯氣。故痞滿膨脹。水氣浮腫。脚氣壅逆者。宜之。

惟虛脹禁用。以其能泄真氣也。

馬檳榔 苦甘寒無毒。發明 馬檳榔生滇南夷地。不入湯藥。熱病食數枚。冷水下之。腫毒惡瘡。嚼一

枚并鹽腫處。產雜臨時細嚼數枚。并化水送下。須臾之產。再以四枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下。欲斷

產常帶二枚久則子宮冷自不孕矣

無花果 實甘平。葉微辛無毒。發明 無花果出雲南揚州亦多有之今吳楚閩越人家折枝插成枝

柯如枇杷樹三月發葉五月不花而實實出枝間狀如木饅頭熟則紫色軟爛其味如柿而無核也食之

開胃止洩治咽喉痛葉主五痔腫痛煎湯薰洗之

枳椇 一名雞距子 俗名雞距子 甘平無毒。發明 枳椇金鈎樹之子也本草止言木能敗酒屋外有此木屋內釀

酒皆不佳丹溪治酒病往往用其實又能止渴除煩去膈上熱潤五藏利大小便多服發蛇蟲以其大甘

助濕熱之所化也

水果部

西瓜 甘寒無毒。發明 西瓜瓢色赤味甘能引心包之熱從小腸膀胱下泄以其得西方金氣於三

伏中故能解太陽陽明中暍及熱病大渴故有天生白虎湯之稱而春夏伏氣發濕熱病竟得隔年藏者

嗽之如湯沃雪緣是世醫常以治冬時傷寒壞病煩渴從未見其得愈者良由不達天時不明鬱發之故

耳近有舶上來者五月便熱不必竟隔年藏者方宜時世之不同若此

瓜子仁 甘淡微溫無毒。發明 西瓜甘寒降泄子仁甘溫性升以中藏烈日之氣不無助火之責其

開豁痰涎是其本性世人咸謂瓜子生痰安有甫入口而便變痰涎之理按相感志云食西瓜後食其子

即不噎瓜氣其溫散之力可知綱目言其主治與甜瓜仁同豈甜瓜仁亦為生痰之物耶

甜瓜蒂 俗名苦 苦寒有毒。發明 本經主大水身面浮腫下水殺蟲毒咳逆上氣及食諸果病在胸

腹中皆吐下之。發明 酸苦涌泄為陰仲景瓜蒂散用瓜蒂之苦寒合赤小豆之酸甘以吐胸中寒邪

金匱瓜蒂湯治中暍無汗今人罕能用之又搐鼻取頭中寒濕黃癩得麝香細辛治鼻不聞香臭瓜蒂乃

陽明除濕熱之藥能引去胸膈痰涎故能治面目浮腫咳逆上氣皮膚水氣黃癩濕熱諸證即本經主治

也凡尺脈虛胃氣弱病後產後吐藥皆宜戒慎何獨瓜蒂為然哉故膈上無熱痰邪熱者切禁

甜瓜子即甜瓜 甘寒無毒 發明 甜瓜仁專於開痰利氣別錄治腹內結聚破潰膿血為腸胃內癰要

藥千金治肺癰有葶藶湯腸癰有牡丹大黃湯予嘗用之然必黃熟味甜者方不傷胃氣若生青味苦力

劣不堪入藥其瓢亦能去暑然脾胃虛人食之每致瀉痢不可不知

蒲桃縮名 甘寒無毒 本經治筋骨濕痺益氣力強志令人肥健耐饑忍風寒可作酒 發明 葡萄

之性寒滑食多令人泄瀉丹溪言東南人食之多病熱西北人食之無恙蓋能下走滲適西北人稟氣厚

故有本經所主之功無足異也

甘蔗 甘平無毒 發明 蔗脾之果也其漿甘寒能瀉火熱煎煉成糖則甘溫而助濕熱也蔗漿消渴

解酒自古稱之而孟詵乃為共酒食發痰者豈不知其有解酒除熱之功耶日華子又為砂糖能解酒毒

則不知既經煎煉便助酒為熱與蔗之性異矣即如甘草遇火則熱麻油遇火則冷此物性之異醫者

當知近世用以搗汁治痢服之有效以其甘寒養胃而清濕熱也

沙糖色黑如油者是 甘溫無毒 發明 沙糖性溫能和脾緩肝故治脾胃及瀉肝藥用為先導今人好吸煙

草受其毒者用此點湯解之但性助濕熱不可多食熬焦治產婦敗血衝心及虛羸老弱血刺不可攻者

最效

石蜜即水糖也散白如霜者曰糖霜與山蜂蜜結石上者不同 甘平無毒 發明 凝結成塊如石者為石蜜輕白如霜者為糖霜

比紫沙糖稍平功用雖同但白入氣分紫入血分為異白糖霜亦能解煙草之毒惟色黃者性熱有濕熱

者透之世言糖性濕熱多食令人齒齲生疳近見患口疳者細嚼冰糖輒愈取其達疳以磨濕熱凝滯也

又暴得咳嗽吐血乍止以冰糖與燕窩菜同煮連服取其平補脾胃而無止截之患也惟胃中有痰濕者

令人欲嘔以其甜膩戀膈故也

蓮藕 甘平瀉無毒 發明 蓮出於泥而無濁氣沾染其根通達諸竅聯絲諸絡允為交媾黃宮通調津液之上品入心脾血分冷而不泄濕而不滯產後血悶及血淋尿血宜之新產生冷皆忌獨生藕不禁

為其能止熱渴破留血也。生食止霍亂虛渴。蒸食開胃。寔下焦。搗浸澄粉服食。治虛損失血。吐利下血。又血痢口禁不能食。頻服則結。養自下。胃氣自開。便能進食。但市者皆豆麥菱粉偽充。不可混用。○藕節之味大瀉。能止暈脫。諸血產後血暈。隔水頓熱。和童子小便飲之。一人患血淋脹痛。百藥不應。以生藕汁調髮灰服之。三日血止痛除。以其性專散血而無傷耗真元之患也。

蓮實 甘平瀉無毒。去心中苦意。則不傷胃。發明 蓮子得水土之精英。補中養神。益氣清心。固精止瀉。除崩帶赤白濁。能使心腎交而成既濟之妙。昔人治心腎不交。勞傷白濁。清心蓮子飲。補心腎。益精血。有瑞蓮丸。皆取其補益黃庭實堤禦水之義。

石蓮子 甘寒無毒。發明 石蓮子本蓮實。老於蓮房。墮入淤泥。經久堅黑如石。故以得名。為熱毒噤口痢之專藥。取水土之餘氣。補助脾陰。而滌除熱毒。然必兼人參之大力。開提胃氣。方始克應。若痢久胃氣虛寒。口禁不食。則為戈戟也。况乎世鮮真者。今藥肆中。乃以一種水實偽充。其子出自粵東。大苦大寒。大傷胃氣。醫者不察。誤投傷殘之軀。往往輕者為重。重者致斃。至於腎虛精滑之人。誤認髓藏有熱。而峻用苦寒。鎚伐虛陽。精愈不能收攝。得無虛虛之患乎。

蓮鬚鬚 甘瀉溫無毒。忌地黃葱蒜。發明 蓮鬚清心通腎。以其味瀉。故為祕蓄精氣之要藥。三因固真丸。巨勝子丸。用之。然惟慾勤精薄者為宜。亢陽不製者勿用。恐其兜瀉為患也。○蓮花性味與鬚相類。惟取白花將開者。陰乾入藥。久服延年不饑。故經進萃仙丸用之。

蓮房 苦瀉溫無毒。發明 蓮房入厥陰。功專止血。故血崩下血。溺血皆燒灰用之。雖能止截。不似椶灰之兜塞也。

荷葉 苦瀉平無毒。發明 荷葉得清震之氣。故潔古枳朮丸。用荷葉燒飯為丸。東垣治雷頭風證。

頭面腫痛。疙瘩憎寒發熱。狀如傷寒。證在三陽。不可過用寒藥。清震湯治之。用荷葉升麻蒼朮煎服。又痘瘡為風寒外襲。而變黑倒靨。聞人現用荷葉合殭蠶。解結滯之氣。而痘自起。又燒灰單服。可消陽水浮腫。

入健脾藥。但用其蒂謂之荷鼻。取其味厚勝於他處也。戴元禮云。服荷葉令人瘦劣。非可常服。觀丹士縮銀法。用荷葉同鍛。則銀質頓輕。其性之消燂。無有甚於此者。

芡實俗名雞 甘平無毒。六經主濕痺腰脊膝痛。補中除暴疾。益精氣。強志。發明。芡生水中。而能

益脾利濕。觀本經所主。皆脾胃之病。遺精濁帶。小便不禁者。宜之。

芡實俗名 甘平無毒。發明。芡實多種。滯氣則一紅瀉白補。生降熟升。僅供食品。略無取於治療。患

瘧痢人勿食。過食令人腹滿腹脹。古法用麝香點蕩解之。近人以沉香磨汁導之。總取芳香散滯之力耳。

烏芋俗名芋蕒又 甘寒無毒。發明。烏芋善毀銅為消堅削積之物。服丹石人宜之。痘瘡乾紫。不能

起發。同地龍搗爛。入白酒釀絞服。即起。又治酒客肺胃濕熱。聲音不清。及腹中熱積。蠱毒。丹方治痞積。三

伏時。以火酒浸曬。每日空腹細嚼七枚。痞積漸消。故有黑三稜之名。凡有冷氣人勿食。多食令人患腳氣。

虛勞咳嗽。切禁。以其峻削肺氣。兼耗營血。故孕婦血渴忌之。

慈姑 苦甘微寒無毒。發明。主治百毒。產後血悶攻心。欲死。產難胞衣不出。並生搗汁服之。有腳氣

癱。緩風人勿食。以熟食壅氣也。葉治小兒遊風丹毒。搗爛塗之。即消。

味部

蜀椒 辛溫小毒。去目勿炒用。蜀產者微辛不辣。色黃者氣味微辛。散心包之火。最勝。色紅者氣味辛辣。

壯命門之火。最强。形如鵝鈴者真。以子種出。其葉十三瓣者。蜀椒也。閉口者有毒。傷人誤中。其毒吐沫吞

地漿水解之。本經主邪氣。效逆溫中。逐骨節皮膚死肌。寒熱痺痛。下氣。久服頭不白。發明。椒乃手

足太陰少陰厥陰氣分之藥。稟五行之氣而生。葉青皮紅。花黃。膜白子黑。其氣馨香。能使火氣下達。命門

故本經謂之下氣。其主邪氣。咳逆等證。皆是脾肺二經受病。肺虛則不能固密。腠理外邪客之。為咳逆。脾

虛則不能溫暖肌肉。而為痛痺等證。其治嘔吐服藥不納者。必有蠅在隔間。但於嘔吐藥中。加川椒數十

粒。蓋就聞藥則動。遇椒則頭伏也。故仲景治蠅厥烏梅丸用之。又能開痺濕。溫中氣。助心包命門之火。本

經言久服頭不白者辛溫上通腎氣之力可知今烏鬚髮方用之一人腰痛痰喘足冷如冰六脉洪大按之却乾服八味丸無功用椒紅袞苓蜜丸鹽海下甫二十日而安但其性辛溫氣竅陰虛火旺人禁之

秦椒 辛溫有毒去目炒去汗取紅用其葉九瓣者秦椒也閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣欲絕或吐

下白沫身體痺冷肉桂煎汁飲之多飲冷水一二升或食蒜或飲地漿或濃煎豆豉飲之並解 本經除

風邪氣溫中去寒痺堅齒髮明目 發明 秦椒味辛氣熱過於蜀椒其溫中去痺除風邪氣治吐逆疔

癢下腫濕氣皆取辛烈以散鬱熱乃從治之法也不宜多服令鬚髮易白以其氣辛非蜀椒之比臭毒瘡

毒腹痛冷水下一握效其能通三焦引正氣下惡氣可知也

椒目 苦平無毒 發明 椒赤目黑水能制火故專瀉水降火治腎氣逆上喘急又妊娠水腫喘逆用

椒仁丸能引諸藥下行滲道所以定喘下水治腎虛耳鳴同巴豆菖蒲碾細以松脂黃蠟浴和為梃納耳

中搗之一日一易效

豬椒根 脚蔓 苦溫無毒其葉七辨者豬椒也 本經主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛煎湯蒸浴

取汗 發明 豬椒根蔓生氣臭故能通經脈去風毒濕痺千金治肝虛勞損關節骨疼痛筋攣煩悶虎

骨酒用之又取枝葉煎熬如飴治通身水腫每日空腹食之

胡椒 辛大溫小毒 發明 胡椒大辛大熱純陽之物走氣助火昏目發瘡多食損肺令人吐血心腹

冷痛反胃吐利霍亂氣逆及魚鱉薑毒宜之嚴久泡水磨墨則硯不冰勝於皂水火酒傷筆易禿也

畢澄茄 辛溫無毒 發明 時珍曰畢澄茄海南諸香皆有之與胡椒一類兩種正如大腹之與檳榔

耳均曰向陰生者為澄茄向陽生者為胡椒主治與胡椒相類而熱性稍遜治反胃吐出黑汁諸藥不效

用此一味為丸薑湯服之痘瘡入目為末以少許吹鼻中三五次動鼻塞不通用此半兩同薄荷葉三錢

荆芥穗二錢半蜜丸芡實大時時含嚥之但陰虛血分有熱發熱咳嗽禁用

吳茱萸 辛苦溫小毒揀去閉口者否則令人躁悶揀淨以滾湯泡七次去其濁氣則清香扶胃而無辛

燥之患也 本經温中下氣止痛除濕血痺逐風邪開腠理效逆寒熱 發明 吳茱萸氣味俱厚陽中
之陰其性好上者以其辛也又善降逆氣者以味厚也辛散燥熱而臊入肝行脾本經主温中下氣止痛
效逆寒熱專取辛温散邪之力又言除濕血痺逐風邪開腠理者以風寒濕痺靡不由脾胃而入辛温開
發表裡宣通而無拒閉之患矣至於定吐止瀉理關格中滿脚氣疝瘕制肝燥脾風厥氣上逆陰寒膈塞
氣不得上下腹脹下痢及衝脉為病逆氣裡急並宜苦熱以泄之東垣云濁陰不降厥氣上逆甚而脹滿
者非吳茱萸不可治仲景吳茱萸湯當歸四逆加吳茱萸生薑湯治厥陰病及温脾皆用之寇氏言其下
氣最速陽虛人服之愈甚凡病非寒滯者勿服按椒性善下茱萸善上故服茱萸者有衝膈衝眼脫髮咽
痛動火發瘡之害其治暴注下重嘔逆吐酸肝脾火逆之證必兼苦寒以降之如佐金丸治肝火痰運嘈
雜最效小兒痘瘡口一嚼吳茱萸抹之即開亦取辛散之意

食茱萸 辛苦大温有毒 本經主心下邪氣寒熱温中逐寒濕痺去三蟲久服輕身 發明 食茱萸
與吳茱萸性味相類功用彷彿而本經之文向來錯簡在山茱萸條內詳其主心下寒熱即孟詵治心腹
冷痛之謂温中逐寒濕脾即中惡去藏府冷之謂去三蟲即藏氣瘴毒飛戾之謂雖常食之品辛香助
陽能辟濁陰之滯故有輕身之喻已上主治豈山茱萸能之乎其治帶下冷痢暖胃燥濕水氣浮腫用之
功同吳茱萸而力少遜多食動目火目痛者忌之

茗 苦甘微寒無毒服葉解毒靈仙土茯苓忌之 本經主瘰瘡利小便去痰熱止渴令人少睡有力悅
志 發明 茗乃茶之粗者味苦而寒最能降火消痰開鬱利氣下行之功最速故本經主瘰瘡利小便
去痰熱之患然過飲即令人少寐以其氣清也消食止渴無出其右合醋治傷暑泄利同薑治帶下赤白
兼香豉葱白生薑治時疫氣發熱頭痛一味濃煎治風痰茶之產處最多惟陽羨者謂之真芥凡芥皆能
降火清頭目其陳年者曰臘茶以其經冬過臘故以命名佐劉寄奴治便血最效產微者曰松蘿專於化
食產浙紹者曰日鑊專於清火產閩者曰建茶專於辟瘴產六合者曰苦丁專於止痢產滇南者曰普洱

茶則兼消食辟瘴止痢之功。蒙山者世所罕有。近世每採石峯代充。誤人殊甚。其餘雜茶皆苦寒伐胃。胃虛血弱之人。有嗜茶成癖者。久而傷精血不華。色黃。痿痺弱。嘔逆洞泄。種種皆傷茶之害。而侵晨啜茗。每傷腎氣。酒後嗜茶。多成茶癖。又新茶飲之。令人聲音不清。以其能鬱遏火邪也。至於精氣寒滑。觸之易泄者。勿食。宜以沙苑蒺藜點湯代之。茶子味苦氣肅。善於降火。專治頭中鳴響。天白蛾之病。江右人每以打油。味最清香。浸油沐髮最佳。取茶子餅煮汁澆花。以辟盆中之蚯蚓。煎湯滌衣垢。則不退顏色。總取其質之輕清而不沾滯也。

香木部

柏子仁 甘平無毒。蒸熟曝乾。自裂入藥炒研用。色黃油透者勿用。本經主驚悸。益氣除風濕。安五藏。久服令人潤澤。美色。耳目聰明。不饑不老。輕身延年。發明 柏子仁性平而補味甘。而辛其氣清香。能通心腎。益脾胃。宜乎滋養之劑用之。本經言除風濕者。以其性燥也。別錄療恍惚及歷節。腰中重痛。即本經主驚悸除風濕也。經疏以為除風濕痺之功。非潤藥所能當。是葉之能事。豈知其質雖潤而性却燥。未。有香藥之性不燥者也。好古以為肝經氣分藥。時珍言養心氣潤腎燥。安魂定魄。益智益神。即本經之安五藏也。昔人以其多油而滑。痰多作瀉。忌服。蓋不知其性燥而無傷中。沉痰之患。久服每致大便燥結。以芳香走氣。而無益血之功也。

柏葉 節油 苦微寒無毒。酒浸焙熟用。發明 柏葉性寒而燥。大能伐胃。雖有止衄之功。而無陽生之

力。故亡血虛家不宜。擅服然配合之力。功過懸殊。如金匱柏葉湯。同薑豈治吐血不止。當無止慮矣。若濟急方同黃連。治小便血。聖濟總錄同芍藥。治月水不斷。縱藉酒之辛溫。以行苦寒之勢。但酒力易過。苦寒長留。每致減食作瀉。痰積不散。是豈柏葉之過歟。相節堅勁。用以煮汁釀酒。去風痺。歷節。風燒取其油。療癩瘡疥癩。柏脂。治身面疣。同松脂研勻塗之。數日白落。根白皮。以臘豬脂調塗。火灼熱油。燙瘡能涼血。生毛髮。

松脂本經名松膏 苦甘溫無毒 本經主癰疽惡瘡頭瘍白禿疥癢風氣安五藏除熱久服輕身不老

延年發明 松脂得風木堅勁之氣其津液流行皮幹之中積歲結成芳香燥烈尤為方士辟穀延齡

之上藥然必蒸煉始堪服食本經所主諸病皆取風燥以祛濕熱之患耳今生肌藥中用之者取其瀉以

效之也

松節 苦溫無毒 發明 松節質堅氣勁久亦不朽故筋骨間風濕諸病宜之但血燥人忌服○松花

潤心肺益氣除風濕今醫治痘瘡濕爛取其涼燥也

杉 辛微溫無毒 發明 杉氣芬芳取其薄片煮湯薰洗膝瘡無不獲效其性直上其節堅勁有杉木

湯治脚氣痞絕腸下有塊如石方用杉節橘葉各一升大腹枳榔七枚連皮碎搗童便三升共煮減半服

之大下三行氣塊通散此鄭間美治柳柳州法也杉葉治風蟲牙痛同芍藥細辛煎酒含漱杉子治疝氣

痛一歲一粒研酒服

肉桂 辛甘大溫無毒去麤皮用凡桂皆忌葱勿見火以辛香得火轉烈恐動陰血也色深紫而甘勝於

辛其形狹長半卷而鬆厚者良若堅厚味淡者曰板桂今名西桂不入湯藥近世舶上人每以丁皮混充

不可不辨 發明 肉桂辛熱下行入足太陰少陰通陰踰督脈氣味俱厚益火消陰大補陽氣下焦火

不足者宜之其性下行導火之源所謂腎苦燥急食辛以潤之利肝腎止腰腹寒痛冷痰霍亂轉筋堅筋

骨通血脈元素言補下焦不足沉寒痼冷之病下部腹痛非此不能止時珍治寒痺風濕陰虛失血瀉痢

驚癇皆取辛溫散結之力也古方治小兒驚癇及泄瀉病宜五苓散以瀉內火滲土濕內有桂抑肝風而

扶脾土引利水藥入膀胱也赤眼腫痛脾虛不能飲食肝脈盛脾脈弱用涼藥治肝則脾愈虛用煖藥助

脾則肝愈盛但於溫脾藥中倍加肉桂殺肝益脾一治而兩得之同丁香治痘瘡及塌以其能溫托化膿

也又桂辛散能通子宮而破血調經消微瘕破瘀墜胎內托陰疽積癰久不斂及虛陽上乘白赤戴陽吐

血衄血而脈皆芤虛大無力者皆不可缺有胎息虛寒下墜服黃芩白朮輩安之不應小腹愈痛愈墜脈

血非妙達陰陽之理不能如此惟陰虛失血而脉弦細數者切忌今人以之同石灰等分為末搽黑膏上貼癰塊效亦取辛溫散結之力然惟藜藿之人皮膚粗厚者宜之

桂心 辛甘大溫無毒即肉桂之去外色淡但存中心深紫切之油潤者是 發明 桂心既去外層苦燥之性獨取中心甘潤之味專溫營分之裏藥故治九種心痛腹內冷痛破症癰等病與經絡軀殼之病無預非若肉桂之兼通經脉和營衛堅筋骨有寒濕風痺等治也

杜桂 大熱 辛甘微苦溫無毒甜厚而潤者是 本經主上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補中益氣久服通神輕身不老 發明 杜桂辛勝於甘而微帶苦性偏溫散而能上行故本經治上氣欬逆成無已

利肺氣皆取辛散上行之力時珍不察乃與桂枝同列非智者一失歟蓋桂枝是最上枝條亦名柳桂言如柳條之嫩小也蓋壯者陽也杜桂是稟離火純陽之氣故味帶苦且大且厚與桂枝絕不相類何可混言本經言治上氣欬逆導下焦之陰火逆上也治結氣辛溫開結也喉痺吐吸同氣相招以引浮游之火

下泄也然必兼苦寒降泄之味用之利關節從內而達於表也補中益氣久服通神輕身不老補助真元陽生陰長也然須詳素稟豐腴濕勝火衰者為宜若瘦人精血不充火氣用事非可例以為然也其治心腹冷痛癥瘕血痺筋脈拘攣冷痰霍亂其功不減肉桂但治相火不歸下元虛冷力不能直達下焦為稍遜耳

筒桂 俗名 辛甘濕無毒 本經主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使久服面生光華媚好常如童子

發明 筒桂辛而不熱薄而能宣為諸藥通使故百病宜之本經言其養精神和顏色有辛溫之功無壯火之患也為諸藥先聘通使凡開提之藥補益之藥無不宜之久服面生光華媚好常如童子以其質薄性輕無桂心肉桂杜桂等雄烈之氣力勝真陰之比別錄治心痛脇痛脇風溫經通血脉止煩出汗

皆薄則宣通之義綱目乃以別錄元素二家之言皆混列杜桂之下蓋杜桂是桂之大者功用與肉桂相

本經逢原 卷三 香木部 七

類專行氣中血滯筒桂則專行胸脇為脹滿之要藥凡中焦寒邪拒閉胃氣不通嘔吐酸水寒痰水癰奔豚死血風寒痛痺三焦結滯並宜薄桂蓋味厚則泄薄則通也

桂枝 辛甘微溫無毒 發明 麻黃外發而祛寒遍徹皮毛故專於發汗桂枝上行而散表透達營衛

故能解肌元素云傷風頭痛開腠理解肌發汗去皮膚風濕此皆桂枝所治時珍乃以列之牡桂之下誤

矣按仲景治中風解表皆用桂枝湯又云無汗不得用桂枝其義云何夫太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱

自發陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出桂枝湯為專藥又太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛

陽必湊之皆用桂枝發汗此調其營則衛氣自和風邪無所容遂從汗解非桂枝能發汗也汗多用桂枝

湯者以之與芍藥調和營衛則邪從汗去而汗自止非桂枝能止汗也世俗以傷寒無汗不得用桂枝者

非也桂枝辛甘發散為陽寒傷營血亦不可少之藥麻黃湯葛根湯未嘗缺此但不可用桂枝湯以中有

芍藥酸寒收斂表腠為禁耳若夫傷寒尺脈不至是中焦營氣之虛不能下通於衛故需膠飴加入桂枝

湯方取稼穡之甘引入胃中遂名之曰建中更加黃耆則為黃耆建中借表藥為裡藥以治男子虛勞不

足千金又以黃耆建中換入當歸為內補建中以治婦人產後虛羸不足不特無餘邪內伏之虞并可杜

陽邪內陷之患非洞達長沙妙用難以體此詳桂枝本手少陰血分藥以其兼走陽維凡傷之邪無不由

陽維傳次故此方為太陽首劑昔人以桂枝湯為太陽經風傷衛之常藥他經皆非所宜而仲景三陰例

中陰盡復陽靡不用之即厥陰當歸四逆未嘗不本桂枝湯也○桂附各具五體各有攸宜肉桂雖主下

元而總理中外血氣桂心專溫藏府營血不行經絡氣分牡桂性兼上行統治表裡虛寒薄桂善走胸脇

不能直達下焦桂枝調和營衛解散風邪而無過汗傷表之厄真藥中之良品尤為湯液之祖也本經之

言牡桂兼肉桂桂心而言言筒桂兼桂枝而言也其他板桂木桂僅供香料食料不入湯藥

辛夷即木 辛溫無毒剝去毛瓣取仁用忌火焙 本經主五藏身體寒熱頭風腦痛面黧 發明 鼻

氣通於天肺開竅於鼻辛夷之辛溫走氣而入肺利竅其體輕浮能開胃中清陽上行通於天故本經治

陽氣鬱遏身體寒熱頭風腦痛面黧辛溫能解肌表芳香上竅頭目逐陽分之風邪則諸證自愈軒岐之後能達此理者東垣一人而已凡鼻軟鼻淵鼻塞及痘後鼻癢並研木入麝香少許以葱白蘸入甚良腦鼻中有濕氣久室不通者宜之但辛香走竅虛人血虛火熾而鼻塞及偶感風寒鼻塞不聞香臭者禁用沉香 辛甘苦微溫無毒咀嚼香甜者性平辛辣者性熱修製忌火香藥皆然不獨沉香也產海南青色黃鋸處色黑俗謂銅筋鐵骨者良產大宜白棕紋者次之近有新山產青色黑而堅質不鬆味不甘苦入藥無效香舶來者氣味帶酸此為下品其浮水者曰速香不入藥 發明 沉水香性溫東南方純陽之性專於化氣諸氣鬱結不伸者宜之溫而不燥行而不泄扶脾達腎攝火歸源主大腸虛秘小便氣淋及痰涎血出於脾者為之要藥凡心腹卒痛霍亂中惡氣逆喘急者並宜酒磨服之補命門三焦男子精冷宜入丸劑同廣藿香香附治諸虛寒熱同丁香肉桂治胃虛呃逆同紫蘇白豆蔻治胃冷嘔吐同茯苓人參治心神不足同川椒肉桂治命門火衰同廣木香香附治婦人強忍入房或過忍尿以致轉胞不通同肉苁蓉麻仁治大腸虛秘昔人四磨飲沉香化氣丸痰疾丸用之取其降泄也沉香降氣散用之取其散結導氣也黑錫丹用之取其納氣歸元也但多降少升氣虛下陷人不可多服久服每致失氣無度面黃少食虛證百出矣○一種曰蜜香與沉香大抵相類故綱目釋名沉水香蜜香二者並稱但其性直者毋論大小皆是沉水若形如木耳者俗名將軍帽即是蜜香其力稍遜僅能辟惡去邪氣尸疰一切不正之氣而溫脾煖胃納氣歸元之力不如沉香也

丁香一名雞舌香

辛溫無毒有子而大者曰母丁香去蒂及子用忌見火 發明 丁香辛溫入手大陰足

少陰陽明經溫胃進食止嘔定瀉虛冷下痢白沫之要藥乾霍亂不吐不下及嘔逆不止厥冷脉沉者並宜服之胃寒肝虛呃逆嘔噦在所必用但渴欲飲水熱噦呃逆不可誤投小兒痘疹不光澤不起發氣虛灰白或脹或瀉或渴或氣促表裡俱虛之證並宜加用凡胃逆嘔吐者健胃消痰藥中加三五粒甚效不宜多用但其性易於僭上過用則損肺傷胃非屬虛寒者概不可施○丁香皮即丁香樹皮似筒桂皮而堅

厚色深紫較之肉桂味稍枯氣稍燥專治一切心腹冷氣腹脹惡心泄瀉虛潯水穀不消及齒痛諸證方家用代丁香今舶上人每以偽充肉桂不可不辨

梅檀 辛溫無毒禁用火炮 發明 白檀香善調膈上諸氣散冷氣引胃氣上升進飲食兼通陽明之經鬱抑不舒嘔逆吐食者宜之癰疽潰後膿多禁用

紫檀 鹹平無毒 發明 白檀辛溫氣分藥也故能理衛氣而調脾肺利胸膈紫檀鹹平血分藥也力能和營氣而消腫毒療金瘡各有攸宜

降真香 辛溫無毒禁用火炮 發明 降真香色赤入血分而降故內服能行血破滯外塗可止血定痛刀傷用紫金散即降真香用磁瓦刮下和血竭研末是也又虛損吐紅色痰味不鮮者宜加用之其

功與花藥石散不殊血熱妄行色紫濃厚脈實便秘者禁用 烏藥 辛溫無毒酒浸眼乾用不可見火 發明 烏藥香竄能散諸氣故治中風中氣諸證用烏藥順

氣散者先疎其氣氣順則風散也性溫能理七情鬱結上氣喘急用四磨六磨婦人血氣諸痛男子腰膝麻痺用烏沉湯並借參之力量補於瀉也大抵能治氣血凝滯霍亂吐瀉疾食稽留但專泄之品施之藜

藿相宜若高粱之輩血虛內熱者服之鮮不蒙其害也 茴香 辛溫小毒去子用小而味淡者曰木蟹不入藥 發明 舶上茴香性熱味厚性入肝經散一切

寒結故黑錫丹用之若陰虛肝火從左上衝頭面者用之最捷蓋茴香與肉桂吳茱萸皆厥陰之藥莫則走腸胃桂則走肝藏茴則走經絡也得鹽引入腎經發出邪氣故治疝氣有效但耗血發熱目病瘡瘍忌

之 楓香脂 膠 白 辛苦平無毒 發明 楓性疎通故木易蛀為外科透毒要藥金瘡筋斷一味為末傅

之千金治咳唾膿血取其開發肺氣也血熱生風齒頰腫痛為末擦之燒過搯牙永無牙疾 薰陸香 膠 乳 苦辛微溫無毒以酒研如泥水飛曬乾或箬上焙去油同燈心研易碎 發明 乳香香

竈能入心經活血定痛故為癰疽瘡瘍要藥諸痛癢瘡皆屬心火也產科諸方多用之亦取其活血調血之功耳凡人筋不伸者重洗敷藥宜加乳香其性能伸筋也瘡疽潰後勿服膿多勿敷胃弱勿用

沒藥 苦平無毒修治與乳香同 發明 乳香活血沒藥散血皆能止痛消腫生肌故二藥每每相兼

為用凡刃傷打損墜馬並宜熱酒調服若妊婦胎氣不安勿用產後惡露去多腹中虛痛癰疽已潰而痛

及筋骨胸腹諸痛若不因瘀血者皆不可服

麒麟竭 脚血 甘鹹平無毒試之透指甲為真嚼之不爛如蠟者為上草血竭色紫亞於瓜竭 發明

血竭木之脂液如人之膏血為止痛和血收斂瘡口散瘀生新之要藥治傷折打損一切疼痛血氣攪刺

內傷血聚並宜酒服乳香沒藥雖主血病而兼入氣分此則專於肝經血分也但性最急却引脹不宜

多服其助陽藥中同乳香沒藥用之者取以調和血氣而無留滯毒之患

安息香 辛苦微甘平無毒出西戎及南海波斯國樹中脂也如膠如飴今安南三佛齊諸番皆有之如

飴者曰安息香紫黑黃相和如瑪瑙研之色白者為上粗黑中夾砂石樹皮者為次乃渣滓結成也有屑

末不成塊者為下恐有他香夾雜也燒之集鼠者為真修製最忌經火 發明 安息香乃外番入貢之

物香而不燥竈而不烈燒之去鬼來神令人神清服之辟邪除惡令人條暢能通心腹諸邪氣辟惡蠱毒

理霍亂止卒然心痛嘔逆治婦人為邪祟所憑夜與鬼交燒烟薰丹田穴永斷故傳尸瘡瘡咸用之其蘇

合香丸紫雪丹用之各有轉日回天之功洵非尋常方藥可比也凡氣虛少食陰虛多火者禁用為其能

耗氣也

蘇合香 甘溫無毒出天竺崑崙諸國安南三佛齊亦皆有之其質如藕膠者為蘇合油色微綠如堆斑

者良微黃者次之紫赤者又次之以簪挑起徑尺不斷如絲漸漸屈起如鈎者為上以少許擦手心香透

手背者真忌經火 發明 蘇合香聚諸香之氣而成能辟惡殺鬼精物治溫瘧蠱毒瀉去三蟲除邪

能透諸竅藏辟一切不正之氣凡痰積氣厥必先以此開導治疫以理氣為本也凡山嵐瘴濕之氣奠於

經絡拘急弛緩不均者非此不能除。但性燥氣竄陰虛多火人禁用。

龍腦香牌水 辛苦溫有毒忌見火 發明 龍腦香竄入骨髓病在骨髓者宜之。若風在血脉肌肉用

之反引風入骨髓也。其味大辛善走。故能散熱通利關節結氣。張雲岐人參散柏子仁湯等方多用之。其

治目痛喉痺下疳取其辛溫而散火鬱也。時珍曰古方皆言龍腦辛涼入心。故目疾驚風及痘瘡心熱血

瘀倒靨者用猪心血為引。使毒散於外。則瘡發。此似是而非也。目痛驚風及痘皆火病。火鬱則發之。從治

之法辛溫發散故也。使壅塞通利經絡條達而驚熱自平。瘡毒能出。然不可多用。多用則真氣立耗矣。人

有急難欲自盡者頰吞兩許立斃。為其性烈立能散盡真氣也。世人誤以為寒。不知辛散之性。似乎涼耳。

治火證舌出寸許。用水片末捺上即縮。引火歸元也。目病屬陰虛者不宜入點。

樟腦一名腦 辛苦熱有毒忌見火 發明 樟木性稟龍火辛溫香竄能去濕辟惡氣。故治乾霍亂。以

樟木屑煎濃汁吐之。中惡卒死者。以樟木燒煙熏之。待蘇用藥。韶郡諸山樟木最多。土人以之蒸汁煎煉

結成樟腦。與焔硝無異。水中然火。其焔益熾。今丹爐家及煙火方皆用之。去濕殺蟲。此物所長。燒煙薰衣

能辟蟲。治腳氣腫痛。或以樟腦置兩股。用杉木作桶盛湯濯之。或樟腦烏頭等分醋丸。彈子大。每置一

丸於足心踏之下。以微火烘之。衣被圍覆。汗出如涎為效。

阿魏 辛苦溫有毒。驗真偽法。置熟銅器中一宿。沾處白如銀色者為真。發明 阿魏消肉積殺蟲。治癰

積為主藥。故能解毒辟邪。治瘡疔疳勞諸病。久瘡用阿魏硃砂等分為末。米糊丸。皂子大。空心人參湯服

一丸即愈。如痢用黃連木香湯下。蓋瘡亦多起於積滯耳。同麝香硫黃蘇合。貼一切塊。有效。然人脾胃喜

芳香而惡臭。凡脾胃虛人。雖有積滯不可輕投。

蘆薈 苦寒小毒 發明 蘆薈入厥陰肝經及衝脉。其功專於殺蟲清熱衝脉。為病逆氣裡急及經事

不調。腹中結塊。上衝與小兒疳積滯。非此不除。同甘草為末。治頭項頑癬甚效。但大苦大寒。且氣甚穢

惡。僅可施之。藜藿若胃虛少食人得之。入口便大吐逆。每致奪食泄瀉。而成羸瘦怯弱者多矣。有人背瘡

愈後餘熱不除或令服蘆薈藥三服不數日而斃傷胃之性於此可徵

喬木部

黃檗 樞秘 苦寒無毒。生用降實火。酒製治陰火上炎。鹽製治下焦之火。薑製治中焦痰火。薑汁炒黑治濕熱。鹽酒炒黑治虛火。陰虛火盛。面赤戴陽。附子汁製。本經主五藏腸胃中結熱。黃痺腸痔。止泄痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。○檀桓主心腹百病。安魂魄。不饑渴。久服輕身。延年通神。發明 黃檗苦燥為治三陰濕熱之專藥。詳本經主治。皆濕熱傷陰之候。即漏下赤白。亦必因熱邪傷陰。火氣有餘之患。非崩中久漏之比。其根治心腹百病。魂魄不安。皆火氣內亢之候。仲景梔子檗皮湯。治身黃發熱。得其旨矣。按黃檗味厚而降。入腎經血分。凡腎水膀胱不足。諸痿厥無力。於黃耆湯中加用。使兩足膝中氣力湧出。痿弱即愈。黃檗蒼朮。乃治痿要藥。凡下焦濕熱腫痛。并膀胱火邪。小便不利。及黃耆者。並宜黃檗。知母為君。茯苓澤瀉為佐。凡小便不通而渴者。邪熱在氣分。主治在肺。不能生水。不渴者。邪熱在血分。主治在膀胱。不能化氣。亦宜黃檗。知母。昔人病小便不通。腹堅如石。脚腿裂水。雙睛凸出。遍服治滿利小便藥不效。此高粱積熱。損傷腎水。致膀胱不化。火氣上逆。而為嘔噦。遂以滋腎丸主之。方用黃檗。知母。人桂。為引導服少時。前陰如火。燒溺即湧出。顧盼腫消。金匱治誤食自死六畜肉中毒。用黃檗。屑搗服。方寸匕。解之。不特治高粱積熱。益苦以解毒。寒以泄熱也。大抵苦寒之性。利於實熱。不利於虛熱。凡脾虛少食。或嘔或瀉。或好熱惡寒。或腎虛五更泄瀉。小便不禁。少腹冷痛。陽虛發熱。瘀血停止。產後血虛發熱。癰疽腫後發熱。陰虛小便不利。痘後脾虛。小便不利。血虛煩躁不眠等證。法皆忌之。一種小而實如酸石榴者。名曰小檗。性亦不甚相遠。千金翼阿加佗丸用之。

厚朴 苦辛溫。小毒。紫厚者佳。薑汁炒用。忌黑豆。宜用滾水泡數次。切之。不可久浸。氣滯有傷脾氣。本

經主中風傷寒。頭痛寒熱。驚悸逆氣。血痺死肌。去三蟲。發明 厚朴苦溫。先升後降。為陰中之陽藥。故能破血中氣滯。本經中風傷寒。頭痛寒熱。有風寒外傷於陽分也。其治驚悸逆氣。血痺死肌。有寒濕入傷

於腠理也濕熱內着於腸胃而生三蟲此藥辛能散結苦能燥濕溫能祛蟲故悉主之消風散用之深得本經之義今世但知厚朴為溫中散滯之藥而治腸胃濕滿寒脹溫中下氣消痰止吐平胃散用以治腹脹者味辛能散滯氣也若氣寒人誤服麝香脹悶作喘宜此瀉之與枳是大黃同用能瀉寒滿所謂消痰下氣也與芩朮橘皮同用能瀉濕滿所謂溫中益氣也然行氣峻猛虛者勿服氣溫即止不可久服

杜仲 辛甘溫無毒鹽酒炒斷絲用 本經主腰痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下瘡濕小有餘瀝發明 杜仲古方但知補腎而本經主腰痛補中益精氣等病是補火以生土也王好古言是肝經氣分藥蓋肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用皆屬於筋故入肝而補腎子能令母寔也但腎虛火熾夢泄遺精而痛者勿用以其辛溫引領虛陽下走也

椿樗根皮輒眼 香者名椿甘平無毒臭者名樗苦溫有毒樗樹有蟲謂之樗雞樗樹有莢莢中有寔狀如明珠名鳳眼草子嗣門中練真丸用之專治髓藏中濕熱高年素享豐厚者宜之 發明 椿根白皮性寒而能瀉血治濕熱為病瀉利濁帶滑夢遺精諸證有燥痰之功但痢疾滯氣未盡者不可遽用崩帶屬陰虛者亦不可服蓋椿皮色赤而入血分久痢血傷者宜之樗皮色白而入氣分暴痢氣滯者宜之不可不辨而混用也

乾漆漆子 辛苦鹹溫有毒炒令煙盡否則損人腸胃今人多用漆渣偽充必疑結如磚者佳 本經主

絕傷補中續筋骨填髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺生漆去長蟲久服輕身耐老 發明 乾漆灰辛

溫性善下降而破血故消腫殺蟲通月閉皆取去惡血之用而本經治絕傷補中是取其破宿生新之力

也蓋胃中有痰積留滯則陽氣竭絕不能敷布中外故藏府筋骨髓腦皆失營養乃致健運失常肢體緩

縱用此以鏟除痰積中氣得復絕傷皆續而緩急和矣生漆去長蟲故千金去三蟲方以之為君三蟲去

輕身長年所不待言但恒人艱於久服耳元素云前年深堅結之積滯破日久疑結之瘀血斯言盡乾漆

之用矣無積血者切忌以太傷營血損胃氣故胃虛人服之往往作嘔此與本經之義似乎相背而寔不

相違產後血暈以舊漆器燒煙熏之即醒蓋亦取下血之義而破經絡中血滯用真漆塗酸醃甲煨入藥破血最捷婦人血虛經閉為之切禁凡畏漆者嚼椒塗口鼻免生漆瘡誤中其毒以生蟹搗汁或紫蘇解之○漆塗紫雲瘋面生紫腫取其散瘀之功也○漆子專主下血千金方用之審無瘀滯慎勿漫投

梓白皮 苦寒無毒取根去外黑皮用 本經治熱毒去三蟲 發明 梓皮苦寒能利太陽陽明經濕

熱仲景麻黃連軀赤小豆湯用之其治溫病復傷寒飲變為胃皖者煮汁飲之取其引寒飲濕邪下泄也

梧葉皮 苦寒無毒 本經主惡蝕陰瘡五痔殺三蟲 發明 梧之與桐本是二種梧子狀如胡椒性

熱助火欬嗽多痰者勿食梧葉消腫毒生毛髮本經治惡蝕陰瘡時後治髮落不生醫林正宗治癰疽發

背大如盤臭腐不可近用梧葉醋蒸貼上熱退痛止漸漸生肉收口梧皮煎汁療小兒丹毒惡瘡本經治

五痔殺三蟲今人煎湯重洗腸痔脫肛即本經治五痔之應浸水塗鬚髮重潤過用則髮黃赤助火之驗

也 桐寔 辛寒有毒 發明 梧子不入食品專供作油其狀如罌厚塗疥癬毒腫吐風痰喉痺以桐油和

水掃入喉中則吐誤食吐者得酒即解 海桐皮 苦平無毒 發明 海桐皮能行經絡達病所治風濕腰痛不遂血脉頑痺腿膝疼痛赤

白瀉痢及去風殺蟲蟲牙風痛煎湯漱之疳蝕疥癬磨汁塗之目赤膚賢浸水洗之此藥專去風濕隨證

入藥服之無風濕者勿用 川棟寔 御金鈴子 苦寒小毒酒浸蒸去皮核取淨肉捻作餅焙乾用 本經主溫病傷寒大熱煩狂

殺三蟲疥瘡利小便水道 發明 川棟苦寒性降能道濕熱下走滲道人但知其有治疝之功而不知

其蕩熱止痛之用本經主溫病煩狂取以引火毒下泄而煩亂自除其溫病之下又續出傷寒二字以溫

病原從冬時伏邪至春隨陽氣而發故宜苦寒以降泄之其殺三蟲利水道總取以苦化熱之義古方金

鈴子散治心包火鬱作痛即婦人產後血結心疼亦宜用之以金鈴子能降火逆延胡索能散結血功勝

失笑散而無腥穢傷中之患昔人以川棟為疝氣腹痛殺蟲利水專藥然多有不用之不效者不知川棟所
主乃囊腫莖強木痛濕熱之疝非痛引入腹厥逆嘔涎之寒疝所宜此言雖迥出前輩然猶未達至治之
奧夫疝瘕皆由寒束熱邪每多掣引作痛必需川棟之苦寒兼茴香之辛熱以解錯綜之邪更須察其痛
之從下而上引者隨手輒應設痛之從上而下注者法當辛溫散結苦寒良非所宜諸痛皆爾不獨疝瘕
為然近有一人牙宣出血不止諸治罔效或今以棟寔研細綿裹塞齒齦即止詳血從內出外治何能即
應因以少許置舌上其苦直透諸齦況有蟬漏安得不滲入於經也○苦棟根治蠱毒煎湯服之即時吐
出又能殺蟲治瘡○其花燒煙辟蚊蟲亦本經殺蟲之驗

槐寔俗名 苦酸鹹寒無毒取子入牛膽中陰乾日服七枚久服有明目通神白髮還黑之功有痔及便
血者尤宜服之本經主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳癭子藏急痛發明 槐者虛星
之精益腎清火與黃蘗同類異治益黃蘗專滋腎經血燥此則專滋腎家津枯觀本經主治皆脾胃有熱
陰津不足之病止涎唾腎司閉藏之職也下焦痔瘻腸風熱便血年久不止者用此一味熬膏煉蜜收
服婦人乳癭子藏急痛皆肝家血熱之患用以清熱滋燥諸證自安上皆指槐角而言其角中核子專主
明目久服鬚髮不白益腎之功可知惟胃虛食少及孕婦勿服槐枝燒灰塗妬精瘡有清火潤燥之功干
金方也

槐花 苦寒無毒溫水滌去灰焙香用 發明 槐花苦涼陽明厥陰血分藥也故大小便血及目赤腫
痛皆用之目得血而能視赤腫乃血熱之病也腸血痔血同柏葉微炒為末烏梅湯服腸風藏毒淘淨炒
香為末腸風荆芥湯服藏毒釀猪藏日服之但性純陰虛寒無寔火禁用

秦皮 苦微寒無毒 本經治風寒濕痺洗洗寒氣除熱自中青翳白膜久服頭不白輕身 發明 秦
皮浸水色青氣寒性瀉肝膽藥也本經治風寒濕痺取其苦燥也又主青白翳障取其苦降也小兒驚癇
取其平木也崩中帶下熱痢下重取其瀉收也老子云天道貴嗇此服食之品故本經有久服頭不白輕

身之說而仲景白頭翁湯治熱痢下重以黃蘗黃連秦皮同用皆苦以堅之也秦皮黃連等分治赤眼腫痛又一味煎湯洗赤目甚效其味最苦胃虛少食者禁用

合歡皮一名合昏俗名烏薺味甘平無毒本經安五藏和心志令人歡樂無憂久服輕身明目發明

合歡屬土與水補陰之功最捷單用煎湯治肺癰嚔濁合阿膠煎膏治肺痿吐血皆驗與白蠟同熬膏為

長肌肉續筋骨之要藥而外科家未嘗錄用何也按合歡所主諸病不過長肌肉續筋骨故用以填補肺

之潰缺而本經安五藏和心志等語豈特諸疾而已菘康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂蓋無顧名思義

之寔乎

皂莢皂名辛鹹溫小毒入藥去皮弦子酥炙用本經主風痺死肌邪氣頭風淚出利九竅殺精物

發明皂莢辛散屬金治厥陰風木之病觀本經主治風痺死肌頭風淚出皆取其去風拔毒通關利竅

有破堅積逐風痰辟邪氣殺蟲毒之功吹之導之則通上下之竅煎之服之則治風痰喘滿塗之擦之則

散腫消毒去面上風氣重之蒸之則通大便秘結燒煙重之則治膝瘡濕毒即本經治風痺死肌之意用

之無不效驗凡人卒中風昏昏如醉形體不收口角流涎者急用稀涎散吐之若南方類中由於陰虛火

炎者誤用涌劑愈竭具津液矣得不在所切禁乎然治濕熱痰積肺癰吐腫及痰迷顛妄干縉湯皂莢丸

來甦膏等誠為聖藥惟孕婦禁服按大小二皂所治稍有不同用治風痰牙皂最盛若治濕痰大皂力優

古方取用甚多然入湯藥最少有瘍醫以牙皂煎湯涌吐風痰服後遍體赤痛數日後皮脫大傷元氣不

可不慎至於鎖喉風證尤為切禁常見有激動其痰鎖住不能吐出頃刻立斃者其子燒灰存性能治大

腸風秘燥結祛風逐穢之性可知

皂角刺辛溫無毒去夫用否則脫人鬚髮發明皂角刺治風殺蟲與茨略同但其銳利直達病所

為異其治痘疹氣滯不能起頂灌膿者功效最捷而氣虛者慎勿誤用恐透表過銳反生虛泡也若血滯

不能起頂灌膿又需陵鯉當非角刺所宜丹方治大風惡疾瘡疔落鬚公明用皂角刺三觔燒灰為末食後煎

大黃湯調一七服之不終劑而愈腫瘍服之即消潰瘍服之難斂以其性善開泄也

肥皂莢 辛溫有毒去皮弦子取淨肉用之 發明 肥皂滌除頑痰垢膩不減二皂痼病勝金丹用之

亦取涌發不使砒性留於腸胃之意其子亦治大腸風秘須去硬殼及黃膜但取其仁炒研用之庶不致

有傷腎氣耳

無患子 俗名鬼見愁 苦平無毒 發明 無患子言其辟邪之功也澹垢去面黥喉痺研納喉中立開又主

飛尸子 中仁燒之辟除惡邪煨食辟惡氣去口臭

沒石子 一名無食 苦溫無毒 發明 沒石子合他藥染髮伸景用治陰汗燒灰先以湯浴之以灰撲之

甚良又血痢及產後下痢俱用之綿裹塞牙痛效取溫散腎經濕熱也

訶黎勒 椰訶 苦溫無毒六稜者佳去核用 發明 訶子苦溫降斂生用清金止嗽煨熟固脾止瀉

古方取苦以化痰涎瀆以固滑泄也殊不知降斂之性雖云溫能固脫終非甘溫益脾之比昔人言同烏

梅五倍則收斂同橘皮厚朴則下氣同人參則補肺治嗽東垣言嗽藥不用者非也然此僅可施之於久

嗽喘之真氣未艾者庶有劫截之能又久嗽陰火上炎久痢虛熱下迫愈刻愈滯宜特風寒暴嗽濕熱下

痢為禁劑乎葛觀世醫用潤肺丸益黃散之功過可知

柳華 柳葉 苦寒無毒 本經主風水黃痺面熱黑 發明 柳華性寒故能療風水黃痺本經雖云柳

絮寔柳華也絮則隨風飛揚何從覓之于金治女人積年不孕吉祥丸中與丹皮桃仁芍藥同為散血之

用亦屬柳華無疑柳葉治惡疥痂瘡煎湯洗之立愈以其力能殺蟲也痘瘡生蛆以免卧柳葉上其蛆立

化無葉時根皮亦可用之

檉柳 俗名西 甘鹹平無毒 發明 檉柳獨入陽明故其功專發麻疹兼解酒毒去風煎湯浴風疹身

癢效其治剝牛馬血入肉者取以火炙熨之亦可煮汁浸之其毒即解 水楊 苦平無毒枝硬葉潤條不下垂其材可造矢者為水楊其枝與葉細條葉下垂者謂之柳 發明

柳葉殺蟲痘爛生蟲用鋪卧下其蟲即出煎湯洗漆瘡惡疥楊枝解毒浴之消腫瘡瘡根治痘瘡頂陷漿滯博愛心鑑有水楊浴法如無水楊根以忍冬藤煎湯代之然南方皮腠薄弱良非所宜肘後治乳癰用柳根水類鈴方以水楊根搗貼乳癰其熱如火再貼遂平大抵二根性味不甚相遠

榆根白皮

本經名

甘平滑無毒

本經治大小便不通利水道除邪氣

發明

榆有二種一種二月

生莢其莢飄零故謂零榆一種八月生莢皮有滑汁謂之榔榆性皆滑利然入手足太陽手陽明經本經治大小便不通取其有逐濕利氣之功故五淋腫滿及胎產宜之本草十劑云滑以去者冬莢子榆白皮之屬蓋亦取其通利滲濕消留者有形之物耳榔榆甘寒其下熱淋利水道之功則一但服之令人睡較零榆之除邪氣稍有不同二者性皆疎利若胃寒而虛者服之恐泄真氣良非所宜

蕪荑

辛平無毒去殼取仁微炒用

本經主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫濕行毒去三蟲化食

發

明 蕪荑辛散能祛五內皮膚骨節濕熱之病近世但知其有去疔殺蟲及腸風痔瘻惡瘡疥癬之用殊不知本經之旨千金治婦人經帶崩淋之病每同澤蘭厚朴藜本白芷細辛防風柏仁石斛輩用之取其去子藏中風熱垢膩也和豬脂搗塗瘡和蜜治濕癬及治腹中氣血痰酒諸癬以蕪荑仁炒香兼暖胃活血理氣藥為散服之

蘇方木

甘鹹平無毒

發明

蘇木陽中之陰降多升少肝經血分藥也性能破血產後血腫脹悶欲

死者苦酒煮濃汁服之本虛不可攻者用二味參蘇飲補中寓瀉之法凜然可宗但能開泄大便臨證宜審若因惱怒氣阻經閉者宜加用之少用則和血多用則破血如產後惡露已淨而血虛腹痛大便不寔者禁用

梓木皮

苦平無毒

發明

梓皮能收肥膩故用以治濕熱癘風癰毒取其能辟惡氣殺蟲也開竅

治諸黃輝濃煮汁飲之以其能利小便也和劑治遍身瘡疥如癩及癰癤搔癢面上風刺婦人粉刺靈苑方治乳癰腫痛結硬欲破燒存性無灰酒服之

後稠 苦澆平無毒。陳久者良。發明 椶灰性澆失血去多。痰滯已盡者用之切當。取澆以固脫也。如積痰未盡。誤服則氣滯血瘀。益增痛結之患矣。

烏桕根 辛苦溫有毒。發明 烏桕味苦而辛。性沉而降。故能主暴水癥結積聚。功勝大戟。氣虛人不可用之。○葉治食牛馬六畜肉。腹中疔痛欲死者。搗自然汁一二盞。頓服。大利毒去則愈。冬用根皮搗爛和酒絞服。○桕油塗頭變白為黑。塗一切腫毒瘡疔。○桕油燭抽去心導大便秘結効。

巴豆 辛熱大毒。去殼及心炒紫黑。或燒存性。或研爛紙包壓去油。取霜各隨方製。本經主傷寒濕瘧。

寒熱破癥瘕結聚。堅積留飲。痰癖大腹。蕩練五藏六府。開通閉塞。利水殺道。去惡肉。除鬼毒。蠱疰邪物。殺蟲魚。發明 巴豆辛熱能蕩練五藏六府。不特破癥瘕結聚之堅積。并可治傷寒濕瘧之寒熱。如仲景

治寒寔結胸。用白散。深得本經之旨。世本作溫瘧。當是濕瘧。亥豕之謬也。其性峻利。有破血排膿攻痰逐水之力。宜隨證輕重而施。生用則峻攻。熟用則溫利。去油用霜則推陳致新。隨證之緩急而施。反正之治。峻用則有戕亂劫病之功。少用亦有撫綏調中之妙。可以通腸。可以止瀉。此發千古之秘也。一老婦久病。溘泄。遍服調脾升提止瀉諸藥。則瀉反甚。脉沉而滑。此脾胃久傷。冷積凝滯所致。法當以熱下之。則寒去利止。自後每用以治泄痢積聚諸病。多有不瀉而病痊者。妙在得宜耳。苟用不當。則犯損陰之戒矣。按巴豆大黃同為攻下之劑。但大黃性寒。府病多熱者宜之。巴豆性熱。藏病多寒者宜之。其殼燒灰存性。能止瀉痢。亦劫病之效也。孕婦禁用。以力能墮胎也。元素曰。巴豆乃斬關奪門之將。不可輕用。世以治酒病。膈氣。以其辛熱能開通腸胃。鬱熱耳。第鬱結雖通。血液隨亡。其陰虧損。傷寒結胸。小兒疳積用之。不死亦危。奈何庸人畏大黃而不畏巴豆。以其性熱劑小耳。試以少許輕擦完膚。湏臾發泡。况下腸胃。能無熏灼潰爛之患乎。即有急證不得已而用之。壓去其油。取霜少許入藥可也。

大風子 辛熱有毒。去殼取仁用。發明 丹溪曰。粗上治大風病。佐以大風油。殊不知此物性熱有燥

痰之功。而傷血持甚。至有病將愈而先失明者。時珍曰。大風油有殺蟲劫病之功。然不可多服用之外塗。

其功不可沒也

相思子 苦平小毒 發明 相思子味甘有毒立能吐人其粒半黑半紅故以命名能通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘡癩殺一切毒毒蠱毒取三七枚研水服之即當吐出今人皆認此為赤小豆以之配入六神麴中鋪家以誤認而罔名醫家亦不辨而混用噫醫之過可勝道哉

灌木部

桑根白皮 甘寒無毒須蜜酒相和拌令濕透炙熟用否則傷肺泄氣大不利人根見土面者有毒傷人發明 桑根白皮瀉肺氣之有餘止嗽而能利水肺中有水氣及肺火有餘者宜之肺虛無火因風寒而致者服之風邪反閉固不散而成久嗽者有之甄權治肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臃脹利水道去寸白蟲可以縫金瘡縫後以熱雞血塗之桑皮之功用盡矣

桑椹 甘溫無毒 本經主傷中五勞六極羸瘦胸中絕脉補虛益氣 發明 桑椹手足少陰太陰血分藥本經所主皆言桑椹之功而宗奭云本經言桑甚詳獨遺其椹即瀕湖之博識尚不加察但以其功誤列根皮之下所以世鮮採用惟萬壽酒用之

桑葉 苦甘微寒小毒蜜水拌蒸用 本經除寒熱出汗 發明 桑葉清肺胃去風明目取經霜者煎湯洗風眼下淚同黑芝麻蜜丸久服鬚髮不白不老延年本經言除寒熱出汗即大明蒸熟搗置風痛出汗之謂煎飲利五藏通關節下氣煎酒服治一切風桑根燒灰淋汁與石灰點面上風滅痣去惡肉

桑枝 苦平無毒 發明 桑枝清熱去風故遍體風癢乾燥水氣脚氣風氣四肢拘攣無不宜之時珍云煎藥用桑者取其能利關節除風寒濕痺諸痛也觀靈樞治寒痺用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺處治口僻用馬膏法以桑鈎鈎其口生桑灰上又癰疽發背流注頑瘡久不愈者用桑木灸法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣其法以桑柴劈作小片束作小把然火吹息灸患處每次灸片時瘡肉漸腐用此以助內服之藥又治久嗽不止用桑枝煎湯渴即飲之桑柴灰熬膏點大風惡疾或淋取汁洗頭面不過十

度即瘥此聖惠法也。

柘根白皮 甘溫無毒 發明 時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾藏器煮汁釀酒服止風虛

耳聾勞損虛羸腰腎冷千金治耳鳴汗出皆由腎虛或一二十年不瘥者方用柘根三十斤菖蒲五斗古

鐵二十斤燒赤浸三宿用米二石麴二斗用上三味汁釀如常法制服必效方具千金二十卷中

楮寔俗名穀調子根 甘平無毒 發明 楮寔走肝腎血分別錄治陰痿水腫益氣充肌明目大明言

壯筋骨助陽氣補虛勞健腰膝益顏色而修真秘旨言久服令人骨軟濟生秘旨言治骨鯁用楮寔煎湯

服之豈非軟骨之徵乎脾胃虛人禁用○楮根白皮別錄主逐水利小便甄權治水腫氣滿吳普治喉痺

總取散風祛毒之義

枳殼 辛苦平無毒陳者良生熟各隨本方 本經主大風在皮膚中如麻豆苦癢除寒熱結 發明

枳殼破氣化痰泄肺走大腸多用損胸中至高之氣枳殼主高枳寔主下高者主氣下者主血故殼主胸

膈皮毛之病本經所治大風在皮膚中如麻豆苦癢除寒熱結是指表病而言寔主脾胃心腹之病本經

所謂止痢長肌肉利五臟益氣輕身是指裡病而言凡人臧府清利則氣自益身自輕矣詳枳殼枳寔皆

能利氣氣下則痰喘止氣行則痞脹消氣通則刺痛已氣利則後重除也仲景治胸脇痞滿以枳寔為要

藥諸方治下血痔痢大腸秘塞裡急後重又以枳殼為通利則枳寔不獨治下枳殼不獨治高也然枳寔

性沉兼能入肝脾血分而消食積痰氣瘀血有衝牆倒壁之喻枳殼性浮兼通肺胃氣分而治喘效霍亂

水腫有乘風破浪之勢與桔梗同為舟楫之劑故柴胡枳殼除寒熱痞滿之專藥凡夾食傷寒感冒與表

藥同用皆無妨礙妊娠胞肥有瘦胎飲乃因氣壅阻滯而設設素稟怯弱者誤服令母氣耗難產子亦氣

弱難育是取虛虛之禍也

枳寔 辛苦平無毒 本經止痢長肌肉利五臟益氣輕身 發明 枳寔入肝脾血分消食瀉痰滑竅

破氣下痞及宿食不消並宜枳朮故潔古枳朮丸以調脾胃寔祖金匱治心下堅大如盤用枳寔白朮

湯之法腹即軟消潔古曰心下痞及宿食不消發熱並宜枳是黃連好古曰益氣則佐之以參朮乾薑破氣則佐之以大黃芒硝此本經所以言益氣而潔古復言消痞也李士材云自東垣分枳殼治高枳是治下好古分枳殼治氣枳寔治血然究其功用皆利氣也凡氣弱脾虛致停食痞滿治當補中益氣則食自化痞自散若用枳殼枳寔是抱薪救火矣

枸橘 辛溫無毒 發明 枸橘與枳同類其幹多刺故破氣散熱之力過之時珍治下痢膿血後重今人解酒毒用之總取其破氣之力也丹方以枸橘煨末存性酒服方寸匕治胃脘結痛又以醋浸熬膏攤貼內傷諸痛貼即痛止但須久貼方不復發

梔子 苦寒無毒入吐劑取肥梔生用入降火藥以建梔薑汁炒黑用 本經主五內邪氣胃中熱氣面

赤酒飽鼓鼻白癩赤癩瘡瘍 發明 梔子仁體性輕浮專除心肺客熱本經治五內邪氣胃中熱氣等

病不獨除心肺客熱也其去赤癩白癩瘡瘍者諸痛癢瘡皆屬心火也炮黑則專瀉三焦之火及痞塊中

火最清胃脘之血屈曲下行能降火從小便中泄去仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹梔

子豉湯主之因其虛故不用大黃既亡血亡津內生虛熱非此不去也治身黃發熱用梔子柏皮湯身黃

腹滿小便不利用茵陳梔子大黃湯取其利大小便而蠲濕熱也古方治心痛恒用梔子此為火氣上逆

氣不得下者設也今人沈丹溪之說不分寒熱通用虛寒何以堪之大苦大寒能損伐胃氣不無減食泄

瀉之虞故仲景云病人舊有微溼者不可與之世人每用治血不知血寒則凝反為敗證治寔火之吐血

順氣為先氣行則血自歸經治虛火之吐血養正為主氣壯則自能攝血此治療之大法不可少遺者也

酸棗仁 寔酸平仁甘平無毒 本經主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺久服安五藏 發明 酸

棗仁味甘而潤熟則收斂津液故療膽虛不得眠煩渴虛汗之證生則導虛熱故療膽熱好眠神昏倦怠

之證足厥陰少陽本藥兼入足太陰脾經按酸棗本酸而性收其仁則甘潤而性溫能散肝膽二經之滯

故本經治心腹寒熱邪氣結聚痠痛血痺等證皆生用以賺利肝脾之血脉也蓋肝虛則陰傷而煩心不

能藏魂故不得眠也傷寒虛煩多汗及虛人盜汗皆炒熟用之總取收斂肝脾之津液也歸脾湯用以滋養榮氣則脾熱自除單用煮粥除煩益膽氣膽氣盛而魂夢安矣今人專以為心家藥殊昧此理

白棘 辛寒無毒 本經主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結 發明 白棘乃小棗樹上針故能決刺破結本經主癰腫潰膿與皂刺不甚相遠別錄治丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓療喉痺不通又治腹脇刺痛尿血痔漏皆取其透達肝腎二經也

蕤仁 甘溫無毒去殼湯浸去皮尖水煮過研細紙包壓去油用 本經主心腹邪熱結氣明目目赤痛傷淚出目腫皆爛 發明 蕤仁甘溫而潤能治諸經風熱之邪心腹邪熱結氣不獨治目疾也眼風癢或生翳或赤皆黃連蕤仁去皮研膏等分以乾棗去核填入煎水點眼甚驗但不因風熱而因於虛者勿用

山茱萸 酸溫無毒去核微焙用核能泄精 發明 滑則氣脫瀉以收之山茱萸止小便利秘精氣取其酸瀉以收滑也甄權治腦骨痛癢耳鳴補腎氣興陽道堅陰莖添精髓止老人尿不節治面上瘡能發汗止月水不定詳能發汗當是能斂汗之誤以其酸收無發越之理仲景八味丸用之蓋腎氣受益則封藏有度肝陰得養則疎泄無虞乙癸同源也命門火旺亦濁淋痛及小便不利者禁服○本經食茱萸主治從古誤列山茱萸條內今移入彼庶不失先聖立言本旨具眼者辨諸

金櫻子 甘酸瀉溫無毒刮開去核及毛用 發明 金櫻子止小便遺泄瀉精氣取其甘溫而瀉也夫經絡隧竅以通暢為和平而味者無過服之以取快慾則不可若精氣不固者服之何咎之有但陰虛多火人誤服每致瀉瀉甚痛不可不慎

郁李仁 即棠棘一 仁辛苦平無毒湯浸去皮及雙仁者研如膏勿去油忌牛馬肉及諸酪 本經主大腹水氣面目四肢浮腫利小便水道 發明 郁李仁性潤而降為大便風秘專藥本經治大腹水氣面目四肢浮腫取其潤下之意利小便水道者水氣從之下趨也搜風順氣凡用之雖有潤燥之功而下後

郁李仁 即棠棘一 仁辛苦平無毒湯浸去皮及雙仁者研如膏勿去油忌牛馬肉及諸酪 本經主大腹水氣面目四肢浮腫利小便水道 發明 郁李仁性潤而降為大便風秘專藥本經治大腹水氣面目四肢浮腫取其潤下之意利小便水道者水氣從之下趨也搜風順氣凡用之雖有潤燥之功而下後

令人津液虧損燥結愈甚老人津液不足而燥結者戒之根治風蟲牙痛濃煎含漱冷即吐去更含勿嚥
沐以其能降泄也

鼠李當作猪李子一名牛李子熟汁可以染綠今造絨馬舖取汁刷印綠色故又名綠子 苦涼微毒 本經主寒熱瘰癧瘡 發明 牛李生青

熟黑而帶紅紫入肝腎血分其味苦涼善解諸經伏匿之毒本經治寒熱瘰癧大明治水腫腹滿蘇恭治

下血及疝瘕積冷搗敷牛馬瘡中生蟲時珍治疥癬有蟲總取其去濕熱之功惜乎世鮮知用惟錢氏必

勝膏治痘瘡黑陷及出不快或觸穢氣黑陷方用牛李熬膏桃膠湯化皂子大一丸如人行十里再進一

丸其瘡自然紅活蓋牛李解毒去濕熱桃膠辟惡氣活血耳

女貞寔 苦甘微寒無毒其子黑者為女貞寔若紅色者即為女青非女貞也 發明 女貞少陰之精

但性稟純陰味偏寒滑脾胃虛人服之往往減食作瀉以本經枸骨主治誤列此味之下後世繆認女貞

有補中安五藏之功多致誤用滋患特甚因表而出之

枸骨一名猫兒刺俗名十大塊 微苦甘平無毒 本經補中安五藏養精神除百病久服肥健輕身不老 發明

枸骨本經諸家本草皆誤列女貞條下味苦甘平有補中安五藏養精神除百病久服肥健輕身不老之

功皆指枸骨而言女貞至陰之物安有如上等治乎其木嚴冬不凋葉生五刺其子正赤允為活血散瘀

堅強筋骨之專藥又為填補髓藏固斂精血之要品僅見丹方不入湯丸古方惟浸酒補腰脚令健枝葉

燒灰淋沐或煎膏塗白癩風今方士每用數斤去刺入紅棗二三斤熬膏蜜收治勞傷失血痿軟往往獲

效以其能調養血氣而無傷中之患也其脂為糯以粘禽鳥其能滋培精血可知

衛牙辭魏 苦寒無毒生山石間小株成叢葉似野茶三四月生小黃綠花寔如冬青子條上有羽如箭

視之若三耳故名之若三 本經主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱症 發明 鬼箭專散惡

血故本經有崩中下血之治別錄治中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫即腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱症之

治今人治賊風歷節諸痺婦人產後血暈血結聚於胸中或偏於脇肋少腹者四物倍歸加鬼箭羽紅花

玄胡索煎服以其性專破血力能墮胎妊娠禁服

南燭牛筋樹也俗名烏藥 苦平無毒 發明 凡滋腎藥皆能傷脾此獨止泄除睡者氣與神通藏器言久服輕

身不饑變白不老者強精益氣之驗千金月令方用之今四月八日煮汁造青精飯是也

五加根皮 辛溫無毒 本經主心腹疝氣腹痛益氣療癆小兒三歲不能行疽瘡陰蝕 發明 五加

者五車星之精也為風濕痿痺壯筋骨助陽氣之要藥本經治心腹疝氣腹痛益氣療癆小兒三歲不能

行其溫補下元壯筋除濕可知別錄治男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰癢腰脊痛脚脾風弱大明治

骨節拘攣蘇恭主四肢攣急種種皆須釀酒則力勢易行非湯藥中所宜

枸杞 甘平無毒河西及甘州者良 本經主熱中消渴久服堅筋骨耐寒暑 發明 枸杞子味甘色

赤性溫無疑根味微苦性必微寒緣本經根子合論無分以致後人或言子性微寒根性大寒或言子性

大溫根性苦寒蓋有感於一本無寒熱兩殊之理夫天之生物不齊都有豐於此而澆於彼者如山茱萸

之肉瀆精核滑精當歸之頭止血尾破血橘冥之皮除痰膜聚痰不一而足即炎帝之嘗藥不過詳氣味

形色安有味甘色赤形質滋映之物性寒之理本經所言主熱中消渴堅筋骨耐寒暑是指其子而言質

潤味厚峻補肝腎衝督之精血精得補益水旺骨強而腎虛火炎熱中消渴血虛目昏腰膝疼痛悉愈而

無寒暑之患矣所謂精不足者補之以味也古語有云去家千里勿食枸杞甚言補益精氣之速耳然元

陽氣衰陰虛精滑及婦人失合勞嗽蒸熱之人慎用以能益精血精旺則思偶理固然也

地骨皮 甘淡微寒無毒泉州者良 本經主五內邪氣周痺風濕久服堅筋骨輕身不老 發明 地

骨皮枸杞根也三焦氣分之藥下焦肝腎虛熱骨蒸自汗者宜之熱淫於內瀉以甘寒也人但知芩連治

上焦之火知柏治下焦之火謂之補陰降火不知地骨之甘寒平補有益精氣退邪火之妙時珍嘗以青

蒿佐地骨退熱屢有殊功又主骨槽風證亦取入足少陰味薄即通也本經主五內邪氣周痺風濕輕身

不老取其甘淡化熱苦寒散濕濕散則痺者通熱化則五內安其氣清其味薄其質輕誠為修真服食之

仙藥按續仙傳云朱孺子見溪側一花大逐入枸杞叢下掘之得根形如二大京而食之忽覺身輕本經之輕身不老可確徵矣則枸杞之滋益不獨在子而根亦不止於退熱也苗葉微苦亦能降火及清頭目

澁疏一名巨龍 苦平一云辛寒無毒 本經主皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道 發明 澁疏與枸杞相

類先哲雖以有刺無刺樹高樹小分辨然枸杞未嘗無刺但樹小則刺多樹大則刺少與酸棗白棗無異

本經枸杞條下主五內邪氣熱中消渴即澁疏之除邪氣也枸杞條下主周痺風濕即澁疏之止遺溺利

水道也除去五內之邪則熱中消渴愈矣疏利水道之熱則周痺風濕痊矣澁疏利則氣化無滯子藏

安和觀千金方與梅核仁辛美藁本澤蘭子葛上亭長同清子藏三十六疾其清利風熱之性可知或云

巨骨即地骨之大者按種樹書云收子及掘根種肥壤中待苗生剪為蔬食甚佳澁疏之名未必非此

石南 辛苦平無毒 本經養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛 發明 石南嚴冬不凋凌霜正赤性溫益

腎可知本經養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛皆取益腎之功古方為風痺腎弱要藥今人絕不知用蓋由

甄氏藥性論有令人陰痿之說殊不知服此藥者能令腎強嗜慾之人藉此放恣以致痿弱而歸咎於藥

良可恨也

牡荊脚黃 寔苦溫根葉甘苦平 莖漑甘平無毒 發明 荊為治風逐濕祛疾解熱之藥寔除骨間寒

熱下氣治心痛及婦人白帶炒熟酒煎服治小腸疝氣浸酒治耳聾葉治霍亂轉筋下部濕熱脚氣腫滿

以荊莖入罈中燒煙薰湧泉穴及痛處汗出則愈搗爛盒蛇傷根主頭心肢體諸風解肌發汗莖治火灼

瘡爛煎水救風牙痛荊漑除風熱開經絡導痰涎行血氣解熱荊子金翼云凡患風人多熱膏宜以竹漑

荆漑薑汁和勻熱服以瘡為度熱多用竹漑寒多用荊漑二汁同用並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不

能食者則用竹漑氣寔能食者則用荊漑

蔓荊子 苦辛溫無毒 本經主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲 發明 蔓荊子入

足太陽體輕而浮故治筋骨間寒熱濕痺拘急上行而能故能明目堅齒利九竅去白蟲及風寒目痛頭

面風虛之證然胃虛人不可服恐助痰濕為患也凡頭痛目痛不因風邪而血虛有火者禁用腫神散大尤忌

紫金皮 苦平無毒苦如膽而紫厚者良 發明 紫荆木之精也入手足厥陰血分能破宿血下五淋通小腸解諸毒治傷寒赤膈黃耳活血消腫為杖瘡必用之藥治癰疽流注諸毒冷熱不明者用紫荆皮獨活亦均白芷白蠟炒為末葱湯調敷痛甚筋不舒者加乳香甚驗

木槿根皮 甘苦微寒無毒 發明 槿為癖科要藥潤燥活血川中所產質厚色紅稱勝而世不易得土槿皮亦可用之但力薄耳其治腸風下血取其清熱滑利耳其治病後作渴餘熱在經津液不足也○其花以干瓣白者為勝陰乾為末治反胃吐食陳糯米湯下二錢日再服紅者治腸風血痢白者治白帶白痢並焙入藥○子治偏正頭風燒煙薰患處并用為末酒服一錢七效

芙蓉 辛平無毒 發明 芙蓉葉散癰疽殊有神效湯醫祕其名為清涼膏鐵箍散皆此藥也加生大黃赤小豆末麝香其功甚捷

山茶花 苦溫無毒 發明 山茶色紅味苦開於青陽初動之時得肝木之氣而生心火肝藏血心主血故吐血衄血下血為要藥生用則能破宿生新入童便炒黑則能止血其功不減鬱金真血家之良藥也

密蒙花 甘平微寒無毒親之即嚏者真揀淨酒浸一宿漉出眼乾用 發明 密蒙入肝經血分潤肝燥為搜風散結目疾之專藥治青盲昏翳亦腫多眵淚消目中赤脈及小兒痘瘡餘毒疳氣攻眼宜之

木棉子 辛溫微毒 發明 木棉葉青花黃莖赤棉白子黑久為溫走命門之品取子燒存性不獨解

徽瘡毒而痔漏脫肛下血每服半兩黑豆淋酒服之其油然燈能昏人即以其助浮火也

柞木皮 苦平無毒 發明 柞專利竅故治黃瘰鼠瘻催生並燒末用之

黃楊 苦平無毒 發明 黃楊性斂而降婦人難產入達生散中服之則痛陣便緊又搗葉塗瘡癩以

其性斂也

放杖木 甘溫無毒 發明 放杖專治一切風氣血氣理腰脚老人浸酒服之一月放杖故名

接骨木 一名續骨木又名木崩 俗名打打活 甘苦平無毒 發明 此木專主折傷續筋骨除風痺鱗蓋可作浴湯根

皮主痰飲水氣痰瘧打傷瘀血一切血不行並煮汁服之不可多服以氣腥傷伐胃氣也

寓木部

茯苓 甘淡平無毒入補氣藥人乳潤蒸入利水藥桂酒拌晒入補陰藥童便浸切一種或時而成者曰
時苓出浙中但白不堅入藥少力凡用須去盡皮膜則不傷真氣以皮能泄利津液膜能阻滯經絡也

本經主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不饑延年

發明 茯苓得松之餘氣而成甘淡性平能守五藏真氣其性先升後降入手足太陰少陰足太陽陽明

開胃化痰利水定悸止嘔逆泄瀉除濕氣散虛熱本經治胸脇逆氣以其降泄也憂恚驚悸心下結痛以

其上行通心氣也寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便以其導熱滋乾流通津液也本草言其利小便伐胃邪

東垣云小便多者能止瀦者能通又大便瀦者可止大便約者可通丹溪言陰虛者不宜用義似相反者

何哉蓋茯苓淡滲上行生津液開腠理滋水之源而下降利小便潔古謂其屬陽浮而升言其性也東垣

言其陽中之陰降而下言其功也經言飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下

輸膀胱則知淡滲之性必先上升而後下降膀胱氣化而小便利矣若肺氣盛則上盛下虛上盛則煩滿

喘乏下虛則痿躄軟弱而小便頻茯苓先升後降引熱下滲故小便多者能止也大便瀦者胃氣不和

能分利水穀偏滲大腸而泄注也茯苓分利陰陽則瀦自止矣大便約者以膀胱之水不行膀胱硬滿上

撐大腸故大便不能下通也宜茯苓先利小便則大便隨出也至若肺虛則遺溺心虛則少氣遺溺下焦

虛則遺溺胞遺熱於膀胱則遺溺膀胱不約為遺溺厥陰病則遺溺皆虛熱也必上熱下寒當用升陽之
藥非茯苓輩淡滲所宜故陰虛不宜用也此物有行水之功久服損人八味丸用之不過接引他藥歸就

腎經去胞中久陳積垢為搬運之功耳是以陰虛精滑而不覺及小便不禁者皆不可服以其走津也其赤者入丙丁但主導赤而已其皮治水腫膚腫通水道開腠理勝於大腹皮之耗氣也

茯神 甘淡平無毒即茯苓中之抱根而生者 發明 神農本經只言茯苓明醫別錄始添茯神而主治皆同後人治心病必用茯神故潔古云風眩心虛非茯神不能除然茯苓未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補此發前人之秘時珍謂茯苓茯神只當云赤入血分白入氣分如牡丹芍藥之義茯神

中所抱之木治風濕筋骨攣縮與松節同功

琥珀 甘平無毒出番禺楓木脂膏所化俗云茯苓千年化琥珀此誤傳也 發明 古方用琥珀利小便

便以燥脾土有功脾能運化肺氣下降故小便可通若陰虛內熱火炎水涸血少不利者反致燥結之苦其消磨滲利之性非血結膀胱者不可誤投和大黃蠶甲作散酒下方寸七治婦人腹內惡血血盡則止

血結腫脹腹大如鼓而小便不通者須兼沉香輩破氣藥用之又研細傅金瘡則無癢痕亦散血消瘀之驗凡陰虛內熱火炎水涸小便不利者勿服服之愈損其陰滋言彌甚

豬苓 甘淡微苦平無毒 本經主痲瘋解毒蓋症不祥利水道久服輕身耐老 發明 豬苓入腎與膀胱血分性善疎利經府世人但知為利水專藥不知其有治痲瘋蓋症之功仲景治消渴脉浮小便不利微熱者豬苓散汗之病欲飲水而復吐名曰水逆五苓散主之豬苓專司引水之功久服必損腎氣昏

人目利小便之劑無如此駛故不入補劑非澤瀉之比也而本經又云久服輕身耐老是指素多濕熱者而言不可一律而推

雷丸 苦鹹寒小毒竹之餘氣所結皮黑肉白者良入藥炮用赤黑色者殺人 本經殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子 發明 雷丸功專殺蟲楊勛得異疾每發語則腹中有小聲漸漸聲大有道士

曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈此追蟲下積之驗也本經稱其利丈夫別錄云久服陰痿似乎相反不知利者疎利之也疎利太過則閉藏失職故陰痿也千金治小

其利丈夫別錄云久服陰痿似乎相反不知利者疎利之也疎利太過則閉藏失職故陰痿也千金治小

兜傷寒不能服藥治方中恒用之取其逐毒氣之功也

桑寄生 苦甘平無毒 本經主腰痛小兒背強墮腫充肌膚髮齒長鬚眉安胎 發明 寄生得桑之餘氣而生性專祛風逐濕通調血脉故本經取治婦人腰痛小兒背強等病血脉通調而肌膚眉鬚皆受其陰即有癰腫亦得消散矣古聖觸物取象以其寓形格木與子受母氣無異故為安胎聖藥別錄言去女子崩中產後餘疾亦是去風除濕益血補陰之驗惟西蜀南粵不經飼蠶之地始有故真者絕少今世皆榕樹枝質充慎勿誤用其真者絕不易得故古方此味之下有云如無以續斷代之於此可以想象其功用也

松蘿 苦甘平無毒 本經主顛怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛 發明 松蘿是松上女蘿又名兔絲能平肝怒去寒熱邪氣其去頭風止虛汗者本乎天者清上也別錄療疫熱温瘧可為吐湯利水道故肘後方同瓜蒂杜蘅酒漬再宿旦飲一合取吐胸中痰熱頭痛千金方同瓜蒂恒山甘草水酒和煎取吐胸膈痰癖以其輕清上涌故吐藥用之

芭木部

竹葉 甘微寒小毒 本經主欬逆上氣療筋急惡瘍殺小蟲 發明 諸竹與筍皆甘寒無毒惟竹葉受陰風烈日氣多故不無小毒本經主欬逆上氣者以其能清肺胃之熱也療筋急惡瘍者以其能化身中之氣也氣化則百骸條暢何有小蟲之患乎仲景治傷寒解後虛羸少氣氣逆有竹葉石膏湯金匱治中風發熱面赤頭痛有竹葉湯總取清肺胃虛熱之義

竹茹 甘寒無毒 取竹茹法選大青竹磁片刮去外膜取第二層如麻縷者除去屑末用之 發明

竹茹專清胃府之熱為虛煩煩渴胃虛嘔逆之要藥欬逆唾血產後虛煩無不宜之金匱治產後虛煩嘔逆有竹皮大丸千金治產後內虛煩熱短氣有甘竹茹湯產後虛煩頭痛短氣悶亂不解有淡竹茹湯內虛用甘以安中悶亂用淡以清胃各有至理存焉其性雖寒而滑能利竅可無鬱遏客邪之患

竹瀝 甘寒無毒。取竹瀝法以青竹斷二尺許劈開火炙兩頭盛取用之。如欲多取以罈埋土中濕泥糊好量罈口大小用篾箍二道豎入罈口多著炭火於竹頂上炙之。發明 竹葉兼行肌表故能療瘡殺蟲竹茹專清胃府故能止嘔除煩竹瀝善透經絡能治筋脉拘攣瘰癧在皮裡膜外筋絡四肢非竹瀝不能化之純陰之性雖假火逼然須薑汁鼓動其勢方得應手取效千金治風痺身無痛四肢不收志亂不甚有竹瀝飲子詳本經療筋急專取竹瀝之潤以濡之也千金治四肢不收則兼附桂羚羊之雄以振之也一以舒急一以收緩妙用不可思議或言竹瀝性寒僅可使之熱痰不知入於附桂劑中未嘗不開發濕痰寒飲也惟胃虛腸滑及氣阻便悶者誤投每致呃逆不食脫瀉不止而斃陰柔之性不發則已發則必暴卒難挽回也

筍 甘微寒小毒 發明 諸筍多食皆動氣發冷癘令人心痛與羊肝食之損目脾胃虛弱大腸滑瀉皆不宜食俗醫治痘往往勸啜筍湯及加入湯藥不知痘瘡不宜大腸滑利而筍有刮腸寬之名若腸胃不寔尤忌惟血熱毒盛者為宜其乾筍淡片利水豁痰水腫葶藶凡用之

竹黃 甘寒無毒 發明 竹黃出大竹之中津氣結成其味功用與竹瀝同而無寒滑之害涼心經去風熱為小兒驚瀾風熱痰湧失音治痰清熱之要藥以其生天竺國故名天竺黃今藥肆多燒諸骨及葛粉雜入不可不辨

震燒木 發明 雷氣通於心故可治失心驚悸之病又掛門戶大壓火災

藏器部

錦 新絳 黃絹 綿 發明 錦灰主失血血崩金瘡出血新絳治婦人血崩絲本主血加以色絳又用煨灰所以取治失血有效自然黃絲絹煮汁服止消渴及產婦胞損為補膀胱要藥綿灰能止吐衄崩中及大小便諸血

褲襠 發明 仲景治陰陽易病身重少氣腹急引陰膝脛拘急者燒襠散主之取襠中近隱處燒灰水

調方寸匙日三服小便即利陰頭微腫則愈男用女裙女用男裙

裏脚布 發明 男子裏脚布取纏軟者透其腹則腹痛瀉痢便止婦人欲回乳以男子裏脚布勒住一

宿即止功效勝於服藥也

鑿柄 發明 鑿柄治妊娠難產燒灰酒服取其開鑿孔竅也銃楔燒服取其迅發之疾也

弓弩弦 發明 難產取弓弩弦縛腰及燒弩牙納酒中飲之皆取發機快疾之義時珍曰弓弩弦催生

取其速疾也折弓弦止血取其斷絕也

敗蒲扇蒲席 發明 蒲性本寒加以為扇至敗汗漬日久鹹寒相濟故用以燒灰和粉撲身取扇動招

風止汗之義敗蒲席取久卧者燒灰酒服二錢治墜仆惡血同蒲黃當歸赤芍朴硝煎湯調服汗乃血液

沾濡日久用以燒灰同氣相感之應也

漆器 發明 漆本散血故用燒煙治產後血暈熏之即甦又殺諸蟲

燈盞油 苦辛寒小毒 發明 油性熬之愈寒燈油得火氣最深故取以治卒中風不省喉痺痰厥用

鵝翎蘸掃喉中涌吐頑痰通其上逆然後用藥

炊單布 發明 炊單布受熱氣最多故用以治湯火薰蒸面目浮腫燒末敷之即消以類相感也金

匱治墜馬一切筋骨傷損亦用之青布燒灰蜜調敷熱毒瘡效

敗鼓皮 平無毒 發明 敗鼓皮專主蠱毒取其形空而聲響遠振也燒作屑水和服之病人即喚蠱

主姓名往呼本主取蠱即瘥梅師云凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之

食人五藏即死欲知是蠱與否但令病人以唾吐水沉者為是浮者即非用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕須

臾自呼蠱主姓名外臺祕要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如拇指大水一升酒三升煮

二升服之當下蠱毒即愈

本經逢原

卷三

三

本經逢原卷三終

長洲石頑張 璐路王父纂述

蜂蜜 甘平無毒入調補藥用白蜜瀉火藥用赤蜜味酸者不堪入藥不可與生葱獨蒜萹苣同食令人下利凡煉蜜炭火慢煉掠去浮沫至滴水成珠為度煉成每斤入陳酒四兩再熬沸和藥為丸則藥力易化 本經主心腹邪氣諸驚癇瘕安五臟補不足益氣補中止痛解毒除眾病和百藥久服強志輕身不饑不老 發明 蜂采無毒之花醞釀而成生則涼性清熱故能治心腹之邪氣熟則性溫補中安五臟諸不足甘而和平故能解毒柔而潤澤故能潤燥緩以去急故能主心腹肌肉瘡瘍之痛仲景治陽明結燥大便不通用蜜煎導法取其能通結燥而不傷腸胃也凡滋補藥俱用煉白蜜丸取其和脾潤肺也赤蜜味酸食之令人心煩惟降火藥用之白蜜雖補脾肺然性涼潤脾胃不實腎氣虛滑及溼熱痰滯胸痞不寬者咸須忌之故瓊玉膏用糖霜枳木丸用荷葉裹飯佐金丸用米飲牛黃丸用蒸餅黑錫丹用酒麴慈珠丸用神麴虎潛丸用酒香連丸用醋苴珠丹用紅棗滾痰丸用水泛各有所宜今人修製丸劑聚用蜂蜜殊失先哲用方之義

蜜蠟 淡平無毒 本經主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不饑耐老 發明 蜜成於蠟萬物之至味莫甘於蜜莫淡於蠟得非厚此薄彼耶仲景治痢有調氣飲千金治痢有膠蠟湯蓋有見於本經之義也淡為五味之本胃為五藏之源故能補中續傷蓋有得於大極也甄權治孕婦胎動下血不絕欲死以雞子大一枚煎三五沸投美酒半升服立瘥又能解毒故蠟磬丸用之為君華陀治下痢食入即吐用白蠟五寸匙雞子黃一枚石蜜苦酒髮灰黃連末各半雞子殼先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻乃納連末髮灰熬至可丸乃止二日服盡神効

露蜂房 苦鹹平有毒 本經主驚癇瘕寒熱邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良 發明 露蜂房

陽明藥也。本經治驚癩癩疾寒熱邪氣蟲毒腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛及他病用之者皆取其以毒攻毒殺蟲之功耳。

蠟一名果蠟 細腰蜂也 辛平小毒 本經治久聾效逆毒氣出刺出汗。發明 詩言螟蛉有子。蜾蠃負之。言

細腰之蜂。取青蟲之子。教祝變化成子也。大明治嘔逆生研能置竹木刺即本經出刺出汗。取其毒之銳

以出其刺也。

蟲白蠟 甘溫無毒 發明 蠟梅屬金性專收斂堅強之氣其葉能治瘡腫蟲食其葉而成與桑螵蛸

無異為外科之要藥。取合歡皮同入長肉膏中神效。今人治下疳服之未成即消。已成即斂。以半兩入鮑

魚腹中煮食。治腸紅神效。

紫釧即紫草 甘鹹平小毒 發明 紫釧乃騏驎竭樹上蟻壤聚其脂液而成與蜂釀蜜無異。出真蠟為

上波斯次之。古方治五藏邪氣金瘡崩漏破積血生肌止痛。今人專治痘瘡有活血起脹之功。無鹹寒作

瀉之患。其功倍於紫草。故以紫草草呼之。實非紫草同類也。

五倍子即川文蛤 苦酸鹹平無毒。產川蜀如菱角者佳。法釀過名百藥煎。每五倍末一斤。入桔梗甘草真茶

各一兩為末。入哮槽二兩。拌和置糠中窖。待起如發麩狀即成矣。作餅晒乾用。發明 川文蛤善收頑

痰解熱毒。黃昏咳嗽乃火氣浮於肺中。不宜用涼藥。宜五倍五味斂而降之。若風寒外觸暴嗽及肺火實

盛者禁用。以其專收而不能散也。故痰飲內盛者。誤用則聚斂於中。往往令人脹閉而死。為末收脫肛及

子腸墜下。○百藥煎性浮。味帶餘甘。治上焦痰嗽熱渴諸病。含嚙尤宜。煨過主下血烏鬚髮。消腫毒。斂金

瘡。治喉痺口瘡。搽之便可進食也。

桑螵蛸 甘鹹平無毒。桑枝上螳螂子也。火炙黃用。本經主中傷。疝瘕。陰痿。益精生子。女子月閉腰痛。

通五淋。利小便水道。發明 桑螵蛸肝腎命門藥也。功專收瀉。故男子虛損腎衰陽痿夢中失精遺溺。白濁方多用之。本經又言通五淋。利小便水道。蓋取以世下佳。虛帶也。桑藥肖。故台小更須數。如調米。甘。

心神恍惚瘦悴食少得之女勞者方用桑螵蛸遂志龍骨菖蒲人參茯苓當歸龜甲各一兩卧時人參湯調下二錢如無桑樹上者以他樹上者濃煎桑白皮汁佐之若陰虛多人誤用反助虛陽多致洩亦並痛強中失精不可不知生研爛塗之出箭鏃

雀甕一名站蜥俗名戴毛甘平小毒本經主寒熱結氣蠱毒鬼疰小兒驚癇發明雀甕站蜥殼也其蟲夏

生葉上背上有刺螫人故名戴毛秋深葉盡欲老口吐白沫凝聚漸硬在中成蛹如蠶至夏羽化而出其形有似蜻蜓而翅黑稍闊放于葉上而成站蜥謂雀甕者以雀好食其蛹也入藥惟取石榴樹上者連蛹炙焙用之蘇頌曰今醫家治小兒驚癇用雀甕子連蟲同白殭蠶全散各三枚微炒搗末前麻黃湯調服一字日三服大效藏器治小兒撮口不得飲乳但先勞口傍見血以雀甕打破取汁塗之

原蠶蛾鹹溫小毒取未交雄蛾紙封焙乾拌椒蜜藏則不蛀本經主心腹邪氣起陰痿益精氣強志

生子好顏色補中輕身發明蠶之性稟淫火力專助陽其子在臘月中非以重鹽鹽透水漬曝乾則繭不能繼緣出子之後非桑不食本經主心腹邪氣皆桑之餘力猶殭蠶之治風疾蠶繭之療癰腫蠶沙之去風溼耳其起陰痿益精氣強志生子即別錄之益精氣強陰道交精不倦亦能止精若合符節好顏色令人面色好之互辭補中輕身者以其善補真陽陽主輕捷故也詳參經旨洵為原蠶主治無疑奈何集本草者誤列榜雞之下敢力正之

白殭蠶鹹辛平無毒色白者良入藥惟取直者為雄去黑口及絲炒用本經主小兒驚癇夜啼去三蟲

滅黑黚令人面色好男子陰瘍病發明殭蠶蠶之病風者也功專祛風化痰得乎桑之力也本經治驚

癇取其散風痰之力也去三蟲滅黑黚男子陰瘍取其滌除浸淫之淫三蟲亦溼熱之蠹也凡咽喉腫痛及

喉痺用此下咽立愈其治風痰結核頭風皮膚風疹丹毒作癢疳蝕金瘡疔腫風疾皆取散結化痰之義

蠶繭甘溫無毒發明蠶繭治癰腫無頭燒灰酒服次日即破者湯治消渴繭絲湯及絲棉煮汁功

用相同

蠶退脚馬 甘平無毒即老蠶眠起所蛻皮入藥微炒用今以出過蠶之紙為馬明退非也 發明 蠶

非桑葉不生得東方水氣之全故能治風病血病而蛻治目中翳障較之蟬蛻更捷惜乎一時難覓

蠶沙 甘辛溫無毒微炒用 發明 蠶沙療風濕之專藥有人病風痺用此焙熟絹包熨之治爛弦風

眼以麻油浸蠶沙二三宿研細塗患處過宿即愈蠶沙置酒罈上泥好色清味美然惟晚者為良早蠶者

不堪入藥以飼時火烘故有毒也

九香蟲 鹹溫無毒 發明 九香蟲產貴州治膈脫滯氣脾腎虧損壯元陽攝生方烏龍丸用之

雪蠶脚雪 甘寒無毒 發明 雪蛆生峨眉山北積雪連年不消其中生此大如瓠味極甘美故能解

內熱渴疾方物中之最益人者也

蜻蛉脚蜻 赤者名赤卒 微寒無毒 發明 蜻蛉生水中而能暖水藏強陰膏精而赤者性猶壯熱

助陽藥用之

樗雞脚紅 苦平有毒不可近目去翅足同糯米炒去米用 發明 樗雞厥陰經藥也能活血散血治

目翳撥雲膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義能通血閉行瘀血主瘰癧辟邪氣療獠犬傷治偏

頭風用紅娘子青娘子各七枚去翅足炒為末同葱莖搗塗痛處周時起泡去之孫一奎治血蠱用抵當

丸以樗雞易水蛭三服血下脹消形神自復與薛新甫治水腫椒仁丸中芫青不殊一走血而下瘀一走

氣而破水皆峻劑也綱目以本經原蠶蛾主治誤列於此今正之

芫青脚青 辛溫有毒去翅足同糯米炒去米用 發明 芫青居芫花上而色青故能泄毒攻積破血

墮胎功同斑蝥而毒尤猛芫花有毒故也其治瘋犬傷消目翳去偏頭風塞耳聾皆取其毒銳也又治月

閉水腫椒仁丸方用之

斑蝥 辛鹹溫有毒去翅足同糯米炒熟或醋煮用之 本經主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石

癘 發明 斑蝥入獲得時尾後惡氣射出臭不可聞其性專走下竅利小便故本經言破石癘能攻實

結而不能治虛秘不過引藥行氣以毒攻毒而已但毒行小便必澇痛當以木通滑石導之其性猛毒力能墮胎虛者禁用瘋犬傷先於患人頭上拔去血髮二三莖以斑蝥七枚去翅足炙黃同蟾蜍搗汁服之瘡口於無風處糊去惡血小便洗淨髮灰敷之服後小便當有瘀毒泄出三四日後當有肉狗形三四十枚為盡如數少再服七枚若早服雖無狗形永不發也

葛上亭長 辛溫有毒去翅足同糯米炒去米用 發明 亭長大毒善通淋及婦人經脈不通以五枚研末服三分空心甘草湯下須臾臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通此蟲五六月為亭長頭赤身黑七月斑蝥九月為地膽隨時變化其毒可知

地膽 辛溫有毒同糯米炒去米用 本經主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥墮胎 發明 地膽有毒而能攻毒性專破結墮胎又能除鼻中瘰肉下石淋功同斑蝥力能上通下泄

蜘蛛 微寒有毒其種類不一惟用懸網者入藥 發明 仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之以其入肝性善循絲上下故取以治疝丸上下之病別錄治大人小兒疝疝又治乾霍亂服之能令人利其邪得以下泄也搗汁塗蚊傷效

壁錢 無毒 發明 生壁間似蜘蛛而形扁其膜色白如錢故名治鼻衄及金瘡出血不止取蟲汁注鼻中及點瘡上同人中白等分燒研治疝又治喉痹

蠍 辛平有毒被螫者以木碗合之即愈去毒及足用亦有獨用其尾者其功尤捷滾醋泡去鹹炒乾用 發明 蠍產於東方色青屬木治厥陰諸風掉眩及小兒胎驚發搐最為要藥左半身不遂口眼喎斜語言寒瀉手足抽掣瘧疾寒熱耳聾無聞心氣帶下無不用之蠍尾膏治胎驚發搐用蠍梢二十一枚麝香少許屢效東垣治月事不調寒熱帶下有丁香柴胡湯方用羌活柴胡當歸生地丁香全蠍蓋取以散血分之風熱耳

水蛭 鹹苦平有毒水蛭是小長色黃挑之易斷者勿誤用泥蛭頭圓身闊者服之令人眼中如生烟漸

至枯槁凡用水蛭曝乾猪油熬黑令研極細倘火不透雖為末經年得水猶活入腹尚能復生凡用須預先熬黑以少許置水中七日内不活者方可用之 本經逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道

發明 鹹走血苦勝血水蛭之鹹苦以除畜血乃肝經血分藥故能通肝經聚血攻一切惡血堅積本經言無子。是言因血癥積聚而無子也別錄云墮胎性劣可知昔人飲水誤食水蛭腹痛面黃飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥得土氣隨出或用牛羊熱血同猪脂飲亦下。或以梅漿水多飲則蛭溶化而出也

焮 苦寒無毒漂淨炙黃搗細末同糖霜食之 發明 焮出糞中故能消積治小兒諸疳積滯取消積而不傷正氣也一法用大蝦蟆十數隻打死置罈內取糞焮不拘多少河水漬養三五日以食盡蝦蟆為度用麻布紮住罈口倒懸活水中令污穢淨取新瓦燒紅置焮於上焙乾治小兒疳積腹大脚弱腎膜遮

睛每服一二錢量兒大小服之無不驗者勿以其鄙而忽諸

狗蠅 鹹溫無毒 發明 蠅食狗血性熱而銳力能拔毒外出故治痘瘡倒靨色黑唇口冰冷之證以數枚插細醋酒少許調服聞人規方也

蟻螞 鹹微溫有毒 本經主惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿通月閉目中淫膚青腎白膜 發明 蟻螞穴土而居與蚯蚓不異故本經所治皆瘀血之證金匱治虛勞瘀血大黃廔蟲丸方用之取其去

脇下堅滿也許學士治筋急養血地黃丸中用之亦取其治血瘀也取汁滴目去翳障散血止痛千金研末敷小兒臍瘡加諸脂調治小兒瘡緊經驗方治瘀傷腫痛肘後搗塗竹木刺蘇頌搗汁點喉痺得下即

開藏器塗遊風丹疹又治麥芒入眼以蟻螞在自上隔布摩之芒著布上即出

桑蠹蟲 甘溫小毒色白帶黃而腹中無穢按之無水者為真若頭硬而腹中不淨者即雜樹內蠹也如一時難覓真者則以戴毛殼煨灰存性代之 發明 桑蠹蟲食木桑能勝堅故治痘瘡毒盛白隘不能起發者用以絞汁和白酒釀服之即起但皮薄脚散及泄瀉畏食者服之每致駭裂而成不救不可不慎

千金治崩中漏下赤白桑蠹燒灰溫酒服亦治胎漏下血效

桃蠹蟲 辛溫無毒。本經殺鬼邪惡不祥。發明 桃實中蟲食之令人美顏色。與桃蠹不異。其蟲屎能辟瘟疫。今不相染。為末水服方寸匕。

炸蟬 鹹甘寒無毒。本經主小兒驚癇夜啼癩病寒熱。發明 蟬主產難下胎衣。取其能蛻之義。聖惠治小兒發癇有炸蟬湯散丸等方。今人只知用蛻而不知用蟬也。

蟬蛻 鹹甘寒無毒。去翅足用。發明 蟬蛻去腎膜。取其蛻義也。治皮膚瘡瘍風熱。破傷風者。炒研一錢。酒服。神效。痘後目昏。羊肝湯服二錢。則腎漸退。更主痘瘡發癢。若氣虛發癢。又當禁服。小兒夜啼。取蟬蛻四十九枚。去前截。用後截為末。分四服。鈎藤湯服之。即止。驚啼加硃砂二字。若用上截。即復啼也。小兒

驚癇夜啼。癩病寒熱。並用蟬腹。取其利竅通聲。去風豁痰之義。較蛻更捷。

蜚螂 鹹寒有毒。去足火炙用。勿置水中。令人吐。本經主小兒驚癇瘰癧。腹脹寒熱。大人癩疾狂癆。發明 蜚螂手足陽明足厥陰藥也。本經等治。總不離三經之證。其治暴噎吐食。用二枚。入生薑內煨。以

陳橘皮二錢。同巴豆炒過。去巴豆。將蜚螂陳皮為末。每服二分。吹入喉中。吐痰二三次。即愈。又治箭鏃入骨。用巴豆微炒。同蜚螂搗塗。痛定必癢。忍之待極。癢不可忍。乃撼動拔之。又燒灰入冰片少許。治大腸脫肛。搽上托入。搗丸塞下部。引痔蟲出。盡永瘥。其蜚螂心貼疔瘡。拔疔。貼半日許。血盡根出。則愈。然蜚螂最

畏羊肉食之即發。

天牛 甘溫小毒。發明 天牛乃木中蠹蟲所化。楊樹中最多。桑樹中獨勝。長鬚如角。故有天牛之名。利齒善嚙。是有嚙桑之號。其性最銳。取治疔腫惡瘡。出箭鏃。竹木刺。最捷。與螻蛄不殊。一嚙木而飛。一穴

土而出。其頑脫之性則一。如無嚙桑。他樹上者亦可。焙乾為末。蜜調傅之。

螻蛄 鹹寒小毒。去翅足炒用。本經主難產。出肉中刺。去潰腫。下噎噎。解毒除惡瘡。發明 螻蛄性善穴上。故能治水腫。自腰以前。甚瀉。能止大小便。自腰以後。甚利。能通大小便。取以治水。最效。但其性急。虛人戒之。本經治難產者。取其下半者。湯服之。則下也。出肉刺。潰癰腫。惡瘡者。生搗塗之。肉刺即出。瘡腫

即潰也。下哽噎者，天末吹之，哽噎即下。非噎膈之謂也。千金治箭鏃入肉，以螻蛄杵汁滴上三五度，即出。延年方治胎衣不下，以螻蛄一枚，水者數沸，灌下入喉，即出。小兒臍風，螻蛄甘草等分為末，敷之，效。

螢火即燭耀本經名夜光 辛溫無毒。本經明目。發明：螢火本腐草所化，得大火之餘氣而成。入胞絡，三焦能辟邪明目。取其照幽夜明之義務，成于螢火丸。辟五兵，白刀，狼虎虺蛇之毒，惡鬼疫癘之邪。龐安常亦極言其効，惜乎世鮮備用。

衣魚即蠹 鹹溫無毒。即衣帛書畫中之蠹，碎之如銀有粉者是。本經主婦人疝瘕，小便不利。小兒中風項強，背起摩之。發明：衣魚主中風項強，摩之即安。驚癇天疳，口喎淋閉，服之即愈。皆手足太陽經病，乃神農本經之藥。古方盛用，今人罕知。合鷹屎白殭蠶敷瘡癩滅。

鼠婦本經名蚰蟥即溼生蟲 酸鹹無毒。發明：金匱治久瘧，鼈甲煎丸中用之。以其主寒熱，去瘀積也。古方治驚癇血病，多用之。厥陰血分藥也。千金治產婦遺尿，以鼠婦七枚，熬研溫酒服之。痘瘡倒靨，為末酒服一字，即起。又解射干蜘蛛毒。

虻蟲本經名地虻 鹹寒有毒。或去足炒用，或酒醉死去足搗汁用。本經主心腹寒熱，酒洒。血積癥瘕，破堅下血閉。發明：虻蟲伏土而善攻隙穴，傷之不死。與陵鯉不殊，故能和傷損，散陽明積血。本經治心腹寒熱，酒洒，亦是積血所致。金匱大黃虻蟲丸，用水蛭虻蟲取其破堅癥下積血耳。無貫結者，勿用。跌撲重傷，焙乾為末，酒服二錢，接骨神効。

蠶即蜚 苦微寒有毒。即噉牛血蠅，去翅足炒用。本經逐瘀血，破血積，堅痞癥瘕，寒熱，通利血脈。九竅發明：蠶食血而治血，因其性而為用。肝經血分藥也。本經治癥瘕寒熱，是因癥瘕而發寒熱，與蟻

蟻治腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯丸，水蛭虻蟲雖當並用一物之純險懸殊，其治經閉用四物加蜚蠊作丸服甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血，血結不行者，以苦攻之。其性雖緩，亦能墮胎。

瘡除 皮辛涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾，泥固煨存性，用其目赤，嘴亦有毒。一種色青而生，肢澤

中者曰毒與此不同 發明 蟾蜍土之精也習土遁者賴之其形大而背多痱磊者是土性厚重其行

極遲土生萬物亦能化萬物之毒故取以殺疔積治鼠瘻蝕陰疽癰燒灰傳惡瘡並效弘景治温病發斑

困篤用以去腸生搗一二枚啜其汁無不瘥者治獺犬傷先於頂心拔去血髮三四莖即以蟾蜍一二枚

搗汁生食小便內見沫其毒即解又破傷風用二枚生切如泥入椒一兩同酒炒熟入酒一盞乘熱飲之

少頃通身汗出而愈發背疔腫初起以活蟾一隻繫定放腫上半日蟾必昏潰即放水中以救其命再換

一隻如前蟾必跟踉再易一枚其蟾如舊則毒散矣其金蟾丸治腫脹腹滿并治小兒疳勞腹大脰細方

用大蟾一隻以砂仁入腹令滿鹽泥固濟煨存性黑糖調服一二錢匕下盡青黃積糞即愈未盡過二三

日再服以腹減熱除為度若糞不能濺注而滴淋不前者此元氣告匱不可救也

蟾酥 辛温有毒 發明 蟾酥辛温其性最烈凡用不過一分齒縫出血及牙疼以紙絛少許搥之即

止蟾酥丸治發背疔腫一切惡瘡拔取疔瘡最捷入外科有奪命之功然輕用能爛人肌肉

蝦蟆 甘寒小毒 本經主邪氣破癥堅壅腫陰瘡服之不患熱病 發明 蟾蜍蝦蟆同類異種故其

功用亦不甚相遠服之不患熱病即弘景治温病發斑困篤之意時珍言古方多用蝦蟆近方多用蟾蜍

蓋古人通稱蟾為蝦蟆而蝦蟆不復入藥矣

毒俗作蛙 甘寒無毒 發明 時珍曰毒產於水與螺蚌同性故能解熱毒利水氣但係濕生之物其骨

性復熱食之小便苦淋妊娠食蛙令子壽夭小蛙多食令人尿閉臍下酸痛搗車前水飲之可解戴厚禮

云凡渾身水腫或單腹脹者以青蛙一二枚去皮炙熟食之則自消也嘉謨曰時行面赤項腫名蝦蟆瘟

以金線畫搗汁水調空腹頓飲極效

蚪斗 發明 蚪斗生水中蝦蟆子也有尾如魚漸大則脚生尾脫因其所稟之毒未化故藏器取治火

賊熱毒及腫瘍瘡並搗碎傅之或化水塗之或配入敷藥中並效又得效方多用蚪斗陰乾待桑椹熟等

分置瓶中密封懸屋東或搗汁浸埋東壁下百日化泥取塗鬚髮永黑如漆

蜈蚣 辛溫有毒。火炙去足用。本經主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精除瘧瘡去三蟲。發明

蓋行而疾者。惟風與蛇。蜈蚣能制蛇。故亦能截風。厥陰經藥也。嶺南有蛇瘡。項大腫痛。連喉用赤足蜈蚣

二節。研細水下即愈。又破傷風欲死。研末擦牙邊去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒。悉能解之。萬金散

治小兒急驚。蜈蚣一條。去足炙黃。入硃砂輕粉乳汁為丸。服少許即安。雙金散治小兒天吊。目久不下。口

噤。反張。蜈蚣一條。酥炙去頭足。入麝香為末。以少許吹鼻。至眼合乃止。若眼未下。再吹之。小兒撮口。刮破

舌瘡。蜈蚣末敷之。千金治射工毒瘡。蜈蚣炙黃為末敷之。小兒禿瘡。蜈蚣浸油搽之。直指方治痔瘡疼痛。

蜈蚣炙末入片腦少許。唾調敷之。急救方治溫瘧。酒時驚涼膈散加蜈蚣蠟尾服之。摘要治婦人趾瘡。

甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條。去頭足焙研入麝香少許。去硬蓋攤烏金紙留孔貼上。一夕即效。如有

惡肉外以南星末醋和傅四圍。其祛毒之功。無出其右。

蚯蚓即地龍 鹹寒小毒。白頸者良。解熱毒。入鹽化水用。通經絡。炙乾用。本經主蛇瘡。去三蟲。伏尸。鬼疰

蟲。毒殺長蟲。發明。蚯蚓在物。應土德。在星為軫水。體雖卑伏。而性善穴竅。專殺蛇蠱三蟲。伏尸諸毒。

解溼熱。療黃疸。利小便。通經絡。故活絡丸以之為君。地龍湯治痘瘡。脾胃虛熱。嬌紅五六日。漸變乾紫。伏

陷者。同葶藶搗和酒釀服之。即起。若乾紫色。黯皮堅。為肝脾血熱。即宜犀角紫草。苗連清解。非地龍所宜。

溫病大熱狂妄。天行大熱。和人尿搗絞服之。熱毒從小便而去也。小便暴秘不通。亦宜用之。入葱化為水。

療暴聾。

蝸牛 鹹寒小毒。發明。蝸牛。生下濕地。陰雨即出。至陰類也。治諸腫毒痔漏。制蜈蚣蠟。諸毒。

研爛塗之。取其解熱消毒之功耳。其形尖小而緣桑上者。謂之緣桑。蠶治大腸脫肛。和猪脂塗之。立縮。此

言蠶諸木上皆有。獨取桑上者。正如桑螵蛸之義。

龍蛇部
龍骨 甘平無毒。粘舌色白者良。煨赤水飛用。飛之不細。粘著腸胃。令人寒熱。本經主心腹鬼疰。精物

老魅效逆泄利膿血女子漏下。癥瘕堅結。小兒熱氣驚癇。發明 瀉可以去脫龍骨入肝斂魂收斂浮越之氣。本經主心腹鬼疰精魅諸疾。以其神靈能辟惡氣也。其治效逆泄利膿血女子漏下。取瀉以固上下氣血也。其性雖瀉而能入肝破結。癥瘕堅結皆肝經之血積也。小兒熱氣驚癇亦肝經之病。為牛黃以協濟之。其祛邪伐肝之力尤捷。許洪云。牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制服之也。其性收陽中之陰。常走足厥陰經。兼入手足少陰。治夜夢鬼交。多夢紛紜。多寐泄精。衄血吐血。胎漏腸風。益腎鎮心。為收斂精氣要藥。有客邪則兼表藥用之。故仲景治太陽證。火劫亡陽。驚狂。有救逆湯。火逆下之。因燒針煩躁。有桂枝甘草龍骨牡蠣湯。少陽病誤下。驚煩。有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱治虛勞。失精。有桂枝加龍骨牡蠣湯。千金方同。遂志酒服。治健忘心忪。以二味蜜丸。硃砂為衣。治勞心夢泄。梅師同桑螵蛸為末。鹽湯服。二錢。治遺尿淋瀝。又主帶脈為病。故崩帶不止。腹滿腰溶。浴若生水中。止瀉藥中加用之。止陰瘧。收濕氣。治休息痢。久痢脫肛。生肌斂瘡。皆用之。但收瀉太過。非久痢虛脫者。切勿妄投。火盛失精者。誤用多致溺赤。瀉痛精愈不能收攝矣。

龍齒 瀉平無毒。煨亦醋泮。七次水飛。用形如筆架。重數兩。外光澤如鏡。碎之。其理如石。內如龍骨。舐之粘舌者。真。亦有微黑。而煨之色如翡翠者。為蒼龍齒。較白者更勝。其小如笋尖。或如指狀者。海鯁齒。及骨也。叢生如貫眾根者。海馬齒也。舐之亦能粘舌。世多以等類偽充。不可不辨。本經主殺精物。大人驚癇。諸癎。癩疾。狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚。十二癇。發明 龍者東方之神。故骨與齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂。能變化。故遊魂不定者。治之以龍骨。古方有遠志丸。龍齒清魂散。平補鎮心丸。皆收攝肝氣之劑也。又龍骨以白者為上。取固上氣。以攝下脫。齒以蒼者為優。生則微黑。煨之翡翠可愛。較白者功用更捷。產後血暈為要藥。取其直入肝藏也。子聞神龍蛻骨之說。初未之信。及從藥肆。選覓龍齒。見其骨有變化未全者。半與牛骨無異。始知宇宙之大。無所不有。即如蛇蟲之屬。皆能蛻形化體。豈特雲龍風虎而已哉。龍稟東方純陽之氣。故能興雲致雨。東方木氣。主乎生也。其耳獨不司聽者。陽神別走於角也。春

夏發現而秋冬潛伏者隨陽氣之鼓舞也虎稟西方陰暴之性故嘯則生風西方金令主乎殺也其項獨不能仰者陰威併振於尾也晝潛伏而宵奮迅者乘陰氣之暴虐也以是推之則虎骨能搜風氣健筋骨療疾重睛能定人魄魄者陰之精也龍骨能蓄精氣收神識止滑脫齒能清人魂魄者陽之神也然龍性飛騰而骨獨粘者正以其滯而欲蛻之始得飛冲御天非飛冲後而蛻其骨也觀本經驚癩癩疾結氣甄權鎮心安魂魄等治總皆入肝欽魂用以療陽神之脫同氣相求之妙許叔微云肝藏魂能變化故魂遊不定者治之以龍齒時珍曰龍者東方之神故其骨與齒皆主肝病。

龍角 甘平無毒。發明 龍稟東方木氣而角又督脈所發故治驚癩癩疾神魂不寧龍火上逆身熱如火及邪魅不詳深師五邪丸用之而千金治心病有齒角同用者。

鼈甲 本經名 鼈魚 酸微温小毒 本經治心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子小腹陰中相引痛崩中下血五色

及瘡疥死肌 發明 本經鼈甲所主之證多屬厥陰其功在平肝木治血殺蟲與鼈相類亦能治陰瘡千金有鼈甲煎今藥肆多懸之云能辟蠱亦殺蟲之意

陵鯉甲 俗名穿山甲 鹹微寒小毒或酥或黃土或蛤粉炒發鬆研用尾甲更勝。發明 穿山甲入厥陰

陽明及陰陽二蹠通經下乳瘧疾癰腫發痘為要藥蓋其穴山而尾寓水而食出陰入陽能竅經絡達於病所凡風溼冷痺之證因水溼所致渾身上下強直不能屈伸痛不可忍者於五積散內加穿山甲七片全蠍炒十個葱薑水煎服取汗避風甚良癰疽潰後不宜服

石龍子 鹹温小毒綱目作鹹寒誤產平陽山谷荆襄等處其類有四一種生岩石間頭扁身長尾與身

等長七八寸大者尺餘其狀若蛇而脚似梅花鱗目五色者為雄色黃身短者為雌此物最惜鱗甲故見

人不動捕之亦不聲人以其生岩石間故本經謂之石龍子以其善於變易吞霧吐毒有陰陽析易之義

故字林謂之蜥蜴楚人名為蜥蜴實一物也入藥雌雄並用去頭足酒浸酥炙用之入傳屍藥醋炙用之

一種生草澤脚頭大尾短身粗其色青黃有傷則啣草自斃故謂之蛇醫母能入水與石斑魚合故又名

水蛭場不入藥用一種生人家屋壁形小身細長三四寸色褐斑黑者謂之蠅蟻吳俗名為壁虎以其居壁而善捕蠅蠅也或云飼之以朱點宮娥臂故名守宮一種似守宮而頭圓身細長五六寸色白如銀通身細鱗雌雄上下相應而鳴情恰乃交者蛤蚧也荆襄嶺澤皆有而西川產者最勝捕得成對線纏炙乾捲榕樹皮中者是也以此明辨方無誤用之失 發明 石龍子為本經中品而綱目主治中有別錄而無本經豈本經之文有所殘缺歟抑本經之文誤註別錄歟其治五癰邪結氣利小便水道破石淋下血者以蜥蜴能吐雹祈雨故治癰淋利水道是其本性千金治癰結水腫屍疰留飲有蜥蜴丸外臺治陰積方用之皆取其長於利水道耳按蜥蜴即是石龍今房術藥中用之以其興發助陽而無止瀆之患也

守宮 一名蠅蟻 俗名壁虎 鹹寒小毒 發明 守宮食蠅蟻蠅蟻乃治風要藥詳守宮所治風症驚癩諸病猶蜈蚣之性能透經絡也且入血分故又治血病瘡瘍以毒攻毒皆取其尾善動之義麻城移痘方治痘出眼目及正齒稠密用以移痘於不傷命處其效最捷觀術士以守宮尾杵為細末彈熟肉上其肉便翕翕蠕動移痘方得非從此悟出陶弘景云蠅蟻喜緣籬壁間以殊飼之滿三斤研乾末以塗婦人臂有交接事便脫故名守宮蘇恭曰飼殊點婦人臂諺說也張華言必別有術今不傳矣時珍曰守宮祛風石龍利水功用自別不可不知

蛤蚧 甘鹹溫小毒生嶺南城垣榕樹間及粵西橫州等處者長七八寸蜀中產者不過五寸頭圓肉滿鱗小而厚形似守宮鳴則上下相呼雌雄相應情恰乃交兩相抱負自墮於地人往捕之亦不知覺以手劈之至死不開取以曝乾為房中要藥即尋常捕得者功用亦相髣髴但驗其囫圇成對捲榕樹皮中者即真無疑入藥去頭留尾酥炙用之口含少許疾走不喘者是其益氣之驗也 發明 蛤蚧味鹹歸腎

經性溫助命門色白補肺氣功兼人參羊肉之用而治虛損痿弱消渴喘嗽肺痿吐沫等證專取交合腎肺之氣無以逾之愚按蛤蚧龍子性皆溫補助陽而舉世藥肆中皆混稱不分醫者亦不辨混用龍子則剖開如皮身多赤斑偏助壯火陽事不振者宜之蛤蚧則纏水成對通身白鱗專溫肺氣氣虛喘乏者宜

本經通原 卷四

之虛則補其母也

蛇蛻 鹹甘平小毒。火熬用之。本經主小兒二十種驚癇。蛇癇癩疾。瘰癧弄舌。搖頭寒熱。腸痔蠱毒。

發明 蛇蛻屬翼走肝。故本經治小兒驚癇等病。一皆風毒襲於經中之象。其入藥有四義。一能辟惡。取其性靈也。故治邪辟鬼魅蠱瘧諸疾。二能驅風。取其性竄也。故治驚癇癩疾。偏正頭風。喉舌諸疾。三能殺

蟲。故治惡瘡痔漏疥癬諸疾。用其毒也。四有蛇義。故治眼目昏膜。胎衣不下。皮膚之疾。會意以從其類也。

蚘蛇膽 即南 甘苦寒小毒。發明 蚘蛇產嶺南。稟己土之氣。其膽受甲乙風木。其味苦中有甘。所主

皆厥陰太陰之病。其治心腹脹痛者。蟲在內攻噬也。下部匿瘡者。蟲在外侵蝕也。濕熱則生蟲。燥濕則殺

蟲。內外施之。皆可取用。更能散腫消血。故直諫之臣。受廷杖者。臨服少許。則血不凝滯於內。又能明目涼

血除疔殺蟲。惜乎難得真者。

白花蛇 甘鹹温有毒。產蘄州者良。禁犯鐵。凡用去頭尾。酒浸酥炙。炭火緩焙。去盡皮骨。此物甚毒。不可

不防脇。有方勝尾上有拂者真。發明 蛇性竄能引藥。至於風痰處。故能治一切風病。其風善行數變。

蛇亦善行數蛇。所以能透骨搜風。為大風白癩。風痺驚搐癩癰。惡瘡要藥。取其內走藏府。外徹皮膚。無

處不到也。陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡服蛇酒藥。切忌見風。開罈時須避其氣。免致面目浮腫。凡

癩風。曾服過大楓子仁者。服白花蛇無效。

烏梢蛇 甘平無毒。劍脊細尾者佳。忌犯鐵器。發明 蛇性主風。而黑色屬水。故治諸風頑痺。皮膚不

仁。風瘙隱疹。疥癬執毒。眉鬚脫落。癩癢等瘡。但白花蛇主肺藏之風。為白癩風之專藥。烏蛇主腎藏之風

為紫雲風之專藥。兩者主治懸殊。而烏蛇則性善無毒耳。

蝮蛇 肉大熱。膽微寒。並有毒。發明 諸蛇皆是卵生。惟蝮蛇破母腹出。惡毒尤烈。故以蝮名。其狀較

諸蛇迥異。形短而粗。嘴尖鼻反。故名反鼻蛇。有頭斑。身赤如錦紋者。有黃黑青黑而斑白者。皆蝮蛇也。

有頭扁。與土同色。而無紋者。土虺也。亦名曰蛇。字形相類之誤也。時珍曰。蝮大虺小。其毒則一。抱朴子言。

蛇類最多惟虺中人甚急即時以刀割去瘡肉投之於地其熱如火須臾毒盡人乃得活一種形如蜥蜴長一二尺者千歲蝦也年久脚生能跳上樹啣人啣已還樹垂頭聽人哭聲頭尾相類犬如搗衣杵俗名望板歸言被其啣必死專望板歸以備險具也蘇頌以細辛雄黃等分為末內瘡口中日易三四次又以枯婁根桂末著管中密塞勿令走氣佩之中其毒者急敷之野談翁方急以黃荊葉搗爛敷之上皆解救之法然有用其毒以攻疾厄之毒者別錄取蝦蛇肉釀酒以療癩疾蝦蛇膽磨汁以塗蠹瘡總取殺蟲攻毒之用耳竊謂攻毒急救之藥頗多奚必藉此而為異端之術哉姑存以備解救之法可也

魚部

鯉魚 甘平無毒其目能捷動者有毒藥中有天門冬者勿犯天行病後勿食 發明 魚性逆水而上動則翹尾其力最勞且目不夜瞑故釋氏雕木象形以警世之昏惰者鯉性跳躍急流故取以治水腫之病河間云鯉之治水驚之利水因其氣相感也黃痺脚氣溼熱孕婦身腫宜之便血同白蠟煮食腦髓治耳卒聾齒治石淋膽治目赤腫痛取汁點之鱗治產婦滯血燒灰治吐血崩中十灰散中用之

鱣魚本名鱣魚

甘溫無毒 發明 鱣魚多畜池中飼草而長與青鱣混雜故名曰鱣江湖亦皆有之

食品之長味也時珍言暖中和胃此指池中蓄者而言李廷飛言能發諸瘡此指湖中獲者而言各有至理膽味苦寒能出一切竹木刺在喉中以酒化二三枚溫呷取吐即出

青魚 肉甘平。膽苦寒無毒。 發明 東方色青入通於肝開竅於目故膽有點目治靛之功肉有補肝

逐水之用同茱白者食治脚氣疼痛目睛生汁注眼能黑夜視物以其好噉螺蛭螺蛭能明目也乾青魚

膽水磨點喉痺痔瘡與龍膽同功。

鱧魚鱧魚

甘溫無毒 發明 池魚大都無毒兼此魚恒食諸魚之遺其毒雖少不無助長溼熱之虞

有皂白二種皂者頭大白者腹腴雖食品之下而有溫中益氣之功與鱣魚無異也

闊口魚鱧魚

甘溫無毒 發明 鮓生海中與石首同類以之剖腹曝乾亦與石首作鮓無異以其領

下有骨撐開故有闊之稱能開胃進食下膀胱水氣病人食之無發毒之慮食品中之有益也

鱖魚古名鱖魚 甘溫無毒 發明 鱖魚縮項性不喜動履冬善息水中故食之能調胃氣而無動風發熱

之慮與白魚之性相仿但無利水之功耳

白魚 甘平無毒 發明 白魚入肺利水開胃下氣金匱治淋病小便不利滑石白魚散用之取其佐

滑石以利氣兼亂髮以破血血氣通調而淋漓止矣同羹食之令人腰痛以其滲泄脾腎也

石首魚鰈魚 甘平無毒乾者名白鯊 發明 石首魚生鹹水中而味至淡故諸病食之無助火之虞

與河豚之性稟陰毒迥殊腦中石鯨主石淋腦骨為末入有嚼壺中薰腦漏然惟暴患得效刺疾切忌油

膩惟白鯊食之最宜

鰾膠 鹹平無毒凡用入丸切作小塊蛤粉炒成珠方可磨末煉蜜調劑須待涼用又不可搗搗則粘韌

難為丸矣 發明 諸魚之鱠皆可為膠而石首魚者膠物甚固故膏精方用之合沙苑蒺藜名聚精丸

為固精要藥丹方又以一味炒研砂糖調日服一錢七治痔最良經久痔自枯落燒灰治產後風播破傷

風症取其滋榮經脈而虛風自息也

勒魚 甘平無毒 發明 勒魚腹下有骨勒人因以得名以其甘溫開胃有宜於老人之說作鯊尤良

脊骨治瘧以一寸入七寶飲酒水各半煎露一宿服之

鱒魚 甘溫無毒 發明 鱒魚性補溫中益虛而無發毒之慮其生江中者大而色青味極甘美生海

中者小而色赤味亦稍薄觀其暗室生光迥非常魚可比其鱗用香油熬塗湯火傷效

嘉魚 甘溫無毒 發明 此魚食乳水功用同乳食之令人肥健悅澤腎虛消渴勞瘦虛損者食之最

宜

鰓魚 此魚骨柔肉脆能益胃氣食之令人肥健腹中子性寒有毒多食令人痢下

鯽魚 甘溫無毒為皆者其味最美以其居濁水中雖肥不無小毒然此恆用食品未嘗見其有毒傷人

鱧魚即鱧魚俗名里魚

甘寒無毒。發明 鱧性伏土而能勝水故治水腫療五痔。治濕痺。主脚氣妊娠面浮

脚腫者合赤小豆煮食甚效。丹方治水腫腹大。用活鱧魚去腹垢入獨顆蒜令滿外塗濕黃泥炭火炙食

屢效有瘡者不可食令服白。

鱧鱷魚

甘平小毒闊嗜者為鱧尖嗜者為鱷

發明 鱧魚雖有毒性能補虛益陰久病勞瘵宜之大

便濡泄勿用其功專在滋補真陰殺勞瘵與蛇同類故主治亦近之

鱣魚

甘大溫無毒

發明 鱣魚稟已王之氣能補中益血婦人產後惡露淋漓腸鳴濕痺並宜食之

暴乾煨灰存性治老人虛癩大鱣魚重筋餘者能助勢力食後遍體疲脹盡力槌之大力丸方用熊筋虎

骨當歸人參等分為末酒蒸大鱣魚取肉搗爛為丸每日空腹酒下兩許氣力驟長鱣魚血力能助陽壯

年陽道不長育通丸用之方用石龍子蛤蚧生犀角生附子草烏頭乳香沒藥血竭細辛黑芝麻五倍子

陽起石等分為末生鱣魚血為丸硃砂為衣每日空心酒下百丸曾有人服此得以嗣續宗祧者不可以

房術論也其尾血療口眼喎斜同麝少許右喎塗左左喎塗右正即洗去其骨燒灰香油調塗流火甚效

甲魚鱉魚

甘溫小毒

發明 鱉魚無鱗而有甲故俗名為蓄甲江淮黃河遼海水深處皆有之長二

三丈逆上龍門能化為龍味及肥美但發氣動風和蕎麥食令人失音其肝味勝河豚食之令人血膚乾

脫亦動風之驗也

鱖魚

本名鱖魚生江中長丈餘無鱗鼻與身等亦鱖屬也

甘平無毒

發明 此魚味雖美而發諸樂毒動風氣發一切瘡疥也

久食令人腰痛服丹石人忌之勿與乾筍同食發癰瘻風小兒食之成咳嗽及癩癧作鮓雖珍亦不益人

鱖魚味甘

甘溫小毒赤目赤鬚無腮者殺人不可合牛肝食反荊芥 發明 鱖魚類蛇故能治

風凡口眼喎斜切活鮎魚尾尖朝吻貼之即正

黃頰魚

甘平微毒反荊芥

發明 無鱗之魚不益人發瘡疥不獨黃頰為然

江鱈魚味甘

甘平小毒 發明 諸魚皆用翅尾游行惟鱈不勞翅尾逐隊齊行故以命名種類不一獨

產江水中者應春而熱味極鮮美性專降池故敗疽痔漏人忌食諸鱗皆然

河豚 甘温有毒海中者大毒江中者次之淡水中者又次之有大小二種大者謂之河豚背淡青黑無赤斑腹白而翅傍色黃者可食小者名斑魚背脊黑有文點多赤色其毒最勝以稟蛟龍之氣最甚也海人言三月後斑魚得木氣全盛之時尤不宜食其雙尾獨目翅赤嘴亦異常背有赤印頰內無腮腹中多血獨腴無膽皆大毒傷人製食之法須去其子與嘴目及脊中肝內惡血并去周身脂膜則不氣腥煮忌煤火及煤炷落入與荊芥桔梗菊花甘草附子烏頭相反故食河豚一日內不可服藥河豚子必久漬石灰水中而後者食曾見水浸一夜大如芡實也中其毒則唇舌麻脊頭眩目眩足不任履行步欹側急宜探吐隨覓荻芽或蘆根搗汁灌之橄欖汁甘草汁皆可解又槐花乾胭脂等分為末水調服之若腹中絞痛昏迷倒仆者急用藁青灌之遲則不救 發明 凡物之美者謂之尤物靡不賈毒傷人如妲已亡殷夷光傾吳蒙其禍而不自覺也河豚嗜鹹內藏信智外顯文刺窄口巨腹陰毒內蓄可知凡陰毒之物必藉陽氣而為鼓舞得春升之令而浮游水面非信而乎散子必入淡水既生必歸巨海非智而乎得鹹則肥得淡則瘦所以淡水中者其毒漸解而不致傷人之甚也以其味美人爭食之春初最為貴品其腹腴呼為西施乳南人有云凡魚之無鱗無腮無膽有聲目能睇者皆有毒河豚目能開闔觸之則曳曳有聲嗔怒則腹脹如球浮起水面故人得以取之其毒入肝助火莫有甚於此者患癰瘍脚氣人切不可食助溼發毒動風其患最速惟取其子同蜈蚣燒研香油調搽疥癬有效挾其目拌輕粉埋地中化水拔婦人脚上雞眼瘡可以脫根

江豚 鹹腥無毒 發明 江豚形如水牛藏器雖有飛屨盡毒瘡瘡之治從未見有用之者以之熬油

點燈照袴蒲則明讀書紡織即暗俗言嬾婦所化也

比目魚 甘平無毒 發明 比目形如箬葉故俗以是稱之爾雅所謂東方有比目者是也魚各一目

相並而遊今吳中崑山最多蓋誣雖有補中益氣之說而多食動氣亦是助濕生熱之故此必溺於佻儷

者之所化也

鮫魚一名沙魚 甘鹹平無毒。發明 鮫魚生南海背皮粗錯可飾刀靶其肉作膾補五藏皮治屍疰盡毒

燒灰解鯨鯢魚毒

烏賊骨即烏鮑骨俗名海螵蛸 鹹微温無毒。發明 烏鮑骨厥陰血分之藥兼入少陰其味鹹而走血故治血

枯血癢經閉崩帶陰蝕腫痛丈夫陰腫下痢疳疾厥陰本藥也寒熱瘧疾聾瘵少腹痛陰痛厥陰經病也

目腎流沮厥陰衰病也厥陰為藏血之室少陰為隱曲之地故諸血病陰病皆治之按素問云有病胸脇

支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液吐血四肢清目眩時時前後血病名曰血枯得之年少時有所

大脫血或醉入房中氣竭肝傷月事衰少不來治之以四烏鮑骨一蘆如為末丸以雀卵大如小豆母服

五丸飲以鮑魚汁所以利腸中及傷肝也觀此入厥陰血分可知

鮑魚 辛臭温無毒。發明 鮑魚腥穢可淡曝而不可著鹽乾則形如塊肉而取腥穢以滌一切瘀積

同氣相感也入肝散血煮汁送四烏鮑一蘆如丸治女子血枯經閉內經用以療傷肝利腸而不傷伐元

氣惜乎世罕用之今庖人用以者肉則脂沫盡解滌除垢膩之驗也秦始皇死沙邱會暑屍腐令輜車載

鮑魚以亂其臭始皇本呂不韋胡華溷廁宮幃非取其滌除遺臭之義歟

海馬 甘温無毒。發明 海馬雌雄成對其性温暖有文感之義故孕婦帶之於身臨時煨末服之并

手握之云易產又陽虛房術多用之可代蛤蚧之功也

鰕俗作鰕 甘温小毒鰕無鬚腹下通黑色者食之傷人。發明 鰕性跳躍生青孰赤風火之象生搗敷

小兒赤白遊風絞汁入藥托腫吐風痰皆取風能勝溼也制藥壯陽取熟能助火也白者下乳汁專入氣

分也

介部

龜板本經名曰神屋 鹹甘平小毒入藥取腹去背酒浸酥炙或蒸膠用色黑產水中者為水龜其色黃出山中

者為秦龜秦龜不入補腎藥。一種呷蛇龜腹折見蛇則呷而食之。其性最毒不可誤用。方書皆用於過敗龜之版取其用過無關生命也。世以自死龜殼為賤。既死精氣已脫。取用何益。悞服反受其毒。以其為蛇虺所傷也。今藥肆所賣龜膠。每以鹿角膠膠沖入。則易凝結。亦有以黃明膠和入者。凡製膠須去骨甲。以淨腹版水浸去外衣。則膠無腥濁之氣。本經主漏下赤白。破癥瘕瘵瘧。五痔陰蝕溼痺。四肢重弱。小兒顛不合。發明 龜稟北方之氣而生。乃陰中至陰之物。若行任脈上通心氣。下通腎經。故能補陰治血。治勞。大凡滋陰降火之藥。多寒涼損胃。惟龜板炙灰。則益大腸。止泄瀉。故漏下赤白。亦能療之。其治小兒顛不合。專取滋水堅骨之功。皆龜之所主。其破癥瘕瘵瘧。五痔陰蝕溼痺重者。皆秦龜之功。用以能入脾經。治風濕也。時珍云。龜鹿靈而壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其腹以補心補腎補血。皆養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命門補精補氣。皆養陽也。觀龜甲所主之病。皆屬陰虛精弱。腰脚痠痿。可心解矣。燒灰酒服。治痘瘡。又合鹿角灰等分。入四物湯服。治血崩。炙末酒服。主風痺脚弱。燒灰傅小兒頭瘡。婦人陰瘡。鱗魚血調塗。流火濕瘡。但胃虛少食。大便不實。及妊娠禁用。以其無陽生之力耳。膽汁苦寒。治痘後目腫。經月不開。取汁點之。良。溺滴耳。治聾。點舌下。治大人中風舌瘡。小兒驚風不語。摩胸背。治龜胸龜背。欲取其瀉。以猪鬃刺其鼻即出。

玳瑁即瑁

甘寒無毒。入藥生者良。

發明

玳瑁入心主血。有解毒解熱之功。故蘇頌以之磨汁服。解

盡毒。日華破癥結消癰毒。止驚癇。士良療心風解煩熱。行血氣。利大小腸。時珍治傷寒熱結狂言。解毒清熱之功。等於犀角。同犀角解毒毒。痘瘡黑陷。乃心熱血凝。用生犀玳瑁磨汁。入猪心血少許。紫草湯調服。則熱解血和。而陷痘起矣。但虛寒而陷者勿用。

鼈甲上甲

鹹平無毒。九肋七肋者佳。以其得陽數也。然多有摘去下肋。偽充七肋者。亦有半邊隻肋。半

邊隻肋者。此團魚與鼈交合而生。不若純隻肋者為優。醋煨酥炙。各隨本方。治瘡母淋灰湯者。糜如飴。用龜用大者力勝。鼈用小者力優。妊婦勿食。鼈肉與鳧菜鴨卵合食尤忌。本經主心腹癥瘕。堅積寒熱。去

痞疾息肉陰蝕痔核惡肉 發明 鼈色青入厥陰肝經及衝脈為陰中之陽陽奇陰偶故取隻肋為肝經之嚮道其所主者痲瘡瘡母虛勞寒熱癥瘕痞疾經水陰瘡不出本經主治也凡骨蒸勞熱自汗皆用之為其能滋肝經之火也與鼈甲同類並主陰經血分之病龜用腹腹屬腎鼈用肋肋屬肝然究竟是削肝之劑非補肝藥也妊婦忌用以其能伐肝破血也肝虛無執禁之煨灰研極細末療湯火傷皮綻肉爛者並効乾則麻油調敷溼則乾摻其痛立止其解火毒療骨蒸殺瘵蟲之功默悟矣鼈頭燒灰酒服療小兒脫肛婦人陰脫下墜取其善縮之性也生血塗尤効○沈聖符曰食品中惟鼈最為巨測其間多有大毒不減河豚者如三足兩頭人所共棄項強腹赤毒可傷人子隣余子坦曾見蛇盤屢跌而成鼈者四生之中物物皆有變化無足異也且有鼈寶生鼈腹中之說說者以為誕妄姑置罔聞近日楓江吳氏買一鼈烹之輒作人言其家以為怪也添火烹之剖腹果得一物約長三寸鬚眉宛然聖符遂予往看驗其驚形背高聳起稍異尋常聖符屬筆命記以為嗜味傷生之警

鼈甲 甘平無毒 發明 鼈甲炙黃酒浸治瘰癧殺蟲逐風惡瘡痔瘻風頑疥瘡功同鼈甲但鼈走肝而鼈走脾故其主治稍有不同

蟹 鹹寒小毒未被霜者有毒多食腹痛泄瀉生薑紫蘇豉汁蘆根汁並可解之其性喜入蛇穴得其毒則驟長故重一觔以上者誤食殺人又兩目相向足斑目赤者大毒不可食 本經主胸中邪氣熱結痛

鳴辟面腫能敗漆燒之致鼠 發明 蟹之外骨內肉生青熟赤陰包陽象無疑性常破血故能續斷絕筋骨本經主胸中邪氣熱結痛鳴辟面腫皆是瘀血為患性能敗漆令人生搗治漆瘡塗火燙皆取散血之意日華治筋骨折傷生搗罾之藏器云能續斷筋去殼用黃搗爛微炒納入瘡中筋即連也可知其功不獨散而能和血矣凡物之赤者皆熱惟蟹與稀性寒所以一物不宜同食令人泄瀉發癥瘕妊嫉忌食以其性專逆水橫行也其爪為催生下死胎胞衣專藥千金神造湯治子死腹中并雙胎一死一生服之

令死者生者安神驗方也但以一邊運動一邊枕者即是無疑方用蟹爪一升甘草一尺東流水一

令死者生者安神驗方也但以一邊運動一邊枕者即是無疑方用蟹爪一升甘草一尺東流水一

斗以葦薪者至一升去滓入真阿膠二兩令烱頓服或分二服若人困不能服灌入即活取蟹之散血而爪觸之即脫也然必生脫者連足用之丹方治蓄血發黃胸脇結痛而不浮腫者蟹殼煨存性黑糖調無灰酒下三錢不過數服效若浮腫者為氣病無藉於蟹之散血也婦人乳癰硬腫蟹殼灰一服即散又以塗硃燒烟辟臭蠱薰之即斃則殺蟲之功從可知矣○蟹之相類多種如蝮蜂擁劍不常見外其螻蛄螻蛄春時甚多螻蛄螯光無毒可醢而食螻蛄螯毛有毒悞食令人吐下又有一種生沙穴中見人則避者沙狗也時珍雖言不可食今海錯中用之非螻蛄之可比也

蟹 辛鹹平微毒 發明 營善候風外殼肉與蟹無異其血蒼色其肉鬆脆亦如蟹臍能散肝腎結血故產後痢不止及腸風瀉血崩中帶下用尾燒灰米飲服即止聖惠方治積年咳嗽呀呷作聲用蟹魚殼半兩貝母桔梗入牙皂末少許蜜丸噙一丸嚥汁服三丸即吐出惡涎而瘥

牡蠣 鹹平微寒無毒煨赤用左顧者良 本經主傷寒寒熱溫瘧酒洒驚恚氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白 發明 牡蠣入足少陰為軟堅之劑以柴胡引之去脇下痛以芩引之消項上結核以大黄引之消股間腫以地黃引之益精收瀼止小便腎經血分藥也本經治傷寒寒熱溫瘧酒洒是指傷寒發汗後寒熱不止而言非正發汗藥也仲景少陽病犯本有柴胡龍骨牡蠣湯金匱百合病變渴有括萋牡蠣散用牡蠣以散內結之熱即溫瘧之熱從內蘊驚恚之怒氣上逆亦宜鹹寒降泄為務其拘緩鼠瘻帶下赤白總由痰積內滯端不出軟堅散結之治耳今人以牡蠣瀉精而治房勞精滑則慮其鹹降治亢陽精傷又恐其斂瀼惟傷寒亡陽汗脫溫粉之法最妙其肉糟製即蠣黃醬也

蚌 肉甘寒殼鹹寒無毒 發明 蚌與蛤皆水產而蛤則生鹹水色白入肺故有軟堅積化頑痰之功蚌生淡水色蒼入肝故有清熱行溼治雀目夜盲之力蓋雀目則肝腎之病也初生小兒啞驚活蚌水磨墨滴入口中少頃下黑糞而愈生蚌炙水治湯火傷甚效古方用方諸水清神定魄以大蚌向月取水是也

真珠 鹹甘寒無毒。發明 珍珠入手足厥陰二經故能安魂定神明目退翳解疔瘡及痘瘡入眼治耳暴聾出水研細末吹之待其乾脫自愈煨灰入長肉藥及湯火傷敷之最妙然不可著水著水則反爛肉。

石決明 珠母珍 鹹平無毒九孔者佳。麩裏煨熟水飛用反雲母。發明 石決明味鹹軟堅入肝腎二

經為磨腎消障之專藥。又治風熱入肝煩擾不寐遊魂無定本事方珍珠母丸與龍齒同用取散肝經之積熱須與養血藥同用不宜久服令人寒中非其性寒乃消乏過當耳。

文蛤 鹹平微寒無毒即蛤蜊之殼厚口光有紫斑文者用酸漿水或醋者半日許搗粉用 本經主惡瘡蝕五痔。發明 文蛤鹹寒走足少陰經為潤下之味故能止渴利小便別錄治欬逆胸痺腰痛脇急

鼠癭崩中即本經主惡瘡蝕五痔之義取鹹能軟堅入血分也仲景傷寒太陽病用水刮益煩意欲飲水反不渴者及金匱渴欲飲水不止並用文蛤散其治反胃吐後渴欲飲水而貪飲者則有文蛤湯總取鹹

寒滌飲之義。

蛤蜊 鹹寒無毒紫口者良 大都鹹寒之物皆能清熱開胃止渴其殼煨赤杵粉能清肺熱滋腎燥降

痰清火止欬定喘消堅癖散癭瘤無不宜之炒阿膠膠用之以其味鹹能發滯性也單方治乳癰每三錢入皂角刺末半錢溫酒調服治肺癰一味童便煨研甘桔湯日進三服屢驗然須冬時取桔萸實和穰

子同搗仍入殼中懸當風處陰乾以供一歲之用否則難於取驗也。

蝗 甘平無毒。發明 蝗在江湖中與蚌蛤相類閩人以田種之謂之蝗田其肉可為淡乾腸鼻糟之

以充海錯婦人產後虛熱宜之。

魁蛤殼 俗名蚶子 肉甘平殼鹹平無毒。發明 蚶肉僅供食品雖有溫中健胃之功方藥曾未之及其殼煨灰則有消血塊散痰積治積年胃腕痰血疼痛之功與鼈甲蟲殼同為消瘧母之味獨用醋丸則

消胃腕痰積觀製蚶餅者以蚶殼灰泡湯搜糯粉則發鬆異常軟堅之力可知。

車螯一名 鹹冷無毒。發明 車螯是海中大蛤以其吐氣成樓故名曰螯所謂雀入淮為蛤雉入海

為蜃者是也。其肉解酒毒消渴殺治瘡腫癰毒。燒赤醋淬為末。同甘草等分酒服。并以醋調敷之。日華法也。

貝子 鹹平小毒。燒赤搗細如麩。以清酒淘過。用白者入氣分。紫者入血分。花者兼入血氣。本經主目

腎五癘利水道。鬼疰蟲毒。腹痛下血。發明 貝生南海雲南極多。土人用為錢貨交易。因其味鹹軟堅

故本經專主目腎。其治五癘等病。取鹹潤走血之力。千金脚氣丸中用之。專取鹹能破堅之意。雖數十年

之疾。靡不克效。以其透入骨空。搜逐溼淫之氣。和諸藥蒸蒸作汗。次第而解之。古方點目用貝子粉。入龍

腦少許。有瘕肉加珍珠末吹點。亦入老醫諸方。紫貝治小兒斑疹目腎。今人用以研紙。謂之研贏。大者曰

珂。亦名馬軻。螺治目消腎。去筋膜努肉。與貝子相類。分紫白煨灰用之。

石蚶一名 甘鹹無毒。發明 石蚶生東南海中石上。蚌蛤之屬。形如龜脚。殼似海螯。與吐蛭等同為

海錯。而此稍遜。然其有利小便之功。吐蛭不如也。

淡菜 甘溫無毒。發明 淡菜生鹹水而味不沾鹹。為消癭之善藥。兼補陰虛。勞傷精血衰少。及婦人

帶下。理腰脚。氣不宜多食。久食令人陽痿不起。及脫人髮。一切海中苔菜皆然。不獨淡菜也。

海蠃屬名 鹹平無毒。發明 海蠃肉甘寒。食之能止心痛。生螺汁洗眼。止痛經二三十年者。輒應入

黃連末點之。尤良。○屬性閉藏。能斂香。氣經月不散。獨燒則臭。與沈麝諸香及諸花和蠟煎成者。曰甲煎。

可作口脂。千金方治之。唐李義山詩。所謂沈香甲煎為庭燎者是也。其殼五色。璀璨為鈿。最精燒過。點眼

能消宿醫。惜乎專目科者罕知。

蠃柳蟻 甘寒無毒。發明 蠃蚌蛤蟹龜螯之類。皆外剛內柔。稟離火之象。雖居泥水而性寒。治火熱

之毒。最捷。用珍珠黃連。散入良久。取汁注目中。止熱壅。目痛。生搗絞汁。和無灰酒飲。治黃瘰。小便利。利田

中大螺。去掩入冰片少許。埋土中一伏時。化水療痔瘡。又搗爛和麝香貼臍上。引溼熱下行。治噤口痢。土

牆上爛殼燒灰敷痘瘡及腫瘡溼毒生田中者得土氣多而形大生水者得水氣多而形小其治水腫黃瘰目赤腫痛痔腫脫肛消渴解酒之功則一產徽州溪澗中者其肉青碧可愛土人取肉焙乾以充食物但性冷利人過食令人腹痛泄瀉急磨木香酒解之

寄居蟲 甘溫無毒 發明 藏器曰寄居蟲在螺殼間非螺也候螺蛤開即自出入螺蛤欲合已還殼

中海族多被其寄南海一種似蜘蛛入螺中負殼而行觸之即縮入螺火災乃出婦人難產以七枚搗酒服之或臨產兩手各握一枚與相思子無異弘景云食之益顏色美心志惜乎一時不易得也

即君子即相思子 發明 相思子狀如螺中之子大如小豆藏篋寄積歲猶活置醋中即盤旋不已婦人難產手把之便生屢驗

禽部

鶴頂 辛溫大毒 發明 鶴食蛇虺而頂血大毒力能殺人人之欲求自盡者服之即斃而嘉祐又以

鶴血益氣力補虛乏去風益肺恐未必然肫中砂石子磨水服能解蠱毒

鶴骨 甘寒小毒 發明 鶴骨治尸疰喉痺蛇虺傷專用其毒以攻伏匿之毒也嘴及脚骨尤良卵能

預解毒水煮一枚與兒啖之令不出痘或出亦稀與鶴卵同功

鵝鵝即鵝 鹹寒無毒 發明 鵝鵝好啖魚蛇及烏雞故治瘡積有鵝鵝丸用之為君治食魚鼈成瘡

者尤效其骨酥炙和南蓬砂吹喉治骨硬忍之須臾輕輕咯之骨與痰涎俱出

鵝鵝即鵝 鹹溫滑無毒 發明 淘鵝油性走能引諸藥透入病所拔毒故治聾痺腫毒諸病其古治

疔瘡取入心拔毒外出也

鵝 白者甘平無毒蒼者有毒嫩者尤劣 發明 鵝氣味俱厚發風發瘡莫此為甚別錄謂其性涼利

五藏是指蒼者而言韓氏謂其疎風是言白者之性耳昔人治厲風方中取純白鵝通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮同固濟散及存性和風藥用之為風藥之嚮導也然不可遺失一處其處即不能愈又不

可用雜色 若有一處色蒼風愈之後其處肌膚色黑此與蛇發風毒白花蛇善解風毒之義不殊白鵝脂祛風潤燥解礬石毒血能涌吐胃中痰結開血膈吐逆食不得入乘熱恣飲即能嘔出病根以血引血同氣相求之驗也中射工毒者飲之并塗其身即解以其能食此蟲也尾膠內耳中治聾及聒耳取以達三焦之氣也涎治誤吞福芒亦物性之相制耳白鵝屎絞汁治小兒鵝口瘡蒼鵝屎傳蟲蛇咬毒

雁 甘溫無毒 本經主風攣拘急偏枯血氣不通利 發明 雁為信鳥豈宜食之故道家謂之天厭性善通利血氣風攣拘急偏枯取肉炙熟貼之昔黃帝製指南於雁脰骨空中製鍼取其能定南北也但覓之不易今人於鯉魚胸中製之以其性專伏土定而不移可定水土之方向也

鶯 鶯家 甘溫無毒嫩者有毒老者無毒 發明 鶯之逼火而生啜水而長未出卵時先得火氣故不

憚冰雪偏喜淫雨而尾膝羶淵最甚故羣雌一被其氣皆得生化之機不待鶯尾之逼也溫中補虛扶陽利水是其本性男子陽氣不振者食之最宜患水腫人用之最妥黑嘴白毛者治腸胃久虛葛可久白鳳膏用之取金水相生之義綠頭老鴨治陽水暴腫外臺鴨頭丸用之取通調水道之義白鴨生血能補血解毒勞傷吐血衝熱酒調服屢效中射工溪毒及野葛砒礬毒灌之即解候吞金銀入腹乘熱頓飲數升其金即下諸鴨涎治穀麥芒入喉及小兒瘰風反張滴之即消卵能閉氣以混沌未分塞人聰慧諸病忌食而滯下尤禁白鴨通殺石藥毒凡服藥過劑昏迷眩暈者取白鴨通一合湯清澄清服之即解勿以其穢而棄諸

鳧 鳧野 甘平無毒 發明 鳧逐羣飛夏藏冬見與鴻雁不異其在九月以後立春以前味極甘美病

人食之全勝家鴨以其肥而不脂美而易化故滯下泄瀉喘咳上氣虛勞失血及產後病後無不宜之雖

有安中利水之功而方藥曾未之及孟詵除十一種蟲等治未能深信摘玄方解挑生蠱毒取生鳧血熱

飲探吐於此可悟生鵝血可吐胸腹諸蟲血積總以血引血同氣相應之力耳

雞 甘平小毒諸雞有五色者黑雞白首者六指者死足不伸者並不可食 發明 雞屬巽而動風外

應乎木內通乎肝得陽氣之最早故先寅而鳴鳴必鼓翅火動生風之象風火易動而易散人之陽事不力者不宜食雞是以昔人有利婦人不利男子之說而東南之人肝氣易動動則生火生痰病邪得之為有助也北方陽氣潛伏最宜發越病邪得之便能作汗以其能助肝氣也姑以物性之常變言之諸雞中惟烏骨白絲毛者最良其象變坎得水木之精氣肝腎血分病宜之烏骨雞丸治精癸胎產虛熱諸病以其峻補肝血也今人治賊風痛痺專取五爪烏骨雞雞置病人痛處任其鳴啄少頃其痛即止雞之五爪者有毒此專取其毒以引其毒外泄也丹雄雞治女人崩中漏下赤白沃通神明殺惡毒辟不祥中惡魔魅以血灌鼻即解中風口眼喎斜乘熱塗患處即止雞冠血和酒釀調陵鯉甲末治痘瘡肝熱毒盛而變青乾紫黑陷伏黃雌雞治產後虛羸者汁煎藥最宜黑雌雞治妊娠胎息不安泰和老雞內托小兒痘瘡近世治產後虛羸寒熱亦取用之以其能助肝經生氣也雄雞肝取不落水者研爛和蜂蠟釀酒頓飲治小兒疳積壞眼日服無間賢盡為度雞脆睡俗名雞內金治食積腹滿反胃泄利及眼目障翳雞卵治傷寒發狂致嗽失音並生食之以雞卵略敲損勿令清漏浸尿中冬三夏一日取煮食之治哮喘風痰雞子清治伏熱目赤喉痛雞子黃治產後胞衣不下並生用者又以煮熟去白取黃同亂髮香油熬化塗嬰孩胎毒熱瘡抱出卵殼研細為末去目中瘴醫燒灰蜜調塗嬰兒頭身諸瘡卵殼中白皮同麻黃紫苑治久效氣結癥雞子乃不孚之卵取以同犬屎數腫瘍其痛立止千金方也雞矢白為散無灰酒下一錢七治蠱脹腹滿內經雞矢醴也唐矢和石灰末塗疔腫半日許即能拔出

雞即野 甘鹹溫小毒 發明 俾雅云蛇交雞則生蜃蜃為雞入大水所化推其變化之源必由異氣

所感水經云蛇雉遺卵於地而為蛟其卵遇雷則入地不遇雷則仍為雉於此可悟其化蜃總由靈蛇之性未泯不得山靈之氣遂其飛騰則得滄溟之氣恣其吞吐是與虹霓奚擇哉別錄言其補中益氣力止泄痢除蟻瘻此指尋常之雉而言千金以之治蟻瘻因其喜於食蟻乃用以製之也周禮庖人供六禽雉

離火雞屬異木故者雞則完變者雉則完紅火性暴烈發痔發瘡與家雞子同食令人發疔週身疼痛為患種種惡得謂之無毒乎。

烏鴉 酸甘平無毒種類有四小而純黑者為烏大嘴而腹下白者為鴉並入藥用其項白而大者為燕烏嘴亦而小者為山烏皆不入藥 發明 慈烏反哺性稟孝慈嘉祐雖有補勞治瘦之功骨蒸羸弱效

救之治然血肉之中豈無他味而忍傷孝慈之物哉○烏鴉嘴大貪戾傷生時珍取治暗風癩疾勞傷吐血欬嗽殺蟲等病專取搜逐風毒之用與慈烏之調補虛羸各有仁慈剛暴之用奚啻天淵。

鵲 甘寒無毒 發明 鵲性靈慧能知吉凶觀其營巢開戶必背太歲而向太乙非鵲鳩之可比

別錄用之為下石淋專藥以其鳴必掉尾取其週身之氣悉向卜通也藏器有云燒灰淋汁飲之令人淋石自下蘇頌言婦人不可食以其相視而通音感而孕也其腦燒之入酒同飲令人相思蘇頌之說得非緣此○鵲重巢日華取多年者燒之療顛狂鬼魅及蠱毒仍呼窠物名號亦敷瘰瘡千金治婦人難產取

多年生育相安之義 鵲鳩 甘溫小毒 發明 此物食烏頭半夏苗好啖此者多發咽喉頭腦腫痛甘草生薑並可解之唐

本言鵲鳩治嶺南野葛菌子生全毒及溫瘧久病欲死者合毛熬酒漬服之或生搗汁服最良日華云酒服主蠱氣欲死孟詵云能利五臟益心力令人聰明。

鷄 甘平無毒 發明 鷄主腹大如鼓解熱結瘵小兒疳按鷄乃蛙化氣性相同蛙與蝦蟇皆解熱結

治疳利水消腫則鷄之消鼓脹蓋亦同功食後下如鷄脂數次即愈。

鷓鴣 鹹平無毒 發明 鷓鴣之品類頗多惟白者入藥能解諸藥毒急患虛羸者食之有益調精益氣治

惡瘡疥癬風瘡白癩風癩癰瘍風者熟酒服無不宜之鷓鴣能稀痘其矢氣臭之能殺瘵蟲虛勞家咸多畜之。

鶯 俗作鶯即黃鸝 甘溫無毒 發明 此鳥感春陽先鳴故能補益陽氣食之令人不妒以陽和之氣

能勝陰毒也按陽燧止妒論云梁武帝却后性妒或言倉庚為膳療治遂令食之如果減半

雀卵 甘温無毒服木人忌食 發明 雀屬陽而性淫故能強壯陽事火衰陰痿精寒者最宜陰虛火

盛者禁用雀卵治血枯素問有四烏鯁骨一慮如丸用之最妙如無雀卵生雀肝代之頭血主雀言腦用

綿裹塞耳治聾雄雀屎名白丁香去目中腎膜及向上點黑但取直者即雄與猴鼠糞無異入藥有效

伏翼 即蝙蝠屎 鹹平無毒伏翼煨灰用夜明砂淘淨焙用 本經主目瞑癢痛明目夜視有精光其屎

治面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸 發明 本經治目瞑癢痛用伏翼近世目科

惟用夜明砂鮮有用伏翼者要皆厥陰肝經血分藥也其伏翼屎能破結血消積故目昏盲障瘧瘵淋帶

瘰癧癰疽皆用之然蝙蝠食之大能利人稍虛者不可輕用

五靈脂 即寒號蟲矢 苦酸寒小毒研細酒飛去砂石晒乾生用則破血炒用則和血 發明 鷓鴣候

時鳥也晉地有之春夏羽翼豐盛冬時裸形晝夜哀鳴故楊氏丹鉛錄謂之寒號蟲屎名五靈脂謂狀如

凝脂而受五行之靈氣也其氣腥穢其味苦酸大傷胃氣綱目言其甘温忍非正論雖有治目腎中脫疼

痛之功惟兼霍度可應用終非膏粱所宜同蒲黃名失笑散治一切心胸腹脇少腹諸痛及產後結血血

崩目中生翳往來不定其性入肝散血最速但性極羶惡脾胃虛者不能勝其氣也

斑鳩 甘平無毒 發明 斑鳩補腎是故能明目治虛損益氣食之令人不嗜目科斑鳩丸錦鳩丸用

之取氣血為引導以助補腎明目之功也

伯勞 平有毒 發明 方藥未有用者其毛治小兒繼病俗作魃病取毛帶之繼病者母有娠乳兒兒

病如瘧痢他日相繼腹大或瘥或發他人有娠相近亦能相繼也北人未識此病

鸚鵡 俗名 八哥 甘平無毒 發明 鸚鵡目和乳汁滴目令人目明能見霄外之物甚言明目之效耳肉治

啞逆及五痔止血並炙熟食之

啄木鳥 甘酸平無毒形色與畫眉鳥相似但頭頂有紅毛一片嘴與爪皆堅銳如鐵故能啄木取蠹不

可不辨。發明 啄木性專殺蠹，故能治人藏府積蠹之患。時珍治勞瘵癰痿，皆取制蠹之義。燒灰存性，治痔漏蟲管，納孔中，不過二三次，愈。丹方治噎膈，諸藥不效，以之熬膏，入麝香一錢，七晝夜六時嗅之，膈塞自開。蓋噎膈多有因鬱積所致，以其善開木鬱之邪也。

鷓鴣即水鷓鴣 酸鹹溫微毒，或云鹹寒。誤。發明 鷓鴣性寒利水，能治腹大如鼓，體寒者。以鷓鴣燒存性，為末，米飲服之。其骨煨灰，蜜調綿裹，治魚骨鯁，與白鷺骨同功。嘴骨尤效。○鷓鴣屎多在石上，色紫如花。

就石刮取，名蜀水花，能去面上野黑，鷹痔，滅癩，疔及湯火瘡痕，和猪脂敷疔瘡。

鷹屎白 微寒無毒。本經主傷撲滅癩。發明 虎嘯則風生於地，鷹揚則風動於天，具體雖殊，機應則一。鷹具雄健之翮，不能長恃無虞。至秋火伏，金生，令行改革，勁翮漸脫，弱翎未振，即有雄風未遂，奮揚是以眾鳥侮之。月令所謂鷹乃祭鳥是也。古聖觸物致思，專取鷹之屎白，滅傷撲痕，雖取穢惡，滌清實取其翮之善脫也。後人推而廣之，用以滌除目中宿翳，吹點藥中，咸取用之。其屎中化未盡之毛，謂之鷹條。

入陰丹陽丹，不特取其翮之善脫，以治難脫之病，非取其屎中未化之羽，以消目中未脫之翳。穎脫之妙，用崇古未宣，因顯示後起毋失本經取用之義。

鵬 溫小毒。發明 鷹鵞鵬骨，皆能接骨，以鷺鳥之力在骨，故以骨治骨。從其類也。折傷斷骨，燒灰每服二錢，酒下。在上食後，在下食前，骨即接如初。但在三日內者易治，三日外則難治。以氣血凝滯不能合轍也。

鷓鴣 鹹平小毒。發明 鷓鴣頭治頭風，目眩，顛倒，癰疾，千金治頭風，眩轉，面上游風，有鷓鴣頭酒，聖惠治旋風，眩胃有鷓鴣頭丸，總取旋風健搏之力。

鷓鴣 甘溫小毒。發明 鷓鴣治風癰，噎食，取初生無毛者一對，黃泥固濟，煨存性，為末，每服一匙，溫酒服之。頭生痘瘡，黑陷，用臘月者，燒灰酒服之，當起。

鷓鴣俗呼鷓鴣 酸微鹹小毒。發明 鷓鴣不祥之物，古方罕用，近世治傳屍勞瘵，專取陰毒之味，以殺

鷓鴣頭，鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

陰毒之蟲也方用鷓鴣酒者焙乾同大鰻鱺七條攤薄荷上蒸爛和薯蕷一觔搗焙細末為丸空腹酒下
三錢功用與獺肝彷彿方士用以昏夜靈者以聚鬼魅是以至陰之味誘至陰之物也

鴆 大毒 發明 鴆產盡毒瘴癘之鄉鍾毒最烈非宿檳榔不能自安以其無枝人莫能捕也人欲求
自盡者以翅羽調酒服之立斃與鶴頂之毒無異別錄云鴆喙殺蝮蛇毒時珍言蝮蛇中人刮末塗之即
愈如極惡之人有以用之未嘗不解危救急也

獸部

猪 甘平無毒同驢馬肉食之令人霍亂同羊肝食之令人心悶與生胡荽同食傷人臍 發明 猪屬

水獸性懶善淫飽食無所用力周身脂膏不流故人食之助溼生痰莫此為甚而肥盛之人尤非所宜一

種蹄甲白者有金水相生之象稍異尋常鹽漬風乾製為南腿有補養脾腎之能病人食之略無妨礙良

非鮮者之比丹溪云猪肉補陽陰虛者切宜少食蓋肉性入胃便作溼熱生痰痰生則氣不降而諸證作

矣故痰嗽家最忌然肺燥乾欬及火嗽痰結者食之痰即易出其嗽便止但不宜過鹹耳當知助溼生痰

惟中者膘脂一層專助脾溼若皮則走肺益氣精者補肝益血但嫌難化耳其汁則全是膘脂鎔化食

之滲入經絡故東垣言之頗詳千金治打傷青腫痰精猪肉搗之小兒火丹生猪肉切片貼之漆瘡作癢

宜啖猪肉并以猪脂塗之男女陰蝕肥猪肉煮汁洗之不過三十觔瘡山行石蛭著人足則穿肌入肉但

以臘脂膏和鹽塗足脛趾即不著人也急救方治竹木刺入肉以多年熏肉切片包裹即出其腎性堅難

化且藏淫火最不益人而治腎虛腰痛猪腎切開入人參末一錢溼紙裹煨每日空心嚼一枚或入青蛾

丸中煮食並效其治水脹用猪脂丸便血用藏連丸皆用以為引藥入病處耳心血治驚風癲癩蓋以心

歸心以血導血之意得冰片入心經也卒中惡死尾血灌之取其動而不息之意并縛豚枕之即活蛇入

人孔割母猪尾血滴入即出用肝者肝主藏血血病用為嚮導故脫肛肝虛雀目用之服即三焦能滌除

腎藏邪毒垢膩故同胡黃連等藥治微瘡最捷用膽者取其瀉肝膽之火故仲景白通湯用為嚮導蓋寒

能勝熱滑能潤燥苦能入心也傷寒熱邪燥結有猪膽導法又膽汁和香油等分亦治癰瘡結毒清晨連服七日大便下泄邪毒最捷未盡停七日更服七日餘邪自盡屢驗尿解治產婦傷膀胱急用上好人參一兩入脬中煮食日日服之稍或遲延氣血衰冷不可瘡矣齒治驚癇乳能斷酒千金方用之其膚香皮上白膏是也取其鹹寒入腎用以調陰散熱故仲景治少陰病下利咽痛胸滿心煩有猪膚湯予嘗用之其效最捷豚卵治陰莖中痛驚癇鬼氣蠱毒降寒熱貢豚五癰邪氣攣縮猪蹄者湯去油前催乳藥及醮洗潰瘍有效蹄甲本經治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕今自疾外障亦用之猪腦治風眩腦鳴凍瘡癰疽塗紙上貼乾則易之禮記云食豚去腦孫真人食之云猪腦損男子陽道酒後尤不可食延壽書云以鹽酒食猪腦是自引賊也猪骨燒存性為末水服方寸匕治食諸果中毒又解馬肝漏脯等毒猪毛燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕猪屎古方取用頗多千金治患霧氣心煩少氣頭痛項急起則目眩欲倒戰掉不安憎寒微熱心中欲吐吐時無物用新猪屎二升半內好酒一斛攪令散以生布絞取汁更以綿濾頓服之即地鋪暖覆卧面前著火常令汗出得汗待其自乾乃起亦治風勞蠱毒燒灰治痘瘡黑陷無價散用之又衝沸湯蒸麻疹陷伏即起總取穢惡以辟不祥之氣同氣相應之用耳

狗 鹹酸溫無毒熱病後忌食妊婦食之令子無聲發明 狗屬土而有火故又人履其地雖卧必省

天時亢熱則卧陰地下元虛人食之最宜但食後必發口燥惟粳米湯以解之敗瘡稀水不飲日噉狗肉最佳痔漏人歲久不愈日食自瘥凡食犬肉不清心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱妄語如狂或洞下池以杏仁一升合皮熟研沸湯三升和取汁分三服利下肉片大驗狗膽本經主明目取其夜能見物也陰莖治傷中陰痿不起除女子帶下十二疾狗頭骨煨末止婦人崩中下痢取其溫而能散也狗屎中米名戍腹糧又名白龍砂主噎膈風病及痘瘡倒靨用此催漿為最取其性溫熱也若乾紫黑焦為血熱毒盛慎勿悞用其血能破妖邪以性屬陽陰邪不能勝之也

羊 甘溫有毒羊類多種惟白羯者良胡羊毛捲洗羊毛豐肉厚皮薄並可為裘羊墳首羴羊色黃形

羸味薄不堪供餓凡煮羊忌用銅器有宿熱者不可食大病食之必發熱瘡家及痼疾家食之必發以其
食百草之毒也羊肉不可共生魚鮮食能害人白羊黑首食其腦作腸癰羊肝共生椒食之傷人五藏羊
蹄中有白珠者名羊懸食之令人癩羊獨角及四角者關外有之皆有毒不宜食 發明 羊為肺家之
獸目無腫子周身之氣皆聚於肺故其氣最腥膻而性味甘溫色白補肺是以昔人有人參補氣羊肉補
形之說金匱治產後腹中虛痛及少腹寒疝並用當歸生薑羊肉湯專取羊肉之甘溫者湯去滓以助當
歸生薑辛散之力虛滯得以開矣羊腎治腎虛膀胱畜熱胞瘦小便淋瀝疼脹千金腎瀝湯以之為主羊
石子即羊之外腎治腎虛精滑本事金鎖丹用之羊胛治下虛遺溺溫水漂淨入補骨脂焙乾為末臥時
溫酒服半兩不過四五服即瘥羊肝補肝專主肝經受傷目無精光之病膽治青盲目暗膽開竅於目膽
汁充則目明膽汁減則目暗古方碧雲膏臘月取羯羊膽以蜜盛滿懸簷下待霜出取藏點眼神效羊乳
潤而且補反胃人宜時時食之取開胃腕潤大腸之燥也青羊者尤良羊肺治嗽止渴久嗽肺虛者宜之
羊膻主反胃止汗治虛羸小便數羊膻生主下利脫肛取潤以導之補中寓瀉也熟主賊風痠痺潤肌膚
入膏透經絡風熱毒氣婦人產後腹中絞痛丸劑中最宜羊脛滌除藏府垢膩與豬脛同功而入肺祛痰
尤捷羊骨稟西方堅勁之氣最銳得火煨以濟之可以消銅鐵故誤吞銅鐵者用之觀磨鏡者非此不明
其治賊風痺痛同虎骨煨灰酒服皆隨痛處取用羊鬚燒灰數小兒頭疔并瘡蠟埋尿瘡羊胎炙乾入藥
亦能補人與鹿胎紫河車同入六味地黃丸中名三胎丸調補腎虛羸瘦最為得力羊血解石藥毒外臺
云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡凡服石藥覺毒發刺羊血熱飲一升即解服地黃何首烏
補藥者忌之

殺羊角

殺音古 墨羊也

鹹平無毒 本經主青盲明目止驚悸寒泄久服安心益氣輕身殺毒蟲入山燒之辟

惡虎狼

發明

殺羊與羚羊俱是野獸殺則雄猛倍甚角亦起稜與羚羊不殊但色黑如漆故專伐腎

邪辟不祥與羚羊大都彷彿互參本經此言青盲明目即羚羊之專主明目也此言止驚悸即羚羊之治魔

寐也。此言止寒池即羚羊之去惡血注下也。此言久服安心益氣輕身即羚羊之益氣起陰氣也。此言殺毒蟲辟惡鬼虎狼即羚羊之辟毒惡鬼不祥也。但此主寒池本乎腎虛不能攝津。彼主惡血注下。係乎肝腸不能統血。而別錄治蠱毒吐血。又與羚羊主治相符。究其大綱。此專補救腫人。彼專消磨腎障。一皆證治之常。至於燒之辟惡鬼虎狼。如此奇突。迥出意表。非尋常之可擬也。

牛 甘溫無毒。同猪肉食之。生寸白蟲。獨肝牛善噉蛇食之。傷人。春月自死牛肉。及生疔牛肉。食之令人瘡急。以生甘草煮汁解之。剝瘡牛傷手足者。令人滿脹。急宜解之。遲則不救。發明 黃牛肉補氣。與黃耆同功。觀丹溪倒倉法論。而引伸觸類。則牛之補土。可心解矣。又以黃牛肉取四蹄各五斤。熬膏去滓。收乾。如鹿膠法。名霞天膏。主中風偏廢。目眼歪斜。痰涎壅塞。五藏六腑留痰。宿飲癖塊。手足皮膚中痰核。及大病後極虛羸瘦。每斤入茯苓四兩。頓浴。空腹酒服三四錢。肥盛多痰者。每斤入半夏麴四兩。廣皮二兩。丸服大效。牛本屬坤土。而膽主風木。故能鎮肝明目。臘月用釀南星末。陰乾。歲久多製。則苦潤不燥。治經絡風痰。及小兒驚痰。其功不減。牛黃牛骨髓。補中填骨髓。久服增年。能潤澤肌膚。黃牛腦。和藥治頭風腦漏。牛角腮。本經下閉血瘀。血疼痛。女人帶下血崩。燻之酒服。宗爽曰。燒灰主婦人血崩。大便下血。血刺。牛血性溫。能補脾胃。諸虛治便血血痢。一切病後羸瘦。咸宜食之。其膈乃肺系肉團。反上焙乾。為末。酒服治喉痺氣癭。古方多用之。或以製藥。益佳。取引入肺經。以通氣結耳。與猪羊膈療治不殊。牛齒燒灰。治小兒癩。牛乳補虛羸。止渴噎膈反胃。大便燥者宜之。人生薑葱白。止小兒風熱吐乳。牛馬乳共生。魚食之。成鼈。癩牛尿。治水腫。但胃虛少食人。勿用。牛屎燒灰。傅小兒痘瘡潰爛。產寶治子死腹中。以濕牛糞塗之。牛齒草絞汁。治反胃噎膈。取其沾涎之多也。

馬 辛溫有毒。綱目作甘涼非。馬脚無夜眼。白馬黑頭。白馬青蹄者。皆不可食。鞍下肉食之。殺人。肝亦不可食。以鞭驅之。傷皆聚於肝也。食馬肉中毒欲死。以香豉杏仁各二兩。蒸熟。杵末服之。或者蘆根汁飲之。發明 按靈樞經云。卒口僻急者。目不合。熱則筋縱。目不開。頰筋有寒。則急。引頰移。口有熱。則弛。縱緩不

勝收故僻。治之以馬膏。膏其急頰以白酒和桂塗其緩頰以桑鈎勾之。即以生桑灰置之坎中。高下以坐等。以膏熨急頰且飲美酒噉炙肉不飲酒者自強也。為之三拊而已。世多不知此方之妙竊謂口頰喎僻乃風中血脉也。手足陽明之經絡於口。會太陽之經絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而縱。故左中寒則逼熱於右。右中寒則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑痺。營衛凝滯。治法急者緩之。緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩以摩其急。以潤其痹。以通其血脉。用桂酒之辛熱急束以塗其緩。以收其縱。以和其營衛。以通其筋絡。秦能治風痺。通節竅也。病在上者酒以行之。甘以助之。故飲美酒噉炙肉云耳。馬白睛。治癩癧時發。千金方用之。馬心。食之善忘。馬肺。食之寒熱。姜陽。馬鞍下肉食之。傷人五藏。馬乳祛風止渴。白馬蹄。本經主驚邪瘕癥。乳難。辟鬼氣。鬼毒。蠱疰不祥。別錄止衄內崩。齩齒。白馬者。治婦人白崩。亦馬者。治婦人赤崩。鬻毛。治小兒驚癇。女子崩中。赤白隨其色用之。燒灰止血。塗惡瘡。尾。主女人崩中。小兒客忤。白馬陰瘕。本經主傷中絕脈。陰不起。強志益氣。長肌肉。肥健生子。野馬陰莖。食之令人陰萎。野馬肉食之。成馬廂。筋脈不能自收持。馬溺微寒小毒。治癥瘕有驗。反胃有蟲積者。亦能治之。潰瘍者肉腐爛徹骨。毒能傷人。馬矢。煨風痺藥酒。取其透達直入病所也。馬通。止血解毒。千金梅師治吐血衄血。肘後治卒中惡吐利不止。經驗治絞腸沙腹痛欲死。俱絞汁服之。又肘後治久痢。赤白聖惠治傷寒勞復。俱燒灰服之。千金治筋骨破傷。以熱馬屎敷之。又治破傷腫痛。以馬屎燒烟熏之。聖惠治疔腫傷風腫痛。以馬屎炒熱熨之。靈樞椒薑桂酒置馬矢煨中。助一切藥力也。今人以馬屎煨烟熏鼈蝨臭蟲無不斃者。食馬肉心煩者。飲美酒則解。飲濁酒則劇。

驢 甘溫無毒。綱目作甘涼誤。發明 驢肉食之動風。脂肥尤甚。日華子言治一切風。是指烏驢而言。

烏驢皮治風補血。東魯阿井水煎膏用之。驢著熬膏。能長鬚髮。與馬鬚同功。驢莖強陰壯筋。與白馬莖同功。驢乳療黃瘡。溼熱止渴。驢屎專於殺蟲。利水止脹。其治噎膈或單服。或入四物湯服之。效。驢屎炒熨風腫痛。愈。絞汁主心腹疼痛。治水腫服五合。良。

駝峯 甘溫無毒。發明 駝峯八珍之一。味雖極美但能動風宿有風氣人勿食。駝脂摩風去頑皮死肌取熱氣透肉也。

酪 甘平無毒。發明 凡牛羊駝馬之乳並可作酪。南人惟知熱酒冲食。北人必以熬熟冲茶漿服大能清胃。不助濕熱。止煩解渴。除心膈熱。潤腸胃。燥結。摩腫。生精血。補虛損。壯顏色。戴原禮云。乳酪血液之屬。血燥者宜食。較之人乳尤勝。以其無怒火淫毒也。華元化云。蛭蝮入耳。以酪灌入即出。

酥醅醪 甘寒利下無毒。酥醅醪不可與生魚膾同食。令人腹内生蟲。發明 酥醅醪性皆滑潤。故血熱枯燥之人。咸宜用之。又傷熱失音。用以通聲最妙。凡災一切氣血堅勒筋骨。藥俱不可少。但脾胃虛滑者禁用。

阿膠 甘平微溫無毒。辨真偽法。以頂有鬃文。極圓整者為真。折之沉亮不作屑。不作皮。臭蛤粉炒成球。經月不軟者為佳。東阿產者雖假猶無妨害。其水膠入木煤。廣造有傷脾氣。慎不可用。本經主心腹內崩勞。極酒洒如瘧狀。腰痛四肢酸疼。女子下血安胎。久服輕身益氣。發明 阿井本淄水之源。色黑性輕。故能益肺補腎。煎用烏驢。必陽谷山中。驗其舌黑。其皮表裏通黑者。用以熬膠。則能補血止血。本經治心腹內崩下血安胎。為諸失血要藥。勞證欬喘急肺痿肺癰。潤燥滋大腸。治下痢便膿血。所謂陰不足者。補之以味也。

黃明膠 膠 廣 甘平無毒。發明 明膠治吐血衄血下血血淋血痢。妊娠胎動下血。風溼走注疼痛。打撲傷湯火傷。一切癰疽腫毒。治血止痛。潤燥利大小腸。皆取其有滋益之功。無滑利之患。

牛黃 苦平小毒。試真假法。搯摩透甲。其體輕氣香。置舌上先苦後甘。清涼透心者為真。喝迫而得者。名生神黃。圓滑外有血絲。嫩黃層多者為上。殺後取者。其形雖圓。下面必扁者次之。在甬中者。名角黃。心中刺得者。名心黃。膽中得之。名膽黃。則又次之。產西戎者為西黃。產廣東者為廣黃。本經主驚癇寒熱。熱盛狂癡。除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

生神黃 圓滑外有血絲。嫩黃層多者為上。殺後取者。其形雖圓。下面必扁者次之。在甬中者。名角黃。心中刺得者。名心黃。膽中得之。名膽黃。則又次之。產西戎者為西黃。產廣東者為廣黃。本經主驚癇寒熱。熱盛狂癡。除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

刺得者 名心黃。膽中得之。名膽黃。則又次之。產西戎者為西黃。產廣東者為廣黃。本經主驚癇寒熱。熱盛狂癡。除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

盛狂癡 除邪逐鬼。發明 牛有黃是牛之病也。因其病之在心及肝。膽之間。凝結成黃。故還治心及肝。

膽之病。本經治驚癇寒熱狂瘧邪鬼皆痰熱所致。其功長於清心化熱。利痰涼驚。安神辟惡。故清心牛黃丸以之為君。其風中心藏者亦必用之。若中經中府者誤用引邪深入。如油入麪。莫之能出。宜詳審而用可也。

狗寶 甘苦溫小毒狀如白石微帶青色。擊碎其理如蠶白臘者真。發明 狗寶專治噎膈反胃之病。

取苦能下降。溫能開結也。予嘗推廣其用。凡癰疽潰瘍不收。癩狂冷痰積結無不可用。惟鬱結傷脾。氣血枯槁者誤投。則有負薪救火之厄。

獅油 辛溫有毒。色微黑者真。發明 獅為百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹。

熊太古言其乳入牛羊馬乳中。皆化成水。西域人捕得。取其油入膏。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙。

上墨跡。刮少許。隔紙熨之。即脫。予嘗試用垢雖去而衣易毀。紙易脆。僅供一時之用。雖系方物。方藥罕用。

近世醫師以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱痰瘀積所致。用取滌垢之意。試之輒驗。由是方家爭為奇物。但性。

最猛利。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能滌垢去痰。但不能去墨跡耳。

虎骨 辛微熱無毒。骨取黃潤者良。若帶青黑色。乃藥箭射者。有毒。勿用。酥炙黃脆用之。發明 虎陰。

也。風陽也。虎金也。風木也。虎嘯風生。木承金制。陽出陰藏之義。故骨能追風定痛。強筋壯骨。風病攣急。骨。

節風毒為之要藥。虎之一身。節節氣力。皆出前足。故膝脛為勝。而前左脛尤良。以臥必用左脛為枕也。然。

按病之左右前後。取用其效尤捷。入陰陽二蹠。虎睛定魄。千金治狂邪有虎睛湯丸。並酒浸炙乾。用一時。

不可得。以珍珠煨末代之。總取定魄之用也。虎脂治反胃吐食。新瓦上煨存性。入平胃散末。和勻。空腹白。

湯服三錢。效。虎頭骨治頭風藥中。浸酒服。作枕止瘡。虎長牙辟邪殺蟲。傳尸方用之。

象皮 鹹溫無毒。發明 象東西方金氣。金令主藏。不宜擅鳴。鳴主金象。大非所宜。其皮專於收斂。其。

肉壅腫。人以刀斧刺之。半日即合。故治金瘡不合者。用其皮煨存性。敷之。若入長肉。諸膏藥切片酥拌。炙。

之。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨礪之末。生蜜調塗。治諸鐵雜物入肉。舊梳刮薄片。屬溫湯。

頰服治竹木刺及諸魚骨鯁即時吐出不吐再服以吐出為度非刮下薄片不能應手也

犀角 苦微鹹大寒無毒鏤成以執手掌摸之香者為真臭者即假忌酒鹽烏附孕婦勿服能消胎氣

發明 犀之精靈皆聚於角足陽明胃為水穀之海飲食藥物必先受之故犀角能涼血散血及畜血驚

狂斑痘之證皆取以通利陽明血結耳別錄治傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒抱朴子云犀食百草之毒及眾

木之棘所以能解毒凡蠱毒之人遇有飲食以犀筋攪之有毒則生白沫無毒則否宗奭曰鹿取茸犀取

尖其精銳之力盡在是也其治吐血衄血大小便血犀角地黃湯為之專藥若患久氣虛又為切禁以其

能耗散氣血也痘瘡之血熱毒盛者尤為必需然在六七日灌漿之時又為切禁以其能化膿為水也而

結痂後餘毒癰腫則又不可惟惟氣虛毒盛之症切不可犯其性大寒無大熱邪者慎不可用凡中毒筋以

犀角刺瘡中立愈又感山嵐瘴氣射工溪毒用生犀磨汁服之即解

能脂肉 甘溫無毒 本經主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面上疔皴 發明

能稟雄毅之性故其脂可開風痺不仁等疾可服可摩但不可作燈烟氣熏目使人不能遠視本經所主

不出風痺筋急之用風為陽邪能為陽獸其性溫潤能通行經絡開通血氣也能筋亦能壯筋強力與虎

骨之搜風壯骨無異熊肉振羸其氣有餘癰病人食之終身不愈

能膽 苦寒無毒 試法取少許研滴水中掛下如線直至水底不散者為真 發明 能膽苦入心寒勝

溼手少陰足厥陰藥也其性潔不染塵故能清心平肝為時氣熱盛變為黃阻之要藥又能殺蟲明目除

醫障疳疔蟲牙蚊痛小兒驚癇瘕癥以竹瀝化豆大許服之去心中涎疔瘡赤腫水化點之即消凡實熱

之證用之咸宜苟涉虛家便當嚴禁

麋羊角 即於羊角 鹹寒無毒鏤碎胸前煨熟令脆研如粉不則粘人腸胃 本經主明目益氣起陰去惡血

注下辟蠱毒惡鬼不祥厥寐 發明 羚羊屬木入足厥陰伐肝最捷目暗腎障而羚羊角能平之痘瘡

正固稠密不能起發而羚羊能分之小兒驚癇婦人子癇大人中風搖擻及筋寒感節痛而羚羊角能舒

之驚駭不寧狂越厥寢而羚羊角能安之惡鬼不祥而羚羊角能辟之惡血注下蠱毒疔腫瘡腫癰癧產後血氣而羚羊角能散之溼熱留滯陽氣不振陰氣衰痿而羚羊角能起之煩懣氣逆噎塞不通鬱為寒熱而羚羊角能降之詳本經所主皆取散厥陰血結耳愚按諸角皆能入肝散血解毒而犀角為之首推以其專食百草之毒兼走陽明力能祛之外出也故痘瘡之血熱毒盛者為之必需若痘瘡之毒并在氣分而正固稠密不能起發者又須羚羊角以分解其勢使惡血流於他處此非犀角之所能也人但知羚羊角能消目翳定驚癇而散痘瘡惡血之功人所共昧殺羊角治青盲目暗與羚羊角不殊而辟除邪魅蠱毒亦相彷彿惜乎從未之聞惟消乳癰丹方用之白羯羊角亦能消乳癰而方家每用琉璃角燈磁片刮取薄屑置胸中候腕杵細酒服方寸匙屢效專取宿腐之味以消陳積之殆也其鹿角刮屑善消虛人乳腫未潰即消已潰即斂即本經主漏下惡血之治龍角治神魂不寧功用於龍齒略同千金方中有齒角並用者牛角腮專主閉血血崩牛之一身惟此無用而本經特為採錄千金尤為崩漏要藥可見天地間無棄物也

山羊血 鹹溫無毒以麋竹通節削鋒利割 發明 山羊產滇蜀諸山中性善走逐好鬪肉能

療冷勞山嵐瘴疴婦人赤白帶下其心血綱目失載性溫味鹹為和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取醉醉醒其骨自續每用不過分許不可多服雖不傷耗元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣但舉世用者絕罕間有收取而市者其價重等於牛黃且心血絕不易得滲血丹用之真虛勞失血之續命丹也

鹿茸 甘溫無毒形如茄子色如瑪瑙者最紫潤圓短者為上毛瘦枯縵尖長生歧者為下酥炙酒炙各

隨本方但不可過焦有傷氣血之性炙後去頂骨用茸 本經主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不

老 發明 鹿是山獸屬陽性淫而遊山夏至得陰氣而解角從陽退之象麋是澤獸屬陰性淫而遊澤

冬至得陽氣而解角從陰退之象鹿首功用專主傷中勞絕腰痛羸瘦取其補火助陽生精益髓強筋健

骨固精攝使下元虛人頭旋眼黑皆宜用之本經治漏下惡血是陽虛不能統陰即寒熱驚癇皆肝腎精血不足所致也角乃督脈所發督為腎藏外垣外垣既固腎氣內充命門相火不致妄動氣血精津得以凝聚扶陽固陰非他草木可比八味丸中加鹿茸五味子名十補丸為峻補命門真元之專藥傳尸癆瘵脊中生蟲習習痒痛浙浙作聲者同生犀鼈甲入六味丸中其殺蟲之力與天靈蓋同功近世鹿茸與麋茸罕能辨別大抵其質粗壯而腦骨堅厚其毛蒼鬣而雜白毛者為麋茸其形差瘦而腦骨差薄其毛黃澤而無白毛者為鹿茸鹿茸補督脈之真陽麋茸補督脈陰中之陽不可不辨。

鹿角膠 甘微鹹溫無毒河南者味甘溫為上泊上者味鹹辛為下又生取成對者力勝解下單角力薄凡角大而毛色淡白者即為麋角能補陽中之陰熬膠法取角寸截用長流水浸三日刮淨用黃蠟煮三日夜乾即添水三日夜足去用取汁重煎滴水不化膠成切片陰乾不可日晒晒則融化成水矣今市者多以黃明膠加楮實偽充不可不察取嫩角寸截置小鐔中酒水相和益蓋泥封糠火煨三伏時搗細如霜名鹿角霜本經主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣力婦人血閉無子止痛安胎又服輕身延年發

明 鹿角生用則散熱行血消腫辟邪熬膏則益陽補腎強精活血總不出通督脈補命門之用但膠力稍緩不能如茸之力峻耳互參一條經言乃知茸有交通陽維之功膠有緣合衝任之用然非助桂以通其陽不能除寒熱驚癇非龜鹿二膠並用不能達任而治羸瘦腰痛非輔當歸地黃不能引入衝脈而治婦人血閉胎漏至若膠治傷中絕勞即茸主漏下惡下也膠之補中益氣力即茸之益氣強志也膠之輕身延年即茸之生齒不老也歷攷別錄外臺千金等方散血解毒居多非如近世專一溫補為務殊失聖賢一脈相傳之義○鹿角霜治火不生土脾胃虛寒食少便溏胃反嘔逆之疾取溫中而不粘滯也古方

多製應用今人每以煎過膠者代充其膠既去服之何益○生角銛尖屑消乳癰腫毒○煨灰行崩中積血○鹿骨安胎下氣作酒主內虛續絕傷補骨除風千金鹿骨丹用之
鹿胎 甘溫無毒其嘴尾蹄合與生鹿無異者為真其色淡形瘦者為鹿胎若色深形肥者為麋胎慎勿

誤用能損真陽。又障胎與鹿胎相類，但色皎白，且其下脣不若鹿之長於上脣也。其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也。入藥取真者，酥炙黃用。發明：鹿性補陽益精，男子真元不足者宜之。不特鹿茸並胎入藥，而全鹿丸合大劑參耆桂附大壯元陽，其胎純陽未散，宜為補養天真，滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之，尤為得力。如平素虛寒，下元不足者，入六味丸中，為溫補精血之要藥。而無桂附辛熱傷陰之患，但慎勿誤用麋胎，反傷天元陽氣也。

麋茸 甘溫無毒，修治與鹿茸同。發明：麋肉大寒，食之令人陽痿，而麋茸大益陽道，以其陽精都聚於角也。其角煎膠，勝於鹿茸，亦勝於鹿茸，然鹿之茸角補陽右腎精氣不足者宜之。麋之茸角補陰左腎血液不足者宜之。此乃千古微旨。治虛損有二至丸兩角並用，但其藥性過溫，偏於補陽，非陰虛者所宜。其麋膠主治與鹿膠無異，而兼補氣血之功，過於鹿膠。但驗其用大而毛者，即是。惜乎本經但言麋脂療癰腫惡瘡死肌寒熱濕痺，四肢拘攣不收，風頭腫氣通脹，理從無及于茸角之用。彭籤延齡方有麋角粉，千金變為麋角丸，以麋性喜食芎藭，故修鍊服食方用之。金匱云：麋脂及梅子。若妊婦食之，令子青盲。男子傷精，皆性冷傷厥陰肝經之驗也。

麋鹿肉 麋肉甘寒，鹿肉甘溫無毒。發明：凡獸之有角者，皆能助肝腎營力，而麋鹿之角多歧，故力能拒虎為角獸之冠，則鹿肉之補陽，麋肉之益陰，所不待言。鹿之一身所稟皆陽，最能益人，以陽氣為主也。麋之一身所稟皆陰，惟角為陰中之陽，較之鹿角純陽無陰倍勝，而週身血肉筋骨皆不足取。鹿肉之生者，主中風口僻不正，剉碎薄貼僻上，正急去之，不爾復牽向不僻處矣。○鹿血起陰器，止腰痛，療折傷和酒脫，治肺痿崩中，諸氣刺痛，飲之立愈。鹿筋大壯筋骨，食之令人不畏寒冷，但須辨骨細者為鹿粗者，即是麋筋，慎食多致陰痿。○凡服丹石藥人，勿食鹿肉，以其食百草之毒，善解諸藥之性也。

麋 甘寒無毒。發明：麋之性怯畏人，以其膽白易驚也。其肉雖肥，但能悅澤人，不能助人營力，以其善躍而無異常之力也。膽能治人粗豪之氣，若人素常膽怯者，為之切禁，其骨主虛羸泄精，麋稟偏陰。

而骨主精氣也。綱目言其甘溫安有膽白易驚而性甘溫之理。

麝香 辛溫無毒不可犯火。妊婦禁用。力能墮胎。今人以荔枝核燒灰入燒酒拌和混充不可不察。本經辟惡氣殺鬼精物。去三蟲。蠱毒溫瘧瘧癘。發明 麝香性溫芳烈為通關利竅之專藥。凡邪氣者入淹伏不起則關竅閉塞。辛香走竅自內達外則毫毛骨節俱開。從此而出。故本經有辟惡氣殺鬼精物。去三蟲蠱毒諸治也。其主溫瘧驚癘者借其氣以達病所也。嚴氏言風病必先入麝香。丹溪謂風病必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅入筋能通筋竅之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣諸血諸病驚癘癥瘕諸病經絡壅閉孔竅不利者安得不用為引導以開之通之。惟中風表證未除而誤用之。引邪入犯如油入麩。莫之能出致成痼疾為之切戒。而救苦丹治壅腫結塊方用硫黃辰砂入麝煠化隔紙壓成薄片。以少許灸患處無不立應。濟生方治食瓜果積作脹及飲酒成消渴者皆用之。蓋果得麝則塊酒得麝則散。此得用麝之理也。

貓 甘酸溫無毒 發明 貓捕生鼠虎噉生人。大小雖異稟性不殊。虎嘯風生而治風痺腫痛。貓齧鼠

竅而主鼠瘻寒熱。故肘後方取貓肉作羹消鼠瘻結核已潰未潰皆愈。但助溼發毒有溼毒人忌之。其頭骨及腦眼酥炙亦治瘰癧鼠瘻。其毛煨存性傳瘰癧潰爛。貓尿治蛇蝎入耳。滴入即出。以薑擦貓鼻。或生葱刺鼻取之。尿治痘瘡倒陷。臘月取乾者燒存性用之。貓胞治噎膈反胃。以純陽之性未散。故取以開陰邪之結也。方用一具酥炙為末入腦麝牛黃鬱金各少許。津唾化服之。予嘗以格至之理論物類。貓之體陽而用陰性稟陰賦機竊地也。故其目夜視精明而隨時收斂。善跳躍而嗜腥生不熟食而能消化血肉生物。一皆風火用事得雪水則蠢動以雪之體陰而用陽物類相感之應。若此而食江中鱗魚之骨。其胎必墮。按異物志云鱗是鱧鳥所化。故腹內尚有鳥腎二枚。與雀入淮水為蛤無異。其肉中細骨如毛粘腸不脫而致傷胎。物類感觸之應則又如此。

狸 甘溫無毒 發明 狸之與貓同類異種以性溫散故其骨炙灰善開陰邪鬱結之氣。鼠瘻寒熱為

之專藥千金以肉治遊風蘇頌作臙治鼠瘻元化取頭骨千金用陰莖總取攻毒破結之義時珍曰狸骨
貓骨性皆相近可通用之

狼 肉鹹熱無毒 發明 狼脂摩風首推而本草不錄亦一欠事狼肉補五藏厚腸胃填骨髓有冷積
人宜食○狼性追風逆行故其矢燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其專性逆行而無阻滯也

兔 辛平無毒妊娠忌食免肉合乾薑食之成霍亂 發明 兔無脾故善走二月建卯木位木尅戊土
故無脾其肉性寒能治胃熱逆腸紅下血其腦為髓之精性善滑胎故免腦丸為催生首藥然須臘月

取活兔用之始驗○兔肝明目屬肝稟氣獨勝且得至陰之精可救目暗之疾其屎謂明月沙又名望
月沙治目中浮翳痘瘡患眼但腫人無損者用以煨灰存性日服之其醫自退又方兔屎一味為末生

雞肝搗爛為丸空腹穀精湯服之醫厚加雞肉金尤捷兼治勞瘵五疳痔瘻殺蟲解毒黃帝曰兔肉和獾
肝食之成道尸

狐陰莖 甘平有小毒 發明 狐屬陰類故其莖主女子絕產陰中癢小兒陰癩卵腫以狐陰善縮入
腹也

水獺肝 甘鹹平小毒 發明 獺者水獸水性靈明故其性亦多智詭性嗜魚魚之生氣都聚於肝
是以獺肝專主傳尸勞瘵殺蟲之性與獺之捕魚不殊蘇頌曰諸畜之肝皆有定數惟獺一月一葉十二

葉間有退葉斗柄建寅之月值其氣退之時反為諸魚所蝕月令所謂獺祭魚是也以其治療有驗故仲
景治冷勞有獺肝丸崔氏治蠱症亦有獺肝丸孟詵云症病一門悉患者以獺肝一具火炙水服方寸匕

日再服之葛洪言尸症乃五症之一病則使人寒熱沉默默不知病之所苦無處不惡積月累年淹滯
至死死後復傳他人乃至滅門覺有此候惟以獺肝一具陰乾為末水服方寸匕

肝獺爪亦可應用小兒鬼症及諸魚骨鯁皆燒灰酒服獺肝之用當不出乎此也

山獺莖 甘熱無毒 發明 山獺稟南真純陽之氣故其性最淫專主陽虛陰痿精寒山中有此凡化

獸皆避去獺無偶則抱木而枯凡女春時入山獺聞婦人氣躍來抱合牢不可脫因扼殺而取之也

膈一名海狗腎

鹹大熱無毒以漢椒樟腦同收則不壞 發明 和劑局方治諸虛損有膈膈膈丸滋

陰丸藥中用之精不足者補之以味也今人多於房術方中用之亦可同糯米法麴釀酒服但功專補陽

陰虛切忌此物壯者最多而壯者絕少海州人捕得壯者以家狗外腎用筋縫上熨貼如生成無二然壯

戶與穀道連合為一雖用生筋縫熨其孔較壯者大而且長以此辨之最為有據

壯鼠 甘温無毒取膽法用活鼠繫定熱湯浸死破喉取膽真紅色者是也誤食鼠噉之餘令人發癩瘡

以貪慾之火蘊積饒涎也 發明 癸水位在於子通氣於腎其目夜明其精在膽故膽能治耳聾目盲

睛能明目骨能生齒皆益腎之驗肘後方治三十年老聾卒聾不過三度即愈令人側卧瀝膽汁入耳盡

膽一枝須與汁從下耳出初時益聾十日後乃瘥也生鼠血蘸青鹽擦牙宣有效松生小鼠香油浸腐化

取塗火燙效少水能制壯火也若生毛則不能消融矣壯鼠糞俗名兩頭尖驗其直者方是壯鼠之矢入

足厥陰少陰故煮服治傷寒勞復陰陽易腹痛研末服治乳癰燒灰存性傳折傷疔腫所主皆厥陰血分

之病又犬咬先洗去牙垢惡血用鼠糞炒研黑糖調塗即愈

狷皮 苦平無毒細剉炒黑或酥炙用 本經主五痔陰蝕下血不止陰腫痛引腰背酒煮殺之 發明

狷者胃之獸也故肉治反胃胃脘痛最捷其皮除目中翳障本經主五痔陰蝕取其銳利破血也酒煮治

陰腫痛引腰背取筋脈能收縱也南方金蠶盡用狷皮為末酒服探吐之狷腦狷肝治瘰癧狼漏千金方

用之但不可食其骨令人瘦劣

人部

髮 苦微温無毒揀去白者先用滾水洗淨入煬成罐外用鹽泥固濟煨候罐內外通紅冷定研末置地

去火毒用 本經主五癰關格不通利小便水道療小兒驚大人瘰仍自還神化 發明 髮者血之餘

故能治血病雖曰補真陰療驚癰理欬嗽固崩帶止血暈而實消瘀生新能去心竅惡血並煨過服若煨

之不透反能動血合雞子黃香油煎之消化為水則治小兒胎驚及逢癩瘡有效用入膏藥中則長肉消
瘰本經治五癧關格不通利小便水道皆取其利散散瘰之功其瘰小兒驚大人瘰以能達肝心一經開
通痰血之滯也仍自還神化者言服自己之髮則勝用他人之髮也但胃虛人勿用以其能作嘔瀉也亂
髮功用與此不殊而剃下者尤勝取長之速也小兒胎髮煨灰大解胎毒而補先天血氣以純陽未離也
頭垢 鹹苦溫小毒 發明 頭垢乃相火之餘氣結成專開鬱結之氣乳癰初起煨灰酒服即消以其
善祛胃中積垢也

人乳汁 甘鹹平無毒 發明 乳汁治目之功甚捷自得血而能視乳即血之源也用以點眼豈不相
宜老人服食尤良但脾虛易瀉者勿食日中曝乾入參苓丸服尤為合宜

爪甲 甘鹹小毒 發明 爪乃肝氣之餘其性銳利故能催生下胞衣利小便治尿血及陰陽易病破
傷風去目翳刮末治鼻衄嗜之立止又能治乳蛾用爪指甲不拘多少煨為末蓬砂白礬各一錢西牛黃
一分烏梅白梅肉各五枚共搗如泥含彈大一丸痰大湧出三四丸即愈但其方酸收太速不無萌發之
患莫若探吐頑痰迅掃病根為愈

人牙 甘鹹熱有毒 發明 牙乃腎之標骨之餘痘瘡倒靨用人牙散因痘瘡為風寒穢氣所觸而變
黑倒靨用此煨灰以酒麝達之竅入腎經發出毒氣乃刮劑也若伏熱在心昏冒不省人事及氣虛色白
癢塌不能作膿熱沸紫泡之證正宜涼血解毒苟誤用之則鬱悶聲啞反成不救臨證審諸

人中黃 甘鹹寒無毒造法用大竹截段兩頭留節削去外皮傍鑽一孔用甘草細末入滿於中以蕉扇
柄削圓塞孔冬至浸大糞池內立春後取出懸風處晒乾取用又法如前製竹不入甘草但用蕉扇柄或
杉木塞孔浸糞池中以取其汁與金汁無異僅供一時取用不能久藏糞清亦解瘟熱諸毒又誤食毒菌
楓樹上菌及過食銀杏脹閉欲死者悉能解之并解砒石野葛野芋等毒即家芋三年不收花開如蓮者
亦能殺人急取灌吐方可得生 發明 人中黃取糞土之精以解天行狂熱溫毒發斑最捷然汁則性

速升能池甘草製者則性緩而能解毒兼瀉河豚毒一切惡瘡災病人中黃酒大黃末等分無灰酒服須臾瀉利毒即隨出雖大渴不可飲水飲水則毒邪不散而難救也急切不可得以糞坑垢代之

金汁 苦寒無毒臘月取糞置罈中埋土內越三年取出如水者是 發明 金汁得土氣最久大解熱

毒故溫熱時行昏熱時劇者用以灌之下咽其勢立減初生小兒週時內毒邪不散服一二合勝化毒丹

胎毒盡解無痘疹患此屢驗者但胎稟虛寒體瘦色白者不可誤用誤用反奪天真多致夭枉不可不審

園叟用以灌諸草木即花葉茂盛且無過壅傷花之患

乾糞灰 鹹平無毒 發明 人屎取乾者煨灰治小兒痘瘡黑陷解時行大熱狂走蜜調塗疔腫拔毒

出根總取解毒之迅耳

溺 鹹寒無毒童子者佳不可見火見火則腥臊難服 發明 人溺療寒熱頭疼取其鹹寒降泄也有

客邪沖熱葱頭湯服之汗出即止而童子小便性純一切熱勞吐血陰虛火動骨蒸勞瘵用以降火最速

產後血暈溫飲一杯壓下敗血惡血即蘇蓋溲溺滋陰降火消瘀血止吐衄諸血每用蓋許入薑汁一二

匙徐徐服之久自有效然須乘熱服之以接生陽之氣冷則生氣散矣時珍云童便入胃隨脾氣上歸於

肺通調水道下輸膀胱乃其舊路也故能清肺導火下行若多服久服亦能損胃滑腸故食少便溏者禁

用傷寒少陰證下利不止厥逆無脈乾嘔欲飲水者加人尿猪膽汁鹹苦寒物於白通湯薑附藥中其氣

相從可無格拒之患但胃虛欲作嘔者勿與恐助嘔勢反致不測也

溺白堊即人 鹹平無毒煨過用 發明 人中白能瀉肝火膀胱火從小便中出蓋膀胱乃其故道也

今人病口舌諸瘡用之有效降火之驗也但積垢之滓僅堪滌熱略無益陰之功耳

秋石 鹹溫無毒陰煉淡秋石法將大缸一隻近底三寸許艾火燒三十餘炷打成一孔杉木塞之秋月

取童子溺入缸內衝河水攪澄定去木塞放去上水每日增童便河水如前攪之只留缸底者積至月餘

用絹篩觀紙瀝乾收之○又陰收秋石法將鉛球大小數十枚俱兩片合成多鑽孔眼入尿桶中浸每日

傾去宿尿換溺浸之。經秋收取置鉛罐藏之。此為最勝。○陽煉秋石。將草鞋數百隻舊者尤佳。長流水漂晒七日。去黃色。浸尿桶中。日晒夜浸一月。許曝乾烈日中。燒灰須頻挑撥。令燒盡滾湯淋汁。渣數日鍋內燒乾。重加雨水者。溶筴稿紙數重。濾淨再澄半月餘。銀缶器內煮乾。色白如霜。鉛罐收之。○又陽煉法。以童子小便入鍋熬乾。其鍋先燒通紅。香油熬過洗淨。則不粘滯。傷鍋初如油脚。入煬成罐。或小鐵釜中。煬通紅。用熱水熔化。置有嘴壺中。將草掩塞壺口。徐徐傾出。下以竹筴襯紙濾清。再以文火收乾。鉛罐收之。則不溶化。○又煉秋冰法。以秋石入秋露水煮化。入煬成罐內。新鐵蓋蓋之。鹽泥固濟。昇打三炷香。取出再研如前昇打。蓋內用水徐徐塗之。水不可多。多則不結。又不可少。少則不昇。從辰至未。退火冷定。蓋上昇起者為秋冰。乃秋石之精英。真虛羸之神丹也。○凡人力製造之藥。每多偽充。而秋石之真者尤不易得。有以食鹽濾水煮成者。有以朴硝溶化製造者。有以談硝煬化傾成錠式者。其偽不一。苟非雇庸督製。總難輕用也。試真偽法。入滾豆腐漿中。不結腐花者為真。若結者即鹽之偽充也。入口令人作渴。入滾豆腐漿中。起水紋而微苦者。即玄明粉之偽充也。入腹令人作瀉。其傾紙錠式。入熱水不易化者。即礞石之偽充也。下咽令人發熱。又以秋石化水入青菜葉有項色。不痿者為真。又以少許入眼。不渣痛者必真。無疑。其淡秋石入滾水不化者。即熟石膏末及滑石末混充也。發明 秋石以秋命名。專取秋氣下降之意。他時製者。功力則殊。製法以童溺煬煉。去其鹹寒。轉成溫補。能滋陰降火。而不傷胃。補益下元。真火散瘀。血助陰精。降邪火。歸真陽。止虛熱。嗽血。骨蒸。勞瘵之仙品也。火盛者宜生。宜淡。陰虛者宜熟。宜鹹。凡勞瘵。陰火亢極。而不受參者。補益者。立秋石丸玉方。次第施治。或服或嚼。則喘效。氣息漸平。痰亦易出。嗽亦省力。以其性味鹹降。而無上逆之患也。先用薑汁炒黑。大黃淨末。與秋石等分者。紅棗肉為丸。空心服三錢。清熱散血。次用貝母。秋石末各等分。生甘草末減半。仍用紅棗肉為丸服之。以止咳消痰。後用人參。秋石等分。反甘草末減半。亦棗肉丸。以補氣安神。製劑之多少。隨痰熱元氣而施。不可限以分兩。其陰煉淡者。性最下滲。苟非陰分熱極。難以輕投。陰虛多火。小便頻數。精氣不固者。誤服令人小便不禁。甚則令人

夢泄其鹹者可代鹽煎物食之。喘效煩渴不得寐者以半錢匙衝開水服之。即得安寐。覺時滿口生津亦不作渴。補陰之功可知。陰煉淡秋石。治夏暑熱淋。小便不通及濁淋沙石淋肉淋。老人絕慾太早。小便淋瀝瀉痛。一服即效。

紅鉛 鹹大溫無毒。即室女初通經水中之結塊如櫻桃者是也。發明 紅鉛流穢之餘。其性大熱峻

補命門淫火。陳酒服一枚少頃蒙昧如醉。若連服二枚則邪火內拒。令人暴亡。壯火食氣之驗也。

天靈蓋 鹹溫小毒。制法以香水滌淨。酥炙杵細入藥。或煎酒。或煨末。隨證取用。忌鐵器。發明 腦為

髓海。諸陽之會。能辟一切陰邪不正之氣。故曰天靈。凡人身中氣血安和。諸邪不能侵犯。陰陽乖戾。則屍

疰之氣得以乘虛襲入。是即瘵蟲之根氣也。若其人平昔陽衰。則蟲攻脊脈。脊中淫淫作癢。隱隱作痛。轉

側不能自安。或時凜凜畏寒。或時翕翕發熱。手足四末常清。脈來弦細乏力。非天靈蓋散不能療之。若其

人素稟陰虛。則蟲蝕藏府。胸中嘈雜如饑。默默不知所苦。無處不苦。動則時效。時噤。靜則善寐。善忘。面上

忽時烘熱。脈多弦勁搏指。此屬癩肝丸證。非天靈之所宜。其天靈散方。用災淨三指大一片。赤檳榔三枚。

白甘遂麝香直安息各三分。阿魏二分。辰砂一分。搗羅為散。桃枝煎湯。五更調進。一服約人行十里。頃蟲

不下。再進一服。天明進第三服。取下蟲物。急擒入油鍋熬之。其蟲嘴黃赤者可卜病人血氣未艾。治之可

愈。青黑向者血氣已竭。治之難已。然亦得斷傳染之患。凡修合勿令病人知。擇僻淨處。忌雞犬婦人孝服

者見。蟲下後忌肥鮮及鹽半月。白粥調養漸安。如病久不勝甘遂。阿魏等攻。遂只以天靈蓋香水滌淨。仰

置銀缶器內。盛以醕酒。隔水煮一官。香酒耗旋添。候一炷香足。取酒服之。少頃頭旋顛。脹瘵無隨。嘔吐出

即以燼火燎之。將養三日後。取前蓋骨。製服如前。蟲盡。即以蓋骨仍埋舊處。其災淨細末。并治小兒痘瘡

反白。陷伏不長。煩躁不寧。酒服四五分。即起。然皆不得已而用之。至於傳下部疔。入枯痔散。乃以人之至

高之膏。置之污下不潔之處。雖極其神驗。殊非仁人君子之用心。舍此豈無他藥可治乎。

人抱脚 甘鹹溫無毒。取厚小色鮮者。挑去血絡。漂淨血水。入椒一握。沸湯泡去腥水。以蜂蜜和長流

水於舊錫器內隔水文火煮爛如糜綿絞去滓代蜜糊丸藥良發明紫河車稟受精血結孕之餘液得母之氣血居多故能峻補營血用以治骨蒸羸瘦喘嗽虛勞之疾是補之以味也自丹溪極言其功而吳球創大造丸雖世所推重然方中生地黃柏天冬麥冬龜板一派滋膩腸胃之品雖有人參一味反助羣陰之勢服之每致傷中嘔泄未見其可惟永類鈐方河車丸方用人胞一具山藥二兩人參一兩茯苓五錢酒糊為丸近世改用鮮者隔水煮搗作丸尤為得方即虛人服之未嘗傷犯胃氣

胞衣水

鹹潤微涼無毒臘月取紫河車置有蓋瓦罐內深埋土中臨用取出不可久留久即乾矣或與

生甘草末同入罐中埋於土中二五年後掘出即為藥也發明胞衣之性本熱而得土氣之化善能

攝火歸元小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮緊虛痞等證天行熱疾咽痛及虛勞咽

痛飲之立効反胃久病飲一鍾當有蟲出

初生臍帶

發明臍帶者人之命帶也用以煨末入硃砂少許蜜水調服以解本嬰之胎毒與內傷之用骨灰無異

胎元

鹹大温小毒發明胎元雖墮下胎息淫火未離天真未刮較河車之性倍甚古方鮮用惟金

剛丸用之雖以人補人然獸相食且人惡之况人食人能無惻怛之念乎

剛丸用之雖以人補人然獸相食且人惡之况人食人能無惻怛之念乎