



武備志

百四十四
百四十五

ケ 5
61
50





武備志卷一百四十三

仿風茅元儀輯

置資乘

餉九

醫藥一

茅子曰軍中之疾莫急於金瘡故首其_次則其中藥毒者也又次則烟火所傷者也又次則墜馬馬咬者也此四者非軍不傷故先_次大軍羣聚則有疫瘡時地相戾則有_疾襍症嚴寒冒觸則士有_戰瘰

武備志卷一百四十三 置資乘 餉九 醫藥一

明治
月
日
年
未

讒毀憂危則將有癰疽故并附之若其它則自有
岐黃家在此也

金瘡

中毒 溺死 壓死 附

火傷

馬傷

疫癘

雜症 卒死 喉痛

霍亂

中暑

中寒

痢疾

駝瘰

癰疽

金瘡

許洞曰人為兵器所傷出血者必甚渴即不可與
水飲所食之物旋毛在吻須乾食食肥膩之物無
所妨害貴解渴而已不可過多飲粥則血沸出人
必死矣所忌者有八焉一曰嗔怒二曰喜笑三曰
大言四曰勞力五曰妄想六曰熱羹粥七曰飲酒
八曰酸鹹此八者犯之鮮有不死矣夫金瘡不可
治者有九曰傷腦曰傷天倉曰傷臂中跳脈曰傷

大腸小腸曰傷五臟此九者皆死處又有金瘡不可治者四焉曰腦髓出口腦破而咽喉中沸聲兩目直視曰痛不在傷處者此謂傷經曰出血不止前赤後黑或自肌肉腐臭寒冷堅實其瘡難愈此四者皆不可療矣除此之外復論其脉脉虛細者生數實者死沉小者生浮大者死其所傷在陽處失血過度而脉微緩忽疾者死矣

唐順之曰夫金瘡者木乃春之權金乃秋之令春則萬物發生故曰春屬震以爲東方甲木之氣秋

則萬木凋零故曰秋屬兌以爲西方庚金之氣也金瘡乃刀斧劍刃之所傷故名金瘡其色所喜淡紅色者良萬不失一所惡者紫紅色百無一生金瘡屬金主與肺患金瘡者則忌咳嗽嘔噦翻胃肺之症亦宜避風爲要蓋風所屬巽木如風入瘡口肺金反尅而成破傷則至瘡口浮腫潰痍穢爛故名破傷風變生餘症患甚者多致不救雖有治法宜辯瘡口淺深脉之虛實吉凶見矣所喜者胃氣益旺飲食如常脾胃屬土胃氣旺則元氣壯氣血

生金瘡亦宜戒怒遠色怒則瘡迸裂變生腐肉怒則瘡口腐爛以損新肌凡治金瘡用敷口之藥生乳沒竭靈蓋乳石之類自始至終不可不用此藥用之則生肌止痛活血全生可保無虞凡服湯藥必以助胃補血為主以為治金瘡之大意金瘡雖有變易各有治法居於邊隘不日刀箭之所傷非此聖藥安能治之塞垣軍旅之間罹於毒者若非秘方必至危殆者多矣學者宜細觀之王鳴鶴曰夫折傷者謂為物所傷於身體或犯刀

斧或墜墮險地或為撲跌傷筋挫骨損皮破肉遂致傷生有死血出不止者有瘀血停積於臟腑結而不散者治之不早則有入腹攻心之患不可勝言凡遇前症當視所傷輕重如皮未破而內損者必有瘀血停積先宜逐去瘀血然後和血止痛若肌肉裂破流血過多者宜調血養氣兼補脾胃為

治金瘡用百草方
五月五日平旦使四人出四方於五里外採

方草木莖葉每種各半把勿令脫漏是日午時
確擣用極爛仍先揀好石灰一斗同杵之復選
大實拊三兩杵鑿破作竅令可受藥然後分藥
實於竅中堅築之畢即以麻皮繫之用麻擣石
灰密泥不令洩氣更以皮纏定令牢到九月九
日午時取出陰乾百日藥成擣之暴令極乾更
擣用絹羅之凡有金瘡傷所出血用藥封裹勿
令轉動不過十日即癒矣不膿不腫不畏風若
傷後數日始得藥須先用溫水令血出即傳之

又乳香方

乳香 一兩 沒藥 一兩 天靈蓋 五錢
血竭 一錢 黃連 二錢 為末 花蕊石 二錢 要淡
珠末 二兩 能止痛生肌散血治肺家症候 金芮 五片 能鎮
壓止痛生肌 黃丹 一錢

右方用降真姜擣爛同服并傳瘡口一云用冬
瓜一云用松枝嚼爛

又方

以童便一碗入酒半碗煎沸溫服以防惡血攻

心之患

治金瘡肚腹腸出者

一右以避風處用麻油潤手安腸入內以桑皮作線縫之更以熱鷄血塗上一夜次用止痛生肌散或花蕊散敷貼仍用磁石三兩燒紅醋七次擣碎研如粉鐵精三兩滑石三兩并爲細末研勻傳於腸胃別將磁石末用粥調下一錢日三四服或將前傳藥溫酒調下亦可

治金瘡至重者用寸金丹

天花粉 三兩 姜黃 一兩 赤石藥 二兩 白芷 一兩

右爲末凡筋斷脉絕血盡人危須用繩索及絹帶扎住血路然後用此藥以茶清調敷用軟絹縛之其血立止其腫頓消若金瘡着水番花者可用韭汁調敷瘡口兩傍以火微炙之或用稻稈烟薰之瘡口水出卽愈

治金瘡并木石損傷者

用好陳石灰六兩研碎篩過綿紋大黃一兩切塊同石灰鍋中炒過紫色爲度去大黃再篩過

傳傷處立效

治金瘡初傷者用辟風止痛方

當歸

五錢剉微炒

川椒

五錢去目及閉口者微炒出汗

澤瀉五錢

芎藭

一兩

附子

一兩去皮臍去

右搗羅為末以溫酒調下一錢日三服

治金瘡疼痛不可忍者用禁聲飲

防風

天南星

湯泡各等分

右為飲片每服五錢水酒各一盞生一片煎

至八分食遠溫服三服有效

治金瘡血出不止用龍骨方

龍骨

一兩剉微炒

芎藭

一兩

熟地黄

一兩

烏樟根

三兩

突厥白

一兩

鹿茸

一兩去毛酥炙令微黃色

右為末傳瘡上血即止如服以溫酒調下一錢

日三服

又方

馬齒莧

葦菜根

蓮鬚葱

陳石灰

右等分共搗為餅子陰乾為末乾摻其血即止

又方

白馬糞 不拘多少

右晒乾為末、乾摻、其血即止、

又方

乳香 沒藥 兒茶 栳皮炒

龍骨 水飛 石膏 煨水飛 黃丹 水飛 真三漆

右各等分、為末、摻之、其血即止、

又方

先以井花水一盆、用碎白紙浸於水中、比血流之處、將水紙於四畔、流則再上、待止方可用之、

治金瘡、去血過多、昏暈等症、用芎歸湯、

川芎 五錢 當歸 一兩

右共為片、水煎、臨服入童便酒各一大杯、熱一

治殺傷不透膜者

乳香 一錢 沒藥 一錢

右研爛、以小便半盞、好酒半盞、同藥通口服、然

後用傳藥

又傳藥方

花蕊石散 龍骨 或烏賊魚骨

右為末等分傳瘡口立止

治金瘡內漏者金瘡通內血者為內漏腸脹不能食者死瘀血脹在腹內脈率大者生沉細者死

蚩虫三十枚去翅足微炒水蛭三十枚微炒桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微桂心一兩川大黃三兩剉碎微炒

右為末每服二錢用童便一鍾煎至五分溫和滓服日五服夜三服如無童便用水并酒代之服訖然後傳藥

又傳藥胡粉方

胡粉二兩

乾薑二分為末

生栗子二分陰乾去皮為末

治金瘡內爛生蛆者

用皂礬飛過為末乾摻其蛆即死

治金傷或壓傷或墜傷而瘀血在內胸腹脹滿喘促氣短者用當歸導治散

當歸各二兩 大黃各二兩

右共為末每服二錢不拘時童便和酒調服

治金瘡腐肉未去者用去腐散

土丹水飛淨一兩 天一石一兩火煨通紅取置地上出火毒

武備志卷五十三 軍資乘

餉醫藥

九

右共為末用磁罐收貯傳瘡上待腐肉化為黃水去盡肉肌淡紅色方換歛口生肌散

治金瘡未收口者用慈蝎歛口生肌散

花蕊石 一兩 乳香 一兩 沒藥 一兩

右藥俱須極真者先將花蕊石在炭火中煨紅

於一末內蘸令烟再煨再應以末盡為度取出

地上出火毒

治破傷風 先有破傷風邪襲入瘡口其症大似傷寒而瘡口驟結白痴是其驗也或發熱

或寒熱間作甚則口禁身強直如角弓反張之狀死在旦夕矣法當同傷寒處治因其有在

表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和裏之法也是故在表者汗之在裏者下之在半表半裏之間者宜和解之又不可過其法也 初傷在表用羌活防風湯

羌活 防風 川芎 藁本

當歸 白芍藥 甘草 各四兩

右以咀每服各一兩水一盞煎至一盞去滓溫服不拘時量緊慢加減用之熱加黃芩大便閉

加大黃一兩

治破傷風癩瘡疼痛體發寒熱用玉真散

天南星 一兩 防風 一兩

右共為末傳於瘡口又以香油潤之後以溫酒調一錢服

治破傷風牙關緊急如角弓反張者即以前方用一錢以老酒入童便少許嚥服立效不愈再服一服有驗

又方

天麻 白芷 川芎 草烏 雄黃 各一錢
右為末酒和丸如桐子大每服十丸溫酒送下治破傷風瘡口不語者

赤箭 一兩 桂心 三分 防風 二分

巴豆 二分去皮及心然後研 附子 三分去尖

吳茱萸 五錢湯浸下 硃砂 一兩水飛過

乾蝎 五錢生用 天南星 三分泡令裂白用

右擣羅為末用醞醋三升熬膏丸如梧桐子大每服三丸不拘時候以熱葱酒下服後汗出效

治箭頭不出者

蜣螂 一枚自死者 土狗子 三箇 婦人髮灰 少許

右先將蜣螂去壳取其白肉與一味同研如泥

用生油塗中箭處塗後內作瘻即以兩手感之其箭自出

治肉中箭頭不出者

巴荳一枚 膩粉一分 砒霜許少 磁石五錢 蜈蚣一枚
右為末以雞子清和丸如綠豆大先以針撥開瘻瘻用生男子乳汁化一丸再撥破處上用醋麵紙封貼常瘻瘻極不可忍其簇自出也多年者兩上當年者一上即出

治骨中箭頭不出者

雄黃一錢 蜈蚣一分 石灰一分
研作末以牛糞燒之令赤色

威靈仙一分 朝桂鼠一枚
去頭取血

右四藥為末入鼠血煨蜜為丸如黃米大納瘻口中其箭不論遠近自出

治箭頭出後服食方

牡丹皮五錢 鹽五錢 白欬五錢

右為末每於食前溫酒調下二錢

治毒箭所中者

笋根一兩 藍葉一兩 紫檀五錢 石灰二兩
研作末以牛糞

火燒今赤石為末不拘時候以藍葉汁調下一錢粥飲下亦可

又方

搗藍葉汁一升飲滓傳瘡上若無藍取青布漬絞汁服之并淋瘡中簇不出搗鼠肝塗之鼠腦亦可用之即出

又方

雄黃一分細研 粉霜五錢細研 巴荳三粒去皮別研如泥生用

蟻娘四兩研末生用

右用研勻以銅筋頭取乳汁塗點瘡上頻頻用之次日箭頭自出

治毒箭及馬汗方

蟻虫大者去翼於端午日收之陰乾為末每服一錢挑破瘡口以藥傳之然後以醋麵糊紙厭面貼之即追出毒也

又方

石灰二兩研末以牛糞火燒令赤色 蜜陀僧 一兩

黃栢五錢剉以膩粉研爛為末

右共為末每用先以鹽水洗瘡後用藥傳之日
一各換之

治中_テ毒箭後皮肉瘀腫者

梨母子一斤煉研去核鹽麩子五兩擣之暴乾更擣用絹羅之去粗滓

菘苳三兩炒熟石灰二兩研末以牛糞火燒令赤色

藍子五兩黃連三兩去鬚獨顆栗子三兩生用

黑荳三兩炒熟大糞灰五兩赤芍藥三兩

右為末煉為膏每服一茶匙日三四服

治打撲損傷腫痛者

用葱頭切爛炒焦搗搭患處冷則再易止疼消
腫散瘀

防風茅元儀輯

軍資乘

餉十

醫藥二

中毒 溺死壓死附

治中百毒者凡中毒從酒得者難治酒性行諸血
 食與藥俱入于胃胃能容毒或逐大便泄出毒氣未流于血脉故易愈也
 用甘草同黑豆煎湯嚥之

武備志卷一百四十四 軍資乘 餉 醫藥 一

又方

以麻油罈之

又方

以芫荽根搗汁半盞和酒服之

又方

確砂仁 生韭汁 藍石

右各單用水調下

又方

石菖蒲 白礬 等分

右為末新汲水調下

又方

淡豉 蔥 麥門冬

右水煎服

又方

真雄黃 研末

右冷酒服凡諸藥汁解毒者皆不可熱飲能使毒氣愈其宜冷服之乃效

治中砒霜毒者

武備元卷一百一十四

鬱金末 二錢

右入蜜少許冷水調服

又方

升麻 不拘

右蜜煎冷服

又方

杏核 不拘

右連仁搗為末米飲調服

又方

白扁豆 不拘

右為末冷水調服

又方

醬調水服

又方

飲醱醋以吐之

又方

飲水解之

又方

武備元卷一百一十四 醫藥二 三

鉛粉 不拘

右取地漿水調服

又方

寒水石 菘豆 等分

又方 右以藍根研水調下

又方

白芷 不拘

右為末水調下

又方

糞清

治中蠱毒者 凡造蠱之家用毒有日如正月則用

日五月五日六月六日七月七日八月九日九月十日十一月十一月十一日十二月十二日凡

蠱毒有五種 治法皆同

馬兜零根 三兩

右咬咀分三服水煎去滓空腹頓服隨時吐出

蠱未吐再服以吐為度

又方

生甘草 五錢

右以水濃煎頓服吐痰即愈

又方

胡荽根 不拘

右搗汁半盞不計時服其蠱即下
穉酒服尤妙
白雞血亦好

又方

鵪鶉熱血隨多少服

治中蠱生血者

小麥麵 一合

右分兩服冷水調下半日當下

治中蠱下血者

蝟皮 燒灰細研不拘

右熟水調服二錢

又方

升麻 不拘

右為末汲溪水調服

治中酒毒者

大黑豆 一升

武備志卷之百一十一 軍資乘 前 醫藥二

右煮汁二升服下吐即愈

又方

生螺螄肉

又方

葶澄茄

又方

葛花

治中百藥毒者

橫紋甘草

又方

右截成小塊麻油煎過不拘時常嚼久而致效

生了蠶殼紙

右燒末細研每服一錢用冷水調下頻服取瘥

雖中_凡毒而面青脉絕腹脹吐血者服之立活

又方

薺苳

以其與毒藥共處毒皆歇也

右取根搗汁飲

又方

藍汁

右用水調服

又方

白扁豆

右用水調服

又方

大小豆

右用水調服

又方

白礬

爲末一兩

右水調嚙耳鼻中皆出黑血勿怪

治中丹藥毒者

嬰藥子研去子煎至_リ腐_ニ入_テ姜蜜和_シ萱草根_ニ研_テ法服_ニ再用_ニ四物湯香蘇散各_{一劑}和煎服

又方

鉛粉

右地漿水調服之

又方

錢譜志卷之四十四 軍資乘

醫藥二

七

淡竹葉

右濃煎服之

又方

猪膚脇骨煎汁研瓜萋根汁飲之

又方

藍汁

又方

羊血

又方

菘豆

治中服附子酒多而覺頭腫如斗唇裂日流者

急求黑菘豆各數合嚼之及煎湯飲

治服風藥多而悶亂不醒者

用醋嚙濃煎甘草同生薑自然汁飲之

又方

螺頭青

右細研用新汲泉水調下

治服諸藥過劑悶亂者

正作志光二區

葛粉 胡粉 藍青汁 地漿 豉汁 乾薑

飴糖 黃連 等分

右水調下

治中飲食毒心煩悶者

苦參 不拘

右煮汁飲之吐出即止

治中諸菜毒者

甘草 胡粉 貝母 等分

右為末水服

又方

小兒溺服愈

治中瓜毒者

瓜皮湯服愈

又方

鹽湯服愈

治中柑毒者

柑皮湯服愈

治中梨毒者

氏消志光二區 軍實果 附 醫藥二

梨葉湯服愈

又方

鹽湯服愈

治中野菜毒者

土漿水服愈

治中野菌毒而笑者

煎桑椹汁服愈

又方

急採鴛鴦草生啖之 即忍冬草

又方

防風不拘

右剉碎以水煎候冷嚙之立愈

又方

石首魚頭

右以白水濃煮嚙之

又方

土漿水飲之立愈

治中六畜肉毒者

武備志卷一百四 軍資乘 餉

壁土

右水調一錢服

又方

白扁豆 不拘

右燒末服

又方

黃栢 不拘

右燒末服

治中馬肉毒者

蘆根汁服愈

又方

蘆根作湯浴

治中馬用毒者

狗糞 不拘

右酒調服

又方

猪骨 不拘

右燒末服

正傳志卷二 雜考 卷二

又方

生韭汁服愈

又方

頸垢吞服愈

治中狗肉毒者

杏仁 三兩

右和皮研熱湯調溫服二盞吐出愈

治中牛肉毒者

猪牙 不拘

又方

右燒灰水調服

井水

治中猪肉毒者

猪糞 不拘

右燒末水調下三服愈

治中鴨肉毒者

糯米泔

右溫服一中盞愈

治中雞子毒者_上

醇醋

右飲數鍾愈_ニ

治中河豚毒者_上

梅花腦子_{不拘}

右爲末水調服

又方

五倍子 白礬_{等分}

右爲末水調服

又方

藍青_{不拘}

右按汁嚥下

又方

青黛_{不拘}

右水調下

又方

生蘆根_{不拘}

右搗汁服

治中諸魚毒者

橘皮 不拘

右煮汁服

又方

馬鞭草 不拘

右煮汁服

又方

黑豆

右煮汁服

又方

大黃 不拘

右煮汁服

又方

朴硝 不拘

右煮汁服

又方

生蘆根 不拘

右搗汁服

治中蠶毒者

紫蘇

右濃煎一盞飲

又方

生藕不拘

右搗汁服

又方

乾蒜不拘

右煮汁服

治中鴉鳥毒者

生扁豆不拘

右爲末溫水下

又方

葛粉不拘

右以水調服

治中挑生毒者凡喫魚肉瓜菓皆可挑生初中毒且則物生能動躍騰上則胃痛沉下則腹痛脇下忽腫起如癰癤狀頃刻間大如碗以菜豆等試若香甜即是

搗小升麻為細末取冷熱水調二大盞連服之
洞下瀉出生蔥數莖根鬚皆具瘰即消續煎平
胃散飲之日食白粥即愈

治中_上生挑毒在_上膈者_{即上則胃}痛是也

用執茶一甌投膽礬半錢于茶中候礬化盡通
口呷服良久即以雞翎探喉中即吐出

治生挑毒在_下膈者_{即下則腹}痛是也

用米飲下鬱金末二錢即瀉下其毒次用人參
白朮各五錢為末用無灰酒納瓶內慢火熬半

日許_{酒熟溫溫服之}每日二盞五日乃止
後飲食如故

治慢食_{桐油者}

飲熱酒解

又方

乾肺

又方

甘草汁服愈

治中_{瘴氣者}

犀角

又方

雄黃

又方

麝香

又方

羚羊角

治中邪氣入腹者

升麻

犀角

射干

等分

右為末水調服

治中飛絲毒者

嚼蘇葉愈

治生漆惹人成毒者

生椒葉 不拘

右煎湯洗

又方

雞子黃

右塗患處

又方

白松菜

治溺水死者以下俱附

用皂莢為末綿裹塞糞門放火燒上臥脚後墊起一二磚用鹽擦鼻裏待水自流出切不可倒提出水但心下溫皆可救

又方

急解衣帶用艾炙臍中令一人以蘆管吹其耳即活

治溺死微有氣及冬月凍死者

脫去濕衣假人熱衣包之用大米炒熟熨心炒竈土令熱以囊盛熨心上冷則緩之令煖氣通溫以熱酒或薑湯或粥飲少許嚥之即活

治木石壓死并從高跌死氣絕不能下者

急擊開口以熱小便嚥之

又方

用豆豉一大盞水兩碗煎三沸去渣服

火傷

王鳴鶴曰凡煙火所傷切不可用冷水冷物熱得冷氣則却而擊搏爛人筋骨矣

治方

用麻油煎黃蜀葵花傳上

又方

用爛黃蠟燭之

又方

多年白螺螄殼不拘

右火煨為末瘡破乾搽不破清油調傳

又方 志卷一百四十四

側栢葉 不拘

右搗爛傳

入方

寒水石 大黃 黃柏 等分

右共為末密調傳之

馬傷

治墜馬而內有瘀血者

地黃 五斤

右搗碎置鐺中熬乾以無灰酒一斗五升入藥飲之

治劣馬咬傷者

絞馬糞汁服之并以此洗瘡愈

武備志卷一百四十四

武備志卷一百四十五

軍資乘

餉十一

醫藥三

疫瘡

治疫病

茵陳 二兩 大麻仁 五兩 研 豉 五合 常山 三兩

梔子 二兩 芒硝 二兩 研 鱉甲 二兩 塗 醋 杏仁 二兩 湯

武備志卷一百四十五 軍資乘 餉 醫藥三

去皮尖雙仁巴豆一兩去皮心炒黃紙裹
麩炒微黃色 巴豆一兩去皮心炒黃紙裹
裹壓法去油細研為末
 右合勻煉和搗幾百杵丸如梧子大每服三丸
 粥飲下或吐或利或汗如不再餌之更不以熱
 粥飲換之老少以意加減

又方

梔子二十枚 乾葛五兩 大黃五兩 芒硝五兩
 茵陳一兩

右為散計飲一服必利如不利投熱粥數匙則利

又方

麻黃一兩去根節 牡蠣粉一合 蜀漆五錢
 甘草五錢 犀角屑五錢 知母五錢

右為末用水二大盞慢火煎去滓分為三服某起午初夜服之

治痲病初起一二日頭痛身熱骨節痛用芎蘇散

川芎十兩 紫蘇一斤 陳皮十兩 茯苓十兩
 甘草十兩 乾葛二十兩 半夏十兩 柴胡二十兩
 枳殼十兩 桔梗十兩 香附十兩

右共爲末每用兩許薑葱送下衣覆取汗如冬
月加白芷麻黃八兩

治疫病初起一上二日諸症俱發兼飲食停滯嘔吐
無汗等症及山巒瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐
瀉中暑冒風吐瀉不服水土用藿香止氣散

藿香 二十兩 蒼朮 一斤 厚朴 一斤 陳皮 一斤

半夏 一斤 茯苓 一斤 白芷 一斤 桔梗 一斤

紫蘇 一斤 大伏皮 一斤 甘草 十兩

右共爲末每服一上二兩薑湯下

治疫病三四日得汗後未解眼眶痛或寒熱往來
口苦嘔吐用柴胡雙解散

柴胡 黃芩 半夏 人參 甘草

乾葛 茯苓 陳皮 芍藥 各等分

右薑三片棗一枚水煎服

治疫病三四日後熱盛大便不通用河間雙解散

薄荷 一兩 黃芩 一兩 連翹 一兩 石膏 一兩

滑石 七錢 川芎 一兩 麻黃 八錢 桔梗 一兩

甘草 一兩 朴硝 五錢 荆芥 一兩 防風 四錢

當歸 一兩 二錢 芍藥 一兩 梔子 一兩 白朮 一兩 五錢

大黃 審病加減

右共為粗末每用一兩五錢再量病虛實加減

白滾湯下煎服亦可

治天行暗時氣

甜瓜蒂 丁香 赤小豆 各四丁 九枚

右三味為末和井花水服之然後取赤大豆作

末分吹兩鼻中須臾取汗黃色如蘗及出黃虫

或痢或吐皆愈

治瘧疾初發用藿香止氣散一二服一二發後用

鬼哭丹截之

黑豆 四百九 十粒 菘豆 四百九 十粒 雄黃 二兩 五錢 信石 一兩

右為末蒸餅為丸如芡實大每服一丸冷水下

忌熱飲食一日

治山瘴發瘧者

常山 三兩 烏梅 二十 七枚 獨顆蒜 一枚 靛帶 三十

右以酒一大盞煎一大盞作二服初一服末發

時吃次一服將發時候服安臥頭左側

雜症

治卒暴百病中惡口禁停尸卒死及心腹諸疾者
用備急丸

巴豆 大黃 乾薑 各等分

右為末蜜糊杵千下丸如小豆大三丸苦酒下
如口不開折齒嚙之或提其髮用匙鑰勾開下
齒亦可嚙入

治霍亂吐瀉方

桑葉 一握 扁竹 一握

右細剉末用水二大盞服
治中暑霍亂用益元散

滑石 六兩 甘草 一兩

右共為細末凉水調下如冬身發炒鹽湯調下
治中寒霍亂

吳茱萸 鹽炒

右煎服再用茱萸煎湯熨臍下

治中暑者用黃連香薷飲

黃連 半斤 香薷 一斤 厚朴 半斤 甘草 四兩

右每用四兩水一大金煎一二沸去渣涼服暑月無病亦宜通與服之則無中暑之患

治中暑途中死者

移置陰處急取路上熱土於死人肚上作窩多冷人尿溺於臍中又取路上熱土并大蒜同研爛水調去滓嚥下切不可用冷水嚥沃及以冷物逼外得冷即死

治中寒厥冷僵仆者

急以繩束葱一斤切去兩頭如餅式火上燒熟

安臍下土上用火熨之即甦無葱則以湯濕布熨臍下上用帶火熱灰熨之

又服藥方用附子理中丸

人參 甘草 炙 白朮 乾薑 炮 附子 製各等分

右為丸鷄子黃太滾沸湯插下

治痢疾初發用花滯丸

丁香 一兩 胡椒 二兩 巴豆霜 一兩

右為末麩糊為丸菴豆大每服二十丸鼻八加

減白湯下

治痢疾應止及泄瀉者用加味香連丸

五倍子四兩 黃連二兩 吳茱萸一兩 木香一兩

右為末煮棗肉為丸梧桐子大每服三四十九

米湯下

治血痢

生犀角五兩 阿膠四兩 黃蘗四兩 艾葉二兩

乾薑二兩

右為末米飲湯調下

治咽喉一時疼痛水米難入者

急用土牛膝草根不拘多少洗淨搗爛加水一大杯米醋半小盞絞汁徐徐嗽吐其汁嗽盡即效

效

皸瘰音中諱

許洞曰土萃涉水踏水蒙犯霜雪寒風所切凌凍所苦或失於飲食肌體虛劣故頭目手足皸瘰血出也

治方

猪脂洗之立止

又方

川椒四合以水煮之去滓清之半食須出令濕須臾後浸乾即塗羊脂腦髓

又方

取艾葉濃煎汗熱洗之即愈

治皸瘡已成瘡者

以羊髓熬成膏油入黃丹攪勻令凝塗三五日即愈

又方

用清油半兩以慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候溶入官粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火上烘乾即用藥傅以薄紙貼之

又方

用瀝青一兩黃蠟一兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥用慢火略烘溶傅之

又方

用茄子根濃煎湯洗過以黃柏為末猪油調傅

治手足指節皸裂欲墮者

用萊州青石作器物者以刀細刮取末如欲落指節尚有柱紋縷微連便以石末厚覆其上以帛纏之止痛十日即安矣

癰疽

治諸毒用萬病解毒丹

山茨菇二兩去皮洗焙文蛤一名五倍子二兩槌破洗焙千金子一名紫太戟一兩去油成霜一兩紅牙大戟一名紫太戟一兩去油成霜一兩瑞香三錢研

右製法宜端午七夕重陽或天月德黃道上吉日修合量藥多寡預期數日前主人及醫者俱齋戒沐浴於靜室焚香將前五味各為極細末重羅兩遍依方用糯米濃飲調和於木臼內杵千下極光潤為度每錠重一錢每服一錠病勢重者連服通利一兩行用溫粥補住一切飲食藥毒蠱脹癰氣惡菌河豚死牛馬蛇羸等諸毒並用凉水磨服南方蠱毒瘡癘傷人纔覺意思不快即磨服一錠或吐或利隨手便愈癰疽發

背對口天蛇頭無名疔瘡楊梅等一切惡瘡諸

風隱癩赤瘡未破及痔瘡並用無灰淡酒磨服

及用涼水調塗瘡上日夜各數次覺痒立效

治一切癰疽托裏止痛護臟用仙方蠟礬丸

黃蠟一兩黃色好者白礬一兩

右和勻用寮手急丸梧桐子大每服十九漸加

至二十九熱水或溫酒送下日進二服即消

治發背癰疽去病根免傳變不動元氣用轉毒丹

車螯一兩紫背光厚者以鹽泥固甘草分

臍煨令通紅候冷淨取末

輕粉五分

右共為細末每服四錢溫酒調下

治癰疽發背用神仙截法

真麻油一斤煎十數沸傾出候冷

石用無灰酒二碗浸油內重湯溫五大盞許稍

熱通口急服一日盡之為妙

治癰疽便毒用如神散

明白礬不拘多少

右端午日晒臨用取五錢為細末葱白七根搗

為大丸以滾酒送下汗出為度

治發背及小癰瘡用立效散

紫色皂角刺 半斤不用枯者 生粉草 二兩

乳香 五錢 沒藥 五錢 瓜蒌 五箇去皮取肉并研碎炒黃色如乾者

不必炒

右共為細末每服二錢無灰好酒調下無時候

治有尖小癰瘡疼痛發熱者

生粉草節不炙不焙只日晒乾若無日只於焙

籠蓋上微火烘乾碾為細末以熱調一二三錢服

連追數服疼痛與熱皆止

治小癰瘡初起者

橄欖核 七枚

右燒灰存性碾為末酒調下連服即消即潰亦

易治

治一切瘡毒不問已潰未潰焮痛發熱者

槐花 一升炒黃

右熱酒調服即消

武備志卷一百四十五

軍器

倉

醫藥

十一

武備志卷一百四十五

