



門中武
新 202
卷 1



古方條理序

醫方之復於古也無人不口長沙
氏之書焉隆乃吾人不口長沙氏
之書焉乎亦惟道德淨說者
歟不務執迷不返而其志嚙々
然曰古之人古之入然至如果
能究長沙氏之深奧者則履々



九折堂山田
氏圖書之記



平也幾矣其藩熊望玄碩夙負
英特之資承家世之業嘗有慨
其如斯也奮然捐志一意以長
沙江之邑為己任焉沈潛精思
研窮不措遂乃有所得焉按此
行事如六符契也其業所造福
可見焉此是平名隆之乎起治

大享于上下也名中之所及豐筑
脰石雲諸如東委業於其門
者相踵焉法年著醫子折衷
日梓行於世也今茲將刻古方
原理余文而卒業必不謂其少
其之二道深賞理達慎然如脉之
掌焉考覈緝摭之勤其功

廣哉吾侯夙崇儒術膏及末技
 頃者中有此舉乃善其志而加
 賞焉蓋特命也此士之行也
 欽使吾蕩之子才輩進於技
 吾於業古法之傑出於其間也
 是乃其候之所以勸誘末技之
 旨而無望其志亦在於此焉遂

上本使承序之年不久何云然
 余之於此聖氏也在同局數年
 非無游一羽之好豈不可固辭
 也因局鄙俚敘事由云爾
 享和二年壬戌孟春

長門侍醫神石深造拜識



古方條理目錄

卷之上

熱

桂枝湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

小柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加芒消湯

大柴胡湯

白虎加人參湯

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

古方條理

目錄

二大萃堂

古方條理

目錄

二大萃堂

大陷胸湯

梔子豉湯

梔子乾薑湯

梔子檳皮湯

抵當丸

猪苓湯

五苓散

理中丸

四逆湯

通脈四逆湯

麻黃附子細辛湯

真武湯

白頭翁湯

惡風寒

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥加附子湯

附子瀉心湯

芍藥甘草附子湯

附子湯

甘草附子湯

四逆湯

四逆加人參湯

葛根湯

麻黃湯

大青龍湯

小柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

大柴胡湯

白虎加人參湯

汗

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

附子瀉心湯

甘艸附子湯

四逆湯

通脉四逆湯

通脉四逆加猪膽汁湯

葛根黃連黃芩湯

麻黃杏仁甘艸石膏湯

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

大柴胡湯

大陷胸湯

十棗湯

梔子豉湯

茵陳蒿湯

五苓散

茯苓甘艸湯

水

小承氣湯

大承氣湯

項背強

葛根湯

桂枝加葛根湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

葛根湯

小柴胡湯

大陷胸丸

苦酒湯

頭痛頭眩目暈

桂枝湯

桂枝湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

茯苓桂枝白朮甘艸湯

大承氣湯

真武湯

四逆湯

理中丸

五苓散

麻黃湯

吳茱萸湯

十棗湯

喘咳

桂枝加厚朴杏仁湯 葛根黃連黃芩湯

麻黃杏仁甘艸石膏湯

麻黃湯

小青龍湯

猪苓湯

大承氣湯

咽痛

甘艸湯

桔梗湯

半夏散及湯

苦酒湯

疼痛

桂枝湯

柴胡加桂枝湯

桂枝附子湯

甘艸附子湯

附子湯

真武湯

四逆湯

理中丸

五苓散

麻黃湯

大青龍湯

胸脇滿痛痞

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

麻黃湯

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡加芒消湯

調胃承氣湯

大陷胸湯

梔子豉湯

瓜蒂散

心腸下痞鞭滿痛

桂枝去桂加茯苓白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

小柴胡湯

柴胡加桂枝湯

大柴胡湯

旋復代赭石湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

五苓散

桂枝人參湯

十棗湯

小陷胸湯

大陷胸湯

大承氣湯

腹滿痛鞭

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

小建中湯

小柴胡湯

黃連湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

梔子厚朴湯

茵陳蒿湯

抵當湯

抵當丸

桃花湯

真武湯

四逆湯

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

大陷胸湯

心下腹中少腹急

小建中湯

小柴胡湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

四逆湯

不能食

小柴胡湯

梔子豉湯

瓜蒂散

小承氣湯

大承氣湯

心中懊憹

梔子豉湯

梔子甘艸豉湯

梔子生薑豉湯

大陷胸湯

大承氣湯

卷之下

上衝悸

桂枝湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝白朮甘艸湯

世補錄
目錄
在苑華堂

瓜蒂散
小建中湯

桂枝甘艸湯
茯苓甘艸湯

茯苓桂枝甘艸大棗湯

真武湯

少氣短氣

梔子甘艸豉湯
竹葉石膏湯

十棗湯
大陷胸湯

大承氣湯
甘艸附子湯

不得眠起卧不安

猪苓湯
水

乾薑附子湯
梔子豉湯

梔子甘艸豉湯
梔子生薑豉湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

梔子厚朴湯
大承氣湯

驚狂

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯
桃花湯

抵當湯

身重

大青龍湯
柴胡加龍骨牡蠣湯

古今錄理
目錄
在苑華堂

大承氣湯

真武湯

小便自利不利

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝加附子湯

桂枝附子去桂枝加白朮湯

甘草附子湯

真武湯

四逆湯

桃花湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

水

五苓散

猪苓湯

小承氣湯

大承氣湯

茵陳蒿湯

抵當湯

抵當丸

黃

麻黃連軹赤小豆湯

梔子蘘皮湯

茵陳湯

抵當湯

血

桂枝湯

麻黃湯

桃核承氣湯

桃花湯

煩

桂枝湯

小建中湯

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

大柴胡湯

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

大陷胸湯

瓜蒂散

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴湯

麻黃湯

大青龍湯

猪苓湯

水

五苓散

瀉文蛤散

小陷胸湯

白散

白虎加人參湯

甘草瀉心湯

甘草乾薑湯

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

白通加猪膽汁湯

吳茱萸湯

烏梅圓

渴

小青龍湯

小柴胡湯

柴胡桂枝乾薑湯

水

五苓散

文蛤散

小陷胸湯

白散

猪苓湯

白虎加人參湯

大陷胸湯

茵陳蒿湯

白頭翁湯

咽口舌乾燥胎

小柴胡湯

梔子豉湯

大陷胸湯

大承氣湯

白虎加人參湯

五苓散

甘州乾薑湯

讖語

柴胡加龍骨牡蠣湯

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

不大便難鞭燥屎

桂枝湯

桂枝附子去桂枝加白朮湯

水

蜜煎

土瓜根

大猪膽汁

麻仁丸

小承氣湯

大承氣湯

大陷胸湯

小柴胡湯

抵當湯

噫

生薑瀉心湯

旋覆代赭石湯

嘔吐

桂枝湯

小柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加芒消湯

大柴胡湯

調胃承氣湯

十棗湯

葛根加半夏湯

小青龍湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

乾薑黃連黃芩人參湯

甘艸瀉心湯

五苓散

猪苓湯

梔子生薑豉湯

甘艸乾薑湯

四逆湯

白通加猪膽汁湯

吳茱萸湯

烏梅圓

竹葉石膏湯

下利

葛根湯

葛根黃連黃芩湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

生薑瀉心湯

甘艸瀉心湯

小柴胡湯

柴胡加芒消湯

古今圖書集成
醫部全錄
目錄
三才華堂

大柴胡湯

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

十棗湯

桂枝人參湯

白頭翁湯

猪苓湯

赤石脂禹餘糧湯

桃花湯

真武湯

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

吳茱萸湯

厥冷

蘇干土薑湯

古小柴胡湯

白虎湯

茯苓甘草湯

附子湯

甘草乾薑湯

四逆湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

白通加猪膽汁湯

吳茱萸湯

烏梅圓

瓜蒂散

四肢拘急

桂枝加附子湯

四逆湯

通脈四逆湯

芍藥甘草湯

古今圖書集成
醫部全錄
目錄
三才華堂

古方條理目錄終

白果

蘇合甘

白果

古方條理卷之上

蘇合甘 長門 熊慳愷玄碩 著

肥前之內藤有道正齋

門人出雲日渡邊文教子敬 同校

市原謙 公光

桂枝湯

熱

汗自出 齋齋惡寒 淅淅惡風 翕翕發熱 鼻鳴 乾嘔者

桂枝湯主之

頭痛發熱 汗出惡風者 桂枝湯主之

臟無他病時發熱自汗出而不愈者先其時發汗則愈宜桂枝湯主之

不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

發熱汗出者宜桂枝湯

煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂

枝湯

古方條理
桂枝湯所之

頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻

黃湯主之

脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄

衄乃解麻黃湯主之

麻黃湯所之

脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之

大青龍湯所之

表不解心下水氣乾嘔發熱而咳者小青龍湯主

之

心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

小青龍湯所之

麻黃湯以下三方條理同

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者與

小柴胡湯主之

往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛必下小柴胡湯主之

四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小

柴胡湯主之

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外

七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如癰狀發作有時小柴胡湯主之

五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出解

發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之

脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯主之

嘔而發熱者小柴胡湯主之
小柴胡湯所之

六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯所之
五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴

而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也

柴胡桂枝乾薑湯主之
柴胡桂枝乾薑湯所之

以上十一條條理同
胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證

下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴

胡加芒消湯主之
柴胡加芒消湯所之

十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

大柴胡湯所之

以上二方條理同

若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

白虎加人參湯所之

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

讞語者以有熱也調胃承氣湯主之

三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

調胃承氣湯所之

潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣

者慎不可攻也

譫語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之

小承氣湯所之

調胃承氣湯以下二方條理同

脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有

潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者

此大便已鞕也大承氣湯主之

潮熱大便微鞕者可與大承氣湯

若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡

所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不

識人循衣摸牀惕而不安微喘直視譫語者大承

氣湯主之

譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也

若能食者但鞕爾宜大承氣湯主之

發潮熱手足熱熱汗出大便難而譫語者下之則愈

宜大承氣湯

煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱脉實者宜下

之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者

有燥屎也宜大承氣湯

六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者為實也急下之宜大承氣湯

大承氣湯所之

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者

大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也

梔子豉湯主之

下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹饑不能食

但頭汗出者梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾姜湯主

之

梔子乾薑湯所之

梔子豉湯以下四條條理同

身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

梔子蘗皮湯所之

有熱少腹滿應小便利今反利者為有血也當下

世補錄
古今醫理
卷之卅
也

之不可餘藥宜抵當丸

抵當丸所之

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翁翁發熱無汗心下
滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主
之

桂枝去桂加茯苓白朮湯所之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反
惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譏語若加燒鍼
必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動
膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲

水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脉浮發熱
渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

猪苓湯所之

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少
少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱
消渴者與五苓散主之
發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則
吐者名曰水逆五苓散主之

五苓散所之

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之

古今醫理
卷之卅

世醫心法 卷之五 霍亂吐瀉 八二 華堂

桂枝去桂加茯苓白朮湯以下三方條理同

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之

寒多不用水者理中丸主之

理中丸所之

發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛當枚其裏宜四

逆湯

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒

者四逆湯主之

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯

主之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯

主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱

脈微欲絕者四逆湯主之

四逆湯所之

下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡

寒者通脈四逆湯主之

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之

通脈四逆湯所之

理中丸以下三方條理同

發熱脉沉者麻黄附子細辛湯主之

麻黄附子細辛湯所之

發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶動振

振欲擗地者真武湯主之

真武湯所之

熱利下重者白頭翁湯主之

白頭翁湯所之

惡風寒

汗自出嗇嗇惡風淅淅惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝湯主之

頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞

當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯

脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

桂枝湯所之

項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

桂枝加葛根湯所之

以上五條條理同

發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈

伸者桂枝加附子湯主之

桂枝加附子湯所之

下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒

者去芍藥方中加附子湯主之

桂枝去芍藥加附子湯所之

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

附子瀉心湯所之

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘艸附子湯主

之

芍藥甘艸附子湯所之

一二日口中和其背惡寒者附子湯主之

附子湯所之

骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小

便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘艸附子湯

主之

甘艸附子湯所之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒

者四逆湯主之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

四逆湯所之

惡寒脉微而復利四逆加人參湯主之

四逆加人參湯所之

以上八方條理同

項背強几几無汗惡風葛根湯主之

葛根湯所之

頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻

黃湯主之

麻黃湯所之

脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之

大青龍湯所之

以上三方條理同

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者與小柴胡湯主之

往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛必下小柴胡湯主之

四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之

五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脉細者此為陽微結可與小柴胡湯設不了者得屎而解
脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯

小柴胡湯所之

六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯所之

五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡桂枝乾薑湯所之

以上八條條理同

十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

大柴胡湯所之

若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之

白虎加人參湯所之

汗

汗自出者惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝湯主之

頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯

藏無他病時發熱自汗出而不愈者先其時發汗則

愈宜桂枝湯主之

發熱汗出者宜桂枝湯

脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

桂枝湯所之

項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

桂枝加葛根湯所之

以上七條條理同之

發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

桂枝加附子湯所之

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

附子瀉心湯所之

骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘艸附子湯

主之

甘艸附子湯所之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱

脉微欲絕者四逆湯主之

四逆湯所之

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之
通脉四逆湯所之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通
脉四逆加猪膽汁湯主之

通脉四逆加猪膽汁湯所之

以上六方條理同

桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而
汗出者葛根黃連黃芩湯主之

葛根黃連黃芩湯所之

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與
麻黃杏仁甘艸石膏湯主之

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與

麻黃杏子甘艸石膏湯

麻黃杏子甘艸石膏湯所之

五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大
便鞭脉細者此為陽微結可與小柴胡湯設不了
了者得屎而解

小柴胡湯所之

五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴
而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也
柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡桂枝乾薑湯所之

小柴胡湯以下二條條理同

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

大柴胡湯所之

十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

下利嘔逆表解者乃可攻之其人鞅鞅汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不

惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯所之

下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之

茵陳蒿湯所之

汗出而渴者五苓散主之

五苓散所之

汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘艸湯主之

茯苓甘艸湯所之

五苓散以下二方條理同

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少

少與飲之令胃氣和則愈

水所之

多汗以津液外出胃中燥大便必鞮鞮則讖語小承

氣湯主之

小承氣湯所之

以上二條條理同

脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有

潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者

此大便已鞮也大承氣湯主之

汗出讖語者以有燥屎在胃中下之則愈宜大承氣

湯

發潮熱手足濇濇汗出大便難而讖語者下之則愈

宜大承氣湯

大承氣湯所之

項背強

項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

桂枝加葛根湯所之

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

桂枝去桂加茯苓白朮湯所之

項背強几几無汗惡風葛根湯主之

四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者小

柴胡湯主之

小柴胡湯所之

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷胸丸

大陷胸丸所之

頭痛頭眩目暝

頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

不大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必

宜桂枝湯

桂枝湯所之

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

桂枝去桂加茯苓白朮湯所之

若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

茯苓桂枝白朮甘草湯所之

發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶動振

振欲擗地者真武湯主之

真武湯所之

茯苓桂枝白朮甘草湯以下二方條理同

發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

四逆湯所之

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

理中丸所之

以上二方條理同

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之

五苓散所之
頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃湯主之
脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄

衄乃解麻黃湯主之
麻黃湯所之

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之
吳茱萸湯所之

下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之
十棗湯所之

喘咳

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之
桂枝加厚朴杏仁湯所之

桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而

汗出者葛根黃連黃芩湯主之

葛根黃連黃芩湯所之

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘艸石膏湯主之

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘艸石膏湯

麻黃杏仁甘艸石膏湯所之

頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

麻黃湯所之

表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳者小青龍湯主之

心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也小青龍湯主之

小青龍湯所之

麻黃湯以下二方條理同

下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之猪苓湯所之

脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有
潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者
此大便已鞫也大承氣湯主之

若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡
所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不
識人循衣摸牀惕而不安微喘直視譫語者大承
氣湯主之

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者
有燥屎也宜大承氣湯

大承氣湯所之

咽痛

二三日咽痛者可與甘艸湯不差者與桔梗湯

甘艸湯桔梗湯所之

二方條理同

咽中痛半夏散及湯主之

半夏散及湯所之

咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

苦酒湯所之

疼痛

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後
身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救
表宜桂枝湯

下利腹張滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏
四逆湯攻表桂枝湯

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯
小和之

桂枝湯所之

六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證

未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯所之良醫家當辨其裏宜四
以上二方條理同

身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂
枝附子湯主之

桂枝附子湯所之

骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小
便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘艸附子湯
主之

甘艸附子湯所之

身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子湯主之

附子湯所之

二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣真武湯主之

真武湯所之

以上四方條理同

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯發熱頭痛脉反沉若不差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏

四逆湯

四逆湯所之

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

理中丸所之

以上二方條理同

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之

五苓散所之
頭痛發熱身疼腰痠骨節疼痛惡風無汗而喘者麻
黃湯主之

脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此
當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄
衄乃解麻黃湯主之

麻黃湯所之
脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍
湯主之

大青龍湯所之意四逆發又不除風逆而惡寒
主以上二方條理同

胸脇滿痛痞
下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之

桂枝去芍藥湯所之
下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒

者去芍藥方中加附子湯主之
桂枝去芍藥加附子湯所之

以上二條條理同
喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

麻黃湯所之不宜和黃湯五六
十日以去脉淨細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛
者與小柴胡湯

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者與
小柴胡湯主之

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證
下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其
治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外

發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯
主之土二寸針豕同

小柴胡湯所之少中胸熱胸內澀以平因
五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴
而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也
柴胡桂枝乾薑湯主之

柴胡桂枝乾薑湯所之下香與胸胃不康
八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不
可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯所之
小柴胡湯以下六條條理同

胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證

下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其
治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴
胡加芒消湯主之

柴胡加芒消湯所之

十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溇腹微滿
鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯

調胃承氣湯所之

脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未
解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客
氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞞

則為結胸大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也

梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

如桂枝證頭不痛項不强脉微浮胸中痞鞞氣上衝
咽喉不得息者當吐之宜瓜蒂散

手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不
能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

瓜蒂散所之

心脇下痞鞭滿痛

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

桂枝去桂加茯苓白朮湯所之

若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

茯苓桂枝白朮甘草湯所之

以上二方條理同

四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之

五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此為陽微結可與小柴胡湯設不了了者得尿而解

脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沉緊

古今醫理 卷之十一 九氣 九氣 九氣

者與小柴胡湯

小柴胡湯所之

六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯所之

小柴胡湯以下五條條理同

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之

大柴胡湯所之

發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復代

赭石湯主之

旋復代赭石湯所之

五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

半夏瀉心湯所之

汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之

古今醫理 卷之十一 九氣 九氣 九氣

生薑瀉心湯所之

醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心
下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病
不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客
氣上逆故使鞭也甘艸瀉心湯主之

甘艸瀉心湯所之

半夏瀉心湯以下三條條理同

心下痞按之濡其脉浮者大黃黃連瀉心湯主之

大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞
當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜

大黃黃連瀉心湯

大黃黃連瀉心湯所之

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

附子瀉心湯所之

大黃黃連瀉心湯以下三條條理同

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口

燥煩小便不利者五苓散主之

五苓散所之

外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞
鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

桂枝人參湯所之

下利嘔逆表解者乃可攻之其人粳粳汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

十棗湯所之

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

小陷胸湯所之

脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客

氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則爲結胸大陷胸湯主之

六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭者大陷胸湯主之

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者

此為結胸也大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大

承氣湯

大承氣湯所之

腹滿痛鞭

醫反下之因爾腹滿時痛者桂枝加芍藥湯主之

桂枝加芍藥湯所之

大實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加大黃湯所之

腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯

小建中湯小柴胡湯所之

往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛

必下小柴胡湯主之

小柴胡湯所之

以上四方條理同

腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

黃連湯所之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘艸半夏人參湯主之

厚朴生姜甘艸半夏人參湯所之
下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之

梔子厚朴湯所之

七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

茵陳蒿湯所之

六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈
抵當湯主之
身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自

利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

抵當湯所之

有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

抵當丸所之

抵當湯以下三條條理

二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

桃花湯所之

二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼

痛自下利者此為有水氣真武湯主之

真武湯所之

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏

四逆湯

四逆湯所之

十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿

鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯

吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

調胃承氣湯所之

脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有

潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者

此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡

寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大

滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不與之若

不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣

湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不

轉失氣者此但初頭鞕後必澹不可攻之攻之必

脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者

必大便復鞕而少也以小承氣湯和之不轉失氣

者慎不可攻也

小承氣湯所之

調胃承氣湯以下二方條理同

脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞅也大承氣湯主之

不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大便也宜大承氣湯

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也宜大承氣湯

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯

大承氣湯所之

重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞅滿而痛不可近者大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

心下腹中少腹急

腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之

小建中湯小柴胡湯所之

二方條理同

十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡下之則愈

大柴胡湯所之

熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻

之宜桃核承氣湯

桃核承氣湯所之

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

四逆湯所之

不能食

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者與小柴胡湯主之

往來寒熱休作有時默默不欲飲食臟腑相連其痛

必下小柴胡湯主之

五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞅脉細者此爲陽微結可與小柴胡湯設不了者得屎而解

脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者與小柴胡湯

小柴胡湯所之

下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散

瓜蒂散所之

潮熱大便微鞅者可與大承氣湯不鞅者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞅後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞅而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

小承氣湯所之

譏語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾宜大承氣湯主之

大承氣湯所之

心中懊懣

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譏語若加燒鍼

必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

下之其外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

梔子豉湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘艸豉湯主之

梔子甘艸豉湯所之

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中

世所傳
卷之七
懽懽梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之

梔子生薑豉湯所之

以上五條條理同

脉浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懽懽陽氣內陷心下因鞮則為結胸大陷胸湯主之

大陷胸湯所之

下之心中懽懽而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞮後必澹不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯大承氣湯所之

古方條理

卷之上

四

大承氣湯

古方條理卷之上

終

大承氣湯



子

