

赤水玄珠

八

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 漢書門 | 類 | 號 | 函 | 架 | 冊 |
| 三 | 二 | 二 | 四 | 四 | 四 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 漢書 | 類 | 號 | 冊 | 架 |
| 三 | 二 | 二 | 四 | 四 |

| | |
|------|----------|
| 內閣文庫 | |
| 番號 | 漢 12463 |
| 冊數 | 44 (9) |
| 函號 | 301 90 |



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak






大學東
校典藉
局之印



赤水玄珠第八卷目錄



赤水玄珠第八卷目錄

客之則為肺欬所謂肺先受邪也五臟各以其時受病

王注云時謂年月也非其時各傳以與之人與天地相參

故五藏各以治時感於寒則受病微則為欬甚

則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受

之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬

則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺欬之狀

欬而喘息有音甚則吐血取太淵心欬之狀則

心痛喉中兀兀如梗狀甚則咽腫喉痺取太陵

肝欬之狀則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胛下滿取太衝脾欬之狀則右脇下痛陰

陰引肩背甚則不可以動動則欬劇取太白腎

欬之狀則腰背相引而痛甚則欬涎取太溪

帝曰六腑之欬奈何安所受病岐伯曰五臟之

欬乃移於府脾欬不已則胃受之胃欬之狀

欬而嘔嘔甚則長虫出取三里肝欬不已則膽

受之膽欬之狀欬嘔胆汁取陽陵肺欬不已則

大腸受之大腸欬狀欬而遺失取巨馬心欬不

已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱

失_取下_取腎_取效_取不已_取則膀胱受_取之膀胱效_取狀效_取
 而遺_取溺_取久_取效_取不已_取則三焦受_取之三焦效_取
 狀效_取而腹滿不_取欲_取食_取飲_取此皆聚_取於_取胃_取關_取於_取肺_取使_取
 入_取多_取涕_取唾_取而面浮腫氣逆_取也_取帝曰治_取之柰_取
 何岐伯曰治_取臟者治_取其俞_取治_取府者治_取其合_取浮腫_取
 者治_取其經_取論_取效_取
 按素問曰咳嗽煩冤者是腎氣之逆也容_取篇_取一陽
 發病少氣善_取欬_取善_取泄_取夏_取脉_取不_取及_取則令_取人_取上_取見_取
 咳唾下_取為_取氣_取泄_取

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足_取乍有_取涼_取時_取其_取脉_取
 洪者熱痰在_取胃_取膈_取也宜_取小_取陷_取胃_取湯_取礞_取石_取丸_取之類
 清膈降痰甚而不_取已_取者宜_取吐_取下_取其_取痰_取熱_取也面_取白_取
 悲_取噫_取或_取脇_取急_取脹_取痛_取或_取脉_取沉_取絃_取細_取遲_取而_取咳_取者_取寒_取飲_取
 在_取胃_取腹_取也宜_取辛_取熱_取去_取之

脉治

脉經曰關上脉微為_取欬_取
 欬而脉弦瀯為_取少_取血_取
 脉細傷_取濕_取
 脉緊者肺寒雙_取弦_取者_取寒_取
 浮緊者虛寒
 脉浮而緩傷_取風_取

數則為熱沉數者裏熱 脉弦為水偏弦為飲

洪滑多痰 脉沉為留飲

肺脉微急為欬而唾血 欬脉浮直者生者浮欬

欬證死脉

欬而脉緊者

欬而羸瘦脉形堅大者 小於中則死而大於外則生

肌瘦下脱形熱不丟 欬而脱形發熱脉小堅急者

咳而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其

脉虚者必苦胃其人本有支飲在胃中故也治

属飲家 上氣面浮腫有息其脉浮大不治又

加利尤甚 脉浮短者其人肺傷諸氣微必不

過一年死法當嗽也 欬嗽羸瘦脉形堅大者

死 欬而脱形身熱脉小堅急以疾是逆也不

過十五日死全文見診 論欬與嗽本一證

子和云内經陰陽應象論云秋傷於湿冬生欬嗽

論欬與嗽本一證

論欬與嗽本一證

論欬與嗽本一證

論欬與嗽本一證

論欬與嗽本一證

五臟生成篇云欬嗽上氣診要經終篇云春刺
秋分環為欬嗽示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣
之逆也此四篇中連言咳嗽其餘篇中止言欬
而不言嗽如生氣通天論云秋傷於濕上逆而
咳與大象論文義同而無嗽字乃知咳即嗽矣
謹按欬與嗽本兩字義內經已作一證連言之愚
詳大抵欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也况
是證其本雖殊其標則一故世俗不以為疑唯
紫古發內經微旨其義見下

病機機要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也
嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有
聲有痰也因傷肺氣動於脾濕而然也夏月嗽
而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩加石膏下兩
知母半兩冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍
加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜
胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨
證加減之痰而能食者大承氣微下之痰而不
能食者厚朴湯主之

赤水遺珠

論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺嗽後人見是斷嗽然可以辯其六者之狀風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒孔子亦每多有之
火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱
淫來皮膚乾燥細瘡燥痒大便秘澀涕唾粘稠

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月卧湿地或冒冷風寒秋冬水冷中感之嗽急而喘此非六氣本之云乎

論濕痰主嗽

潔古曰嗽者秋傷于濕積於脾經曰秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而為欬嗽甚則動于濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不為痰也有痰者寒少熱多各隨五臟而治之假令濕在肝經謂之風痰

也濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕
在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證
而治之欬而無痰者以辛甘潤其肺欬而嗽者
治痰為先故以南星半夏勝其痰而嗽自愈枳
殼陳皮利其氣而痰自下
劉宗厚曰按此論欬因濕在於經致痰為欬五臟
亦皆有之可謂發內經之秘矣然至氣鬱津液
不降或停水飲所致或腎氣虛弱火炎水涸津
液湧而為痰涎於上此氣飲及真臟為病非諸

經留濕致病也故易老云半夏止能洩痰之標
而不能治痰之本是矣

丹溪曰咳嗽有風寒有火有痰有勞有肺脹風寒
者鼻塞聲重惡寒是也宜發散行痰又有聲啞
及喘嗽遇冬則發皆為寒包熱也解表則熱自
除感冷則嗽膈上有痰也宜解表豁痰火者有
聲痰少面赤是也勞者盜汗出蕪痰多吐紅作
寒熱是也宜補陰清金痰者嗽動便有痰出痰
出嗽止是也主豁痰肺脹者動則喘滿氣急聲

赤水卷末

重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿
肺脹抑遏不得眠者難治
飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者
冷嗽也熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五
味子
又有先因傷濕傷寒解利不盡病雖退然飲食減
少不生肌肉身倦無力稍勞則躄熱痠痛狀如
勞症但不吐血不發潮熱經二三年此是餘毒
伏在經絡其脈弦再發則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃關於肺令人
多涕唾而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而
不下治以異功白朮散
治嗽最要分肺虛實新嗽揆虛者可用人參風寒
邪盛及久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然
凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也
涎稠黃者為熱青白者為寒
凡嗽春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋
是濕熱傷肺冬是風寒外束也

丹溪曰上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降
胃火午後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒
栢先降其火黃昏嗽多此火氣浮於肺不宜用
涼藥宜五味子五倍子斂而降之
治嗽藥大藥多用生薑以其辛散也
粉青黛瓜蒌貝母不除有痰者加痰藥用
藥發散之後必以半夏逐其痰庶不再來
嗽多用粟壳不必疑但要先去病根此收後也
夫咳之為病有一咳則出痰者脾勝濕而痰滑也

有連欬十數聲不出痰者肺燥勝痰濕也滑者
宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑
所當忌也澁者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺
若燥肺之劑所當忌也
咳嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母飲
水者不用瓜蒌恐滯膈不快
乾咳嗽
乾咳嗽者無痰出而欬連聲者是也此本於氣
澁澁之微者欬十數聲方有痰出澁之甚者雖

咳十數聲亦無痰出

丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之症痰鬱火邪

在中以苦桔梗開之下用補陰藥不已即成勞

倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物

湯加竹瀝炒栢之類

陰虛咳嗽四物湯加竹瀝姜汁去之陰分嗽者

多屬陰虛治用知母勿用生薑以其辛散故也

肺虛嗽此好色腎虛者有之人參膏以陳皮

生薑佐之

治咳嗽疎表之劑

仲景厚朴麻黃湯 欬而脉浮者

厚朴_{五兩} 麻黃_{四兩} 石膏_{二兩} 杏仁_{半升} 半夏

升乾姜_{二兩} 細辛_{二兩} 小麥_升 五味子_升

右以水一斗三升先煮小麥熟去渣納諸藥

煮取三升溫服一升一日三服

三拗湯 治欬嗽感胃風寒鼻塞聲重_{方在傷}

敗毒散 治痰嗽身熱鼻塞_{方在瘟}

華蓋散 治感寒而嗽胃滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑白皮 麻黃 各一

炙甘草 錢五 每服八錢入姜水煎服

橘蘇散 治傷風咳嗽身熱有汗

陳皮 蘇葉 杏仁 五味子 半夏 桑白

皮炒 貝母 白朮 各錢 甘草 分六

姜三片水煎

神朮散 治四時瘟疫發熱惡寒及傷寒咳嗽

蒼朮 白芷 細辛 羌活 川芎 炙甘

草 各一 每服五錢姜三片葱白三寸水煎服

若傷風鼻塞可為末以葱茶調下

金佛草散 治感寒咳嗽發熱惡寒無汗

荆芥 麻黃 前胡 炙甘草 赤芍

藥 半夏 旋覆花 分二服每姜三片

白朮水煎服

橘皮湯 治冷嗽

陳皮 紫苑 麻黃 當歸 杏仁 炙甘草

黃芩 各二 分二服水煎服

白朮治暑嗽之劑

赤水 治欬而脉細

白木湯 白茯苓 半夏 各等分 每服一兩水

一鍾半 姜三片煎 調神麩末二錢 一方加

蘇文 黃芩

白木木香散 喘嗽腫滿欲變水氣者

白木 猪苓 甘草 澤瀉 木香 栝柳 各

兩 陳皮 兩 桂枝 錢 滑石

右為末 每服五錢 入姜煎

機要欬氣丸 咳反痰喘肺氣浮腫

陳皮 青皮 栝柳 木香 杏仁 郁李仁

茯苓 澤瀉 當歸 馬兜鈴 苦葶藶 各三

錢 防已 各五 牽牛 兩半 右為末 姜汁

糊丸 梧子大 每服三十九 至六十九 白湯下

大橘皮湯 木感濕面腫上喘

滑石 錢 炙甘草 木香 栝柳 錢 各半 陳皮 錢

右分三帖 水煎服

治燥嗽之劑 治燥嗽不已 皮膚乾燥 唾中有

千金五味子湯

十五 胃脇疼痛 五味子 小桔梗 紫苑 甘草

續斷 錢各二 竹茹 錢三 赤小豆 撮 生地 桑白皮 五各

錢作二帖 水煎服

冲和神功丸 大黃 煨訶子 麻子仁 人參

右為末 入麻仁 研勻 加煉蜜 為丸 梧子 大每

五十丸 溫水下

按丹溪曰 訶子 治肺氣因火傷極 遂鬱遏 脹滿

取其味酸 苦有收斂 降火之功 若佐以海粉香

附瓜 萎青 黛 半夏 曲 治嗽 非止澁之藥也

楊文治 痰嗽 利膈方

木瓜 萎去子 洗淨 槌破 刮皮 細切 焙乾 半夏 四

香 十丸 顆湯 洗十遍 槌碎 焙乾 為末 以洗瓜 萎實

熱水 并穰 同熬 成膏 為丸 梧子 大 生薑湯 下二

丸 十九

衍義云 有婦人 患肺熱 久嗽 身如炙 肌瘦 將成肺

疝 癆 以枇杷 葉木 通款冬 花 紫苑 杏仁 桑皮 各等

分 大黃 減半 各如常 製蜜丸 櫻桃 大 食後 夜卧

卅 含化 一丸 未終劑 而愈

丹溪潤肺散 貝母一兩 瓜蒌五錢 青黛五錢

為末 姜汁蜜調成膏 噙化 下大分

抑痰丸 瓜蒌仁一兩 半夏麩 三錢 貝母三錢

為末 炊餅丸 麻子大 良

海蛤丸 咳逆上氣 痰飲心痛

海蛤燒為粉 瓜蒌仁帶穰 和勻為丸 麻子大白 湯下

杏仁煎 喘嗽寒熱 噴多喜少 面色不潤 食少脉

弦緊 杏仁去皮尖 用童便浸一日 一換夏月

蘇白三換 浸半月 取出洗淨 焙乾 研令極細 每

同服一匙 大用薄荷一葉 白蜜少許 水一盞煎

食後服 甚不過二劑 永瘥

丹溪肺鬱痰嗽 睡不安者清化丸 貝母 杏仁

右為末 砂糖入姜汁 蒸餅丸 噙化

潤下丸 治氣實有痰 又治積氣并大腸經氣滯

痰嗽 陳皮去白 甘草兩 食鹽五錢 右以水拌

焙乾為末 蒸餅丸 如梧子大 或為末 白湯點

服立効

治肺燥痰多 煉蜜一斤 北五味兩 右用五味

入蜜內浸十日，后臨卧挑一匙於口內，徐徐嚥下，潤肺消痰。

玉液散治久近喘嗽，口渴，

天花粉、知母、貝母、各一兩、人參、甘草、各五錢

不右為末，每服二錢，先熔下黃蠟二錢，同入米

飲中調下。

丹溪云：火嗽宜清金化痰丸，清化丸與清金丸

同用，專治熱嗽及咽痛，蓋苦能燥，濕熱輕能治。

上取燈籠草葉為細末，餵餅為丸，每服五十丸。

清金丸一名與點丸，去肺火降膈上熱痰，與

清化丸同用。黃芩一味炒為末，水丸服。

痰因火動，逆上作嗽者，先治火，次治痰，用知母止

嗽，清肺金，滋陰火。火鬱嗽用訶子、海石、瓜蒌

仁、青黛、半夏、曲、香附以開之。喘嗽不拘老幼

久近，上壅善嗽等疾，槐花為末，滴水丸，如梧子

大白湯或姜湯吞。

梔子仁湯 發熱咳嗽煩躁面赤咽痛

梳子仁 赤芍 大青 知母 各一升 麻

黄芩 石膏 杏仁 各二 柴胡 二 钱 甘草 二 钱

豉百粒 水煎服 未煎水 咳 肺

麥門冬湯 火熱乘肺 欬 唾 有血 方 聖 不 咳 肺

仲景加減小柴胡湯 欬 而 寒 熱 往 來 月 嗽 發 寒

熱 以 此 三 兩 入 石 各 柴 胡 八 半 夏 黃 芩

甘草 乾姜 五味子 水煎服

地骨皮散 知母 柴胡 甘草 人參 地骨

皮 茯苓 半夏 姜三片 水煎服

王御齋治咳嗽活套

杏仁 祛皮 橘紅 各五分 五味子 桔梗 炙甘草

各五分 白木 杏仁 各五分 柴胡 各五分 黃芩 各五分

春多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥 各一

半夏 麥門冬 黃芩 知母 各五 若傷風致咳鼻

流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇黃芩

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母

黃芩 麥冬 石膏 各一

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮 各一

防風黃芩山梔子炒

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生

乾姜防風錢各一肺經素有熱再加酒炒黃芩知

母分各五若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎

前胡柴胡錢各一

若有痰加半夏枳殼風痰加南星濕痰脾困少

食加白朮蒼朮口燥咽乾勿用半夏南星

宜加知母蠶水貝母黃芩瓜蒌仁

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石

青黛半夏曲軟石膏山查子枳實黃連姜汁為

采蜜調噲化

因欬而有痰者咳為重主治在肺因痰而致欬者

痰為重主治在脾設是食積痰或痰氣上升以

致咳嗽只治其痰消其積而咳自止不必用肺

藥以治咳也

熱嗽咽喉乾痛鼻出熱氣其痰嗽而難出色黃且

濃或帶血縷或出血腥臭或堅如蜆肉不似風

寒之嗽痰清而白宜金佛草散仍以辰砂化痰

九或薄荷煎八風丹含化熱嗽於金佛草散
中加五味杏仁茯苓
有熱嗽咽痛失聲服冷藥而聲愈啞者宜以生姜
汁調消風散少少進之或只一味姜汁亦得冷
熱嗽後失音者尤宜嗽而失聲者非獨熱嗽有
之宜審其症用藥佐以橄欖丸含化仍濃煎獨
味枇杷葉熟服
有嗽而吐痰與食俱出者此蓋飲食致肝氣不利
而肺又有客邪肝濁道肺清濁相干宜二

陳湯加木香杏仁細辛枳殼
有飲冷熱酒或飲冷水傷肺致嗽俗謂之湊肺宜
紫苑飲
癆嗽者所嗽之痰或痰或濃或時有血腥異常語
聲不出補肺湯半帖加杏仁貝母款花阿膠百
合各五分煎去渣調鍾乳粉咽痛者更加桔
梗五分熱甚者加秦艽五分嘔者去地黃
加半夏如其數
時行嗽發熱惡寒頭疼鼻塞氣急用參蘇飲加細

赤水卷五

赤白痰

治寒痰嗽劑
東垣曰咳嗽脉弦微面白者寒也難經云肺金太

過則外症面白善噫悲愁不樂欲哭其内症喘
咳上喝逆氣煩心胃滿煩熱夜則涕出多噫鼻
塞不通肺金大實以子助母也心脾肺皆受寒
邪涎出口甘水反侮土寡于畏也腹中大寒病
名曰寒中痰白有泡肺中氣虛而為大寒子助
母也當於肺中瀉腎水非辛熱之藥不退也口

其涎沫者胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒

者多有此反化
半夏温肺湯 治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋

嘈雜常多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲
食此胃氣虛冷所致其脉沉絃細遲 旋覆花

人參 細辛 桂心 甘草 陳皮 桔梗
芍藥 半夏 各五錢 赤茯苓 三錢

右每服六錢姜三片水煎服
丁香半夏丸 心下停飲冷痰頭目眩運睡卧口

病入心脉 卷八 十一

中多涎 栝柳錢三 丁香 半夏各一 細辛

乾姜 人參 各五錢 右為末 生薑汁為丸 梧子

大每服三十丸 日三次 姜湯下

姜桂丸 治寒痰咳嗽 脉沉 面色黧黑 小便急痛

足寒而逆 心多恐怖 天南星 半夏 各一

官桂 粗皮 兩去 右為末 蒸餅為丸 如桐子 大每

服五七十九丸 食後 生薑湯下

治嗽 加減法 如心下痞悶 加枳實五錢 如身

熱甚 加黃連五錢 如體重 加茯苓白朮各一

兩 如氣上逆者 加苦葶藶五錢 如氣促加

人參 桔梗 各五錢 如氣浮腫 加郁李仁杏仁

各五錢 如大便秘 加大黃五錢

治氣嗽之劑

羅太無 人參 欬花散 肺胃虛寒 久嗽不已 咽膈

滿悶 咳嗽 痰涎 嘔逆 惡心 腹脇脹滿 腰背倦疼

或虛勞 冷嗽 及遠年近日 一切嗽病

欬冬花 人參 五味子 紫苑 杏仁 錢八

木香 栝柳 紫蘇葉 桑白皮 各一 半夏 各五

錢右煉蜜為丸如芡實大每服一丸食後細嚼

淡姜湯下

治痰壅氣嗽群藥不成功者

大半夏五十枚橘紅十枚作一帖水二鍾煎至一

鍾不可攪動恐麻人食後連進三帖立效其

名半橘湯

蘇子降氣湯 氣逆咳嗽胃膈痞滿

有入患氣嗽將期或教以橘紅生姜焙乾神曲等

分末為丸如梧子大食後及夜米飲吞三五十

丸舊患膀胱氣因服此并瘳

局方四七湯 治咳而痰涎在咽喉間不下

東垣加減三奇湯 欬逆上氣喘促胃膈不利

桔梗 陳皮 甘草 青皮 人參 紫蘇

桑白皮各五錢半夏七錢杏仁二錢五味子四錢

右每服六七錢入姜煎服

經驗方 治久嗽氣嗽生訶子一枚含之嚙津頻

嚙之瘥 后不知食味煎栝柳湯服之便知

滋陰之劑

瓊玉膏 虛勞喘嗽氣促發熱

金櫃腎氣丸 治腎虛不能攝水津液不降致成

痰飲欬逆潮熱盜汗方見門虛

補肺湯 治勞嗽

桑白皮 熟地黄各二人參 紫苑 黃耆

五味子各 右每服四錢水煎入蜜少許服

治老人虛嗽久不愈者

人參一胡桃肉 杏仁各五五味子五棗五

右作一服水煎食後連三服即愈

黃耆切勞散 治心腎俱勞欬嗽時復三兩聲無

痰夜則發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠

勞黃瘦飲食減少唾中有血系名曰肺痿

白芍藥四黃耆 粉草 人參 半夏 熟地

茯苓 杜五味子 歸身 阿膠各兩 右每

服八錢姜三片棗二枚水煎服一日三兩服

紫苑湯 飲食煎燔邪熱傷肺或呼呼走氣咳嗽

咽痒痰多吐血喘急胸滿脇痛

紫苑 欬花 百合 杏仁 貝母 蒲黃

經霜桑葉 半夏 犀角屑 炙甘草 人參

各七錢 阿膠半錢 分二帖 姜三片 水煎服

天門冬丸 咯血吐血大能潤肺止咳

天門冬西 杏仁 茯苓 阿膠各五錢 右為末煉

蜜丸如彈子大 日夜噙化三五丸 下方有

潤脾膏 治勞証久嗽肺燥肺痿時常服

羊肺具 杏仁 柿霜 真酥 真粉各一兩 白蜜

二 右先將羊肺洗淨次將杏仁膏柿霜等白蜜

水二 解薄打撓五味稀稠得所灌入肺中白水

煮熟如常服之

團參飲子 七情抑鬱飢飽失節咳嗽膿血漸成

肺痿勞瘵 人參 紫苑茸 阿膠 百合

細辛 款花 杏仁 天冬 半夏 經霜桑

葉 五味子各一兩 炙甘草五錢 每服六錢 姜五

片水煎服

地黄煎 治肺損吐血嗽血

生地黄四兩 鹿角膠兩 右為末每服三錢 薑便

一盞煖熱入姜汁少許調下 無鹿角膠阿

膠亦可

古方紫苑散

紫苑

款冬花

各五錢

百部

二錢

右為末烏梅湯點服姜湯亦可○如嗽加五

味子○喘加杏仁○渴加烏梅○氣逆加橘

紅○頭疼加細辛三錢甘草二錢○氣脫者

加御米壳蜜炒粗末水煎服

臟腑效劑

小柴胡湯

治肝臟發咳兩脇下痛甚則不可以

轉轉則兩脇下滿熱方見前

黃芩加半夏生姜湯

治膽府發咳嘔苦水若

黃芩

生薑

炙甘草

芍藥

大棗

各二錢

半夏

右咬咀水煎服

甘桔湯

治心臟發咳而喉中如梗狀甚則咽

腫喉痺方在

芍藥甘草湯治小腸府發咳而失氣方在

芍藥

炙甘草

各四錢水煎服

升麻飲

脾臟發咳而右脇下痛痛引肩背甚

則不可以動

升麻

白芍

甘草

各二錢

葛根 三錢 水煎服

烏梅丸 治胃府發咳，咳而嘔，嘔甚則長虫出。五門

麻黃湯 肺臟發，咳而喘，息有聲，甚則唾血。五門

麻黃 錢三 桂枝 錢二 甘草 錢一 杏仁 枚二十 水煎服

赤石脂禹餘糧湯 大腸府發，咳而遺溺。

赤石脂 禹餘糧 各二兩 碎 水煎服

麻黃附子細辛湯 腎臟發，咳則腰背相引，而

痛甚，則欬涎。麻黃 細辛 各一錢 附子 一錢

水煎服

茯苓甘草湯 膀胱府發，欬而遺溺。

茯苓 錢二 桂枝 半二錢 生姜 片五 炙甘草 一錢

水煎服

異功散 久咳不已，三焦受之，其狀欬而腹滿，不

欲飲食，此皆聚于胃，干於肺，使入多涕唾而面

浮腫，氣逆。人參 茯苓 白朮 甘草

陳皮 各一錢 入姜末，水煎服。已上諸方皆傷寒例

藥也，特存之以備其旨。以三因論之，則自有

一臟一腑之病機，亦不止於寒已也。

食積痰嗽

凡食積痰嗽非青黛瓜蒌仁不除人面青白黄色不常面上如麤水路一黄一白者是也

瓜蒌丸 食痰壅滯喘咳

瓜蒌仁 半夏 山查 神曲 各等分為末

以瓜蒌穰拌為丸竹瀝姜湯送下

又方治食積痰嗽

杏仁 蘿蔔子 各二兩為末粥丸服

食積痰作嗽發熱者 半夏 南星 瓜蒌仁

蘿蔔子 佐為

青黛

石碱 使為

隨証加減丸服

保和丸

治食積痰嗽飽悶

食飽咳嗽

千金方温脾湯

治食飽便咳

甘草

兩四

大棗

枚二十

水五升煮取二升分三

服若咽中痛而聲鳴者加乾姜一兩

醋搶喉嗽

甘膽丸

治吃醋搶喉因成咳嗽不止諸藥無効

用甘草二兩去皮作二寸段中半劈開以猪膽

汁五枚浸三日取出火上炙乾為末煉蜜為丸
每服四十九茶清吞下卧服神效曾有患此諸
藥無功服此良愈

酒熱傷肺咳嗽

丹溪云飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁吞瓜

菱仁杏仁黃連丸

又方治酒嗽

青黛瓜菱仁姜汁蜜丸含化散熱毒也

丹溪白龍丸治酒積有痰

半夏 滑石 茯苓 枯礬

右為末神麩糊為丸

酒病嗽 白礬另研 杏仁升 水一升煎乾攤

新瓦上露一宿砂鍋內炒乾每夜飯後細嚼

杏仁十五枚妙

痰嗽

局方桔梗湯除痰下氣胃脇脹滿痰逆惡心飲

食不進 陳皮去白 半夏製 桔梗炒各 枳實去

麩三兩 右末每服四錢水一鍾生姜五片煎服

右用陳皮枳實氣充形實者宜之寒者加姜
 桂此小夫南星半夏乃燥濕之劑若嗽而痰
 澁者忌服形肥有汗或脉緩身重嗜卧之
 人有咳者脾濕勝也形瘦或夏月無汗或
 脉澁之人咳者肺燥勝也濕者宜蒼白木星
 半之屬燥是也燥者宜杏仁瓜蒌仁之屬潤
 寒熱痰咳而嘔吐面腫蚌粉新瓦上燒紅放地
 上出火毒每半兩加青黛五分入麻油數點以

淡薑汁調服妙妙
 本事方化痰涎治咳嗽
 枯礬二兩白姜蚕炒去系為末研薄荷令爛
 為丸菴荳大每服三十丸薄荷湯下日三服
 青礞石丸消痰消痞經絡中有痰作痛皆治之
 青礞石煨黃芩各五錢半夏二兩風化硝二錢陳皮
 茯苓各七錢白木一兩姜汁打神麴糊為丸
 又方礞石丸治痰嗽礞石南星茯苓各
 瓜錢半夏七錢風化硝二錢黃神麴糊為丸

風化硝丸 治痰嗽 黃芩酒洗 滑石 白

芥子去殼各五錢 貝母各一兩 南星各一兩 風化硝二錢

羅太無人參半夏丸 化痰墜涎止嗽定喘或風

痰茶痰食痰一切痰逆嘔吐厥頭痛或風氣偏

正頭風頭目昏眩耳聾鼻塞咽乾腎膈不利喘

丹溪墜痰丸 治食積痰飲咳嗽痞滿氣逆

枳實 枳殼各一兩 明礬三錢 風化硝三錢

牙皂角二錢 黑丑半斤 右以蘿蔔子汁為

丸每服五十九丸鷄鳴時服初有糞次下痰

治久嗽痰積 半夏二兩 以江子五錢 打碎同煮半夏

透為度去江子不用 杏仁一兩 以烏梅五錢同

煮去烏梅不用只將半夏杏仁焙乾為末煉蜜

為丸棗薑大量虛實服

痰泡方 若或作白泡當于肺中瀉火

滑石 貝母 南星 半夏 風化硝 白芥

子 陳皮 茯苓 皂角 蒼朮加溫 瓜蒌仁加燥

枳實加結 青黛 黃芩加熱

赤丸 未 卷 三

肺脹

仲景曰咳而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之

麻黃_{兩六}石膏_{斤半}麻黃_{兩六}石膏_{斤半}麻黃_{兩六}石膏_{斤半}麻黃_{兩六}石膏_{斤半}

肺脹欬而上氣煩躁而喘脉浮者心下有水小青龍加石膏麻黃芎藭芍藥桂枝細辛

甘草乾姜_{兩各三}五味子_半半夏_{格半}石膏_兩水一斗先煮麻黃去沫內諸藥者取三升壯

人服一升弱者減之日三服仲景之治乃傷寒法也邪從皮毛而入皮毛者肺之合也故肺脹以散邪為重丹溪之治乃陰虛火動火逼肺金及濁痰瘀血凝結於內故治以收斂消痰之劑

丹溪云肺脹而咳者用訶子青黛杏仁訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一

取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石香附瓜蒌仁青黛半夏麩姜蜜丸

香附須用章便浸三日

香附須用章便浸三日

香附須用章便浸三日

香附須用章便浸三日

香附須用章便浸三日

氣鬱痰嗽睡不安宜清化丸貝母杏仁為末砂糖入姜汁餽餅為丸噙化

肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四物

加桃仁訶子青皮竹瀝之類

一法灸之妙左不得眠者灸右足三陰交右不得眠者灸左足立安

張光顯年四十二患肺脹咳嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病降火疎肝以清其痰四

物湯加桃仁訶子青皮竹瀝八帖而安

乾咳嗽

前治燥條杏仁青黛貝母瓜蒌等潤劑皆可用

本事補肺法

生地黄

洗淨

杏仁

二兩

生薑

蜜酪

右搗如泥

入瓦盆中置飯上蒸五七度每五更挑

一中年婦人乾咳寸脉滑動似葶狀餘皆散大不

浮左大于右每五更躁熱有汗但怒氣則甚與

桔梗不開諸藥無効遂以石膏香附為君芩連

青黛瓜蒌仁陳皮黃栢當歸桔梗為臣五味砂

仁川芎紫苑佐之凡二十餘帖而安

咳嗽喉中作聲

咳嗽氣急喉聲如鼾者為虛

一男子五十餘歲病傷寒咳嗽聲如鼾與獨參湯

一服而鼾聲稍止至二三帖嗽亦漸退凡服三

帖始得全愈

喉如水鷄聲者為實

仲景治欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

射干三兩麻黃二兩生薑各四兩細辛二兩紫苑二兩款冬二兩

花各三兩大棗七枚五味子半夏水一斗二

升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升

分溫三服取此虛實二條為治規

一服暴嗽失音

千金治暴熱嗽方杏仁一斤紫蘇子一斤陳皮一斤

柴胡四兩水一斗煮三升分三服

又方治暴嗽

面部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏噉之

貝母散暴發欬嗽多日不愈

貝貝母 桑皮炒 五味子炙 甘草各五錢 知母二錢

半款花二兩 杏仁三錢 每服一兩姜三片水煎服

白鯢殼散 治暴嗽

白鯢殼洗淨研細粥飯下

三拗湯 治寒燥不常暴嗽喘急鼻塞痰壅方見前味

一服散 治暴嗽 生姜片 阿膠二片 烏梅二枚

甘草錢一 紫蘇片十 杏仁七枚 大半夏三枚 嬰粟

殼條三 水煎臨睡服

治久嗽失音 半夏半斤 水煎服

真蘇子二兩 杏仁三枚 訶子一枚 百藥煎二兩

為末熱酒調下錢

治暴失音

用猪脂油一觔入鍋先煉出渣入白蜜一斤再

煉少頃瀘過淨磁器內冷定成膏不時挑一茶

匙匙化大能潤肺出聲

治失音不語

訶子四生半 桔梗半生半 甘草二寸一

分三服水一鍾章便一鍾煎服

治久寒痰結咽喉音不出

桂心各半草烏各半半夏五錢右為細末姜汁浸

治蒸餅為丸如茨實大每服一九至夜噙化

治謳歌失音連翹各半桔梗各半甘草各二兩半薄荷四兩

訶子肉各半砂仁各半大黃各一兩川芎各半百藥煎各二兩

右為細末雞子清丸如彈子大每服一九臨

治暴卧噙化

治失音不語

百藥煎 杏仁 百合干 訶子肉 桑菽仁 等分

為末以雞子清和丸如彈子大每臨卧噙化

治失聲皂角皮去弦子蘿蔔切片水一碗煎至半

碗服之不過三服能使語聲出

杏仁煎 治嗽失音不出

杏仁三兩生姜汁各一兩蜜糖各一兩木通 桑皮 貝

母各一分紫苑各一兩五味子各一兩一方加知母一

兩款冬花一兩水三升煎半升去渣入杏仁

蜜糖姜汁再熬成稀膏食後臨卧每服匙

含化一方有石菖蒲

訶子飲治文嗽語聲不出

訶子肉錢各一杏仁錢炒通草半錢分二服每服水

二鍾姜三片煎一鍾食遠溫服去杏仁杏仁

一方治暴嗽失聲語不出初服三合再夜後

杏仁姜汁砂糖蜜五味紫苑略

通草貝母各四桑白皮五右九味咀以

水九升煮取三升去滓內杏仁脂姜汁蜜糖

和攪微火煎取四升初服三合再夜後

稍加

又方通聲膏

五味款冬花通草各三人參細辛青

竹皮桂心葛蒲各二杏仁姜汁各一升

白蜜東膏酥右十三味咀以水五

升微火煎上三下去查內姜汁東膏酥蜜

煎令調和酒服束大二九或入

木火嗽

羅太無柴胡飲治虛勞羸瘦面黃無方減食盜

汗咳嗽不止柴胡知母鱉甲酥各

示之朱

八卷

經

五味子錢五地骨皮半兩右為末每服三錢烏梅

本事驚甲丸治勞嗽虛証及鼻流清涕耳作蟬

鳴眼見中黑花一切虛証丈夫婦人皆可服

五味子兩驚甲一地骨皮略右為末煉蜜

丸如梧子大空心食前温酒或鹽湯任意服

三五十九丸婦人醋湯下此方延曲江人家

正秘方服効者衆且處方有理

丹溪蛤蚧丸肺臟內傷咳嗽氣急久不除漸

瘦スルニ蛤蚧去頭足訶子肉煨細辛炙甘草

丹熟地成珠阿膠炒麥門冬各五錢為末蜜丸

與每一兩分十五丸每含化一九

貝母湯諸嗽久不瘥

貝母姜製黃芩桑皮各五錢乾生薑五

味子陳皮半夏柴胡桂心木香

甘草各半錢右每服六錢加杏仁七枚授之一

服瘥以治諸般嗽通用悉効者緣方內有寒

有熱有收有散也

潔古枳殼湯治日久痰嗽胃膈不利上焦多熱

枳殼兩炒三桔梗兩黃芩兩每早取二兩半水

三盞煎一盞半日三服三日服盡再服後半湯

生半夏湯治半夏三錢半水盞半姜五片煎至一

盞食後服一日三服服三日了再服枳殼丸至

其痰為度論曰先消胃中痰氣后去膈上痰再

與枳朮丸謂首尾合治其氣令痰不復也

丹溪又嗽丸子海蛤粉膽星臣杏仁臣訶子

佐青黛佐皂角使右為末姜汁丸如梧子大

姜湯下

久嗽乃積痰久留肺脘粘滯如膠氣不升降或挾

濕與酒而作香附童便姜蚕炒海蛤粉瓜

萎仁蜂房杏仁姜汁竹瀝神麩

各等分蜜調噙化

夏月無汗成久咳嗽汗方在

衍義治久咳膿血胃膈咽痛

蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角

各一兩除膠外皆為末入膠河水三升煮半

升臨睡細呷愈

療三十年嗽以百部根二十觔搗絞取汁煎之如

飴服二匙一日三服驗外臺和飴一斤熬成煎以溫粥飲調下深師方

以白蜜二升更煎

百一方治久咳嗽上氣十年諸藥治不瘥以編

蝠除翅足炙令存性為末飲服之

紫苑散久嗽多年不愈

紫苑兩款花兩為末米飲調服一錢日三次

三物湯大人小兒久嗽神效

桑皮蜜百部根馬兜鈴等分水煎服

清金湯遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胃

入滿氣逆坐卧不安嬰粟殼人參粉草各

錢陳皮茯苓杏仁阿膠五味桑皮

苡仁紫蘇百合貝母半夏麴款花

每服六錢姜三片棗二枚烏梅半箇水煎服

收斂之劑肺欬收急食酸以收之

羅太無九仙散治一切咳嗽

桑皮人參桔梗阿膠五味子烏梅

欵花

各一兩

貝母

錢五

嬰粟殼

蜜炒

八兩

右為末

每服三錢

白湯調服

欵花

清肺散

治咳嗽喘促

胃膈不利

不得安卧

人參

炙甘草

三枯礬

二烏梅

連核搗碎

粟殼

醋炒

甜葶藶

生用

右為末

每服二錢

濕

米飲湯調服

食後忌油膩

節言語

人參

清肺湯

治男婦肺胃虛寒

咳嗽氣急

胃膈咽

塞腹脇脹

滿迫塞短氣

喜飲飲冷咽嗑

隱痛及

瘵肺痿勞吐血腥臭乾嘔煩熱

烏梅

地骨皮

人參

炙

甘草

阿膠

炒

杏仁

去皮

桑皮

知母

粟

殼

去鬚蒂

右每服四錢

烏梅

一枚

水煎服

人參

欵花散

咳嗽久不愈者

人參

欵花

錢各五

知母

貝母

半夏

錢各三

粟殼

炒

右每服六錢

烏梅

同煎服

人參

養肺湯

肺痿咳嗽

清痰

午後熱

并聲

颯者

人參

炙甘草

阿膠

珠

錢各一

茯苓

錢半

貝母

柴胡

錢四

杏仁

五味

桔梗

錢各半

桑皮

錢二

枳實

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

廿

四

十

赤小豆
一錢 右每服八錢 生姜三片 枣一枚 食後溫服
減柴胡 茯苓 五味 貝母 桔梗 枳實 加地骨皮
知母 烏梅 嬰粟殼 即上人參清肺湯已上
乃御米殼 烏梅 例收後藥也
卅溪謂 黃昏嗽者 火浮于肺 以酸味 飲而降之 用
訶子 五味 五倍子 白礬 等是也

雜方

血竭散

治勞嗽 見血 諸治不效

蛤蚧一對 訶子錢三 血竭錢一 三味共為末 以姜

汁與蜜等分 熬膏 入前未調 三五分服 效
治咳嗽 感胃方 及痰嗽 熱嗽

雪梨一箇 開一竅 入明礬一錢 用紙封固 灰火
中煨 令礬化 梨熟 為度 食之 立愈 甚者 不過枚
又方 治痰嗽

細芽茶三四兩 濃煎 濾去渣 好蜜六兩 水內 頓
滾 抹去沫 入濃茶內 同煮 二三沸 露一宿 空心
溫服 一碗 二三次 全愈

阿膠散 一切咳嗽 虛人 老人 皆可服

阿膠 馬兜鈴各一兩 五靈脂 桑皮錢各一 炙甘

草半錢 右為末每服一錢水一鍾煎六分食

後夜卧通口服

當歸散 治男婦因打撲負重辛苦勞力傷損肺

臟既損遇風寒則為咳嗽或咯紫血宜此藥去

心肺之瘀血仍灸肺俞穴 蘇木 生地黃

當歸 大黃 芍藥 等分為末每服四錢或

水酒煎服亦可

活血飲 自裁得效方治怒氣積血在胃脇咳嗽

年久不愈每咳則隱而痛 滑石錢五分 苑仁

錢紅花分五 桔梗分五 粉草分四 瓜蒌錢二 丹皮分八 茜根

分貝母分八 柴胡分五 香附分五 水煎服

躰厚者加大黃川山甲或作末以韭菜汁拌

為丸服

本事 治十六般哮喘

阿膠兩 炒一馬兜鈴 炙甘草 半夏姜汁浸

人參錢五 杏仁去皮米 右為末每服一大錢水

一盞煎至七分臨卧食後服

隨病看湯使為引
心嗽面赤或汗流加乾葛煎
烏梅一枚大米十四粒煎脾嗽不思飲食或惡
心下兩時入姜二片煎胃嗽吐逆酸水入蛤粉
煎膽嗽冷入不睡加茯神五分茶清調下
咳嗽出痰如員塊生姜汁調藥嚥下
勞嗽入
紫朮末煎血嗽連頓不在當歸末枣子同煎
暴嗽涕唾稠粘入烏梅生姜同煎
產嗽背
脚痛甘草三寸黃蠟少許同煎
氣嗽肚痛脹

滿入青皮去白同煎熱嗽夜甚蜜一匙葱白
同煎哮喘喉如拽鋸入半夏三枚同煎
嗽入黃耆白飴糖同煎上件十六般嗽依法
煎服無不効驗此方京都下家專治此疾因中
官厚賂始得其方屢試有効
本事劫痰方治癆嗽及哮喘痰湧
青黛錢三辰砂一錢雄黃一錢明凡一錢信石生用各
右俱為極細末淡草鼓一百粒湯浸去殼研
如膏入藥丸如梧子大臨卧冷茶吞下丸

赤小豆

治咳嗽不問遠近其効如神

桑白皮四兩 五味子二兩 甘草二兩 陳皮二兩 粟殼一斤
去蒂膜用醋浸三日 晒干再入醋浸晒干 右為末用冷蜜湯調服

忌煎燂油膩酒醎酸等物

潤肺湯

治上感下虛脾肺濕熱遠年近日氣喘

咳嗽痰盛心胷氣悶不思飲食或寒熱往來或感胃風寒喘嗽氣急五癆七傷吐血等症並皆

治之

知母二錢 紫苑五錢 山梔仁五分 甘草一錢

半炒 麻黃五分 白沫湯泡 荆芥五分 馬兜鈴五分 去筋膜

前胡二錢 赤芍一錢 桑白皮二錢 半夏三錢

湯泡七次晒 赤茯苓二錢 杏仁五錢 黃芩二錢

半去 如婦人加當歸川芎生地黄牡丹皮各一錢

此藥製度每服一兩四錢半用水二大鍾生

姜五片初感風寒加葱白三根久患咳嗽加東

二枚不用葱白煎至一鍾半去滓臨睡候將身

右卧用絹帛頂住右軟肚次用竹筒緩吸藥

熱服不言語呼吸切忌房勞

赤小豆

卷

卷

四十四

馬兜鈴散 治胎氣壅塞咳嗽喘息

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母 各五錢

橘紅 紫蘇 大腹皮 桑皮 五味 各五錢

每服六錢 姜四片 水煎服

麻黃散 治 妊婦外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃 前胡 橘紅 甘草 半夏 人參 白朮 各二錢

枳殼 貝母 每服六錢 姜四片 水煎服

葱白 五根 束二枚 水煎服

竹茹 紫苑 湯 治 咳嗽不止 胎不安

紫苑 天冬 桔梗 甘草 杏仁 桑皮 各二錢

每服五錢 竹茹 一塊 水煎 去渣 入蜜 半

匙 再煎 二沸 溫服

天門冬湯 氣逆咳嗽

天冬 貝母 人參 甘草 桑皮 桔梗 各一兩

紫蘇 赤茯苓 麻黃 去節 各五錢 每服六錢 姜四片 水煎服

大宮 詹少溪 吳馭閱 校

赤丸去五
八八卷

大宮歌火窟具燈因妹

每銀六錢美四市米煎服

藥補藥主法外冬酒煎黃

天冬一兩 貝母一兩 人參一兩 桂枝一兩 桑葉一兩 林林

天門冬一兩 麻黃一兩

起耳煎年煎服

每銀五錢美四市米煎服

天冬一兩 貝母一兩 人參一兩 桂枝一兩 桑葉一兩 林林





