

目睛露白

人之一身必元氣固則精血為之凝聚而瞻視有常也若元氣虛損則衛氣受虧是以督脈縮促致睛上吊而露白也若謂之風則謬矣遇此候別無他証者可以保元湯加陳黃米主之無魂失志不省人事者不治雖無他証而或見於七日之前則毒尚未解而氣血已離必不可治之症也

声哑

心之氣舉擊於肺而為音肺清則音清肺熱則音啞此必氣喉有痘熱毒閉塞肺竅而然也湏分順逆為治如七日之後失音者乃內痘先熟而先屬則咽喉漸寬毒氣漸消聲音自亮為順症也若七日之前失音者此毒氣薰蒸失於調解致肺竅不通閉塞管籥毒無從洩內痘靡爛舌齦成坑咽門腐壞馴至呼吸俱廢為不治之症矣或有內本無痘因食辛熱之物或多服熱藥所致者急用甘桔湯射干牛蒡湯加玄參連翹

犀角治之或能言声不清者以火乘於肺也瀉白散加天花粉桔梗石膏片芩菝苓麥冬山梔治之或感風寒閉塞而声不清者參蘇飲加桑白皮杏仁石膏主之如法治之而効者吉否則凶

水 呰

喉之竅若管籥然痘之初出細小不竟及肌表之痘成漿則內痘亦成漿而其毒壅於會厭然是乃飲食所進之處故飲湯水不易進納則溢入

氣喉而發喰也若穀食有渣自能咽之從食喉而下非如水溢以犯氣道矣七日後見者不藥而愈何也外痘屬而內自痊矣若七日前見則為逆症由熱毒壅塞不能發於肌表故耳治用甘桔湯合解毒湯加牛子玄參荆芥麥冬若預以甘桔湯清其氣道安致有此患哉

驚 搞

附癲癇

心者神之舍也痘毒本熱：氣擊動心神肝不能制故神不安而發驚搐治宜瀉肝利小便蓋瀉

肝則風去利小便則熱除風熱既退則痘出而驚自愈矣故痘未出而見此症者則升麻湯合消毒飲主之或紫草膏或蟬酥丸不可竟投涼劑蓋心一涼則氣血隨斂毒無從出也痘既見而有此症由熱毒之未解耳四苓散合消毒飲或紫苓湯或導赤散若風火相搏喉中痰鳴目睛上視面赤引飲喜居冷處者紫苓湯或抱龍丸若痘後胃弱飲食不化謂之食蒸發搐必面黃潮熱大便酸臭秘泄不調或吐利腹痛宜紫

霜丸下之大便秘者四順飲痘後毒當盡解而又發驚則心氣已絕神無所依必不可治發癲癇者粉紅丸治之

痘後手足麻木無汗者參附湯若手足難動常出汗者芪附湯卒然驚仆不省人事者用皂角為末吹入鼻中即甦古謂先痘後驚者不治痘正發而有此症能不為之可悼哉

又痘未出毒氣內逼目上竄驚叫如驚風者乃痘欲出之候也若誤認為驚而治之則毒氣內蓄

也始終固有用白虎湯加天花粉乾葛甘草然
有汗加人參或辰砂六一散小水不利者四苓
散氣虛保元湯加麥冬五味至於陰虛火動而
發渴者固為難治之症理辯則謂六味地黃丸
加桂心五味子乃治虛渴之聖藥也不可不知
痘疹心書曰毒氣萃于陽明此時多發熱渴熱澑
于內而外不得宣通故發渴也宜神功散服後
猶渴者宜紅花子一味煎湯飲之如無子即用
紅花湯加牛蒡子服之此藥神妙能散胃口之

瘀血故也切不可用荔枝黑棗椒姜等湯以助陽

經之熱

噯氣

熱毒鬱於胃中欲發而不得發故噯氣治用半夏
生姜湯加陳皮黃芩或四苓散加陳皮竹茹以
利之

不食

痘瘡始終以脾胃為主若飲食如常者此臟府充
實脾胃完固不消服藥若不喜飲食者必須辯

別而治之如泄瀉痘色灰白而不食者此脾胃虛而元氣弱也宜四君子湯或人參養胃湯七珍散治之如大便秘瘡掀腫不食者此毒盛而血熱也宜四物湯加解毒藥熱甚者加姜炒芩連便秘者下之萬氏云痘瘡不怕稠密只要能食

汗多

汗乃心之液由熱氣內蒸腠理開泄故液隨氣而出也自汗盜汗俱能虛人未漿之時恐不能灌

既灌恐不能屬既屬恐血脫陽虛變為他症最宜調理自汗宜保元湯加桂枝白芍浮小麥以斂之有熱加酒芩盜汗宜當歸六黃湯或當歸湯丹溪曰自汗不妨蓋溫熱薰蒸而然也此特為汗少出者言耳若汗大出身冷惡寒寧不早為之治乎此宜異功散救之寒不已者死汗綴如珠者死汗而昏沉者死汗流煩渴者死不可不察

諸失血

風濕者平胃散加防風羌活汗之水腫者以五皮飲消之一方用蘿蔔子殼蒲蘆煎湯洗之立消又法柏樹葉桑樹葉煎湯洗亦消

驗動靜

凡痘以靜為貴內有不和則動凡靜屬陰而動屬陽痘之為症陰陽俱病但息欬其匀語欬其少寐欬其安寤欬其寧觸其瘡則吟拂其欬則鳴飲食二便如時此平人之候是謂靜而吉也如呻者身有苦也自語者神不清也喘粗者內熱也腸鳴者泄也坐卧不寧者心煩也啼呴不止者痛也搖頭者風也指欬搔者痒也嚥物難者咽痛也咬牙者心肝熱也若悶亂躁擾譖妄昏眩如見鬼狀搖頭扭項手舞足擲目睛上視寒戰咬牙語音不出皆為死候如病向靜忽然擾動者異也須細察之痘色變而無他候者戾氣觸之也痘色不变又無他症此必有因但俟自定其有目瞑息微四肢僵直口噤痘壞昏睡不省者此真氣將脫魂魄欬離之兆又不可作靜

看也

稀痘仙方

牛黃一錢蟾酥三分辰砂七分絲瓜蒂近蒂燒存性五錢

為末每一歲服一分砂糖湯調下

兔紅丸

服此可免出痘

辰砂 甘草 六安茶 各等分臘八日午時
取生兔子血為丸梧桐子大逢三六九與兒
食之

鼠肉方

取雄鼠肥大者去皮毛腸穢用鹽醋爛煮與兒
食之痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對他
言知但只可自設法取用不可用他人取討者
恐防毒藥死的慎之或只用砂仁白水煮不用
椒葱蒜並油煎等辛辣熟物若未食葷兒與
食尤妙此屢試屢驗者

四脫丹

蟬退 蛇退 凤凰退

即哺出
雞子壳

神仙退

即父母
瓦甲

右各等分焙為末每服一錢煉蜜為丸菉豆

大每年除夜服服三年永不出痘

玄兎丹

玄參

酒洗五兩

兔絲子

水淘淨酒煮研爛為末

右二味俱不

犯鐵器為末黑砂糖為丸彈子大每日與兌

服三丸沙糖湯下

葫蘆花湯

八月採葫蘆花不拘多少陰乾入除夜蒸籠湯浴兌或不出痘緩出亦稀少

苦棟子湯

苦棟子不拘多少煎湯浴兌或痘瘡不出出亦稀少

三花丹

將出之明用之能稀少

梅花

桃花

梨花

取已開未開盛開者陰

乾為末等分取兔腦為丸雄黃為衣用赤小

荳菉荳黑大荳三荳湯下

六味稀痘飲

將發痘預服之

山楂

紫草

牛旁子

各一錢

防風

荆芥

各二錢

分甘草五分

姜三片水煎服

輕斑散

治痘未見點時服之

絲瓜子近蒂三寸連皮硃砂

五分

二味和勻沙糖

調下痘出必稀多者少少者無

稀痘如神散

絲瓜

升麻

芍藥炒

甘草

山楂

黑豆

赤荳

犀角磨用

各等分

每服三錢水煎服不

拘時看大小加減

預服萬靈丹

初發一服即輕百發百中

牛麻小者

葛根三錢

甘草三分

紫草一錢

蟬退

姜蚕洗連翹

白附子炒各

山荳根五錢

全蝎去毒

十雄黃一錢

射香錢蟾酥一錢好

右十二味

和拌為丸皂角子大每服一丸

草湯下

發熱有數種

生生子曰凡痘疹發熱與傷寒傷風傷食驚風等相似先當辨明傷寒之熱手足稍微冷無汗惡寒面色青慄不舒左額有青紋傷風熱手足稍微溫自汗惡風面赤而光二者皆太陽症俱

頭項痛腰脊強 傷食熱目胞腫右額有青紋
身熱而額腹最甚夜熱晝涼面色黃或吐利腹
痛 驚風熱面色青紅額正中有青紋手心有
汗時發驚悸 痘子之熱必顯四臟之症耳覲
冷中指冷尻冷面燥腮赤呵欠頹悶乍涼乍熱
多睡咳嗽噴嚏驚悸吐利○夫發熱者瘡疹常
候也但熱微毒微執甚毒甚微者勿藥甚者必
宜及早清解原痘無逆險只在發熱之初調治
之早觀其熱重神昏即以清解之劑投之或發

表或攻裏法在不避必使一晝一夜表裏通和
熱退為佳蓋毒解則執始退熱退痘出自然稀
疎明朗若不早為疎通表裏則毒無出路雖小
毒穰成大毒迨及出齊則順逆險已定順者幸
而無虞逆者無所措手矣古無順逆險之名稱
順逆險者自魏桂岩始也

初發熱三朝証治活法

凡發熱疑似之間宜投人參敗毒散一劑發之是
與不是一發便見萬葛軒曰大抵痘疹只宜發

蓋勿使留伏于中

凡用發表之劑務察天時不可固執只宜平和之說極為誤事設遇冬寒及春行冬令之候腠理緻密血氣凝滯痘必出遲遲則蘊熱熱不得汗毒莫能洩必多壅遏之變急宜辛熱之劑發之桂枝葛根湯或五積散去乾姜

如天時熱則腠理踈豁氣血淖澤防其發洩太急恐罹潰爛之變必以辛涼之劑解之宜升麻葛根湯復解散之類如春秋天時溫和不寒

不熱只以人參敗毒散最佳

保嬰丹熟甚者用之捷効或就於前解散藥化下一丸能令重者輕輕者少以其極能解毒也初發熱時飲食二便如常精神清爽痘必稀少不

須藥

初發熱時渾身壯熱熇熇然不渴清便自調與邪鬱在肌膚之間宜輕揚之劑發之升麻葛根湯甚者羌活湯

初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便赤大便

秘煩悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表通
裏瀉解散主之

初發熱時表不甚熱煩躁不安口渴小便赤澁熱
在裏用紫草膏保嬰丹辰砂六一散犀角山荳
根之類清解之甚者三黃丸微利之

初發熱時腹中痛者此痘毒與穀氣相併急以麦
芽山楂紫蘿枳實砂仁陳皮溫而消之若腹脹
硬痛大便秘者倍急丸下之

初發熱時咳嗽裏流清涕參蘿飲主之

初發熱大便秘結急宜潤之恐熱毒內蓄宜紫草
飲必使大便通利為好

初發熱嘔吐者要明外感內傷外感者二陳加
紫胡蘿香生姜枳壳和而解之內傷者二陳
加藿香砂仁麥芽山楂枳實蘿梗白芷消之
胃弱而吐者六君子湯有毒氣上衝大吐不止
者辰砂六一散甚者加石膏芦根湯亦佳

初發熱作鴻腹中不痛原無內傷者此痘內動與
外邪搏激所致不必治鴻但以輕揚之劑升發

之痘出而瀉自止

初發熱自汗自吐自瀉者乃毒從上中下而出皆為吉兆但只在三日內裏不可多日恐元氣虛脫也

瀉有冷熱熱瀉者口渴小水少而身大熱四參散加木通若乾嘔加姜炒黃連或六一散 冷瀉口不渴小水清重者理中湯輕者參參白朮散久瀉者豆蔻丸

初發熱二三日間有驚搐者導赤散羌活湯辰砂

散○大便秘者三黃丸微利之 小便赤澀者導赤散 渴甚者葛根解毒湯 腹中痛者桂枝大黃湯 腰痛者人參敗毒散 自利者黃芩湯 吐利者黃芩加半夏湯 如脾胃素弱自利清白者理中湯丸或四君子湯豆蔻丸合而服之

允發熱及初見標時須問咽喉疼否但有微疼急清解之甘桔湯加牛蒡子 大抵痘要解咽喉為急務不早防以致失声乾嘔水穀不入搶喉

噴吐治無及矣

管氏曰發熱之初痘之吉凶皆兆於此故急宜表汗使臟府胎毒及感不正之氣盡從汗散則痘出自自然稀少蓋熱甚毒甚熱微毒微不必治妄汗則表氣一虛痘不能起發反為害也盛者汗之要在身熱盡退為佳其有一切雜症皆由毒氣欲出不能故耳一表散則毒氣盡洩諸症自退矣或有當解者解之當下者下之切不可抗一也胡氏曰表熱壅盛非微汗則表不解裏熱

壅盛非微利則裏不解正此之謂耳失此不治則毒氣漸盛而逆症隨見世人多忽於此及見逆症而後治之將何及哉

大抵治痘之訣妙在三法曰發表曰和中曰解毒知此三者於發熱見標之際預為之地則多可少重可輕自無以後變症故發表最先蓋痘疹只要發得毒盡不使留伏于內凡發表必兼解毒非發表之外另行解毒也痘既已出不渴不熱表裏無邪不須服藥如痘多毒盛裏實能食

者可望用解毒如裏氣不和或吐或利於和中
法內客無解毒若毒輕痘少惟裏不和胃氣虛
者三用和中則不必解毒也每發表湏辛甘清
陽之劑羌活防風升麻白芷桂枝之類和中湏
甘溫之品如人參當歸甘草芍藥之儔蓋中不
足甘以補之解毒湏苦寒之輩如牛蒡連翹葛
根芩連梔柏紫草之類蓋毒者火也凡用苦寒
之劑必要酒炒可以活血達表且不犯胃氣切
宜識之

痘宜依期施治治貴通变

翁仲仁曰夫痘由中以達外用藥因期而變通以
其尚未見標必發熱三日然後見標出齊三日
而後起脹蒸發三日而後灌膿漿滿三日而後
收靨發熱之初耳尻中指俱冷耳後起紅絲呵
欠噴嚏眼目困倦兩顧之間有花紋見者預知
其為痘也發熱三日當托裏解表使其易出亦
有氣弱而不能出者當微補其氣氣和則出快
初不可用芪恐腠理密而難出也四五六日以

清涼解毒為主清涼則無血熱燥毒之患解毒
則無壅滯黑陷之害七八九日以貫膿為主治
法當溫補氣血氣血流行而成漿自易也十與
十一二日以收斂為主大和氣血補脾利水則
自然結膿此特語其常也蓋常者可必而變者
不可必當隨候參詳安可執藥以應無窮之變
哉言見紅點之時如豆輕少不可過表在後恐
成班爛或乾紅紫色急宜疎利不然在後必成
黑陷四五日之內痘出至足心為齊苟未盡出

於解毒之中宜兼發散若專於寒涼則痘遲滯
不出七八日之間毒未盡解於溫補之中又兼
解毒若偏於燥劑則毒盛不能化漿也十二
日之間漿未滿足必大補氣血畧兼解餘毒不
然恐有瘡毒溫疤之患此變通之妙要在隨時
制宜也

人參敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼
桔梗 白茯苓 人參各等分 甘草減半 生姜

三片水煎服 一方加薄荷少許

參蘿飲

人參三分 紫蘿葉 桔梗 乾葛 前胡各四

陳皮 茯苓各五分 枳壳三分 半夏二分 木香半分

生姜三片水煎服

升麻葛根湯

葛根 升麻 白芍藥 甘草各等 分 水煎服

雙解散 脾防風通聖散益元散二方也

防風 川芎

當歸

白芍藥 薄荷葉

大黃 連翹各五分 石膏 桔梗 黃芩各八分

白术 桂枝 荆芥穗各二分 滑石二錢 甘草一錢

生姜三片水煎服

桂枝葛根湯

葛根 桂枝 赤芍藥 升麻 防風 甘草
各一錢 生姜三片淡豉一錢水煎服

保嬰丹

紫草茸

酒洗 忌鐵

纏莖藤

燒存性

荆芥穗

四兩

防風

四兩

升麻

大力子

炒各二兩

天竺黃

一錢二分如

無真者以雄

以雄

如

黃一錢二分代之牛黃半錢辰砂用麻黃荔枝壳蟾酥
自取真正者赤小草各一分炒香甘

草梢去皮二兩加紫草三兩水熬成膏半碗沙糖半

碗前藥俱製淨末和為丸圓眼核大辰砂飛過為衣未出之先濃煎甘草湯每服一丸大兒加一丸凡遇發熱之時生姜葱白湯化下

厚蓋表汗乃解毒之神藥

心要羌活湯

羌活川芎防風山梔子龍胆草

當歸各一錢甘草減半薄荷葉片淡竹葉片水煎服

紫草膏治紅紫黑陷熱毒

紫草茸白附子

麻黃去節

甘草各五錢

全蝎八

枚

炒右為細末用蜂蜜一兩酒半錢入紫草煎

熬成膏旋入各藥丸如皂角子大每服一丸

仍用紫草湯化下如治驚搐用金銀箔為衣

薄奇湯下

六一散

桂府滑石飛淨六兩大甘草去皮一兩

每用一錢灯心

薄奇湯下 内加制辰砂三錢名辰砂六一
散 治狂言妄語驚搐用防風荆芥薄奇天
麻煎湯候冷調下 本方加鬱金名牛黃六
一治痘後瘡癩瘻毒及天行瘟疫冷水調下
多服大効

退火丹 治痘初出標大熱不退或稠密成片者
神効

六一散 一料加雄黃飛過三錢 經豐藤燒存性一
錢外用紫草木通蟬退地骨皮紅花大力子

羌活片芩燈心煎湯候冷調下極能解毒稀
痘

四苓散

白朮 赤茯苓 泽瀉 猪苓

右為細末每服一錢

三黃丸

黃芩五錢 黃連 大黃各二錢半 為細末雪水搗丸

菉荳大辰砂為衣每服五七十丸燈心湯下

備急丸

木香二錢半

錢

大黃

黑丑頭末各五錢

錢

為細末神麴

糊丸菜莖大每服五七丸山查湯下

桔湯

甘草

二錢

桔梗

一錢

水煎服

三莖湯

赤小莖

黑莖

菜莖

各升

一甘草

三兩

三莖用水

淘淨用水八升入甘草同煮莖熟為度逐日空心面東任意食莖飲汁服七日永不出

代天宣化丸 即韓氏五瘟丹也

甘草

甲子年

黃芩

乙庚年

黃柏

丙辛年

山梔

丁壬

年君木

黃連

戊癸年

連翹

佐火

山荳根

佐土

牛旁子

佐土

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥加一倍臣減半佐又減半共為末冬至日修合取雪水煮升麻汁打麵糊為丸辰砂為衣竹葉湯下

五積散

白芷

川芎

各三分

桔梗

半分

芍藥

茯苓

炙甘草

當歸

桂枝

半夏

各二分

陳皮

枳壳

麻黃

各五分

蒼朮

一錢

厚朴

四分

右除桂枳

壳二味為粗末外十二味為末慢火炒令轉色攤冷次入二味末令勻水一盞半生姜三片煎一盞溫服

辰砂散

辰砂

一錢

絲瓜

近蒂三寸連子燒灰存性為末

蜜水

調服多者可少少者全無絲瓜解痘最

妙

紫草甘草湯

調服尤佳

連翹湯 納解諸毒散風清熱痘後一切發熱瘡

毒赤腫

連翹

防風

瞿麥

荆芥穗

木

通

車前子

當歸

紫胡

赤芍

滑石

蟬退

黃芩

山梔子

甘草

各五分

紫草

五分

水煎服

連翹升麻湯

連翹

一錢

升麻

葛根

桔梗

甘草

各七分

木通

八分

牛蒡子

一錢

白芍藥

五分

薄荷葉

少許

淡竹葉

水煎服

消毒飲 治咽喉腫痛上膈熱盛 一方加升麻

水煎服

牛蒡子

炒

荆芥

錢

甘草

各分

水煎服

翁仲仁十神解毒湯

專治身發壯熱腮紅臉赤

毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴

欲飲睡卧不寧小便赤澁此熱盛也並皆治之

歸尾

生地

紅花

丹皮

赤芍

桔梗

木通

大腹皮

連翹

川芎

以方治血熱

痘疹以涼血活血為主佐以桔梗川芎有開

提發散之功引以大腹皮木通有疎利熱毒之効臣以連翹丹皮有解毒之良用此以治

血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛庶幾解
散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐
驟用寒涼不惟火伏熱毒反出不快抑且熱
毒為其所抑則鬱於臟府或肚痛腹脹內潰
而死者有之豈若此方用之為穩當若不得
已而用黃連芩柏亦須酒炒一以製其寒涼
之性二以助其上行之勢借連柏以解毒耳
加減法

身熱壯盛加

葛根前胡

毒盛綿密加

荆芥

四
子 鼠粘 滴加 天花粉竹

小便血加 屎角

山梔

大便黑加 屎角

或槐仁 黃連

吐血乾嘔加

黃連
山梔

發紅斑加 柏山梔玄參

小便赤加 屎角

山梔

小便短澁加 猪苓澤瀉

小便秘加 滑石

瞿麥

大便秘加 桂壳

前胡 嘔加 橘紅

泄瀉加 猪苓澤

防風

大便秘加 胡椒殼

大黃 煙躁加

麥門冬

天花粉

煩渴狂亂譫語加

知母 門冬

嘔吐加 猪苓澤

黃連

咽喉痛加 鹿角

甘草 鼠粘

利口加

猪苓澤

以上並用灯心十四根水煎服

羌活散鬱湯

專治實熱擁盛鬱遏不得達表氣

粗喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡卧不寧大小便
秘毛豎面浮眼張若怒並有神効并為風寒外
搏出不快者同治

防風

羌活

白芷

荆芥

桔梗

地骨皮

川芎

連翹

甘草

紫草

大腹皮

鼠粘

子

右為粗散水一鍾燈心十四根煎六分溫

服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所

抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒擁遏於內為腹脹為喘急為秘結為狂煩為驚搐為失血皮燥毛直面急眼脹睡卧不寧驚啼多哭此熱毒擁遏之症辨認不差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不擁而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提勾氣之能荆芥連翹梟粘善解鬱熱地骨皮消擁熱於筋骨之間且能肅清臟府

紫草滑肌通竅六腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治熱擁之症效大而功用極妙若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑不得伸越逗遛經絡為痘為癧者有之水伏硬閉者有之至於人參黃芪白朮茯苓溫補之劑誤用則其擁盛禍不旋踵他如丁桂木香姜附之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依後法而加減之

加減法

初發熱壯熱腮赤面赤毛焦皮燥咳嗽

喘急加

升麻煩渴加

天花粉乾葛

腹脹喘急鼻塞面赤

若怒毛直加

麻黃便秘加

當歸枳壳

甚則加大黃嘔吐加

猪苓澤瀉陳皮

禁用

生姜丁香半夏木香

洞瀉加升麻禁用白朮

荳蔻龍骨等

劑喘嗽惡風加紫蘿

失血加犀角地榆

加黃芩三連加口

青皮

斑加

黃連黃芩

鼻衄加桑白皮失血加犀角小便赤澁加石

山梔

地榆驚悸加

木通山梔不思食加

查傷食加山楂神曲

麥芽

煩紅赤色加

生地紅花丹皮

白芷防風

見標二三日間出不快利加

大力子山楂

退名透肌散

皮急肉緊身壯熱甚加

葛根前胡

見標三日之內並依本方加減及三日後痘瘡出齊血包已成而前症悉平不得復用此方恐發散太過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從血熱痘症法而裁治之

太乙保和湯

又名紫草透肌湯

專治血熱痘症服十

神鮮毒湯後熱症悉去內外和平見點三日之後不易長大粗肥者用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易痂易落也

桔梗

紫草

川芎

山楂

木通

人參

紅花

生地

甘草

糯米

五十粒

右用燈心七根姜一片水一鍾煎至六分溫

服

便澁腹脹加

大腹皮

繁紅不潤加

當歸
蟬退

出不快者加

鼠粘子

陷塲加

黃芪

痛加白芷

不勻加防風

水泡加白术

五味子

門冬渴加

麥門冬

痺加白芍

桑葉

七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急

前胡枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散

專治擁熱痘症服羌活散鬱湯後

擁症悉開氣和平見點三四日後不肥大者

不成漿者用之則能勻氣解毒透肌達表領出

元陽助痘成漿而易結膿窠也加減以保和湯

同論漿足之後另有保嬰百補湯在後 按此

即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘陳皮

水一鍾加燈心十四根東二枚煎六分溫服

血熱痘症禁忌

血熱痘症熟毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血涼血之劑則痘雖稠密亦能消散而易出易化漿也所謂輕其表而涼其內十神解毒湯蓋得安泰和中解毒三法盡善誠痘科之神方也丹溪曰熱者清之實者平之其妙方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內外彌盛血熱之症悉具辯症不差並只以本方

處治之切不得用參芪白朮茯苓補氣之藥於熱症未漿之前如誤而用之是謂實其實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變症百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁桂乾姜木香藿香訶子肉果如誤而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥症必至咽喉癟瘡失血便祕無所不至矣至於龍骨枯礬滯滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而反閉其門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒

之及至血包已成氣血定位頭頂白光勢將行
漿又宜易方另行別議

三仁膏 治痘疹大便堅實不宜下者服此潤通

火麻仁

炒去壳一兩

松子

去壳去皮七錢

桃仁

去皮炒五錢

右研爛加芝麻一合微炒研細入蜜水研極
爛以帛瀘去渣同前三仁蜜湯調下看大小

用之

見標三日証治活法

發熱三日後退涼見標飲食二便如常形色淡紅

踈朗抹過碍手者上吉不須藥

發熱一日便出者凶乃表虛毒盛也急用羌活散
加紫草牛蒡蟬退煎調紫草膏或保嬰丹若治
之早十枚二三 若服後熱盛不退宜羌活散

調退火丹

若無保嬰丹用纏黃藤灰加辰砂者大

小一歲三厘十分逐歲增加代

矣之

報痘時煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭痘見紫
色者死

標色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一線紅

三五日即長如棗荳大此痘決不能灌漿久後成一包清水擦破而死不可因其好晝妄與下藥

標出全不起頂如湯泡灯火燒者一樣十日後痒癟而死

標出時一片紅斑如錦紋者六日死遍身如蛇皮者死黑斑如瘡狀肌肉成塊黑者立時死

凡見標疎少則毒輕不必妄治密則毒盛但要磊落大小分明不相粘連成片可用前藥進之或

托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使其易發易腐如出太密粘連糗糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防痒癟黑陷之變更察外症可治則治不可治則勿治

凡痘子初出最要唇口潤澤其毒則輕如唇焦裂舌燥有芒為毒火熾盛表裏鬱遏急宜解之黃連解毒湯加大力子 標後身熱未退清地退火湯

凡見標先要頭面稀疎磊落頸項胸前稀少其毒

則輕如面上一片糲糊未發壅腫蒙頭纏項胸
前布密此毒盛也慎勿治之

凡頭面未見標而手足先出他處未起而手足先
起他處未收而手足先收者此陽火太旺宜早
解毒抑陽扶陰之劑四物湯合黃連解毒湯主
之如他處俱起而手足起遲他處俱收而手
足不收者此脾胃虛弱不能行其氣血達於手
足宜補脾胃十全大補湯桂枝芍藥湯

凡初見標之時磊磊落落似稀疎之狀其後漸加

日多一日此毒伏於裏氣虛弱不能使之即
出湏大補而兼解毒庶可十救二三也十宣散
加無價散

石谷程氏曰凡發熱見標密無毫縫空地稠若蚕
種者急用三元秘方救之每一歲兒用茜根芫
荽子各三錢荔枝四枚若不起加葡萄一錢半
好酒一鍾煎至五分候冷每用半盞挽熟水半
盞時慢喂之一日服盡次日再用水煎如
前慢喂之但服此藥之後不可雜食他物以

傷胃氣小者只許食乳大者只吃粥若口渴即以此藥水飲之一以止渴又能清熱解毒切忌油膩煎炒恐滯腸作瀉則悞矣或十歲二十歲藥後一歲加起依數增加作一劑服之如年多劑大不能盡煎可分作二三罐煎之按前藥用酒煎者活血也後用水者清熱也熱盛必作渴代茶飲之足可解毒蓋前症不可補補則助毒又不得不補不補則不起發宜當解毒解毒又作瀉不解毒又攻內茲用三味代之既能

解毒又可溫脾活血誠為千金良劑

凡痘發熱一二日便出或一齊擁出密如蚕種紅紫無縫急宜服之此時切忌保元恐溫補助毒以其血未活而漿不能化故用此三元解之俟其色淡血活熱勢已退然後進補庶為萬全
凡皮肉間繫然紅點稠密急用纏荳藤加製過辰砂末連進二三服或薄荷湯調退火丹仍以牛旁為末敷額門上以散熱毒非惟能使痘疎又且免使侵眼又方生地黃牛旁子搗成膏

貼面頰額角能退痘毒

已出未出之時口鼻出血此血熱錯經妄行不可妄投熱劑宜用生犀薄酒磨服如鼻血不便下血恐胃為熱毒所傷腐壞而然不可不知一出與地皮相平無興起之意乃是紅斑急用涼血解毒羌活散加酒炒芍藥紅花紫草蟬退木通占米連進二三劑退之夾疹同此治治之遲則紅變黑黑則逆而難治

大凡用紫草必用占米以制其冷性俾不損胃無洩瀉之患惟大熱大便燥者不必占米

大凡用當歸活血須以芍藥收之免辛散助熱一標出他處未見獨出數粒於山根之上為毒盛氣虛犯上或發三五粒一塊者皆不吉之兆也急宜涼血解毒以防危急若腮頤地角之間疎朗淡紅潤澤三四次出者為氣正道尊上吉症也

一出皮膚乾燥枯澀必難起壯用溪中白色石子

數枚燒紅以井水淬之使薰蒸痘上或置被下薰之頃刻潤澤痘即起發又能解穢

一色淡不紅活者血虛也以四物湯加減服之但地黃大能滯血不可輕用不得已湏姜汁炒過人乳補血甚捷加酒少許佐之且血非氣不行又加四物於保元之中為陽生陰長之義

一痘正出好飲水者此乃脾胃虛弱津液枯涸故也如恣飲則必傷脾洩瀉及發泡難屬之患保元湯加麥冬五味子止之

一痘未起壯而頭面先腫者乃陰虛陽盛大下四物湯加人乳好酒服之以補陰與陽齊然陽易補陰難補宜急之勿遲否則悞事

一出即變黑者此為惡候如有起興急用托裏解毒之劑少用保元大加紫草紅花服之外用四聖散點之然早能涼血解毒必無此患亦多因脾胃衰弱血熱所致凡紅變白白變黃者生紅變紫紫變黑者死

一痘全藉氣運血活腠理疎通則出快而稀疎亦

無餘症倘遇寒凍及勞役瘦弱之人血凝氣滯出則不快蓄於皮膚之間肌肉之上進退兩難日久變成黑紫褐色不旋踵凡有此候當按令急

與和劑

如羌活散之類

以疎利之其毒氣隨痘而出庶

無變症保合太和之兆也

如頭面出不快身

太陽經當用荆芥甘草羌活防風天麻湯

如

胸腹出不快身少陽經當用升麻紫草木通紫

蘇羌活湯

如四肢出不快當用芍藥紫蘿葛

根甘草葱白連鬚羌活湯各加生姜連進二服

痘即出快

賊痘

凡賊痘與好痘一般但撓先起壯皮嫩嬌軟內係淡膿當用保元湯加占米煎服亦能回癟

一出其色掀赤抹過皮軟不得指其係賊痘遇三日變成水泡甚至紫泡黑泡者危症也若未成紫黑宜少進保元大加紫草蟬退紅花解之或灯草木通湯調六一散利去心經蘊熱而紅紫自退如已成水泡白泡或灰白色則保元中大

下四參利之妙千金妙法也不然則遍身孤破
黑爛而死

起壯三日証治活法

凡四五日來起壯活動一線紅暈而有根窠此為
上吉蓋有根窠方見氣勻血活血活則毒化成
漿收功結痂全藉此也若無根窠必是氣凝血
滯按法治速治

凡起壯肥滿乳食如常不必服藥

一四五日來起壯肥大中有一小孔自項直下至

脚不黑不白與痘色相並此名蛀痘由表虛腠
理而然若不早治大洩元氣不能起發灌膿急
用保元湯大加占米川芎肉桂提起內膿以實
其孔庶為佳兆三二劑後孔自塞滿若孔色黑
乃疔也以疔法治之

一頂暗色白皮薄光洞者氣虛也光明者是火照内外大進
保元倍加酒炒黃芪肉桂川芎丁香人乳酒漿
和服

一根窠淡枯澀不澤血虛也宜保元加酒炒紅花

川芎當歸芍藥加山楂以消參芪之滯再加木香一二分調氣氣調而血自活矣

四五日痘色不宜紅紫乃熱毒不化若血熱仍當涼血解毒兼氣虛者保元加紫草木通紅花生地之類解之

一地紅血散乃血不附氣保元加當歸大加白芍藥以收斂之蓋芍藥味酸用之為君使血得以附氣且又能活血化漿此最上一乘之法切記

切記

一洩瀉按寒熱急治至妥再不宜瀉

若起壯遲緩根脚不紅活者以無價散一歲三厘看大

小用之好酒調服或保元加人乳好酒丁香占米山楂血虛者加當歸鹿角膠

一黑陷及痘疔外用四聖散以油胭脂調點之內以涼血解毒如紫草紅花木通茜根少加保元進之其疔自退疔退看其虛實仍以保元補之一煩躁者內必有熱可用木通以引其火下行或以六一散灯心湯調俟冷服之 譴語者加三

制辰砂夏月井泉水服

如飲食不進看痘色何如未可輕投藥劑蓋其間
有毒氣未盡者且山楂紅花子紫草等藥清而
解之如脾胃虛弱痘色淡白宜保元加山楂
扁豆神曲嘔吐加霍香

一倒痘頭面上未出從足底出起逆而上之縱起
壯灌膿回至心窩下則毒攻入內大呴一聲昏
迷而死雖疎快亦不免死乃逆症也候其出齊
至頭面遂早丟去下身不治只將保元大加川

芎以升提之漸々使其自上而下起壯灌膿自
上而下收斂結痂如常痘一般此鮮有知其妙
者宜謹誌之此逆痘若治之早以黃連解毒
湯一帖以護其心可十全三五遲則百無二三
矣

翁仲仁曰三日四日痘當出齊點至足心勢方安
定猶有陸續不出之狀或隱々於皮膚之內不
見不起者古名不快若非風寒鬱遏之因必有
氣虛不振之過是以四日已前痘毒方出身表

宜涼四日已後毒出已定身宜溫涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠理開通其毒易以成漿故至此而身不微熱雖未必至於冰伏而痘瘡斷乎不長四五日來血包已成候當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白者已具行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿六日依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如燈內含是水項尖而根脚不紅行漿勿實是以毒熱盛而未解則為紫為黑壅而不起則為陷為癟滯而

不榮則為乾為枯為青為灰怯而不振則為不快為停漿或有肉先腫脹而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則遏而不進故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色若還不變溫之可興氣血弱而不振遂成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌溫中帶補只宜活血鬆肌為壅為滯烈藥雖然可發透肌尤是良方溏洩惟於溫補瀉甚佐以

升提

凡起壯時痘之根脚全然不起其頭面皮肉紅腫
如瓜之狀者死○起壯時腰腹或疼或止遍身
紫點如蚊蚤咬全不起發者死○起壯時痘伏
陷不起腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死畧
能飲食用消膨藥治之○起壯時遍身黑陷悶
亂不寧神昏氣潰者死○起壯時根窠紫色乾
燥不活全然不起發者死

頂陷不起湏着年壽上痘起則不必憂如年壽上
不起急與升天散一二服

痘半起忽然平陷而色白者急與內托散或補中
益氣湯

痘色紅鮮反乾燥而不充肥者此火盛而血不足
也宜退火涼血輕清之劑四物快斑湯主之
痘克肥而帶濕者此脾中有濕而氣不足也宜瀉
濕補氣兼風藥治之蓋風能勝濕也四君快斑
湯主之

一痘不起發不拘五陷用獨聖散或胡荽酒 若
黑陷腹脹用猪尾膏

一痘乾尅不起者外用水楊湯洗之內服補中益氣湯

一起脹時手足見而復隱起而復塌者死矣根本已摧枝葉先萎之象也

凡假壯之痘其中有數粒者是也至十二三日決不能回漿結膿內攻而死矣 白痘者可急進保元加川芎丁香生占米提氣灌膿而愈矣內托法也內托散即保元加川芎
便是不必千金內托散 正壯之時痘雖起發而皮膚不碍手按之水漿就出內色不暗是也

灌膿三朝症治活法

灌膿時根窠紅潤肥滿如黃蠟色飲食二便如常者上吉不須服藥

灌膿時皮白而薄純是清水與水泡相似者三四日後遍身拆破而死

灌膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者死若二便不下血猶可用止瀉及消食之藥

灌膿時二便閉目合声嘔腹中脹滿肌肉黑者死

藥

一頂暗無膿為逆

火照

之內外光洞手按之軟陷

按之如破者有膿也

急用保元加歸芍肉桂木香占米煎

成入人乳好酒溫服

有一等肥白痘其色白不作膿俗名木痘以其人原有痰也用二陳四物湯合而服之一消一補仍將小麥粉作麵調與食之立時膿起紅活但不可妄投人參占米而助胃中痰火恐防口瘡寒戰咬牙乃陰盛陽虛也大用保元加川芎肉桂丁香主之甚者加鹿茸

痘灌膿痛不止者氣滯也少用保元加山楂木香以行滯氣如膿血已滿可大用四苓以利之而痛自止

凡灌膿三朝之內身涼痘灰白色或不進飲食寒氣逆上嘔吐或腹脹或瀉清水手足厥冷無陽症也急用二神加入保元連進數服溫而補之痒塌不止者血盛也少用保元大加何首烏牛蒡子蟬退芍藥木香紅花若將麝時微痒者不必治有氣血虛而痒者十全大補湯加何首

烏盧甚者加鹿角膠

一發白泡如彈子大者用棗針挑破去水以活石
末敷之仍服保元加白朮留皮茯苓以利皮膚
之水如前後發紫泡是毒盛溢於皮膚之上必
死

夫膿者血之化也有血方有膿無血則無膿痘至
灌膿大勢已定故此時必以有膿為主有膿則
生無膿則死痘至七日若頂陷不能灌膿者必
由先失調治故也急看根窠血聚別無雜症速

宜大補氣血以充其頂頂滿膿足猶可回生若
頂陷而色灰白此氣血俱離無能為矣

一頂陷無膿服內托藥而暫起不久又陷者膿未
充足故也宜內托散倍加參芪當歸煎和人乳
占米好酒服 若色灰白欲成倒塌皮薄易破
者用滌羊補漿湯保元湯加芎歸升麻人乳好
酒

一痘色紅紫漿不滿足欲成乾枯黑陷者當歸活
血散合解毒湯加升麻石膏乾葛

一遍身灌膿忽然一日变白变紅变紫者不可不察白者為虛宜內托散 变紅紫為熱宜當歸活血散合解毒湯

一痘起壯灌膿俱好至八日大便忽秘常欲去而不能去急用帰尾枳壳芝朮各三錢紫草生地黃芩各一錢煎服即通若失治至屬時忽然發熟而死 翁仲仁三仁膏尤妙

一頂平脚潤漿不滿足十全大補湯加木香乾姜

一遍身無皮膿水流沾衣席不能轉動者用秘傳茶葉方或敗草散內服內托散去桂加荆芥穗一痘發痒滿面抓去而面上瘡痕隱然點點有起發之勢此猶可治急以托裏發毒止痒之藥用內托散加蟬退立驗

一痘抓破而出血者此陽瘡出血也宜當歸涼血湯主之

一灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治二便不通目閉声哑腹中脹滿肌肉黎黑者不治一瘡爛無膿吐利不止二便下血乳食不化者不