


衛生家寶產科備要一集

育寶慶

慶

集



叢書集 成

初編

主玉

編雲
五著

商務印書館發行



集慶寶育產



郭中權集

本館據函海本排
印初編各叢書僅
有此本

序

姪娠之理。內經定以十月爲正產者。尙以間有過期者。蓋古之賢聖之生如此。然聞其語。未見其人也。比年以來。姪之過產者。遠者不得而知。近在燕趙間。時復有之。方姪之初也。信其爲姪。及其過產。則反疑其非姪也。問之產姪。則曰未之見也。問之名醫。則曰出月。出月者貴。問之方士。則曰妖也。以妖治之。問之庸醫。則曰病也。以病治之。二者俱失。至有母子俱不救者。旣而方知其姪也。雖悔其可追耶。余聞之甚可悼矣。恨無可考之方。以破其惑也。一日過醫公李寧之家。示一書曰產育寶慶集。披讀一二。蓋宋儒李師聖、郭稽中、楊子建輩之所編集。至生產篇云。婦人懷胎有七月八月九月十月而產者。亦有經一年至二年四年五年而後產者。蓋人之生陰注陽定。自有時日。不可改移。今獨限以十月。似爲未盡。讀不終篇。不覺屢嘆惜乎。此書在世希有。若能廣傳。使天下共知。則人生安得罹殤天之禍乎。意謂婦人方經雖多。而產書難其全者。若是一或廢失。世間必不復有也。因問誰氏之書。公曰。外郎楊士表所秘藏也。輒親往謁告。以情實求之。忻然見許。遂得原書印本。方議刊行。公曰。此止一產書也。若更將御藥院雜病方論并入月產圖體、元子借地法、安產藏衣方位附之。合爲一集。可爲完書矣。余喜從之。猶恐有錯謬未盡者。更命諸名醫復加校正。余謂公曰。書則完矣。當如之何矣。參謀周德甫聞之。毅然贊成。遂命工刊行。自今以始。庶姪婦得安。產姪無失。家自可以修藥。人自可以爲醫。來者可知而傳之。愈廣矣。冀致君序。

產育寶慶集卷上

宋 郭

第一論曰。熱疾胎死腹中者何。答曰。因母患熱疾至六七月以後。臟腑極熱。薰灼死冷不能自出。但服黑神散緩其胎。須臾胎氣溫緩。卽自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者是其驗。

黑神散

桂心 當歸 芍藥 甘草炙 乾薑炮 生地各一
兩 黑豆炒去皮二兩 附子炮去皮臍半兩

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。一法無附子。有蒲黃。

陳言評曰。夫姪娠謂之重身。二命係焉。將理失宜。皆能損胎。不特病薰灼所致。或因傾仆驚恐。出入觸冒。及素有癥瘕積聚。壞胎最多。候其舌青。卽知子死。養胎論云。面青舌赤。母死子生。青唇吐涎。子母俱死。又有雙懷二胎。或一死一生。其候尤難知。是非臨期觀變。未易預述。不可不備述也。然以黑神散溫胎。未若補助產母。使其氣正。免致虛乏困頓。胎自下矣。催生丹殊勝黑神散。

催生丹 治胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澀。

蒼朮米泔浸二兩。桔梗一兩。陳皮六錢。白芷。桂心。甘草炙。各三錢。當歸。川烏頭尖。乾薑炮厚朴製。

南星炮附子炮去皮 半夏湯洗七次 茯苓 茵藥各二兩 杏仁炒去皮 阿膠麸炒各二錢 川芎錢半 枳殼錢四錢

南木香一錢

右爲末。每服一二錢。溫酒下。覺熱悶。用新汲水調白蜜服。

第二論曰。難產者何答曰。胎側有成形塊。呼爲兒枕子。欲生時。枕破。與敗血裹其子。故難產。但服勝金散。逐其敗血。卽自生。若逆生橫生。並皆治之。

勝金散

麝香一錢
鹽豉紅一兩。用舊青布裹了燒令通急以乳鉢槌碎爲末。

右共爲末。取秤槌燒紅。以酒淬之。調下藥一錢七。

陳言評曰。產難不只胎側有兒枕。破裏凝隨其胎息。因緣自有難易。其遇橫逆。多因坐草太早。努力過多。兒轉未速。或已破水。其血必乾。致胎難轉。若先露脚。謂之逆。先露手。謂之橫。法當以微針刺之。使自縮入。卽服神應黑散。以固其血。必自轉生。養生方云。倉皇之間。兩命所係。不可不廣傳。蓋贊黑散之功也。或以鹽搽兒脚底。抓搔之。

神應黑散 治橫生、逆生、難產。

百草霜 香白芷各等分

右爲末。每服二錢。童子小便。好醋各一茶腳許。調勻。更以沸湯浸四五分服。止一服見功。甚者再服卽

分娩矣。一名烏金散。

第三論曰。胎衣不下者何。答曰。母生子訖。血流入衣中。衣爲血所脹。是故不得下。治之稍緩脹滿腹中。以次上衝心胸。疼痛喘急者難治。但服奪命丹。以逐去衣中之血。血散消脹。胎衣自下而無所患。

奪命丹

附子半兩。炮去皮臍。 牡丹皮一兩。 乾漆一分。炒煙盡。 搗碎

右爲末。釀醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥丸如桐子大。溫酒下五七丸。不以時。

牛膝湯

治產兒已出。胞衣不下。臍腹堅脹急痛甚。及子死腹中不得出。

牛膝酒浸。

瞿麥各四兩。

滑石八兩。

當歸酒浸。

木通各六兩。

葵子五兩。

按陳言第三論評闕。

第四論曰。產後血暈悶者何。答曰。產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者令人悶絕不知人口噤。神昏氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服清魂散卽愈。

清魂散

澤蘭葉 人參各一分。 荆芥穗一兩。 川芎半兩。

右爲末。溫酒熱湯各半盞。調一錢。急灌之下。咽卽開眼。氣定省人事。

陳言評曰。產後眩暈。頃刻害人。須量虛實爲治。若胸中宿有痰飲。阻病不除。產後多致眩暈。又血盛氣

弱氣不使血逆而上攻此等皆非清魂可療仍用半夏茯苓湯血壅須用牡丹皮散但缺藥尤難輒用當識輕重所謂擾乎可擾擾亦無擾若氣血平人同去血多致暈者芎窮湯尤佳

半夏茯苓湯

半夏湯洗三兩 茯苓 熟地各一兩 陳皮 細辛 蘇葉 川芎 人參 茯藥 桔梗 甘草各六錢

右咬咀每服四大錢水二盞薑七片煎七分去渣空心服下有客熱煩渴口生瘡者去陳皮細辛加前

胡知母腹冷下利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便祕小便濁加大黃一兩八錢去地黃加黃芩六

錢

牡丹皮散 治產後血暈悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

牡丹皮 大黃蒸熟 芒硝各一兩 冬瓜子半合 桃仁三十七粒去皮尖

右咬咀每服五錢水三盞煎至一盞半去渣入芒硝再煎分二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸癰但分兩少異

芎窮湯方在第十論

第五論曰產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上薰胸中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得一但服見睂丸

見睂丸

薑黃 京三棱 菖澄茄 陳皮去白 高良薑 人參 蓬莪茂

右七味等分爲末用細切蘿蔔漫火煮令爛研細將汁煮糊丸桐子大蘿蔔湯下三十九不以時

陳言評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷躁熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看病何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷見覲丸卻能作效四物湯方見第六論

第六論曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷藏府血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫若人誤作瘧疾治之則繆矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者以何別之答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯

當歸 人參 茵藥 川芎 炮薑各一兩 甘草

錢四

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣熱服

奪命丹

方見第三論

陳言評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二藏耶大抵一陰閉一陽卽作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰能寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再

會而復作。大調經散、五積散入醋煎佳。
大調經散 治產後血虛惡露未消。氣爲敗濁凝滯。榮衛不調。陰陽相乘。憎寒發熱。或自汗。或腫滿。皆氣血未平之故也。

大豆炒去皮一兩半 茯神一兩 真琥珀一錢

右爲末用濃煎。烏頭紫蘇湯下。

五積散 治感寒濕。與脾胃氣閉。腰腹痛。及有積聚。

蒼朮米泔浸一宿二十兩 桔梗十兩 陳皮六兩 白芷 甘草炙 當歸各二兩

白茯苓 半夏湯去滑各一兩 麻黃去節春秋二兩。秋冬三兩 乾薑春夏三兩。秋冬四兩 厚朴薑製炒二兩

芍藥

桂圓

分兩原

右先將前十二味咬咀。微炒令香。取出當風涼之。入後枳殼。桂朴三味。同爲細末。每服三錢。水一盞。薑三片。聚二枚。煎七分。食前溫服。產婦陣疎難產。經二三日不生。胎死腹中。或產母氣乏委頓。產道乾澀。加順元散水七分。酒三分。煎相繼兩服。氣血內和。即瘥。胎死者不過三服。當下其順元散量產母虛實。加減。

順元散

烏頭炮去皮尖二兩 附子炮去皮尖一兩 天南星炮各一兩 木香半兩

右爲末。同前法煎此藥。治內外感寒脈沉伏遲細。手足冷。毛髮枯槁。傷寒陰症。大啜一二杯。氣和汗出。

卽愈。

第七論曰。產後四肢浮腫者何。答曰。產後敗血乘虛停積于五臟。循經流入于四肢。流淫日深。卻還不得腐壞如水。故令四肢面目浮腫。醫人不識。便作水氣治之。凡治水腫。多用導水藥。極能虛人。夫產後既虛。又以藥虛之。是爲重虛。往往多致天枉。但服調經散。血行腫消。卽愈。

調經散

沒藥另研 琥珀另研 桂心 赤芍藥 當歸各一 細辛 麝香另研各半錢

右爲末。每服半錢。用生薑汁溫酒各少許。調勻服。

陳言評曰。產後浮腫多端。有自懷孕腫至產後不退者。有產後失於將理。外感風寒暑濕。內作喜怒驚憂。血與氣搏。留滯經絡。氣分血分。不可不辨。要當隨所因脈證治之。宜得其情。調經散治血分固效。但力淺難憑。不若吳茱萸湯、枳實湯、奪魄散、大調經散。皆要藥也。

加減吳茱萸湯 治婦人藏氣本虛。夙挾風冷。胸膈滿痛。腰脇絞刺。嘔吐惡心。飲食減少。身面虛浮。惡寒戰慄。或泄利不止。少氣羸困。及因生產藏氣暴虛。邪冷內勝。宿疾轉甚。

吳茱萸湯洗七次炒一兩半 乾薑炮 丹皮 桂心各半 桔梗 甘草炙 麥冬去心 防風 細辛 當歸酒洗炒半

夏湯洗七次 次 茶

右咬咀。每服四錢。水盞半煎七分。去渣空心熱服。

枳實湯 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分。

枳實麸炒去瓢一兩五錢 白朮一兩

右咬咀每服四錢水盞半煎七分去渣溫服腹中軟卽散。

奪魄散 治婦人產後虛腫喘促利便卽愈。

生薑取汁 白麵各二兩 半夏七個沸去滑湯

右以生薑汁溲麵裹半夏爲七餅子炙焦熟爲末熱水調一錢小便利爲效。

大調經散 最治產後腫滿喘急煩渴小便不利

方見第六論

第八論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛敗血停積上干于心心不受觸遂致心中煩躁起臥不安乍見鬼神言語顛倒醫工不識呼爲風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加生龍腦一捻得睡卽安。

調經散

方見第七論

按陳言第八論評闕。

第九論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後血氣弱多致停積敗血閉于心竅神志不能明了又心氣通于舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散

七珍散

人參 石菖蒲 川芎 熟乾地黃各一兩

細辛錢 防風 硫砂

研各半兩

右爲末每服一錢薄荷湯調下不以時

按陳言第九論評闕

第十論曰產後腹痛又瀉利者何答曰產後腹胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛入流于肓膜散于腸脣故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白腹脣膜脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫者以爲積滯攻之則禍不旋踵謹之

調中湯

良薑 當歸 桂心 芍藥 附子炮 川芎各一兩 甘草炙五錢

右㕮咀每服三錢七水三盞煎一盞去渣熱服

陳言評曰產後下利非止一證當隨所因而調之旣云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從自性況勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中赤白帶下非此能愈各隨門數別有正方今錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門中選用之

沉香桃膠散 治產後利下赤白裏結後重疼痛等證

桃膠瓦上焙乾 沉香 蒲黃紙隔炒各等分

右爲末每服二錢陳米飲調下空心服

白頭翁湯 治產後下利虛極。

白頭翁 甘草 阿膠各二兩 黃連 藥皮去粗皮 秦皮去粗皮 各三兩。

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去渣空心服。

第十一論曰。產後遍身疼痛者何。答曰。產後百節開張。血脉流走。遇氣弱則經絡分肉之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脉引急。故腰背不得轉側。手脚不能動搖。身熱頭痛也。若醫以爲傷寒治之。則汗出而筋脈動搖。手足厥冷。變生他病。但服趁痛散以默除之。

趁痛散

牛膝 當歸 桂皮去 白朮 黃耆 獨活 生薑各五錢 薤白 甘草炙各一分

右爲粗末。每服半兩。水五盞。煎至二盞。去滓熱服。

陳言評曰。趁痛散不特治產後氣弱血滯。兼能治太陽經感風。頭疼腰背痛。自汗發熱。若其感寒傷食。憂恐驚怒。皆致身腫發熱頭痛。況有蓐勞諸證尤甚。趁痛散皆不能療。不若五積散入醋煎用。卻不妨。第十二論曰。產後大便祕澀者何。答曰。產婦臥水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便祕澀不通也。若過五六日。腹中悶脹者。此有燥糞在臟腑。以其乾澀未能出耳。宜服麻仁丸以津潤之。若誤以爲有熱。而投之以寒藥。則陽消陰長。變動百出。性命危也。

麻仁丸

麻仁研 枳殼炙 人參 大黃各半兩

右爲末，鍊蜜丸梧桐子大空心溫湯下二十九丸，未通加丸數。

陳言評曰：產後不得利，利者百無一生。去血過多，藏燥，大便祕澀，則固當滑之。大黃似難輕用，惟葱涎調蠟茶爲丸，復以葱茶下之必通。

阿膠枳殼湯 治產後虛羸，大便祕澀。

阿膠 枳殼麸炒去瓤等分

右爲末，蜜丸如桐梧子大，別研滑石爲衣，溫酒下二十九丸，半日來未通，再服。

第十三論曰：產後血崩者何？答曰：產後傷耗經絡，未得平復，而勞役運動，致血暴崩下淋漓不止，或因鹹酸不節，傷蟲榮衛，氣衰血弱，亦變崩中。若小腹滿痛，肝經已壞，爲難治，急服固經丸以止之。

固經丸

艾葉 赤石脂煅 補骨脂炒 木賊各半兩 附子一枚，炮去皮臍

右爲末，陳米飲和丸梧子大，食前溫酒下二十九丸，米飲亦得。

陳言評曰：血崩不是輕病，況產後有此，是謂重傷。恐不止鹹酸不節而能致之，多因憂驚恐恚，藏氣不平，或產後服斷血藥早，致惡血不散，鬱滿作堅，亦成崩中。固經丸似難責效，不若大料煮芎窮當歸加芍藥湯，候定續次隨證合諸藥治之爲得。

芎窮散 治產後去血過多。暈悶不省。及傷胎去血多不止。懸虛心煩。眩暈頭重。目昏耳聾。舉頭欲倒諸

證。

芎窮 當歸洗去土、焙
乾各等分

右剉爲散。每四錢水一盞半。煎七分。去渣熱服。

第十四論曰。產後腹脹悶滿。嘔吐不定者。何答曰。血散於脾胃。脾受之不能運化精微而成腹脹。胃受之則不得受納水穀而生吐逆。醫者不識。若以尋常治脹止吐藥療之。病與藥不相干。轉更傷動正氣。疾愈難治。但服抵勝湯必瘥。

抵勝湯

赤芍藥 半夏湯洗
七次 泽蘭葉 人參 陳皮各二
錢 甘草炙一
錢

右咬咀作一劑。水三碗。薑半兩。煎至兩盞。去渣服。

按陳言第十四論評闕。

第十五論曰。產後口鼻黑氣起及鼻衄者。何答曰。陽明者。經脈之海。起于鼻。交額中。還出挾口。交人中。左之右。右之左。產後氣消血散。榮衛不理。散亂入于諸經。卻還不得。故令口鼻黑起。及變黑衄。此緣產後虛熱。變生此疾。其疾不可治。名曰胃絕肺敗。不出方。

按陳言第十五論評闕。

第十六論曰。產後喉中氣急喘者何。答曰。榮者血也。衛者氣也。榮行脈中。衛行脈外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無主。獨聚于肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰爲難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰于肺。亦令喘急。如此但服奪命丹。血出喘息自定。

奪命丹

方見第三論

陳言評曰。產後喘急固可畏。若是敗血上薰于肺。猶可責效奪命丹。若感風寒。或因憂怒飲食鹹冷等。奪命丹未可均濟。況孤陽絕陰乎。若榮血暴絕。宜大料煮芎窮湯。亦自可救。傷風寒宜旋覆花湯。性情鬱發。宜小調經散用桑白皮、杏仁煮湯調下。傷食宜見曉丸、五積散。見曉丸見第五論。五積散見第六論。芎窮湯見第十三論。小調經散則或即第七論中調經散。

旋覆花湯 治產後傷感風寒暑濕。咳嗽喘滿。痰涎壅塞。坐臥不安寧。

旋覆花 赤芍藥 半夏麪 前胡 麻黃去根節 荆芥穗 五味子 甘草炙 茯苓 杏仁各等分

右㕮咀。每服四錢。水一盞半。薑五片。棗一個。煮七分。去渣空心服。

第十七論曰。產後中風者何。答曰。產後五七日內。強力下牀。或一月之內。傷于房室。或懷憂發怒。擾蕩冲和。或因著炙。傷動藏府。得病之初。眼澀口噤。肌肉瞶搐。以漸腰脊筋急強直者不可治。此人作非偶爾。中風所得也。

陳言評曰。問產後中風。是外邪。血虛則或有中之者。直答以人作不可治。問答不相領解。如何開示。

後人立論之難有如此者若是中風當以脈辨看在何藏依經調之強力下牀月內房室憂愁着矣非中風類虧勞性氣火邪治各有法非產後病不暇繁引學者識之

第十八論曰產後心痛者何答曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏于血血凝不得消散其氣遂上衝擊於心之絡脉故心痛但以大巖蜜湯治之寒去則血脉溫而經絡通心痛自止若誤以爲所傷療之則虛極寒益甚矣心絡寒甚傳之正經則變爲真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大巖蜜湯

熟地 當歸 獨活 吳茱萸湯泡 乾薑炮 茯藥 桂心 甘草炙 小草各一

各二兩半

右剉爲散每服半兩水三大盞煎至一盞去渣微熱服

陳言評曰產後心痛雖非產蓐常痛庸或有之凡痛未必便是血痛設是巖蜜湯豈可用熟地黃等藥泥血安能去痛此方本出千金用生乾地黃吳茱萸一升合准五兩乾薑三兩細辛治陳寒在下焦方本一兩卻減作半兩制奇制偶量病淺深自有品數不可妄意加減然以巖蜜湯治血痛不若失笑散用之更效

失笑散 治心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

五靈脂 蒲黃微炒各

右爲細末先用釀醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

第十九論曰。產後熱悶氣上轉爲腳氣者何。答曰。產後血虛生熱。復因春夏取涼過多。地之蒸濕。因足履之所以着而爲腳氣。其狀熱悶癲癇。驚悸心煩。嘔吐氣上。皆其候也。服小續命湯兩三劑必愈。若醫者誤以逐敗血藥攻之。則血去而疾益增劇。

小續命湯

麻黃去節一枝泡
湯泡人參一錢半
桂心一錢半
甘草炙一錢半
白芍一錢半
川芎各一錢半
杏仁一兩。尖炒。泡去皮一錢半
附子一錢半

右剉爲散。每服四大錢水。一盞半。薑七片。棗二個。煮七分去渣。不拘時服。

陳言評曰。脚氣固是常病。未聞產後能轉爲者。往往讀千金見產婦多此疾之語。便出是證。文辭害意。可概見矣。是熱悶氣上。如何令服續命湯。此藥本主少陽經中風。非均治諸經脚氣。須要依脚氣方論陰陽經絡調之。此涉專門。未易輕論。旣非產後要病。更不繁引。

第二十論曰。產後汗出多而變痙攣者何。答曰。產後血虛腠理不密。故多汗。因遇風邪搏之。則變痙攣也。痙攣者口噤不開。背強而直。或發癟狀。搖頭馬鳴。身反折。須臾復發。氣息如絲。宜速幹口灌小續命湯。稍緩卽汗出如雨。手拭不及者不可治。

小續命湯見第十
九篇。

陳言評曰。產後汗出多變痙攣。亦令服續命湯。此又難信。旣汗多。如何更服麻黃、官桂、防己、黃芩輩。不

若大豆紫湯爲佳。大醫局方大聖散亦良藥也。

大豆紫湯 治中風頭眩惡風治汗吐冷水及產後有病中風癥瘕背強口噤直視煩熱。

獨活一兩半 大豆半升 酒三升

右先浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急投酒密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈日數十服此湯能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得瘥。

大聖散方略

第二十一論曰。產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以榮血爲主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾此但虛極生風也如此急服濟危上丹神良若以風藥治之則誤矣。

濟危上丹

乳香研 五靈脂研 硫黃研 大陰元精石研 陳皮白去 桑寄生 真阿膠炙搗 卷柏生分等

右將上四味同研勻石器內微火上炒勿令焦再研極細後入餘藥末用地黃汁糊丸梧桐子大產後溫酒下二十九當歸酒亦得。

陳言評曰所下過多傷損虛竭少氣唇青肉冷汗出神昏此皆虛脫證何以謂之生風風是外淫必自感冒中傷經絡然後發動臟腑豈能自生風也風虛之說蓋因脈經云浮爲風爲虛此乃兩病合說在人迎則爲風在氣已則爲虛後學無識便謂風虛是一病謬濫之甚學者當知。

產育寶慶集卷下

宋 郭 稽 中 纂

產乳備要

娩乳大故方書浩博。自非素習。誰能適從。危殆之間。頗難應用。今採摭諸方論中。將護要法。及預備經效。要用湯藥。名曰產乳備要。務從簡易。以救倉卒。

凡產婦合要備急湯藥。並須預先修合題號。恐臨時倉卒難致。臨月慎勿多飲酒。卽依產圖方位。擇深靜房室。入月一日卽貼借地法于房內北壁。薰令香潔。安產藏衣方位。此與太平聖惠方同。但彼以支言。而此以干言。故兩存之。

正月丙位安產吉。 壬位藏衣吉。 丁天德藏衣吉。
二月甲位安產吉。 庚位藏衣吉。 坤天德藏衣吉。
三月壬位安產吉。 丙位藏衣吉。 壬天德藏衣吉。
四月庚位安產吉。 甲位藏衣吉。 辛天德藏衣吉。
五月丙位安產吉。 壬位藏衣吉。 乾天德藏衣吉。
六月甲位安產吉。 庚位藏衣吉。 甲天德藏衣吉。

七月壬位安產吉。丙位藏衣吉。癸天德藏衣吉。

八月庚位安產吉。甲位藏衣吉。艮天德藏衣吉。

九月丙位安產吉。壬位藏衣吉。丙天德藏衣吉。

十月甲位安產吉。庚位藏衣吉。乙天德藏衣吉。

十一月壬位安產吉。丙位藏衣吉。巽天德藏衣吉。

十二月庚位安產吉。甲位藏衣吉。庚天德藏衣吉。

凡欲生產切不得喧鬧。產婦房門常須關閉。選一年高性和善產婆。又選穩審謹慎家人一兩人扶持。切不用揮霍。致令產婦憂恐。又忌閑雜外人。喪孝穢濁之人瞻視。若不慎之。定是難產小兒。若干腹中痛來。但令扶行或行不得且立候。行得便行。或痛作陣。眼中如火生。此是兒回轉。卽進琥珀散一服。直至行不得。卽扶上蓐草。務要產婦惜力。或心中熱悶。取白蜜一匙。新汲水調下。或未解。卽吞生雞子一枚。

琥珀散 治產後惡露不盡。結聚小腹疼痛。

琥珀半兩。當歸三分。炒。沒藥半斤。青橘皮半兩。白薑半兩。湯浸去。赤芍藥半兩。木香半兩。桂心半兩。

香附子一兩。

右藥擣細爲散。不計時候。以豆淋酒調下一錢。

若產後心空。但時與琥珀散一服。或煎芍藥湯進之。更不用他治。當進溫粥。慎勿與熱食。食熱則滯血。或

三五日內但覺腹中搗痛。兒枕未定。卽進定痛散二服。

芍藥湯 治產後因血不快利氣上攻心腹疼痛。

芍藥二兩 黃蓍剉 白芷 人參 芍藥炒 生乾地黃焙 甘草一兩 各 白茯苓 去黑皮一兩半

右爲粗末。每服三錢。七水一盞。煎取七分。去渣。入酒少許。溫服。不拘時候。

芍藥湯 治產後虛乏。不思飲食。四肢昏倦。心腹陣痛。補虛治氣。

當歸切焙一兩半 人參 肉桂 生薑後入 甘草一兩 各 芍藥二兩

右爲末。每服三錢。水二盞。入棗二枚。煎至一盞。去滓。溫服。日三次。

定痛散 治產後惡血不止。腹內熱痛。不可忍。及兒枕未定。

當歸切焙一兩半 芍藥各一兩 或以桂心川芎代之

右爲末。每服二錢。水酒共一盞。生薑一塊。彈子大拍破。同煎至六分。去滓。溫服。

夫人生產。自有時候。痛不甚者。名曰試痛。宜須強行熬忍。宜食軟飯。若食飯不得。卽宜食粥。及飲蜜漿。勿令飢渴。恐產婦無力。困乏。若經時不產。進通靈散一服。若生畢。暖少許醋墨至呻。以童子小便。調七寶散一服。心中自然開爽。不住燒磚石。以醋沃之。直至七日。要令產婦鼻中常聞醋氣。宜燒茅香、白芷、皂莢等物。慎勿令見穢惡。若產訖。忽覺心中昏悶或眼花。如在舟車中。卽是血暈。急須服牡丹飲子黑神散。

通靈散 催生。

用蛇蛻皮一條全者緊捲以蚯蚓泥裹燒黃近藥處泥些少用不妨細研爲末每服一錢溫酒調下。

又方 治產後惡血不下兒枕不散小腹疼痛

細墨濃研半盞 好醋半盞 沒藥分

右用童子小便少許同煎五七沸溫服不拘時候

七寶散 治初產後勻血和氣補虛壓驚悸

硃砂研如粉 桂心 乾薑炮 當歸切焙 川芎 人參 羚羊角灰 茯苓各等分

右各杵爲細末若產婦平和三臘以前直至滿月每日各取一小匙以羌活豆淋酒調者空心服若覺心胸煩熱卽減薑桂冷卽加之腹痛加當歸心悶加羚羊角心中虛氣加桂不下食或恶心加人參虛戰加茯苓以意斟酌日二夜一服不飲酒者以童便溫調下

牡丹飲子一方缺

黑神散 防暈備急

驢護肝不拘多少以桑柴火燒以刀刮取黑煤更刮令盡研細入真麝香少許如纔產了及覺血上衝心暈悶取一錢以熱酒和童子小便調下

薑粉散 纔產服此藥盞兒枕除百病源

當歸 官桂不得見 人參 茯苓 甘草 茵藥 知母 川芎 大黃炒 黃耆 木香 草

豆蔻 白朮 藝子 高良薑 青橘皮去瓢 熟地黃少許

右除地黃外各等分焙乾次用附子一箇中様半兩者炮製入衆藥生薑一片研取自然汁於碗器中停留一食久傾去清汁取下面粉脚攤在蒻葉中入焙籠焙乾共合地黃搗羅爲末纔產後用末三錢水一盞薑三片棗子一個擘開同煎至七分乘熱喫喫後自然產母睡着半日以來睡覺再服全除卻腹痛一日只可三服至九服不可多服肚中冷也。

當歸血竭丸 治婦人產後惡物不下結聚成塊心胸痞悶臍下堅痛

當歸炒 血竭 蓬莪遠炮 芎藥各二兩 五靈脂四兩

右爲細末醋麪糊丸桐子大每服四十九溫酒下或溫粥飲下空心食前服

烏金散 治產後諸疾

紅芍藥 川當歸 乾薑 蒲黃 甘草 熟乾地黃各一兩

右各爲末別用黑豆一合炒令香熟去皮除蒲黃與餘藥共杵爲細末於銀器中漫火炒紫色後入蒲黃如產後別無疾每日服一盞豆淋酒調下更不生諸疾若稍有不安服卽愈如產後血逆心悶腹悶痛一兩服立止

血竭散 治產後百疾

血竭 沒藥剪碎

右等分輕手研細頻篩再研取盡爲度每服二錢用小便合陳酒半大盞煎一沸溫調下纔產下一服上床良久再服其惡血自循下行更不衝上免生百病

保安丸 治產前產後三十六種冷血氣半身不遂手脚疼諸疾並宜服之

赤茯苓去皮 牡丹皮 白芍藥各三分 吳茱萸 沉香各一分 人參去蘿

當歸洗切

桂皮

牛膝酒浸 香白芷 木香 藥本蘆 麻黃去根節

川芎 附子炮去皮

細辛搗淨

蘭香葉

甘草剉炙 寒水石燒去皮 防風去蘿 桔梗去蘿

蟬殼去足翅各半兩

馬鳴退一兩

生乾地黃一兩

右爲細末揀蜜爲丸如小彈子大每日空心用溫酒化下一丸療八風十二痺症瘕乳房中風淋血積聚并治胎不安子死腹中不過三丸可下死胎生衣不出一丸便效產前產後癟并赤白帶下及嘔逆填心疾氣煩滿一丸瘥產後或產前腹中疼痛違臍下如刀刺相似一丸便止產難月可日一服至產不覺疼痛產前傷寒中風體如板煎麻黃湯化下一丸立效經脈不通或頻併或赤白喫食無味瘦惡乍寒乍熱面赤唇焦手足煩疼遍身黑點血斑一切病服此藥悉愈每一丸細嚼宜空心溫湯送下

二聖散 治產前安胎產後惡血不盡及胎衣不下

羌活 川芎等分

右爲細末每服二大錢酒少許水七分沸調溫服

方 治產後血痛如刀刺

熟乾地黃 橘皮等分

右爲末每服一錢粥飲調下尋常痛發可常服。

方 治產後頭痛大金良方作奇散

大川芎爲末每服二錢水一盞煎至七分溫服立瘥。

方 治產後咳逆

石蓮十箇炒然 丁香十箇

右爲末用米三合煎十沸溫服。

方 治產後咳逆不止

狗膽一箇 磨砂 丁香 五靈脂各少許

右爲末以狗膽丸如白豆大每服一丸生薑水磨下。

方 治產後小便不通

右用葱爛擣蜜調以紙花貼臍下。

若三日後覺壯熱頭痛此是乳脉行卽進玉露散二服或大小便祕澀或發寒熱頭痛四肢如碎此是蓐勞或產後大渴胎損吹妳咳嗽別生他疾及帶起宿患亦宜檢尋別方治之月內不宜多語笑強起離床行或作針線運動恣食生硬不避風脫衣洗浴當時雖無大損滿月後或成蓐勞手脚及腰腿酸重冷痛。

骨髓間颶颶如風吹縱有名醫卒不能療大都產婦將息須是百日方可平復大慎犯觸因此多致身體強直如角弓反張名曰蓐風遂至不救小有虛羸失於將補便成大患終身悔不及矣慎之慎之

玉露散 治產後乳脉行煩熱或大腸滯澀肌體疼痛涼膈壓熱下乳

茯苓 人參 甘草炙各半兩 桔梗 白芷 川芎各一兩 川大黃 當歸炒各一分 茵藥三分

右爲末每服二三錢水一盞煎至七分溫服日三若臟腑洩瀉卽除大黃

湧泉散 下妳

川山甲半兩炒令輕空 脂麻退皮合 胡桃二個敲去殼湯浸去皮 肉豆蔻麪包火內炮令麪焦去麪不用

增損四物湯 與一便良方同云治產後乍寒乍熱無他痛處者陰陽不和只無人參

當歸 茵藥 人參 川芎 乾薑各一兩 甘草四錢炙

右爲末每服二錢水一盞生薑五片同煎至六分去滓微熱服不以時

若產後四肢安和亦不用多喫酒藥緣氣虛禁持未得卻多昏眩唯飲童子小便無妨且勿平身側臥夜常須一人看承令堅起兩膝臥睡卽須頻喚覺虛羸困乏無力卽空心進理中丸七寶散七日外恐喫粥無味或虛乏無力卽爛煮羊肉汁黃雌雞汁作粥未可喫肉亦不可喫生冷及硬物便成積滯之患常以淨黑豆一升炒令煙出以酒五升澆淋入羌活一兩搗碎同浸常用此酒下藥或時飲一盞大辟風邪令諸疾不生

理中丸方缺。

七寶散見前。

方 治小兒傷食。吐不止。

丁香粒一十 巴豆油一個不出 只用殼 縮砂仁五箇 大烏梅箇

右爲細末。丸如黍米大。每服二三丸。煎薑香湯下。乳後服。

經氣調治法

論曰經候者。經脈之常候。血氣運行。恆久之度也。陰陽愆伏。則月候失常。以致太過不及。乍多乍少。或前或後。陰氣乘陽。胞寒氣冷。血不運行。故乍少。陽氣乘陰。血熱流散。故乍多。陰過於陽。則期前來。陽過於陰。則期後至。久則或崩漏不止。斷絕不行。至使面色不澤。臍腹時痛。久不治之。漸致虛損。令人斷產。變生他疾。皆由衝任虛弱。榮衛不調。所致也。婦人賦柔弱之質。易感易傷。氣以榮養之。血以滋潤之。氣行則血隨而行。氣滯則血凝而窒。當調其陰陽。順其血氣。一有偏勝。則經候不調。百病生矣。可不慎哉。

滋陰丹 養血和氣。理治榮衛。充盛肌膚。活血注顏。久服大補衝任。調順月經。

熟乾地黃 生乾地黃 人參 白茯苓各二兩 黃耆 甘菊花 枸杞子 丹參 柏子仁炒

白芍藥各一兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服五十九米飲下。空心食前。日進二三服。

沒藥丸 治婦人水經不調。肌瘦發熱。飲食減少。

沒藥 荊蔚子 乾薑 蒼朮 川芎 熟乾地黃 白芍藥 當歸各一
血竭半兩。

右除血竭、沒藥外。咬咀先炒荊蔚子焦黃色。次下乾薑炒令黃。次下蒼朮微黃色。次下川芎等藥並令
微黃色。與血竭、沒藥等同爲細末。醋煮麵糊爲丸。桐子大。每服五六十丸。漸加至八十九丸。空心食前。
溫酒或醋湯亦得。日進二服。

地黃膏子 治婦人本藏血氣衰乏。困倦無力。或發虛熱。飲食減少。並宜服之。

熟地黃八兩。淨蜜十八兩。

右將熟地黃爲末。同蜜熬成膏子。丸桐子大。空心食前。每服四五十丸。溫酒下。米飲亦得。或作膏子酒
化服。不飲酒白湯亦得。

八珍散 調和榮衛。理順陰陽。滋血養氣。進美飲食。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 人參 茯苓 甘草炙 級砂仁各等分。

右爲粗末。每服三錢。水一大盞。生薑七片。棗三枚。去核。同煎三五沸。去渣。放溫。空心。日進二服。

萬病丸 治婦人久虛。血氣衰少。怠惰嗜臥。飲食不進。肌體瘦悴。精神不足。十便良方。名滋陰萬病丸。鄭汝明產經。名內補丸。

熟乾地黃 當歸各四兩。

右爲細末。麪糊爲丸。桐子大。空心食前。每服五十九。溫粥飲下。

大保生丸 調和本氣治療諸疾滋補榮衛久服之大有功效。

人參 薑本 白茯苓 當歸 赤石脂 生乾地黃 白芷 延胡索 肉桂皮

白芍藥 白

薇 川芎 白朮 甘草炙 没藥 牡丹皮半兩

右爲細末煉蜜和丸彈子大空心食前每服一丸溫酒化下。

六神散 治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補真養氣進食充肌。

當歸 熟地黃 川芎 地骨皮 黃耆 白芍藥各一兩

右爲粗末每服五錢水一盞半煎至八分去渣空心溫服。

當歸沒藥丸 治婦人真氣虛憊血氣極少不能榮養致使經氣不來或發寒熱飲食減少怠惰嗜臥以致勞虛。

當歸

炒剉 沒藥 天仙子炒黑色 乾薑炮 蒼朮炒黃色 芍藥 熟乾地黃 川芎各等分

右爲細末麪糊爲丸桐子大每服五十九溫粥飲下食前服。

活血散 治衝任氣虛經事不調或多或少或前或後並皆治之。

當歸 川芎 白芍藥 柴胡各四兩 肉桂去粗皮二兩

右爲粗末每服五六錢水一盞半煎至七分去渣稍熱食後服。

說說丸 治衝任不和子藏怯弱或經墮胎後元氣不復此藥常服調和衝任氣血。

當歸 熟地黃各一兩

延胡索 澤蘭葉各一兩半

川芎 赤芍藥 白薇 人參

金釵石斛各一兩

牡丹皮一兩

右爲細末。醋麪糊爲丸。桐子大。每服五十九。空心溫酒下。或粥飲亦得。

加味四物湯 治婦人衝任不調。臍腹疼痛。月事入時不來。及衝任太過。致使陰陽不和。或發寒熱。減食

和飲欲成勞病。

當歸 地黃 茄藥 川芎各一兩 半

柴胡

黃芩二錢半

右咬咀。服食依前法。

地髓煎丸 治婦人經氣不調。虛煩發熱。肌體瘦悴。形羸弱困。飲食不進。欲成勞病。

熟乾地黃不計多少

右爲末。煉蜜爲丸。桐子大。每服五十九。空心食前。溫粥飲下。

當歸地黃丸 治婦人血氣不和。月事不勻。腰腿疼痛。

當歸 熟地黃 川芎 白芍藥各二兩 各一兩

牡丹皮 延胡索各一兩

人參 黃耆各半兩

右爲末。煉蜜和丸。桐子大。每服三十九。米飲下。食前日二服。平養氣血。

滋血湯 治婦人皮聚毛落。心肺俱損。血脉虛弱。月水愆期。益氣養血。調進飲食。

人參 白茯苓去皮 熟乾地黃 川芎 當歸 白芍藥 黃耆 乾山藥各一兩

右爲粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去渣溫服下。

滋榮丸 治婦人本經衰弱愆期不來及有血結成塊臍下堅硬疼痛不消並宜治之。

熟乾地黃

人參

五味子

赤芍藥

當歸

遠志

去苗

白茯苓

皮去

牡丹皮

桂心

藁本

各一兩

防風

卷柏

細辛

山藥

各半兩

白朮

三錢

右爲細末煉蜜和丸桐子大每服三十九食前空心溫酒下日進三服。

當歸良薑散

補養血氣去心腹疼悶脇肋脹滿經絡不調或赤白帶下腰脚疼痛一切痼疾。

高良薑

五兩

厚朴

二兩去皮

當歸

二兩

桂

去皮二兩

右爲粗末每服二錢水一盞艾十葉同煎至七分去滓食前熱服。

抽刀散 治婦人心腹脇肋疼痛不忍產前後亦用。

川烏頭

炮去皮解

牡丹皮

芍藥

乾薑炮

桂心

沒藥

當歸

各等分

右爲細末每服二錢熱酒調下不過三服輕可一服產後加紅花。

禹餘糧散

治氣血傷衝任虛損崩傷帶漏久而不止或下如豆汁或成片如肝或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛面體痿黃心忪悸動發熱多汗四肢困倦飲食減少。

禹餘糧

醋淬

伏龍肝

赤石脂

白龍骨

牡礪

烏魚骨

桂皮

浮石

各等分

右爲末每服三錢煎烏梅湯調下食前服白多加牡礪龍骨烏魚骨赤多加赤石脂禹糧黃多加伏龍

肝、桂心隨病加治。

禹餘糧丸 治婦人諸病方。

桂皮去 · 禹餘糧淬燒醋 · 龍骨 · 人參 · 紫石英 · 川烏頭 · 桑寄生 · 杜仲去皮炒 · 五味子 · 遠志
心 · 泽瀉 · 當歸洗切焙 · 石斛根 · 蔓荳 · 乾薑各二兩 · 川椒去目炒出汗 · 牡礪 · 甘草炙 ·

右爲末，煉蜜爲丸，桐子大，每服二十九米飲下，漸加至三十九日三服。

五聖散 調益榮衛，滋養氣血，治衝任虛損，月水不調，臍腹疼痛，崩中漏下，血瘕塊硬，發歇俱疼，妊娠宿冷，將理失宜，胎動不安，血下不止，及產後乘虛風寒內搏，惡露不下，結生瘕聚，小腹堅疼，卽作寒熱。

當歸 熟乾地黃 川芎 白芍藥各一兩 · 生乾地黃三兩 ·

右爲末，酒煮麪糊爲丸，桐子大，每服六七十九食前溫酒送下。

延齡護寶丸 治婦人血藏虛損，經候過多，每行時暴下，不可禁止，因成崩中，連日不斷，致五臟空虛，失色，黃瘦，崩竭暫止，日少復發，不耐動搖，小勞輒極劇，此藥但空心服，大有效。

禹餘糧石二兩，淬七遍燒醋 · 龍骨 · 人參 · 桂 · 赤石脂 · 紫石英研 · 熟地黃 · 杜仲剉碎去粗皮 · 桑寄生
續斷 · 香白芷 · 茜草 · 當歸剉炒 · 遠志去 · 金釵石斛去根剉炒 · 白茯苓皮 · 阿膠炒 ·

牡蠣 五味子 艾葉各一兩 ·

右爲末，煉蜜爲丸，桐子大，每服四五十丸，溫粥飲下，空心食前服。

必效散 治婦人本經不調及崩漏不止。

櫻皮燒二兩 木賊存性去節燒灰 研細 麝香錢

右爲細末每服二錢食前溫酒調下。

方 治內損吐血。

飛過麪不計多少微炒過濃磨陳墨一茶脚調下二錢立效。

方 治非時吐血。

荆芥連根洗淨擣汁半盞飲之。

又方

生地黃自然汁一盞槐花揀淨一兩用地黃汁炒槐花候地黃汁盡花乾每用三五十粒細嚼之。

又方

新綿半兩燒令存性分二服濃煎人參湯調下。

靈寶散 治血氣刺痛引兩肋疼痛及痃癖刺氣。

丁香半錢 木香半錢 乳香半錢 當歸 延胡索 白芍藥各半兩

右爲末每服一錢溫酒調下食前服。

烏金散 治血崩漏下最治產後血崩并小產血崩漏下。

櫻櫞皮 烏梅 乾薑
燒灰存性各等分

右爲末。每服二大錢。煎烏梅湯調溫服。不以時。

旋覆花丸 治停痰積飲在脇下久而不愈漸成大癰心腹脹滿羸瘦不能食食不消化喜睡乾嘔大小

便或濁或利在腸中搖動有水聲或口乾如飢水漿兩脇痛利服之必安少服柏子
桂枝湯一服

旋覆花莖去根桂皮去桂心枳實去瓢人參各一錢半乾糞炮芍藥白朮各一錢半

狼毒	川烏頭	炮去皮曬
礬石	燒赤·各兩七錢半	
芫花	醋浸炒乾	
吳茱萸	湯浸去滑炒黃色	
橘皮	細辛葉	去苦

大黃 微炒 · **黃芩** 去黑心 · **厚朴** 去皮生薑製 · **葶苈** 隔紙炒 · **七錢牛** · **各** · **甘遂** 炒兩半

右爲細末。煉蜜和丸桐子大。每服一十九至二十九。日二服。不拘時候。

妊娠調養法

螽斯丸 治婦人無子術。金城太守范羅謙上。臣驗此術。若服藥四十日無子。請戮臣一家。以令天下。醫

人又名賜子丸。陳無擇三因方作秦桂丸，施圓端效方作白薇丸。

附子	生 · 去皮 · 去
白茯苓	去黑皮 · 去
白薇	半夏
半夏	湯洗 · 七次 ·
杜仲	去粗皮 · 去粗

風乾薑生牛膝沙參錢各二
細辛去苗半兩人參錢四

右爲細末。煉蜜丸如小豆大。日服五十丸。空心任下。如覺無益。稍加丸數爲度。如服七日後。陰陽覺有

娠三日後不可更服。臣妻年二十七歲無子，服此藥有娠，又殘藥與前太子中舍宇文妻李氏，年四十。

歲無子服此藥十三日有娠此藥名螽斯丸屢用屢驗此方不可不廣與人如夫不在家不可服

凡女人妊娠若素虛羸血氣不足體中有風氣心下多痰水者欲有胎喜病阻其狀顏色如常脈理和順但覺肢體沉重頭目昏眩不思飲食惡聞食氣多噉鹹酸心中憤懣不知患之所在以至三四月以後則大劇吐逆不能勝舉如此有證則宜服療阻病竹茹湯人參散地黃丸

竹茹湯方闕

人參散 治初娠惡食嘔逆

人參一兩 枳殼三分 炒去青 黑熟地黃一兩
厚朴一兩 塗炙甘草半兩 薑汁各一兩

右爲粗末每服四錢水一盞半入生薑彈子大一塊拍破同煎至七分去滓溫服不拘時候

地黃丸方闕

夫妊娠藏氣皆壅關節不利切不宜多睡食粘硬難化之物亦不須亂服湯藥大慎鍼灸惟須靜安心神不得悲憂驚恐負重振動若覺胎藏不安腹中微痛心意煩悶四體昏倦宜服安胎順氣阿膠散近難月即服順胎保安散千金丸

阿膠散 治妊娠不問月數深淺因頓仆胎動不安腰腹痛或有所下或胎奔上刺心短氣

熟乾地黃二兩 細切 艾葉一兩 切當歸一兩 烘焙甘草炙芍藥川芎阿膠炙令燥色各一兩 黃耆一兩 加至兩

右爲末每服四錢水一盞半煎至八分溫服若胸中冷逆氣加生薑五片棗五枚同煎服。

保安散

治妊娠胎氣不安心腹痛

當歸一兩半
切焙

人參兩

阿膠炙令燥

甘草炙各半兩

右爲末每服三大錢水一盞半入葱白一莖拍破煎至八分去滓食前溫服未定再服。

千金丸 治產前後一切風冷血氣等候產前胎氣不安腰腹疼痛四肢昏倦妊娠臨月預合下每日空

心一服臨產五臟不痛易產蓐中不生諸疾兼治產後惡血不盡及胎衣不下增寒壯熱吐逆煩悶皮

膚虛腫或血暈狂迷眼見神鬼能調勻血氣

金釵石斛

別搗爲細末

秦艽

川椒去子微炒

細辛

防風

貝母

微黃鉄炒

熟乾地黃

切焙

糯米

甘草

大分各

當歸切

大麻仁

黃芩

乾薑炮

大豆蔻

以黑豆生芽焙乾用

各三分

是二寸

石膏

半分

右精研爲末以煉蜜成劑入臼中杵一千下分爲七十二丸擇除破天德月德日合每服一合溫酒調下產後產前赤白帶下溫酒嚼下產前後血風薄荷湯嚼下月信不通當歸酒下臨產艱難或三五日難產及胎衣不下子死腹中橫生倒產死絕不語但心頭有熱氣用藥一丸姜棗湯研化灌之下喉立瘡產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐壯熱增寒煩悶月候不調或少肢體虛怠皮腹浮腫產血不止虛勞中風口噤不語半身不遂產前後赤白痢大小便祕澀血暈狂語頭痛面色痿黃漸成勞瘵飲食無味並溫酒研下一丸產前臨月每日一丸至臨產用當歸酒下一兩丸催生五臟不痛易生

救生散 安胎益氣易產

人參半

訶子 濕紙裹煨令
熟去核

白朮 剁炒

陳橘皮炒去白

大麥蘖炒黃

神麴 細剁炒黃
各半兩

右爲末每服二錢水一盞煎至六分空心溫服入月加一倍水二盞煎一盞溫服能令兒緊小乳母無患十月厥陰行令地氣不收冬氣不藏萬物反生時有濛霧人病關閉不禁心痛陽氣不收氣嗽孕婦多暴死及墮胎之病宜服暖肝藥以治之治婦人胎動不安方無間太歲但寅申年十月瀕有濛霧淒清之化孕婦有胎動不安之病宜進後方

方

人參分

防風分

當歸分

五味子分

白朮分

續斷分

川芎半兩

桑寄生

甘草分

細辛分

右爲末每服一錢水一大盞煎至七分空心去滓服

方 治妊娠患時疾

黃芩分

尖如錐者

鬱金各一兩

右爲末每服一錢板藍根地黃水下汗出效未得汗再服卽瘥夏子益衛生十全方內有白朮一錢

石脂散 治妊娠瀉痢

赤石脂錢六

乾薑錢四

糯米一合
炒黃

右爲末分爲二服水二盞煎至一盞食前溫服。
戊己丸 治泄瀉水穀不分謂之飧瀉方缺