


姚若琴編著
陸淵雷校閱

臨證醫典

上海二民圖書公司藏版



3 0534 4270 7

為若琴書

博采眾方

章灼麟



臨證良師

鈕永達



吳孫學先

千金之裘

錢樞



南針寶筏

丁仲英



若琴先生

菊
怡
津
梁

夏应堂



醫
西
林
正
軌

謝利恒



臨證醫典序

自活字排印之法行。而書籍之成就易。自標榜宣傳之法行。而營利之計術工。以甚工之計術。作易成之書冊。於是新出醫書。充棟而不勝庋。汗牛而不勝載矣。報紙廣告所載。莫非名醫撰述。名人題序。莫非人人宜讀。保證學成。吾試讀焉。則勦襲割裂。轉相裨販。不終一篇。棄去唯恐不遠。吾喜讀醫書。獨不敢讀並世名醫之書。並世名醫作者。亦無敢乞吾題序者。此無他。志在學術。與志在宣傳

營利。道不同。不相爲謀也。姚子若琴。篤實好學士也。供職於商務書館。以其餘緒作醫。僚友數千。病而求治焉。應手輒愈。書館燬於兵燹。若琴始專業醫。嘗手一冊稿。請爲點定。曰。平日讀書臨證所裒集。用中醫最習見病名。分門類證。而撮取效方。自仲景以至近世。排比其下。故曰臨證醫典云。余惟千金外臺以後。方書至多。然其用法效否。非經試則不知。臨病者不能無決擇。吾執匕以來。常諦審其主療之文。揣度其藥物之性。試之病者。得必效方數十首。今

檢若琴之書。大抵在焉。於是知若琴之用功勤而決擇精。視彼宣傳營利之作。相去奚啻雲泥也。因爲之是正若干事。序其簡端以歸之。壬申九秋。陸淵雷。

體溫脈搏表

搏		脈		溫		體	
140	醒	初生	健	36.7	攝華	常溫	健體
90-100	睡			98			
90		子童	體	38-38.4	攝華	低熱	病
70-76		壯少		100.4-101			
68		老衰	病	38.5-39	攝華	中熱	體
90	上下	熱低		101.3-102.3			
100	上下	熱中	體	39.5-40.5	攝華	高熱	體
120	上下	熱高		103.1-104.9			

例言

一 國醫治病。有鍼灸按摩諸法。而方藥實爲大宗。病萬變。則方藥亦萬變。而醫之陋者。或守數首

套方以應付萬病。於是競尙淡薄。以求逃責。醫風之下。有自來也。是編蒼萃古今醫方。皆對證發藥。確然有效者。名曰臨證醫典。苟能按證求索。則可治而失治者鮮矣。

二 選用方藥。必須與證候相對。乃能見效。是編每病冠以證解。略

論病源及治法大綱。醫家得之可以補充學識。病家得之可以不致倉皇失措。惟言之不能甚詳。則因是編爲方藥書。非病理書故。閱者諒焉。

三 病之分類。古今醫書遞有出入。核以科學。俱未盡善。是編以通俗易曉爲主。不參學術上之主張。故病類間有不合學理者。要以便於常人檢閱耳。

四 傷寒溫病。包括多數急性傳染病。是編不以傳染病分類。而以傷寒溫病分類者。亦從俗也。閱者

須知傷寒溫病諸方多通用。斯可矣。治傷寒須從仲景傷寒論。近世醫風日下。仲景方久置高閣。是編采傷寒獨多。所以匡俗也。方書通例。婦人小兒各爲一門。婦科之胎產經帶。爲男子所無。小兒之痧痘。腦脊髓膜炎等。非小兒所獨有。而小兒患者較多。今亦從俗入於小兒科。

六 市上賣醫書者。鈔錄套方千百首。輒云萬病自療。無師自通。大言欺世。識者嗤之。然患病者得是編。雖未能不求醫而自療。若

以校閱醫士之方藥。知其對證與否。可服與不可服。則綽有餘裕。古今醫方之分量。均不符合。概從刪略。後附之處方用量表。尤便於學者參攷。然則是編不獨有益於醫家。亦且有益於常人攝生矣。

此書編著時。深得陸淵雷先生之商榷。並隨時予以拾遺訂誤。獲益甚多。而徐衡之先生及章次公先生頗關懷此編。俾得時時請益於醫室。編校二載。始底於成。然舛謬之端。誠知難免。近代學者。當有以督責教誨之也。民國十九年國慶日 後學姚若琴識

天
414.6
334

目次

內科

傷寒 百十三方

桂枝湯……………二
 桂枝加附子……………五
 桂枝加桂湯……………五
 桂枝去芍藥湯……………五
 桂枝去芍藥加附子湯……………五
 桂枝加厚朴杏仁湯……………五

小建中湯……………五
 桂枝加芍藥生薑人參新加湯……………六
 桂枝甘草湯……………六
 茯苓桂枝甘草大棗湯……………六
 桂枝麻黃各半湯……………六
 桂枝二麻黃一湯……………七
 桂枝二越婢一湯……………七
 桂枝去桂加茯苓白朮湯……………七
 桂枝去芍藥加蜀漆……………七

龍骨牡蠣救逆湯……………七
 桂枝甘草龍骨牡蠣湯……………八
 桂枝加葛根湯……………八
 桂枝加芍藥湯……………八
 桂枝加大黃湯……………八
 麻黃湯……………八
 麻黃杏仁甘草石膏湯……………九
 大青龍湯……………一〇
 小青龍湯……………一〇
 麻黃附子細辛湯……………一〇

麻黃附子甘草湯	一一
葛根湯	一一
葛根黃芩黃連湯	一一
葛根加半夏湯	一一
小柴胡湯	一一
大柴胡湯	一四
柴胡加芒硝湯	一四
柴胡桂枝湯	一五
柴胡加龍骨牡蠣湯	一五
柴胡桂枝乾薑湯	一五
梔子豉湯	一六
梔子甘草豉湯	一六

梔子生薑豉湯	一七
梔子乾薑豉湯	一七
梔子厚朴枳實湯	一七
梔子藥皮湯	一七
枳實梔子豉湯	一七
大承氣湯	一七
小承氣湯	一九
調胃承氣湯	二一
桃核承氣湯	二二
抵當湯	二二
抵當丸	二三
十棗湯	二三
大陷胸湯	二四

大陷胸丸	二五
小陷胸湯	二五
白散方	二五
麻仁丸	二五
半夏瀉心湯	二五
大黃黃連瀉心湯	二六
附子瀉心湯	二六
生薑瀉心湯	二六
甘草瀉心湯	二七
黃連湯	二七
黃芩湯	二七
黃芩加半夏生薑湯	二七

乾薑黃芩黃連人參湯……………二七
 旋復代赭湯……………二八
 厚朴生薑甘草半夏人參湯……………二八
 白虎湯……………二八
 白虎加人參湯……………二八
 竹葉石膏湯……………二九
 五苓散……………二九
 豬苓湯……………三〇
 文蛤散……………三〇
 茯苓甘草湯……………三〇
 四逆湯……………三一

四逆加人參湯……………三二
 通脈四逆湯……………三二
 通脈四逆加豬胆汁湯……………三三
 乾薑附子湯……………三三
 白通湯……………三三
 白通加豬膽汁湯……………三三
 茯苓四逆湯……………三四
 四逆散……………三四
 當歸四逆湯……………三四
 當歸四逆加吳萸生姜湯……………三四
 姜湯……………三四
 理中丸……………三四

真武湯……………三五
 附子湯……………三五
 甘草附子湯……………三六
 桂枝附子湯……………三六
 桂枝附子去桂加白朮湯……………三六
 茯苓桂枝白朮甘草湯……………三六
 芍藥甘草附子湯……………三七
 桂枝人參湯……………三七
 赤石脂禹餘糧湯……………三七
 炙甘草湯……………三七
 甘草乾薑湯……………三七

芍藥甘草湯	三七
茵陳蒿湯	三八
麻黃連軹赤小豆湯	三九
.....	三九
麻黃升麻湯	三九
瓜蒂散	三九
吳茱萸湯	三九
黃連阿膠湯	四〇
桃花湯	四〇
半夏散及湯	四〇
豬膚湯	四〇
甘草湯	四〇
桔梗湯	四〇

苦酒湯	四一
烏梅丸	四一
白頭翁湯	四一
牡蠣澤瀉散	四一
蜜煎導方	四二
豬膽汁方	四二
燒裨散	四二
温病 風温 十	
四方	
葛根黃連黃芩湯	四六
白虎湯	四六

五苓散	四六
大承氣湯	四六
黃芩湯	四六
大黃黃連瀉心湯	四六
梔子豉湯	四七
柴葛解肌湯	四七
羌活冲和湯	四七
萎蕤湯	四七
荆防敗毒散	四七
黃連解毒湯	四七
括蕞根湯	四七
三黃石膏湯	四八

暑温 十二方

竹葉石膏湯	四八
人參白虎湯	四八
六一散	四八
桂苓甘露飲	四八
香薷飲	四八
清暑益氣湯	四九
三仁湯	四九
黃耆湯	四九
甘露消毒丹	四九
藿香正氣散	五〇
生脈飲	五〇

紫雪……………五〇

濕温 十二方

麻黃杏仁薏苡甘草湯	五〇
梔子厚朴湯	五一
半夏瀉心湯	五一
白虎加人參湯	五一
梔子蘗皮湯	五一
抵當丸	五一
小品芍藥地黃湯	五一
白朮附子湯	五一
白通湯	五一

朮附湯……………五二

附子麻黃湯……………五三

蒼朮白虎湯……………五三

温疫 四方

人參敗毒散	五三
普濟消毒飲	五三
十神湯	五四
牛蒡苳連湯	五四
一方	
麻杏石甘湯	五六

喉痧 喉痺 卅

竹葉石膏湯	五六
半夏散及湯	五六
甘草湯	五六
桔梗湯	五六
苦酒湯	五六
總方六味	五六
解毒雄黃丸	五六
黑龍膏	五七
古今錄驗升麻湯	五七
利膈湯	五七
清涼散	五七
利咽解毒湯	五七
玄參解毒湯	五七

龍腦飲子	五七
清咽抑火湯	五八
滋陰降火湯	五八
玄參散	五八
牛蒡子湯	五八
貝母湯	五八
古今錄驗射干湯	五九
響聲破笛丸	五九
小太平丸	五九
黃芪湯	五九
玉鑰匙	五九
加味珠黃散	五九
錫類散	六〇

稀涎散	六〇
柳花散	六〇
金不換	六〇
吹喉散	六〇
霍亂 二十四方	
六和湯	六二
藿香正氣散	六二
厚朴湯	六三
乾薑吳茱萸湯	六三
三味飲子	六三
理中丸	六三
漿水散	六三

香薷散	六三
小品人參湯	六三
黃瓜湯	六四
勻氣散	六四
香薷散	六四
蕭豆湯	六四
蘆根飲子	六四
生脈飲	六四
五苓散	六五
理中湯	六五
四逆湯	六五
通脈四逆湯	六五
吳茱萸湯	六五

臥龍丹	六五
行軍散	六五
辟瘟丹	六六
霍亂急救法並方	六六
瘧疾 二十五方	
何人飲	六八
常山飲	六八
截瘧清肺湯	六八
四獸飲	六八
木賊煎	六九
清脾飲	六九
延年知母鼈甲湯	六九

芎歸鼈甲散	六九
柴胡芎歸湯	六九
清中驅瘧飲	七〇
截瘧飲	七〇
人參實衛湯	七〇
柴苓湯	七〇
柴胡加桂枝湯	七〇
柴朴湯	七〇
柴胡去半夏加括蕒	七〇
根湯	七一
小柴胡湯	七一
白虎加桂枝湯	七一
蜀漆散	七一

牡蠣散	七
柴胡桂薑湯	七一
達原飲	七一
截瘡七寶飲	七二
蟹甲煎丸	七二
常山草果補正湯	七二
痢疾	二十八方
芍藥湯	七四
蒼朮地榆湯	七四
溫脾湯	七四
治痢散	七四
駐車圓	七五

黃連湯	七五
沒乳湯	七五
香連丸	七五
人參敗毒散	七五
芍藥加芒硝湯	七六
文仲犀角散	七六
大桃花湯	七六
犀角散	七六
阿膠散	七六
斗門散	七六
祕傳香連丸	七六
參歸芍藥湯	七六
四味香連丸	七七

香參散	七七
黃連丸	七七
輕車湯	七七
真人養臟湯	七七
補中益氣湯	七八
白頭翁湯	七八
桃花湯	七八
烏梅丸	七八
木香檳榔丸	七八
枳實導滯丸	七八
泄瀉	十九方
七成湯	七九

四柱飲	八〇
六柱湯	八〇
八柱散	八〇
胃苓散	八〇
連理湯	八〇
連葛解醒湯	八一
二宜丸	八一
三白散	八一
益中散	八一
防風芍藥湯	八一
香砂六君子丸	八一
胃關煎	八一
參苓白朮散	八二

保和丸	八二
八珍散	八二
四神丸	八二
藿香正氣丸	八三
附子理中湯	八三
腳氣 三十八方	
越脾湯	八四
獨活湯	八四
犀角旋覆花湯	八五
茱萸湯	八五
半夏湯	八五
烏頭湯	八五

風引獨活湯	八五
麻黃散	八五
牛膝散	八六
澤瀉散	八六
桑白皮散	八六
加味腎氣圓	八六
檳榔散	八七
犀角散	八七
檳榔湯	八七
大戟丸	八七
羌活導滯湯	八七
當歸拈痛湯	八七
木瓜湯	八八

木瓜吳茱萸湯	八八
風濕湯	八八
七味檳榔湯	八八
洗脚氣方	八八
追風毒剉散	八八
桂心湯	八九
甘豆湯	八九
搜風丸	八九
沉香湯	八九
防己飲	八九
三將軍圓	八九
神效檳蘇散	九〇
活血丹	九〇

檳榔湯	九〇
廣濟半夏湯	九〇
五苓散	九〇
胃苓湯	九〇
雞鳴散	九〇
四物湯	九一
中風 二十九方	
蘇合香丸	九二
通關散	九三
小續命湯	九三
大秦芎湯	九三
牛黃清心丸	九三

保元湯	九四
八味順氣散	九四
玉屏風散	九四
三生飲	九四
清熱導痰湯	九四
黑錫丹	九四
返魂丹	九五
獨活散	九五
侯氏黑散	九五
風引湯	九五
古今錄驗續命湯	九五
附子散	九六
桂心散	九六

人參南星圓	九六
朮附湯	九六
三黃湯	九六
滌痰散	九七
地黃飲子	九七
養壽方解語湯	九七
勻氣散	九七
附子大獨活湯	九七
活絡丹	九七
人參再造丸	九八
大活絡丹	九九
癆瘵虛損	四十三

方	
補中益氣湯	一〇一
四物湯	一〇一
當歸補血湯	一〇一
附桂八味丸	一〇一
六味丸	一〇一
逍遙散	一〇一
坎離既濟丹	一〇二
人參養榮湯	一〇二
三白廣生湯	一〇二
大菟絲子丸	一〇二
保和湯	一〇三

聖愈湯	一〇三
柴胡疏肝湯	一〇三
調中益氣湯	一〇三
八珍湯	一〇四
人中白丸	一〇四
棗人湯	一〇四
大建中湯	一〇四
五味子散	一〇四
黃芪散	一〇五
人參散	一〇五
地骨皮湯	一〇五
大補元煎	一〇五
清骨散	一〇五

龍甲散	一〇五
河車丸	一〇六
十全大補丸	一〇六
十四味建中湯	一〇六
人參龍甲丸	一〇六
人參龍甲散	一〇六
大黃廩蟲丸	一〇七
十疰丸	一〇七
桃奴丸	一〇七
肘後癩肝散	一〇七
蘇合香丸	一〇七
滋補養榮丸	一〇八
補榮湯	一〇八

參苓丸	一〇八
巴戟丸	一〇八
益氣丸	一〇九
歸脾湯	一〇九
黃耆建中湯	一〇九
薯蕷丸	一〇九
鼓脹 二十方	
藿香正氣散	一一二
木香調氣飲	一一三
蘇子湯	一一三
調中健脾丸	一一三
金匱腎氣丸	一一三

木香散	一一三
柴胡厚朴湯	一一四
大正氣散	一一四
朴附湯	一一四
厚朴七物湯	一一四
七氣消聚散	一一四
分消湯	一一四
祕方治脹丸	一一四
治諸脹方	一一五
沈香飲	一一五
龍甲丸	一一五
雞矢醴方	一一五
人參芎歸湯	一一五

柿靈丹……………一一六
 琥珀人參丸……………一一六

水腫 三十二方

防己茯苓湯……………一一六

甘草麻黃湯……………一一六

麻黃附子湯……………一一六

桂枝去芍藥加麻黃

附子細辛湯……………一一六

枳朮湯……………一一七

蒲灰散……………一一七

己椒藶黃圓……………一一七

牡蠣澤瀉散……………一一七

大腹水腫方……………一一七

麻豆湯……………一一七

舟車神祐方……………一一七

葶藶丸……………一一八

療患氣兼水身面

腫垂死方……………一一八

五香散……………一一八

五皮散……………一一八

小胃丹……………一一八

禹餘糧丸……………一一八

白朮散……………一一九

場脹湯……………一一九

導水茯苓湯……………一一九

蒼戟丸……………一一九

廓清飲……………一一九

人參木香散……………一二〇

壯原湯……………一二〇

越脾湯……………一二〇

黃芪芍藥桂枝苦

酒湯……………一二〇

茯苓湯……………一二〇

茯苓湯……………一二〇

防己湯……………一二一

犀角湯……………一二一

復元丹……………一二一

茯苓琥珀湯……………一二一

噎膈反胃

關格 三十一方

香砂寬中湯	一二三
補氣運脾湯	一二三
來復丹	一二三
滋血潤腸丸	一二四
大半夏湯	一二四
大黃甘草湯	一二四
茯苓澤瀉湯	一二四
昆布丸	一二四
關膈不通方	一二四

廣濟栴榔散	一二四
崔氏方	一二五
深師治噎方	一二五
華佗治胃反	一二五
翻胃湯	一二五
麥門冬散	一二五
沈香升降散	一二五
八正散	一二六
延年祕傳九物五膈丸	一二六
古今錄驗五噎丸	一二六
五膈散	一二六

參苓膏	一二六
五子散	一二七
七聖散	一二七
加味麻仁丸	一二七
導氣清利湯	一二七
黃連湯	一二七
附子理中湯	一二八
清熱二陳湯	一二八
開關利膈丸	一二八
廣利方	一二八
枳橘二陳湯	一二八
吐血	二十四方

十灰散	一三〇
花蕊石散	一三〇
獨參湯	一三〇
犀角地黄湯	一三〇
四生圓	一三〇
瀉心湯	一三〇
清咯湯	一三一
麥門冬湯	一三一
斷紅飲	一三一
堅中湯	一三一
竹茹湯	一三一
黃土湯	一三一
黑散子	一三一

斷紅散	一三二
龍膽瀉肝湯	一三二
大阿膠丸	一三二
大補陰丸	一三二
五汁膏	一三二
八味地黄丸	一三二
歸脾湯	一三三
柏葉湯	一三三
茜根散	一三三
阿膠散	一三三
涼血散	一三三

欬嗽 五十四方

小青龍湯	一三五
小青龍加石膏湯	一三五
十棗湯	一三五
射干麻黃湯	一三六
越婢加半夏湯	一三六
紫蘇散	一三六
杏蘇散	一三六
杏仁飲子	一三六
橘蘇散	一三六
六安煎	一三七
麻黃蒼朮湯	一三七
華蓋散	一三七

加減瀉白散	一三七
鎮欬湯	一三七
諸欬丸	一三七
趙府濟急丸	一三七
杏仁湯	一三八
貝母湯	一三八
止嗽散	一三八
百部湯	一三八
款冬花湯	一三八
射干兜苓湯	一三八
紫菀茸湯	一三八
九仙散	一三九
乾薑散	一三九

小品生姜五味子湯	一三九
龍甲散	一三九
蛤蚧丸	一三九
加味理中湯	一三九
人參清肺湯	一四〇
人參清鎮丸	一四〇
人參湯	一四〇
補肺湯	一四〇
滋陰降火湯	一四〇
二冬膏	一四〇
瓊玉膏	一四〇
清火甯嗽湯	一四一

二母甯嗽湯	一四一
三子養親湯	一四一
澤瀉湯	一四一
葶癭大棗瀉肺湯	一四一
降氣化痰湯	一四一
甯嗽化痰湯	一四二
二陳湯	一四二
南星飲	一四二
滾痰丸	一四二
溫肺湯	一四二
細辛湯	一四二
甯肺湯	一四二

厚朴麻黃湯……………	一四三
麥門冬湯……………	一四三
深師蘇子湯……………	一四三
柴胡散……………	一四三
治頓欬不止方……………	一四三
哮喘 十四方	
冷哮丸……………	一四四
鎮咳湯……………	一四四
降氣化痰湯……………	一四四
沉香散……………	一四五
定喘飲……………	一四五
甯嗽化痰湯……………	一四五

橘皮湯……………	一四五
參蘇溫肺湯……………	一四五
蘇子降氣湯……………	一四五
五味子散……………	一四六
人參定喘湯……………	一四六
五味子湯……………	一四六
均氣人仙散……………	一四六
冷哮痰喘……………	一四六
心痛胸痺 卅	
二方	
青皮丸……………	一四七

三花神佑丸……………	一四七
桂枝四七湯……………	一四七
神效散……………	一四八
歸脾湯……………	一四八
清中湯……………	一四八
剪紅丸……………	一四八
金鈴子散……………	一四八
加味四七湯……………	一四九
辰砂妙香散……………	一四九
代抵當湯……………	一四九
手拈散……………	一四九
妙應丸……………	一四九
蘇合香丸……………	一五〇

神保丸	一五〇
神聖復氣湯	一五〇
草苳寇丸	一五一
訶子散	一五一
括蕪薤白半夏湯	一五一
枳實括蕪薤白桂枝湯	一五一
桂枝生薑枳實湯	一五一
烏頭赤石脂丸	一五一
九痛丸	一五一
桂枝三物	一五一

高良薑湯	一五二
廣濟柴胡湯	一五二
張文仲蜀椒丸	一五二
雞舌香散	一五二
梔萸丸	一五二
茯苓杏仁甘草湯	一五二
橘皮枳實生薑湯	一五二
薏苡附子散	一五三

胃痛痺病 十

三方

平胃散	一五三
二陳湯	一五四
沈香降氣散	一五四
清中湯	一五四
倉卒散	一五四
俞痛散	一五四
養胃湯	一五四
異功散	一五五
升陽益胃湯	一五五
七珍散	一五五
補脾湯	一五五
溫中降氣丸	一五五
內消散	一五六

肝鬱 肝氣

肝陽 肝風

十

五方

逍遙散	一五七
半夏厚朴湯	一五七
越鞠丸	一五七
左金丸	一五七
半夏散	一五七
分心氣飲	一五八
四七湯	一五八
理氣平肝散	一五八

解肝煎	一五八
黃鶴丹	一五八
抑鬱湯	一五八
六青丸	一五九
金鈴子散	一五九
龍蒼丸	一五九
加味四七湯	一五九
頭痛 二十七方	
半夏白朮天麻湯	一六〇
防風散	一六一
藿香正氣散	一六一

玉真圓	一六一
芎辛導痰湯	一六一
玉壺丸	一六一
三祛湯	一六一
鈎藤散	一六一
菊芎散	一六二
祛風清上散	一六二
香芎散	一六二
加減三五七散	一六二
羌活散	一六二
川芎散	一六二
川芎散	一六三
川芎茶調散	一六三

消風散	一六三
乳香瓊落湯	一六三
加味四物湯	一六三
川芎散	一六三
大川芎丸	一六四
羌活附子湯	一六四
清空膏	一六四
清震湯	一六四
愈毒湯	一六四
止痛太陽丹	一六四
痛風餅子	一六四

羚羊角散	一六五
芎歸湯	一六五
天麻半夏湯	一六五
旋覆花湯	一六五
近效朮附湯	一六五
真武湯	一六五
茯苓桂枝白朮甘 草湯	一六五
澤瀉湯	一六六
香橘飲	一六六
參附湯	一六六

心悸驚	
悲喜 十一方	
歸脾湯	一六七
養心湯	一六七
人參養榮丸	一六八
天王補心丹	一六八
黃連安神丸	一六八
正神正心丹	一六八
安神補心湯	一六九
定志丸	一六九
妙香散	一六九

怔忡卑慄

眩暈 十方

茯苓補心湯……一六九
 茯苓飲子……一六九
嘔吐 二十四方

吳茱萸湯……一七一
 半夏瀉心湯……一七一
 小半夏湯……一七一
 豬苓散……一七一
 大半夏湯……一七一
 四逆湯……一七一
 小柴胡湯……一七一
 大黃甘草湯……一七二
 茯苓澤瀉湯……一七二

文蛤湯……一七二
 生薑半夏湯……一七二
 葛根加半夏湯……一七二
 黃連湯……一七二
 崔氏方……一七三
 比和飲……一七三
 華佗治胃反方……一七三
 翻胃湯……一七三
 麥門冬散……一七三
 竹茹湯……一七三
 半夏藿香湯……一七四
 代赭石散……一七四
 張渙養中湯……一七四

丁香溫中湯……一七四
 旋覆花湯……一七四
噦 **乾嘔** 五方

橘皮竹茹湯……一七四
 橘皮湯……一七五
 黃芩加半夏生姜湯……一七五
 湯……一七五
 半夏乾薑散……一七五
 參粟湯……一七五
噎氣 五方
 十味保和湯……一七五

破鬱丹	一七五
勻氣散	一七五
健脾丸	一七六
旋覆代赭湯	一七六
呃逆 二方	
丁香柿蒂湯	一七六
安胃飲	一七六
吐酸 七方	
清鬱二陳湯	一七六
蒼連湯	一七七
加減安胃湯	一七七

廣濟檳榔散	一七七
又白朮散	一七七
延年增損承氣丸	一七七
...	一七七
菜連丸	一七七
失眠 十三方	
琥珀養心丹	一七八
琥珀多寐丸	一七九
珍珠母丸	一七九
知柏地黃丸	一七九
養心湯	一七九
酸棗湯	一七九

硃砂安神丸	一八〇
引神歸舍丹	一八〇
溫膽湯	一八〇
黃芩散	一八〇
茯神散	一八〇
高枕無憂散	一八〇
黃連阿膠湯	一八〇
健忘 七方	
定志丸	一八一
讀書丸	一八一
茯苓湯	一八一
人參養榮湯	一八一

癩狂癩

二十方

孔聖枕中丹	一八一
朱雀丸	一八一
天王補心丹	一八二
五痢丸	一八四
控涎丹	一八四
葇荇子散	一八四
清心豁痰湯	一八四
清心溫膽湯	一八四
半夏圓	一八四

鈎藤湯	一八五
生鐵洛飲	一八五
抱胆丸	一八五
風引湯	一八五
防己地黃湯	一八五
桃核承氣湯	一八五
抵當湯	一八五
桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯	一八六
二陰煎	一八六
雄雌圓	一八六
鎮心丹	一八六

甯志膏	一八六
白金丸	一八六
牛黃清心丸	一八七
黃疸	二十六方
茵陳蒿湯	一八八
刪繁苦參丸	一八八
龍膽散	一八八
茵陳蒿湯	一八九
梔子大黃湯	一八九
鹿茸散	一八九
四君子湯	一八九
茵陳梔子黃連三	一八九

物湯	一八九
硝石礬石散	一八九
五味湯	一八九
必效大黃湯	一九〇
延年瓜蒂散	一九〇
茵陳附子乾姜湯	一九〇
茵陳附子乾姜湯	一九〇
小半夏湯	一九〇
茵陳四逆湯	一九〇
茵陳五苓散	一九〇
大黃硝石湯	一九一

加減五苓湯	一九一
茵陳蒿湯	一九一
茵陳丸	一九一
梔子蘘皮湯	一九一
一清飲子	一九一
退黃散	一九一
葛花解醒湯	一九一
茵陳瀉黃湯	一九二
痿躄 十方	
藿香養胃湯	一九三
保元湯	一九三
四君子湯	一九三

加味四物湯	一九三
龍膽瀉肝湯	一九四
清燥湯	一九四
二妙丸	一九四
虎潛丸	一九四
虎脛骨丸	一九四
五痿湯	一九四
行痺 六方	
敗毒散	一九五
烏藥順氣散	一九六
黃芪桂枝五物湯	一九六

升麻湯……………一九六
 防風湯……………一九六
 大秦芫湯……………一九六

痛痺 五方

五積散……………一九六
 五痺湯……………一九七
 獨痺湯……………一九七
 附子湯……………一九七
 甘草附子湯……………一九七

着痺 七方

羌活勝濕湯……………一九七

改定三痺湯……………一九七

茯苓湯……………一九八

朮附湯……………一九八

平胃散……………一九八

厚朴溫中湯……………一九八

甘薑苓朮湯……………一九八

麻木 十一方

二陳湯……………一九九

神效黃芪湯……………一九九

八珍湯……………一九九

三妙丸……………一九九

小防風湯……………一九九

止麻消痰湯……………二〇〇

人參益氣湯……………二〇〇

薏苡仁湯……………二〇〇

茯苓川芎湯……………二〇〇

茯苓湯……………二〇〇

開結舒經湯……………二〇〇

痛風 十九方

附子湯……………二〇二

當歸拈痛湯……………二〇二

四物湯……………二〇二

半夏茯苓湯……………二〇二

活血通經湯……………二〇二

舒筋飲	二〇三
甘草乾薑茯苓白	
朮湯	二〇三
續斷圓	二〇三
大防風湯	二〇三
牛膝木瓜湯	二〇三
羌活勝濕湯	二〇三
生附除濕湯	二〇四
羚羊角湯	二〇四
獨活寄生湯	二〇四
指迷 治痰茯苓丸	二〇四
補髓丹	二〇四

清濕湯	二〇四
丹溪方	二〇五
中行圓	二〇五
歷節風 九方	
桂枝芍藥知母湯	二〇五
防己湯	二〇五
加味四物湯	二〇五
烏頭湯	二〇五
滲濕湯	二〇五
追命再造散	二〇六
赤芍藥散	二〇六

牛蒡子散	二〇六
大羌活湯	二〇六
麻瘋 六方	
舒筋蒺藜散	二〇八
蒺藜丸	
醉仙散	二〇九
搜風散	二一〇
八寶丹	二一一
蒺藜苦參丸	二一一
蟲病 十五方	
烏梅丸	二一三

甘草粉蜜湯	二一三
追蟲丸	二一三
追蟲取積丸	二一三
化蟲丸	二一三
化蟲飲	二一四
使君子丸	二一四
胡粉丸	二一四
安蟲飲	二一四
安蟲散	二一四
集效圓	二一四
木香檳榔圓	二一四
理中安虻散	二一五
椒梅湯	二一五

掃蟲煎	二一五
三消 十五方	
白虎加人參湯	二一六
調胃承氣湯	二一六
六味地黃丸	二一六
腎氣丸	二一七
參苓白朮散	二一七
黃芪六一湯	二一七
忍冬丸	二一七
文蛤散	二一八
茯神湯	二一八
神效散	二一八

麥門冬湯	二一八
括蕪瞿麥丸	二一八
五苓散	二一八
括蕪散	二一八
黃連散	二一八
體雜 五方	
清鬱二陳湯	二一九
加味小陷胸湯	二一九
石膏丸	二一九
和中湯	二一九
交泰丸	二一九

肺癰 肺脹

十

四方

桔梗湯……………二二〇

葶藶大棗瀉肺湯

……………二二〇

桔梗白散……………二二〇

葶藶湯……………二二一

皂莢丸……………二二一

排膿散……………二二一

肺傷湯……………二二一

玄參清肺飲……………二二一

四順散……………二二一

加味桔梗湯……………二二二

五味子湯……………二二二

越婢加半夏湯……………二二二

小青龍加石膏湯

……………二二二

十六味桔梗湯……………二二二

肺痿 十方

炙甘草湯……………二二三

甘草乾薑湯……………二二三

生薑甘草湯……………二二三

桂枝去芍藥加皂

莢湯……………二二三

劫勞散……………二二四

保和湯……………二二四

秦艽扶羸湯……………二二四

人參養榮湯……………二二四

紫菀散……………二二四

知母茯苓湯……………二二四

胃癰 五方

大黃牡丹湯……………二二五

排膿湯……………二二六

排膿散……………二二六

射干湯……………二二六

犀角湯……………二二六

鼻衄齒衄 十

方

犀角地黃湯……………二二七

瀉心湯……………二二七

止衄散……………二二七

牡蠣散……………二二七

涼榮湯……………二二七

蘇東坡方……………二二七

陶氏生地芩連湯……………二二七

……………二二七

人參飲子……………二二八

龍骨散……………二二八

清胃湯……………二二八

牙癰 八方

甘露飲……………二二八

清胃敗毒散……………二二八

清胃散……………二二八

清胃散……………二二八

清陽散火湯……………二二九

中和湯……………二二九

神功丸……………二二九

玉池散……………二二九

牙痛 五方

四種牙痛方……………二二九

瀉胃湯……………二二九

如神散……………二三〇

定痛散……………二三〇

赴涎散……………二三〇

便血 五方

黃土湯……………二三一

黃芩散……………二三一

赤小豆當歸散……………二三一

平胃地榆湯……………二三一

枳朮丸……………二二二

腸風 三方

清臟湯……………二二二

地榆散……………二二二

升陽除濕防風湯……………二二二

腸癰 八方

薏苡附子敗散……………二二二

大黃牡丹湯……………二二二

四聖散……………二二二

腸癰湯……………二二二

排膿散……………二二二

七賢散……………二二三

黃連丹……………二二三

神仙蠟礬丸……………二二三

臟毒 五方

會膿散……………二三四

阿膠丸……………二三四

芍藥柏皮丸……………二三四

內托黃芪湯……………二三四

槐花散……………二三四

痔疾 十五方

秦朮防風湯……………二三四

治痔疾方……………二三四

加味四物湯……………二三五

當歸連翹湯……………二三五

參芪湯……………二三五

黃連閉管丸……………二三五

清臟補漏丸……………二三五

臟連丸……………二三五

痔疾傳藥方……………二三五

乾葛湯……………二三六

橘皮湯……………二三六

丹溪蓮花蕊散……………二三六

小品生地黃湯……………二三六

古今錄驗鹿茸散

桃仁湯……………二三六

脫肛 八方

補中益氣湯……………二三七
養臟湯……………二三七
參朮實脾湯……………二三七
龍骨散……………二三七
訶子人參湯……………二三七
參朮芎歸湯……………二三八
涼血清腸散……………二三八
提肛散……………二三八

遺精 九方

茯神湯……………二三九
正元散……………二三九
鹿茸丸……………二三九
金鎖固精丸……………二四〇
三才封髓丹……………二四〇
桑螵蛸圓……………二四〇
黃連清心飲……………二四〇
桂枝龍骨牡蠣湯
……………二四〇
大風髓丹……………二四一

陽痿 六方

右歸丸……………二四一
左歸丸……………二四二
還少丹……………二四二
黑歸脾丸……………二四二
逍遙散……………二四三
全鹿丸……………二四三

五淋 十三方

神效琥珀散……………二四五
石葦散……………二四五
海金砂散……………二四五

藕蜜煎	二四五
八正散	二四六
鬱金散	二四六
琥珀散	二四六
琥珀散	二四六
參苓琥珀湯	二四六
赤白濁	八方
治濁固本丸	二四六
分清飲	二四七
滋腎圓	二四七
六味湯	二四七
萬全木通散	二四七

五淋散	二四七
清心蓮子飲	二四七
珍珠粉丸	二四八
蒲黃丸	二四八
玄免丹	二四八
草薺分清飲	二四八
地黃圓	二四八
癰閉轉胞	
遺溺	十二方
括婁嬰麥圓	二五〇
滑石白魚散	二五〇

茯苓戎鹽湯	二五〇
八正散	二五〇
滋腎丸	二五〇
豬苓湯	二五〇
療小便難方	二五〇
胞轉方	二五一
夜多小便方	二五一
黃芪朮氣湯	二五一
滋營養衛湯	二五一
鞏隄丸	二五一
疝氣	二十一方
大烏頭煎	二五二

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯	二五三
蜘蛛散	二五三
椒附散	二五三
當歸四逆湯	二五三
解急蜀椒湯	二五三
聚香飲子	二五三
沈香桂附丸	二五四
煖肝煎	二五四
桃仁當歸湯	二五四
荔枝散	二五四
橘核丸	二五四

古今錄驗牡丹五

等散	二五五
玄附湯	二五五
回春丸	二五五
麝香大戟丸	二五五
倉卒散	二五五
棟實丸	二五五
既濟丸	二五五
葵子丸	二五六
眼目	三十六方
竹葉飲	二五六
神麵丸	二五六

瀉肝湯

羌活散	二五七
補肝散	二五七
柴胡散	二五七
駐景圓	二五七
蜜蒙花散	二五七
羚羊角散	二五八
洗肝散	二五八
草龍膽散	二五八
車前子散	二五八
糖煎散	二五九
決明子散	二五九
柴胡散	二五九

道人開障散	二六〇
芎辛湯	二六〇
助陽活血湯	二六〇
益氣聰明湯	二六〇
益陰腎氣丸	二六〇
當歸立効散	二六〇
補肝散	二六一
經効散	二六一
地黃圓	二六一
七寶丸	二六一
七寶湯	二六一
石決明丸	二六二
止痛散	二六二

當歸湯	二六二
蘆薈丸	二六二
磁石丸	二六三
四明飲	二六三
神消散	二六三
珍珠退翳散	二六三
涼膈清脾飲	二六四
還陰解毒湯	二六四

耳病 十三方

地黃湯	二六四
解倉飲子	二六四
犀角飲子	二六五

地黃圓	二六五
犀角散	二六五
龍膽湯	二六五
荊芥連翹湯	二六六
滋腎通耳湯	二六六
清神散	二六六
復聰湯	二六六
通氣散	二六六
檳榔神芎丸	二六七
順氣聰耳湯	二六七

鼻病 十一方

桑根白皮散	二六七
-------	-----

辛夷九……………二六七
辛夷清肺散……………二六七
皂莢散……………二六八
治鼻塞氣息不通

方……………二六八

犀角升麻湯……………二六八
辛夷散……………二六八
蒼耳散……………二六八
溫肺湯……………二六九
治腦漏……………二六九
金花九……………二六九

口舌 二十二方

升麻煎……………二六九
涼膈散……………二六九
治木舌方……………二七〇
增損建中湯……………二七〇
琥珀犀角膏……………二七〇

導赤散……………二七〇

升麻散……………二七〇
清陽湯……………二七一
理中湯……………二七一
黑錫丹……………二七一
升麻柴胡湯……………二七二
清熱如聖湯……………二七二
柴胡清肝散……………二七二

清熱化痰湯……………二七二
清熱補氣湯……………二七二
清熱補血湯……………二七三
八味丸……………二七三

黃連瀉心湯……………二七三

瀉胃湯……………二七三
北庭丹……………二七三
歸脾湯……………二七四
歸芍異功散……………二七四

婦科

月經 二十二方

清經湯	二七六
兩地湯	二七六
涼血調經丸	二七六
逍遙散	二七六
溫經湯	二七七
溫經攝血湯	二七七
定經湯	二七七
歸脾湯	二七七
宣鬱通經湯	二七七
調肝湯	二七八
建固湯	二七八
安老湯	二七八
益經湯	二七八

和血通經湯	二七八
破結丸	二七九
越鞠丸	二七九
紅花散	二七九
延胡索散	二七九
土瓜根散	二七九
烏藥散	二七九
白薇丸	二八〇
甘麥大棗湯	二八〇
胎前 二十四方	
芎歸膠艾湯	二八〇
葵子茯苓散	二八〇

崔氏半夏茯苓湯	二八〇
刪繁黃芪散	二八一
桂枝茯苓丸	二八一
膠艾湯	二八一
助氣補漏湯	二八一
當歸芍藥散	二八一
援土固胎湯	二八一
安奠二天湯	二八一
解鬱湯	二八二
扶氣止啼湯	二八二
乾薑人參半夏丸	二八二

順肝益氣湯	二八二
利氣洩火湯	二八三
救損安胎湯	二八三
當歸散	二八三
白朮散	二八三
半夏湯	二八三
柴胡散	二八三
漢防己散	二八三
當歸飲	二八四
竹瀝湯	二八四
木通散	二八四
臨產 六方	

難產神效方	一八四
救母丹	二八四
送胞湯	二八五
補氣升腸湯	二八五
補氣解暈湯	二八五
脫花煎	二八五
小產 四方	
千金保孕丹	二八六
引氣歸血湯	二八六
理氣散瘀湯	二八六
固氣填精湯	二八六
產後 十六方	

生化湯	二八七
清魂散	二八七
失笑散	二八七
安心湯	二八七
散結定疼湯	二八七
救敗求生湯	二八七
生乳丹	二八八
兩收湯	二八八
小柴胡湯	二八八
枳實芍藥散	二八八
下瘀血湯	二八八
竹葉湯	二八八
白頭翁加甘草阿	

膠湯	二八九
蜀椒湯	二八九
人參當歸散	二八九
芎藭散	二八九
帶下	十四方
完帶湯	二九〇
側柏樗皮丸	二九〇
膠艾四物湯	二九一
清肝止淋湯	二九一
妙香散	二九一
易黃湯	二九一
逍遙散加減	二九一

延胡苦楝湯	二九一
任附湯	二九一
元戎六合湯	二九二
白芷散	二九二
苓朮菟絲丸	二九二
龍胆瀉肝湯	二九二
震靈丹	二九二
崩漏	十五方
補中益氣湯	二九三
歸脾湯	二九四
當歸芍藥湯	二九四
涼血地黃湯	二九四

伏龍肝散	二九四
固本止崩湯	二九四
加減當歸補血湯	二九五
養血平肝湯	二九五
平肝開鬱止血湯	二九五
柴胡調經湯	二九五
金華散	二九五
丁香膠艾湯	二九五
鹿茸丸	二九五
調經升陽除濕湯	二九六

小薊根湯……………二九六

癥瘕 十二方

血瘕方……………二九六
 脂瘕方……………二九七
 燥瘕方……………二九七
 黃瘕方……………二九八
 青瘕方……………二九八
 狐瘕方……………二九八
 蛇瘕方……………二九八
 鼈瘕方……………二九九
 血瘕方……………二九九
 食瘕方……………三〇〇

兒科

驚風 二十三方

涼驚圓……………三〇一
 瀉青圓……………三〇一
 地黃丸……………三〇一
 導赤散……………三〇一
 益黃散……………三〇二
 利驚丸……………三〇二
 大青膏……………三〇二
 牛黃膏……………三〇二
 蚊黃丸……………三〇二

至寶丹……………三〇二
 截風散……………三〇三
 截驚丸……………三〇三
 抱龍丸……………三〇三
 龍膽湯……………三〇三
 胡黃連散……………三〇三
 張渙烏蛇散……………三〇三
 羚羊角湯……………三〇四
 犀角湯……………三〇四
 牛黃丸……………三〇四
 天麻丸……………三〇四
 鉤藤飲……………三〇四
 安神鎮驚丸……………三〇四

牛黃丸……………三〇五

慢驚 十一方

宣風散……………三〇五

青州白丸子……………三〇五

羌活膏……………三〇五

金液丹……………三〇六

括蕪湯……………三〇六

醒脾丸……………三〇六

毛彬銀白散……………三〇六

烏沈湯……………三〇七

沈附湯……………三〇七

參附湯……………三〇七

加味回陽散……………三〇七

腦脊髓膜炎 六

方

加減麻黃湯……………三〇八

增損葛根芩連湯

……………三〇八

損益犀角地黃湯

……………三〇八

惲先生訂安腦丸

……………三一〇

惲師訂回天丸……………三一〇

又公佈腦炎效方

及說明……………三一二

天花痧子 十

一方

桂枝加葛根湯……………三一六

升麻湯……………三一七

大青湯……………三一七

紫草散……………三一七

紫草快癩湯……………三一七

紫草木香湯……………三一八

紫草木通湯……………三一八

人參白虎湯	三二八
化斑湯	三一八
清咽滋肺湯	三一八
甘露飲	三一九
疳積	九方
四靈圓	三一九
麝香圓	三一九
大蘆蒼圓	三二〇
胡芻連丸	三二〇
劉氏蘆蒼丸	三二〇
朱氏肥兒丸	三二〇
黃芪湯	三二〇

清胃養脾湯	三二〇
消疳飲	三二〇
外科	
瘰癧	三十方
益氣養榮湯	三二一
補中益氣湯	三二一
經効犀角丸	三二一
玉屑妙靈散	三二二
治瘰癧單方	三二二
七腎散	三二二
芩連二陳	三二二
防風解毒湯	三二二

連翹消毒飲	三二三
必効散	三二三
夏枯草	三二三
玉燭散	三二四
芎歸養榮湯	三二四
消癧丸	三二四
消核散	三二四
瘰癧疎肝丸	三二四
瘰癧結核丸	三二五
內消瘰癧丸	三二五
治陰虛瘰癧方	三二五
神效消癧丸	三二五
消核丸	三二五

二貝丸……………三二六
 海龍丸……………三二六
 連翹散堅湯……………三二六
 消核膏……………三二六
 陽和解凝膏……………三二六
 千槌膏……………三二七
 大紅膏……………三二七
 紫霞膏……………三二七
 療癰膏……………三二八

癰疽 三十二方

排膿散……………三二八
 五香連翹湯……………三二九

黃耆竹葉湯……………三二九
 五利湯……………三二九
 神効托裏散……………三三〇
 當歸湯……………三三〇
 托裏黃芪湯……………三三〇
 托裏湯……………三三〇
 內消散……………三三一
 加味十全湯……………三三一
 內疎黃連湯……………三三一
 當歸和血散……………三三一
 內托黃芪柴胡湯……………三三一
 ………………三三一
 乳香消毒散……………三三二

托裏溫經湯……………三三二
 托裏溫中湯……………三三二
 化毒爲水內托散……………三三二
 ………………三三二
 乳香黃芪散……………三三三
 玉蕊托裏散……………三三三
 五聖散……………三三三
 連翹托裏散……………三三三
 祕方奪命散……………三三四
 內托羌活湯……………三三四
 犀角湯……………三三四
 托裏消毒飲……………三三四
 神効解毒散……………三三五

回陽湯……………三三五
 神効內托散……………三三五
 透臆散……………三三五
 黃連苦救湯……………三三五
 解毒天漿散……………三三六
 固本養榮湯……………三三六
疔瘡脫疽 七方
 內托連翹飲……………三三六
 追疔奪命湯……………三三六
 黃連解毒湯……………三三七
 疔毒復生湯……………三三七
 人參清神湯……………三三七

內托安神散……………三三八
 解毒濟生湯……………三三八
鬚疽癭瘤
發頤 八方
 柴胡清肝散……………三三八
 梔子清肝散……………三三九
 鼠粘子湯……………三三九
 參苓內托散……………三三九
 海藻玉壺湯……………三三九
 十全流氣飲……………三四〇

柴胡葛根湯……………三四〇
 牛蒡甘桔湯……………三四〇
注流 七方
 活絡流氣飲……………三四〇
 調和榮衛湯……………三四一
 附子八物湯……………三四一
 通經導滯湯……………三四一
 調中大成湯……………三四一
 黃芪六一湯……………三四二
 散血葛根湯……………三四二
乳癰 十方

蜂露房散	三二四二
神効瓜樓散	三二四二
治乳癰未潰方	三二四三
治乳癰已潰方	三二四三
牛旁子湯	三二四三
橘葉散	三二四三
鹿角散	三二四三
治乳旁腫痛方	三二四四
消癰散毒湯	三二四四
治乳巖方	三二四四

囊癰 懸癰

腎癰 鶴口癰

十二方

解毒排膿散	三二四四
清肝滲濕湯	三二四五
滋陰內托散	三二四五
滋陰八物湯	三二四五
炙粉草膏	三二四五
還元保真湯	三二四六
滋陰九寶飲	三二四六
活血散瘀湯	三二四六
黃芪內托散	三二四六

下疳 便毒

徽瘡 結毒

二十八方

滋陰除濕湯	三二四六
和氣養榮湯	三二四六
滋腎保元湯	三二四七
雙解湯	三二四七
龍膽瀉肝湯	三二四七
草薺湯	三二四八
九味柴胡湯	三二四八
換肌消毒散	三二四八

獨瘰消毒飲……………三四九
 消卮敗毒散……………三四九
 茯苓湯……………三四九
 治楊梅瘡方……………三四九
 二連湯……………三四九
 四仙湯……………三五〇
 紫草飲……………三五〇
 治便毒一方……………三五〇
 山甲內消散……………三五〇
 紅花散瘀湯……………三五〇
 黃芪內托散……………三五〇
 升麻解毒湯……………三五〇
 歸靈湯……………三五〇

九龍丹……………三五二
 五寶散……………三五二
 結毒紫金丹……………三五二
 鉛回丹……………三五三
 治楊梅瘡方……………三五三
 治楊梅結毒未散方……………三五三
 治廣瘡爛壞方……………三五四
 龍胆瀉毒湯……………三五四
 解毒至寶丹……………三五四
 十服神効湯……………三五四

隱疹 疥癬

丹毒天泡 十
 六方
 升麻和氣飲……………三五五
 當歸飲子……………三五五
 防風通聖散……………三五五
 平血飲……………三五五
 烏龍丸……………三五六
 檉花散……………三五六
 浮萍散……………三五六
 荆防敗毒散……………三五六
 升麻牛旁子飲……………三五七

消風散……………三五七
 化斑解毒湯……………三五七
 解毒瀉心湯……………三五七
 羚羊角散……………三五八
 胃脾湯……………三五八
 頑癬浮萍丸……………三五八
 治斑疹及疔腮方
 ………………三五八

跌撲 金瘡 十

三方
 治從高墮下方……………三五九

大膠艾湯……………三五九
 大黃散……………三五九
 導滯散……………三五九
 沒藥散……………三六〇
 花蕊石散……………三六〇
 內托黃芪圓……………三六〇
 治破血在心腹……………三六一
 當歸鬚散……………三六一
 大成湯……………三六一
 獨參湯……………三六一
 順血散川芎散……………三六二
 湯潑火燒 七方

桂枝去芍藥加蜀
 漆龍骨牡蠣散
 逆湯……………三六二
 蜀漆湯……………三六二
 治湯火方……………三六二
 四順清涼飲……………三六二
 玄妙飲……………三六三
 逐火丹……………三六三
 清涼散……………三六三
 附錄處方用量表
 ………………


臨證醫典

傷寒

證解

內經凡熱病。皆歸納傷寒之類。難經云。傷寒有五種。有傷寒、有中風、有熱病、有濕溫、有溫病。觀仲景傷寒卒病論。卒讀曰猝暴也有傷寒、中風、風溫、溫病、等名。蓋凡熱病之卒然而來者。皆曰傷寒。猶西醫所謂急性傳染病也。古人傷寒名詞。有廣狹兩義。廣義包括種種急性熱病而言。已如上述。狹義則專指無

汗、惡寒、脈浮緊之病所包括者。是廣義之傷。稱爲傷寒。唐宋以後。單有溫病天行等名目。與知皆在仲景傷寒論中也。云。宗族數百人。建安以來，猶未十稔。病傷寒而死亡者過半。則非一種狹義傷寒可知。又云雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若尋余所集。思過半矣。苟其中不涉溫病天行。何能思過半耶。總之。治外感證法。悉自傷寒論出。可無疑義。傷寒論注重疾病之脈證治法。教人見



得某種脈證。便對準脈證可用某方某藥以治之。全書篇目標題。均言辨某某脈證并治。更有麻黃證。桂枝證等辭。又言可與某湯。或不可與。又言宜某某湯及某湯主之。仲景之心法。盡於此矣。傷寒論湯方。從治療學之分類。凡有七法。汗法、和法、吐法、下法、利小便法、清法、溫法。溫法爲維持心力衰沈及發溫生機之衰弱。清法爲遏止體溫之亢進。此二者乃對證治療。非以去病爲目的者。其他假使病在表則汗之。在血液則利小便。在半表半裏者則和之。在胸膈則吐

之。在腸間則攻下之。此五者均以排除疾病之毒害於體外。爲處方之要旨。今薈萃大論所設脈證并治條文於百十三方之首。以供臨證者探討也。

仲師傷寒方

【桂枝湯】仲景1

「太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者汗自出。齋齋惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。」

「太陽病。頭痛。發熱。汗出。惡風。桂枝湯主之。」
「太陽病。下之後。其氣上衝者。可

與桂枝湯。方用前法。若不上衝者。不得與之。」

「桂枝本爲解肌。若其人脈浮緊。發熱汗不出者。不可與之也。常須識此。勿令誤也。」

「若酒客病不可與桂枝湯。得之則嘔。以酒客不喜甘故也。」

「太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯則愈。」

「太陽病。外證未解。脈浮弱者。當以汗解。宜桂枝湯。」

「太陽病。外證未解者。不可下也。」

下之爲逆。欲解外者。宜桂枝湯。」

「太陽病。先發汗不解。而後下之。脈浮者。不愈。浮爲在外。而反下之。故令不愈。今脈浮故知在外。當須解外。則愈。宜桂枝湯。」

「病常自汗出者。此爲榮氣和。榮氣和者。外不諧。以衛氣不共營氣諧和故爾。以營行脈中。衛行脈外。復發其汗。營衛和則愈。宜桂枝湯。」

「病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈者。此衛氣不和也。先其時發汗則愈。宜桂枝湯。」

「傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。」

未可與承氣湯。其小便清者。知不在裏仍在表也。當須發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。」

「傷寒發汗已解。半日許復煩。脈浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。」

「傷寒醫下之。續得下利。清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆湯。救表宜桂枝湯。」

「太陽病。發熱汗出者。此爲榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風者。宜桂枝湯。」

「陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者

。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。」
「太陰病。脈浮者。可發汗。宜桂枝湯。」

「病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者宜下之。脈浮虛者宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。」

「下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆。攻表宜桂枝湯。」

「吐痢止而身痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯小和之。」

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗

【桂枝加附子湯】仲景²

「太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。」

桂枝加附子湯主之。」

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗

泡附子

【桂枝加桂湯】仲景³

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從少腹上衝心者。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯。更加桂二兩也。

桂枝湯原方加桂三分之一

【桂枝去芍藥湯】仲景⁴

太陽病下之後。脈促胸滿者。桂枝去芍藥湯主之。

芍藥湯主之。

桂枝 炙甘草 生薑 大棗

【桂枝去芍藥加附子湯】仲景⁵

若微惡寒者。桂枝去芍藥加附子湯主之。

桂枝 炙甘草 生薑 大棗 泡附子

子

【桂枝加厚朴杏仁湯】仲景⁶

「喘家作桂枝湯。加厚朴杏仁佳。」

「太陽病。下之微喘者。表未解故也」

桂枝加厚朴杏仁湯主之。」

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗

厚朴 杏仁

【小建中湯】仲景7

「傷寒陽脈濇陰脈弦。法當腹中急痛。先與小建中湯。不差者。小柴胡湯主之。」

「傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。」

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗

膠飴

【桂枝加芍藥生姜人參新加湯】仲景8

「發汗後。身疼痛。脈沈遲者。比湯主之。」

桂枝湯原方芍藥生薑各增三分之一

加人參

【桂枝甘草湯】仲景9

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸欲得按者。桂枝甘草湯主之。

桂枝 炙甘草

【茯苓桂枝甘草大棗湯】仲景10

發汗後。其人臍下悸者。欲作奔豚。此湯主之。

茯苓 桂枝 炙甘草 大棗

【桂枝麻黃各半湯】仲景11

太陽病得之八九日如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日二三度發。脈微緩者。爲欲愈。

也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗更吐更下也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗。身必癢。宜桂枝麻黃各半湯。

桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗

麻黃 杏仁

【桂枝二麻黃一湯】仲景¹²

服桂枝湯大汗出。脈洪大者。與桂枝湯如前法。若形似瘧。一日再發者汗出必解。宜服桂枝二麻黃一湯桂方。

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗

麻黃 杏仁

【桂枝二越婢一湯】仲景¹³

太陽病。發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發汗。宜此湯。

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗
麻黃 石膏

【桂枝去桂加茯苓白朮湯】仲景¹⁴

服桂枝湯或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。此湯主之。

芍藥 炙甘草 生薑 大棗 白朮
茯苓

【桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯】
仲景¹⁵

傷寒脈浮。醫以火迫劫之亡陽。必驚狂。臥起不安者。此湯主之。

桂枝 炙甘草 生姜 大棗 蜀漆

牡蠣 龍骨

【桂枝甘草龍骨牡蠣湯】仲景16

「脈浮宜以汗解。用火炙之。邪無從出。因火而盛。病從腰以下必重而痺。名火逆也。」

「火逆下之。因燒針煩躁者。此湯主之。」

桂枝 炙甘草 牡蠣 龍骨

【桂枝加葛根湯】仲景17

太陽病。項背強几几。反汗出惡風者

。桂枝加葛根湯主之。

桂枝 芍藥 炙甘草 生薑 大棗

葛根

【桂枝加芍藥湯】仲景18

桂枝 炙甘草 生薑 大棗 芍藥

加一倍

【桂枝加大黃湯】仲景19

本太陽病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰也。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。

桂枝 炙甘草 生薑 大棗 大黃

芍藥加一倍

【麻黃湯】仲景20

「太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘者。麻黃湯主之。」

「脈浮而緊。浮則爲風。緊則爲寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。可發其汗。宜麻黃湯主之。」
「太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。」

「太陽病。十日以去。脈浮細而嗜臥者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脈但浮者。與麻黃湯。」

「太陽病脈浮緊。無汗。發熱。身疼痛。八九日不解。表症仍在。此當發

其汗。服藥已微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。麻黃湯主之。」

「脈浮者。病在表。可發汗。宜麻黃湯。」

「脈浮而數者。可發汗。宜麻黃湯。」
「陽明病。脈浮。無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。」

麻黃 枝桂 炙甘草 杏仁

【麻黃杏仁甘草石膏湯】仲景21

「發汗後。不可更行桂枝湯。汗出而喘。無大熱者。可與麻黃杏仁石膏甘草湯。」

一下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘無大熱者。可與此湯。」

麻黃 杏仁 石膏 甘草

【大青龍湯】仲景22

「太陽中風。脈浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。若脈微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此爲逆也。」

「傷寒脈浮緩。身不疼。但重。乍有輕時。無少陰證者。大青龍湯主之。」

麻黃 桂枝 炙甘草 杏仁 生薑

大棗 石膏

【小青龍湯】仲景23

「傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔。發熱而欬。或渴。或痢。或噎。或小便不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之。」

「傷寒。心下有水氣。欬而微喘。發熱。不渴。服湯已。渴者。此寒去欲解也。小青龍湯主之。」

麻黃 桂枝 炙甘草 芍藥 乾薑

細辛 半夏 五味子

【麻黃附子細辛湯】仲景24

少陰病。始得之。反發熱。脈沈者。麻黃附子細辛湯主之。

麻黃 泡附子 細辛

【麻黃附子甘草湯】仲景25

少陰病。得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無裏證。故微發汗也。

麻黃 泡附子 炙甘草

【葛根湯】仲景26

「太陽病。項背強几几。無汗惡風。葛根湯主之。」

「太陽與陽明合病者。必自下利。葛根湯主之。」

葛根 麻黃 桂枝 芍藥 炙甘草
生薑 大棗

【葛根黃芩黃連湯】仲景27

太陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。此湯主之。

葛根 炙甘草 黃芩 黃連

【葛根加半夏湯】仲景28

太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。

葛根 麻黃 桂枝 芍藥 甘草
生薑 大棗 半夏

【小柴胡湯】仲景29

「傷寒五六日。中風往來寒熱。胸脅苦滿。嘿嘿不欲飲食。心煩喜嘔。或

胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脅下痞鞭。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。」

「血弱氣盡。腠理開。邪氣因入與正氣相搏。結於脅下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。噤噤不欲飲食。藏腑相連。其痛必下。邪高痛下。故使嘔也。小柴胡湯主之。」

「傷寒四五日。身熱惡風。頸項強。脇下滿手足溫而渴者。小柴胡湯主之。」

「傷寒陽脈濇陰脈弦。法當腹中急痛。」

。先予小建中湯。不差者。與小柴胡湯主之。」

「傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。」

「凡柴胡湯病證而下之。若柴胡證不罷者。復與柴胡湯。必蒸蒸而振。却復發熱汗出而解。」

「傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本柴胡證。下之而不得利。令反利者。知醫以丸藥下之。此非其治也。潮熱者實也。先宜服小柴胡湯。以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。」

「傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞭。脈細者。此爲陽微結。必有表復有裏也。脈沈亦在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此爲半在裏半在外也。脈雖沈緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。說不了了者。得屎而解。」

「陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胸脇滿而不去者。與小柴胡湯。」
「陽明病。脅下鞭滿。不大便而嘔。」

舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濺然汗出而解也。」

「陽明中風。脈浮大。而短氣。腹部滿。脅下及心痛。久按之。氣不通。鼻乾。不得汗。嗜臥。一身及目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差，外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。脈但浮。無餘證者。與麻黃湯。若不尿腹滿加噦者。不治。」

「本太陽病不解。轉入少陽者。脇下鞭滿。乾嘔不能食。往來寒熱。尙未

吐下。脈沈緊者。與小柴胡湯。」

「嘔而發熱者。小柴胡湯主之。」

「婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。」

柴胡 黃芩 人參 半夏 炙甘草

生薑 大棗

【大柴胡湯】仲景30

「太陽病。過經十餘日。反二三下之。後四五日。柴胡證仍在者。先與小柴胡湯。嘔不止。心下急。鬱鬱微煩者。爲未解也。與大柴胡湯。下之則

愈。」

「傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱。與大柴胡湯。」

「傷寒發熱。汗出不解。心中痞鞭。嘔吐而下痢者。比湯主之。」

「傷寒後。脈沈者。內實也。下解之。宜大柴胡湯。」

柴胡 黃芩 芍藥 半夏 生薑

枳實 大棗

【柴胡加芒硝湯】仲景31

「傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。已而微利。此本柴胡證。下之而不得利。今反利者。知醫以丸

藥下之。此非其治也。潮熱者實也。先宜服小柴胡湯。以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。

柴胡 黃芩 人參 半夏 炙甘草

生薑 大棗 芒硝

【柴胡桂枝湯】仲景³²

「傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下支結。外證未去者。」

柴胡桂枝湯主之。」

「發汗多。亡陽譫語者。不可下。與

柴胡桂枝湯。和其營衛。以通津液後

自愈。」

柴胡 黃芩 人參 半夏 桂枝

芍藥 甘草 生薑 大棗

【柴胡加龍骨牡蠣湯】仲景³³

「傷寒八九日下之。胸滿煩驚。小便不利。噦語。一身盡重不可轉側者。」

柴胡加龍骨牡蠣湯主之。」

柴胡 黃芩 人參 半夏 桂枝

生薑 大棗 茯苓 鉛丹 大黃

龍骨 牡蠣

【柴胡桂枝乾薑湯】仲景³⁴

「傷寒五六日。已發汗。而復下之。胸脇滿。微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心下煩者。此爲未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。」

柴胡 黃芩 桂枝 炙甘草 乾薑

括樓根 牡蠣

【梔子豉湯】仲景³⁵

「發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者。必反覆顛倒。心中懊懣。梔子豉湯主之。」

「發汗若下之。而煩熱。胸中窒者。

梔子豉湯主之。」

「傷寒五六日。大下之後。身熱不去。心中結痛者。未欲解也。梔子豉湯主之。」

「陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊懣。飢不能食。但

頭汗出者。梔子豉湯主之。」
「下利下更煩。按之心下濡者。爲虛煩也。宜此湯。」

「陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憤憤。反噦語。若加溫針。必怵惕煩躁不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。梔子豉湯主之。」

梔子 香豉

【梔子甘草豉湯】仲景³⁶

凡用梔子湯。病人舊微瀉者。不可與服之。若少氣者。梔子甘草豉湯主之。

梔子 炙甘草 香鼓

【梔子生薑豉湯】仲景37

若嘔者。梔子生薑豉湯主之。

梔子 生薑 香鼓

【梔子乾薑湯】仲景38

傷寒。醫以丸藥大下之。身熱不去。

微煩者。梔子乾薑湯主之。

梔子 乾薑

【梔子厚朴枳實】仲景39

傷寒下後。心煩腹滿。起臥不安者。

梔子厚朴湯主之。

梔子 厚朴 枳實

【梔子蘗皮湯】仲景40

傷寒身黃發熱者。此湯主之。

梔子 炙甘草 黃蘗

【枳實梔子豉湯】仲景41

大病差後。勞復者。枳實梔子湯主之。

若有宿食者。加大黃如博棋子大五

六枚。

枳實 梔子 香鼓

【大承氣湯】仲景42

一陽明病脈遲。雖汗出不惡寒者。其

身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。

此外欲解。可攻裏也。手足濇然汗出

者。此大便已鞭也。大承氣湯主之。

一陽明病。譫語。有潮熱。反不能食

者。胃中必有燥屎五六枚也。若能食者。但鞭耳。宜大承氣湯下之。」

「汗出譫語者。以有燥屎在胃中。此爲風也。須下者。過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實。故也。下之則愈。宜大承氣湯。」

「二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足繫繫汗出。大便難而譫語者。下之則愈。宜大承氣湯。」

「陽明病。下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。腹微滿。初頭鞭後必澹。不可攻之。若有燥屎者。」

宜大承氣湯。一

「病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者。宜下之。脈浮虛者。宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。」

「大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。」

「病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。宜大承氣湯。」

「傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難；身微熱者。此爲實也。急下之。宜大承氣湯。」

「陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。」

「得病二三日。脈弱。無太陽柴胡證。煩躁心下鞭。至四五日。雖能食。

以小承氣湯。少少與微和之。令小安。至六日。與承氣湯一升。若不大便六七日。小便少者。雖不受食。但初頭鞭。後必澹。未定成鞭。攻之必澹。須小便利尿定鞭。乃可攻之。宜大承氣湯。」

「腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。」

「陽明少陽合病。必下利。其脈不負者。爲順也。負者失也。互相尅賊。名爲負也。脈滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。」

「少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。宜大承氣湯。」

「少陰病。自利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。急下之。宜大承氣湯。」

「少陰病。六七日。腹脹不大便者。急下之。宜大承氣湯。」

大黃 厚朴 枳實 芒硝

【小承氣湯】仲景43

「陽明病脈遲。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿。不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄下。」
「陽明病。潮熱。大便微鞭者。可與大承氣湯。不鞭者。不可與之。若不與。六七日恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉矢氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉矢氣者。此但初頭鞭。後必澹。不可攻之。攻之必脹。滿不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。必大便復鞭而少也。以小承氣湯和之。不轉

矢氣者。慎不可攻也。」
「陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則讞語。小承氣湯主之。若一服讞語止者。更莫復服。」
「陽明病。讞語發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。因與小承氣湯一升。腹中轉矢氣者。更服一升。若不轉矢氣者。勿更與之。明日又不大便。脈反微濡者。裏虛也。爲難治。不可更與承氣湯也。」
「太陽病。若吐若下若發汗後。微煩。小便數。大便因鞭者。小承氣湯和

之愈。下利讞語者。有燥屎也。宜小承氣湯。」

大黃 厚朴 枳實

【調胃承氣湯】仲景44

「傷寒脈浮自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾姜湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和讞語者。少與調胃承氣湯。」

「發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒但熱者。實也。當和胃氣與。調胃承氣

湯。」

「太陽病未解。脈陰陽俱停。必先振慄汗出而解。但陽脈微者。先汗出而解。但陰脈微者。下之而解。若欲下之。宜調胃承氣湯。」

「傷寒十三日不解。過經讞語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞭。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。調胃承氣湯主之」

「太陽病過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反澹。腹微滿。鬱

鬱微煩。先其時。自極吐下者。與調胃承氣湯。若不爾者。不可與。但欲嘔。胸中痛。微澹者，此非柴胡症。以嘔故知極吐下也。」

「陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。」

「太陽病。三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之。」
「傷寒吐後。腹脹滿者。與調胃承氣湯。」

大黃 炙甘草 芒硝

【桃核承氣湯】仲景45

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。

血自下。下者愈。其外不解者。尙未可攻。當先解其外。宜桂枝湯。外解已。但小腹急結者。乃可攻之。宜桃核承氣湯主之。

桃仁 大黃 芒硝 桂枝 炙甘草
【抵當湯】仲景46

「太陽病。六七日。表症仍在。脈微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹當鞭滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀血在裏故也。抵當湯主之。」

「太陽病身黃。脈沈結。少腹鞭。小便不利者。爲無血也。小便自利。其

人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。」
「陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞭。大便反易。其色必黑者。宜抵當湯主之。」

「病人無表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者。可下之。假令已下。脈數不解。令熱則消穀善飢。至六七日不大便者。有瘀血也。宜抵當湯。其脈數不解。而下不止。必協熱而便膿血也。」

熬水蛭 去翅足熬蟲蟲 桃仁
大黃

【抵當丸】仲景47

傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。當下之。不可餘藥。宜抵當丸。

熬水蛭 去翅足熬蟲蟲 大黃

桃仁

【十棗湯】仲景48

太陽中風。下利嘔逆。表解者。乃可攻之。其人褻絮汗出。發作有時。頭痛。心下痞鞭滿。引脅下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表解裏未和也。十棗湯主之。

熬芫花 甘遂 大戟 大棗

【大陷胸湯】仲景49

「太陽病。脈浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣煩燥。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞣。則爲結胸。若不結胸。但頭汗出餘處無汗。漉頸而還。小便不利。身必發黃也。傷寒六七日。結胸熱實。脈沈而緊。心下痛。按之石鞣者。大陷胸湯主之。」

「傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒

熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此爲水結在胸脅也。但頭汗出者。大陷胸湯主之。」

「太陽病。重發汗。而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心上至少腹。鞣滿而痛。不可近者。大陷胸湯主之。」

「傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸蒸而振。卻發熱汗出而解。若心下滿而鞣痛者。大陷胸湯主之。」

大黃 芒硝 甘遂

【大陷胸丸】仲景50

「病發於陽。而反攻之。熱入因作結胸。病發於陰。而反下之。熱入因作痞也。所以成結胸者。以下之大早故也。」

結胸者。項亦強。如柔瘰狀。下之則和。宜大陷胸丸。

大黃 葶藶子 芒硝 杏仁

【小陷胸湯】仲景51

小結胸病。正在心下。按之則痛。脈浮滑者。小陷胸湯主之。

栝樓實 黃連 半夏

【白散方】仲景52

寒實結胸。無熱症者。與三物小陷胸

湯。白散亦可服

桔梗 巴豆 貝母

【麻仁丸】仲景53

趺陽脈浮而濡。浮則胃氣強。濡則小便數。浮濡相搏。大便則鞭。其脾爲約。麻仁丸主之。

麻仁 杏仁 芍藥 枳實 厚朴

大黃

【半夏瀉心湯】仲景54

傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。

必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而飢痛者。此爲結胸也。大陷胸主之。但滿而不痛者。此爲痞。柴胡不中與之。宜半夏瀉心湯主之。

半夏 人參 黃芩 黃連 炙甘草

大棗 乾薑

【大黃黃連瀉心湯】仲景55

「脈浮而緊。而復下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。但氣痞耳。心下痞。按之濡。其關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。」

「傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解

表。表解乃可攻。痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。」

大黃 黃連

【附子瀉心湯】仲景56

心下痞。而復惡寒汗出者。附子瀉心湯主之。

大黃 黃芩 黃連 附炮子

【生薑瀉心湯】仲景57

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞。鞭乾噫食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴。下利者。生薑瀉心湯主之。

生薑 半夏 黃芩 黃連 人參
乾薑 炙甘草 大棗

【甘草瀉心湯】仲景58

傷寒中風。醫反下之。其人下利。日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。乾嘔。心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非熱結。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。

炙甘草 半夏 黃芩 黃連 乾薑

大棗

【黃連湯】仲景59

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛欲嘔吐者。黃連湯主之。

黃連 人參 半夏 炙甘草 桂枝

乾薑 大棗

【黃芩湯】仲景60

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。

黃芩 芍藥 炙甘草 大棗

【黃芩加半夏生薑湯】仲景91

黃芩 芍藥 炙甘草 大棗 半夏

生薑

【乾薑黃芩黃連人參湯】仲景62

傷寒本自寒下。醫復吐下之。寒格更吐逆下。若食入口即吐。乾薑、黃芩、黃連、人參、湯主之。

【旋復代赭湯】仲景63

傷寒發汗若吐若下。解後。心下痞鞭。噫氣不除者。旋復代赭湯主之。

旋復花 人參 半夏 炙甘草 代

赭石 大棗 生薑

【厚朴生薑甘草半夏人參湯】仲景64

發汗後腹脹滿者。此湯主之。

厚朴 生薑 半夏 炙甘草 人參

【白虎湯】仲景65

「傷寒脈浮滑。此表有熱。裏有寒。

白虎湯主之」

「傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。白虎

湯主之。」

「三陽合病。腹滿身重。難以轉側。

口不仁而面垢。讞語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生津。手足逆冷。若

自汗者。白虎湯主之。」

知母 石膏 炙甘草 粳米

【白虎加人參湯】仲景66

「服桂枝湯大汗出後。大煩渴不解。

脈洪大者白虎加人參湯主之。」

「傷寒若吐若下後。七八日不解。熱

結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴

舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎

加人參湯主之。」

「傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微

惡寒者。白虎加人參湯主之。」

「傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解者。不可與白虎湯。渴欲飲水無表症者。白虎加人參湯主之。」

知母 石膏 炙甘草 粳米 人參

【竹葉石膏湯】仲景67

傷寒解後虛羸少氣。氣逆欲吐者。竹葉石膏湯主之。」

竹葉 石膏 粳米 甘草 半夏

人參 麥門冬

【五苓散】仲景68

「太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與

飲之。令胃氣和則愈。若脈浮。小便不利。微熱消渴者。與五苓散主之。」
發汗已。脈浮數。煩渴者。五苓散主之。」

「中風發熱。六七日不解而煩。有表裏症。渴欲飲水。水入則吐者。名爲水逆。五苓散主之。多飲煖水汗出愈。」

「本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利者。五苓散主之。」

「太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發熱汗出。復惡寒。不嘔。但心下痞者。」

此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞭。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水者。少少與之。但以法救之。渴者宜五苓散。」

「霍亂頭痛。發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。」

豬苓 澤瀉 白朮 茯苓 桂枝

【豬苓湯】仲景69

「陽明病若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。豬苓湯主之。」

「陽明病。汗出多而渴者。不可與豬苓湯。以汗多。胃中燥。豬苓湯復利。」

小便故也。」

「少陰病。下利六七日。咳而嘔渴。心煩不得眠者。豬苓湯主之。」

豬苓 澤瀉 茯苓 滑石 阿膠

【文蛤散】仲景70

病在陽。應以汗解之。反以冷水澀之。若灌之。其熱被劫。不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。

文蛤

【茯苓甘草湯】仲景71

「傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。」

「傷寒厥而心下悸者。宜治水。當服茯苓甘草湯。卻治其厥。不爾水漬。入胃。必作利也。」

茯苓 桂枝 炙甘草 生薑

【四逆湯】仲景72

「傷寒脈浮自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反與桂枝湯攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚卽伸。若胃氣不和譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗復加燒針者。四逆湯主之。」

「傷寒醫下之。續得下利清穀不止。身疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表。救裏宜四逆。救表宜桂枝湯。」

「病發熱頭痛。脈反沈。若不差。身體疼痛。當救其裏。宜四逆湯。」

「脈浮而遲。表熱。裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。」

「自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。急溫之。宜四逆輩。」

「少陰病。脈沈者。急溫之。宜四逆湯。」

「少陰病。飲食入口則吐。心中溫溫

欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。

脈弦遲者。此胸中實。不可下也。當

吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可

吐也。當溫之。宜四逆湯。」

「大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼

。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。

。」

「大汗若大下利。而厥冷者。四逆湯

主之。」

「吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。

手足厥冷者。四逆湯主之。」

「既吐且利。小便復利。而大汗出。

下利清穀。內寒外熱。脈微欲絕者。

四逆湯主之。」

「下利腹脹滿。身體疼痛者。先溫其

裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表

宜桂枝湯。」

「嘔而脈弱。小便復利。身有微熱見

厥者。難治四逆湯主之。」

炙甘草 乾薑 附子

【四逆加人參湯】仲景73

惡寒脈微。而復利。利止亡血也。四

逆加人參湯主之。

炙甘草 乾薑 附子 人參

【通脈四逆湯】仲景74

「少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手

足厥逆。脈微欲絕。身反不惡寒。其人面色赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止脈不出者。通脈四逆湯主之。其脈即出者愈。」
下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脈四逆湯主之。

炙甘草

乾薑加倍

附子

面色赤者加蔥。腹中痛者去蔥加芍藥。嘔者加生薑。咽痛者去芍藥加桔梗。利止脈不出者去桔梗加入參。

【通脈四逆加豬膽汁湯】仲景75

吐已下斷。汗出而厥。四肢拘急不解。脈微欲絕者。通脈四逆加豬膽汁湯

主之。

乾薑

附子

炙甘草

豬膽汁

【乾薑附子湯】仲景76

下之後。復發汗。晝日煩躁。不得眠而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沈微。身無大熱者。乾薑附子湯主之。

乾薑

附子

【白通湯】仲景77

少陰病。下利。白通湯主之。

乾薑

附子

葱白

【白通加豬膽汁湯】仲景78

少陰病。下利脈微者。與白通湯。利不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。白通加

猪膽汁湯主之。服湯脈暴出者死。微續者生。

乾薑 附子 葱白 人尿 猪膽汁

【茯苓四逆湯】仲景79

發汗者下之。病仍不解。煩躁者。茯苓四逆湯主之。

茯苓 人參 附子 炙甘草 乾薑

【四逆散】仲景80

少陰病。四逆。其人或欬。或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重者。四逆散主之。

炙甘草 枳實 柴胡 芍藥

欬者加五味子乾薑。悸者加桂枝。小

便不利者。加茯苓。腹中痛者加附子炮。泄利下重者加薤白。

【當歸四逆湯】仲景81

手足厥寒。脈細欲絕者。當歸四逆湯主之。

當歸 桂枝 芍藥 炙甘草 大棗

細辛 通草

【當歸四逆加吳茱萸生薑湯】仲景82

若其人內有久寒者 宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。

當歸 細辛 通草 桂枝 芍藥

甘草 生薑 大棗 吳茱萸

【理中丸】仲景83

一霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散。寒多不用水者。理中湯主之。」

「大病差後喜睡。久不了了。胃上有寒。當以丸藥理之。宜理中丸。」

人參 炙甘草 白朮 乾薑

理中丸與湯本屬一方。急則用湯。若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂，吐多者。去朮加生薑。下多者。還用朮。悸者加茯苓。腹滿者。去朮加附子。

【真武湯】仲景84

「太陽病發汗。汗出不解。其人仍發熱。心下悸。頭眩。身瞶動。振振欲

擗地者。真武湯主之。」

「少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重疼痛。自下利者。此爲有水氣。其人或咳。或小便利。或下利。或嘔者。真武湯主之。」

茯苓 芍藥 生薑 白朮 泡附子

若嗽者加五味子。細辛。乾薑。若小便利者。去茯苓。若下利者。去芍藥加乾薑。若嘔者去附子加生薑。

【附子湯】仲景85

「少陰病。得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。」

「少陰病。身體疼。手足寒。骨節痛。脈沈者。附子湯主之。」

炮附子 茯苓 白朮 人參 芍藥

【甘草附子湯】仲景86

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。此湯主之。

炙甘草 白朮 桂枝 炮附子

【桂枝附子湯】仲景87

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濡者。桂枝附子湯主之。

桂枝 炮附子 炙甘草 生薑 大棗

【桂枝附子去桂加白朮湯】仲景88

條文續上。若其人大便鞭。小便自利者。去桂加白朮湯主之。

白朮 炮附子 炙甘草 生薑 大棗

【茯苓桂枝白朮甘草湯】仲景89

傷寒若吐若下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沈緊。發汗則動經。身爲振振搖者。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。

茯苓 桂枝 白朮 炙甘草

【芍藥甘草附子湯】仲景 90

發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。

芍藥 甘草 炮附子

【桂枝人參湯】仲景 91

太陽病。外症未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞭。表裏不解者。桂枝人參湯主之。

桂枝 人參 炙甘草 白朮 乾薑

【赤石脂禹餘糧湯】仲景 92

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞鞭。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。

理中焦也。此利在下焦。赤石脂禹餘

糧湯主之。復利不止者。當利其小便。

赤石脂 禹餘糧

【炙甘草湯】仲景 93

傷寒脈結代。心動悸。炙甘草主之。

炙甘草 生薑 人參 生地黃 桂

枝 麥門冬 阿膠 麻仁 大棗

【甘草乾薑湯】仲景 94

【芍藥甘草湯】仲景 95

「傷寒脈浮自汗出。小便數。心煩。

微惡寒。脚攣急。反與桂枝湯欲攻其

表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩

躁吐逆者。作甘草乾薑湯與之。以復

其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚卽伸。若胃氣不和譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗復加燒針者。四逆湯主之。」

炙甘草 乾薑

「問曰。證象陽旦。按法治之而增劇。厥逆。咽中乾。兩脛拘急而譫語。師言夜半手足當溫。兩脚當伸。後如師言。何以知之。答曰。寸脈浮而大。浮則爲風。大則爲虛。風則生熱。虛則兩脛攣。病證象桂枝。因加附子參其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。厥逆。咽中乾。煩躁陽明

內結譫語煩亂更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足常熱。脛尙微拘急。重與芍藥甘草湯。爾乃脚伸。以承氣湯潛微。則止其譫語。故知病可愈。」

芍藥 炙甘草

【茵陳蒿湯】仲景96

「陽明病。發熱汗出者。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出者。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴欲飲水者。此爲瘧熱在裏。身必發黃。茵陳蒿湯主之。」

一、傷寒論卷之九、辨黃疸病脈證並治法、第96條

不者。服後清者。茵陳蒿湯主之。」

茵陳蒿 梔子 大黃

【麻黃連軹赤小豆湯】仲景97

傷寒瘀熱在裏。身必發黃。比湯主之。

麻黃 連軹 赤小豆 杏仁 生梓

白皮 炙甘草 生薑 大棗

【麻黃升麻湯】仲景98

傷寒六七日。大下後。寸脈沈而遲。

手足厥逆。下部脈不至。咽喉不利。

唾膿血。泄利不止者。為難治。此湯

主之。

麻黃 升麻 當歸 知母 黃芩

萎蕤 白朮 石膏 乾薑 芍藥

天冬 桂枝 茯苓 炙甘草

【瓜蒂散】仲景99

「病如桂枝症。頭不痛。項不強。寸

脈微浮。胸中痞鞭。氣上冲咽喉。不

得息者。此為胸中有寒也。當吐之。

宜瓜蒂散。」

「病人手足厥冷。脈乍緊者。邪結在

胸中。心中滿而煩。飢不能食者。病

在胸中。當須吐之。宜瓜蒂散。」

瓜蒂 赤小豆

諸亡血虛家不可與之

【吳茱萸湯】仲景100

「食穀欲嘔者。屬陽明也。吳茱萸湯

主之。得湯反劇者。屬上焦也。」

「少陰病。吐利。手足逆冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。」

「乾嘔吐涎沫。頭痛者。吳茱萸湯主之。」

吳茱萸 人參 生薑 大棗

【黃連阿膠湯】仲景¹⁰¹

少陰病。得之二三日以上。心中煩。不得臥。黃連阿膠湯主之。

黃連 黃芩 芍藥 阿膠 雞子黃

【桃花湯】仲景¹⁰²

「少陰病。下利便膿血。桃花湯主之。」

「少陰病。二三日至四五日。腹痛。」

小便不利。下痢不止。便膿血者。桃花湯主之。」

赤石脂 乾薑 粳米

【半夏散及湯】仲景¹⁰³

少陰病。咽中痛。半夏散及湯主之。

半夏 桂枝 炙甘草

【豬膚湯】仲景¹⁰⁴

少陰病。下利咽痛。胸滿心煩者。豬膚湯主之。」

豬膚 白蜜 白米粉

【甘草湯】仲景¹⁰⁵

【桔梗湯】仲景¹⁰⁶

少陰病。二三日咽痛者。可與甘草湯

。不差與桔梗湯。

甘草 「桔梗 甘草」

【苦酒湯】仲景¹⁰⁷

少陰病。咽中傷生瘡。不能言語。聲不出者。苦酒湯主之。

半夏 雞子 苦酒

【烏梅丸】仲景¹⁰⁸

傷寒脈微而厥。至七八日膚冷。其人躁無暫安時者。此為藏厥。非虵厥也。虵厥者。其人常吐虵。今病者靜。而復時煩。此為藏寒。虵上入其膈。故煩。須臾止。得食而嘔。又煩者。虵聞食臭出。其人當自吐虵。虵厥者

。烏梅丸主之。又主久利。

烏梅 細辛 乾薑 黃連 當歸

炮附子 蜀椒 桂枝 人參 黃蘗

【白頭翁湯】仲景¹⁰⁹

「熱利下重者。白頭翁湯主之。」

下利欲飲水者 以有熱故也 白頭翁湯主之。

白頭翁 黃連 黃蘗 秦皮

【牡蠣澤瀉散】仲景¹¹⁰

大病差後。從腰以下有水氣者。牡蠣澤瀉散主之。

牡蠣 澤瀉 蜀漆 海藻 括婁根

葶藶子 商陸根

【蜜煎導方】仲景 111

蜜手捻作錠入穀道中欲便去之西藥

房有現存蜜錠發售

【豬膽汁方】仲景 112

陽明病。自汗出。若發汗小便自利者。此乃津液內竭。雖鞭不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若土瓜根。及大豬膽汁皆可爲導。

大豬膽 和醋少許以灌穀道中

【燒視散】仲景 113

傷寒陰陽易之爲病。其人身體重。少氣少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花，膝脛拘

急者。燒視散主之。

取婦人中視近陰處剪燒灰以水和服
婦人病取男子視當燒灰

縱觀仲師全書。雖以六經爲大綱然所謂三陰三陽者。不過假設六經名目。以標着表、裏、寒、熱、虛、實、上下之病位病性耳。要在察色脈。辨虛實。以百十三方對症治療之。例如頭項強痛。發熱惡風。有汗脈浮緩者。用桂枝湯。無汗惡寒脈浮緊者。用麻黃湯。項背強几几者。用葛根湯。上喘下利者。用葛根芩連湯。無汗煩躁者。用大青龍湯。有汗煩渴者。用白

虎湯。無汗氣喘欬嗽者。用小青龍湯。渴而小便不利者。用五苓散。寒熱往來，胸脅苦滿善嘔者。用小柴胡湯。苔黃而鬆。大便秘胸脇滿者。用大柴胡湯。腹痛拒按。轉矢氣者。用承氣湯。吐利煩燥。欲死者。用吳茱萸湯。下利完穀者。用四逆湯。振振欲擗地者。用真武湯。脈結代心動悸者。用炙甘草湯等等。凡此皆爲對症治療也。

治療上約可分爲溫、清、汗、和、下、補、吐、七法附萸姜桂爲溫劑。白虎爲清劑。麻桂爲汗劑。柴胡爲

和劑。承氣爲下劑。五苓爲利小便劑。瓜蒂爲吐劑。腹脈爲補劑。七法爲傷寒用藥之定例也。臨證苟能對準證候。處方得當。其效驗若形影之相隨。若桴鼓之相應也。

溫病

風溫 暑溫 濕溫 瘟疫

證解 溫病傷寒之辨。爲中醫之癥結。明清兩朝之醫學。只在此問題上糾紛。其說愈多。其理愈晦。中醫學之不進步。此爲一大原因。仲景傷寒論。既爲吳鞠通。王孟英輩之著作。爲紫色奪朱之僭竊。則傷寒論。爲後

人所懷疑。中醫學卽由此衰落。溫病方。葉天士溫熱案開其端。吳鞠通溫病條辨繼其後。王孟英溫熱經緯統其成。然用銀翹桑菊等方。可以卽愈者。恐亦非傷寒論中之真溫病。不過小小風熱。或少陽之遊熱耳。如果真溫病。此等方必不能治。必用傷寒論法。急去熱邪。陰始可保。如梔子。白虎。承氣等方。皆去熱存陰之法。如葛根本連等方。辛從甘以化陽。苦從甘以化陰。陰陽和而時雨降。始可奏效。而葉吳王輩。以爲苦寒遏伏。不如改用甘潤。詎知溫病未有不至陽明者

苦寒始有泄熱之功。彼以爲熱病亡津液爲難治。故用甘潤之石斛。不知石斛厚其腸胃而留熱不泄。病毒得甘潤之品。則如油入麵。反增其病。此與病邪方盛而議補者何異。更有以溫病藥宜寒涼而早服犀角者。用之。反致神昏譫語。余所見多矣。觀仲景治熱病。未嘗用犀角。蓋犀角有收縮血管之功。雖能引邪外達。亦能送邪內入。溫病原有汗出。今反以犀角收之。將欲外達之邪逼入腦神經系。神昏譫語相繼而來。醫家不知病隨藥變。反自詡先知。若讀之陸九芝世補齋書中

論文兩篇。以證明溫熱案。條辨。經緯之疵謬。可以洞見癥結。

病在太陽恆惡寒。傳入陽明始惡寒罷而惡熱。若溫病。初起卽發熱。渴而不惡寒。或惡寒時間甚短。一太陽病身熱而渴。不惡寒者。爲溫病。一本是仲景之言。然則傷寒與溫病不同之病狀。只在惡寒與不惡寒。有汗與無汗之分。凡病之發熱惡寒無汗者。無論春夏秋冬。皆爲傷寒。其發熱不惡寒有汗者。爲溫病。在春曰春溫。在夏曰暑溫。在長夏曰濕溫。溼溫名見難經。爲五種傷寒之一。病限于夏秋

間習見者。今人名爲溫病。古人卻不名之爲溫病。傷寒之瘧濕渴。濕卽長夏濕令病熱挾溼者。今所謂爲濕溫。淵雷案此篇多用鐵樵先生說然今人所謂濕溫確以西醫所謂腸胃扶斯而與金匱濕病迥異此渴卽暑證。唯素問稱凡傷於寒而成溫病者。先夏至日爲溫。後夏至日爲暑。彼暑似卽熱病。要略渴證乃真暑病耳。熱病較溫爲甚。傷寒溫病同是外感。初一步不外乎解肌解表。若濕渴兩種病。則與傷寒絕對不同有二點。所感受者。爲暑爲溼。而非風寒。絕對不能解肌解表。傷寒傳至陽明。當清當下。忌用香藥。濕渴之爲病

。凡傷寒清下之劑。皆不適用。淵雷案此以喝爲今之暑温故云爾若金匱之喝則有人參白虎證非紫雪不可也。溽暑長夏溼重。故溼病僅不化燥。卽不退熱。若以香燥化之。數日間得慶安然也。病之朝至日中熱甚微。晡時熱稍增。亦潮熱也。熱而不甚壯。二七三七日間。其熱以漸而高。舌苔白潤口渴。脈軟。汗多爲濕温。病之汗多。舌苔絳邊潤。脈數爲暑温無論濕喝。必覺胸悶。是其候也。

名家驗方選

【葛根黃連黃芩湯】仲景脈證並治見傷寒門第27

首方

葛根 黃連 黃芩 炙甘草

【白虎湯】仲景脈證並治見傷寒門第65方首

石膏 知母 炙甘草 粳米

【五苓散】仲景脈證並治見傷寒門第68方首

豬苓 茯苓 澤瀉 去桂朮

【大承氣湯】仲景脈證並治見傷寒門第42方首

大黃 芒硝 厚朴 枳實 三承氣湯酌用

【黃芩湯】仲景脈證並治見傷寒門第60方首

黃芩 赤芍 大黃 甘草

【大黃黃連瀉心湯】仲景脈證並治見傷寒門第56

首方

大黃 黃連

【梔子豉湯】仲景脈證並治見傷寒門第35方首

梔子 香豉

【柴葛解肌湯】六書 目疼鼻乾不眠。頭痛眼眶疼。宜解肌。

柴胡 甘草 芍藥 白芷 乾葛

黃芩 羌活 桔梗

【羌活沖和湯】六書 治春夏秋。非時感冒。暴寒頭痛。發熱惡寒。脊強無汗。脈浮緊。傷寒傷風溫熱病。

羌活 蒼朮 生地黃 川芎 甘草

防風 黃芩 白芷 細辛

【萎蕤湯】千金 治風溫。壯熱無汗。冬

溫發熱欬嗽

萎蕤 石膏 甘草 芎藭 麻黃

杏仁 木香 葛根 白微 獨活

【荆防敗毒散】準繩 治風熱相搏。邪氣在表。寒熱作痛。及捻頭大頭蝦蟆瘟。

荆芥穗 防風 羌活 獨活 前胡

柴胡 枳殼 桔梗 赤茯苓 川

芎 人參 甘草 薄荷

【黃連解毒湯】治一切內外邪熱之證。面赤口乾。狂躁心煩。錯語不眠。熱

痢。

黃連 黃蘗 梔子 黃芩

【栝婁根湯】活人 治風溫加渴甚。

石膏 栝藹根 人參 防風 甘草

葛根

【三黃石膏湯】陶華 治傷寒六脈洪數。

面赤鼻乾。舌燥口渴。煩躁不眠。譫

語等。

黃連 黃芩 黃蘗 石膏 麻黃

豆豉 梔子

以上主治風溫濕病方

【竹葉石膏湯】仲景 治傷暑發渴。

竹葉 石膏 人參 甘草 麥冬

半夏 粳米 生薑

【人參白虎湯】仲景 治太陽中暈。汗出

惡寒身熱。脈虛口渴。此湯主之。

知母 石膏 甘草 粳米 人參

【六一散】河間 治傷寒中暑。表裏俱熱

。口渴小便不通。瀉痢。暑瘧。

滑石 生甘草

一名天水散。加辰砂名益元散。加薄荷

荷名雞蘇散。加青黛名碧玉散。

【桂苓甘露飲】河間 治中暑。受濕。引

飲過度。頭痛煩渴。濕熱便秘。

石膏 寒水石 滑石 甘草 白朮

茯苓 豬苓 肉桂 澤瀉

【香薷飲】局方 治夏秋臟腑冷熱。不調

。飲食不節，暑熱乘之。陽氣為陰

邪所遏。致頭痛發熱，惡寒。煩躁口

渴引飲。腹中不和。心腹疼痛。吐瀉者。

香薷 厚朴 白蒿苳 甘草

清水煎。井中沈冷服之。身熱欲汗者。熱服。若心煩口渴者。去扁豆。加黃連。名黃連香薷飲。加茯苓。名五物香薷飲。加木瓜參耆橘朮。名十味香薷飲。隨證加減。盡香薷之用也。

【清暑益氣湯】東垣 治長夏濕熱。蒸炎。四肢困倦。精神減少。頭痛身熱。氣高心煩。自汗口渴。便黃溺赤。脈虛者。

黃耆 蒼朮 升麻 人參 白朮

陳皮 神麴 澤瀉 甘草 黃蘗 乾葛 青皮 歸身 麥門冬 加薑棗煎

【三仁湯】條辨 治暑濕

杏仁 苳蔻 薏仁 滑石 竹葉 半夏 通草 厚朴

【黃耆湯】元戎 治中喝。脈弦細芤遲

人參 黃耆 白朮 茯苓 芍藥 甘草 加姜煎

【甘露消毒丹】天士 治發熱倦怠。胸膈腹脹。肢痠咽腫。斑疹身黃。頤腫口渴。溺赤便閉。凡暑溼時疫之邪在氣分。並治水土不服諸病。

飛滑石 茵陳 黃芩 川貝 石膏
蒲 木通 藿香 射干 連翹 薄

荷 豆蔻

【藿香正氣散】惠民 治外感風邪。內傷飲食。傷溼傷暑。霍亂吐瀉。瘧痢等證。

藿香 半夏 陳皮 白朮 腹皮
茯苓 甘草 厚朴 白芷 紫蘇

苦桔梗

【生脈飲】醫錄 治熱傷元氣。肢體倦怠。氣短懶言。口乾作渴。汗出不止。

脚軟眼黑。津枯液涸。

人參 麥門冬 五味子

長流水煎。此為治傷暑之後存其津液

之方。若誤治暑病。則收住邪氣。禍不旋踵。

【紫雪】玉案 治發斑譫語。畜血。三陽症。煩躁作狂氣喘。

赤金 升麻 寒水石 石膏 犀角
羚羊角 沈香 丁香 木香 玄

參 甘草

右以赤金同升麻先煎去金入諸藥同煎。瀘去滓。投朴硝。微火煎熬。即成紫雪。

以上主治暑溫方

【麻黃杏仁薏苡甘草湯】仲景 太陽病。發熱。日晡所劇者。此名風濕。夏秋

間氣溫。其風卽溫風矣。宜此湯。

麻黃 杏仁 薏仁 甘草

今人夏日不敢用麻黃。以香薷代之亦得。

【梔子厚朴湯】仲景 濕家自汗出。胸

中窒腹滿者。宜此湯。

梔子 厚朴 枳實

【半夏瀉心湯】仲景 胸滿腹中雷鳴者。

宜此湯。

半夏 乾姜 甘草 大棗 黃芩

人參 黃連

【白虎加人參湯】五苓散 仲景 服半夏

瀉心湯已。若但發熱。渴欲引飲者。

此濕已去也。宜白虎加人參湯。

石膏 知母 人參 炙甘草 粳米

微者但與煖水。次與五苓散。五苓散不可作湯。

豬苓 茯苓 澤瀉 白朮 桂枝

以上濕溫正治法

【梔子蘘皮湯】茵陳蒿湯 仲景 濕家誤

治致發黃者。宜梔子蘘皮湯。

梔子 炙甘草 黃蘘 劇者宜茵陳

蒿湯 茵陳蒿 梔子 大黃

【抵當丸】仲景 濕家誤治。或發黃或不

發黃。但脈沈微。或沈結。小便自利

。小腹鞭滿。其人或昏聩 或發狂者

此小腸有蓄血也。宜抵當丸下之。

熬水蛭 去翅足熬蝨蟲 大黃

桃仁 每服三錢

以上救逆法

【小品芍藥地黃湯】外臺 濕家服抵當丸

已。瘀血得下。若下不止血淡紅者。

宜小品芍藥地黃湯。通名犀角地黃湯

犀角 丹皮 芍藥 地黃

以上幹旋法

【白朮附子湯】防己黃芪湯【金匱 濕家

自汗出不止。白瘰出。手足冷者。此

為邪盡而正亦衰。宜白朮附子湯。

白朮 附子 炙甘草 生薑 大棗

微者但與防己黃芪湯。

防己 甘草 白朮 黃耆

【白通湯】仲景 濕家病。十餘日。熱暴

下。身冷。脈微細。無少腹鞭滿候者

。雖自安臥。一二日必自尿血而絕。

此非欲愈。心弱。腎不能泌尿故也。

急與白通湯。甚者乃三四服。寒厥之

昔人所難辨今以寒暑表探口量取辨之甚易曾見不體溫降至九十度者

乾薑 附子 葱白

以上急救法此四法錄國醫學院院刊第三期是尊太炎先生所

整齋仲師遺術為治濕溫之步驟也

【朮附湯】指迷 若但寒頭重。動則眩暈

。肌肉痠痛。牽急不得轉側。漿漿

汗出。惡寒小便不利。大便反快。足寒。或時咽痛。或發熱。此由寒濕之邪。客搏經絡。謂之寒濕。脈遲緩者。

蒼朮 茯苓 甘草 芍藥 人參
附子

【附子麻黃湯】二因 治寒濕所中。昏暈緩弱。或腰背強急口喎語聲混濁。心腹脹。不能動轉。

麻黃 白朮 附子 甘草 乾薑
人參

【蒼朮白虎湯】醫通 治濕溫。身熱足冷。及暑鬱。秋疫役勞。此湯治之。

蒼朮 石膏 知母 甘草 粳米
以上主治濕溫方

【人參敗毒散】活人 治傷寒頭痛。憎寒壯熱。及時氣疫癘。嵐瘴鬼瘡。腮腫毒痢。諸瘡斑疹。

人參 桔梗 前胡 甘草 茯苓
羌活 柴胡 枳殼 獨活 川芎
薄荷加生姜煎

【普濟消毒飲】東垣試效 凡瘟疫病。以此方治之。全活甚衆遂名普濟。專治大頭瘟卽西醫所謂丹毒彼時此病大流行故曰瘟疫

黃芩 黃連 連翹 薄荷 陳皮

人參 桔梗 牛蒡 馬勃 板藍根

甘草 元參 僵蠶 升麻 柴胡

便祕加大黃

【十神湯】局方 治時令不正。瘟疫盛行

。人多疾病

麻黃 甘草 乾葛 川芎 升麻

赤芍藥 白芷 陳皮 紫蘇 香附

子

【牛蒡芩連湯】回春 治積熱在上面腫多

從耳根上起俗曰大頭瘟。

黃芩 黃連 桔梗 石膏 大黃

荊芥 防風 羌活 連翹 牛蒡子

玄參 甘草 右薑水煎

以上主治瘟疫方

喉痧 喉痺

證解 喉痧之病古無是名。有之自

雍正癸丑間始。此證流行以來。不過

二百餘年。當時方盛行白喉忌表一書

。時醫即狃於白喉忌表。於此而死者

。不知凡幾。凡咽喉腫痛。及有白腐

之病。古書皆稱喉痺。細析之。乃有

數種。俗傳忌表之白喉。即西醫之急

性喉炎咽炎腭扁桃及周圍炎等。此病

最輕。用傷寒論少陰咽痛諸方即愈。

西醫之白喉。或音譯為實扶的里。而

俗醫亦以忌表法治之。殺人最多。又俗醫稱爛喉丹痧者。卽西醫之猩紅熱。發熱與疹點爲主證。咽痛是副證。治法當究傷寒發表解肌諸方。若咽喉傷甚。不能語言者。可兼用苦酒湯。白喉與猩紅熱皆險症。其病勢之猖獗。可驚可畏。沿門闔境。人人俱病。竟有朝發而夕死夕發而朝斃者。白喉初起惡寒發熱無汗之證。喉間卽見白點。頭痛遍體骨楚。胸脘悶甚。觀其喉間白點擴大之迅速。一日半日之間。殆可以全喉皆白。又當初所見白點之頃。喉頭必炎腫。自扁桃腺至

軟口蓋懸壅垂。咽頭方寸之間。悉爲所蔽。外面頷下結喉之旁。皮膚稍高。此亦因扁桃腺腫脹所致也。

惲鐵樵先生往往以麻杏石甘湯之類治愈喉症。其效驗如神。嘗見治愈者彰彰在人耳目也

鐵師又言但必在初期。其毒未潰之時。大約在喉間見白腐之後二十四點鐘。乃至三十六點鐘之內。過此則毒潰。麻杏石甘湯不能治矣。須見症治之。白喉之病竈在扁桃腺。而治愈之目的在汗腺。因扁桃腺腫則汗腺閉。汗腺開則扁桃腺自消。仲師對症治療之所以可貴也。

此外咽喉科之症候及治法。詳見名家方首所載。茲不多贅。

名家驗方選

【麻杏石甘湯】仲景 憎寒發熱無汗。頭痛。骨楚。喉痧見白點在卅六點鐘之內。而未潰此湯主之。

麻黃 杏仁 甘草 石膏

【竹葉石膏湯】仲景 喉痧虛羸少氣。口乾欲飲。咽痛蒂墜等。

竹葉 石膏 粳米 甘草 半夏

人參 麥門冬

【半夏散及湯】仲景 少陰病。喉中痛。

此散及此湯主之。

半夏 桂枝 炙甘草

【甘草湯】【桔梗湯】仲景 少陰病。二三日咽痛者可與甘草湯。不差與桔梗湯。

甘草 「桔梗 甘草」

【苦酒湯】仲景 少陰病。咽中傷生瘡。不能言語。聲不出者苦酒湯主之。

半夏 雞子 苦酒

【總方六味湯】喉科指掌 治咽喉七十二症。

荊芥穗 防風 桔梗 甘草 炒僵

蠶 薄荷

【解毒雄黃丸】本事 治纏喉風。

鬱金 飛雄黃 巴豆

右爲末。醋煎。麵糊爲丸。如菉豆大。吞七丸。

【黑龍膏】葉氏 治一切纏喉急症。

芒硝 礞砂 皂莢 百草霜 人參

【古今錄驗升麻湯】外臺 治咽喉生瘡。

升麻 石膏 牡丹皮 甘草

【利膈湯】本事 治脾肺有熱上盛咽喉生瘡。

雞蘇 桔梗 荊芥 防風 牛炒莠

子 甘草 玄參

【清涼散】回春 治一切實火咽喉腫痛。

連翹 薄荷 山梔 黃芩 黃連

生地 防風 枳壳 當歸 甘草

桔梗 白芷

加燈心細茶。水煎

【利咽解毒湯】保赤全書 痘有咽喉腫痛

者。

山豆根 玄參 桔梗 甘草 牛蒡

子 防風 麥門冬

加菉豆。水煎服。

【玄參解毒湯】正宗 治咽喉腫痛。

玄參 甘草 山梔 黃芩 桔梗

葛根 生地 荊芥

加竹葉。燈心水煎。

【龍腦飲子】局方 治咽喉腫痛。赤眼口

瘡。心煩鼻衄。咽乾多渴。及除痰熱。

繡砂 石膏 梔子 瓜蒌根 藿香

甘草

右爲末。以蜜爲丸。

【清咽抑火湯】壽世 治咽喉腫痛。壯熱可服。

黃連 大黃 玄明粉 黃柏 知母

連翹 梔子 桔梗 薄荷 甘草

玄參 牛蒡子 淡芩 防風

【滋陰降火湯】壽世 治虛火上升。喉痛及喉內生瘡。

玄參 當歸 桔梗 甘草 川芎

知母 芍藥 熟地 天花粉 黃柏

右水煎。加竹瀝服。

【玄參散】聖惠 治熱毒伏在心脾。攻於咽喉。

玄參 桑皮 甘草 牛蒡子 犀角

屑 升麻 黑豆 木香

【牛蒡子湯】濟生 治風熱上盛。咽喉窒塞。痛而或生瘡瘍。

牛蒡子 玄參 犀角 黃芩 升麻

桔梗 木通 甘草

【貝母湯】千金 治咽喉窒塞。短氣不臥。腰背痛。胸悶。

貝母 桂心 石膏 杏仁 生薑

麻黃 甘草 半夏

【古今錄驗射干湯】外臺治喉痺。閉不通利而痛。飲食不利。

當歸 射干 犀角 杏仁 甘草
升麻 白芷

【響聲破笛丸】同春歌唱失音。

連翹 訶子 川芎 砂仁 甘草
薄荷 桔梗 大黃

右爲末。雞子清爲丸。臨臥時噙化。

【小太平丸】壽世治久嗽喉痛。

人參 麥冬 天門冬 五味子 玄
參 微墨

右藥爲末。蜜丸。痰多加貝母。

【黃耆湯】聖濟治咽喉中腫癢。音啞聲

不出。

黃芪 甘草 桂枝 赤茯苓 人參
加生薑煎

吹藥

【玉鑰匙】丁甘仁先生治一切痰症腫痛白腐。將此藥吹之。能退炎消腫。惟陰虛忌用。

西瓜霜五錢 西月石五錢 飛硃砂
六分 蠶蠶五分 冰片五分 研極
細末吹之

【加味珠黃散】甘仁先生治喉症立能消腫止痛。化毒生肌。

珠粉七分 西黃五分 琥珀七分
西瓜霜一錢

【錫類散】治一切喉痧喉疔。腐爛作痛。痰涎甚多。渴飲難下。此散吹入。能豁痰開肺。去腐生新。

象牙屑四分 壁錢三十個 西黃七厘 冰片五厘 青黛七分 人指甲七厘 珠粉四分

【稀涎散】局方 治單蛾雙蛾。

江子仁 牙皂 明礬

右爲末。吹入口中。

【柳花散】心悟 治喉瘡。並口舌生瘡。

青黛 黃柏 冰片 蒲黃 人中

白 硼砂

右爲細末。吹喉極效。

【金不換】喉科指掌 功效較玉鑰匙尤勝。治疫喉。生肌長肉。

玉鑰匙加 人中白三錢 青黛三錢

西黃三錢 珠粉三錢

【吹喉散】經驗祕方 主治咽喉腫痛。

甘草 朴硝

右研勻。腫甚者吹之。

以上七方是吹喉藥

霍亂

證解 霍亂胸悶吐利脈絕之證。病

勢極猛暴。卽西醫所謂虎列拉也。多起于夏秋間。蓋夏時空氣中含養氣十之二強。淡氣十之八弱。假使養氣除去。其純粹之淡氣。可以令人窒息。故淡氣亦稱窒素。但養氣人體所必需者夏時旣因空氣中養氣少而吸入之養氣量不足。復因氣候炎熱勞力輩汗出多而血中內存積之養氣亦不足。故感胸悶。悶甚脾胃之升降失職。以致吐瀉交作。膚出魄汗。血中水分盡泄。則血如枯涸。四肢拘攣。癘瀰脈絕。于是死矣。章太炎先生霍亂論。謂冬時空氣濃厚。中含酸素多。呼吸入

血。則體溫高而血脈行疾。夏時空氣稀薄。中含素少。呼吸入血。則體溫低而血脈行遲。血脈行速則抵抗力強盛。血脈行遲則抵抗力衰弱。傷寒論所謂身寒脈盛者得之傷寒。身熱脈弱。得之傷暑。可知冬時寒雖盛。然血脈行速而抵抗力強。是以乍得傷寒。多爲陽證。夏秋寒雖微。然血脈行遲而抵抗力弱。猝罹寒涼。任其直中。中寒而厥。多爲陰證。治以吳萸四逆湯等。奏效如神。屢試屢驗。非誇詡也。冬時用涼。夏時用溫。乃證候虛實有殊。抵抗力強弱有異也。大論所

謂熱多欲飲水者。用五苓散。寒多不飲水者。用理中丸。四肢拘急大汗淋漓手足厥冷者。用四逆湯。脈不出者。用通脈四逆湯。兼煩躁欲死者。用吳茱萸湯。用之得當。可以起死回生。

名家驗方選

【六和湯】澹寮 治暑熱內蘊。霍亂吐瀉。寒熱交作。咳嗽胸滿。頭目疼痛。倦怠煩悶。或成痢疾。

香薷 人參 厚朴 縮研砂仁 甘草
木瓜 半夏 赤茯苓 藿香

杏仁 白扁豆
加姜棗煎。寒加紫蘇。（一方有白朮一方有蒼朮）

【藿香正氣散】惠民 治外感風邪。內傷飲食。憎寒。壯熱。頭痛。嘔吐。胸悶腹脹。痰嗽氣喘。傷冷。傷溼。傷暑。霍亂吐瀉。瘧痢。山嵐瘴癘。不服水土等症。

藿香 茯苓 白朮 大腹皮 柴蘇
厚朴 白芷 陳皮 苦桔梗 半夏 炙甘草
加姜棗煎。熱多加黃連。寒多加乾姜。寒甚加附子。嘔吐去甘草。腫脹去

大棗加燈心。痰食氣滯。去白芷加木香。

【厚朴湯】蘇沈方 治乾霍亂。

厚朴。高良薑 朴硝 枳殼 檳榔

大黃

【乾薑吳茱萸湯】肘後 治霍亂乾嘔。

乾薑 吳茱萸

手足逆冷。加附子。椒。

【三味飲子】外臺 療濕霍亂。吐利。

高良薑 豆蔻子 桂心

【理中丸】外臺 療冷熱不調。霍亂吐痢。

。宿食不消。

人參 炙甘草 桂心 白朮 高良

薑

右五味。搗篩蜜丸。如梧子大。每服卅丸。空心服。

【漿水散】保命 治陽虛人。霍亂吐利。冷汗不止。脈伏或脫者。

附子 甘草 半夏 良薑 肉桂

乾薑

按漿水即淡醋

【香薷散】活人 治霍亂轉筋。

香薷 甘草 厚朴 黃連

治吐利霍亂。須井中沈冷。頓服之乃效。

【小品人參湯】醫心方 霍亂卒吐瀉不禁

者。主之。

人參 甘草 茯苓 陳皮 葛根

麥門冬

聖惠、有白朮、生姜、名人參散。

【萸瓜湯】家寶 治霍亂吐瀉。頭旋眼暈

手脚轉筋。須臾不救。

吳茱萸 木瓜 食鹽

【勻氣散】廣嗣全書 治霍亂吐瀉。

藿香 白朮豆 木香 丁香 人參

乾薑 炙甘草 厚朴

加姜、棗、鹽、湯。或紫蘇木瓜煎。

【香薷散】準繩 治伏暑吐瀉。霍亂轉筋。

香薷葉 白朮豆 厚朴

（一方有茯苓）調益元散服。

【藟豆湯】外臺 療霍亂吐利。

扁豆 香薷 木瓜 乾薑

【蘆根飲子】聖惠 治妊娠霍亂。吐瀉心

煩。

蘆根 甘草 枇杷葉 人參 藿香

加薤白。生姜煎服。

【生脈飲】醫錄方 治熱傷元氣。肢體倦

怠。氣短懶言。口乾作渴。汗出不止

。脚欬眼黑。津液枯涸。

人參 麥門冬 五味子

長流水煎。按人參用井水煎。服之無

效。

【五苓散】仲景脈證並治見傷寒門第68方首

豬苓 白朮 桂枝 澤瀉 茯苓

【理中湯】仲景脈證並治見傷寒門第83方首

人參 炙甘草 乾薑 白朮

【四逆湯】仲景脈證並治見傷寒門第72方首

附子 乾薑 甘草

【通脈四逆湯】仲景脈證並治見傷寒門第74方首

按通脈四逆湯。卽四逆湯加倍乾薑。

【吳茱萸湯】仲景脈證並治見傷寒門第100方首

吳茱萸 人參 生薑 大棗

【臥龍丹】治諸痧中惡。霍亂五絕。諸般卒倒。不省人事。療癰疽發背。蛇蠍。蜈蚣咬傷。

蠍。蜈蚣咬傷。

西牛黃 金箔 冰片 荊芥 羊躑

躑 麝香 硃砂 豬牙皂角 燈心

炭

一方無荊芥。有北細辛。白火硝。明月不。蟾酥。共研細末。瓷瓶密藏。

每用少許。吹入鼻中。得嚏立愈。垂危重證。恥可以涼水調灌分許。瘡傷

蟲咬。用酒調塗。孕婦忌服。

【行軍散】武侯 辟疫氣（搗鼻）去風熱障翳。（點之）治口瘡喉痛。霍亂痧脹。

山嵐瘴癘。及暑熱穢惡。諸邪直于包絡。頭目昏暈。不省人事。危急等證。

牛黃 麝香 當門子 珍珠 梅花

冰片 蓬砂 明雄黃 火硝 飛金
右研極細末。瓷瓶密收。

【辟瘟丹】太倉公方 辟瘟疫。霍亂吐瀉。
絞腸肚痛。

蒼朮 羌活 紫草 白芷 白朮

川烏 防風 香附 烏藥 草烏

獨活 當歸 黃連 細辛 藜蘆

荊芥 肉桂 甘松 三柰 白芍藥

乾姜 麻黃 皂角 甘草 麝香

右藥研極細末。棗肉爲丸。如彈子大。
每用一丸。

【霍亂急救法】錄惲鐵樵先生於丙寅年。
因滬上時疫大行。所印送之傳單。

凡霍亂初起。必感胸悶泛噁。腹鳴腹痛。亦有僅僅泛噁者。亦有僅僅腹鳴者。此時爲病。尙不甚劇。病者往往不以爲意。

【第二步】吐瀉交作。或先吐後瀉。或先瀉後吐。此時胸悶愈甚。手指必覺麻。凡見此病狀者。霍亂症已確。先服十滴水。繼進辟瘟丹（中國藥店中有買）可以應手而愈。十滴水至少須半小瓶。少則無效。辟瘟丹。輕者半粒。重者一粒。尤重者兩粒。用溫開水磨服。胸腕卽不悶。少服亦無效。或者與十滴水先後服。若藥後仍覺胸

悶。可再進辟瘟丹。至胸不悶爲度。

【第三步】若第二步不治。則入第三步

大汗淋漓。面青唇白。爪甲泛紫。

手足麻甚而冷。氣則漸急。此爲極危

極險之候。可用十滴水一瓶。辟瘟丹

一粒先服繼卽予下面之方。

生附子八分 姜半夏錢半 鮮霍香

錢半 吳萸四分 枳實八分 乾薑

四分 川連三分 厚朴三分炒

「右藥煎濃。一次頓服。可以起死回

生。」若第三步再失治。則入第四步

。手脚牽動。昏不知人。螺門皆癰。

不可救藥矣。以上方法。只要病未至

第四步。可以萬舉萬全。且無流弊。切勿自誤。

瘧疾

證解 瘧疾寒熱起伏。寒慄鼓頷之

證。有每日發作。有間日發作。有三

四日發作。有日晏日早發作。凡先寒

後熱發作有定時者。皆爲瘧疾也。若

先熱後寒爲溫瘧。然未之見但熱不寒

者。名牡瘧。其原因夏令傷暑多汗。

或浴後當風。至秋令復感風寒所致。

猶之素問所謂夏傷于暑。秋爲痲瘧。

此外瘧之名目。亦頗繁夥。曰暑瘧。

曰風瘡。曰寒瘡。曰濕瘡。曰瘡瘡。曰癩瘡。曰癩瘡。曰牡瘡。曰疾瘡。曰食瘡。曰疫瘡。曰鬼瘡。曰虛瘡。曰勞瘡。曰瘡母等。其病名之不同。是根據病源之不同來。症候有殊。處方亦當有異也。例如截瘡用小柴胡湯加常山。溫瘡用達原飲。瘡之經年累月久久不愈。食積痰瘀。結成痞塊。爲疹爲脹。爲瘡母也。所謂無痰不成瘡。亦屬正氣已虛。邪氣留于肝經。用鱉甲煎丸。皆可奏效也。

名家驗方選

【何人飲】景岳截瘡如神凡氣血俱虛。久瘡不止。可服。

何首烏 人參 當歸 陳皮 煨生薑

【常山飲】局方瘡久不止者。用此截之。

常山 檳榔 知母 草菓 烏梅 貝母

加薑棗。半酒半水煎服。

【截瘡清肺湯】醫方大成截瘡用之。貝母人參臨發日之五更服之。可以全愈。否則當再服。

【四獸飲】簡易治瘡病胃虛。中挾痰食。

人參 白朮 陳皮 茯苓 炙甘草

製半夏

草菓烏梅加姜棗煎。

【木賊煎】景岳 凡瘧疾形實氣強。多濕

多痰者。宜此截之大效。

木賊艸 小青皮 製厚朴 製半夏

檳榔 蒼朮

【清脾飲】嚴氏 治瘧疾。熱多寒少。口

苦噓乾。小便赤澀。脈來弦數。

青皮 製半夏 甘草 厚朴 艸果

仁 胡柴 茯苓 黃芩 白朮

加姜煎服。一方加檳榔。瘧不止加酒

炒常山烏梅。

【延年知母鼈甲湯】外臺 療溫瘧。壯熱

不能食。

知母 常山 竹葉 石膏 鼈甲

地骨皮

【芎歸鼈甲散】直指 治勞瘧寒熱。

當歸 川芎 芍藥 青皮 陳皮

茯苓 半夏 鼈甲

加薑棗煎。

【柴胡芎歸湯】同春 治夜間陰瘧。引出

陽分則散。

胡柴 川芎 當歸 芍藥 人參

桔梗 白朮 乾葛 茯苓 陳皮

厚朴 紅花 甘草

加薑、棗、烏梅煎。

【清中驅瘧飲】六要 治瘧疾初起。胸膈飽悶。

半夏 橘紅 柴胡 黃芩 檳榔

草菓 山查 青皮 厚朴 蒼朮

加姜棗煎。

【截瘧飲】必讀 虛人久瘧不止。此飲神効。

人參 黃芪 白朮 茯苓 砂仁

草菓 橘紅 甘草 五味子 烏梅

加薑棗煎。

【人參實衛湯】醫療方規矩 治瘧痰不止自汗。

人參 甘草 芍藥 黃芪 白朮

【柴苓湯】尊生 治陽明瘧。

柴胡 澤瀉 甘草 赤茯苓 半夏

枳心 豬苓 黃芩 白朮 人參

加生姜煎。

【柴胡加桂枝湯】尊生 治少陽瘧。

柴胡 黃芩 甘草 桂枝 一作肉

桂 半夏

加姜棗煎。

【柴朴湯】準繩 治諸瘧疾。

柴胡 黃芩 半夏 麴 厚朴 蒼朮

白茯苓 獨活 陳皮 藿香 前

胡 甘草

加生姜。五更時服。氣弱者。加人參

白朮。食不消化者加神麴。麥芽。山查。

【柴胡去半夏加栝萸根湯】外臺 治瘧病發渴及勞瘧。

柴胡 黃芩 栝萸根 人參 甘草
生姜 大棗

【小柴胡湯】仲景 治傷寒少陽症。往來寒熱。口苦耳聾。脇痛脈弦。瘧發寒熱。及婦人傷寒。熱入血室等證。

柴胡 黃芩 甘草 半夏 人參
加生姜。大棗煎，加常山。截瘧如神。

【白虎加桂枝湯】金匱 治溫瘧者。其脈如平。身無寒。但熱。骨節煩痛。時

嘔。此湯主之。

知母 石膏 甘草 粳米 桂枝

【蜀漆散】金匱 治瘧多寒者。名曰牡瘧。此散主之。

蜀漆 雲母 龍骨
【牡蠣湯】外臺 治牡瘧。

牡蠣 麻黃 甘草 蜀漆

【柴胡桂薑湯】外臺 治瘧寒多微有熱。或但寒不熱。服一劑如神。

柴胡 桂枝 乾姜 甘草 栝萸根
黃芩 牡蠣

【達原飲】醫通 治時疫邪氣。初犯募原。及疫瘧。壯熱。多汗而渴者。

黃芩 厚朴 檳榔 炙甘草 草菓

白芍藥 知母

加棗姜煎。發熱前服。溫覆取微汗。

日服三次。夜服二次。

【截瘡七寶飲】治實瘡久發不已。

常山酒炒 青皮 檳榔 甘草 煨

草果 陳皮 厚朴

【蟄甲煎丸】金匱 治瘡病。以月一日發

。當十五日愈。設不差。當月盡解。

如其不差。結為癥瘕。名曰瘡母。急

治之。宜此丸主之。

麥冬 蠶甲 厚朴 蟻螂虫 枳實

廢蟲 芒硝 桂枝 蜂房 大黃

白芍 甘草 柴胡 黃芩 半夏

人參 葶藶 丹皮 阿魏 烏扇

石葦 乾姜 鼠婦 桃仁

【常山草菓補正湯】穎甫 瘡之輕者日發

。正氣略虛。則間日發。正氣益虛。

則間二日發。世俗謂之三陰瘡。宜此

法治之。

常山 茯苓 草菓 川芎 生潞黨

生白朮 甘草 全當歸 赤白芍

熟地 小青皮 知母 製半夏

生薑 紅棗

【外治方】無論每日瘡。間日瘡。三日

瘡。均可貼之。

硃砂 斑貓 雄黃 麻黃

右藥研末。和入膏藥。貼在項後第三骨節（此名肺俞穴）但須在發作前二三点鐘貼之。即能截止。

痢疾

證解 國醫之言痢疾者。其名詞多矣。素問謂之腸澼。有腸澼下白淋。腸澼下膿血。卽白痢赤痢之別名也。曰便膿血。難經謂之大瘕泄。有大瘕者。裏急後重。屢至圍而不能便之。謂孫真人千金方引素問曰。春傷于風。夏爲膿血。多滯下也。今觀素問無

此文。是佚篇也、痢疾之西醫名詞。爲赤痢。爲腸加答兒。西醫以有菌無菌爲斷。國醫不驗菌。則以裏急後重者爲痢疾。無裏急後重者爲泄瀉。其在仲景書。則統稱下利。後人於病名輒加疒傍。乃作痢字。方書有血痢。氣痢。虛痢。勞痢。五色痢。水穀痢。噤口痢。休息痢。暴痢。久痢等名。痢者。皆由暑溼外受。內食瓜果食生冷及不潔等物。膠固而成。故云無積不成痢。痢疾之爲病，腸病也。小腸下口爲闌門。直腸之下口爲肛門。皆有約括筋。使腸內容物不致下行無

阻。患痢者因氣墜。大腸直腸。皆腫。於是蠕動加速。迫物下行。而肛門之括約筋。因所下者非糞便。收縮不令出。故腹部搗痛。而裏急後重。其所下或白。或紅。或紅白並下者。皆膠黏如凍。氣下墜裏急下重。屬熱之陽證。可用白頭翁湯升舉之。久痢滑脫。屬寒之陰證。可用桃花湯。兜塞之。上熱下寒。口噤不食而久下痢者。可用烏梅丸。夏時痢疾。用木香檳榔丸。若秋季之痢。用枳實導滯丸。更效。

各家驗方選

【芍藥湯】保命 治下痢膿血。腹痛裏急後重。日夜無度。

芍藥 甘草 大黃 當歸 肉桂

黃芩 木香 黃連 檳榔

水煎服。如痢不減。大黃可以加重。

【蒼朮地榆湯】潔古 脾經受溼痢疾下血。

蒼朮 地榆

水煎食前服。

【溫脾湯】千金 治下久赤白連年不止。

及霍亂。脾胃冷實不消。

大黃 人參 甘草 乾薑 附子

【治痢散】心悟 專治痢疾初起之時。不

論赤白皆效。

葛根 陳松蘿茶 山查 苦參

赤芍藥 陳皮 麥芽

【駐車圓】千金 治大冷洞痢腸滑。下赤

白如魚腦。

黃連 當歸 乾薑 阿膠

右爲末。以大酢八合。烱膠和之。和

丸如大豆許。飲服卅丸。日三服。

【黃連湯】千金 治赤白痢。

黃連 石榴皮 甘草 黃柏 阿膠

乾姜 當歸

水煎服。

【沒乳湯】本草權度 治瘀血湯。

乳香 桃仁 沒藥 滑石

右佐以。木香。檳榔。爲末。蒸餅丸

磨後。二味同蘇木湯下。

【香連丸】直指 治下痢赤白。膿血相雜

。裏急後重。

木香 黃連

醋糊丸。米湯下。

【人參敗毒散】活人 脈證治法見溫病門

。嘉言每以治痢。名逆流挽舟之法。

人參 桔梗 前胡 茯苓 羌活

柴胡 枳殼 獨活 川弓 薄荷

甘草

加生姜煎。

【芍藥加芒硝煎】醫方大成 治痢疾。便膿血。而裏急後重者。

芍藥 當歸 大黃 木香 肉桂

黃連 檳榔 黃芩 甘草 芒硝

【文仲犀角散】外臺 治熱毒痢血。

犀角 石榴皮 黃連 乾藍 地榆

為散。米飲調服。

【大桃花湯】千金 治冷白滯痢腹痛。

赤石脂 乾姜 當歸 龍骨 牡蠣

附子 白朮 甘草 芍藥 人參

【犀角散】聖惠 治血痢。止腹痛。

犀角 黃連 阿膠 艾葉 當歸

伏龍肝

為散米飲調下。

【阿膠散】聖惠 治膿血痢。繞臍疼痛。

阿膠 當歸 黃連 芍藥 赤石脂

乾薑

為散米飲調下。

【斗門散】局方治八種毒痢。

乾葛 地榆 甘草 乾薑 當歸

黑豆 罌粟殼

【祕傳香連丸】直指 治諸般痢疾作痛。

神效。

黃連 木香 白豆蔻 乳香 沒藥

甘草生薑湯服。

【參歸芍藥湯】回春 治痢久一二十日。

痢去多不止。用此調理氣血。

當歸 茯苓 芍藥 白朮 人參

砂仁 山藥 陳皮 甘草

加烏梅燈草蓮肉水煎。

【四味香連丸】入門 治痢疾初起。不問赤白。每日二服。有積自行。無積自止。

黃連 大黃 木香 檳榔

【香參散】大還 治痢久積穢已盡。腹中不痛。或微痛不後重。但滑溜不止。

人參 白朮 白茯苓 白芍 白扁

豆 陳皮 肉蓯 烏梅 木香 甘

草 陳米

右水煎。滑溜加粟殼、爲末、沙糖湯

下。

【黃連丸】上池祕錄 療痢疾無問冷熱有神驗。

黃連 阿膠 茯苓

右先擣。黃連。茯苓。爲末。以許水烱膠和丸。

【輕車湯】醫療方規矩 治男婦。一切血痢。

黃連 當歸 阿膠 乾姜

右藥水煎服。

【真人養臟湯】謙甫 治瀉痢日久。虛寒脫肛。

人參 木香 罌粟殼 白朮 炙甘

草 煨肉豆蔻 當歸 訶子 白芍

肉桂

寒甚加附子。一方中無當歸。

【補中益氣湯】東垣 治煩勞內傷。陽虛

自汗。氣虛不能攝血。久痢久瘧。

人參 白朮 陳皮 黃芪 炙甘草

歸身 柴胡 升麻

加姜棗煎。

【白頭翁湯】仲景 脈證並治見傷寒門第109方首

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮

【桃花湯】仲景 脈證並治見傷寒門第102方首

赤石脂 乾姜 梗米

【烏梅丸】仲景 脈證並治見傷寒門第108方首

烏梅 細辛 乾姜 當歸 蜀椒

桂枝 黃連 附子 人參 黃柏

【木香檳榔丸】寶鑑 治一切滯氣。心胸

腹脅痞滿。二便澀滯。

青皮 枳殼 黑丑 炒吳萸 陳皮

黃柏 香附 黃連 木香 大黃

砒硝 三稜 檳榔 蓬莪朮 一方

有 當歸 黃芩

【枳實導滯丸】東垣 治脾胃因於溼熱。

不得運化。胸悶腹痛。積滯泄瀉。

枳實 黃芩 神麴 大黃 黃連

白朮 茯苓 澤瀉

泄瀉

證解 泄瀉之爲病。腸胃脾病也。

腸胃司運化。脾司吸收。吸收則液體由腸管入於血管。腸炎之滲出。則液體由血管入於腸管。脾病而其所滲出於管外者。爲濕。夫知此亦可以知脾病惡溼之原矣。凡其人飲食不節。起居不時。脾胃受傷。運化無權。吸收隨之失職。腸炎滲出而泄瀉作矣。難經所謂溼多成五泄。其殮泄之完穀不化。溘泄之腸垢污積。鶩溘之澄青溺白。濡泄之身重脈軟。滑泄之久下不

禁。以上泄瀉。皆不外乎脾傷積溼。治法初用調中分利。濕兼化燥。風兼解表。寒佐溫中。食積者消之。熱者清之。虛者補之。滑者固澀之。隨證治之。例如五更泄。足冷腹疼爲腎泄。用四神丸。中寒腹痛。洞泄無度。利下完穀。用附子理中湯。夏令多水瀉。用藿香正氣丸加荷蒂皆能奏效也。

名家驗方選

〔七成湯〕溫疫 治病愈後。脈遲細而弱。黎明或夜半便作泄瀉者。

五味子 附子 人參 破故紙 茯苓

苓 甘草。

【四柱飲】局方 治臟虛。陽耗。耳鳴。

腹痛。二便滑數。

人參 煨木香 炮附子 白茯苓

加姜棗煎。鹽少許。葉氏。加白朮名

附子降氣湯。

【六柱湯】準繩 治脾胃虛弱吐利。肢冷

脈微。

人參 熟附子 肉苳蔻 白茯苓

南木香 白朮【一作訶子】

加姜棗煎服。(活人有白朮。無訶子

。

【八柱散】醫療手引艸 治腸胃虛寒。滑

泄不禁者。

甘草 訶子 罌粟殼 人參 肉苳

蔻 附子 白朮 乾薑

右爲末。入姜棗煎服。

【胃苓散】婦人良方 治夏秋之間。脾胃

傷冷。水穀不分。泄瀉不止。

豬苓 澤瀉 桂枝 茯苓 白朮

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

按此卽。五苓散。平胃散。合劑。加

姜棗煎。

【連理湯】要訣 治暑月內傷生冷。下泄

無度。

人參 乾姜 黃連 白朮 炙甘草

茯苓

按此即理中湯。加黃連。茯苓。

【連葛解醒湯】大還酒溼積。腹痛泄瀉。

黃連 滑石 神麴 葛花 炒山梔

青皮 木香

加茵陳。澤瀉。豬苓。肉桂。分利濕熱。尤妙。

【二宜丸】朱氏集驗治泄瀉。即五苓散。理中丸。合劑煎服。

【三白散】醫療藥方規矩治一切泄瀉如神。

白朮 乾姜 澤瀉 茯苓 生姜
黃連 厚朴 芍藥 烏梅

【益中散】張氏醫通治大人小兒之泄瀉。

。白朮 荷葉 芍藥 陳皮 茯苓

乾姜

【防風芍藥湯】東垣治殮泄。身熱脈弦。頭痛腹痛。

炒防風 炒黃芩 炒芍藥

【香砂六君子丸】摘要治中虛氣滯。痰濕內阻。胸中滿悶。食難運化。嘔噦。

。腹痛。腸鳴泄瀉等證。

人參 炒焦白朮 木香 茯苓
炙甘草 研砂仁 法半夏 陳皮

研細末和丸。姜棗煎服。

【胃關煎】景岳治脾胃虛寒作瀉。或久

瀉腹痛不止。

熟地 山藥 白扁豆 炙甘草 乾

姜 吳萸

白朮水煎。氣虛加人參。下脫加附子。

【參苓白朮散】局方 治脾胃虛弱。飲食

不進。多困少力。嘔吐泄瀉。

白扁豆 蓮子肉 桔梗 縮砂仁

薏苡仁 人參 白茯苓 白朮 甘

草 山藥

右爲末。加姜棗煎。

【保和丸】丹溪 和血。補血。治食積酒

溼痰飲。胸膈痞滿。噯氣吞酸。泄瀉

腹痛。及瘡痢。

山查 炒橘紅 麥芽 姜半夏 神

麴 白茯苓 連翹殼 黃連 炒蘿

蔔子

一方無黃連。一方無黃連、麥芽、一

方無茯苓、連翹殼、蘿蔔子。共研末

。水泛丸。

【八珍散】普濟本事 治脾虛泄瀉。開胃

進食。

人參 茯苓 白扁豆 白朮 黃芪

甘草 山藥 粟米

【四神丸】薛氏

破故紙 吳茱萸 大棗 五味子

肉荳蔻 生姜

【藿香正氣丸】局方

藿香 茯苓 白朮 大腹皮 紫蘇

厚朴 白芷 陳皮 半夏 炙甘

草 苦桔梗

加姜棗和丸。

【附子理中湯】準繩

炮附子 炮乾姜 焦白朮 人參

炙甘草

（一方加吳茱萸、肉桂、當歸、陳皮、厚朴、）

水煎食前溫服。入肝加木瓜。入脾多加白朮。入肺加桑白皮。入心加茯苓。腹痛甚加木香。下利及渴者。多加

白朮。倦臥沈重。多加附子。腹滿去甘草。嘔吐去白朮。加半夏。薑汁。臍下動氣。去白朮。加桂心。悸加茯苓。寒積結胸。加枳實。

脚氣

證解 脚氣病之名詞。古來無也。後以病從脚起。故名脚氣。古書或稱壅疾。亦即晉宋以前所謂緩風。內經所謂厥逆也。急性脚氣。猝然由足腫至膝。為第一期。由膝腫至腿股為第二期。由腿股腫至心腹。為第三期。即所謂衝心期。觀其腫至心腹而感胸

悶。徵之呼吸促迫。脈搏疾速者。腳氣衝心無疑矣。病愈危。則脈搏愈速。呼吸愈迫，加以自汗嘔吐。而死期至矣。東南地卑屬濕。易罹腳氣。西

北地高屬燥。罕見此病。腳氣之原因有二。曰內因。曰外因。凡受濕令之淡氣。或坐臥溼地等。致令溼邪襲于肌膚經絡而入臟腑者。爲外因也。恣以肥甘過度。酒醴無節。或多食乳酪等物。致令壅塞經絡。下注足脛而日漸脹痛。或上連手節者。爲內因也。方書以腫爲溼腳氣。不腫爲乾腳氣。屬溼者。可用五苓散。胃苓湯等。除溼

分利之。屬乾者。可用四物湯加牛膝木瓜等。行氣清利之。急性腳氣如未至衝心期。用雞鳴散加附子。皆可奏效也。

名家驗方選

【越脾湯】千金 治風溼惡風。一身悉腫脈浮而渴。風痺腳弱。

麻黃 甘草 大棗 生薑 石膏

右藥水煎。寒甚加附子。膚腫加白朮。

【獨活湯】千金 治脚痺。

獨活 茯苓 乾薑 防風 黃芪
甘草 芍藥 人參 附子 當歸

大豆 葛根

右藥水煎。

【犀角旋覆花湯】千金 治脚氣腫滿。小便祕澀。氣急衝心。

犀角 生薑 茯苓 橘皮 旋覆花

紫蘇莖葉

右藥水煎。

【茱萸湯】千金 治脚氣入腹。困悶欲死腹脹。

吳茱萸 木瓜

水煎。(三因)酒糊丸。名茱萸圓。

【半夏湯】千金 治脚氣上入腹。氣急上衝胸。氣急欲絕。

半夏 人參 桂心 乾薑 附子

甘草 細辛 蜀椒

【烏頭湯】千金 治風冷脚痺。疼痛。羸弱。不可屈伸。

烏頭 桂心 獨活 附子 當歸

蜀椒 乾薑 細辛 芍藥 大棗

秦芫 防風 甘草 茯苓

【風引獨活湯】千金 治脚氣兼補方。

獨活 茯苓 大豆 炙甘草 升麻

桂心 人參 防風 芍藥 當歸

乾薑 黃芪 附子

水煎服。相去二十里久。更進服。

【麻黃散】聖惠 治風水腫滿。身疼惡風

脚弱皮膚不仁。

越脾湯。加白朮、附子。更加防己、桑白皮。

按越脾湯。即麻、甘、石、薑、棗。

【牛膝散】聖惠 治脚氣腫脹。小便不利。

。牛膝 甘草 丹皮 檳榔 桃仁

肉桂 大黃 羚羊角 芍藥 防己

芒硝

【澤瀉散】聖惠 治脚氣。大小便秘澀。

膀胱氣壅攻心。腹痞悶。

澤瀉 豬苓 茯苓 枳殼 牽牛

木通 檳榔

右細末。每服二錢。生姜葱白湯。調

下。日二三服。以利爲度。

【桑白皮散】聖惠 治脚氣腹脹滿。壅悶喘息。

桑白皮 檳榔 木香 大黃 青橘

皮 牽牛子 杏仁

右爲末。童便調下。

【加苓腎氣圓】濟生 治腎虛。腰重脚腫。小便不利。

附子 牡丹皮 山茱萸 澤瀉 牛

膝 車前 山藥 茯苓 官桂 熟

地

右爲細末。蜜丸加梧子大。每服七十圓。空心米湯下。

【檳榔散】聖惠 治脚氣春夏防發。宜服此疎風調氣。

檳榔 川芎 獨活 大黃 羚羊角

沈香 茯苓 枳殼 甘草

加生薑水煎。

【犀角散】聖惠 治婦人脚氣忽發。衝心悶亂。四肢煩疼有熱。

犀角屑 檳榔 芍藥 木香 紅花

紅雪 紫蘇 茯苓

右藥水煎。

【檳榔湯】濟生 治一切脚痛。

檳榔 木瓜 紫蘇 橘皮 香附

甘草

右藥水煎。加姜。

【大戟丸】聖濟 治脚氣攻注。心腹脹滿。小便赤澀。

炒大戟 炒葶藶 炒續隨子 炒芫

花 炒巴豆

右藥爲末。蜜丸如梧子大。每十九。

燈心湯下。

【羌活導滯湯】東垣 治脚氣初起。一身悉痛。手足腫痛。大小便滯結。

羌活 枳實 防己 當歸尾 獨活

大黃

【當歸拈痛湯】東垣 治濕熱爲病。股節煩疼。肩背沉重。胸膈不利。手足脛

腫痛不可忍。

當歸 苦參 猪苓 澤瀉 茵陳

知母 白朮 甘草 蒼朮 葛根

防風 升麻 人參 黃芩 羌活

右藥水煎。

【木瓜湯】醫級 治風濕脚氣。

木瓜 茯苓 炙甘草 紫蘇 大腹

皮 陳皮 羌活 木香

右藥水煎。食前服。

【木瓜吳茱萸湯】經驗良方 治脚氣入腹

。困悶欲死。腹脹喘息。

乾木瓜 檳榔 吳茱萸

水煎食前溫服。

【風濕湯】經驗良方 治風寒濕痺。脚氣筋攣。著床不能行步。

附子 白朮 當歸 甘草 沒藥

桂枝 防風 薏苡仁 茯苓 乳香

右藥水煎。

【七味檳榔湯】治脚氣。疏通之劑也。

桂枝 檳榔 大黃 橘皮 生姜

枳實 甘草

右藥水煎。

【洗脚氣方】

礬石 甘草 芍藥

右三味。水煎洗脚。或少許加鹽亦佳。

【追風毒剉散】直指 治脚氣熱多證。疎

丑風毒。

獨活 大黃 檳榔 防風 桑白皮

郁李仁

右藥。加黑豆煎服。

【桂心湯】奇効 治風毒脚氣。

桂心 黃芩 防風 茯苓 犀角

當歸 升麻 檳榔 麻黃

右水煎服。

【甘豆湯】奇効 治脚腫。

黑豆 甘草

水煎服。

【搜風丸】仁存 治脚氣內壅。大便不通。

大黃 黑牽牛 檳榔

枳實

右爲末。米糊丸。如梧子大。食前飯湯下。

【沉香湯】奇効 治脚氣衝心。煩悶氣促。脚疼。

沉香 檳榔 紫蘇 木通 芍藥

吳茱萸

加生姜水煎。

【防己飲】丹溪 治脚氣濕熱。

防己 木通 蒼朮 川芎 犀角

黃柏 生地 檳榔 甘草

【三將軍圓】得効 治脚氣入腹衝心。大便不利。

宣木瓜 吳茱萸

右爲末。糊丸如菉荳大。粳米枳殼湯下。

【神效檳蘇散】彭氏普濟 治脚氣如神。

檳榔 沒藥 蘇葉梗 木瓜 羌活

乳香 當歸 防風

和水加姜、葱、煎。

【活血丹】萬安 治寒濕脚氣。筋骨手足

。一切疼痛。

當歸 官桂 甘草 乾姜 人參

杜仲 牛膝 附子 白朮

【檳榔湯】萬安 治風毒脚氣。四肢不仁

檳榔 防風 犀角屑 茯苓 當歸

麻黃 桂心

【廣濟半夏湯】外臺 治脚氣衝心煩悶。氣急臥不安。

半夏 生姜 檳榔 桂心

【五苓散】仲景 脈證並治見傷寒門第8方音

豬苓 澤瀉 桂枝 茯苓 白朮

【胃苓湯】準繩

豬苓 澤瀉 桂枝 茯苓 白朮

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

按比卽。五苓散。平胃散合劑。水煎。

【鷄鳴散】準繩 治脚氣疼痛。及風濕流

注。足痛筋脈浮腫者。

檳榔 木瓜 紫蘇葉 陳皮 吳萸

桔梗 生姜 加附子

右藥爲末。五更時服。

【四物湯】局方

川芎 生地 牛膝 當歸 白芍藥

木瓜

中風

證解 中風之狀。卒然昏倒。不

省人事。痰聲如鋸。口眼喎斜。手

足癱瘓。多發于卅五歲以後。大抵

其人腦部松果腺發育不健全。此種人

體質多肥。其肥異常。其形臃腫。

常鼾睡。多血。腦不靈。氣急。此種

人腦部本弱。因腺體不健全。體內機

關不協調。因而多痰。如此者。爲容

易中風之體質。蓋卅五以後是由盛入

衰時期。復恣食肥甘而好色慾。恣食

肥甘則胃熱而消油多痰。以致經絡不

通。好色則精空。腦失所養。易罹卒

中。醫書或以一中卽死者。爲真中。

左癱右瘓。半身不遂者。爲類中。千

金稱風痺風懿。亦卽西醫所謂腦出血

。謂因腦部血管爆裂所致。故往往於

頭部安置冰囊。

金元間醫家論中風者。東垣主虛。河

間主火。丹溪主痰。東垣所以主虛。

因中風之病。必卅五以後。四十五以後者更多。若卅五以前。罕有病中風者。則謂之由虛而病。未嘗不可。丹溪所以主痰。則因中風多起于肥人。既中之後。又見頑痰爲梗。因之以痰爲說。河間所以主火。因中風者。血中酸素自燃。熱侵纖微神經而見血色。殷紅。淵雷案此亦用鐵樞先生說予大劑甘涼之藥。其熱漸減。故主火不爲臆說也。要之。皆以藥効爲病因。故所見殊異也。攷西國生理病理。可知中風之爲病。是纖微神經斷絕之故。淵雷案此亦用鐵樞先生說視神經。舌咽神經。皆有連帶關係。

故眼斜舌縮。此病初中卽治。或可挽救。若延過六點鐘。乃至十點鐘。不與藥則危。因可治之病機已錯過也。在可治時若見閉證者。急用蘇合香丸之類灌之。若見脫證者。急用大劑參附之類治之。然第一步吐其所食。使腑氣先通。不能爲梗。第二步弛緩神經。兼用除痰清熱之類。第三步用甘涼稀血之類。治之得當。可以恢復如常人也。

名家驗方選

【蘇合香丸】局方 治中風痰厥。昏迷。僵仆。不省人事。口眼喎斜牙關緊閉證。

宜此丸灌之。

蘇合香油 安息香 丁香 訶梨

青木香 白檀香 沈香 硃砂 華

撥 香附子 烏犀角 薰陸香 龍

腦 麝香

藥肆中有現存發售。服半粒或一粒。

【通關散】準繩 卒中風。口噤不省人事

。吹入鼻中有嚏即甦。無嚏難治。

細辛 皂角 薄荷 雄黃（一方有

南星半夏） 研爲末每用少許

【小續命湯】千金 治卒中風欲死。身體

緩急。口眼喎斜。語言蹇澀。或舌強

不言。當隨症加減皆驗。

麻黃 杏仁 甘草 防己 人參

黃芩 桂心 芍藥 川芎 防風

附子 生薑

【大秦芫湯】濟要 治中風四肢麻痺。舌

強不能言語。宜此湯。

秦芫 當歸 生地 芍藥 熟地

防風 羌活 黃芩 獨活 白朮

石膏 白芷 甘草 茯苓 川芎

細辛

【牛黃清心丸】局方 治諸風緩縱不隨。

言語蹇澀。心神恍惚。痰涎壅塞。

牛黃 白芍藥 麥門冬 黃芩 當

歸 防風 白朮 柴胡 桔梗 川

芎 茯苓 杏仁 神麴 蒲黃 人參 羚羊 麝香 龍腦 肉桂 蛤粉炒阿膠 大豆卷 白蘇 炮乾 薑 雄黃 犀角 山藥 甘草 金箔 大棗

藥店中有現存發售。

【保元湯】驗方 治卒中虛脫。不省人事。

。生附子 當歸 人參 黃芪

白朮 桂枝

【八味順氣散】濟生 治中風氣虛。痰涎壅盛。

人參 白朮 茯苓 甘草 烏藥 青皮 陳皮 白芷

【玉屏風散】得効方 治中風衛虛。自汗不止。

防風 黃芪 白朮

加姜棗煎或研細末。

【三生飲】局方 治卒中風。不省人事。

口眼喎斜。痰涎上壅。

天南星 烏頭 木香 生附子

【清熱導痰湯】壽世 卒中不省人事。牙

關緊閉不言。火痰壅盛。面赤身熱。

人參 甘草 茯苓 白朮 半夏

陳皮 南星 桔梗 瓜蒌 枳實

黃芩 黃連

【黑錫丹】局方 治卒中風。痰聲如鋸。言

語蹇澀。神昏氣亂。

黑錫 硫黃 沉香 木香 金鈴子

附子 茴香 胡蘆巴 陽起石

破故紙 肉桂 荳蔻

【返魂丹】聖惠治卒中風。不能言語。

神志昏迷。

生玳瑁 雄黃 辰砂 白芥子

右藥研末。加安息香爲丸。以酒灌服。

【獨活散】聖惠治卒中風。不能言語。

身體拘攣。

獨活 防風 附子 芍藥 當歸

甘草 桂心 生姜

【侯氏黑散】金匱治大風。四肢煩重。

心中惡寒不足者。

菊花 白朮 細辛 茯苓 牡蠣

桔梗 防風 人參 礬石 黃芩

當歸 乾姜 川芎 桂枝

【風引湯】金匱除熱癰癩。主大人風引

。少小驚癇癧。

大黃 乾薑 龍骨 桂枝 甘草

牡蠣 寒水石 滑石 赤石脂 白

石脂 紫石英 石膏

【古今錄驗續命湯】外臺治中風痲。身

體不能自收。口不能言。冒昧不知痛

處。或拘急不得轉側。

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 川芎

當歸 人參 石膏 乾姜

右水煎。范汪云是仲景方。又古今錄驗。無人參。有黃芩。名西州續命湯。深師、名大續命湯、千金亦名大續命湯。

【附子散】千金 主治中風。手臂不仁。口面喎僻。

附子 桂心 細辛 防風 人參

乾薑

【桂心散】聖惠 治中風。失音不語。

桂心 附子 赤箭 甘草 羚羊

酸棗 羌活 防風

加竹瀝沖服。傳家祕寶名解語散。簡

易方引資壽方同。聖濟名桂附湯。

【人參南星圓】朱氏集驗 治風邪入心經。神思昏亂。涎潮搐搦。

南星 白附子 茯苓 天麻 人參

遠志 酸棗仁

【朮附湯】近效 治風虛頭重眩苦極。不知食味。暖肌補中益精氣。

白朮 附子 甘草 生姜

【三黃湯】千金 治中風手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂。惡寒經日不欲飲食。

麻黃 獨活 細辛 黃芪 黃芩

心熱加大黃。腹滿加枳實。氣逆加人參。渴加天花粉。寒加附子。

【滌痰散】嚴氏 治中風痰迷心竅。舌強不能言。

南星 半夏 枳實 茯苓 橘紅

石菖蒲 人參 竹茹 甘草 生薑

【地黃飲子】宣明 治中風舌瘡不能言。

足廢不能行。此少陰氣厥不至。名曰風痺。急當溫之。

熟地 山茱萸 五味子 菴蓉 石

斛 麥冬 石菖蒲 遠志 茯苓

桂心 附子 巴戟 薄荷

加生姜棗煎。

【資壽方解語湯】簡易 治風侵心脾。舌強不言。半身不遂。口眼喎斜。

附子 防風 酸棗 天麻 羚羊
官桂 甘草 羌活

水煎竹瀝沖服。

【勻氣散】端竹 治腰腿疼。半身不遂。手足難以屈伸者。

天麻 烏藥 沉香 木瓜 白朮
青皮 甘草 白芷 人參 紫蘇
加生姜大棗煎。

【附子大獨活湯】朱氏集驗 治中風癱瘓。一切風氣虛損。

白朮 人參 肉桂 芍藥 乾葛
當歸 獨活 附子 防風 甘草
【活絡丹】局方 治風痰或寒濕襲于經絡

。拘攣麻木不仁。步履艱難。

川烏頭 草烏頭 地龍 南星 乳

香 沒藥

藥店中有售。

【人參再造丸】功能治中風。中痰。口

眼喎斜。手足拘攣。筋骨疼痛。半身

不遂。步履艱難。言語蹇澀。凡真中

。類中。左癱。右瘓。服之皆驗。能

驅風散火。益氣養血。舒筋骨。逐頑

痰。活絡調元爲主。

人參 當歸 川芎 黃連 羌活

防風 炒玄參 炒藿香 炒白芷

茯苓 炒麻黃 炒天麻 炒葶藶

炒薑黃 炙甘草 勿見火肉桂 荳

蔻 蒸九次何首烏 另研琥珀 炙

黃芪 酒蒸大黃 研草豆蔻 雄鼠

糞 熟地 芝麻油浸炙穿山甲 安

息 小者佳蕪蛇 乾全蠍 酒炒威

靈仙 葛根 烘乾桑寄生 細辛

炒赤芍藥 酒炒烏藥 麸炒青皮

土炒於朮 洗炒蠶蠶 去油乳香

去油沒藥 辰砂 酒炒骨碎補 香

附 天竺黃 白附子 炙生龜版

沈香 丁香 膽星 酒浸紅花 犀

角 厚朴 炙地龍 松香 木香

梅花冰片 西牛黃 血竭 炙虎脛

骨

研爲末。煉蜜和丸。每丸重一錢。金箔爲衣。蠟殼封固。每服一九。生薑湯送下孕婦忌服。藥店中有現存出售。

【大活絡丹】功能治一切中風痰厥。癱

瘓。痿痺。疼痛拘攣。步履艱難等症。

白花蛇 烏梢蛇 威靈 俱黃酒浸

兩頭尖 草烏 煨天麻 去毒全蠍

黑豆水浸首烏 炙龜版 麻黃

貫仲 炙甘草 羌活 官桂 藿香

烏藥 黃連 熟地 蒸大黃 木香

沈香 細辛 赤芍藥 去油沒藥

丁香 去油乳香 僵蠶 姜製南星

青皮 骨碎補 豆蔻 酒浸安息香

製黑附子 黃芩 香附 玄參

白朮 防風 葛根 炙虎脰骨 當

歸 血竭 炙地龍 犀角 麝香 松

脂 牛黃 片腦 人參

研末蜜丸。金箔爲衣。白蠟爲匱。每服一九。陳酒送下。藥店中有製就。

均有發售。

癆瘵虛損

解證 癆瘵之效嗽。卽西醫所謂肺

結核也。凡癆病殆無有不效者。肺癆固效。心脾肝腎之癆亦效。古人所謂

五臟皆有癆也。故癆病之名詞。不可認爲一種病之名詞。必須於癆字之上。更加一限制之名詞乃得。例如肺癆、童癆、乾血癆、蓐癆等是也。

虛損癆瘵。除肺結核外。皆爲機能上之退行性疾患。古人以作癆爲近因。以虛損爲遠因。虛者氣血之虛。損者臟腑之損。久虛以致癆損。唐孫思邈謂虛癆有五癆、六極、七傷。金匱所謂五癆者。心癆神損。肝癆血損。脾癆食損。肺癆氣損。腎癆精損是也。六極七傷證候並治法詳方首。茲不贅述。

癆瘵之屬。有桃花疰。有傳尸癆。觀千金方鬼疰病。卽傳尸癆。疰本注字。去二點偏旁加疒。意謂由一人患此。死則更轉注他人。有至滅門者。其病恆發於十七八歲。乃至廿七八歲。其證狀。沈沈默默。欬嗽發熱。肌膚漸漸羸頓而遺精。自憊不能興。臥床之日起。扣足一百日死也。

癆病爲最難治之病。用藥固難。調理尤難。半在病者不知利害。如操勞憂鬱喜怒哀樂。皆能使人爲患。且病爲慢性。動須經年累月。故防不勝防。制不勝制。例如肝虛者易怒。不與怒

而怒自來。腎虛者多慾。勉強節慾而慾火愈熾。所以癆病之難治也。

名家驗方選

【補中益氣湯】東垣 氣虛者。脾肺二經虛也。宜此湯。

人參 黃芪 白朮 炙草 升麻

柴胡 歸身 陳皮

【四物湯】局方 血虛者。心肝二經虛也。宜此湯。亦宜當歸補血湯。

川芎 當歸 生地 白芍

【當歸補血湯】衛生寶鑑 氣血俱虛。脈洪大而虛。重按則微者。

當歸 黃耆

【附桂八味丸】崔氏 陽虛者。腎中真陽虛也。真陽即真火。審是火虛。右尺必弱。大補元陽。宜此丸。

地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

澤瀉 附子 肉桂

【六味丸】錢乙 陰虛者。腎中真陰虛也。真陰即腎水。審是水虛。脈必細數。大補真陰。宜此丸。

地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

澤瀉

【逍遙散】局方 陽虛所生病爲熱癆。口乾。咽痛。舌瘡。涕唾稠黏。手足心

熱。大便燥。小便赤。失音。或疔羸。陽不舉。脈細無根。脈數不倫。漸已成瘵而難救。宜此散。亦宜坎離既濟丸。

當歸 白芍 柴胡 薄荷 黃芩
白朮 甘草 煨薑

【坎離既濟丹】尊生 陽虛

菴蓉 枸杞 歸身 白芍 天冬
麥冬 人參 棗仁 生地 熟地
丹皮 茯苓 茯神 澤瀉 山萸
五味 遠志 黃柏

【人參養榮湯】局方 陰虛所生病為虛勞。吐痰白色。胃逆不思飲食。惡食。

食不化。遺洩。便澹。至泄不已。神瘁肉削。漸已成瘵而難治。宜此湯。亦宜三白廣生湯。

人參 茯苓 白朮 甘草 當歸
白芍 地黃 黃芪 陳皮 遠志
肉桂 五味子

【三白廣生湯】尊生 陰虛

白朮 白芍 茯苓 地骨皮 丹皮
陳皮 甘草 山藥 芡實 蓮肉
棗仁 貝母 烏梅

【大菟絲子丸】局方 腎病。見患精濁。又見脛痠。腰背拘急。知其病在腎也。宜此丸。

鹿茸 附子 肉桂 茴香 破故紙

川斷 巴戟 牛膝 桑螵蛸 菴蓉

杜仲 菟絲 澤瀉 茯苓 萸肉

覆盆子 石龍芮 防風 熟地 川

芎 沈香 畢澄茄

【保和湯】準繩 肺病。見患喘嗽吐血。

又兼皮枯鼻塞聲重。知其病在肺也。

宜此湯。

貝母 知母 天冬 麥冬 五味子

杏仁 桔梗 紫苑 款冬 兜鈴

阿膠 歸身 苡仁 百合 百部

失血加炒黑蒲黃 生地 小蘗

痰加瓜蒌 茯苓 橘紅 喘加 蘇

子 桑皮

【聖愈湯】東垣 心病。見患咯血多汗。

又兼驚惕口舌瘡。知其病在心也。宜

此湯。

人參 黃芪 川芎 當歸 生地

熟地

【柴胡疏肝湯】統旨 肝病。見患夢遺。

又見脇痛善怒煩強。知其病在肝也。

宜此湯。

柴胡 陳皮 枳殼 川芎 製香附

白芍 甘草

【調中益氣湯】東垣 脾病。見患澹泄。

又患腹痛。痞塊。飲食無味。四肢倦

怠。知其病在脾也。宜此湯。

人參 黃芪 白朮 甘草 升麻

柴胡 當歸 陳皮 白芍 五味子

【八珍湯】準繩 氣虛而熱。必兼少氣自汗。體倦心煩。此湯治之。

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎

當歸 白芍 地黃

【人中白丸】尊生 血虛而熱。必兼燥渴。睡臥不安。此丸治之。

生地 熟地 白朮 白芍 當歸

阿膠 鱉甲 羚羊角 青蒿 人中

白 百部膏丸

飽傷於房室。驚惕小腹裏急。

棗核仁 芍藥 桂心 澤瀉 人參

黃芪 甘草 茯苓 白龍骨 牡

蠣 生姜 半夏

水煎。奇效名人參湯。

【大建中湯】千金 治五勞七傷。小腹急。胸中氣急。夢交失精。驚恐虛乏。

人參 芍藥 甘草 生薑 大棗

龍骨 飴糖 黃芪 遠志 當歸

澤瀉

【五味子散】聖惠 治肺虛勞損。腸鳴切痛。胸脇逆滿氣喘。

五味子 半夏 桔梗 白朮 蘇子

【人中白丸】千金 治大虛勞夢泄精。或醉

附子 桂心 訶梨勒 木香

加倉米、生姜、大棗煎。

【黃芪散】聖惠 治虛勞。小腹裏急。少氣羸物。

黃芪 人參 半夏 甘草 雲苓

當歸 牛膝 五味子 桂心 附子

熟地 芍藥

加姜棗煎。

【人參散】聖惠 治虛勞少氣。四肢無力。

。心神煩熱。不得睡臥。

人參 甘草 黃芪 當歸 白芍

白朮 麥冬 熟地 酸棗仁

加姜棗煎。

【地骨皮湯】聖濟 治虛勞骨蒸潮熱

皮地骨 鼈甲 當歸 秦艽 銀柴

胡 知母 貝母

加烏梅煎。

【大補元煎】景岳 治男婦氣血大壞。精

神失守。此回天贊化。救本培元。

人參 炙甘草 山藥 杜仲 熟地

當歸 枸杞 山茱萸

【清骨散】準繩 治骨蒸勞熱。

銀柴胡 鼈甲 青蒿 知母 地骨

皮 川連 秦艽 甘草

【鼈甲散】謙甫 骨蒸熱。必兼肌瘦。舌

紅。頰赤。宜此散。

銀柴胡 鼈甲 青蒿 當歸 知母

地骨皮 秦朮 烏梅

【河車丸】準繩 治骨蒸勞熱。

銀柴胡 鼈甲 阿膠 百部 地骨

皮 人參 五味子 秋石 人中白

河車 青蒿 陳酒 童便熬膏丸

【十全大補湯】局方 五心熱。必兼體疼

。口乾。頰赤。發熱五勞七傷。諸虛

。百損。

八珍湯 加黃芪 肉桂

【十四味建中湯】局方 徧體發熱。必兼

瘦瘠。神疲乏力。

十全大補湯 加附子菴蓉 麥冬

半夏

【人參鼈甲丸】普濟方 治婦人一切虛損

。肌肉瘦瘠。盜汗心忪。欬嗽上氣

經脈不調。或作寒熱。不思飲食。

人參 杏仁 當歸 赤芍 炙甘草

柴胡 桔梗 地骨皮 黃連 胡

黃連 肉桂 木香 麝香 炙醋鼈

甲

研爲末。用青蒿。絞汁。童便。黃酒

。以蜜爲丸。

【人參鼈甲散】準繩 治瘵勞。

人參 桂心 當歸 桑寄生 白茯

苓 白芍 桃仁 麥冬 熟地 甘

草 續斷 牛膝 鼈甲 黃耆

右藥研細末。每服二錢。

【大黃蠱蟲丸】金匱 指五癆虛極羸瘦。

腹滿不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房勞傷。飢傷。勞傷。經絡營衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。

大黃 蠱蟲去頭足炒 黃芩 甘草

桃仁 杏仁 芍藥 乾漆 去翅

足炒蟲蟲 乾地黄 炙水蛭 炒鱗

蟻

右藥研末。煉蜜和丸。如小豆大。每

服五丸。酒送下每日三次。

【十疰丸】尊生 治氣疰、勞疰、鬼疰、

冷疰、食疰、尸疰、水疰、土疰、生人疰、死人疰、宜此丸。

雄黃 巴豆霜 人參 細辛 麥冬

桔梗 附子 皂莢 川椒 甘草

研末蜜丸

【桃奴香】尊生 治傳尸癆。

桃奴 玳瑁 安息香 硃砂 犀角

琥珀 雄黃 麝香 冰片 牛黃

桃仁

爲丸入參湯下。

【肘後癩肝散】金匱 治鬼疰。一門相染

。癩肝 炙乾研末

【蘇合香圓】局方 療傳屍。骨蒸。肺痿

症忤。

蘇合香油 薰陸香 安息香 青木

香 白檀香 沈香 犀角 龍腦

白朮 丁香 朱砂 藜蘆 香附子

訶梨勒 麝香

【滋補養榮丸】尊生 數轉十指爪甲皆痛

。爲筋極。宜此丸。

遠志 白芍 黃芪 白朮 熟地

人參 五味子 川芎 當歸 山藥

陳皮 茯苓 生地 山萸

右藥研末。煉蜜爲丸。

【補榮湯】尊生 牙痛手足痛。不能久

立爲骨極。面無血色。頭髮墮落。爲

血極。宜此湯。

當歸 白芍 生地 熟地 赤茯苓

梔子 麥門冬 陳皮 人參 甘

草

加大棗烏梅。

【參苓丸】尊生 身上往往如鼠走。體上

乾黑。爲肉極。宜此丸。

人參 赤苓 遠志 菖蒲 牛膝

地骨皮

研末蜜丸。

【巴戟丸】醫發明 氣少無力。肌膚羸瘦

。目眊。膚癢搔之生瘡。爲精極。宜

此丸。

巴戟 白朮 五味子 茴香 熟地
肉蓯蓉 人參 覆盆子 菟絲子
牡蠣 益智仁 骨碎補 白龍骨
研末蜜丸

【益氣丸】尊生 胸脇逆滿。恆欲大怒。
氣少不能言。爲氣極。此丸主之。

人參 麥冬 陳皮 炙甘草 五味
子 研末蜜丸

【歸脾湯】濟生 治憂思傷心脾。血虛發
熱。食少體倦。健忘怔忡。驚悸少寐
自汗盜汗等。

當歸 人參 茯苓 黃芪 白朮
龍眼肉 酸棗仁 青木香 炙草

遠志

加姜棗煎。

【黃耆建中湯】金匱 治虛勞裏急。諸不
足者。主之。

桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗
飴糖 黃芪

【薯蕷丸】金匱 治虛勞諸不足。風氣百
疾。

薯蕷 人參 白朮 茯苓 甘草
當歸 芍藥 芎藭 地黃 麥冬
阿膠 乾薑 大棗 桔梗 杏仁
桂枝 豆黃卷 防風 神麴 柴胡
白欬

右廿一味研末煉蜜和丸。

鼓脹 水腫

證解

鼓脹皮急緊張之證。有脈脹

。有膚脹。有五臟脹。有六腑脹。有蟲脹。有單腹脹。有石水。有水腫。一脈脹者。內經云。五臟六腑。各有畔界。病各有形狀。營氣循脈。衛氣逆之。爲脈脹。二膚脹者。內經云。衛氣並脈循分爲膚脹。三五臟脹。心脹者。短氣。煩心臥不安。肺脹者。虛滿而喘欬。肝脹者。脇下滿而痛。引小腹。脾脹者。善噓。四肢煩冤。體

重不能勝衣。臥不安。腎脹者。腹滿引背尖尖然。腰脾痛。四六腑脹。胃脹者。腹滿腎腕痛。鼻聞焦臭。妨於食。大便難。大腸脹者。腸鳴濯濯而痛。冬日重感於寒。則飧泄不化。小腸脹者。少腹填脹。引腰而痛。膀胱脹者。少腹滿而氣癰。三焦脹者。氣滿於皮膚中。漚漚然而不堅。膽脹者。脇下痛脹。口中苦。善太息。五蟲脹者。沈云由脾胃家濕熱積滯或內傷瘀血而成。九種腸疰、疴、癆、瘕、等虫。使心腹痛。而脹。甚至面青吐涎。一單腹脹。俗名蜘蛛鼓。其症四肢不

腫。但腹脹。腹膨絕大而四肢則奇瘠如柴。一脹與腫。外形相似。內因不同。辨別之法。先腹大後四肢腫者。爲脹病。先頭足腫後腹大是水腫也。但腹腫四肢竟不腫是脹。病臍腹四肢悉腫是水腫也。皮厚色蒼。或一身皆腫。或上而下是脹。病皮薄色白。自下而上者。是水也。治法當分別脹與腫。屬虛。屬實。或在腑。或在臟。爲要旨。臟腑之脹。統以理氣爲主。藿香正氣散。木香調氣散。蘇子湯爲主。各加引經藥爲佐。心脹黃連、細辛。肺脹桔梗、升麻、白芷。肝脹柴

胡、川芎、青皮、吳萸。脾脹升麻、蒼朮、葛根、石膏、大腸脹白芷、升麻、黃芩石膏、小腸脹黃柏、蘘本、赤苓、木通。膀胱脹滑石、羌活。三焦脹柴胡連翹。地骨地。胆脹柴胡、青皮、連翹、單腹脹及虛脹以調中健脾丸。及金匱腎氣丸等爲主。治虛脹一切鼓脹也。

水腫臍腹四肢悉腫之證。內經云。水之始起也。目窠上微腫。如新起狀。其頸脈動。陰分。陰股間寒。足脛腫。腹乃大。其水已成矣。按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。又

云三陰結謂之水。三陰者。太陰脾也。太陰爲六經之主。三陰邪結。脾不得運。腎爲水臟。獨主於裏。其氣更盛。反來侮土。腎盛不與肺相應。肺氣不得通調。斯寒水不行而壅。故成水腫之病。水腫最古之治法。爲內經開鬼門。潔淨府。鬼門卽玄府。開鬼門卽發汗。淨府謂膀胱。潔淨府卽利小便。金匱所謂。腫在身半以上當發汗。腫在身半以下者。利小便。水氣可去。則腫自消。開鬼門宜麻黃、羌活、防風、柴胡、牛蒡、葱白、忍冬藤、外用柳枝煎湯薰洗。潔淨府宜澤

瀉、香薷、甘草、木通、燈心、冬葵子、蜀葵子、防己、昆布、海金沙、赤小豆、雲苓、豬苓、海蛤、之類治之。水去腫退。則當健脾理氣善其後。水腫五臟各有敗徵。脣黑者肝敗。缺盆平者心敗。臍突者脾敗。背平者肺敗。足底平者腎敗。五臟敗症悉見者不治也。

名家驗方選

【藿香正氣散】愚民局方 外感風寒。內傷食積。胸悶腹脹。痰嗽氣喘等證。

藿香 紫蘇 白芷 厚朴 桔梗

茯苓 半夏 陳皮 甘草 腹皮
燈心

【木香調氣飲】局方治氣滯。胸膈虛痞。惡心嘔逆。宿冷腹痛。

木香 白豆蔻仁 丁香 檀香 藿香葉 炙甘草 砂仁（一方無丁香、檀香、）

【蘇子湯】以上皆統治脹病之方。治水腫須忌甘草。

腹皮 蘇子 草薺 半夏 厚朴
木香 陳皮 木通 白朮 枳實
人參 甘草

【調中健脾胃】尊生治鼓脹、單腹脹。

五加皮 蒼朮 人參 黃芪 茯苓
陳皮 半夏 香附 山查肉 薏仁 吳萸 白芍 黃連 萊菔子
草豆蔻 澤瀉 蘇子 沈香（方有白朮）

腹皮煎湯。和黃米粉丸。

【金匱腎氣丸】虛脹 仲景以治腎臟機能衰弱。排洩無權而為腫。或虛脹。

熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓
澤瀉 附子 桂心 牛膝 車前
【木香散】類方治單腹脹。

木香 青皮 白朮 姜黃 豆蔻
阿魏 萹澄茄

薑湯送下。

【柴胡厚朴湯】外臺療心腹脹滿。

柴胡 厚朴 茯苓 陳皮 紫蘇

生姜 檳榔

【大正氣散】濟生治心腹脹滿。

厚朴 藿香 半夏 橘紅 白朮

甘草 檳榔 枳枝 枳殼 乾姜

加姜棗煎。

【朴附湯】濟生治老人虛弱。心腹膨脹。

炮附子 厚朴 生姜棗煎

【厚朴七物湯】金匱腹脹滿。發熱十日

脈浮而數。飲食如故。主之。

厚朴 甘草 大黃 大棗 枳實

桂枝 生薑

【七氣消聚散】統旨治蟲脹因積聚相攻

。或病或脹。

香附米 青皮 陳皮 枳殼 蓬朮

三稜 木香 砂仁 厚朴 甘草

加姜煎。

【分消湯】回春治中滿成鼓脹。兼治

脾虛發腫滿飽悶。

蒼朮 白朮 茯苓 厚朴 陳皮

枳實 豬苓 澤瀉 香附 腹皮

砂仁 木香

加生薑燈草煎。

【祕方治脹丸】袖珍

太香 茯苓 厚朴 滑石 大黃

澤瀉 黑牽牛末

【治諸脹方】石室 鼓脹經年而不死者。必非水鼓。水鼓之證。不能越於兩年。未有皮毛不流水而死者。今二三年不死。非水鼓。乃氣鼓。血鼓。食鼓。虫鼓也。但得小便利。俱可治。

茯苓 人參 白朮 甘草 蘿蔔子
大黃 雷丸 附子

服後必然腹中雷鳴。大瀉大下之後。體弱極當善後。

人參 茯苓 山藥 陳皮 白芥子
薏仁

忌食鹽者百日。犯則復發則無可救矣。

【沈香飲】得效治腹脹氣喘。坐臥不得。

沈香 木香 枳殼 萊菔子
加生姜煎。

【鼈甲丸】外臺療鼓脹氣急。

鼈甲 芍藥 枳實 人參 檳榔
訶梨勒 大黃 桂心 橘皮
研末蜜丸。

【雞矢醴方】素問 治心脹滿。且食不暮食。

羯雞矢 無灰酒

研末瀘取汁。五更熱飲。

【人參芎歸湯】直指治血脹。

當歸 半夏 川芎 蓬朮 木香

縮砂 烏藥 甘草 人參 肉桂

五靈脂

加姜棗煎（去烏藥。加芍藥。入門名

散血消腫湯）

【柿靈丹】壽世仙丹 治十種蠱脹

黑牽牛 大黃 木香 阿魏 丁香

檳榔 香附

【琥珀人參丸】醫通 治血蠱。

人參 五靈脂 琥珀 肉桂 附子

茯苓 川芎 沈香 穿山甲

以上主治鼓脹方。

【防己茯苓湯】金匱 皮水為病。四肢腫

。水氣在皮膚中。四肢聶聶動者。主之。

防己 黃芪 桂枝 甘草 茯苓

【甘草麻黃湯】金匱 裏水主之。

甘草 麻黃

【麻黃附子湯】金匱 水之為病。其脈沈

小屬少陰。浮者為風。無水虛脹者。

為氣水。發其汗即已。脈沈者。麻黃

附子湯。浮者宜杏子湯。

麻黃 甘草 附子

【桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯】金匱

氣分心下堅大如盤邊。如旋杯。水飲所作。此方主之。

桂枝 生薑 甘草 大棗 麻黃

細辛 附子

當汗出如虫行皮中。即愈。

【枳朮湯】金匱 心下堅大如盤邊。如旋盤。水飲所作此方主之。

枳實 白朮

【蒲灰散】金匱 治水便不利。

蒲灰 滑石

【己椒藶黃圓】金匱 腹滿。口舌乾燥

。此腸間有水氣。此丸主之。

防己 椒目 葶藶 大黃

【牡蠣澤瀉散】仲景 大病瘥後。從腰以下有水氣者。主之。

牡蠣 澤瀉 括蕒根 蜀漆 藤蓼

商陸根 海藻

小便利止後服。

【大腹水腫方】千金 治氣息不通。命在旦夕者。

牛黃 椒目 昆布 海藻 牽牛子

桂心 藶藶

服至小便利為度。

【麻豆湯】千金翼 治遍身腫。小便澀者。

麻黃 桑根白皮

【舟車神祐方】河間 治水脹形氣俱實者。

黑牽牛 大黃 甘遂 橘紅 大戟

芫花 青皮 木香 檳榔 輕粉

【葶藶丸】外臺 治水腫。及脚并虛腫。

葶藶子 牽牛子 昆布 澤瀉 海藻

桑根白皮 甘遂 椒目 郁李

仁 桂心

【療患氣兼水身面腫垂死方】外臺

桑白皮 茯苓 郁李仁 橘皮 海藻

赤小豆

【五香散】局方 升降諸氣。宜利三焦。

疏導壅滯。發散邪熱。治陰陽之氣鬱

結不消。諸熱蘊毒腫痛。結核中脘不

快。心腹脹滿。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香

【五皮散】局方 治風濕客於脾經。氣血

凝滯。以致面目虛浮。四肢腫滿。心

腹膨脹。上氣促急。兼治皮水。妊娠

胎水。

五茄皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮

茯苓皮

（一方加白朮磨沉香木香。）

【小胃丹】丹溪

芫花 甘遂 大黃 大戟 黃柏

爲末白朮膏爲丸。（一方加木香檳榔。）

【禹餘糧丸】治十種水氣。脚膝腫上氣

喘滿。小便不利。但是水氣。悉皆治

之。「許學士及丹溪」皆云此治膨脹之

要藥。(一名針砂丸又名蛇含石丸)

蛇含石 禹餘糧 真針砂

以三物爲主。其次量人虛實。下項藥。

羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝

桂心 白豆蔻 大茴香 蓬朮 附

子 乾薑 青皮 三稜 白蒺藜

當歸

【白朮散】聖惠 治石水腹腫。

白朮 赤苓 防己 射干 檳榔

桑白皮 楮白皮 澤漆莖葉

【場脹湯】楊氏 治水氣病。渾身腫脹喘

急。小便不利。

商陸 赤小豆 陳皮 木香

【導水茯苓湯】奇效 治水腫。徧身如爛

瓜。喘滿倚息。不能轉側。溺出絕少。

茯苓 麥冬 澤瀉 白朮 桑白皮

紫蘇 檳榔 木瓜 大腹皮 陳

皮 砂仁

木香加燈草煎。

【蒼戟丸】大還 治水腫。行水燥脾。甚

驗。

大戟 蒼朮 沈香 陳米和丸

【廓清飲】景岳 治三焦壅滯。氣道不清

。小便不利。通身腫脹。

枳殼 腹皮 白芥子 厚朴 蘿蔔

子 陳皮 茯苓 澤瀉

【人參木香散】奇效治水氣病。

人參 木香 茯苓 枳殼 滑石

琥珀 檳榔 豬苓 海金砂 甘草

加姜煎。

【壯原湯】赤水治下焦虛寒。中滿腫脹

。陰囊兩腿皆腫。或面有浮氣。

人參 白朮 茯苓 桂枝 破故紙

附子 乾薑 砂仁 陳皮

【越婢湯】金匱治風水。惡風。一身悉

腫。脈浮不渴。續自汗出。無大熱。

此湯主之。

麻黃 石膏 生薑 甘草 大棗

【黃耆芍藥桂枝苦酒湯】金匱治黃汗病

身體腫。發熱汗出而渴。狀如風水。

汗沾衣。色正黃如蘗汁。脈自沈。從

何得之。以汗出入水中浴。水從汗孔

入得之。此湯主之。

黃芪 芍藥 桂枝

加苦酒煎。

【茯苓湯】楊氏治手足浮腫。小便祕

澀。喘滿氣急。

茯苓 橘紅 澤瀉 香附子 大腹

皮 乾姜 桑白皮

【茯苓湯】聖惠患痢之後。徧身浮腫。

茯苓 白朮 澤瀉 防己 黃芩

射干 桑白皮

【防己湯】聖濟痢疾之後。四肢浮腫。

喘息促迫。小便不利。

防己 豬苓 桑白皮 茯苓 海蛤

陳皮 檳榔 紫蘇 木通 木香

白朮 加姜煎

【犀角湯】河間治結陽者。四肢腫。

犀角 玄參 連翹 柴胡 升麻

木通 沉香 射干 甘草 芒硝

麥門冬

【復元丹】三因治水腫喘息迫急。心腹

墜脹。

附子 木香 茴香 川椒 獨活

厚朴 白朮 橘皮 吳茱萸 桂心

澤瀉 檳榔 肉豆蔻 紫蘇湯下

【茯苓琥珀湯】寶鑑治臍腫滿。脚沉重

。不得安臥。小便不利。

茯苓 滑石 桂枝 琥珀 白朮

澤瀉 豬苓 甘草

右藥用長流水煎

以上主治水腫方

噎膈反胃 關格

證解 噎塞反胃之為病。噎塞為脾

虛病。反胃為胃虛病。大約飲食之際

氣忽阻塞。飲食原可下咽。如有物梗

塞之狀。名為噎。心下格拒。飢不能

食。或食到咽喉胸膈之間。不能下者。名爲塞。若反胃則食下良久復出。或朝食暮吐。暮食朝吐。東垣云。噎塞之食入而吐者。與反胃之每食必出不同。反胃祇吐原物。有食必盡。噎塞則或食。或曰沫。酸水。或吐糟粕。以及非痰非血。若醬汁然者皆是也。潔古所謂上焦吐皆從於氣。食則暴吐。此卽噎塞病也。所謂下焦吐皆從於寒。朝食暮吐。暮食朝吐。此卽反胃病也。王太僕亦云。噎塞爲食不得入。是有火。屬熱。反胃爲食入反出。是無火。屬寒。徐靈胎云。反胃者

。十愈八九。噎塞十死八九。內經云三陽結謂之膈。三陽者大腸、小腸、膀胱也。結者熱結也。小腸結則血脈燥。大腸結則後不便。膀胱結則津液不行。三陽俱結。前後閉塞。下旣不通。必反上行。所以噎。食不下。卽下亦復出。乃陽火上行而不下降。則噎塞反胃二者。皆在膈間受病。故名爲膈也。以附子理中湯。爲主治胃寒脾弱之反胃。以香砂寬中丸。爲主治噎塞也。

關格。內經三焦約病也。約者不行之謂。謂三焦之氣不得通行也。惟三焦

之氣不行。上而吐逆曰格。下而不得大小便曰關。其所以然者。由寒氣遏絕胸中。水漿不得入。格因成也。熱氣閉結丹田。二便不得出。關因成也。若寒既在上。熱又在下。則爲關格。宜沈香降氣散之類。以治其上。亦宜八正散。加味麻仁丸之類。以治其下之二便不通。嘉言以進退黃連湯。爲主治上熱下寒之關格也。

名家驗方選

【香砂寬中湯】統旨 治氣滯。胸痞噎塞。或胃寒作痛。

木香 白朮 陳皮 香附 白豆蔻

縮砂仁 青皮 檳榔 半夏 茯苓

荅 厚朴 甘草 生姜

【補氣運脾湯】統旨 治中氣不運。噎塞。

人參 白朮 橘紅 茯苓 炙黃耆

炙甘草 半夏 砂仁

加姜棗煎

【來復丹】局方 治上盛下虛。裏寒外熱。

。及痰飲。一

硝石 硫黃

研末銀石瓷器內。慢火炒。柳木槌攪

之。不同猛火。以傷藥性。研極細。

玄精石、五靈脂。青皮、陳皮、研末

糊丸。(一名養正丹)、(一名黑錫丹)、(又名二和丹)。

【滋血潤腸丸】統旨 治血枯。及死血在膈。飲食不下。大便燥結。

當歸 白芍藥 生地 紅花 桃仁

大黃 枳殼 韭汁

【大半夏湯】金匱 反胃嘔吐者。此湯主之。

半夏 人參 白蜜

【大黃甘草湯】金匱 食已即吐者。此湯主之。

大黃 甘草

【茯苓澤瀉湯】金匱 胃反吐而渴欲飲水

者。此湯主之。

茯苓 澤瀉 甘草 桂枝 白朮 生薑

【昆布丸】治五噎咽塞。食飲不下。

昆布 麥冬 天冬 訶梨勒 木通

大黃 朴硝 郁李仁 桂心 百

合 羚羊角 杏仁 蘇子 射干

柴胡 陳皮 檳榔 蜜丸酒下

【關膈不通方】千金翼

芒硝 芍藥 杏仁 枳實 大黃 地黃

【廣濟檳榔散】外臺 療吐酸水。每食則變作醋水吐出。

檳榔 人參 茯苓 橘皮 藜蘆

爲末姜汁沖。

【崔氏方】外臺療食則吐。或朝食夜吐名曰胃反。或氣噎不飲食。數年羸削唯飲水。亦同此方。

半夏 人參 生薑 羚羊角 橘皮

牛涎 厚朴

【深師治噎方】外臺

羚羊角 前胡 甘草 人參 橘皮

【華佗治胃反】千金胃反爲病。朝食夕吐。心下堅如杯升。往來寒熱。吐逆不下。此爲膈上寒邪所爲。

眞珠 雄黃 丹砂 朴硝 乾薑

研末蜜丸。

【翻胃湯】葉氏治胃反嘔吐。胸膈不利。食卽經宿。吐出酸臭。

茯苓 厚朴 陳皮 白朮 人參

吳茱萸

加姜棗煎。

【麥門冬散】聖惠治反胃嘔吐食。煩熱。

。

麥門冬 半夏 人參 陳皮 茯苓

甘草 枇杷葉

姜棗煎。

【沈香升降散】御藥院方治一切氣不升降。脅肋刺痛。胸膈痞塞。

沈香 檳榔 人參 大腹皮 訶子

白朮 烏藥 香附子 紫蘇 厚

朴 神麴 京三稜 蓬莪朮 益智

仁 陳皮 薑黃 炙甘草 紅花

研末。

【八正散】衛生寶鑑 治膀胱結熱。甚至

大便閉塞。

瞿麥 菡蓄 車前 滑石 甘草

山梔 木通 大黃 (一方有木香)

【延年祕錄九物五膈丸】外臺 療五膈。

大痛欲吐。吐則差。飲食不得下。甚

者乃手足冷。喘息氣短。

麥冬 蜀椒 遠志 乾薑 桂心

細辛 甘草 附子 人參

【古今錄驗五噎丸】外臺 治胸中久寒嘔

逆。逆氣膈飲食不下。結氣不消。

乾薑 蜀椒 吳茱萸 人參 桂心

細辛 白朮 茯苓 附子 橘皮

【五膈散】濟生 治五膈胸痞悶。脇肋脹

滿。痰逆惡心。不進飲食。

枳殼 木香 青皮 大腹子 白朮

半夏 丁香 南星 乾姜 草果

甘草 麥芽

加姜煎。

【參朮膏】醫統 治五膈五噎。嘔逆食不

下。

人參 陳皮 茯苓 生地 麥冬

成膏

加丁香、洗香末、蜜姜汁調服。

【五子散】彙言 治氣膈膨脹。

白芥子 山楂子 香附子 紫蘇子

蘿蔔子

【七聖湯】彙補 治噎膈。

半夏 黃連 白蔻 人參 茯苓

竹茹

加姜煎。

【加味麻仁丸】會編方 治關格便秘。

麻仁 大黃 白芍藥 厚朴 當歸

杏仁 檳榔 木香 枳殼 麝香

研末蜜丸。

【導氣清利湯】會編方 治關格吐逆。二

便不通。

豬苓 澤瀉 白朮 人參 藿香

柏子仁 半夏 陳皮 白茯苓 甘

草 木通 梔子 黑牽牛 檳榔

枳殼 大黃 厚朴 麝香

加生姜煎。

【黃連湯】仲景 傷寒胸中有熱。胃中有

邪氣。腹中痛欲嘔吐者。宜此湯主之。

。

黃連 人參 半夏 炙甘草 桂枝

乾薑 大棗

【附子理中湯】準繩 治脾胃虛寒。飲食不化。嘔吐泄瀉。一切沈寒痼冷等證。

附子 人參 乾薑 炙甘草 白朮

【清熱二陳湯】尊生 治胃反

半夏 陳皮 赤茯苓 甘草 人參
白朮 砂仁 竹茹 梔子 麥門

冬

加姜、棗、烏梅煎。

【開關利膈丸】寶鑑 治腸胃壅滯。噎膈不通。大便燥結。

木香 檳榔 人參 當歸 藿香
炙甘草 枳實 大黃 厚朴

爲丸。

【廣利方】醫心方 關隔不通。胞脹妨悶。大小便不通。

冬葵子 滑石 礞石

聖濟名芒硝湯。

【枳橘二陳湯】回春 治關格上下不通。

枳實 砂仁 茯苓 貝母 陳皮
香附 蘇子 瓜蒌仁 厚朴 川芎

甘草 沈香 木香

加姜煎。

吐血

證解 血液由吐而出。有胃病。有

肺病。若以舊說求治法。則當兼及心腎肝家。吐血前作嘔及上腹壓。血色暗黑凝或成塊者。屬胃血。血由欬嗽而吐。吐血前胸內有溫液上升之盛覺。血色鮮紅而稀者。屬肺血。癆病家多吐血。欬而痰中夾血者。爲嗽血。不須欬一咯卽出者。謂之咯血。傾盆盈碗而出者。謂嘔血。古人以嗽吐咯嘔分臟腑。均不確實。當以證爲主。吐血多由肺絡損傷。凡大吐者。大血管破裂。小吐者。微絲血管破裂。見鮮血知從動脈管來。若間有紫色者。知從靜脈管來。治宜先用十灰散。重

加重便。血止後繼服參三七等。若因鬱怒傷肝。浸成薄厥者。宜犀角地黃湯之類。有房勞傷腎太過。陽越上盛下虛。浸成煎厥者。治宜八味丸等。揮鐵樵先生嘗謂嘔血。面色紅而脚冷。血液奔迫上溢。此時之有效治法。用熱酒熨脚。則血可立止。繼用生附子。麝香帖湧泉穴。則血可以不復上行。此卽內經所謂病在上當取之於下。足使臨症者取法。故特錄之以供參攷也。

名家驗方選

【十灰散】十藥神書 專治虛癆心肺損傷。大吐血。及咯血吐血。服此如不止者。用花蕊石散。

大薊 小薊 側柏 荷葉 茅根
茜根 梔子 棕皮 丹皮 大黃
右藥燒存性研末。用藕汁或萊菔汁。磨京墨調服。

【花蕊石散】十藥神書 專治虛勞吐血。五內崩損。湧出升斗者。宜服此散。使瘀血化為黃水。繼服獨參湯以補之。

花蕊石煨研極細末童便一盃煎溫調下三錢。醋與童便各半和調尤妙。

【獨參湯】十藥神書 專治吐血後羸弱氣微。

人參

加棗流水濃煎。

【犀角地黄湯】千金 治吐血、衄血、瀉血、婦人倒經、血崩、妊娠吐血等證。

犀角屑 牡丹皮 生地黃 芍藥

【四生圓】良方 治吐血衄血。血熱等宜此丸。

生地 生艾葉 生荷葉 側柏葉

【瀉心湯】金匱 治心氣不足。吐血衄血者。此湯主之。

大黃 黃連 黃芩

【清咯湯】醫療方 治咯血。

生地黃 梔子 知母 杏仁 甘草

貝母 茯苓 桔梗 桑白皮 阿

膠 桂枝 陳皮 半夏

加生薑煎。

【麥門冬湯】千金 治吐血。

麥門冬 芍藥 大棗 甘草 白朮

牡蠣 阿膠

【斷紅飲】樛寗 治吐血。

當歸 川芎 側柏 阿膠 蒲黃

炒姜炭

【堅中湯】千金 治虛勞內傷。寒熱嘔逆

吐血。

桂枝 芍藥 炙甘草 生姜 大棗

飴糖 半夏

【竹茹湯】千金 治吐血汗血。大小便下

血。

竹茹 黃芩 芍藥 甘草 當歸

川芎 白朮 人參 桂心

【黃土湯】金匱 治吐血衄血。

竈中黃土 白朮 阿膠 甘草 乾

地黃 附子 黃芩

【黑散子】直指 諸竅出血主之。

隔年蓮蓬 血餘炭 棕皮炭

右爲末吞服。

【斷紅散】濟生治下血。吐血不止。

川續斷 側柏葉 鹿茸 附子 黃

芪 阿膠 當歸 白礬

右藥爲末。米飲下。

【龍膽瀉肝湯】準繩瀉肝火。滋陰血。

龍膽草 生甘草 人參 天門冬

黃連 梔子 知母 麥門冬 柴胡

黃芩 五味子

【大阿膠丸】衛生寶鑑治嗽血。垂血。

阿膠 卷柏 生地 熟地 大蘗

鷄蘇葉 五味子 遠志 柏子仁

茯苓 百部 人參 麥門冬 防風

乾山藥

研末蜜丸。

【大補陰丸】丹溪降陰火。益腎水。治

陰虛火旺。欬血虛勞證。

黃蘗 知母 熟地 敗龜板

研末加豬脊髓加煉蜜和丸。

【五汁膏】尊生治虛勞欬血。

梨汁 藕汁 萊菔汁 甘蔗汁 人

乳汁 天門冬 麥門冬 生地 薄

荷 貝母 牡丹皮 茯苓 犀角

羚羊角

諸藥煎好。入五汁加蜜成膏。

【八味地黃丸】崔氏治命火衰而腎虛。

浮火上盛下虛。

熟地 山藥 山萸 牡丹皮 澤瀉

茯苓 桂心 附子

研爲細末。煉蜜和丸。

【歸脾湯】濟生 治憂思傷脾。脾虛不能攝血。致血妄行吐下。或健忘怔忡。

驚悸少寐。

當歸 人參 茯苓 黃芪 白朮

龍眼肉 酸棗仁 青木香 炙草

遠志

加姜棗煎。

【柏葉湯】金匱 吐血不止主之。

柏葉 乾薑 艾葉

千金有阿膠。治吐血內崩。

【茜根散】聖惠 治小兒吐血。心躁煩悶。

。

茜根 犀角 升麻 大黃 黃芩

甘草 黑豆

竹茹煎。

【阿膠散】直指 治肺破嗽血。唾血。

人參 茯苓 生地黃 天冬 五味

子 阿膠 白朮

加秫米、姜煎。

【涼血湯】會解 治胃欬嘔血。

梔子 黃芩 白茅 知母 桔梗

甘草 側柏葉 赤芍

加姜煎。

欬嗽

證解

欬嗽見諸家分門太繁。巢氏有十欬。內經有五藏六府之欬。皆不得要領。致後人臨症者無所適從。所以治難奏效。特景岳分爲二端。一曰外感。二曰內傷。盡之矣。

外感欬可分三種。一曰傷風。卽流行感冒之不發熱者。其證欬嗽、鼻塞多涕、喉癢多痰。一星期後喉癢癢。痰稠欬鬆。漸自愈。二曰風溫症。卽流行感冒之有熱候者。及急性肺炎之輕症。初起與傷風略同。二三日後。壯

熱鼻塞喉癢之外。舌絳唇乾。三日重症急性肺炎。發熱與欬嗽俱來。愈欬愈劇。至於氣急鼻扇。治之不當。可以致命。

傷風欬嗽。是風襲於肺。治法當宣肺。風溫欬嗽多屬胃熱。治法當先退其熱。熱退則咳不能爲患。但熱退後。劇欬數日卽愈。所謂餘邪以欬爲自覓出路也。急性肺炎欬嗽。多屬肺寒。治法當溫肺。宜小青龍湯等。

內傷欬嗽之爲病。癆瘵病也。凡勞病必欬嗽。有陰虛而咳。有陽虛而咳。陰虛而欬者。卽榮虛內熱。脈帶數。

唇舌絳。其所以咳嗽者。則因肺熱。肺所以熱。則因不勝外界冷空氣之壓迫。故體內之酸素悉數自燃。以爲救濟。淵雷案此亦用惲先生說不知確有此事否。虛熱爲抵禦外界之冷。咳嗽爲肺臟抵抗外邪侵入之工作。陽虛而效者。卽腎中真陽衰下部虛寒也。腎陽不能上承而爲津液。則肺燥。燥則痰癢。癢則作咳嗽。陽虛經冬必效。是不勝外界冷空氣壓迫而效也。治宜參芪桂附等藥。

名家驗方選

【小青龍】金匱 治傷寒不解。心下有水。氣。咳嗽氣急鼻扇。肺脹胸滿。鼻塞流涕。或效逆倚息不得臥。及一切肺氣不宣。痰飲停積。膚脹水腫之宜發汗者。

麻黃 芍藥 細辛 乾姜 炙甘草
桂枝 半夏 五味子

【小青龍加石膏湯】金匱 治肺脹而上氣。煩躁而喘。心下有水氣者。

卽原方加石膏

【十棗湯】金匱 治太陽中風。表解裏未和。及懸飲支飲。或因水而效。

大棗 芫花 甘遂 大戟

一方加生姜汁、一方加肉桂，十棗丸、即十棗湯之藥品作丸。

【射干麻黃湯】金匱 治欬而上氣。喉中水雞聲者。主之。

射干 麻黃 生姜 細辛 紫苑

款冬花 大棗 半夏 五味子

【越婢加半夏湯】金匱 治欬而上氣。此

為肺脹。其人喘。目如脫狀。脈浮大者。此湯主之。

麻黃 石膏 炙草 生姜 大棗 半夏

【紫蘇散】本事 治肺感風寒而作欬嗽者。宜此散。

紫蘇 麻黃 杏仁 炙甘草 五味子 桑白皮 青皮

【杏蘇散】治上氣、欬嗽痰喘。面目浮腫。

杏仁 紫蘇 麻黃 炙甘草 五味子

子 陳皮 桔梗 烏梅 紫苑

阿膠 桑白皮 腹皮

【杏仁飲子】千金 治暴熱欬嗽。

杏仁 橘皮 柴胡 紫蘇子

【橘蘇散】正傳 治傷寒咳嗽。身熱有汗。惡風脈浮者。

陳皮 紫蘇 杏仁 甘草 半夏 貝母 木香 桑白皮 五味子

【六安煎】景岳 治風寒欬嗽。

半夏 陳皮 甘草 茯苓 杏仁

白芥子 生姜

【麻黃蒼朮湯】蘭室 治秋冬夜咳不絕。

麻黃 甘草 五味子 蒼朮 黃芪

柴胡 黃芩 防風 羌活 當歸

草豆蔻

【華蓋散】局方 治欬嗽上氣 聲重鼻塞

。

麻黃 杏仁 甘草 陳皮 蘇子

桑白皮 茯苓

【加減瀉白散】寶鑑 治胸膈不利。煩熱

口乾。時時欬嗽。

桑白皮 知母 黃芩 陳皮 桔梗

青皮 地骨皮 炙草

【鎮咳湯】彙言 治咳嗽聲連發。痰逆不

出。

枇杷葉 防風 杏仁 甘草 前胡

藁仁 薄荷 桑白皮 桔梗 升

麻

【諸欬丸】入門 傷風欬甚。發表後。

以此斷根尤妙。

陳皮 枳殼 訶子 知母 百藥煎

半夏麴 姜汁爲丸

【趙府濟急方】本綱 治咳嗽。氣虛散不

止者。

訶黎勒 五味子 貝母 杏仁 阿膠

【杏子湯】易簡 治一切咳嗽。

人參 半夏 茯苓 甘草 乾姜 細辛 五味子 官桂 杏仁 芍藥 加姜煎。

【貝母湯】張氏醫通 治諸嗽久不差。

貝母 半夏 陳皮 甘草 桂心 木香 乾姜 五味子 黃芩 桑白皮 柴胡

【止嗽散】心悟 治諸般效嗽。

荊芥 桔梗 紫苑 百部 白前 甘草 橘紅

【百部湯】彙言 治久咳不已。效吐痰涎。

百部 薏仁 百合 麥門冬 桑白皮 茯苓 沙參 黃芪 地骨皮

【款冬花湯】聖惠 專治暴效。

款冬花 桑白皮 貝母 五味子 甘草 知母 杏仁

【射干咽苔湯】玉衡 治屬熱之效嗽。

射干 兜鈴 薄荷 桔梗 桑白皮 玄參 花粉 枳壳 貝母 甘菊 金銀花

【紫苑茸湯】正宗 治效嗽咽乾。吐痰吐血。喘急脇痛。不得安臥。

紫苑 款冬 炙甘草 杏仁 貝母

人參 犀角 桑葉 百合 阿膠

蒲黃

姜煎。

【九仙散】寶鑑治一切欬嗽。

人參 款冬 桑白皮 桔梗 五味

子 阿膠 烏梅 貝母 御米殼

【乾姜散】聖惠治咳嗽短氣。

乾姜 桂心 款冬 細辛 白朮

炙草 五味子 木香 附子一大棗

【小品生姜五味子湯】外臺治陽虛而欬。

桂心 附子 生姜 細辛 五味子

紫苑 半夏 吳萸 款冬 茯苓

甘草

【鼈甲散】本事治癆瘵咳嗽。

五味子 鼈甲 地骨皮

右藥研末為散淡鹽湯下。

【蛤蚧丸】準繩治婦人欬嗽不止。漸成

癆病。

蛤蚧 紫苑 款冬 炙鼈甲 貝母

皂角子 杏仁

蜜丸。

【加味理中湯】直指治肺胃俱寒之咳嗽。

理中合二陳加細辛五味子

【人參清肺湯】局方 治肺胃虛寒。欬嗽。

喘急。及勞病欬嗽者。

地骨皮 人參 阿膠 杏仁 桑白

皮 知母 烏梅 甘草 罌粟殼

加棗煎。

【人參清鎮丸】寶鑑 治屬熱之欬嗽。

人參 柴胡 黃芩 半夏 甘草

麥門冬 青黛 陳皮 五味子

爲末 麩糊爲丸。

【人參湯】會解 治肺虛之欬嗽。

胆星 人參 陳皮 生姜 烏藥

枳殼 蘇子

【補肺湯】張氏醫通 治肺胃虛寒之欬嗽。

五味子 乾姜 桂心 款冬 麥門

冬 桑白皮

【滋陰降火湯】濟世 治陰虛發熱欬嗽。

吐痰喘急。

天門冬 麥冬 知母 貝母 生地

熟地 百部 白朮 芍藥 茯苓

黃芪 地骨皮

【二冬膏】張氏醫通 治肺胃燥熱。痰瀉

欬嗽。

去心天門冬 去心麥門冬

加蜜熬膏。

【瓊玉膏】丹溪 治虛癆乾欬。久服返老

還童。髮白還黑。

生地 茯苓 人參 白蜜

【清火甯嗽湯】濟世 治欬嗽有熱痰。胸

中痞悶。

麥冬 黃芩 枳實 貝母 桔梗

前胡 赤苓 炙甘草 桑白皮 生

姜

【二母甯嗽湯】醫鑑 治傷飲食。胃熱上

炎。衝迫肺氣上逆。

貝母 知母 梔子 黃芩 石膏

桑白皮 茯苓 瓜蘗 陳皮 枳實

甘草 五味子 生姜

【三子養親湯】濟世 治老人痰嗽氣喘。

白芥子 蘿蔔子 蘇子 胆星 半

夏 黃芩 茯苓 陳皮 枳實 甘

草 生姜

【澤瀉湯】金匱 治心下有支飲。其人苦

冒眩者。主之。

澤瀉 白朮

【葶藶大棗瀉肺湯】金匱 支飲不得息此

湯主之。

葶藶 大棗

【降氣化痰湯】統旨 治喘因於痰者。喘

則便有痰聲。

紫蘇子 前胡 半夏 茯苓 橘紅

桑白皮 杏仁 甘草 瓜蘗

加姜煎。

【甯嗽化痰湯】醫療方治經年喘痰不止。

半夏 茯苓 陳皮 甘草 柴蘇

葛根 桔梗 前胡 麻黃 杏仁

桑白皮 生姜 烏梅

【二陳湯】局方 治脾胃濕痰。及一

切痰飲。

半夏 陳皮 茯苓 炙甘草

加枳實竹茹名溫胆湯。

【南星飲】吳氏集驗 治痰涎咽喉不利。

半夏 皂角 南星 甘草 生姜

【滾痰丸】王隱君 治頑痰怪痰。

青礞石 大黃 黃芩 沉香 木香

【溫肺湯】局方 治肺虛久客寒飲。發則

喘欬。不能坐臥。嘔吐痰沫。

五味子 半夏 乾薑 肉桂 甘草

杏仁 陳皮 芍藥 細辛

【細辛湯】本事 治肺虛實不調。鼻塞多

涕。咽中有涎而喘。頭項強痛。

細辛 半夏 茯苓 桔梗 桂枝

甘草

加生姜煎

【甯肺湯】楊氏 治榮衛俱虛。發熱自汗

。氣短怔忡。安肺消痰。定喘止咳。

人參 白朮 甘草 當歸 熟地

川芎 白芍藥 麥門冬 五味子

桑白皮 阿膠 茯苓

加薑煎。

【厚朴麻黃湯】金匱 欬而脈浮者。主之。

厚朴 麻黃 杏仁 半夏 石膏

乾薑 細辛 小麥 五味子

【麥門冬湯】金匱 欬逆上氣。咽喉不利。

。止逆下氣主之。

麥門冬 半夏 人參 甘草 粳米

大棗

【深師蘇子湯】外臺 療氣上迫滿。或氣

不通。煩悶喘嘔。

蘇子 乾姜 陳皮 茯苓 半夏

桂心 人參 甘草

【柴胡散】聖惠 治肺熱。便秘。時時欬

嗽。喘息促迫。

柴胡 鼈甲 檳榔 桔槿 桑根白

皮 旋覆花 甘草 大黃

加薑煎。

【治頓欬不止】葉言

白蘿蔔搗汁 飴糖

蒸化乘熱呷之。

哮喘

證解 哮喘與喘其症狀相似而微有不同。入門曰。哮喘以聲響言。喘以氣息

言。蓋哮喘症無不與痰俱。喉間如水雞聲。病發作時。肺管中皆痰。氣道窒塞而痰鳴。或擡肩搖身者。爲哮喘症。

沈金鰲曰。哮喘症大都感自幼時。客犯鹽醋。透滲氣腕。故有鹽哮、酸哮、痰哮、及幼稚天哮之證。一遇風寒。

便窒塞肺管。氣息急促。故多發于冬初。調攝須淡飲食。藥治以行氣化痰爲主。其氣息壅湧。呼吸張口抬肩如不能連續者。爲喘症。其病又分二種。因腎不納氣而喘者。宜納氣歸元。以桂附溫腎爲主。因外邪表實而喘者。當解表爲主。葉氏云。喘證之因。在

肺爲實。在腎爲虛。以此二語爲提綱。庶無誤矣。蓋在肺者屬外感。在腎者爲內傷也。

名家驗方選

【冷哮丸】全生 治痰飲經寒即發。哮喘氣急。不能平臥。

江西白豆豉 白礞 研末飯丸。

【鎮咳湯】彙言 治冬時冷哮痰喘。

麻黃 半夏 蘇子 皂角 白芥子
合二陳湯立驗。

【降氣化痰湯】統旨 治喘因於痰者。喘則便有痰聲。

紫蘇子 前胡 茯苓 半夏 陳皮

桑白皮 杏仁 甘草 瓜蒌仁

加姜煎。

【沉香散】壽世 治腹脹氣喘。坐臥不得者。

沈香 枳殼 木香 萊服子

加姜煎。

【定喘飲】大還

蘇子 麻黃 款冬 桑皮 半夏

杏仁 甘草 白朮

【甯嗽化痰湯】醫療方規矩 治經年喘痰

不止。

半夏 陳皮 茯苓 甘草 紫蘇
葛根 桔梗 前胡 麻黃 杏仁

桑白皮 生姜 烏梅

【橘皮湯】千金 治肺熱氣上。效息奔喘

橘皮 麻黃 柴胡 石膏 杏仁

生姜 紫蘇

【參蘇溫肺湯】醫療方 治肺寒喘息。

半夏 陳皮 茯苓 甘草 人參

肉桂 木香 五味子 桑白皮 紫

蘇 白朮

【蘇子降氣湯】局方 治氣易上攻。上盛

下虛。痰涎壅盛。肺逆喘咳。

紫蘇子 半夏 前胡 厚朴 陳皮

甘草 當歸 沈香

加姜棗煎。(一方加蘇葉)(一方無沈香有肉桂)(一方無陳皮、當歸、沈香、有肉桂)

【五味子散】望惠 治卒上氣逆。奔喘。

麻黃 五味子 甘草 細辛 貝母

加姜煎。

【人參定喘湯】局方 治肺氣欬嗽。上喘

氣急。喉中涎聲。胸滿氣逆。坐臥不

安。

人參 麻黃 甘草 阿膠 半夏

桑白皮 五味子 罌粟殼

加生姜煎。

【五味子湯】活人 治喘促。脈伏而厥。

人參 麥門冬 杏仁 陳皮 五味子
加姜棗煎。

【均氣八仙散】保元 治哮喘。氣急不得息。

麻黃 杏仁 黃芩 知母 桔梗

貝母 甘草 石膏

【方脈正宗治冬夏冷哮喘痰喘】彙言

麻黃 白芥子 半夏 蘇子 皂角

加二陳湯立驗。

心痛 胸痺

證解 心痛舊說以為心胞絡病。而

不在心。蓋以心爲君主。內經謂心不受邪。故以爲包絡病矣。若大寒觸犯心君。或瘀血衝心。猝然大痛無聲。咬牙切齒。舌青氣冷。汗出不休。四肢冷過肘膝者。爲真心痛。且發夕死。夕發旦死。不可治也。今人之所患。大半是胃脘痛。亦卽古人所謂九種心痛。乃尋常習見之病也。

名家驗方選

【青皮丸】食痛必飽悶。時噦噫。作敗卵氣。此由食冷或傷食也。宜青皮丸。

青皮 山查 神曲 麥芽 草果

【三花神佑丸】飲痛必噦心煩悶。時吐黃水。甚則搖身作水聲。由傷水飲痰涎積聚也。宜此丸。

芫花 牽牛 大戟 甘遂 輕粉
大黃

（丹溪常用此方）

【桂枝四七湯】寒痛外寒當溫散。內寒當溫通。久則鬱。當疏解。總治宜芩附湯。佐藥隨酌加。虛寒當溫補。宜歸脾湯。加乾姜肉桂菖蒲。腎寒乘心痛則心懸如饑。泄瀉下重。宜五積散。寒氣客背俞之脈。則血脈澹。則

血虛。虛則痛。其俞注於心。故相引而痛。宜此湯。亦宜神效散。

桂枝 白芍 炙甘草 生姜 大棗

人參 茯苓 厚朴 半夏 枳殼

蘇葉

【神效散】寒痛

木香 青皮 陳皮 枳殼 麥芽

三稜 莪朮 神麴 肉桂 白芷

白芍 甘草 延胡 補骨脂 畢澄

茄 丁香 香 姜 棗

【歸脾湯】虛痛

人參 白朮 黃芪 歸身 茯神

棗仁 遠志 龍眼肉 木香 甘草

姜 棗

【清中湯】熱痛 必身熱煩躁。掌熱。口渴。便閉。面目赤黃。大熱作痛。由積熱攻心。或暑熱入心。宜金鈴子散。剪紅丸。甚者宜大承氣湯。痛不止。熱未清也。宜此湯。

黃連 山梔 陳皮 茯苓 姜夏

甘草 草豆蔻 生姜

【剪紅丸】熱痛

蓬朮 三稜 雄黃 木香 檳榔

貫仲 乾漆 陳皮 大黃

煎湯丸。

【金鈴子散】熱痛

金鈴子 延胡索

痛止再服香砂枳朮丸。

【加味四七湯】悸癆 勞役則頭面赤而下重自煩。發熱脈弦。臍上跳。心中痛。由心傷也。宜此湯。亦宜辰砂妙香散主之。

厚朴 半夏 赤苓 茯神 蘇葉
遠志 炙草 石菖蒲 生薑 大棗

【辰砂妙香散】悸痛

黃芪 山藥 茯苓 茯神 遠志
人參 桔梗 甘草 辰砂 木香

麝香
右爲末。蓮肉湯下。

【代抵當湯】血痛 脈必澀。壯盛人宜代抵當湯。虛弱人須補而帶行。飲下作呃。亦須行之。宜手拈散。

桃仁 蓬朮 大黃 芒硝 當歸
生地

【手拈散】呃痛

延胡 五靈脂 草蓰 沒藥
爲末熱酒下。

【妙應丸】蟲痛 必面色青黃。有白斑。

脣紅。能食。或食後卽痛。或痛後卽能食。或嘔噦涎沫。或吐青水。凡吐水者虫痛。不吐水者冷心痛。虫心痛。小兒多有之。先以雞肉汁。或蜜糖

飲之。隨服妙應丸。

蕪荑 木香 檳榔 大黃 雷丸

錫灰 黑牽牛頭末 使君子肉

葱白湯爲丸。

【蘇合香丸】疰痛 必心痛。神昏猝倒。

昏憤妄言。或口噤。由卒感惡也。宜

蘇合香丸。又有脾胃腎肝病而心痛者

。經曰厥心痛。與背相控。善噤。如

從後觸其心。僵僕者。腎心痛也。宜

神保丸。神聖復氣湯。

蘇合香油 安息香 丁香 訶黎

青木香 白檀香 沈香 硃砂 藜

撥 香附 烏犀角 薰陸香 龍腦

麝香

【神保丸】腎心痛

全蠟 巴豆霜 木香 胡椒

硃砂爲衣。

【神聖復氣湯】腎心痛

黃柏 川連 生地 枳殼 川芎

蔓荊子 細辛

以上七味。先一宿用新汲水浸。

羌活 柴胡 藜蘆 甘草 姜夏

升麻 當歸 郁李仁 防風 人參

附子 炮姜 白葵花 黃芪 草

豆蔻 橘紅

連前煎。

【草薺薏丸】胃心痛 腹脹胸滿。胃脘當心痛。胃心痛也。

枳實 煨草薺 白朮 麥芽 神曲

半夏 乾薑 青皮 陳皮 食鹽

【訶子散】脾心痛 如以錐針刺其心。心痛甚者。脾心痛也。

炮訶子 厚朴 泡姜 草果 陳皮

良姜 茯苓 神麴 麥芽 炙草

【括蕒薤白半夏湯】金匱 治胸痺不得臥

。心痛徹背者。主之。

括蕒實 薤白 半夏 白酒

【枳實括蕒薤白桂枝湯】金匱 治胸痺。

心中痞氣留結在胸。胸滿。脇下逆搶

心者。此湯主之。

枳實 薤白 桂枝 厚朴 括蕒實

【桂枝生姜枳實湯】金匱 治心中痞。諸

逆心懸痛者。

桂枝 生薑 枳實

【烏頭赤石脂丸】金匱 治心痛徹背。背痛徹心者。

烏頭 蜀椒 乾薑 附子 赤石脂

蜜丸。

【九痛丸】金匱 治九種心痛。

附子 生狼牙 巴豆 乾薑 吳茱

入參

【桂枝三物湯】千金 治心下痞。諸逆懸

痛。

桂心 生姜 膠飴

【高良薑湯】千金 治心腹絞痛如刺。不可忍者。

高良姜 厚朴 當歸 桂心

【廣濟柴胡湯】外臺 治胸膈滿塞。心痛徹背。

柴胡 當歸 木香 犀角 檳榔

甘草

右水煎。入麝香末服。

【張文仲蜀椒丸】外臺 治胸中氣滿。心痛徹背。

半夏 附子 蜀椒

蜜丸

【鷄舌香散】三因 治心腹猝痛。

丁香 甘草 高良姜 芍藥

右爲末。米飲調下肉桂丸。

【梔莢丸】入門 治氣實心痛。按之更痛。

山梔 吳萸 香附子

右爲末。生姜湯下。

【茯苓杏仁甘草湯】金匱 治胸痺。胸中氣塞短氣者。此湯主之。橘皮枳實生

姜湯亦主之。

茯苓 杏仁 甘草

【橘皮枳實生薑湯】金匱

橘皮 枳實 生薑

【薏苡附子散】金匱 治胸痺緩急者。

薏苡仁 大附子

胃痛 脾病

證解

胃痛者。邪干胃脘病也。胃稟冲和之氣。多氣多血。壯實者邪不能干。虛則邪客而為病。偏寒偏熱。水停食積。皆與真氣相搏而痛。惟肝氣相乘為尤甚。以木性暴。且正尅也。肝所分泌之液體。專能助胃腸消化。故肝氣條達。胃力則健。肝失其職。胃則痛而嘔逆。是肝能病胃。故云。

臨證醫典 胃痛 脾病

木能尅土。謂胃案此亦用鐵焦先生說
因憂勞刺激交感神經起反作用肝失
阻滯胃腸之消化殆與膽汁無關
其職。不但病胃。亦能病腎病脾。然
不如肝胃關係之密切。故肝病胃即病
也。丹溪曰。心胃痛。須用規藥。痛
方止。如倉猝散。愈痛散皆能治之。
又曰心胃痛用山梔規藥。又發前藥必
不效。加元明粉即止。又曰心胃痛時
。雖數日不食。不死。若痛止便食痛
即復發。

名家驗方選

【平胃散】局方 治溼滯脾胃、不能運化

。積飲痞膈。不思飲食。心腹脹痛。反胃噁心。噯氣吞酸。常服調氣。緩胃。化宿食消痰飲等證。

厚朴 陳皮 甘草 蒼朮

研末加生薑、大棗煎。

【二陳湯】局方 治胃中寒溼痰濁等證。

陳皮 半夏 茯苓 甘草 生薑

烏梅（一方無生薑烏梅）

【沈香降氣散】局方 通順氣血。治一切

留飲氣滯。噯醋吞酸等證。

沈香 甘草 縮砂仁 香附（一方

有烏藥）

【清中湯】統旨 治胃中大熱作痛。

黃連 梔子 陳皮 茯苓 半夏
草薢 薏 甘草
薑 蘇。

【倉卒散】準繩 心腹卒痛。脾胃氣攻。腹中冷重如石。汗出四肢冰冷垂死者。

山梔 炮附子

此藥刮劑加川芎尤妙。

【愈痛散】尊生 治急心胃痛。

五靈脂 延胡 莪朮 高良薑 當

歸

淡醋湯調服。

【養胃湯】三因 治胃中虛寒。

厚朴 半夏 附子 人參 甘草
茯苓 橘皮 白朮 草菓 藿香
加姜棗烏梅煎。

【異功散】錢氏 溫中。和氣。脾胃虛弱。
。飲食少思。

人參 茯苓 白朮 甘草 陳皮
（一方加木香）加生姜、大棗煎。

【升陽益胃湯】東垣 治脾胃受傷。邪熱
內陷。外反惡風。體重節痛。飲食無
味。不能消化。

黃芪 半夏 人參 炙甘草 獨活
防風 白芍 羌活 橘皮 茯苓
柴胡 澤瀉 白朮 黃連

生薑、大棗煎。

【七珍散】本事 開胃養氣進食。

人參 茯苓 白朮 炙甘草 黃芪
山萸 粟米

加白扁豆、名八珍散。大還加藿香、
扁豆、砂仁、名十珍散。

【補脾湯】三因 治脾胃虛寒。飲食不消。
。情意不樂。

人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮
草菓 乾薑 麥芽 厚朴

【溫中降氣丸】御藥 治脾胃不和。心腹
滿悶。腹脇刺痛。逆氣上衝。

三稜 莪朮 青皮 陳皮 乾薑

良薑 吳萸 木香

【內消散】同春 治過食寒硬之物。或嘔吐、痞滿、脹痛。

陳皮 半夏 茯苓 山查 莢朮
砂仁 香附 神麴 三稜 乾薑
枳實

肝鬱 肝氣 肝陽 肝風

證解 內經云。肝爲將軍之官。恬愉快樂。爲肝德。憂愁鬱怒。爲肝病。肝喜條達。往往遇然怫鬱。則百病蠶起矣。故曰將軍。蓋古人所謂肝。乃指動物性植物性運動神經。其生理的

機能則謂之氣。其病理的反射或謂之風。婦人易鬱。鬱則氣滯。爲噎、爲嘔、爲胸腹滿悶。甚則爲脹爲痛。皆由肝鬱。亦卽肝氣病也。犯怒必動肝陽。爲吞酸脇痛。爲頭痛。爲失血等。皆肝陽衝激病也。

肝病則血燥。而熱侵纖微神經。蓋血行之調節。司於植物性運動神經。神經又藉血液之滋養以柔和。故肝與血俱病。則爲瘵、爲癩瘖。爲類中。爲眩、爲暈、此卽古人所謂肝風也。而以逍遙散。及越鞠丸。主治肝鬱肝氣。以左金丸。抑青丸爲主治肝鬱肝陽。

以歸、芍、地、膠、之類主治肝風也。

名家驗方選

【逍遙散】局方 治肝氣抑鬱。血虛火旺。頭痛目眩。二脅作痛。臍部脹痛等證。

柴胡 白朮 茯苓 炙甘草 當歸
白芍藥 陳皮 煨薑 薄荷
(一方無陳皮)

【半夏厚朴湯】金匱 治婦人咽中如有炙

鬱。
半夏 厚朴 生薑 茯苓 乾蘇葉

【越鞠丸】丹溪 治一切溼痰食火氣血諸鬱。牙疼、口瘡、胸悶、腕痛、腹脹、吞酸、腿痠、黃疸等證。

香附 蒼朮 川芎 山梔子 神麩
(一方有山查、炒麥芽。)(一方加陳皮、半夏、茯苓、砂仁、甘草、蘇子、葶子。)

【左金丸】丹溪 治肝火燥盛。左脅作痛。吞酸嘔吐。一切肝火之症。

川連(六兩) 吳茱萸(一兩)
共研末泛水。吞服。

【半夏散】聖惠 治七氣。臟腑虛冷。心胸氣逆。勞乏納呆。

半夏 人參 白朮 附子 沈香

桂心 厚朴 陳皮

加薑煎。

【分心氣飲】局方治一切氣不和。或環
境拂逆。使鬱抑之氣。於胸膈爲患。

半夏 陳皮 青皮 甘草 木通

赤芍 赤苓 肉桂 桑白皮 大腹

皮 羌活 紫蘇

加姜棗煎。

【四七湯】局方治七情氣結。成痰涎結
核。

卽半夏厚朴湯（方出金匱）

【理氣平肝散】統旨治七情所傷。氣滯

肝厥諸症。

烏藥 香附 木香 甘草 柴胡

川芎 青皮 枳殼 芍藥

加姜煎。

【解肝煎】景岳治暴怒傷肝。氣逆脹滿

。氣滯等證。

半夏 厚朴 雲苓 蘇葉 陳皮

芍藥 砂仁

加生薑煎。

【黃鶴丹】韓氏醫通治一切肝鬱氣滯。

香附子 黃連

【六鬱湯】正傳治氣、濕、熱、痰、血

、食、之六鬱。

陳皮 半夏 蒼朮 川芎 赤苓
梔子 香附 甘草 砂仁
加姜煎。

【抑青丸】張氏醫通 治肝火脅下急痛。

川連(六兩) 吳茱萸(一兩)

研末爲丸。(卽卍肝散之藥爲丸。)

【金鈴子散】心命集方 治熱厥心痛。

金鈴子 玄胡索

【龍薈丸】尊生 治肝火。

龍膽草 蘆薈 當歸 梔子 廣木

香 黃連 黃芩 麝香

研末。蜜丸。

【加味四七湯】直指 治心氣鬱滯。豁痰

散驚。

茯苓 半夏 厚朴 紫蘇 遠志
甘草 石菖蒲
加姜棗煎。

頭痛 眩暈

證解 頭痛與頭風作痛無異。但病源有外感內傷之不同耳。太陽病。風寒上攻。專主頭痛。陽明病。胃家實熱氣上逆。亦有頭痛。少陽病。頭痛在二側角。厥陰病。頭痛在巔頂。其痛卒然而來。此屬實。爲外感頭痛。環境拂逆。憂愁鬱怒。肝虛而火旺。

其痛作止不常。或左或右偏痛。愈後隨觸隨發。此屬虛。爲內傷頭風。婦人多鬱。易罹此病也。外感頭痛。如破如劈。痛無休止。內傷頭痛。病勢較緩。時作時止也。頭痛甚則腦盡痛。手足寒至節。名真頭痛。且發夕死。夕發旦死。故不可治也。

眩暈是肝病也。眩者視物目眊而黑。暈者視物皆轉動。甚至有昏厥跌仆。不省人事者。爲肝厥眩暈。內經云。諸風掉眩。皆屬于肝。又曰上氣不足。頭爲之苦傾。目爲之眩。又曰。上虛則眩。又曰髓海不足。則腦轉耳鳴。

而眩暈。上虛者。陽虛也。汗多亡陽者多有之。吐下太過者亦有之。眞武湯主治汗後下極上冒。振振欲擗地之頭眩。蒼桂朮甘湯主治汗吐下後。虛煩之頭眩。髓海不足者。陰虛也。几房勞斲傷太過。或婦人產後。失血過多者有之。宜補肝腎之陰。六味丸。四物湯之類。景岳云。無虛不作暈。滋苗者。必灌其根也。

名家驗方選

【半夏白朮天麻湯】東垣 治痰厥頭暈目眩。

半夏 陳皮 茯苓 黃柏 白朮
神麴 乾姜 澤瀉 天麻 麥芽
黃芪 人參 生薑 蒼朮

【一方無黃柏有生薑】

【防風散】得効治積熱上衝。而頭痛。

羌活 薄荷 當歸 梔子 防風
大黃 川芎 蟬退 甘草

【藿香正氣散】局方治感受四時不正之氣。頭痛發熱。

藿香 紫蘇 甘草 白朮 茯苓
陳皮 腹皮 厚朴 半夏 桔梗
加姜棗煎

【玉真圓】本事治氣逆而頭痛。不可忍

。 半夏 石膏 硫黃 硝石姜湯下
【芎辛導痰湯】奇效痰厥頭痛。

川芎 細辛 南星 陳皮 茯苓
半夏 枳實 甘草 生姜煎

【玉壺丸】局方治風痰吐逆。頭痛。目眩。

生南星 生半夏 天麻 白麴
研末爲丸。生姜湯下

【三祛湯】百代醫宗治風濕熱而頭痛。
淡芩 蒼朮 羌活 防風 蒼耳子
清茶調服亦可

【鈎藤散】本事治肝厥頭痛。

鈎藤 菊花 甘草 防風 半夏

茯苓 陳皮 麥冬 人參 石膏

加生姜煎

【菊芍散】上池祕錄 治風熱上攻。頭痛

不止。

甘菊花 石膏 甘草 羌活 防風

蔓荆子 枳殼 旋覆花

加生姜煎

【祛風清上散】統旨 治風熱上攻。眉稜

骨痛。

川芎 白芷 防風 羌活 黃芩

柴胡 荆芥 甘草

【香芍散】中藏 治一切頭風。

香附子 川芎 甘草 石膏

【加減三五七散】局方 治陽虛頭痛。風

寒入腦。目眩暈。

山萸 乾薑 茯苓 附子 細辛

防風

【羌活散】局方 治風寒頭痛項強。肢節

煩疼。天陰風雨。先覺不適。

羌活 菊花 麻黃 川芎 防風

石膏 前胡 黃芩 細辛 甘草

枳殼 茯苓 蔓荆子

加生姜薄荷煎。

【川芎散】準繩 治頭風。偏正頭痛目眩

。

川芎 防風 菊花 薄荷 羌活
甘草 石膏 細辛 槐花 香附
荊芥 茵陳

【川芎散】補珍 治偏頭痛。

川芎 菊花 防風 半夏 人參

柴胡 甘草 細辛 前胡

加生姜薄荷煎

【川芎茶調散】局方 治頭風。頭目暈眩

。偏正頭痛。

川芎 白芷 羌活 防風 甘草

荊芥 細辛 薄荷

右爲細末。清茶調服。

【消風散】局方 治諸風上攻。頭目眩暈

。而痛。

川芎 防風 蟬退 陳皮 人參
甘草 茯苓 荊芥 羌活 厚朴
藿香 姜蠶

【乳香沒落湯】寶鑑 治男子婦人。偏正
頭痛不可忍。

柴胡 甘草 桔梗 陳皮 粟殼

加燈草煎

【加味四物湯】回春 治陰虛火旺之頭痛

。

川芎 當歸 熟地 白芍 知母

黃柏 黃芩 黃連 梔子 蔓荊子

【川芎散】拔萃 治偏頭痛。及頭風。

甘菊花 川芎 石膏

【大川芎丸】河間 治頭風。頭痛。

川芎 天麻 蜜丸茶酒服

【羌活附子湯】東垣 治冬季大寒犯腦。

為腦風。

羌活 附子 升麻 麻黃 防風

姜蠶 黃芪 蒼朮 甘草 白芷

黃柏

【清空膏】東垣 治偏正頭痛。及久久不

愈之風。濕。熱。頭痛。

羌活 柴胡 甘草 黃芩 防風

川芎 黃連

【清震湯】保命 治頭面沓瘡。增寒發熱

。即雷頭風。

升麻 蒼朮 荷葉

【愈毒湯】六要 治曾患梅毒。而頭痛不

止。此痛在後腦。

土茯苓 桑白皮 苦參 黃柏 銀

花 皂角針 木通 薏苡仁 防風

【止痛太陽丹】奇効 外治

天南星 川芎 蓮鬚葱白

搗爛作餅。貼太陽痛處。

【痛風餅子】聖惠 外治

五倍子 全蝎 土狗

醋為餅。太陽穴上灸熱貼之。

以上主治頭痛方

【羚羊角散】本事 治風邪中於陽經。上注頭目。遂入於腦。一切眩暈。

羚羊角 川芎 半夏 甘草 附子

茯苓 防風 白芷 枳殼

加生姜煎

【芎歸湯】千金 治失血過多。心中懸虛。

。胸悶眩暈等證。

當歸 川芎

【天麻半夏湯】寶鑑 治風痰爲患。頭暈

眼黑。

天麻、半夏 黃連 甘草 前胡

陳皮 黃芩 茯苓 柴胡

生姜煎

【旋覆花湯】濟生 治胸中有痰。嘔噫眩暈。

旋覆花 半夏 陳皮 甘草 乾姜

人參 白朮 檳榔

加生薑煎。「加茯苓。名清陽除眩湯」

「壽世」

【近効朮附湯】外臺 治陽虛眩冒。苦極

不辨食味。

白朮 附子 甘草

生姜大棗「加川芎。名芎朮湯」三因

【真武湯】仲景 脈證並治傷寒門第84方首見

茯苓 白朮 附子 芍藥 生姜

【茯苓桂枝白朮甘草湯】仲景 脈證並治

見傷寒門第
89方首

茯苓 桂枝 白朮 炙甘草

【澤瀉湯】金匱 心下有支飲。其人苦冒眩。主之。

澤瀉 白朮

【香橘飲】直指 治氣滯眩暈。

木香 橘皮 茯苓 甘草 半夏

白朮 縮砂 丁香

加姜煎。或吞蘇合香圓。

【參附湯】回春 治真陽不足。上氣喘氣短。自汗眩暈。

人參 大附子

怔忡 卑慄 心悸 驚喜 悲

證解 怔忡。是心惕不甯。氣上衝

也。其人肝氣旺。上盛下虛。卽不免有此病。病後虛弱。與處境拂逆。皆製造此病之大源也。治宜養心湯之類。卑慄。亦屬心血不足。與怔忡略同而較甚。其症狀。胸痞不能飲食。心中常若有所失。如癡如醉。喜獨居暗室。見人驚避。似無地可自容者。每病至數年。不得以癩症治之。宜人參養榮丸之類。

心悸。與怔忡。卑慄相類。亦卽心下

惕惕然跳不甯。其源因水衰火旺。治宜天王補心丹之類。

驚者。心與肝胃病也。心氣強者。雖遇非常。亦能鎮定。虛則不爾。心氣之所以虛。當是由肝胃積漸來。故內經言驚屬肝胃。心虛甚者。多短氣自汗。坐臥不安。寐則易覺多驚。治宜黃連安神丸。及平補正心丹之類。悲者。心肝兩虛病也。心虛則神失所守。肝虛則不能生血。所謂悲者。不必有可悲之事。只是怏怏不樂。宜安神補心湯之類。

喜者。心肺二經病也。喜本不是病。

經謂暴喜傷陽。傷陽却是病。靈樞所謂喜樂無極則傷魄。傷魄者。傷肺也。則是病矣。治宜定志丸加天麥冬之類爲主也。

名家選方驗

【歸脾湯】濟生 治思慮過制。勞傷心神。及脾。健忘怔忡。

人參 白朮 黃芪 木香 茯神
甘草 龍眼肉 酸棗仁

加姜棗煎

【養心湯】準繩 治心虛血少。驚悸怔忡。或盜汗不寐。

黃芪 茯神 白茯苓 當歸 半夏

麴 川芎 遠志 酸棗仁 肉桂

柏子仁 五味子 人參 炙甘草

加生姜紅棗。如停水怔忡。加檳榔赤

茯苓。

【人參養榮丸】局方 治脾肺氣虛。營血

不足驚悸健忘。筋惕肉瞤。

人參 白朮 炙黃芪 炙甘草 陳

皮 桂心 當歸 熟地 五味子

茯苓 遠志 白芍藥 生姜 大棗

研末爲丸

【天王補心丹】得效能除怔忡。甯心神

。定驚悸。愈健忘。

生地 川連 菖蒲 人參 當歸

天冬 麥冬 五味子 棗仁 柏子

仁 元參 丹參 茯神 遠志 桔

梗

【黃連安神丸】準繩 治大驚。

黃連 硃砂 生地 當歸 炙甘草

研末爲丸

【正神正心丹】局方 治心虛血少。驚悸

顫振。夜臥不甯。

龍齒 遠志 人參 茯神 酸棗仁

柏子仁 當歸身 石菖蒲 生地

肉桂 山藥 五味子 麥門冬砂

硃一方無柏子仁 酸棗仁 石菖蒲

研末蜜丸。硃砂爲衣。

【安神補心湯】尊生 安神補心

當歸 生地 茯神 黃芩 麥門冬

白芍 白朮 遠志 棗仁 川芎

玄參 甘草

【定志丸】千金 補心。強志。治一切神

志不足，驚悸健忘。言語失倫。喜笑

發狂。色傷泄精。及能近視不能遠視

。

石菖蒲 遠志 白茯神 人參

研末蜜丸。硃砂爲衣。

【妙香散】局方 治男婦心氣不足。志意

不定。驚怖悲憂。喜怒不常。夜多盜

汗。頭眩目眩。

茯苓 甘草 茯神 遠志 薯蕷

黃芪 人參 桔梗 木香 辰砂

麝香

「王荆公」去薯蕷、黃芪、桔梗、麝香、木香、加益智、龍骨、名妙香散。

【茯苓補心湯】千金 治心氣不足。善悲

愁悲怒。

茯苓 甘草 人參 大棗 桂心

紫石英 麥冬 赤小豆

【茯苓飲子】濟生 治痰飲蓄于心胃。怔

忡不已。

茯苓 橘皮 半夏 麥冬 沉香

檳榔 甘草 生姜

嘔吐 噦 乾嘔 噯氣

呃逆 吐酸

證解 嘔吐、噦、乾嘔、之爲病。

乃脾胃虛弱病也。嘔者聲物俱有而旋出。吐者無聲有物而頓出。皆以生薑半夏爲主治。噦者。有聲無物。俗謂之吃忒是也。以橘皮丁香等主治。乾嘔者。但空泛噦心而無物也。以半夏吳萸等爲主治。

噯氣卽噯氣也。是脾胃氣滯病。景岳所謂噯氣多由滯逆。滯逆多由氣不行

者。凡人之飲食太飽。及飲食不易消化者。多有此證。但太飽作噯。爲實證。宜行氣消導。若食不易消化。時多虛悶作噯者。爲胃氣虛而脾失健運宜溫中健運。

呃逆之證。景岳謂古來無此名也。後人因其呃呃連聲。故以呃逆名之。傷寒雜病中皆有之。古人悉以爲屬虛寒。實不的確。總之氣逆于下。則直衝于上。有屬寒者。亦有屬熱者。以丁香柿蒂湯。爲主治屬寒之呃逆也。以安胃飲爲主治屬熱之呃逆也。若大病中虛脫而呃逆者。則危殆矣。當以見

證爲主治也。

名家驗方選

【吳茱萸湯】仲景 脈證並治 傷寒論第100方之首

【金匱】治嘔而胸滿者又主。乾嘔吐涎

沫頭痛者。

吳茱 人參 生薑 大棗

【半夏瀉心湯】仲景 脈證並治 見傷寒門第54方首

【金匱】治嘔而腸鳴。心下痞者。此湯

主之。

半夏 人參 黃芩 乾薑 黃連

炙甘草 大棗

【小半夏湯】金匱 治諸嘔吐穀不得下者

。此湯主之。 半夏 生薑

加茯苓名小半夏加茯苓湯

【豬苓散】金匱 治嘔吐而病在膈上。後

思水者解。急與之。思水者。此散主

之。

豬苓 茯苓 白朮

【大半夏湯】金匱 治胃反嘔吐者。此湯

主之。

半夏 人參 白蜜

【四逆湯】仲景 脈證並治 見傷寒門第72方首

【金匱】治嘔而脈弱。小便復利。身有

微熱見厥者難治。此湯主之。

炙甘草 乾姜 附子

【小柴胡湯】仲景 脈證並治 見傷寒門第29方首

【金匱】治嘔而胸脅苦滿。寒熱往來者。此湯主之。

柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

生薑 大棗

【大黃甘草湯】金匱 治食已即吐者。此湯主之。

大黃 甘草

【茯苓澤瀉湯】金匱 治胃反吐而渴欲飲水者。此湯主之。

茯苓 澤瀉 甘草 桂枝 白朮

生薑

【文蛤湯】金匱 治吐後渴欲得水而貪飲者。此湯主之。兼主微風脈緊頭痛。

文蛤 石膏 麻黃 甘草 生姜 杏仁 大棗

【生薑半夏湯】金匱 治病入胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。徹心中憤憤無奈者。此湯主之。

半夏 生薑

【葛根加半夏湯】仲景 太陽與陽明合病不下利。但嘔者。主之。

葛根 麻黃 桂枝 芍藥 甘草

生薑 大棗 半夏

【黃連湯】仲景 傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。主之。

黃連 炙甘草 乾薑 桂枝 人參

半夏 大棗

【崔氏方】外臺療食則吐。或朝食夜吐。名曰胃反。或氣噎不飲食。數年羸削。唯飲水亦同此方。

半夏 人參 生薑 橘皮 牛蒡

厚朴 羚羊角

【比和飲】保元治久病胃虛。嘔吐不納水穀。服藥亦嘔者。

人參 白朮 茯苓 神麩 藿香

陳皮 砂仁 甘草

加陳倉米水煎。伏龍肝末攪和澄清。

取姜棗煎。

【華佗治胃反方】千金胃反爲病。朝食

夕吐。心下硬。往來寒熱。吐逆不下。此爲關上寒邪所爲。

真珠 雄黃 丹砂 朴硝

乾薑密丸

【翻胃湯】葉氏治胃反嘔吐。胸膈不利食後經宿。吐出臭酸者。

茯苓 厚朴 陳皮 白朮 人參

吳茱萸 加姜棗

【麥門冬散】聖惠治反胃嘔吐食。煩熱。

麥門冬 半夏 人參 陳皮 茯苓

枇杷葉 加姜棗煎

【竹茹湯】本事治胃熱嘔吐。

乾葛 炙甘草 半夏 竹茹

加姜棗煎

【半夏藿香湯】溫疫 治胃氣虛寒。下後

反嘔。

半夏 藿香 乾薑 茯苓 陳皮

白朮 甘草

加生薑煎

【代赭石散】集驗良方 治一切嘔吐不止

。

旋覆花 代赭石

研末調服嘔止爲度。

【張渙養中湯】幼幼養脾胃嘔吐不止。

附子 沈香 木香 半夏 人參

官桂

加生薑煎

【丁香溫中湯】易簡 治嘔逆惡心。

理中湯加

丁香 橘紅 半夏 生姜

理中湯。加半夏。茯苓。姜。棗。名

白朮散。治嘔吐

【旋覆花湯】濟生 治中脘伏痰。吐逆眩

暈。

旋覆花 半夏 人參 橘紅 乾薑

檳榔 甘草 白朮

以上主治嘔吐方

【橘皮竹茹湯】金匱 治噦逆者。此湯主

之。

橘皮 竹茹 大棗 生薑 甘草
人參

【橘皮湯】金匱 乾嘔。噦。若手足厥者

。此湯主之。

橘皮 生薑

【黃芩加半夏生姜湯】金匱 乾嘔而痢者

。此湯主之。

黃芩 芍藥 炙甘草 半夏 生薑

大棗

【半夏乾薑散】金匱 乾嘔吐逆。吐涎沫

此散主之。

半夏 乾薑

【參粟湯】聖濟 治乾嘔不下食者。

人參 陳粟米 半夏
加姜棗煎。

以上主治噦乾嘔方

【十味保和湯】噯氣 脾胃虛弱作噯。

爲虛證。補中行氣。宜此湯。

人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮

砂仁 木香 香附 藿香 甘草

【破鬱丹】回春 治婦人噯氣胸緊。連十

餘聲不盡。噯出氣。心頭略寬。不噯

即緊。

香附 梔子 黃連 枳實 檳榔

莢朮 青皮 瓜蒌仁 蘇子

【勻氣丸】入門 治氣虛濁升多噯。

草豆蔻 橘皮 沈香 人參 益智

仁 檀香 大腹子 姜湯下

【健脾丸】必用 若食不消化。時多虛悶作噯者。乃胃氣虛寒。脾氣失運。宜

此丸。

白朮 茯苓 白芍 半夏 陳皮

神麴 山楂 當歸 川芎

荷葉湯作米糊丸

【旋復代赭湯】仲景 傷寒發汗若吐若下

。解後。心下痞鞭。噯氣不除者。此

湯主之。

旋復花 人參 半夏 炙甘草 代

赭石 大棗 生薑

以上主治噯氣方

【丁香柿蒂湯】嚴氏 治寒呃逆

丁香 柿蒂 人參 生薑

【安胃飲】景岳 治熱呃逆。

陳皮 山楂 麥芽 木通 澤瀉

黃芩 石斛

以上主治呃逆方。

【清鬱二陳湯】回春 治酸水刺心。及吞

酸饋雜。

陳皮 半夏 茯苓 甘草 香附

黃連 梔子 蒼朮 川芎 枳實

神麴 芍藥

加生薑煎。

【蒼連湯】同春治吐酸。

蒼朮 黃連 陳皮 半夏 茯苓

神麴 吳茱萸 砂仁 甘草

加生姜煎

【加減安胃湯】統旨治脾胃虛寒。嘔

吐酸水。

藿香 人參 蒼朮 陳皮 吳茱萸

加生薑煎

【廣濟檳榔散】外臺療吐酸水。食後則

變作酸水吐出。

檳榔 人參 橘皮 藜蘆 茯苓

空腹姜湯調服

【又白朮散】外臺療嘔吐酸水。結氣於

心。

白朮 茯苓 厚朴 橘皮 人參

藜蘆 吳茱萸 檳榔 大黃

【延年增損承氣丸】外臺療胸脅支滿。

多噫醋咽。

前胡 枳實 陳皮 大黃 桂心

乾薑 吳茱萸 茯苓 芍藥 原朴

杏仁

【茱連丸】丹溪治吞酸

黃連 黃芩 吳茱萸 陳皮 蒼朮

研末神麴糊丸

以上主治吐酸方

失眠 健忘

證解 經曰。衛氣者。晝行于陽。夜行于陰。行陽則寤。行陰則寐。醒則行陽。臥則行陰。蓋陽盛陰虛。則晝夜不得寐。若陰氣盛。則日醒而臥也。不寐之因。不外乎外感熱病。而內有心肝血虛。心血虛。神不守舍。故不寐。治宜琥珀養心丹。肝虛。魂不守舍。亦不寐。治宜珍珠母丸。或有肺腎並病。真陰虧損。孤陽上越者。亦不寐。治宜知柏八味丸。胃不和者。亦不寐。治宜橘紅、半夏、茯苓

、神麴、山查、諸和胃消導藥。爲主。健忘者。陡然而忘記也。內經責于心腎不交。心不下交於腎。則濁火亂其神明。腎不上交於心。則精氣伏而不。用。火居上則因而生痰。水居下則因而生燥。故惟有補腎養心。使意志常治。而健忘自愈也。

名家驗方選

【琥珀養心丹】準繩 治血虛驚悸。夜臥不甯。或怔忡心跳。

琥珀 龍齒 遠志 茯神 石菖蒲

人參 酸棗仁 當歸 生地 柏子

仁 黃連 硃砂 牛黃

研極細。以豬心血和丸。金箔爲衣。

【琥珀多寐丸】驗方 治心血不足。腎

氣虧損。致怔忡健忘。寤寐不安。心

神恍惚。

琥珀 黨參 茯苓 遠志 羚羊角

甘草

研末煉蜜爲丸

【珍珠母丸】世補齋 肝虛失寐。

珍珠母五錢 川連四分 獐桂三分

薄荷一錢 沈香二分 犀角三分

姜夏一錢 歸身三錢 白芍三錢

煎湯服沈香、犀角，獐桂研沖

【知柏地黃丸】功用治相火旺盛。孤

陽上越而不眠。

熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓

澤瀉 知母 黃柏

【養心湯】醫鑑 勤政操勞。心虛不眠。

人參 黃連 麥門冬 茯苓 當歸

芍藥 遠志 陳皮 柏子仁 酸棗

仁。甘草 蓮肉

【酸棗湯】醫療方 治虛勞多煩。胆虛

不眠。

酸棗仁 人參 桂枝 生姜 石膏

茯苓 知母 甘草

【硃砂安神丸】東垣 心血虛。驚悸怔

忡。心神顛倒。寤寐不安。

硃砂 黃連 炙甘草 生地 當歸

研末蜜丸。硃砂爲衣

【引神歸舍丹】入門 治思慮過度。病在

心脾者。宜此方。

胆星 硃砂 附子

豬心血爲丸。萱草根煎湯下。

【溫膽湯】千金 治大病後。虛煩不得

眠者。

半夏 橘皮 甘草 生姜 竹茹

枳實

【黃芩散】聖惠 治虛勞煩熱。不得臥

寐。

甘草 羚羊角 酸棗仁 黃芩

知母 茯苓

加棗煎

【茯神散】聖惠 治膽虛。不得眠。神

志不足。

茯神 柏子仁 酸棗 黃芪 人參

熟地 遠志 五味子

【高枕無憂散】醫療方 治晝夜不眠。

陳皮 半夏 茯苓 枳殼 竹茹

麥冬 龍眼肉 石膏 甘草 人參

【黃連阿膠湯】仲景 少陰病。得之二

三日以上。心中煩。不得臥。

黃連 黃芩 阿膠 芍藥 雞子黃

以上主治不寐方

【定志丸】千金 補心強志。治一切神志不足。驚悸健忘。言語失倫。喜笑發狂。

石菖蒲 遠志 白茯神

（一作茯苓）（人參）（一方有茯苓，白

朮、麥門冬）

研末蜜丸。硃砂爲衣。

【讀書丸】準繩 益智。安神。

石菖蒲 菟絲子 遠志 生地黃

五味子 川芎 地骨皮 研末爲丸

【茯苓湯】健忘兼飲者。

半夏 陳皮 茯苓 甘草 香附
益智仁 人參 烏梅 竹瀝 薑汁
【人參養榮湯】局方 治氣血兩虛。形神不足者。

人參 白芍 黃芪 陳皮 肉桂

甘草 當歸 白朮 五味子 熟地

茯苓 遠志 姜棗

【孔聖枕中丹】千金 治讀書善忘。久服

益智聰明。

敗龜版 龍骨 遠志 九節菖蒲

研末爲丸

【朱雀丸】百一方 治心腎不交。恍惚健

忘。時復怔忡。

沈香 茯神 (一作白茯苓)

研末蜜丸。辰砂爲衣

【天王補心丹】得效甯心。保神，益血。固精。壯力強志。治思慮過度。心血不足。神志不甯。健忘怔忡等證。

生地 人參 白茯苓 遠志 石菖

蒲 玄參 柏子仁 桔梗 天門冬

丹參 酸棗仁 炙甘草 麥門冬

百部 杜仲 茯神 當歸 五味子

(一方有熟地、黃連、無生地、石菖蒲、甘草、百部、杜仲、茯神。)(一方無茯苓、甘草、百部、杜仲。)

蜜丸

以上主治健忘方

癩狂癩

證解 癩之發作無定時。其證狀。猝然仆地作聲。知覺神經頓時全失。口流涎沫。甚至手足癱瘓。經數分鐘。乃至一小時。必可自止。後人因其作聲如馬牛雞羊豬。故名之五癩。石頭云。癩證之發。往往起于鬱悶之人。鬱則生滯。鬱則生火。滯火則易生痰飲。雖不聞驚。亦自發作。治法以開鬱清火滌痰爲主。又有千金少小風、驚、食、三癩。風邪所中。病先身

熱癩癧。驚啼叫喚。而後發癩，脈浮
者。爲陽癩。病在六腑。外在肌膚。
猶易治也。病先冷。不作驚掣。不啼
呼。而發病時脈沈者。爲陰癩。病在
五臟。內在骨髓。極難治。然千金之
少小驚、風、食、三癩。爲驟發之猝
病。亦卽後人所謂驚風。癩癩五癩乃
頻發之痼疾。證狀有相似處。但源因
乃大相懸殊。治不可混淆也。淵雷案
晉唐以前癩爲小兒病之專名。
靈樞癩狂篇。狂始發。少臥不飢。自
高賢也。自辯智也。自尊貴也。善詈
罵。甚至登高而歌。棄衣而走。有因

胃中實熱。大渴欲飲而狂者。宜白虎
湯。有因蓄血在小腸。熱結膀胱。小
便不利。重心在膀胱而狂者。宜桃核
承氣湯。小便自利知蓄血。重心在小
腸而狂者。宜抵當湯。有因心經邪熱
而狂亂者。宜牛黃清心丸之類。
難經。癩疾始發。意不樂。言不倫。
僵仆直視。如醉如癡。重陽者狂。重
陰者爲癩。大都處境拂逆。爲製造此
病之大源。宜寧志膏。之類爲主治也。

名家驗方選

【五癩丸】楊氏 專治癩癩。

白附子 半夏 皂角 天南星

生白礬 烏蛇 全蠍 蜈蚣 白殭

蠶 麝香 硃砂 雄黃

研末生姜汁爲丸

【控涎丹】類方 治諸癩久不愈。頑涎聚

散無時。變生諸症。

川烏 半夏 鐵粉 全蝎 白殭

蠶 甘遂

研末姜汁爲丸。硃砂爲衣。

【葇荇子散】外臺 治五癩

豬卵 葇荇子 牛黃 鯉魚胆

桂心

【清心豁痰湯】玉案 治五癩。並治癩狂

石菖蒲 茯苓 遠志 貝母 玄參

橘紅 竹茹 麥門冬 枳實 花粉

酸棗仁 黃連 甘草

加姜煎

。

【清心溫膽湯】醫鑑 平肝解鬱。清火化

痰。諸癩。

麥冬 人參 當歸 白芍 川芎

遠志 白朮 茯苓 陳皮 半夏

枳實 竹茹 菖蒲 香附 黃連

甘草

【半夏圓】聖惠 治積痰不散。上衝心臆

變爲風癇。

半夏 白礬 硃砂 黃丹

爲末粟米飯和丸。人參湯下。

【鈎藤湯】錦囊 治諸癇

橘紅 鈎藤 膽星 天麻 姜蠶

人參 遠志 犀角 石菖蒲

加燈心煎。加牛黃、珍珠、

【生鐵洛飲】素問 治怒狂。

生鐵洛卽爐冶間鎚落之錢屑。

【抱胆丸】類方 治一切癲癇風狂。或因

驚恐怖畏所致。

水銀 硃砂 黑鉛 乳香

【風引湯】金匱 除熱癰癇。

大黃 乾薑 龍骨 桂枝 甘草

牡蠣 寒水石 滑石 赤石脂

白石脂 紫石英 石膏

【防己地黃湯】金匱 治病如狂狀。妄行

獨語不休。無寒熱。其脈浮。

防己 甘草 桂枝 防風

【桃核承氣湯】仲景 證脈並治見傷寒門第45方首

小便不利。少腹急結者。可知重心在

膀胱而狂者。

桃仁 大黃 芒硝 桂枝 炙甘草

【抵當湯】仲景 脈證並治見傷寒門第46方首小

便自利。可知蓄血重心在小腸而狂者

熬水蛭 去翅足熬蟲蟲 桃仁

大黃

【桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯】

仲景 脈證並治見

傷寒門第
十五方首

傷寒脈浮

。醫以火迫劫之亡陽。必驚狂。臥不

安者。

桂枝 炙甘草 生姜 大棗 蜀漆

牡蠣 龍骨

【二陰煎】景岳 治心經有熱。水不制火

。驚狂失志。多言多笑。

生地 玄參 麥冬 甘草 棗仁

黃連 茯苓 木通

加燈心煎

【雄雌圓】千金 治風癩失性。顛倒欲死者。

雄黃 雌黃 眞珠 丹砂 水銀

右藥研末蜜丸。服至以有知覺爲度。

(三因)名六珍丹

【鎮心丹】三因 治心氣不足。驚悸心煩

。喜怒悲憂悉不知。

研明光辰砂 枯礬

右爲末。水丸人參湯下。

【寧志膏】普濟本事 治喪心病狂。

人參 酸棗仁 辰砂 乳香

研末蜜丸

【白金丸】永類 治失心癩狂

眞鬱金 明礬

爲末糊丸。白湯下。

【牛黃清心丸】同方 治心氣不足。神志不定。驚怕恐怖。悲憂慘傷。喜怒無時。神志昏亂。或發狂癲。

黃芩 蒲黃 羚羊角 麝香 龍腦

牛黃 犀角 雄黃 金箔爲衣

右爲末蜜丸

黃疸

證解 身黃及目眥黃溺黃之證。舊

說因受濕邪而得。其黃色素則膽汁也。大凡膽汁混入毛細管。則猝然於眼

白膜發黃。瀰蔓指爪、面部、四肢、以及遍體皆黃。甚至於襯衫被褥皆染黃色。婦人甚至乳汁亦染黃色者。故多爲黃疸病。且口舌常有苦味之感。亦屬膽氣上逆之原因也。觀之金匱。疸證有五。黃疸、穀疸、酒疸、女勞疸、黃汗、是也。身目盡黃。煩熱體倦欲寐。日見衰弱者。爲黃疸。宜茵陳五苓散主之。食已如飢。心胸煩熱。身黃者。爲穀疸。宜茵陳蒿湯主之。若酒疸。小便不利。面目黃而兼見赤斑者。宜葛花解醒湯加茵陳。脈有力而便秘者。宜梔子大黃湯。若女

勞疸。則一身盡黃。而額上獨黑者。宜補中益氣湯。或四君子吞六味丸等。又有汗出染衣，色如蘗汁爲黃汗。總之身目皆黃而無汗者。曰黃疸。汗出染衣色黃者。曰黃汗。因食傷胃而得者。曰穀疸。因酒傷溼而得者。曰酒疸。因色慾過度而得者。曰女勞疸。雖名目有五種。然不外乎陰陽二證。大都陽證發黃。屬實屬熱。可用茵陳蒿湯。陰證發黃。屬虛屬寒。可用朮附加茵陳之類治之。虛實弗失。得其要矣。

名家驗方選

【茵陳蒿湯】金匱 穀疸之爲病。寒熱不食。食卽頭眩。心胸不安。久久發黃爲穀疸。此湯主之。

茵陳 梔子 大黃

【刪繁着參丸】外臺 療勞疸。穀疸。

苦參 龍膽 梔子

右爲末。若病甚。加豬膽汁和丸。如梧子大。每服五丸。日三服。

【龍膽散】聖惠 治勞黃疸。

龍膽 甘草 牡蠣 柴胡 麥門冬
升麻 犀角

右水煎。入生地黃汁。

【茵陳蒿湯】千金 主治黃疸。酒疸酒癰等。

茵陳 黃芩 人參 大黃 甘草

梔子 黃連

【梔子大黃湯】金匱 酒黃疸。心中懊懣。或熱痛。此湯主之。

豆豉 大黃 枳實 梔子

【鹿茸散】聖惠 治房黃疸。體虛無力。夜多夢遺精。神思不安。

鹿茸 五味子 黃芪 熟乾地黃

山茱萸 牡蠣

右藥爲末。以溫酒調下二錢。

【四君子湯】直指 治色疸，

人參 茯苓 白扁豆 甘草 芍藥 白朮 黃芪

右藥加姜棗煎

【茵陳梔子黃連三物湯】準繩 治大便自利而黃。

茵陳 梔子 黃連

右藥水煎

【硝石礬石散】金匱 女勞疸。腹滿。身盡黃。此湯主之。

硝石 礬石

右二味爲散。以大麥粥汁和服。

【五味湯】外臺 療急黃疸。

麻黃 石膏 茵陳 葛根 生姜
右藥水煎。覆被微取汗。

【必効大苦湯】外臺 療急黃疸。

大黃 芒硝

右藥水煎。須臾當快利爲度。

【延年瓜蒂散】外臺 療急黃疸。

瓜蒂 赤小豆

右爲末。漿水和散。

【茵陳附子乾姜湯】寶鑑 治陰黃。脈沈

細。

附子 茵陳 草豆蔻 白朮 茯苓

枳實 乾姜 澤瀉 半夏 橘紅

右藥加生薑。水煎。

【茵陳附子乾姜湯】方選 治陰黃。脈沈數者。

茵陳 茯苓 乾姜 附子 澤瀉

枳殼 白朮 陳皮 半夏 白朮

【小半夏湯】聖惠 治陰黃。

半夏 生姜 葛根 人參

【茵陳四逆湯】醫通 治陰黃。脈沈細。

肢體逆冷。腰以上自汗。

茵陳 乾姜 炙甘草 附子

【茵陳五苓散】金匱 黃疸病。小便不利者。此湯主之。

茵陳 茯苓 桂枝 澤瀉 豬苓

白朮

右卽五苓散加茵陳。

【大黃硝石湯】金匱黃疸。腹滿。小便不利而赤。宜此湯。

大黃 硝石 梔子 黃柏

【加減五苓湯】濟生治伏暑鬱發黃。煩渴。小便不利。

茯苓 澤瀉 茵陳 豬苓 白朮

【茵陳蒿湯】藥方規矩治身黃。二便不利。腹微滿。

茵陳 大黃 山梔

【茵陳丸】上池祕錄療黃疸。遍身面目悉黃。小便如梔子汁。

茵陳蒿 黃芩 大黃 枳實

右擣篩蜜丸。

【梔子蘗皮湯】醫方大成傷寒身黃發熱者。主之。

梔子 甘草 黃蘗

【清飲子】藥方選治黃疸發熱。

茯苓 川芎 桑白皮 甘草 柴胡

右入姜棗煎

【退黃散】藥方選治傷寒發黃。小便濃者。

茵陳 升麻 柏子仁 黃芩 柴胡

通草 黃連 龍膽 甘草 山梔

滑石 燈心草

【葛花解醒湯】試效

猪苓 荳蔻 神麴 茯苓 青皮
乾姜 澤瀉 陳皮 木香 白朮
砂仁 葛花 人參

【茵陳瀉黃湯】尊生瀉黃病。

茵陳蒿 赤茯苓 白芍 黃連

木通 白朮 山梔 人參 木香

葛根

右藥加姜棗煎

痿躄

證解 痿者痿弱無力。舉動不能。

躄者足弱不能行也。內經曰。手得血而能握。足得血而能行。血衰不能營

養百骸。故手足痿弱。今知手足弛緩。乃因司運動之神經弛緩之故。又曰。凡五臟之病。皆能使人痿弱也。例如色枯毛落。喘呼不已。屬肺病者。爲皮痿。色赤脈溢。脛腫不任地。屬心病者。爲脈痿。色蒼口苦。爪枯筋攣。屬肝病者。爲筋痿。色黃肉潤。肌痺不仁。屬脾病者。爲肉痿。色黑耳焦。腰脊不舉，屬腎病者。爲骨痿也。古人治痿獨取陽明。何也。蓋陽明爲臟腑之海。陽明虛則五臟無所稟。不能行氣血。濡筋骨。又爲宗筋之長。因陽明虛則宗筋縱。宗筋縱則不

能約束筋骨。而流利關節也。症治準繩等書。論治痿之法甚爲紛繁。無當要領。不過徒亂人意而已。要不外乾溼二端。可以植物爲喻。譬如植物過溼則痿。過燥亦痿。人之痿躄者。亦惟乾濕二端盡矣。測知其痿之屬濕屬乾者。見其體之肥瘠。肌膚之枯潤。顯然可知。治溼痿者。以利溼祛風燥濕爲主。如清燥湯。二妙丸等。治乾痿者。以養血潤燥舒筋爲主。如四君子湯。保元湯。加天冬、石斛、等治之。

名家驗方選

【藿香養胃湯】三因治胃弱不食。四肢痿躄。行握不能者。

藿香、茯苓、白朮、甘草、人參

砂仁、神麴、薏仁、半夏、華澄茄

烏藥、加姜棗

【保元湯】主治宗筋弛縱之乾痿者

黃芪、人參、甘草、肉桂

【四君子湯】局方主治失養之乾痿者。

人參、白朮、茯苓、甘草

【加味四物湯】正傳治痿躄之不能舉動者。

川芎、當歸、熟地、芍藥、麥冬

人參、知母、杜仲、黃柏、蒼朮

黃連 牛膝 五味子

【龍膽瀉肝湯】方考 色青爪枯口苦。屬乾之痿躄。宜此湯主之。

柴胡 黃芩 黃連 梔子 人參

天冬 麥冬 五味子 知母

龍胆草

【清燥湯】東垣 主治濕痿。

黃芪 白朮 人參 橘皮 茯苓

甘草 當歸 生地 蒼朮 豬苓

澤瀉 神麴 麥冬 五味子 黃柏

升麻 柴胡 黃連

【二妙丸】丹溪 治濕熱下注之痿躄。

黃柏 茅朮 加當歸 牛膝 防己

葶藶 龜版

【虎潛丸】丹溪 治腎虛筋骨失養。屬乾之痿躄。不能步履。

龜版 黃柏 知母 熟地 牛膝

鎖陽 虎骨 當歸 芍藥 陳皮

冬日加姜爲末。羊肉搗爲丸。淡鹽湯下。

【虎脛骨丸】正傳 治兩足痿弱軟痛。或如火烙。從足踝下。上衝腿膀等證。

因濕熱所成。

蒼朮 黃柏 牛膝 龜版 虎脛骨

防己 當歸

【五痿湯】心悟 治五藏痿。

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸
麥冬 黃柏 知母 薏仁

行痺 痛痺 着痺

證解 痺者因經絡之氣血爲邪所閉。不得通行而爲痺病也。內經痺論曰風、寒、溼、三邪侵襲。合而爲痺。凡風勝者爲行痺。寒勝者爲痛痺。濕勝者爲着痺。行痺着痺知痛知癢者易治。

行痺痛無定處之證。蓋風性善行數變。流注歷節屬風勝者。治以散風爲主。如敗毒散。烏藥順氣散等。

痛痺痛有定處。苦楚之證。因受寒邪。受寒則氣血凝滯不通。不通則痛。屬寒勝者。治以溫散爲主。如五積散。小續命湯。甘草附子湯等。

着痺肢體重而頑木微疼之證。因經絡受濕。濕邪留滯于經絡不泄。屬濕勝者。治以燥濕散風爲主。如羌活勝濕湯。三因附子湯。朮附湯等治之。

名家驗方選

【敗毒散】直指 治行痺風勝者。

柴胡 前胡 羌活 獨活 茯苓
甘草 枳殼 桔梗 川芎 薄荷

薑加人參名人參敗毒散

【烏藥順氣散】嚴用和 治風勝之行痺。

川芎 白芷 橘紅 麻黃 枳殼

天蟲 炙甘草 烏藥 生薑

【黃芪桂枝五物湯】金匱 治血痺陰陽俱

微。外症身體不仁。如風痺。

黃芪 芍藥 桂枝 生薑 大棗

【升麻湯】聖濟 治熱痺。

升麻 茯神 人參 防風 犀角

羚羊角 羌活 桂枝

加姜煎

【防風湯】濟生 治血痺。皮膚不仁。

防風 獨活 當歸 茯苓 秦艽

芍藥 黃芩 桂枝 杏仁 甘草

加薑煎

【大秦芩湯】潔古 治血弱不養筋。致手

足痿痺。

秦芩 石膏 甘草 川芎 當歸

白芍 羌活 獨活 防風 黃芩

白朮 白芷 茯苓 生地 熟地

細辛

以上主治風勝之行痺方

【五積散】局方 治外感風邪。內傷生冷。

以及寒濕客于經絡。腰脚痠疼如痛痺。

蒼朮 桔梗 麻黃 枳殼 陳皮

厚朴 乾姜 半夏 茯苓 甘草

白芷 當歸 白芍 川芎 肉桂

【五痺湯】尊生 治風寒濕氣內襲。手足

緩弱痛痺。

人參 茯苓 當歸 白芍 川芎

白朮 細辛 甘草 五味子

加生薑煎如心肝腎三痺當倍川芎舒筋

湯之別名

【蠲痺湯】濟生 治身體疼痛。舉動艱難

。及手足冷痺。

當歸 黃芪 羌活 芍藥 甘草

獨活

加姜棗煎

【附子湯】三因 治屬寒勝之痛痺。

附子 白朮 茯苓 人參 白芍

【甘草附子湯】金匱 治屬寒勝之痛痺。

甘草 附子 白朮 桔梗

以上主治寒勝之痛痺方。

【羌活勝溼湯】辨惑 治受濕身重。脊痛

着痺。

羌活 獨活 川芎 甘草 藁本

蔓荊子 防風

【改定三痺湯】醫通 治風寒濕三氣合而

為痺。

人參 白朮 當歸 川芎 黃芪

芍藥 茯苓 甘草 烏頭 桂心

防已 防風 細辛

加姜棗煎

【茯苓湯】聖濟 治風痺濕。留著不去。

四肢麻木。拘攣浮腫。

赤茯苓 桑根白皮 防已 桂枝

川芎 芍藥 當歸 麻黃 甘草

加棗煎

【朮附湯】近效 治以溫脾燥濕之著痺。

白朮 附子

【平胃散】局方 以治着痺。行氣行溼。

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草

【厚朴溫中湯】治以調中利溼之着痺。

厚朴 陳皮 甘草 茯苓 乾薑

荳蔻 木香 薑

【甘薑苓朮湯】金匱 治屬溼勝之著痺。

以定痛散濕。

甘草 乾姜 茯苓 白朮

一名賢着湯

以上主治濕勝之著痺方。

麻木

證解 麻者非痛非癢。或四肢。或

半身。或遍體。如肌膚被繩纏縛初鬆

之狀，木者不痛不癢。按之搔之。知

覺全失。麻木之證。先起于四肢者為多

。四肢屬末梢神經所主。因氣血虛而

營養難到末梢故也。丹溪謂麻為氣虛

而風痰湊之。木則肌肉頑癩。全屬溼痰瘀血。阻滯行氣。蓋氣爲血之帥。氣行則血隨之而行。治麻以生薑爲嚮導。二陳以滌痰。殭蠶以行經絡。治木以桂附爲嚮導。烏藥、木香、以行氣。當歸、紅花、以和血。穿山甲以通經絡。凡麻木初起，治宜驅風逐痰通絡爲主。病瘥善後。以益氣養血調之。

名家驗方選

【二陳湯】局方 麻者治以滌痰法。

半夏 陳皮 茯苓 甘草

【神效黃芪湯】東垣 主治麻木之衛氣不行者。宜此湯。

人參 黃芪 陳皮 白芍 甘草

蔓荊子

【八珍湯】局方 主治麻木之營氣不行。

八珍加桂枝。

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎

當歸 地黃 白芍 加桂枝

【三妙丸】正傳 主治溼熱下注。腿足之

麻木。

黃柏 蒼朮 牛膝

【小防風湯】葉氏 治手足之麻木。

防風 秦艽 羌活 附子

加姜煎入生地汁

【止麻消痰湯】壽世 治口舌麻木。涎流
嘴角。頭面亦麻木者。

天麻 細辛 枳殼 桔梗 半夏

陳皮 茯苓 甘草 黃連 瓜蒌

黃芩 南星

加生姜煎

【人參益氣湯】東垣 治麻木倦怠嗜臥。

黃芪 甘草 升麻 芍藥 人參

五味子 柴胡

【薏苡仁湯】醫通 治手足流注疼痛。麻
木者。

薏苡仁 當歸 桂心 甘草 芍藥

麻黃 蒼朮 生姜

【茯苓川芎湯】宣明 治四肢麻木。拘攣
浮腫。

茯苓 川芎 甘草 芍藥 桑白皮

官桂 防風 麻黃 當歸 大棗

【茯苓湯】濟生 治支飲手足麻痺。多睡

眩冒。

半夏 茯苓 橘紅 枳實 桔梗

甘草

加姜煎

【開結舒經湯】同春 治婦人手足麻痺。
因七情鬱滯經絡也。

紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎

蒼朮 羌活 南星 半夏 當歸
桂枝 甘草
加生薑竹瀝煎

痛風 歷節風

證解 痛風百節疼痛如刺之證。通常起于卅五歲以上者爲多。因卅五歲以上是由盛入衰。賊風乘虛侵襲故也。亦有嗜食肉類之人。或酒客等。易罹此症。因肥甘過度。以致經絡不通。血行不利。蓋不通則痛。通則不痛。往往溼痰及濁血凝滯。流于四肢。或留于腰背。甚則兼紅兼腫。塊癩徧

身而化膿。丹溪曰。瘦人多陰虛火旺。血不榮筋。脈弦而硬。宜四物湯。加秦艽、防風、芩柏之類。肥人多風溼生痰。流注經絡。脈濡滑數者。宜半夏茯苓湯。加桂枝豨蠶草之類。凡治痛風。因血不養神經而痛者。治宜養血爲主。因溼痰凝滯經絡而痛者。治宜化痰通絡爲主。養血以四物湯損益之。化痰通絡半夏茯苓湯。及大羌活湯增損之。爲治痛風不二法門。歷節風。病有經歷關節而作痛者。名爲歷節痛風也。寒溼合邪。不可屈伸。風濕相搏。肢節疼痛者。亦宜大羌

活湯。酒客汗出當風。風熱成歷節者。宜牛蒡子散等治之。

名家驗方選

【附子湯】千金 治濕痺緩風。身體疼痛。如欲折。

附子 白朮 人參 桂心 芍藥 茯苓 甘草

右藥水煎

【當歸拈痛湯】東垣 治溼熱爲病。肢節煩疼。手足脛腫疼痛不可忍。

當歸 澤瀉 白朮 葛根 人參 苦參 茵陳 甘草 防風 黃芩

猪苓 知母 蒼朮 升麻 羌活
【四物湯】局方 瘦人陰虛火旺，血不榮筋。

川芎 當歸 白芍 生地 牛膝 木瓜

【半夏茯苓湯】肥人風溼生痰。流注經絡。

半夏 茯苓 蒼朮 白朮 南星 香附 黃芩 陳皮 甘草 威靈仙

【活血通經湯】東垣 治風熱暴仆。筋搐急而拘攣。

當歸 葛根 桂枝 芍藥 升麻 人參 甘草 黃柏

【舒筋飲】治臂痛不能舉。氣血凝滯經絡。非風非濕。

莢朮 赤芍 當歸 海桐皮 白朮

羌活 甘草

加生薑煎。磨沉香屑沖。腰以上食後服。腰以下食前服。

【甘草乾薑茯苓白朮湯】金匱 腎著身重。腰冷如坐水中。

甘草 乾姜 白朮 茯苓

【續斷圓】本事 風濕四肢浮腫。手足無力。筋脈緩急。

續斷 附子 乳香 沒藥 當歸
防風 川芎 草薢 天麻

右爲末蜜丸。食前以酒送下。

【大防風湯】百一 治鶴膝痛風。

附子 甘草 白朮 牛膝 人參

川芎 防風 杜仲 熟地 黃芪

當歸 芍藥 羌活

加生姜大棗煎。

【牛膝木瓜湯】經驗良方 肝虛肩背連尻

。陰股膝髀等痛。

牛膝 天麻 杜仲 木瓜 甘草

枸杞 菟絲子 黃松節 芍藥

加薑棗煎。

【羌活勝濕湯】辨惑 脾胃受濕。身重脊痛。項強頭痛。

羌活 獨活 川芎 甘草 藁本

蔓荊子 防風

【生附除濕湯】直指 寒濕交阻。遍體冷痛。

附子 白朮 木瓜 蒼朮 厚朴

甘草

加姜煎

【羚羊角湯】得効 治筋痺。肢節束痛。

羚羊角 桂枝 附子 獨活 芍藥

防風 川芎

加姜煎。

【獨活寄生湯】千金 治冷痺緩弱。腰痛

攀脚。

獨活 寄生 杜仲 牛膝 細辛

秦艽 茯苓 桂心 防風 川芎

人參 甘草 當歸 芍藥 乾地黄

【指迷治痰茯苓元】百一 治臂痛不能舉手。或左右轉移。後人謂此臂痛。乃痰證也。用以治痰。無不效者。

茯苓 枳殼 半夏 朴硝

【補髓丹】百一 補益真元。治臂痛、腰痛。

杜仲 鹿茸 補骨脂 沒藥。

【清濕湯】醫經 濕熱身重。腰背膞痛。

薏仁 黃芩 黃柏 甘草 防風

羌活 澤瀉 防己 赤芍

【丹溪方】治酒家濕熱痛風。

黃柏 蒼朮 陳皮 甘草 芍藥

威靈仙 羌活

【中行圓】楊氏風濕客于經絡。流注作痛。

芍藥 甘草 犀角 威靈仙

以上主治痛風方。

【桂枝芍藥知母湯】金匱治肢節疼痛。

身體尪羸。脚腫如脫。頭眩短氣。温温欲吐。

桂枝 芍藥 甘草 生薑 防風

麻黃 附子 白朮 知母

【防已湯】千金治歷節痛風。四肢疼痛

防已 白朮 生薑 烏頭 桂心

茯苓 甘草 人參

【加味四物湯】正傳治白虎歷節痛風。

當歸 川芎 熟地 芍藥 桃仁

牛膝 黃柏 龍胆膝

【烏頭湯】金匱治歷節疼痛。不可屈伸。

麻黃 芍藥 黃芪 烏頭 甘草

白蜜

【滲濕湯】三因坐臥濕地。或雨露所襲

身重厥弱。歷節疼痛。

蒼朮 白朮 乾薑 陳皮 茯苓

丁香 炙甘草

加姜棗煎。

【追命再造散】醫統 治歷節痛風。

錦紋大黃 生皂角刺

右爲末。臨寢用酒調下。

【赤芍藥散】聖惠 治歷節疼痛。四肢微

腫。

赤芍藥 川芎 防已 當歸 桂心

附子 草薢 桃仁 海桐皮

加生姜煎。

【牛蒡子散】本事 治風熱歷節痛風者。

此湯主之。

牛蒡子 羌活 豆豉 生地 黃芪

【大羌活湯】潔古 風濕相搏。肢節疼痛
此湯主之。

羌活 獨活 防風 細辛 防已

黃芩 黃連 蒼朮 白朮 甘草

知母 川芎 生地

以上主治歷節痛風

麻瘋

證解 據調查家統計。全世界患麻

瘋者至少二百萬人。而吾國足佔半數

。每一千六百人中有中國患麻瘋者一

人。何以此症在中國如此之多。民智

未開。不講衛生。政治不良。地方腐

敗。此爲重大之原因也。孫真人謂大瘋有七十二種。其結果禍患皆甚酷毒。今之麻瘋。肉中結核。臉紅耳腫。口眼喎斜。至病深時。壞形變貌。鼻塌肉崩。手足脫落。足底爛穿。或手拳脚吊之證。所謂大風也。西醫分爲結節性麻瘋。神經性麻瘋。混合式麻瘋等。

治以大楓子油樟腦油及雷鎖辛所調合爲注射。古者亦謂之癘風。盛行于廣東東南天氣炎暖。地氣卑溼。溼熱鬱蒸。易罹此病。瘋瘋之可畏。人人皆知。故不多述。欲防傳染。以隔離病

人爲唯一妙法。患麻瘋者。當屏絕房事。不絕慾則必不能愈。卽愈之後。不守禁忘。必然復發。

心臟受病。面色紫塊者。梔仁主之。重則徧身生瘡。上損睛目者。黃連主之。

肺臟受病。眉落先脫。音破鼻塞者。梔仁桑皮主之。重則鼻梁塌。音啞語變。或生瘰肉。黃芩杏仁主之。

脾臟受病。徧體如癬。苦參桑皮主之。重則語變聲散。四肢浮腫者。以甘草補之。蒼朮燥之。

肝經受病。眉睫先落。皮膚搔痒。面

發紫泡。荊芥川芎主之。若手足拘攣者。乳香沒藥主之。鈎藤天麻佐之。腎臟受病。耳鳴啾啾。枸杞首烏主之。重則足底先穿。黃柏元參主之。

名家驗方選

【舒筋蒺藜散】蒺藜丸 準繩大癩瘋。唇翻齒露。手足指脫。鼻梁崩塌。損形變容。病深以蒺藜散毒藥治之。拔髮瘋。眉髮脫落。然後疾出。手足麻痺。肌膚結核。先穿脚心。手拳足弔以蒺藜散治之。癩癬瘋。遍身癩癬搔痒。久則拘攣麻

木。眉鬚脫落。蒺藜散主之。

雞爪瘋。病久血脈運行不利。十指拳曲狀如雞爪。蒺藜散主之。

白砒霜 黑鉛 麝香 蒺藜 蜈蚣

地龍土狗子 番木鱉

右藥研末。

侵寒瘋。體弱受濕氣所侵。初不以爲意。肌肉麻痺。四肢拘攣。蒺藜散主之。蒺藜丸亦主之。

癩皮瘋。耳臉有密疹如癩。搔之落屑。手足破爛。眉髮稀少。身體日見瘦弱。蒺藜丸散主之。

牛皮瘋。皮破搔之如竹殼。皮膚不知

痛痒。色如牛皮狀。蒺藜散及丸主之。

蛇皮瘋。皮膚如蛇鱗。色紅兼黑。體羸手足麻木。或誤食毒蛇。蒺藜散及丸主之。

脾毒瘋。脾臟受病。四肢焦枯。身體瘦削麻木。遍身紅癬。蒺藜散及丸主之。

瘦毒瘋。一名珍珠瘋。面如油光。疹癩如珠。肌膚麻木蒺藜散及丸主之。輭脚瘋。溼熱下注。足痿難以步履。鍼刺不知疼痛。宜蒺藜丸主之。

白蒺藜 秦艽 茯苓 羌活 苦參

黃芩 細辛 枳殼

研末烏蛇肉爲丸。

【醉仙散】寶鑑

白癩瘋。遍體白點。狀如汗斑。白可轉紅。亦有痺肉非溼氣卽輕粉毒也。外當擦洗內服醉仙散爲主。

白癩瘋。毛髮俱白。臉如扑粉。蔓延遍身。手足痿躄。宜此散主之。

乾瘋。身有枯皮。手足焦枯。肌肉麻痺。宜此散。

豬頭瘋。臉紅磊磊紅團。結核在肌膚中。鼻塞音啞。發之甚凶。治之尙易。宜醉仙散主之。

牛蹄瘋。風病多年。十脂脫落。狀如牛蹄。不治。初起病淺者。宜此散主之。

胎毒瘋。父精母血。遺毒子女。此湯主之。

心毒瘋。心臟受病。面多紫色結核者。宜此散主之。

腎毒瘋。腎臟受病。脚底先脫。骨節疼痛。房勞太過。或得病後不禁房事。宜此散主之。

疹毒瘋。痘疹除毒流于肌肉。或臥濕浴冷。宜此散主之。

流毒瘋。因由染病。曾服輕粉屢發瘡

。而爲麻木。肌膚結核或爛或破。眉髮少。宜小神丸。或醉仙散治之。破傷瘋。打跌損傷。致風寒暑濕。流于經絡。久久成痺。麻木。或結核在膚中。宜醉仙散主之。

胡麻 蔓荊子 枸杞 苦參 牛蒡子 白蒺藜 花粉 防風 輕粉

一方多乳香、沒藥、麝香、全蠍、蛤粉、藿香、大楓子、

【搜風散】面游瘋。臉如蟲行。身如虱咬。漸漸麻木。肌膚結核。大麻瘋濕根也。宜此散治之。

白附子 白蒺藜 川烏 草烏 全

蠟 甘草 豬牙皂角 白頭翁 欒
斛

【八寶丹】侵熱瘋。遍體蒸熱。臉有結核紅塊。宜八寶丹。

金錢瘋。結核如錢。色黃麻木。婦人多有此證。因月事阻滯所致宜此丹。銀錢瘋。結核塊如錢大。色白如銀。隱隱于面部。或肌膚。宜此丹。淫毒瘋。夫婦交媾傳染。體多痛痒。臉如蟲行作熱。宜此丹。

血熱瘋。溼熱相搏。氣血凝滯。流注皮膚。結毒生瘡。宜八寶丹治之。犀角 阿膠 生地 川芎 羚羊

京墨 當歸 白芍 威靈仙
【蒺藜苦參丸】暗滯瘋。手足麻痺。遍身結核。皮痒眉稀。初起不以爲意。宜此丸。

肺毒瘋。大腸燥結。面如酒醉。眉毛先脫。四肢浮腫。宜此丸。

隱瘋。初起不覺。勞則紅光。耳臉常熱。面膚似蟲行。隱隱發出卽爛。宜此丸。

紫癩瘋。皮膚油亮。肉中有塊。穿爛成瘡。麻痺眉髮先脫。宜此丸。

紫癩瘋。耳臉紅光雲斑。或起紫塊紅塊。內紅外白。時起時落。或出風珠

或風團。宜此丸。

暑溼瘋。四肢麻木。遍體瘡癩。疥癬狀。皮中似蟲行。落白屑。此大麻瘋之根也。宜此丸主之。

蒺藜 羌活 蟬蛻 當歸 全蠍

川芎 荆芥穗 防風 麻仁 苦參

大楓子肉

蟲病

證解 虻蟲寄宿於人類腸管中。其狀二端細而中央粗大，長約二三寸乃至七八寸不等。小兒往往有之。在腸中引起腹痛下痢。在胃中則多嘔吐者。

。沈金鰲謂蟲病由脾胃濕熱積滯。或內傷瘀血而成。蓋人之腹中雖長虻寸白。皆賴以消宿食。然太多即爲病。沈氏所說蓋本千金方。雖長虻寸白。實非盡人皆有之。虻蟲屬腸中寄生蟲。皆由不潔之食物而生。非賴以消宿食之天然應有品。西醫謂盲腸中有一種微菌。能助消化。是則天然應有品。然其盲腸應有之微菌非顯微鏡不能見也。患蟲證者。必眼眶鼻下色青，面色萎黃。身體羸瘠。腹痛反能食。時發潮熱。如胸中煩而吐虻。久瀉痢痢不止者。以烏梅丸治之。體壯者。

以追蟲丸下之。體虛者。以化蟲丸治之。使蛭蟲排出於體外。則各證自愈矣。

名家驗方選

【烏梅丸】金匱 治蛭厥者。其人當吐蛭。今病者靜而復煩。此爲臟寒。蛭上入膈故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。蛭聞食臭出。其人當吐蛭。蛭厥者。此丸主之。

烏梅 黃連 黃蘗 乾薑 附子

蜀椒 桂枝 細辛 人參 當歸

【甘草粉蜜湯】金匱 治蛭蟲病。令人吐

涎。心痛。發作有時。毒藥不止。主之。

甘草 白粉 白蜜

【追蟲丸】準繩 下一切蟲積。

黑牽牛頭末 茵陳 檳榔 雷丸

木香 皂角 棟皮

【追蟲取積丸】尊生 取一切蟲積。

蕪荑 雷丸 錫灰 使君子 檳榔

牽牛子頭末 大黃 鶴蟲 木香

研末蜜丸

【化蟲丸】局方 治諸蟲積。肚腹常熱。

嘔吐清涎。

鶴蟲 檳榔 苦楝根皮 胡粉

枯礬 一方有蕪荑使君子

【化蟲飲】準繩 治蟲擾腹痛。

檳榔 酸石榴皮 紅丹 雷丸 貫

衆使君子肉 甘草 枳殼

大黃

【使君子丸】準繩 治腹肉蟲痛。口吐清

水。

使君子 檳榔 酸石榴皮 大黃

沙糖水煎麵和丸

【胡粉丸】外臺 療心痛不可忍。似蚘蟲

者。

生胡麻 胡粉

服後若吐涎。卽是蚘蟲也。

【安蟲飲】幼科百効 治蚘蟲病。口吐清涎。

使君子 苦楝子 枳實 烏梅

山查 芍藥 黃連 乾薑 厚朴

陳皮 水煎

【安蟲散】直訣 治蟲動心痛者。

川棟子 檳榔 胡粉 枯礬 鶴虱

研末痛時米湯下

【集効圓】局方 治蛔蟲動作。心腹攪痛

。往來上下。嘔吐涎沫。

蕪荑 木香 鶴虱 檳榔 訶梨勒

附子 乾薑 大黃

【木香檳榔圓】直指 殺諸蛔蟲。

木香 檳榔 鶴蟲 貫衆 錫灰

乾漆 使君子肉 輕粉 雷丸

巴豆

【理中安虬散】蘊妥 治吐虬。

人參 白朮 茯苓 乾薑 烏梅

【椒梅湯】回春 治腹痛時止時發。面白

脣紅者。蟲痛也。

烏梅 花椒 檳榔 枳實 木香

香附 砂仁 肉桂 厚朴 乾薑

甘草 練子 加薑煎

【掃蟲煎】景岳 治諸蟲上攻。胸腹作痛

。青皮 小茴香 吳茱萸 檳榔

烏梅 樵肉 烏藥 甘草 硃砂

雄黃

三消 體雜

證解 上中下三消之證。是燥病也

多飲而渴不止。屬之肺燥。為上消。

善飢能食而瘠。屬之胃燥。為中消。

飲一溲一。渾濁如膏。今謂溲尿。屬

之腎虛。為下消。三陽結謂之消。醫

宗金鑑。以人參白虎湯主治上消。調

胃承氣湯主治中消。六味地黃丸主治

下消。金匱以腎氣丸主治飲一斗。溲

一斗。腎虛之下消也。趙獻可言三消

之證。由煎熬既久。臟腑燥裂。能食者。多發胸疽背癰。若三消得愈。防發癰。須服忍冬丸。黃芪六一湯之類。饋雜之爲病。乃脾虛胃燥病也。景岳云。腹中空空。似飢非飢。似辣非辣。似痛非痛。而胸膈懊膿。莫可言狀。或得食而暫止。或食已而復飢。或兼惡心而漸見脘痛。皆是饋雜之證也。宜金匱麥門冬湯加白芍藥。補脾陰滋胃液。以濡潤之品爲主治饋雜也。俗諺謂云心饋者非也。須知心但有煩而無饋。胃但有饋而無煩也。

名家驗方選

【白虎加人參湯】仲景 脈證並治

見傷寒門
第88方首

知母 石膏 灸甘草 粳米 人參

【調胃承氣湯】仲景 脈證並治

見傷寒門
第111方首

大黃 灸甘草 芒硝

【六味地黃丸】錢乙 治腎水不足。虛火炎上等證。

熟地 山茱萸 山藥 牡丹皮

茯苓 澤瀉

研未蜜丸。空腹前。淡鹽湯下。

【腎氣丸】金匱 腎中真陽虛。飲一斗。溲一斗。宜此丸主之。

熟地 萸肉 山藥 茯苓 澤瀉

牡丹皮 牛膝 車前

【參苓白朮散】局方 治脾胃虛弱。胸中痞滿。噫嘔腹逆。喘嗽消渴。癰疽潰後不思飲食者。

人參 茯苓 白朮 山藥 蓮肉

白扁豆 桔梗 砂仁 薏仁

炙甘草 研爲細末

一方有陳皮、神麴、無桔梗、一方多

陳皮

【黃耆六一湯】局方 治諸虛不足。肢體勞倦。胸中煩悸。時常焦渴。或衄虛自汗。常服平補氣血。安補五臟。可免癰疽。

炙黃芪六兩 甘草一兩

(一方加白朮白芍)

加大棗、加人參尤妙。

【忍冬丸】集驗 止渴、消毒、治渴疾愈後預防發癰疽。

忍冬不拘多少。(根莖花葉俱可)放於瓶中。傾入無灰酒浸之。

糖火煨一宿。取出晒乾。加甘草少許

。共研末。即以所浸酒煎糊丸。

【文蛤散】金匱 渴欲飲水不止者。主之。

文蛤

杵爲末

【茯苓湯】千金 洩熱止渴。治胃腑實熱。

。引飲常渴者。

茯苓 括蕤根 生麥冬 萎蕤 知母

生地 小麥 大棗 竹葉

渴卽服之

【神效散】本事 治渴疾飲水不止

白浮石 蛤粉 蟬脫

研末用鯽魚胆調服

【麥門冬湯】金匱 補脾陰大生津液。所

謂濡潤胃燥。

麥門冬 半夏 人參 甘草 粳米

大棗

【括蕤瞿麥丸】金匱 治小便不利者。有

水氣其人若渴者。宜之。

薯蕷 茯苓 括蕤根 炮附子

瞿麥 蜜丸

【五苓散】金匱 脈浮。小便不利。微熱

消渴。主之。

茯苓 澤瀉 白朮 豬苓 桂枝

【括蕤散】千金 治消渴。

括蕤根 麥冬 鉛丹 茯苓 甘草

【黃連散】聖惠 治消渴。口舌乾燥。

黃連 葛根 麥冬 枇杷葉

加生薑、竹葉煎

以上主治三消方

【清鬱二陳湯】回春 治酸水刺心。及吞酸嘈雜。

半夏 茯苓 陳皮 甘草 香附

黃連 梔子 蒼朮 川芎 枳實

神麴 芍藥

加生薑水煎

【加味小陷胸湯】大還 治火動其痰嘈雜

括蕒 枳實 半夏 黃連 梔子

【石膏丸】丹溪 治嘈雜噯氣

石膏 半夏 南星 香附 山梔

姜湯下

【和中湯】醫統 治脾胃虛弱嘈雜。

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏

陳皮 (方出脾胃門)

加黃連，大棗，粳米

【交泰丸】回春 治胸中悶痞嘈雜。大便稀則胸中頗快。大便堅則胸中痞悶難當。

枳實 白朮 黃連 吳萸 大黃

當歸

右爲末。姜汁打。神麴爲丸。

以上主治嘈雜方

肺癰 肺脹

證解

肺癰欬嗽喉燥。胸脅刺痛。

痰中腥臭。或帶膿血之證。多起于肺臟熱極而成者。治宜葦莖湯。金匱另立二方。謂平時嗜飲。濕痰漸漬于肺者。宜皂莢丸。肥人喘滿多痰者。宜葶藶大棗瀉肺湯。或已吐膿血者。必以去膿。補氣爲要。治宜排膿散。十六味桔梗湯之類。總之。無論已成未成。皆當清熱滌痰爲主。使無留壅。自然易愈矣。

肺脹者。沈氏尊生所謂肺家氣分病也

。觀仲景云。欬而上氣。喘而煩躁。此爲肺脹。欲作風水。發汗自愈。治以小青龍加石膏爲主。

名家驗方選

【桔梗湯】金匱 治肺癰。欬而胸滿。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。此湯主之。

桔梗 甘草

【葶藶大棗瀉肺湯】金匱 治肺癰喘不得臥者。主之。

葶藶 大棗

【桔梗白散】外臺 治欬而胸滿。咽乾不

渴。時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者。爲肺癰。

桔梗 貝母 巴豆

【葦莖湯】金匱 治欬有微熱煩滿。胸中

甲錯。是爲肺癰。

葦莖 薏苡仁 桃仁 瓜瓣

【皂莢丸】金匱 治欬逆上氣。時時吐濁

。但坐不得眠者。此丸主之。

皂莢 明礬 杏仁 炙草 白丑

百部 半夏 桑皮 紫苑 石菖蒲

胆星

金匱但用皂莢一味爲丸

【排膿散】得効 治肺癰。吐膿後。宜排

膿補肺。

生黃芪 白芷 五味子 人參

【肺傷湯】千金翼 治肺氣不足。欬唾膿

血。不得眠。

人參 阿膠 桂心 生姜 紫苑

乾地黃 桑白皮 飴糖

【玄參清肺飲】正宗 治肺癰咳吐膿痰。

胸膈脹滿。上氣喘急而發熱。

玄參 柴胡 陳皮 桔梗 茯苓

地骨皮 麥冬 甘草 薏仁 人參

檳榔

加姜煎

【四順散】正宗 治肺癰吐膿。心煩熱壅

悶。欬嗽氣急。

桔梗 甘草 貝母 杏仁 紫苑

【加味桔梗湯】心悟 治肺癰。

桔梗 甘草 貝母 苡仁 白朮

橘紅 葶藶 銀花

【五味子湯】千金 治唾中有膿血。率胸

脅痛。

五味子 桔梗 紫苑 甘草 續斷

竹茹 桑白皮 地黃 赤小豆

【越婢加半夏湯】金匱 治欬而上氣。此

為肺脹。其人喘。目如脫狀。

麻黃 石膏 甘草 生薑 大棗

半夏

【小青龍加石膏湯】金匱 治肺脹而上氣。煩躁而喘。心下有水氣者。

麻黃 芍藥 桂枝 細辛 乾姜

五味子 半夏 甘草 石膏

【十六味桔梗湯】濟生 專治肺癰。

桔梗 甘草 貝母 百合 地骨皮

黃芪 枳殼 當歸 杏仁 桑白皮

葶藶 薏仁 知母 防己 五味子

瓜蒌仁

肺痿

證解 肺痿之證。乃久咳虛而熱在上焦也。其證狀。必乍寒乍熱。自汗

氣逆煩悶。多唾稠粘。亦有帶線膿血者。治宜紫苑湯之類。仲景云。或有患比症吐涎沫而欬者。有吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便利數。所以然者。因上虛不能制下故也。此爲肺寒。必頭眩而多吐涎。治宜甘草乾姜湯。又有熱盛者。治宜人參平

肺散。有喘急而面浮者。治宜葶藶湯。總之。以養氣潤肺生津液清熱。如二地二冬之類。爲主治也。

【炙甘草湯】金匱 治肺痿涎唾多。虛勞不足。脈結代。心動悸。

炙甘草 桂枝 生薑 人參 阿膠

大棗 麻仁 生地 麥門冬

【甘草乾薑湯】金匱 治肺痿吐涎沫而不欬者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺中冷。必眩。多涎唾。以此方溫之。若服湯已渴者。屬消渴。

炙甘草 乾薑

【生薑甘草湯】千金 治肺痿咳嗽涎注不止。咽燥而渴。

生薑 人參 甘草 大棗

【桂枝去芍藥加皂莢湯】千金 治肺痿吐涎沫。

桂枝 生薑 甘草 大棗 皂莢

【劫勞散】良方 治勞嗽盜汗。睡中有紅線。名曰肺痿。

黃芪 人參 阿膠 甘草 芍藥

當歸 茯苓 五味子 半夏 熟地

加姜棗煎

【保和湯】心悟 治肺痿。

知母 貝母 天冬 麥冬 薏仁

五味子 桔梗 甘草 馬兜鈴

百合 阿膠 薄荷

加飴糖煎。虛甚加人參。

【秦朮扶羸湯】楊氏 治肺痿骨蒸。勞嗽

寒熱。聲啞形羸自汗。

秦朮 地骨皮 鼈甲 人參 柴胡

半夏 紫苑 甘草 當歸

加姜棗、烏梅水煎

【人參養榮湯】聖濟 治肺痿欬嗽有痰。

午後熱聲嘶。

柴胡 桑白皮 阿膠 人參 桔梗

貝母 杏仁 枳實 茯苓 五味子

姜棗煎

【紫苑散】張氏醫通 治咳唾有血。虛勞

肺痿。

紫苑 麥門冬 人參 桔梗 茯苓

阿膠 貝母 炙甘草 五味子

右爲散

【知母茯苓湯】聖濟 肺痿喘咳。寒熱往

來有汗。

知母 茯苓 白朮 人參 甘草

阿膠 麥冬 半夏 川芎 柴胡

桔梗 薄荷 款冬 五味子

生姜煎

胃癰

證解

觀內經診胃癰者。當候胃脈

。其脈沈細者。胃氣逆也。人迎脈甚盛。盛則爲熱。人迎卽胃脈。逆而盛則熱聚於胃口而不行。故胃脘成癰。聖濟總錄云。令人寒熱如瘧。肌膚甲錯。或效嗽。或嘔吐膿血。若脈洪數

。膿已成也。急用排膿之劑，脈遲緊屬瘀血也。急當議下。否則毒氣內攻。腸胃並腐。其害非淺。仲景云。嘔家有癰膿者。不可治嘔。膿盡自愈。此不言癰之所在。然嘔膿而不效。可以測知其非肺癰而爲胃脘癰也。若膿過中能而在膈之下。則膿當從大便而出者。宜排膿湯。大黃牡丹湯之類。若膿從上而嘔吐者。宜排膿散。射干湯。犀角地黃湯之類治之。

【大黃牡丹湯】金匱治腫癰。其脈遲緊者。膿未成可下之宜此湯。

大黃 牡丹皮 桃仁 冬瓜仁

芒硝

【排膿湯】金匱 治癰之脈洪數。膿已成。宜此湯。

甘草 桔梗 生姜 大棗

【排膿散】金匱 胃脘癰之膿已成。不可下者。宜此散主之。

枳實 芍藥 桔梗

為散雞子黃調

【射干湯】聖濟 治癰疽發背。諸瘡腫痛。

。脈洪實數者。

射干 犀角 升麻 玄參 黃芩

麥門冬 大黃 山梔

加竹葉、芒硝煎。

【犀角湯】聖濟 治胃脘癰。脈沈細者。宜此湯。

犀角 芍藥 黃芩 梔子 大黃
茯苓 射干

鼻衄 齒衄 牙癰

牙痛

證解 鼻衄者。鼻膜破裂而出血也。

。或身體毫無病症之時。突然有之。又有婦人倒經而成鼻衄者。齒衄者。血從牙齦中出是也。牙癰者。齒齦腫是也。往往口臭而齒不動搖。乃其人嗜好飲酒。或喜啖炙博之物。遂生

胃熱。宜清胃散。甘露飲之類。鼻膜
牙齦處皮膚甚薄。偶有局部充血之際
。容易破裂而出血。其他如骨槽風等
證。亦屬胃熱。蘊於牙床也。

名家驗方選

【犀角地黄湯】千金 治吐血衄血、溺血
、婦人倒經、血崩等證，

犀角屑 牡丹皮 生地黃 芍藥

【瀉心湯】金匱 治衄血吐血。

大黃 黃連 黃芩

【止衄散】得效 治久衄發熱。

黃芪 當歸 赤茯苓 白芍藥

乾地黃 阿膠

研爲細末

【牡蠣散】聖濟 治鼻衄口衄

牡蠣 石膏

【涼榮湯】百代 治吐血衄血

知母 黃柏 芍藥 麥冬 蒲黃

甘草 生地 當歸 側柏炭

【蘇東坡方】回春 治齒齦出血。

人參 茯苓 麥門冬

【陶氏生地芩連湯】醫療方 治吐血、鼻

衄。去血失神。

犀角 生地 芍藥 甘草 黃芩

黃連 梔子 川芎 柴胡 桔梗

【人參飲子】試効 治衄血吐血等

人參 黃芪 甘草 當歸 芍藥

五味子 麥門冬

【龍骨散】聖惠 鼻衄不止。眩冒欲死者

。吹之。

龍骨 亂髮

研粉吹鼻中可以立止

【清胃湯】金鑑 治胃火上炎。牙縫出血

石膏 牡丹皮 黃芩 生地 黃連

升麻

以上主治鼻衄齒衄方

【甘露飲】局方 治胃熱。齦腫出膿。

鮮枇杷葉 刷去毛 熟地黃 枳殼

天門冬 茵陳 生地 麥冬 石斛

炙甘草 黃芩

【清胃敗毒散】尊生 治胃熱

赤芍 當歸尾 甘草 黃芩 連翹

天花粉 荊芥 大黃 銀花

【清胃散】東垣 唇口腫痛。齒齦潰爛。

痛引頭腦。吐舌流涎。

升麻 生地 當歸 川連 牡丹皮

(一方有甘草)

【清胃散】金鑑 治骨槽風。牙腫疼。

薑黃 白芷 細辛 川芎

研末先以鹽湯漱口後此散擦牙痛處

【清陽散火湯】正宗 治牙齦結腫。連及耳項作痛。名爲骨槽風。

升麻 白芷 黃芩 連翹 石膏
防風 當歸 荆芥 蒺藜 甘草
蔓荊子

【中和湯】金鑑 治骨槽風。日久不消。欲潰膿。疼痛者。

白芷 桔梗 人參 黃芪 甘草
白朮 土炒 川芎 當歸 白芍
藿香 肉桂 麥冬

加生姜大棗煎

【神功丸】東垣 治口臭不可近。牙齦肉將脫。而出血不止。

當歸 佩蘭葉 藿香 木香 升麻

生地 甘草 黃連 砂仁

【玉池散】局方 治牙疼牙齦潰爛。

當歸 防風 白芷 槐花 川芎
甘草 細辛 升麻 地骨皮 蘘本
加黑豆、生姜、

以上主治牙癰方

【四種牙痛方】本草彙言

黃連 連翹 防風 荆芥 白芷

蔓荊子 川椒 細辛 吳萸

【瀉胃湯】回春 治齒痛如神

當歸 川芎 芍藥 生地 牡丹皮
黃連 梔子 防風 荆芥 薄荷

甘草

【如神散】局 治牙蛀疼痛。晝夜不止。

川椒 露蜂房

右二味水煎。入鹽少許。乘熱含之。

冷即吐出

【定痛散】上池祕錄 治風冷牙痛

川烏 細辛 乳香 白芷

右爲末。每用少許。擦牙痛處。使涎吐之。

【赴涎散】上池祕錄 治風寒牙痛。及蟲

蛀牙疼。不可忍者。

良薑 草烏頭 細辛 荊芥

右爲末。每用少許。擦牙痛處。

以上主治牙痛方

便血 腸風 腸癰

臟毒 痔疾

證解

景岳云。大便下血。多由腸

胃之火。蓋大腸之上口是小腸。小腸之上口是胃。其先見血而後便者屬近血。或在直腸。或在大腸。其先見便而後血者。屬遠血。或在小腸。或在胃。觀金匱治先便後血者。用黃土湯。治先血後便者。用赤小豆當歸湯。又腸風下血。治以槐花甚驗。

腸癰。瘀血留積于大腸。丹溪謂大腸有積熱。血流注于大腸而爲腸癰。治宜大黃牡丹湯之類。

臟毒之證。起於腸熱。其人喜食辛燥。煎煇之物而成患。在肛門之內。往往潰爛。治法與腸癰同。或宜大黃黃連解毒湯之類。

痔漏在肛門者。曰外痔。在直腸者。曰內痔。皆因濕熱下注于大腸。作痛而下膿血。亦謂腸風之屬也。法宜臟連丸。四苓湯之類。

名家驗方選

【黃土湯】金匱 治先便後血。婦人血崩等。

竈中黃土 炙甘草 乾地黃 白朮

炮附子 阿膠 黃芩

（一方無附子、乾地黃。有乾姜

【黃芩散】聖惠 治大腸積熱。下血不止。日夜無度。

黃芩 黃柏 黃連 地榆 生地

犀角 加竹茹煎

【赤小豆當歸散】金匱 治狐惑及便血。

赤小豆 當歸

【平胃地榆湯】寶鑑 治便血

地榆 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草

升麻 黑炮附子 白朮 赤茯苓

乾薑 葛根 當歸 神麴 白芍藥

益智仁 人參

加姜棗煎

【枳朮丸】潔古 消食。強胃。治胃虛濕熱。脾虛不健運。氣滯痰聚。心下痞悶。或臟腑羸弱。及便血。

枳實炒 白朮土炒 研末飯丸

以上主治便血方

【清臟湯】尊生 治腸風便血

生地 當歸 地榆 黃芩 黃柏

梔子 白芍藥 黃連 阿膠

側柏葉 槐角 川芎

【地榆散】直指 治腸風熱證下血。

地榆 黃連 茜根 黃芩 茯苓

梔子

加薤白煎。

【升陽除濕防風湯】東垣 治殮泄、滯下、腸風、便血。或大便閉塞。或裏急後重。或下白膿。或下血。

防風 蒼朮 白朮土炒 白茯苓

白芍藥炒 (一方加生姜一片)

以上主治腸風

【薏苡附子敗散】金匱 治腸癰之爲病。

其身甲錯腹皮急。按之濡。如腫狀。

腹無積聚。身無熱。脈數。此爲腸內

有膿。此散主之。

薏苡仁 附子 敗醬

【大黃牡丹湯】金匱 治腫癰者。少腹腫痞。按之即痛如淋。小便自調。時時發熱。自汗出。復惡寒。其脈遲緊者。膿未成。可下之。脈洪數者。膿已成。不可下也。此湯主之。

大黃 牡丹 桃仁 芒硝 冬瓜仁

【四聖散】直指 治腸癰

生瓜萐 甘草 沒藥 乳香

酒煎服

【腸癰湯】千金 治腸癰

薏苡仁 牡丹皮 桃仁 瓜萐仁

【排膿散】正宗 治腸癰。小腹脹痛。

生黃芪 當歸 白芷 川芎 防風

銀花 穿山甲 瓜萐仁

【七賢散】正宗 治腸癰潰後疼痛

茯苓 山藥 山茱萸 牡丹皮

熟地 人參 生黃芪

加姜棗煎

【黃連丹】張渙方 治血乘血分。滲入腸胃。

黃連 當歸 白頭翁 蔓青根

木香 川棟子

右爲末粳米飯和丸

【神仙蠟礬丸】準繩 治腸癰

黃蠟 白礬

右熔化黃蠟。和礬爲丸

以上主治腸癰方

【會膿散】廣筆記 治腹中腫毒

穿山甲 白姜蠶 乳香 白芷

大黃 沒藥 五靈脂

【阿膠丸】醫林 治便血。先便而後血。

謂之濕毒

阿膠 茯苓 黃連 白芍藥

【芍藥柏皮丸】醫林 治先血而後便。爲

之臟毒。

白芍 黃蘗 當歸

【內托黃芪湯】正宗 治癰毒已成。作膿

當托毒。

黃芪 白朮 陳皮 川芎 當歸

白芍 山甲 皂角針 檳榔

【槐花散】本事 治腸風臟毒。

槐花 柏葉 荆芥穗 枳殼

以上主治臟毒方

【秦艽防風湯】醫道綱目 痔漏。每日大

便時疼痛者。宜此湯

秦艽 防風 當歸 甘草 大黃

黃柏 澤瀉 紅花 陳皮 升麻

桃仁 柴胡

【治痔疾方】藥寶明集

紅花 萹薢 桔梗 甘草 白芷

【加味四物湯】醫方大成 內傷痔漏下血者。主之

當歸 芍藥 川芎 地黃 黃柏
黃芩 槐花

【當歸連翹湯】醫療方 治痔漏

當歸 連翹 防風 黃芩 荊芥
白芷 芍藥 生地 山梔 大黃
人參 阿膠 地榆 烏梅 甘草

【參芪湯】醫療綱目 治肛門翻出

人參 當歸 生芪 白朮 芍藥
生地 茯苓 升麻 桔梗 陳皮
甘草

加生姜大棗煎

【黃連閉管丸】張氏醫通 治痔漏成管。

胡黃連 穿山甲 石決明 槐花
研末密丸

【清臟補漏丸】瘍醫 治痔漏

穿山甲 槐花 明礬
研末黃蠟爲丸

【臍連丸】儒門事親 治腸風臍毒痔漏。

黃連 槐花 枳殼 防風 甘草
槐角子 香附 木香 豬牙皂角
右藥用陳倉米皆爲末。入豬大腸蒸杵丸

【痔疾傳藥方】名家方

蚯蚓油 杉脂油 蝸牛油 琥珀油
右油調和傳患處

【乾葛湯】直指 治酒痔。

白乾葛 枳殼 半夏 茯苓

生地黃 杏仁 黃芩 甘草

加黑豆、薑、白梅、水煎。

【橘皮湯】直指 治氣痔。

橘皮 枳殼 川芎 槐花 檳榔

木香 桃仁 紫蘇 香附 甘草

加姜棗煎

【丹溪蓮花蕊散】醫綱 二三十年痔疾不

愈者。

蓮花蕊 黑牽牛頭末 當歸 礬紅

【小品生地湯湯】醫心方 治小便血。

生地 柏葉 黃芩 阿膠 甘草

【古今錄驗鹿茸散】外臺 療尿血。

鹿茸 當歸 乾地黃 蔡子 蒲黃

【桃仁湯】溫疫 治邪干下焦血分。溺血

畜血。

桃仁 阿膠 丹皮 當歸 赤芍

滑石

以上主治痔疾方

脫肛

證解 脫肛者。氣虛下陷而肛門翻

出也。凡產婦及患痢。用力過甚。或

小兒氣血未充。老人氣血已衰者。皆易罹脫肛。經云。虛者補之。陷者舉之。滑者瀉之。此皆治脫肛之不二法門。例如氣虛下陷。用補中益氣湯。氣虛不能收攝。用養臟湯等治之。或以五倍子研末敷之。托而上之至收爲度。或煎湯洗之亦驗也。

【補中益氣湯】東垣 治氣虛。勞傷。遺泄脫肛。一切中氣不足之證。

黃芪 人參 甘草 當歸 橘皮
升麻 柴胡 白朮

加生薑、大棗煎。

【養臟湯】局方 治泄痢膿血。有如魚腦

。後重脫肛。臍腹疔痛。

人參 白朮 肉桂 訶子肉 木香
肉荳蔻 罌粟殼

【參朮實脾湯】統旨 治脾氣虛而脫肛。

人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮
草菓 附子

【龍骨散】準繩 治大腸虛。而肛門脫出。卽滑者瀉之也。

龍骨 訶子肉 赤石脂 沒石子
粟殼

米湯下

【訶子人參湯】準繩 治氣虛而脫肛

人參 白朮 茯苓 炙甘草

訶子肉 升麻 蓮肉 柴胡
【參朮芎歸湯】六要 治瀉痢之後。及產後。一切氣虛脫肛。

黃芪 人參 炙甘草 當歸 橘皮
升麻 白朮 白芍 川芎 白茯苓
加生姜、大棗煎。

【涼血清腸散】統旨 治大腸熱甚脫肛。

生地 當歸 芍藥 防風 升麻
荊芥 黃芩 黃連 香附 川芎
甘草

【堤肛散】正宗 治氣虛肛門下墜。及脫肛便血。脾胃虛弱等症。

川芎 歸身 白朮 人參 黃芪

陳皮 甘草 升麻 柴胡 條苓
黃連 白芷

遺精

證解 遺精之爲病。乃心腎病也。夢與女交爲夢遺。無夢而遺爲遺精。古人以有夢爲心病。無夢爲腎病。夫精之藏制雖在腎。而精之主宰則在心。蓋心藏神。心虛則不能藏。故心神動於上。則腎精洩於下。大抵有夢而遺者輕。無夢而遺者重。治法安神定心爲要藥。宜茯神湯之類。又有縱慾無度。斲傷太過。以致滑精不禁者。

沙法當固攝之。宜正元散。加牡蠣、菴蓉。或佐以鹿茸丸之類。又有溼熱爲小腸膀胱病而遺者。宜蒼白二陳湯加黃柏之類。葉氏謂遺滑之證。補瀆無效者。大都由脾胃溼熱所乘。擾動精府而遺滑也。

【茯神湯】千金 治心虛神不甯。思欲太熾。夢遺心悸等證。

茯神 遠志 石菖蒲 人參

酸棗仁 白茯苓 黃連 生地

當歸 甘草 蓮子

【正元散】千金 治下元氣虛。心脅刺痛。泄利嘔吐。自汗肢厥。一切虛寒。

常服助陽。消陰。正元氣。溫脾胃。

紅豆 乾薑 陳皮 人參 白朮
炙甘草 茯苓 肉桂 川烏 附子
山藥 川芎 烏藥 乾葛 黃芪
(即正元丹)

加姜棗

【鹿茸丸】濟生 治腎臟真陽久虛。下體痿弱。

鹿茸 牛膝 五味子 石斛 巴戟
附子 川棟肉 山藥 肉桂 杜仲
澤瀉 沉香

(一方多白棘、菟絲子、磁石、陽起石。)

【金鎖固精丸】功用 治真元虧損。心腎不交。夢遺滑精。盜汗虛煩。腰痛耳鳴。四肢無力。

沙苑蒺藜 芡實 蓮鬚 龍骨

牡蠣 (一方無蓮鬚)

蓮肉爲丸

【三才封髓丹】寶鑑 滋陰。降心火。益腎水。治虛火上炎。夢遺失精。

天門冬 熟地 人參 砂仁 黃柏

炙甘草

研末麵糊丸

【桑螵蛸圓】得效 治下焦虛冷。精滑不固。

附子 五味子 龍骨 桑螵蛸 糯米糊丸

【黃連清心飲】入門 治心有所慕。而遺精者。

黃連 生地 川棟 遠志 茯神 當歸 人參 酸棗 甘草 蓮肉

【桂枝龍骨牡蠣湯】金匱 治失精家。少腹弦急。陰頭寒。目眩。髮落。脈極虛芤遲。爲清穀亡血失精。脈芤動微緊。男子失精。女子夢交。此湯主之。

桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗 龍骨 牡蠣

【大鳳髓丹】元戎 治心火旺。腎水真陰虛損。心動于上。腎泄于下。此方固真元。降心火。益腎水。皆效。

黃柏 縮砂 甘草 半夏 豬苓
茯苓 紅蓮心鬚 益智仁

陽痿

證解 陽痿者。其生殖器官不能舉。

雖具春情而下體依然萎縮。即新婚合卺之夜。生殖器官亦不能勃起。或雖勃起而交媾未遂。已射精而萎縮之謂也。凡縱慾無度。致斲傷太過。或誤犯手淫極甚之人。往往成陽痿之證。景

岳謂陽痿不起。由命門火衰。宜右歸丸。氣血虛弱。宜左歸丸之類。或因思慮驚恐。致脾腎虛而陽痿者。宜黑歸脾丸。或因抑鬱傷肝。肝失條達而陽痿者。宜逍遙散之類治之。則痿自起也。

【右歸丸】景岳 治命門火衰。脾胃虛寒。便溏泄瀉。陽衰無子陽痿等證。

大熟地 上肉桂 製附子 山萸
懷山藥 杜仲 枸杞子 菟絲子
鹿角膠 全當歸

（一方無附子、山萸、有棗皮、一方多茯苓、補骨脂、

共研細末。煉蜜和丸

【還少丹】楊氏 大補心腎脾胃四經虛損。治精血不足。精髓不固。飲食不進。發熱盜汗。牙齒浮痛。神衰力弱。腰痠體倦。陽痿等症。久服輕身還童。陽自舉。婦人服之。澤容顏。煖子宮。去一切病。

山藥 牛膝 茯苓 山萸 楮實

杜仲 五味子 巴戟 菴蓉 遠志

小茴香 石菖蒲 熟地 枸杞

右藥研末。以白蜜同棗肉爲丸。

【左歸丸】景岳 治腎水不足。營衛失養。或虛熱往來。自汗盜汗。或神不守

舍。血不歸原。或昏暈。目眩。耳聾。口燥舌乾。腰痠腿軟一切精髓內虧。津液枯竭陽痿等證。

熟地 山萸 枸杞子 鹿角膠

菟絲子 山藥 龜版膠 牛膝

茯苓 一方無枸杞鹿角膠茯苓

共研末。煉蜜和丸。淡鹽湯吞下。

【黑歸脾丸】即歸脾丸加熟地也 治思慮驚恐。致脾腎虛而陽痿者。宜此丸。

當歸 人參 茯苓 黃芪 白朮

龍眼肉 酸棗仁 木香 炙甘草

遠志 熟地

加生薑、大棗、爲丸

【逍遙散】局方 治憂愁抑鬱傷肝。肝失條達。而陽痿者。宜比散。

柴胡 白朮 茯苓 炙甘草 當歸

白芍 陳皮 生姜 薄荷

(一方無陳皮)

【全鹿丸】景岳 補腎填精。益氣培元。治五勞七傷。諸虛百損。精神衰憊。髓質虛弱。脊軟腰痠。精寒陽痿。久服和顏悅色。壯陽種子。返老還童。延年益壽。功效不能盡述也。

活大鹿 去皮連肚洗淨 熟地 黃芪

人參 當歸 生地 牛膝 天門冬

麥門冬 芡實 枸杞 山藥

肉蓯蓉 補骨脂 巴戟天 鎖陽

杜仲 菟絲 五味子 秋石 茯苓

續斷 葫蘆巴 炙甘草 覆盆子

於朮 川芎 新會皮 楮實 川椒

小茴香 沈香 青鹽

(一方無川椒、有蒺藜、女貞子、蓮肉、山萸、川連、)

藥店中有現存發售

五淋 赤白濁

證解 景岳云。五淋之爲病。小便

痛澀滴瀝。欲通不通。欲止不止之病也。蓋病因不通。通則不痛。故治淋

濁皆以通爲止也。病源論五淋。謂一石淋者。淋而出石。腎主水。水結則化爲石。宜神效琥珀散治之。一氣淋者。腎虛膀胱熱氣脹所爲也。宜石葦散治之。一血淋者。熱淋之甚者。則尿血。心主血。血之行身。通遍經絡。循環腑臟。勞甚則散失其常經。溢入胞。而成血淋也。一宜牛膝膏治之。一勞淋者。謂勞傷腎氣。而生熱成淋也。一宜補中益氣湯加車前牛膝治之。一膏淋者。淋而有肥。狀似膏。故謂之膏淋。亦曰肉淋。比腎虛不能制於肥液。故與小便俱出也。一宜

海金砂加牛膝葦蘚之類治之。赤白濁之爲病。乃腎虛及溼熱下注于膀胱病也。丹溪云。肥人多溼熱。瘦人多腎虛。腎虛者。因思想過度。嗜慾無節。腎水虛。膀胱火盛。則小便澀。所以成濁。濕熱者。因脾胃溼熱。下流膀胱。遂致小溲渾濁。而溺道痛。其赤濁者。蓋精是血所化。濁去過多。化精不及。赤未變白。故成赤濁。一云血虛而熱甚者。則爲赤濁。亦有濕熱而爲赤濁者。宜治濁固本丸。加牛膝、滑石、桃仁、琥珀等藥。或加韭汁、蚯蚓、甚捷且莖痛可卽止。

。腎陰虛而膀胱火盛。宜六味丸。去山萸、加葶藶黃柏治之。

精濁者。病在心腎。由心動于慾。腎傷于色。強忍不泄。敗精阻滯。溺時莖痛。不可忍。景岳所謂。濁在精分。必因相火妄動。或逆精而然。宜大分清飲。加牛膝、葶藶、冬葵子、之類治之。若濁證經年不愈。珍珠粉丸。為最佳也。

名家驗方選

【神效琥珀散】準繩 治石淋。

琥珀 桂心 滑石 大黃 冬葵子

膩粉 木通 磁石

研末燈心、葱白、煎湯下。

【石葦散】局方 治腎氣不足。膀胱有熱氣淋瀝。或出砂石。勞倦即發。

石葦 芍藥 白朮 滑石 葵子

瞿麥 木通 當歸 甘草

王不留行

【海金沙散】準繩 治諸淋澀痛。

海金沙 肉桂 甘草 赤茯苓

豬苓 白朮 芍藥 澤瀉 滑石

石葦

研末燈心下

【藕蜜煎】養老書 治老人淋病。小便不

利。痛悶之極。(此方亦治血淋)

藕汁 白蜜 生地黃汁

【八正散】寶鑑 治諸淋

瞿麥 梔子 篇蓄 大黃 滑石

木通 車前子 甘草

加燈心煎。

【鬱金散】聖惠 治血淋。尿道痛。

鬱金 車前 瞿麥 乾地黃 滑石

芒硝

【琥珀散】御藥 治五淋澁痛。小便有膿

血。

琥珀 沒藥 蒲黃 海金砂

研末甘草梢煎湯下

【琥珀散】上池祕錄 治砂淋。膏淋。血淋。氣淋。

琥珀 滑石 木通 扁蓄 木香

當歸 鬱金

【參苓琥珀湯】寶鑑 治溺澁。尿道中痛不可忍。

人參 茯苓 琥珀 甘草 川棟子

玄胡 澤瀉 柴胡 歸尾

以上主治五淋方

【治濁固本丸】醫學正傳 治脾胃溼熱。流入膀胱。下濁不止。

甘草 豬苓 茯苓 砂仁 益智仁

半夏 黃柏 黃連 蓮蕊

【分清飲】直指治思慮過度。精濁相干而白濁

益智 石菖蒲 茯苓 草薢 烏藥 甘草

鹽少許水煎。

(一方無茯苓、甘草、名草薢分清飲)

【滋腎圓】試効治不渴而小便閉。熱在下焦血分也。

知母 黃柏 肉桂

蘭室名通關丸。一名泄腎丸。

【六味湯】經驗良方治男子驚滯。疼痛砂淋。或小便出血。

破故紙 川棟子 茴香 木香

沈香 麝香

加鹽煎其砂卽下。

【萬全木通散】入門治膀胱有熱。小便難而黃。

木通 滑石 茯苓 車前子 瞿麥

【五淋散】局方治膀胱有熱。水道不通。淋瀝不宣。

赤苓 當歸 甘草 赤芍 梔子

又方無當歸、有木通、滑石、竹葉、茵陳、治法證狀同。

【清心蓮子飲】直指治心中熱。赤濁肥脂。

蓮肉 茯苓 遠志 人參 車前
澤瀉 益智 麥冬 石菖蒲 白朮
甘草

燈心煎

【珍珠丸】潔古降火滋陰。治白淫。夢遺。泄精。

黃蘗皮 蛤粉

研末爲丸

(一方有珍珠)

【蒲黃丸】準繩治虛損。膀胱有熱。尿血不止。

蒲黃 葵子 茯苓 黃芪 車前
當歸 荆實 麥冬 生地

研末蜜丸

【玄兔丹】局方治三消渴。禁遺精。止白濁。

兔絲子 五味子 茯苓 蓮子

【葶藶分清飲】楊氏治下焦虛寒。小便白濁。頻數無度。

益智仁 川葶藶 石菖蒲 烏藥

【地黃圓】朱氏集驗治白濁如神。

熟地 兔絲子 鹿角霜 茯苓

柏子仁 附子

以上注治赤白濁方

癃閉 轉胞 遺溺

證解

●景岳謂癰閉之證。最危最急

候也。膀胱氣化失職。以致尿不得通。乃小腹膨脹。裏急殊甚。若無法通之。數日內可以變爲腫脹。西醫所謂腎臟性水腫。易致尿中毒。亦屬致命大病。見肺燥者。宜以紫苑、麥冬、車前、丹皮、茯苓之類。見脾濕者。當以茯苓、半夏、蒼朮。見腎熱者。宜以知母、黃柏、茯苓、通草、澤瀉、之類。見腎虛者。宜金匱腎氣丸。及肉桂爲主藥。外治用井底泥。或田螺麝香同搗爛。敷小腹。有效。有時用通漚之藥。而愈通愈窒。丹溪嘗

謂以藥吐之則反得通。亦卽內經所謂病在上取之於下。病在下取之於上也。轉胞症亦名轉脬症。其證狀臍下急痛。小便不通是也。或因小便應下而強忍之。或爲寒熱所迫。此二者。俱令水氣還上於胞。使胞系屈曲不充張。外水應入不得入膀胱。內溲應出不得出膀胱。外內相雍塞。故令不通。或忍小便而急疾走。或忍水入房。皆令轉胞。因此腹脹浮腫。數便爲癰。絕不小便爲轉胞病也。宜胞轉方治之。遺溺者。睡中不覺尿之遺出。見之嬰兒脬氣未固者。亦見之老人下衰膀胱

虛者。嬰兒不須治。老人則宜以葷隄丸爲主治也。

名家驗方選

【栝萹瞿麥圓】金匱 小便不利者。有水氣。其人苦渴。此丸主之。

栝萹根 茯苓 薯蕷 附子 瞿麥

蜜丸

【滑石白魚散】金匱 主小便不利

滑石 亂髮 白魚

杵爲散

【茯苓戎鹽湯】金匱 小便不利主之

茯苓 白朮 戎鹽

【八正散】局方 治心經邪熱。小便赤澀。或癃閉不通。

車前 瞿麥 大黃 滑石 梔子
蘆蓄 木通 甘草

【滋腎丸】東垣 治下焦陰虛。脚膝軟無力。足不能步履。不渴而小便閉者。邪熱蘊於血分也。

黃柏 知母 肉桂

研末水丸

【豬苓湯】金匱 脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。主之。

豬苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉

【療小便難方】本事 治便難。小腹胀。

不急治則殺人。

用葱白三斤

細剉炒令熱以帕子裹分作二處更替運

臍下則通

【胞轉方】千金翼 治丈夫。婦人胞轉。

不得小便八九日者。

滑石 寒水石 葵子

【夜多小便方】千金翼 治膀胱冷。故小

便至夜獨多。

雞腸 羊腎 赤石脂 龍骨

肉蓯蓉 川連 桂心

【黃芪束氣湯】方要 治氣虛遺溺

黃芪 人參 白芍 升麻 破故紙

益智 玉桂 五味子

加生姜煎

【滋營養衛湯】醫療方 治體虛。夜患遺溺。

人參 歸身 白朮 山藥 芍藥

山萸 益智 甘草 酸棗仁

【鞏隄丸】景岳 治心脾肺腎及膀胱虛而

遺溺。

附子 熟地 菟絲子 白朮

五味子 茯苓 破故紙 家韭子

益智仁

疝氣

證解

經云。任脈之爲病。男子內結七疝。女子帶下癥瘕。衝脈之爲病。從少腹上衝心而痛。不得前後。爲衝疝。又云。三陽爲病。發寒熱。其傳爲癰疝。子和以筋、水、狐、癩、氣、血、寒、名爲七疝。皆以辛香疏肝爲主。觀金匱獨以寒疝爲名。所出三方。亦以溫散調補爲主。

筋疝亦卽巢氏謂之癥疝。水疝亦卽內經謂之癰疝。王肯堂云。疝與小腸氣。膀胱氣不同。小腸氣是病在小腸。膀

胱氣是病在膀胱。疝氣是病在肝經。疝氣必睪丸偏墜而痛。連及小腹。次攻胸脅。有自下而上之證。小腸氣少腹引睪丸腰脊痛。膀胱病小腹腫痛。不得小便。見證立方。庶無誤治也。

名家驗方選

【大烏頭煎】金匱 治腹滿脈弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。卽爲寒疝。寒疝繞臍痛。若發則白津出。手足厥冷。其脈沉緊者。此主之。

烏頭 (大者五枚熬去皮不必咀煎)

【當歸生姜羊肉湯】金匱 治寒疝。腹中痛。及脇病裏急者。

當歸 生薑 羊肉

【烏頭桂枝湯】金匱 治寒疝。腹中痛。

逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸

藥不能治者。

烏頭 桂枝

【蜘蛛散】金匱 陰狐疝氣者。偏有小大

。時時上下。此方主之。

蜘蛛 桂枝

【椒附散】聖惠 治寒疝心腹痛。自汗出

氣欲絕。

川椒 附子 檳榔 白朮 乾姜

青皮

加生姜煎

【當歸四逆湯】寶鑑 治臍腹冷痛。相引

腰脊。

當歸 附子 官桂 茴香 柴胡

芍藥 玄胡 川棟 茯苓 澤瀉

【解急蜀椒湯】外臺 治寒疝。心腹痛如

刺。

蜀椒 甘草 附子 粳米 乾姜

半夏 大棗

【聚香飲子】濟生 治七情所傷。遂成七

疝。心腹痛引腰脅連背，

檀香 木香 乳香 沉香 丁香

藿香 姜黃 玄胡 川烏 桔梗

桂心 甘草

加生姜、大棗煎

【沉香桂附丸】六要 陽氣虛弱。七疝引

痛。

沉香 官桂 附子 乾姜 川芎

良姜 茴香 吳萸

【煖肝煎】景岳 治肝腎陰寒。小腹疼痛

。疝氣等證。

官桂 小茴香 沉香 烏藥 當歸

茯苓 枸杞

姜煎

【桃仁當歸湯】準繩 治疝氣，因瘀血作

痛。

桃仁 牡丹皮 川芎 生地 當歸

玄胡 芍藥 青皮 吳萸

加姜煎

【荔枝散】準繩 治疝氣。丸腫大。痛不

可忍。

荔枝核 小茴香 沉香 木香

川棟肉 大茴香 青鹽 食鹽

【橘核丸】濟生 治癰疝。卵核腫大。或

堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊腫脹

成癰潰爛。

橘核 海藻 昆布 桃仁 海帶

川棟肉 厚朴 木通 枳實 延胡

桂心 木香

【古今錄驗牡丹五等散】外臺療癩疝。陰卵偏大。有氣上下脹大。行走腫大。

牡丹皮 防風 黃蘗 桂心 桃仁

【玄附湯】濟生治七疝。心腹冷痛。腸鳴泄瀉。

玄胡索 附子 木香

【回春丸】摘要治疝如神。

茯苓 白朮 山查 枳實 大茴香

吳茱萸 荔枝核 橘核

姜湯送下。

【麝香大戟丸】局方治陰癩腫脹。或小

腸氣痛。

葫蘆巴 麝香 大戟 茴香

川棟子 木香 訶子 附子 檳榔

【倉卒散】蘇沉治小腸氣

山梔子 炮附子

加鹽

【棟實丸】尊生治小腸氣

川棟子 茴香 陳皮 吳萸

馬蘭花 芫花

醋糊丸姜湯下

【既濟丸】尊生治膀胱虛。溲便不禁。

菟絲子 益智仁 菴蓉 茯苓

韭子 當歸 熟地 牡蠣

黃柏鹽炒 知母鹽炒 萸肉

五味子 麵糊丸

【葵子丸】濟生 治膀胱濕熱。小便不通

冬葵子 赤豬苓 赤茯苓 枳實

瞿麥 滑石 木通 黃芩 甘草

車前子 生姜

眼目

名家驗方選

【延年竹葉飲】外臺 主淡熱。眼赤頭痛

竹葉 犀角 升麻 乾葛 黃芩

麥門冬

【神麴丸】千金 主明目。百歲可讀注書

神麴 磁石 光明砂

右末之。鍊密爲丸。如梧子。飲服三丸。日三。不禁。常服益眼力。澹寮

。一名磁硃圓。原機。治神水寬大。

漸散昏如霧露中行。漸覩空中有黑花

。漸覩物成二體。久則光不收。及內

障。神水淡綠色。淡白色者。

【瀉肝湯】千金 治眼赤。漠漠不見物。

息肉生。

柴胡 芍藥 大黃 決明子 澤瀉
黃芩 杏仁 升麻 枳實 梔子人

竹葉

體壯加大黃。羸老去大黃。加梔子人

【羌活散】聖惠 治眼睛疼痛。連頭偏疼

羌活 防風 黃芩 芎藭 蔓荊子

甘菊花 石膏 甘草

【補肝散】簡要 治肝虛目睛眩疼。冷淚

不止。羞明怕日。

夏枯草 香附子

右爲散。每服一錢。臘茶調下。

【柴胡散】簡要 治肝藏壅熱上攻。頭目

不利。四肢拘捲。

柴胡 石膏 黃芩 芎藭 甘草

【駐景圓】局方 治肝腎俱虛。眼常昏暗

。多見黑花。或生障翳。視不明。迎

風有淚。久服補肝腎。增目力。

兔絲子 (酒浸。別研爲末。)

車前子 熟乾地黃

右爲末。煉密爲圓。如梧子大。每服

三十圓。溫酒下日二。

此方本出本草圖經。今加地黃

【蜜蒙花散】局方 治風氣攻注。兩眼昏

暗。眵淚羞明。閉澀難開。或痒或痛

。漸生翳膜。及久患偏頭疼。兩眼漸

覺昏澀。

蜜蒙花 羌活 菊花 石決明

杜蒺藜 木賊

已上各等分

右爲末。每服一錢。臘茶清調下。

【羚羊角散】局方治一切風熱毒。上攻

眼目。暴發赤腫。疼痛

羚羊角 川升麻 黃芩 車前子

甘草 決明子 草龍膽 梔子仁

右爲末。每一錢。溫水調下。

【洗肝散】局方治風毒上攻。暴作赤目

。腫痛難開。隱澀翳淚。或生翳膜。

大黃 梔子 防風 薄荷 當歸

川芎 羌活 甘草

右爲末。每服二錢。冷水或熱水調下

。

本事後集。無薄荷、羌活、防

風、川芎、有黃芩、芍藥、甘

松、乾葛、熟地黃。

【草龍膽散】局方治熱毒攻衝。眼目暴

赤。礮澀腫痛。翳膜攀睛。

川芎 香附子 龍膽草

草決明子炒 甘草 木賊 菊花

右爲末。每服二錢。用麥門冬熟水。

入砂糖少許。同調服。

【車前子散】聖濟治飛塵眩目。因此生

翳暈。

車前子 五味子 芍藥 細辛

白茯苓 玄參 人參 大黃 桔梗

右爲末。每服三錢七。食後臨臥。溫米泔調服。

【糖煎散】楊氏 治風熱毒氣上攻，眼目赤腫疼痛。視物不明。

龍膽 漢防己 大黃 荊芥穗

芍藥 當歸 甘草 防風

山梔子仁 川芎

右每服四錢。水一盞。入砂糖如彈子大。同煎至七分溫服。

【決明子散】濟生 治風熱毒氣上攻。眼

目腫痛。或卒生翳膜。或赤脈弩肉。或痒或澀。羞明多淚。或始則昏花。漸成內障。

黃芩 甘菊花 木賊 決明子

石膏 芍藥 川芎 羌活 甘草

蔓荊子 石決明

加姜煎。

【柴胡散】濟生 治肝氣實熱。頭痛目眩。眼目赤痛。胸中煩悶。夢寐驚恐。

肢節不利。

柴胡 地骨皮 玄參 羚羊角

甘菊花 芍藥 黃芩 甘草

加薑煎。

【道人開障散】直指 治諸障翳。

蛇退洗焙 蟬退洗焙 黃連 綠豆

甘草

【芎辛湯】試效 治兩目晝夜隱澀難開。

羞明畏日。目赤視物昏暗。

芎藭 蔓荊子 細辛 防風 甘草

白芷

【助陽活血湯】試效 治眼發上熱。白睛

紅。上壅無疼痛。隱澀難開。多眵淚

。

防風 黃芪 甘草 當歸 蔓荊子

白芷 升麻 柴胡

【益氣聰明湯】試效 治飲食不節。勞役

形體。脾胃不足。內障耳鳴。或多年目昏暗。此藥令目廣大。

黃芪 甘草 人參 升麻 葛根

蔓荊子 芎藭 黃柏

【益陰腎氣丸】試效 治內障瞳子散大。

此壯水之主。以鎮陽光。

熟地黃 牡丹皮 柴胡 五味子

山藥 生地黃 澤瀉 茯苓

當歸酒製 山茱萸

右爲末。煉蜜丸。如梧子大。朱砂爲

衣。每服五七十丸。鹽湯送下。

【當歸立效散】御藥 涼血。定眼睛疼痛

。

當歸 大黃 乳香

【補肝散】得效 圓翳者。黑珠上一點圓日中見之差小。陰處見之則大。或明或暗。以冷藥治之。轉見黑花。此因肝腎俱虛。宜服。

熟地黃 茯苓 家菊 細辛 芍藥

柏子仁 甘草 防風 柴胡

【經效散】得效 因撞刺生翳。疼痛無時。經久不安者。復被物撞之。兼爲風熱所攻。轉加痛楚昏暗。宜服。

大黃 當歸 芍藥 柴胡 粉草

連翹 犀角

【地黃圓】得效 素問云。久視傷血。故

勤書則傷肝。而日昏。宜服。

熟地黃 黃連 決明子 防風

甘菊花 羌活 桂心 朱砂 沒藥

右爲末。煉蜜丸。梧子大。熟水下。三十圓

【七寶丸】奇效 治內障冰翳。如水凍。

堅結睛上。先以針撥取之。後以此藥散翳。

石決明 堯蔚子 人參 琥珀

龍腦 熊膽 真珠

右爲細末。蜜丸梧子大。每服十五丸。加至二十九。茶清下。

【七寶湯】奇效 治內障橫翳。橫著瞳仁

。中心起而劍脊。針後用。

羚羊角 犀角 胡黃連 車前子

石決明 甘草 丹砂

右除丹砂、決明、外麤搗篩。每服三錢七。水一盞。煎七分去滓。入丹砂末半錢。決明末一字。再煎兩沸。食後溫服。

【石決明丸】奇効治肝虛血弱。日久昏暗。

石決明 五味子 兔絲子（酒浸一宿。別搗爲末。各一兩。） 山芋 知母 細辛 熟地黄各一兩半

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服

三十九。米飲下。

【止痛散】醫綱治兩額角痛。目睛痛。時見黑花。及目赤腫痛。脈弦。作內障也。得之於飢飽勞役。

柴胡一兩半 甘草七錢半

瓜蒌根二兩 當歸 黃芩四錢

生地黄一兩

右薑、棗、水煎。

【當歸湯】醫綱治翳。補益瞳子散大。

當歸 黃芩各一錢 黃連 地黄

甘草各三錢 柴胡一錢 芍藥二錢

右水煎。

【蘆薈湯】醫綱黑水凝翳內障。不通不

痒。微有頭旋。脈瀼者。

蘆薈 甘草各一分 人參

牛膽各半兩 柏子仁 細辛各一兩

羚羊角二兩

右爲末。煉蜜爲丸。如桐子大。空心茶下十九。

【磁石丸】醫綱 治雷風內障。頭旋惡心嘔吐。

磁石 燒赤。醋淬二次。五味子

牡丹皮 乾薑 玄參各一兩

附子 炮。半兩。

右爲末。煉蜜丸。如桐子大。食前茶下十九。

【四明飲】回春 治一切眼目腫痛翳障。

大黃 葛花 澤瀉 石決明各等分

百代。有木賊。名決明飲。治

翳障眼三服取效。

【神消散】準繩 治眼內黃膜上衝。赤膜下垂。

黃芩 蟬退 甘草 木賊 穀精草

蒼朮 龍退

右末。每服二錢。夜臥冷水調下。

【珍珠退翳散】準繩

珍珠少許 白澤石膏 烏賊魚骨

真蚌粉等分

右爲細末。每服一錢。用第二次米泔

調。食後臨臥服。

【涼膈清脾飲】正宗 治眼胞菌毒。其患眼胞內。生出如菌。頭大蒂小。漸長垂出。甚者眼翻流淚。亦致昏朦。

防風 荊芥 黃芩 石膏 山椒

薄荷 赤芍 連翹 生地 甘草

燈心二十根。水煎。

【還陰解毒湯】瑤函 治梅毒餘毒未清。移害於肝腎。以致蒸灼。神水窄小。兼赤絲。黑白混濁不清。看物昏眊不明。

川芎 當歸 生地黃 金銀花

連翹 黃芩 土茯苓 甘草減半

黃連 苦參 麥門冬 芍藥
玄參各等分

耳病

名家驗方選

【地黃湯】本事 治因瘡毒後。腎經熱。右耳聽事不真。每心中不如意。則轉覺重。虛鳴疼痛。

生乾地黃 桑白皮 磁石（搗碎）

水淘二三十次。去盡赤汁爲度。）

枳殼 羌活 防風 黃芩 木通

甘草

【解倉飲子】三因 治氣虛熱壅。或失飢

冒暑。風熱上壅。耳內聾閉徹痛。膿血流出。

芍藥 當歸 甘草 大黃 木鱉子
奇效。有川芎。名芍藥散。

【犀角飲子】濟生 治風熱上壅。耳內聾閉。聾腫掣痛。膿血流出。

犀角 菖蒲 木通 玄參 芍藥

赤小豆 甘菊花 甘草

加姜煎

【地黃圓】直指 治勞損耳聾。

大熟地黃 當歸 川芎 辣桂

兔絲子 酒浸三日。晒乾搗末。

大川椒 故紙 白蒺藜 葫蘆巴

杜仲 白芷 石菖蒲 磁石（火燒醋淬七次。研細水飛。）

右爲細末。煉蜜爲圓。以蔥白溫酒。空心吞下。

【犀角散】寶鑑 治風毒熱壅。心胸痰滯。兩耳虛聾。頭重目眩。神效。

犀角屑 甘菊花 前胡 枳殼

菖蒲 澤瀉 羌活 木通

生地黃各半兩 麥門冬一兩

甘草一錢

【龍膽湯】回春 左耳聾者。忿怒動肝火也。

黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮

膽星 龍膽草 香附 玄參 青黛

木香 乾薑炒黑

加薑煎。

【荊芥連翹湯】同春 治兩耳腫痛者。腎

經有風熱也。

荊芥 連翹 防風 當歸 川芎

芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 山梔

白芷 桔梗 甘草

又無當歸、芍藥、柴胡、有黃

連、薄荷、名清上防風湯、治

頭面瘡癩風熱毒。

【滋腎通耳湯】同春 治腎虛耳聾而鳴。

黃柏 黃芩 知母 生地黃 白芍

當歸 川芎 柴胡 白芷

香附各等分

【清神散】丹溪 治風氣壅上。頭目不清

。耳常重聽。

姜蠶 菊花 荊芥 羌活 木通

川芎 防風 木香 石菖蒲 甘草

右爲末。食後臨臥。茶清調下。

【姚方伯復聰湯】丹溪 治痰火上攻。耳

聾耳鳴。

半夏 陳皮 茯苓 甘草 蕭蓄

木通 瞿麥 黃柏炒各一錢

加薑煎。

【通氣散】奇效 治耳聾。氣閉不通。

茴香 木香 全蠟 玄胡索 陳皮
菖蒲 羌活 僵蠶 川芎 蟬退
穿山甲 甘草

右爲細末。溫酒調服。

【丹溪檳榔神芎丸】醫綱 耳聾有濕痰者
下之。

大黃 黃芩 牽牛 滑石 檳榔

神芎丸。出宣明。治一切熱證
。今加檳榔。

【順氣聰耳湯】統旨 治因惱怒而耳鳴。

枳殼 柴胡 烏藥 木通 青皮
川芎 石菖蒲 甘草

鼻病

名家驗方選

【桑根白皮散】準繩 治肺藏積熱。皮膚
乾燥。鼻痛無涕頭疼。

桑根白皮 木通 大黃 升麻
石膏 葛根 甘草

【辛夷丸】準繩 治頭風。鼻涕下如白帶
者。

南星 半夏 蒼朮 黃芩 辛夷
川芎 黃蘗 滑石 牡蠣各等分
右末。糊丸。薄荷湯下。

【辛夷清肺散】正宗 治肺熱。鼻內慙肉

。初如榴子。日後漸大。閉塞孔竅。氣不宣通。

辛夷 黃芩 山梔 麥門冬 百合

石膏 知母 甘草 枇杷葉 升麻

【古今錄驗皂莢散】外臺療鼻窒塞。不得喘息。

皂莢去皮子炙 菖蒲各等分

右以末。綿裏塞鼻中。暮臥之時乃著。甚良。

【治鼻窒氣息不通方】千金瓜蒂末。少許吹鼻中。亦可綿裏塞鼻中。

此方。本醫心方。引葛氏方。治鼻中生息肉。不通利。

【犀角升麻湯】本事治陽明經風毒。鼻額間痛或麻痺不仁。或口唇頰車。髮際皆痛。不可開口。

犀角 升麻 防風 羌活 白芷

黃芩 川芎 白附子 甘草

【辛夷散】濟生治鼻內壅塞。涕出不已。或氣息不通。或不聞香臭。

辛夷仁 細辛 藁本 升麻 羌活

甘草 防風 川芎 木通

白芷各等分
右爲末。食後茶清調服。

【蒼耳散】濟生治鼻流濁涕不止。名曰鼻淵。

辛夷仁 蒼耳子 白芷 薄荷

右爲末。用蔥茶。食後調服

【溫肺湯】試效治鼻不聞香臭。眼有眵淚。

升麻 葛根 甘草 黃芪 羌活

防風 麻黃 丁香

加蔥白煎。

【治腦漏】保元

防風 荊芥 獨活 連翹 藁本

辛夷 甘草 細辛 牙皂 石菖蒲

右水煎服。未效可將後藥三味爲末。

棉裹塞鼻內即效。

【金花丸】保元 治酒瘡鼻。

黃連 枯苓 黃柏 大黃 白粉葛
梔子 桔梗

口舌

名家驗方選

【升麻煎】千金 治膀胱熱不已。口舌生瘡咽痛。

升麻 玄參 薔薇根白皮 射干

大青 黃蘗 蜜

右水煎。下蜜更煎兩沸。細細含咽之。

大青。今代青黛。

【涼膈散】局方 治腑臟積熱。舌腫喉閉

。目赤鼻衄。頰頰結硬。口舌生瘡。痰實不利。腸胃燥澀。一切風壅。

川大黃 朴消 甘草 山梔子仁

薄荷 黃芩 連翹

右爲末。水壹盞。入竹葉。蜜少許。煎服。

施圓、去黃芩、竹葉、加石膏

、菘豆、蜜丸、名涼藥子丸、

治五藏、伏熱諸症。

【治心脾壅熱木舌腫脹】本事

玄參 升麻 大黃 犀角 甘草

【增損建中湯】葉氏 治上膈壅盛口燥咽乾。舌上麻木。不知酢苦。意思不樂

綿黃芪 肉桂 粉草 烏梅

白芍藥 五加皮 乾葛 五味子

【琥珀犀角膏】精要 治熱毒衝心經。咽喉口舌生瘡。甚至生紅黑菌。變證甚速。

生犀角屑 琥珀 辰砂 茯神

酸棗仁 人參 眞腦子

右爲細末。和勻用煉蜜。搜爲膏。每

服彈子大。以麥門冬。濃煎湯化服，

一日連進。五服取效。

【導赤散】濟生 治心藏實熱。口乾煩渴。或口舌生瘡。驚怖不安。

黃連 麥門冬 半夏 地骨皮

茯神 芍藥 木通 生地黃 黃芩

甘草

加薑煎。

【升麻散】濟生治上膈壅毒。口舌生瘡

。咽喉腫痛。

升麻 芍藥 人參 桔梗 乾葛

甘草

加薑煎。

示兒。加露蜂房。微冷含化。

二服立安。

右爲末。每服一錢。食後臨臥。新汲水調服。

【清陽湯】脾胃治口喎頰頰急緊。胃中

火盛。必汗不止。而小便數。

紅花 酒黃蘗 桂枝 生甘草

蘇木 炙甘草 葛根 當歸身

升麻 黃耆

右水酒煎。

按。靈樞經筋篇。有用桑鈞治

筋痺法。卽此證也。

【理中湯】丹溪類集口瘡服涼藥不愈者

。此中焦氣不足。虛火泛上無制。用

此方。甚則加附子。

【黑錫丹】要訣曾有舌上病瘡。久蝕成穴。累服涼藥不效。後來有教。服黑

錫丹遂漸愈。此亦下虛。故上盛也。

此說。本出醫說。用養正丹。

【升麻柴胡湯】醫統 治心痺虛熱上攻。

舌上生瘡。舌本強。二頰腫痛。

升麻 柴胡 芍藥 梔子 木通

大青 黃芩 石膏

右水煎。甚者口舌生瘡不已。須加熱

附子。

【清熱如聖散】回春 治舌上腫如核大。

取破出黃痰。已疴復發。

枳殼 荊芥 薄荷 連翹 黃連

牛蒡子 花粉 梔子 柴胡 甘草

右燈心水煎。

【柴胡清肝散】保元 治肝經怒火。風熱傳脾。脣腫裂。或齩唇。

柴胡 黃芩 生地黃 黃連 當歸

牡丹 山梔 川芎 升麻 甘草

【清熱化痰湯】準繩 治上焦有熱。痰盛作渴。口舌腫。

貝母 天花粉 枳實 桔梗 黃芩

黃連 玄參 升麻 甘草

【清熱補氣湯】準繩 治中氣虛熱。口舌如無皮狀。或發熱作渴。

人參 白朮 茯苓 當歸 芍藥

升麻 五味子 麥門冬 玄參

甘草

右水煎。如不應。加炮薑。更不應。加附子。

【清熱補血湯】準繩 治口舌生瘡。體倦少食。日晡益甚。

當歸 川芎 芍藥 熟地 玄參

知母 五味子 黃蘗 麥門冬

柴胡 牡丹皮

【八味丸】準繩 治口瘡小便頻數。腎水虧。

【黃連瀉心湯】正宗 治大人小兒。心火妄動。結成重舌木脹腫堅硬。語言不利。

黃連 山梔 荊芥 黃芩 連翹

木通 薄荷 牛旁子 甘草

右燈心二十根。水煎。

【瀉胃湯】入門 治胃氣實熱。唇口乾裂。便祕煩渴。

大黃 葛根 桔梗 枳殼 前胡

杏仁

加薑煎。

【清溪祕傳北庭丹】金鑑 治舌疳。又名舌菌。

番礬砂 人中白 瓦上青苔 瓦松

溱雞矢

用傾銀罐子二箇。將藥裝在罐內。將口對嚴。外用鹽泥封固。以炭火煨紅

。待三炷香爲度。候冷開罐。將藥取出。入麝香。冰片。各一分。共研細。未用磁鍼刺破舌菌。用丹少許點上。再以蒲黃蓋之。

【歸脾湯】金鑑 治舌疳屬虛者。

方出健忘

【歸芍異功散】金鑑 治舌疳便溏者。然此症百無一生。縱施藥餌。不過苟延歲月而已。

人參 白朮 陳皮 白芍 當歸身

白茯苓 甘草

右燈心五十寸。水煎。

治一切口中苦甘辣鹹酸諸味爲病。以

燭心草一握爲君。佐以五經清火藥。

彙言

口苦心熱。加黃連。山梔。

口甜脾熱。加黃連。黃芩。

口辣肺熱。加桑白。地骨。

口鹹腎熱。加黃柏。知母。

口酸而苦。肝胆有火。加龍胆。柴胡。

。青皮。

配諸藥。俱佐燈心草。見證加煎。漱

口徐徐嚥下。

婦科月經

證解 女子與男子生理之異者。在生殖。病理之異者。在胎產經帶崩漏。病之無關胎產經帶崩者。與男子同治。病之關係胎產經帶崩漏者。與男子異治，此即所謂婦科也。觀男女生殖腺發育成熟者。則男子有精蟲。女子有月事。其月經初來之時期。約在十四歲左右。或有過早過遲者。大約因溫帶與寒帶之異。或因體質強弱之異。行經通常以廿八日排泄一次。臨經持續之時。三日至六七日不等。蓋

卵巢之分泌液爲天癸。卵巢與黏膜之分泌液。及子宮內膜之分泌液破裂外出之血液爲月經。生殖腺成熟。天癸至則月經以時下也。

月經與內分泌關係之密切。內分泌者。是體內直種無管腺體。其細胞分泌之液體。即爲內分泌之液體。於生理病理皆有關係。月經之來源。由生殖腺成熟而來。諸腺以肝爲最大。肝臟者。腺體之主腦也。可知月經不調。病緣於肝。肝氣條達。則胃健而意志發舒。自無月經不調之患。若肝鬱。則胃納減。而月事不以時下矣。所謂

條達者。謂肝氣能下行也。肝氣下行。不但胃健。大便亦以時行。而頭目清楚。所謂鬱者。謂上逆也。肝氣上逆。不但胃家消化不良。大便且苦燥結。而頭目則眩暈昏眩。而脈必弦。經亦愆期。或經前後腹痛。諸症蠱起。女子欲求生育。必先調經。本編搜集。起調經。迄產後。

名家驗方選

【清經湯】傅氏 治經行先期。腎中水火交旺者。

青蒿 地骨皮 牡丹皮 黃蘗

熟地 白芍 茯苓
【兩地湯】傅氏 治經行先期。腎中火旺而陰水虧者。

生地 地骨皮 白芍 元參 麥冬 阿膠

【涼血調經丸】尊生 治血熱。經行先期。

黃芩 黃柏 白芍 杞子 鼈甲 當歸 樗皮

【逍遙散】局方 治肝鬱。血虛脈弦。月經不調等證。

柴胡 白朮 茯苓 當歸 白芍 炙甘草 陳皮 薄荷 煨姜

(一方無陳皮)

【溫經湯】金匱 治婦人年五十。所病下利數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。手掌煩熱。唇口乾燥。及經行後期。虛寒不孕。為調經之祖方。

吳萸 當歸 川芎 白芍 人參
桂枝 阿膠 牡丹皮 炙甘草
生薑 半夏 麥冬

【溫經攝血湯】傅氏 治經行後期。為血有餘者。

熟地 白芍 五味子 續斷 川芎
白朮 肉桂 柴胡

【定經湯】博氏 治經行先後無定期。屬

肝腎之鬱者。

當歸 白芍 菟絲子 熟地 山藥
茯苓 荊芥 柴胡
【歸脾湯】濟生 治氣血虛弱。經行愆期。及過多者。

歸身 人參 茯苓 黃芪 白朮
龍眼肉 酸棗仁 青木香 炙甘草
遠志

加薑棗煎

【宣鬱通經湯】傅氏 經前腹痛。是熱極而不化者。亦所謂痛經。

當歸 白芍 柴胡 丹皮 黑山梔
白芥子 香附 黃芩 鬱金

生甘草

【調肝湯】傅氏 治經後少腹疼痛。屬腎之酒者。又善止鬱痛。經後之證。以此方調理最佳。

當歸 白芍 阿膠 山藥 山萸
巴戟肉 甘草

【健固湯】傅氏 治經前洩水，一二日而後行者。屬脾氣虛者。

人參 白朮 薏仁 巴戟肉 茯苓
【安老湯】傅氏 治年老月經復行。爲血崩之漸者。

人參 生芪 熟地 山萸 阿膠
白朮 甘草 黑荆芥 當歸 香附

木耳炭

【益經湯】傅氏 治年未老而經水斷。屬心肝脾氣之鬱者。

人參 當歸 生棗仁 丹皮 沙參
白芍 柴胡 白朮 熟地 杜仲
山藥

【和血通經湯】寶鑑 治婦人寒客胞門。經閉血凝。堅硬如石。

當歸 京三稜 蓬莪茂 木香
熟地 肉桂 紅花 貫衆 蘇木
血竭

(一方無貫衆)
研末和勻。食前熱酒調下。

【破結丸】尊生 治婦女過食生冷酸澀等物。致月經不通。

琥珀 延胡索 降香 牛膝

五靈脂 蓬莪茂 桃仁 當歸尾

桂心 血竭

研末水丸。熟湯送下。

【越鞠丸】丹溪 治一切濕、痰、食、火、氣、血、諸鬱。婦人月經爲病。

香附 蒼朮 川芎 梔子 神麴

(一方有山查炒麥芽)

(一方加陳皮、半夏、茯苓、

砂仁、甘草、蘇子、萊菔子)

【紅花散】驗方 治倒經

紅花 黃芩 蘇木 天花粉

【延胡索散】尊生 治女子七情六鬱。心腹作痛。或連腰脅背脊。上下攻刺。

甚則搖擲。經候不調。凡一切經病。及血氣疼痛。

延胡 當歸 赤芍 炒蒲黃 官桂

黃連 木香 炙甘草 乳香 沒藥

加生姜水煎食前服。

【土瓜根散】金匱 治帶下經水不利。少腹滿痛。經一月再見者。

土瓜根 芍藥 桂枝

廬蟲杵爲散酒服

【烏藥散】尊生 治氣滯經行不利。

烏藥 白朮 白芷 青皮 茯苓

陳皮 人參 甘草

【白薇丸】千金 治經水不利。閉塞絕產。

白薇 細辛 人參 杜蘅 牡蒙

厚朴 半夏 白殭蠶 當歸 牛膝

沙參 乾薑 紫苑 秦艽 蜀椒

附子

防風研爲末。蜜丸。覺有孕卽止服

【甘麥大棗湯】金匱 婦人藏燥。喜悲傷

欲哭。主之。

甘草 小麥 大棗

胎前

名家驗方選

【芎歸膠艾湯】金匱 妊娠下血。腹中痛。爲胞阻。主之。

芎藭 當歸 阿膠 艾葉 甘草

芍藥 乾地黄

【葵子茯苓散】金匱 妊娠有水氣。身重。小便不利。洒淅惡寒。起卽頭眩。

葵子 茯苓

【崔氏半夏茯苓湯】外臺 治妊娠惡阻。嘔吐頭眩。喜臥疲極黃瘦。

半夏 茯苓 生薑 橘皮 細辛

旋覆花 川芎 桔梗 人參 甘草
芍藥 乾地黄

【刪繁黃芪散】外臺 療婦人懷孕。數落而不結寶。

黃芪 吳萸 乾薑 人參 甘草

川芎 白朮 當歸

乾地黄聖惠，名熟乾地黄散。證治同。

【桂枝茯苓丸】金匱 治婦人宿有癥病。

經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。此爲漏瘕。害妊娠。六月動者。前三月經水不利時胎也。下血者。後斷三月不血也。所以血不止者。其

癥不去故也。當下其癥。宜此方主之。
桂枝 茯苓 丹皮 桃仁 芍藥
研末蜜丸。食前服。

【膠艾湯】金匱 治婦人有漏下者。有半產後。因續下血都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻以此湯主之。

地黄 川芎 阿膠 炙甘草 艾葉
當歸 芍藥

【助氣補漏湯】傅氏 妊娠小便下血胎漏
人參 白芍 黃芩 生地 益母草
續斷 甘草

【當歸芍藥散】金匱 治婦人懷妊。腹中

疔痛。此散主之。

當歸 芍藥 川芎 茯苓 白朮

澤瀉

【援土固胎湯】傅氏 妊娠吐瀉腹痛。脾

胃虛極。

人參 白朮 炙甘草 砂仁 山藥

山萸 枸杞 杜仲 兔絲子 續斷

炮附子 肉桂

【安奠二天湯】傅氏 妊娠少腹痛。屬脾

腎之虧。

人參 白朮 炙甘草 熟地 扁豆

山藥 山萸 杜仲 枸杞

【解鬱湯】傅氏 妊婦有懷抱憂鬱。以致

胎動不安。子懸脇痛。屬肝氣不通。

人參 白朮 茯苓 白芍 當歸

枳殼 砂仁 山梔 薄荷

【扶氣止啼湯】傅氏 妊娠七八月。忽然

兒啼。腹中腰間隱隱作痛。子鳴屬氣

虛之故。

人參 黃芪 甘草 麥冬 當歸

橘紅 花粉

【乾薑人參半夏丸】金匱 治妊娠嘔吐不

止。此丸主之。

乾薑 人參 半夏

【順肝益氣湯】傅氏 治婦人有娠之後。

惡心嘔吐。思酸解渴。見食憎惡。困

倦欲臥一切妊娠惡阻。

人參 白朮 茯苓 熟地 當歸
白芍 麥冬 陳皮 砂仁 蘇子
神麴

【利氣洩火湯】傅氏 治妊娠多怒墮胎

人參 白朮 甘草 白芍 熟地
當歸 芡實 黃芩

【救損安胎湯】傅氏 妊婦有失足跌損。
致傷胎元。腹中疼痛。勢若將墮者。

當歸 白芍 生地 白朮 炙甘草
人參 蘇木 乳香 沒藥

【當歸散】金匱 主婦人妊娠。宜常服之。

當歸 黃芩 芍藥 川芎 白朮

【白朮散】金匱 主妊娠養胎方。

白朮 川芎 蜀椒 牡蠣

【半夏湯】千金 治妊娠九月。若卒得下
痢。腹滿懸急。胎上衝心短氣。

半夏 麥冬 吳萸 當歸 阿膠
乾薑 大棗

【柴胡散】聖惠 治妊娠傷寒壯熱。心煩
頭痛。

柴胡 黃芩 甘草 石膏 阿膠
麥冬

加姜煎

【漢防己散】聖惠 治妊娠通身浮腫。喘

促小便澀。

防己 腹皮 桑白皮 木香

紫蘇葉 赤苓

【當歸飲】聖濟 治妊娠胎萎。

當歸 川芎 阿膠 白朮

【竹瀝湯】千金 治妊娠。常苦煩悶。此

是子煩。

竹瀝 防風 黃芩 麥冬 茯苓

【木通散】醫統 治妊娠四肢浮腫。或遍

身面目俱浮。謂之子腫。

木通 條芩 木香 檳榔 紫蘇

枳殼 白朮 茯苓

加姜煎

臨產

名家驗方選

【難產神效方】蔡松汀 產以氣血爲主。

氣足則易於送胎出門。血足則易於滑

胎落地。故宜大補氣血。如產婦痛久

不下。胞衣已破未破。宜此方四五帖

。只服頭煎。惟一經產後。此藥一滴

不可入口。切勿誤服。

熟地 枸杞子 黨參 炙黃芪

醋炙龜板 歸身 川芎 茯神

酒炒白芍

【救母丹】傅氏 婦人有坐蓐三四日。兒

已到門。交骨不開。兒不得下。子死產門。

人參 當歸 川芎 炒黑荆芥

益母草 赤石脂

【送胞湯】傅氏 胞衣不下

當歸 川芎 乳香 沒藥 益母草

黑荆芥 麝香

【補氣升腸飲】傅氏 治產婦腸下

人參 生黃芪 當歸 白朮 川芎

升麻

原方用升麻不過一分。亦不過引氣使升耳。蓋升麻之爲用。少則升氣。多則血升。不可不知也。

【脫花煎】景岳 凡臨盆將產者。宜先服此藥。催生最佳。並治難產經日。或死胎不下者。

當歸 肉桂 川芎 牛膝 車前子

紅花

熱服。或服後飲酒數杯亦可。

【補氣解暈湯】傅氏 婦人甫產兒後。忽然眼目昏花。神不自主。屬氣虛欲脫者。

者。

人參 生黃芪 當歸 黑荆芥

薑炭

小產

名家驗方選

【千金保孕丹】保元 治婦人慣常小產。久而不育者可常服。過七個月。則可止服。

當歸 條芩 熟地黃 陳皮 香附
人參 續斷 杜仲 白朮
糯米飯丸

【引氣歸血湯】傅氏 妊婦有大怒之後。忽然腹痛。因而墮胎。小產之後。痛仍未止。屬血不歸經者。

白芍 當歸 白朮 甘草 黑荆芥

丹皮 姜炭 香附 麥冬 鬱金
【理氣散瘀湯】傅氏 妊婦有跌扑閃挫。遂致小產。血流紫塊。昏暈欲絕。屬血室損傷者。

人參 生黃芪 當歸 茯苓 紅花
丹皮 薑炭

【固氣填精湯】傅氏 妊婦有行房顛狂。遂致小產。血崩不止。屬氣脫者。

人參 黃芪 白朮 三七 熟地
當歸 黑荆芥

產後

名家驗方選

【生化湯】傅氏 新產之主劑。而血瘀之聖藥也。凡產後總以此湯爲主。亦宜隨症加減之。

當歸 川芎 桃仁 炙甘草 黑薑
用黃酒童便各半煎

（一方有人參大棗）

【清魂散】嚴氏 治產後氣虛血暈。

澤蘭葉 人參 川芎 炙甘草

荊芥穗（一方無甘草）

研末調下

【失笑散】驗方 產後瘀結心腹絞痛。血暈等症。

五靈脂 蒲黃

研末食前服

【安心湯】傅氏 產婦發熱。惡露不行。敗血攻心暈狂。屬血虛而心失養者。

當歸 川芎 生地 丹皮 生蒲黃
乾荷葉

【散結定疼湯】傅氏 產後少腹疼痛。按之愈痛。是有瘀血者。

當歸 川芎 丹皮 乳香 益母草
黑荊芥 山查 桃仁

【救敗求生湯】傅氏 少婦產後半月血崩

。昏暈目眩。屬犯房者。

人參 當歸 白朮 熟地 山萸

山藥 棗仁 附子

【生乳丹】傅氏 婦人產後乳汁不下。屬

氣血二虛者。

人參 生黃芪 當歸 麥冬 木通

桔梗

七孔豬蹄水煎

【兩收湯】傅氏 婦人有產後。尿道中出

肉線一條。長二三尺。動之則疼痛欲

絕。帶脈之虛脫者。

人參 白朮 川芎 熟地 山藥

山萸 芡實 扁豆 巴戟 杜仲

白果

【小柴胡湯】金匱 新產後大便堅。嘔不

能食。主之。

柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

生姜 大棗

【枳實芍藥散】金匱 產後腹痛。煩滿不

得臥主之。

枳實炭 芍藥

【下瘀血湯】金匱 產前腹痛。法當以枳

實芍藥散。若不愈者。此為腹中有乾

血。著臍下。主之

大黃 桃仁 蟬蟲

【竹葉湯】金匱 產後中風。發熱面正赤

。喘而頭痛

竹葉 葛根 防風 桔梗 桂枝

人參 甘草 附子 大棗 生薑

【白頭翁加甘草阿膠湯】金匱 治產後下利虛甚。

白頭翁 黃柏 黃連 秦皮 甘草

阿膠

【蜀椒湯】千金 治產後心痛。此大寒冷所爲。

蜀椒 芍藥 當歸 半夏 甘草

桂心 人參 茯苓

加生姜蜜煎。

【人參當歸散】局方 治產後去血過多。

血虛內熱。心煩短氣。頭疼體痛。

麥冬 肉桂 人參 當歸 乾地黄

芍藥

【芎藭散】聖濟 治產後血塊攻心。腹痛。

川芎 當歸 柏葉 肉桂 大黃

帶下

證解 內經謂帶脈者。如帶橫束於

腰。故婦人患帶下者。其腰恆痠。此

帶下之所以名也。古書有帶下卅六疾

。謂十二癥、九痛、七害、五傷、三

固是也。帶爲婦人生殖器中一種分泌

。經爲應有之物。帶非應有之物。然婦女有此者爲多。儘有健體無病而患帶下者。通常帶下。無論屬虛寒。屬濕熱。多起於肝鬱者。虛寒者。屬肝屬腎。濕熱者。屬肝屬脾。肝宜條達。脾宜升燥。腎宜補澁。有色如濃米泔水者。濕熱也。宜以蒼白朮、黃柏、黃芩、半夏、車前、升麻、柴胡之類。有色如雞子白者。腰脚痠。面浮腫。脾腎虛。宜以歸脾湯八味丸之類。又有憂愁鬱怒。傷乎肝脾。血不歸經。則患赤白帶下。當疏肝補脾。宜以補中益氣湯。加茯苓、山藥、麥冬

、杜仲、牡蠣、牛膝、海螵蛸、之類。又有陰虛火盛者。宜以六味丸加五味子、枸杞、菟絲子、車前子之類治之。

名家驗方選

【完帶湯】傅氏 濕熱盛而患白帶。屬脾屬肝者。

白朮 山藥 人參 白芍 蒼朮

甘草 陳皮 柴胡 車前子

黑荆芥

【側柏樗皮丸】尊生 治七情所傷白帶下

側柏葉 白朮 白芍 白芷

椿根皮 香附 川連 黃柏

【膠艾四物湯】局方 治赤帶

歸身 川芎 熟地 白芍 阿膠

艾葉

【清肝止淋湯】傅氏 婦人憂思傷脾。又加鬱怒傷肝而患赤帶下者。

當歸 白芍 生地 阿膠 丹皮

黃蘗 香附 牛膝 紅棗 小黑豆

【妙香散】蘇沈良方 治心氣不足。精神恍惚。驚悸鬱結。虛煩少寐盜汗。亦治帶下。

人參 炙甘草 桔梗 山藥 茯苓
茯神 遠志 黃芪 木香 硃砂

麝香

研末酒下

【易黃湯】傅氏 濕熱盛。而其氣腥穢之黃帶下者。

山藥 芡實 白果 黃蘗 車前子

【逍遙散加減】傅氏 肝鬱溼熱而其腥臭特甚之青帶者。

柴胡 陳皮 白芍 甘草 茯苓

茵陳 梔子

【延胡苦楝湯】尊生 治大寒帶下

延胡 苦楝子 黃柏 附子 肉桂

甘草 熟地

【桂附湯】東垣 白帶腥臭。多悲不樂大

寒。

肉桂 附子 黃柏 知母

【元戎六合湯】尊生 治赤白帶下。脈沈

微腹痛。或陰中痛。

當歸 川芎 熟地 白芍 附子

肉桂

(一方無附子有茴香)

【白芷散】婦人良方 治赤白帶下者。

白芷 海螵蛸 煨胎髮

【苓朮菟絲丸】景岳 治脾腎虛損婦人帶

下。

茯苓 白朮 菟絲 山藥 蓮肉

五味子 杜仲 甘草

【龍胆瀉肝湯】東垣 治帶下起於肝經屬濕熱者。

龍胆草 澤瀉 生地 木通

車前子 當歸尾 山梔 黃芩

甘草 柴胡

(一方無柴胡一方加赤苓生姜)

【震靈丹】魏夫人方 治婦人氣血不足。

崩漏。帶下。虛損子宮寒冷無子。

禹餘糧 代赭石 硃砂 紫石英

赤石脂 乳香 五靈脂 沒藥

研末糯米粉打糊丸。枵腹醋湯下。孕

婦忌服

崩漏

證解

內經云。任脈通。太衝脈盛。則月事以時下。太衝脈衰。則天癸竭絕。今謂輸卵管爲任脈之一部份。卵巢之分泌液是曰天癸。子宮黏膜內毛細血管破裂外出之血液。皆由大動脈而來。衝脈爲大動脈。假使卵巢萎頓。則月事不行。卵巢爲病。則月事淋漓。子宮內膜靜脈血管破裂。則爲漏下。動脈血管破裂。則爲崩中。女子由天癸通後。經行準確。可無崩漏之患。若憂鬱發怒太過。則傷肝。操

心思慮。恐怖煩惱太過。則傷脾。房勞強力操作。則傷腎。氣血不能調和。則傷衝任。因不能約束其經血。使之如期而下。故或積久。或不須積久。足使漏下。涓涓不塞。以致血崩者。初見崩漏。治宜四物調十灰散。血止宜涼血地黃湯。血已盡止。裏熱盡除。治以加味補中益氣湯之類。善其後也。

名家驗方選

【補中益氣湯】東垣 治脾胃虛弱。致中氣不足。而崩漏者。

人參 黃芪 白朮 當歸 炙甘草

橘皮 升麻 柴胡

加姜棗煎

【歸脾湯】濟生 治思慮傷脾。不能攝血。而崩者。

人參 黃芪 白朮 當歸 茯苓

遠志 龍眼肉 棗仁 木香

炙甘草

【當歸芍藥湯】東垣 婦人勞役傷脾胃。虛弱崩中漏下。

當歸 白芍 黃芪 陳皮 炙甘草

柴胡 生熟地 蒼白朮

【涼血地黃湯】東垣 治婦人陰虛腎虧。

而血崩者。

生地 歸尾 川連 黃柏 知母

蘘本 川芎 升麻 防風 羌活

黃芪 細辛 荆芥 炙甘草 柴胡

黃芩 蔓荊子 紅花

【伏龍肝散】局方 治崩因氣血勞傷。衝任脈虛。腹痛五色垢穢雜下。

川芎 伏龍肝 艾葉 甘草

赤石脂 熟地 麥冬 當歸 乾薑

肉桂 紅棗

【固本止崩湯】傅氏 婦人血崩昏暈。屬虛者。

熟地 白朮 黃芪 當歸 黑薑

人參

【加減當歸補血湯】傅氏 婦人經斷後。

血崩昏暈。屬虛耳。或犯房所致。

當歸 生黃芪 三七根 桑葉

【養血平肝散】尊生 治盛怒傷肝血崩

當歸 白芍 香附 青皮 柴胡

川芎 生皮 甘草

【平肝開鬱止血湯】傅氏 婦人肝氣之鬱

結。而血崩者。

白芍 柴胡 白朮 丹皮

炒黑荆芥 生地 當歸 甘草

三七根

【柴胡調經湯】準繩 治婦人漏下。鮮血

。熱服取汗立止。

羌活 獨活 升麻 藁本 蒼朮

柴胡 葛根 當歸 炙甘草 紅花

【金華散】張璧 治血室有熱。而崩漏不

止。服溫藥不效者。

延胡 瞿麥 當歸 丹皮 乾薑

石膏 桂心 威靈仙 蒲黃

研末空腹服

【丁香膠艾湯】東垣 治崩中漏下。

當歸 白芍 熟地 川芎 丁香

艾葉 炒阿膠

【鹿茸丸】準繩 治崩漏。因風冷客乘胞

中。

鹿茸 赤石脂 艾葉 柏葉

禹餘糧 附炮子 當歸 熟地

川斷

蜜丸空腹服

【調經升陽除濕湯】準繩 治婦人漏下惡血。暴崩不止。

黃芪 蒼朮 羌活 防風 藁本

柴胡 升麻 炙甘草 當歸

蔓荊子

【小薊根湯】婦人良方 治崩漏不止。血

明如水。（小薊莖葉搗汁）

鮮生地汁 白朮

水煎

癥瘕

證解 癥瘕之爲病。迺血凝病也。

多起於婦人月經及崩漏之後。轉變而成者。臍下積塊堅而推之不動者爲癥。或聚或散推之活動者爲瘕。古人以婦人瘕症有八方。癥症有二方。其脈證治法並載方首。茲不多贅。

名家驗方選

【血瘕方】此證留着腸胃之外及小腹間。橫骨有積氣。堅牢如石。少腹急痛。陰中若有冷風。或背脊痛。腰疼不

可俛仰。多因行經未盡。飲食過度。血留於經絡所致。

乾薑 烏鬍骨 桃仁

共研末酒調服

當歸 大黃 山萸 皂莢 細辛

戎鹽

共研末以豬脂棟如手指大。包在綿裏納陰中。正坐良久。瘕當下。餘如桃仁煎可酌用之。

【脂瘕方】此證多起於月經初來。及產後未滿月而犯房所致。伏在脂膜間。猝難踪跡。腰背如刺。左右腹中劇痛。少腹沈重。大小便血。時有時止者。

皂莢 礬石 五味子 蜀椒 細辛

乾薑

研末。香脂和膏。敷其夫生殖頭上。與之交媾。數次即可愈。

【燥瘕方】此證狀如杯下覆。遊移腹中定。痛連兩脅。胸及腹中不得太息。兩脚痠楚。遺尿失精。便難盜汗。妨於飲食。時欲嘔吐。多起于暑月行經時。勞役恚怒所致。

大黃 乾薑 黃連 炙雞內金

桂心 廕蟲 厚朴 郁李仁

研末。每早空腹溫酒調下。瘕當下。

【黃瘕方】皂莢散局方此證左脅下有氣。堅結不可抑。腰背徹痛。少腹急結不得小便。多起于月經行時。感冒風邪所致。

皂莢 蜀椒 細辛

搗散蜜調長二寸。絹布貯之。納陰中。小便時取出。已則復納之。惡血畢出。此時勿近男子。

【青瘕方】此證腰下急痛。腹中氣衝。面色萎黃。四肢腫。二便難。唾涎納呆。多起于新產後盥洗太早所致。

戎鹽 皂角 細辛

搗散蜜調如指大長三寸。絹作袋。納

藥袋中。納入陰中。但仰臥。瘕當下。

【狐瘕方】此證少腹瘀滯。胸脅腰背引痛。陰中腫。小便難。不能受精。四肢無力。嗜食欲嘔。喜吐如有孕狀。多起于經行時。悲哀驚恐過度。或行路遇暴風疾雨所致。

宜取新死鼠一枚裹以新絮。塗以黃土。穿地爲坎。厝鼠於中。上用桑柴火灼一日夜。取出研末，加桂心末二錢五分。酒調服二方寸止。病當下。甚者再服即差。

【蛇瘕方】此證在臍上下。或左右脅。

其形長大。上犯心肝。令人不得吐氣。腰背痛。難以動作。少腹熱。膀胱引陰攣急。小便黃赤。兩股脛間時痛。多起于月經適止。誤吞蛇鼠之精所致。

大黃 黃芩 芒硝 炙甘草

烏鰂骨 皂莢

水煎數沸。去滓下硝。適寒溫服之。十日一劑。空腹時服。

【龍瘕方】此證形大如杯。腹中竄走。或按之跳躍。或有若無。腰背引痛。不可以息。經閉不通。面目黃黑。多起於經水將淨。入水澆浴。感受水

中精邪所致。

大黃 乾薑 側子 附子 人參
廬蟲 桂心 細辛 土鉏 白朮
研末酒方寸止。日三次。

【血瘕方】尊生蓄血成瘕。因體質虛弱。起居飲食失節。或受寒。或飲食不化。循環系阻礙。結而成塊。亦有因跌仆。氣凝而血亦隨結。壅於經絡而成塊者。

五靈脂 大黃 甘草梢 桃仁泥
生地 牛膝 官桂 玄胡索 當歸
三稜 蓬莪茂 赤芍藥 川芎
琥珀 乳香 沒藥

研末酒煎米糊和丸。熱湯送下。

【食癥方】烏藥散 婦人大全 食積成癥。因食生冷黏滯等物。脾胃虛弱。不能運化。膠滯其間。循環系阻礙。積聚成塊。漸漸長大。堅硬不移。血氣上攻心痛者。

烏藥 蓬莪茂 桂心 當歸 桃仁

青皮 木香

研末熱酒調下

兒科驚風 慢驚

證解

驚風之壯熱。手足抽搐神昏。目睛歧視。牙關緊閉。面色發青。

角弓反張等證。與腦膜炎相同。其不同之點。腦炎為流行性。驚風則非流行性。有起於飽食之後感寒發熱而為驚風者。是胃神經起反應為病。有起於飽食之後。而遇驚怖為驚風者。是交感神經節遇阻力為病。有傾跌驚怖為驚者。是延髓之神經系為病。有熱病痧疹未傳為驚風者。是因藥誤熱陷深入於腦。波及神經為病。驚風者。古人為癘。亦即傷寒論中之癘。由熱病轉屬而來者。治熱為主。凡治熱之方。當以傷寒法為主要。熱已入腦。神經緊張。為驚風已成者。當以弛

緩神經爲主。參腦炎編可知也。
慢驚是虛證。睡則露睛。身冷。口鼻
氣出亦冷。手足抽搐時作時止。神情
萎靡。啼聲異常如貓嘶。爲慢驚。其
病後虛甚。或由吐瀉。脾胃虛損而成
者。慢驚又曰慢脾。故急驚者。病之
屬熱屬實者。治法不外乎清涼爲主。
慢驚者。病之屬寒屬虛者。治宜溫補
。須用參、附、朮、苓、之類爲主

名家驗方選

【涼驚圓】錢乙治小兒驚風。

胆草 防風 青黛 鉤尖 黃連

牛黃 麝香 龍腦

麵糊爲丸。金銀花湯下。

【瀉青圓】錢乙治肝熱搐搦脈洪實。

當歸 龍腦 川芎 防風 梔子

煨大黃 羌活

【地黃丸】崔氏治腎怯失音。頤閉不合

。神不足。目中白睛多。面色皛白等

熟地 萸肉 山藥 澤瀉 牡丹皮

白茯苓

【導赤散】錢乙治小兒心熱視其睡目中

氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也心
氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之

意故合面睡

生地 木通 甘草 竹葉

(一方不用甘草有黃芩)

【益黃散】錢乙 治脾胃虛弱及治脾疳腹

大身瘡

青皮 陳皮 丁香 炙甘草

炮訶子 又名補脾散

【利驚丸】準繩 治痰熱急驚風

青黛 輕粉 天竺黃 牽牛末

麵糊爲丸。薄荷湯下。

【大青膏】準繩 治小兒熱盛生風。欲爲

驚搐。血氣未實。不能勝邪。故發搐也。大小便依度。口中氣熱。當發之。

天麻 白附子 青黛 蠟尾
烏梢蛇肉 硃砂 天竺黃

(一方有麝香)

研爲細末。蜜和成膏。

【牛黃膏】張渙 治小兒驚疳

牛黃 左牡蠣 人參 炙甘草

辰砂 雄黃 龍腦

研末蜜和成膏

【蛇黃丸】錢乙 治小兒驚癇

蛇黃 鬱金 麝香

【至寶丹】局方 治諸癇。急驚。心熱。

卒中。客忤不得眠睡。煩躁。風涎搐搦。

生烏犀屑 生玳瑁屑 琥珀 硃砂

雄黃 金箔 銀箔 龍腦 麝香

牛黃 安悉香

【截風丹】尊生 治急驚風

白附子 全蠍 殭蠶 南星 天麻

硃砂 蜈蚣 麝香

研末蜜丸。銀花薄荷湯下。

【截驚丸】準繩 治驚風搐掣。煩躁有熱

。二目上視。口噤牙關。

龍胆草 防風 青黛 鈎藤 黃連

牛黃 甘草 硃砂 薄荷 麝香

【抱龍丸】局方 治小兒驚風抽搐

胆星 天竺黃 雄黃 辰砂 麝香

(一方有全蠍)

【龍膽湯】千金 治嬰兒出腹。寒熱溫壯。四肢驚掣。及變蒸不解。諸驚癇悉主之。

龍膽 鈎尖 柴胡 黃芩 桔梗

芍藥 茯苓 甘草 蟻螂 大黃

【胡黃連散】聖惠 治小兒驚熱不退。

胡黃連 牛黃 朱砂 犀角 麝香

【張渙烏蛇散】幼幼 專治一切風癇。角

弓反張。潮搐甚。

烏蛇 白附子 半夏 天麻 姜蠶

人參 全蠍 羌活 石菖蒲 附子

加生姜、薄荷、煎。

【羚羊角湯】直指 治諸驚壯熱。

羚羊角 蟬殼 黃芩 甘草 茯神

麥冬 柴胡 地骨皮

【犀角湯】直指 治心熱盛。驚癇。

犀角 防風 木通 茯苓 桑白皮

甘草

【牛黃丸】準繩 治風癇虛乏。痰在胸膈

。迷悶抽掣。

牛黃 麝香 虎睛 蛻螻 犀角屑

安息香 獨活 抱茯神 遠志

炙甘草 防風 人參 鐵粉 硃砂

龍齒

研末蜜丸

【天麻丸】直指 治小兒食癇有痰。撮口抽搐等。

天麻 白附子 馬牙硝 川靈脂

全蠍 天南星 輕粉 巴豆霜

薄荷或姜湯下

【鈎藤飲】準繩 治小兒脾胃氣虛。吐利虛風。驚風天釣。卒然驚悸。身熱足冷。

鈎藤 防風 人參 蟬殼 麻黃

白殭蠶 天麻 蠟尾 甘草 川芎

麝香

加生姜煎

【安神鎮驚丸】準繩 安心神養氣血。爲

急驚風善後。

天竺黃 人參 茯神 天南星

酸棗仁 麥門冬 當歸 生地

赤芍藥 薄荷 木通 黃連 山梔

辰砂 牛黃 龍骨 青黛

研末蜜丸。赤金箔爲衣。姜湯下。

【牛黃丸】羅氏 治急慢驚風。

白花蛇肉 全蠍 白附子 生川烏

天麻 薄荷

以上六味先爲末後藥另研加入

雄黃 硃砂 冰片 牛黃 麝香

以上五味各研

與前藥和勻另用麻黃去根酒煎去渣。

入前藥末。熬令勿焦。密藏薄荷湯下

以上主治急驚方

【宣風散】錢乙 治小兒慢驚

檳榔 陳皮 甘草 黑牽牛

研末蜜水調食前服

【青州白丸子】局方 小兒驚風痰盛泄瀉

。

半夏 天南星 白附子 川烏

糯米粉煎粥爲丸姜湯下

【羌活膏】準繩 治小兒病後脾胃虛。或

吐瀉後爲慢驚。

羌活 防風 川芎 人參 白附子

赤茯苓 天麻 白殭蠶 乾蠍

白花蛇 川附子 麻黃 沈香

丁香 肉荳蔻 藿香 木香 輕粉

眞珠末 牛黃 龍腦 麝香 辰砂

雄黃

研末蜜丸薄荷湯下

【金液丹】局方 小兒脾胃虛寒。吐利。

肢厥。神昏。多睡露睛。口鼻氣冷。

將成慢驚。

舶上硫黃

研末水飛。入沙罐內。水調赤石脂封

口。鹽泥固濟。候乾坦地坑。慢火七

日夜。用炭十斤爲度。候冷乳鉢中研

。糊爲丸。姜湯下。

【括蕪湯】綱目 治慢驚。有陽症者。

括蕪根 白甘遂

麝香薄荷湯調下

白甘遂卽蚤休亦卽草河車也

【醒脾丸】本事 治小兒慢脾風。或吐利

後虛困昏睡。

厚朴 白朮 天麻 硫黃 全蠍

防風 官桂 人參

研末爲丸。米湯送下。

【毛彬銀白散】幼幼 治小兒脾胃虛弱。

吐瀉。成慢脾。

乾薑 人參 茯苓 山藥 白扁豆

半夏 糯米

加薑煎

又玉訣。四君子湯。加扁豆、藿香。

名銀白散。生胃氣。

【烏沉湯】直指 治慢驚。驅風助胃。

天麻 人參 川烏 全蝎 南星

木香 沈香 甘草

加姜煎。此沈香天麻湯之祖方。

【沈附湯】直指 治慢脾風。厥冷吐瀉。

沈香 丁香 木香 藿香 黑附子

白附子 全蝎 天麻

【參附湯】類萃 治元氣虛脫。將成慢驚

大附子 人參 丁香

加薑煎

【加味回陽散】大還 治慢驚面青。四肢

逆冷。泄瀉不止。

人參 白朮 茯苓 甘草 山藥

附子 赤石脂 殭蠶 全蝎

姜湯調下

以上主治慢驚方

腦脊髓膜炎

證解 瘰後腦痠、頭痛劇烈、抽搐

神昏、頭向後仰、曲如黃瓜、後腦延

髓緊張之證。多起於氣候燥。寒暖不

常。致肝陽胆火上燔。熱易入腦。西

醫謂之流行性腦脊髓膜炎。初起發熱

。嘔吐。骨楚等症。病情與傷寒相似。故傷寒論。謂瘧濕暍與傷寒相濫。瘧卽今之流行性腦症。其證狀。可分四期。曰惡寒期。曰發熱期。曰危險期。曰不治期。四期中除不治期外。其餘三期。治之得當。奏效如神。今將證狀及治法。分析於后。爲治瘧之步驟。

【加減仲景麻黃湯】惡寒期 初起憎寒發熱。頭痛如劈。痛時連及後腦。遍體骨楚。病在淺層。當先解表爲主。

麻黃 桂枝 杏仁 炙甘草 葛根
秦芫 研冲胆草

【增損仲師葛根芩連湯】發熱期 惡寒已。壯熱有汗而渴。唇絳舌乾。禁麻桂。宜此湯爲主。却於二方中均加胆草三四分。則腦症便不得進行。而熱病得麻桂葛。書然而解。

葛根 淡芩 川連 炙草 茅根
桑葉 蘆根 杏仁 防風
研冲胆草

【損益犀角地黄湯】危險期 發熱期治之不得法。或未經治。則熱侵神經系。凡熱皆上行。上行則侵入腦部。延髓爲神經總匯之區。熱邪上行。則神經受其熏灼而緊張。此時卽見頸項強直

。甚則頭向後仰。爲脊髓膜發炎所致。其神志昏糊。卽知識神經受病。手足痙攣。運動神經亦病。其目睛上視或歧視。或牙關勁強而不得開張者。則滑車神經並頰車神經皆病。在發熱期。未見神經證時。以退熱爲主。此時熱雖壯。當以弛緩神經爲主。苦寒降熱佐之。

磨冲烏犀尖 研冲胆草 川連

赤芍 鮮生地 滁菊 歸身

去毒灸研冲蠟尾

回天丸藥化服一粒
安腦丸一粒藥化服

【不治期】在危險期中尙可設法挽救。

失治及至不治期。如脣焦舌黑。齒乾如枯骨。頭向後仰。身體成弧形。手足蹇縮。時作痙攣。口不能言。却作馬鳴。或滿口糜爛。臭不可近。或見紫紅斑紋。神志全失。氣喘不續。或大汗涔涔。脈搏悉亂。心肺腦三部皆壞。敗象悉見。是必死之候。故曰不治期。危險期尤忌鉦鼓聲。犯之必增劇。

在發熱期以退熱爲主。切不可早予香藥。如同春丹、玉樞丹、紫雪丹、至寶丹、牛黃清心丸等。若誤投香藥。

勢必引邪入腦。而瘧厥神昏立見。且由熱病轉屬腦症者易治。誤藥而成者難救。

【安腦丸】惲鐵樵先生 凡手脚瘳攣抽搐。面色發青。兩目上視。後腦發癢。項反折。此是腦脊髓膜緊張之故。此丸弛緩神經有特效。

金錢白花蛇六條去頭隔紙烘研篩

全蠍三錢 白附子一錢五分

薄荷三錢 梅片三錢 生川烏二錢

天麻三錢 明雄二兩 獨活五錢

犀黃一錢五分 元寸一錢

麻黃二兩 陳酒熬膏

如無金錢白花蛇真蕪蛇可代

如用真蕪蛇約須六錢

安腦丸回天丸發售處上海雲南路惲鐵樵醫寓

【回天丸】惲師訂 凡中風猝然昏迷。手脚抽搐。有兩目上視者。有手握者。亦有手開張者。有便溺不禁者。亦有無便溺者。又治小兒腦症。此丸皆有特效也。

蕪蛇四兩 姜黃二兩 首烏二兩

香白芷二兩 龜腹版一兩

川芎二兩 粉葛根二兩五錢

淡全虫二兩五錢 黑犀角八錢

冰片二錢五分 土藿香二兩
熟附子一兩 炙乳香一兩
玉桂心二兩 川貝母二兩
製香附一兩 杭青皮一兩
穿山甲二兩 川黃連二兩
錦紋大黃二兩 京赤芍一兩
兩頭尖二兩 姜蠶一兩
沉水香一兩 虎脛骨二兩
北細辛一兩 廣三漆一兩
冬白朮一兩 青防風二兩
炙黃芪二兩 當門子五錢
西牛黃二錢五分 全當歸二兩
蘇黃二兩 天竺黃一兩

白茯苓三兩 元參二兩
大熟地二兩 山羊血五錢
松香五錢 威靈仙二兩
川羌活一兩 台烏藥一兩
桑寄生一兩五錢 白蒞仁二兩
上血芫八錢 母丁香一兩
飛辰砂一兩 紅糶八錢
明天麻二兩 粉甘草二兩
廣地龍五錢 草豆蔻二兩
骨碎補一兩 明沒藥一兩
右藥研末蜜丸每粒重一錢二分孕婦忌服
民十九春。滬上流行性之腦膜炎盛行

。憚鐵樵先生治愈之成績。超乎西醫名聞江浙。茲錄分送之傳單於左。

流行腦炎效方及說明

腦炎本西名。在中國覓相當名詞。可說是瘧。近有據金匱反駁此語者。謂金匱有汗爲柔瘧。無汗爲剛瘧。今之腦炎。柔乎。剛乎。又金匱治瘧用葛根刮蕪實。今之腦炎。可以葛根刮蕪取效乎。爲此語者。彼自無精密之研究。須知金匱風病所傳之方均不確。不止此一條。卽如中風用侯氏黑散。風引湯。續命湯。何曾有好效果。故知金匱不足據。當據千金方。千金方

風病門。瘧病條下所說。織屑畢合。文繁不俱贅。現在腦炎有兩種。一種得病後目上視。偏身抽搐。昏不知人。牙關勁強。西名謂之大腦炎。亦謂之急性腦膜炎。十餘鐘。至二十四鐘便死。此種以中國病名合之。如小孩之驚風。成人之中風。其病在頭腦之中樞神經。及胸前之神經節。故患此病者。於上述種種症狀外。必兼有氣喘。因神經節所統之交感神經。連肺系也。又一種西人謂腦脊髓膜炎。其病在後腦之延髓膜緊張縮短。故患此者。頭必後仰。並非角弓反張。角弓

反張。是全軀體反張作弧形。此則顫項彎曲如黃瓜。亦目上視。神昏抽搐。惟不如大腦之甚。熱不甚壯。脈不甚數。因延髓中迷走神經興奮之故。迷走神經本所以制動。故此神經緊張。脈反不速。現在流行症。以此種爲多。古無治法。病名是瘥。(或謂瘥之字形近瘥。殆傳寫之訛。其實不然。瘥訓惡病。徐靈胎謂患此症者。百無一生。可知古人已見此種病。特無治法耳。)患此病者。多兼肝陽。參用川連胆草。苦以降之。收效極良。可於二十四鐘內。完全除去其病。此

次之疫。因氣候太燥熱。無論受寒受熱。皆得發此病。胆火上燔。頭則脹痛。受熱者。直接上行。受寒者。化熱之後上行。若用重藥鎮之。則反應而氣反上衝。惟用苦降。則其效捷于影響。此其大略也。方如下。

胆草五分 滌菊三錢 鮮生地五錢

犀角三分 歸身三錢 川連三分

回天九半粒 人參再造丸亦可用

右七味爲必用要藥。其餘可以隨症加減。胆草不得過七分。否則反化火。歸地滌菊。卽爲胆草而設。若單獨用胆草。則嫌尅伐。且不能取效。犀角

所以弛緩神經。且與胆草協調。則升清降濁。回天丸所以開閉。亦所弛緩神經。他種香藥。如紫雪丹。回春丹。祇能洞開門戶。則邪深入。無弛緩神經之作用。不適用也。一劑不足。則繼進一劑。以有知爲度。若遇大腦炎。則須重用羚羊。亦不過二分。且羚羊只用一次即得。凡犀羚。回天丸。必須見抽搐之後方可用。若僅僅發熱。後腦痠。頭痛。於尋常疏解藥中。加胆草二三分即得。不得遽用丸藥。及犀羚。

松江用此方。已救好多人。上海正風

中學。試用此方。亦甚驗。余因其神效。倩手民印刷多張。分致各埠。願善人君子。輾轉傳佈。以救浩劫。

靈護室主人印送

天花 痧子

證解 天花俗名出花。醫書謂之天痘。爲極危險之病。至發明種牛痘法後。遂少天花。但父母往往溺愛兒女過甚。致生數月後仍未及種痘。適春秋天花流行時令。突然傳染。其證狀。可分六期。第一期爲發熱期。發熱欬嗽。與流行性感冒相同。與出痧疹

之前兆亦同。目珠含潤。呵欠噴嚏。第二期爲發斑期。頭面見點。以次及於上半身。遍及週身全有。此二期約各三天。六天之後。第三期爲發蕾期。斑點逐漸擴大。中心高起。其形圓整。第四期爲水泡期。疹點頂漸變透明。形同水泡。此二期約六天。第五期爲化膿期。水泡變黃。漸化爲膿。第六期爲結痂期。膿色漸乾，而結痂蓋。此二期亦約六天。嗣後痂蓋漸脫而病愈。以上除痂蓋脫無險外。其餘每期三天。三六十八天。天天在危險中。初起第一期至二期。治宜辛涼透

達。兼之宣肺。如荊芥葛根、茅根、薄荷、連翹、象貝、杏仁、等。第三期若其根脚不紅。及第四期之頂不飽滿。色澤晦滯。根脚淡無血色者。治宜於清熱解毒方中酌加活血。如紅花川芎等。至第五期。若膿不厚黃塌陷不圓湛清稀。此時用藥切忌寒涼。治宜溫托之。如黃芪、黨參、白朮、鹿角霜、鹿茸、等。至六期。用藥不過清補化毒。如人參、歸身、白朮、白芍、甘草、銀花等等。

痧子。又名麻疹。景岳云。在蘇松曰痧子。在浙江曰瘡子。在江右湖廣曰

麻。在陝西曰膚瘡。在北直隸曰疹子。名雖各異。其證則一。但天花不常有。痧子乃常有。天花經種牛痘可以避免。痧子則無避免預防。且天花出過一次。終身免疫。痧子則不然。或有再度出者。其天花之危險。雖有高手。十不過愈半。若兼先天惡因。則百無一生矣。痧子初起治之得法。可以百不失一。其證狀。初起欬嗽。鼻流清涕。與流行性感冒傷風相似。目珠含潤。流淚噴嚏呵吹。繼而發熱。目赤。神疲。迷寐。如此者。三四日面部胸背皆見疹點。初則稀疏。逐漸

密佈。遍及週身四肢。見點大約三四天。逐漸隱回。熱亦退清。初起發熱欬嗽。治法宜解肌宣肺。如葛根、連翹、薄荷、茅根、象貝、杏仁、桑葉、橘紅、等。切忌驚藥。如同春丹、保赤散等。見咽喉紅腫而痛。宜以大力子、馬勃、元參、桔梗等。見發熱無汗氣喘煩躁。宜以麻黃、石膏、見壯熱煩渴引飲。宜人參白虎。見證圖治。庶無差失也。

名家驗方選

【桂枝加葛根湯】仲景脈證治法

見

傷寒門第
17方首

有汗憎風。項背強几几。

桂枝 芍藥 炙甘草 生姜 大棗

葛根

【升麻湯】準繩 治發熱頭痛肢冷。脈數

陽明經邪熱下利。及痘疹初起。或在

疑似之間。

升麻 白芍 炙甘草 葛根

加生薑、葱白、莖煎。

有汗加桂枝。無汗加麻黃。熱甚加芩

連。舌乾紅絳起刺如楊梅狀者。參用

犀角、生地。大便溏瀉加扁衣、芡實

。小溲短赤方通豬苓。凡初起。以此

湯加減甚驗。

【大青湯】準繩 治熱毒發斑。

大青 玄參 生地 石膏 知母

木通 甘草 地骨皮 荊芥

(一方無地骨皮)竹葉

【紫草散】孝忠 治痘疹血熱口渴。黑陷

不能起發。

紫草 炙甘草 糯米一撮 黃耆

(此散係保元湯去參易紫草)

【紫草快癍湯】準繩 治痘疹血氣不足。

不能發出。色不紅活。

紫草 人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 芍藥 木通 甘草 糯米

水煎

【紫草木香湯】準繩 治痘出不快。裏虛癢塌。黑陷發熱。大便泄利。

紫草 木香 茯苓 白朮 甘草

(一方無甘草)

加糯米。脾氣虛者加人參。

【紫草木通湯】準繩 治痘症行漿時。氣虛血熱。小便不利。

紫草 木通 人參 茯苓

糯米一撮 甘草

【人參白虎湯】驗方 治麻證熱渴。又治痘疱。赤黑出不快。

人參 石膏 知母 防風 升麻

牛蒡 黃芩

口渴甚者。用茅根去心。及西河柳代茶。

【化斑湯】準繩 痘瘡夾斑。外治法。

薄荷 楊柳 荆芥 蒼耳草

水煎去渣將髮(滾湯洗去油垢)團攏。

徐徐浴之。痧子面部見點不多。用芫荽菜(即香菜)一大撮泡湯。以毛巾蘸濕向面部輕輕熨之。連續熨至面部疹透爲度。

【清咽滋肺湯】醫通 治麻疹出透回後。有餘熱欬嗽者。宜此湯。

玄參 麥冬 炙甘草 玉竹

牛蒡子 荆芥 貝母 桔梗

括囊根 馬兜鈴

痰多去麥冬加橘皮

【甘露飲】局方 解胃熱。及瘡疹已發。

餘熱仍壯。齩齒宣腫。牙痛不能嚙物

。飲而不欲食。煩熱身黃。及病瘡

。乳母俱可服之。

鮮枇杷葉 乾熟地黃 天門冬

枳殼 茵陳 生乾地黃 麥冬

石斛 炙甘草 黃芩

疳積

名家驗方選

【四靈圓】聖惠 治小兒五疳。

大蟾 一枚去腸雜入胡黃連末腹內

。以線縫合。外塗泥。置於

微炭火上炙存性。去泥更入

後藥

盧蒼 麝香 熊膽

研細末麵糊和圓

【麝香圓】聖惠 治小兒氣疳。壯熱憎寒

。腹脹下痢。皮膚乾燥。乳食不化。

日漸羸瘠。

麝香 熊膽 赤苓 胡黃連 盧蒼

京三稜 桂心 大黃 檳榔 當歸

木香 蜜丸

【大蘆蒼圓】直訣 治疳殺蟲。和胃止瀉。

蘆蒼 木香 青橘皮 胡黃連

黃連 蕪荑 雷丸 鶴虱 麝香

爲末粟米飯爲丸

【胡黃連丸】聖濟 治乳哺不節。或生冷

過度。下痢不止。面黃肌瘦。腹脹名

爲疳痢。

胡黃連 蕪荑 蘆蒼 麝香 巴豆

【劉氏蘆蒼丸】幼幼 治小兒疳疾。

蘆蒼 黃連 白朮 巴豆 使君子

蕪荑 飯丸

【朱氏肥兒丸】幼幼 小兒常服疳藥方。

蕪荑 黃連 神麩 麥蘖

【黃芪湯】直指 治疳勞。

黃芪 當歸 川芎 白芍 生地黃

蝦蟆 鼈甲 人參 茯苓 橘皮

半夏 柴胡 史君子 甘草

姜棗煎

【清胃養脾湯】回春 治小兒愛吃泥土。

乃脾胃虛所致。

黃芩 石膏 陳皮 白朮 茯苓

甘草

【消疳飲】濟世 治少兒疳疾。身熱面黃

。腹大青筋瘦弱。

人參 白朮 茯苓 甘草 胡黃連

神麴 黃連 青皮 陳皮
砂仁傷食加山查之類。有蟲加史君子
之類。

外科 瘰癧

名家驗方選

【益氣養榮湯】準繩 治懷抱抑鬱。或氣
血損傷。瘰癧結核流注。一切鬱熱毒
氣。潰爛不斂者。

人參 茯苓 陳皮 貝母 香附
當歸 川芎 黃芪 熟地 白芍
炙甘草 桔梗 白朮 柴胡

(一方無柴胡)

加生姜煎熱服

【補中益氣湯】東垣 治內傷勞倦。陰虛
而熱。凡屬脾胃虛弱。一切元氣不足
者。

炙黃芪 人參 炙甘草 歸身
陳皮 升麻 柴胡 白朮

加生薑棗煎

【經効犀角丸】外臺 療瘰癧。

犀角四分 升麻三分 大黃六分
牛旁子八分 炙烏蛇十分
玄參八分
右末之。蜜丸和梧子大。每日至午後
煎牛旁湯下。三十五丸。

【玉屑妙靈散】朱氏集驗 治癩癧。

滑石二兩。用靜江者。

右爲細末。每服二錢。米飲調下。若有琥珀。研細。濃燈心。湯服之。尤佳。良久旋下其物。正如剝皮子蒲萄肉。而瘡盡平復。

【單方】朱氏集驗 治癩癧。破與未破。及膿血淋漓。其効如神。

煨牡蠣八分 甘草二兩

右二味勻拌。每服二錢。食後以建茗同點。日二服。忌魚酒酢醬油鹽梅味等。此病多有人父子相傳至死。如服此藥。定並不疼痛。亦無吐痢。

【七賢散】纂要 治癩癧初起卽効。已潰速愈。

皂角。 皂角子 連翹 黃連

花粉 金銀花各一兩 土茯苓八兩

分七劑。每劑水五碗。煎二碗半。一

二日服完七劑。疾卽愈。

【芩連二陳湯】正宗 治痰癧。項間結核。腫而作痛。名曰馬刀初起者。

黃芩 黃連 半夏 陳皮 茯苓

甘草 桔梗 連翹 大力子 花粉

木香 夏枯草

加生姜煎服

【防風解毒湯】正宗 治風毒癩癧。耳項

結腫。痰凝氣滯。

防風 荆芥 桔梗 牛蒡子 連翹

甘草 石膏 薄荷 枳殼 川芎

蒼朮 知母各一錢

右燈心二十根水煎。

【連翹消毒飲】正宗 治熱毒瘰癧。腮項成核。或天行亢熱作腫。

連翹 陳皮 桔梗 玄參 黃芩

赤芍 當歸 山梔 葛根 麝干

天花粉 紅花各一錢 甘草五分

大黃初起便燥者加之

右水煎。有痰者。加竹茹一錢。

【必効散】精義 治久患瘰癧。不較服此

藥。取効如神。

南鵬砂二錢五分 輕粉一錢

麝香五分 斑猫四十箇去頭翅

巴豆五箇 白檳榔一箇

右同研極細。取鷄子清二箇去黃。調藥勻。却傾在鷄子殼內。濕紙數重糊定。無令透氣。坐飯甑內。與飯一處蒸。飯熟取藥。曝乾研極細末。用時相度虛實。並用炒生薑酒下。五更初服。

【夏枯草湯】正宗 治瘰癧

夏枯草 當歸 芍藥 紅花 柴胡

陳皮 茯苓 貝母 白朮 桔梗

生地 甘草 香附 白芷

先以夏枯草煎水。以水煎藥。

【玉燭散】寶鑑 治瘰癧。和血通經。連

服十日自消。

當歸 芍藥 甘草 川芎 熟地

芒硝 大黃 黃芩

加生姜煎

【芎歸養榮湯】正宗 治瘰癧流注。及一

切虛損之症。或不潰。或已潰不斂者

。當歸 人參 白朮 甘草 茯苓

川芎 黃芪 砂仁 遠志 牡丹皮

麥冬 熟地 白芍 五味子

姜棗煎

【消癧丸】瘍醫 治瘰癧

夏枯草 連翹 蓖麻仁

研末裝豬大腸內。二頭紮緊。酒浸蒸

爛搗丸。

【消核散】金鑑 治頸項痰凝瘰癧。

海藻 牡蠣 玄參 糯米 生甘草

紅娘子

研末溫酒調下。

【瘰癧疏肝丸】驗方 開鬱結。清肺熱。

滌痰火。消腫毒。由憂鬱而成瘰癧。

乳巖等證。

川貝母 茜根 生甘草 蒲公英

漏蘆 瓜蒌仁 柴胡 橘皮 茅茹
橘葉 茄蒂 連翹 兩頭尖 銀花
首烏 白菊花 地丁草

研末夏枯草煎湯泛丸。

【療癰結核丸】準繩 治癰癰。結核。

黃芪 玄參 苦參 牛蒡子 枳實

大黃 羚羊角 麥冬 連翹

青木香 人參 蒼耳子 升麻

茯苓 炙甘草 桂心 朴硝

研末蜜丸

【內消癰癰丸】瘍醫 治癰癰。

夏枯草 玄參 青鹽 海藻 貝母

薄荷 天花粉 海粉 白蘇 連翹

大黃 甘草 生地 桔梗 枳殼
當歸 硝石
研末酒糊丸。

【醫學心悟】治陰虛火盛。頸項間癰癰

。及一切痰核。

川貝母 玄參 左牡蠣

研末夏枯草湯泛丸。

【神效消癰丸】瘍醫 治癰癰

熟地 澤瀉 白茯苓 淮藥 山萸

玄胡索（一作玄參） 牡丹皮 牡蠣

研末蜜丸

【消核丸】尊生 治痰核

橘皮 赤茯苓 大黃 連翹 黃芩

山梔 半夏 玄參 牡蠣 天花粉

桔梗 瓜蒌仁 白殭蠶 甘草

研末爲丸。熟湯送下。

【二貝丸】純源 治痰癧

大貝母 紫貝天葵 海藻 海粉

明礬 硃砂

研末夏枯草熬膏爲丸

【海龍丸】瘍醫 治瘰癧

海藻 昆布 白茯苓 穿山甲

全蠍 龍胆草 歸身 桃核

(將全蠍嵌在核內合緊煨存性)

研末蕎麥打糊爲丸。早晚服。

【連翹散堅湯】東垣 治氣毒。瘰癧、馬

刀。已潰或未潰者。

連翹 莢茂 三稜 歸尾 土瓜根

龍胆草 柴胡 黃芩 炙甘草

黃連 蒼朮 赤芍

研末煉蜜爲丸

【消核膏】許梈。瘰癧外治法

甘遂 大戟 白芥子 麻黃 生南

星 殭蠶 朴硝 籐黃 半夏

熬膏貼之。膏上摻九一丹少許。未潰

者貼之甚效。「九一丹」金鑑 用煨石

膏九錢 黃靈藥一錢 研末

【陽和解凝膏】全生 專貼腦疽。背疽。

乳疽。凍瘡。瘰癧一切潰爛陰毒。外治法

牛蒡 川芎 白鳳仙梗 川附子

桂枝 大黃 當歸 肉桂 草烏

川烏 地龍 疆蠶 赤芍 白芷

白歛 白芨 乳香 沒藥 續斷

防風 荊芥 五靈脂 木香 香櫟

陳皮 蘇合油 麝香

右藥熬膏攤貼患處。若治瘧疾。貼背

脊第三節骨上。藥店中有現存製就

【千槌膏】瘍醫治瘰癧。初起貼之自消

。外治法。

杏仁 蓖麻仁 琥珀 冰片 珍珠

麒麟竭 當門子 乳香 沒藥

銅綠 黃丹 龍骨 輕粉 水安息

松香

熬膏用大紅緞攤貼。藥店中有出售此膏。

【大紅膏】瘍醫治瘰癧。痰核。結塊。未潰者。外治法。

石灰（大黃同炒石灰紅色去大黃）

乳香 輕粉 銀硃 血蝟 潮腦

硝石 天南星

研末熬稠。調藥敷核上。三日一換。

敷後皮損者。另換紫霞膏。

【紫霞膏】瘍醫治瘰癧初起。外治法。

松香 銅綠

研末熬膏貼之。瘰癧未成者自消。摻

梅花冰片膏上貼之。

【癩癧膏】瘍醫 癩癧外治法。

金線釣蝦蟆 蓖麻子仁 商陸

天南星 半夏 露蜂房 防風

蛇蛻 大黃 土木鼈 穿山甲

番木鱉 射干 川烏 草烏 枳殼

當歸 紅花 白芷 殭蠶 紫花

地丁 天葵 雄鼠 乾蟾 芫花

巴豆肉 急性子 鯽魚

用麻油浸七日。熬枯去渣。復入淨鍋內。熬至滴水成珠。秤熟油。入銀珠收之成膏。再下黃蠟再下乳香、沒藥、血竭、兒茶、麝香、潮腦、乳油末

同前藥攪勻。攤厚貼之。編者按。初起用煙桿中黑煙油。或鳳仙膏敷之。三日即消。水仙根搗爛敷痰結核亦可消也。

癰疽

名家驗方選

【劉涓子排膿散】醫心方 治癰疽發背。已潰未潰。

當歸 桂心 人參 芎藭 厚朴

防風 甘草 白芷 桔梗

右下篩。酒服方寸寸。千金。名內補散。局方。有黃耆。名化毒排膿內

補十宣散」亦名托裏十補散「治一切癰疽瘡癤。未成者速散。已成者速潰」

「活人事證。又名十奇散」「回春。名千金內托散」「寶鑑。加黃耆。芍藥。木香。乳香。沒藥。連翹。名千金托裏散。治一切惡腫」經驗祕方。無桔梗。桂心。有黃耆。茯苓。連翹。木香。金銀花。芍藥」

【小品五香連翹湯】醫心方 主惡脈及惡核。瘰癧風結。諸核腫氣痛。

青木香 沉水香 連翹子。夜干
升麻 獨活 寄生 甘草 麝香
薰陸香 鷄舌香 大黃 淡竹瀝

「外臺崔氏。有朴消」「千金。無甘草有通草」

【黃耆竹葉湯】千金 治癰疽發背

黃耆 甘草 麥門冬 黃芩 芍藥
當歸 人參 石膏 芎藭 半夏
生薑 生地黃 大棗 淡竹葉

「聖濟。名竹葉黃耆湯」「樞要。去薑

。治癰疽氣血虛。胃火盛而作渴。」
【五利湯】千金 主常大患熱。發癰疽無定處。大小便不通。

大黃 梔子人 升麻 黃芩 芒消
「劉涓子。名大黃湯」「聖濟。名五利大黃湯」

【神效托裏散】局方 治癰疽發背。腸癰爛癰。無名腫毒。欣作疼痛，增寒壯熱。

忍冬草 黃芪 當歸 甘草

右爲末。酒煎服。「拔萃活法機要」。

無當歸。用金銀花。名迴瘡金銀花湯。

「治瘡瘍痛甚。則色變紫黑」袖珍。

加牡蠣，名內托散「醫宗說約」。名四

妙湯」

【當歸湯】聖濟 治癰疽發背。膿血穿潰

疼痛。托裏止痛。

當歸 黃芪 人參 桂心 赤芍藥

甘草 生乾地黃

【托裏黃芪湯】聖濟 治癰疽諸瘡。潰後膿出多內虛。

黃芪 白茯苓 桂心 麥門冬

當歸 人參 甘草 遠志 五味子

【托裏湯】聖濟 治發背內潰。及諸惡毒

。衝心嘔痛。

乳香 眞蓂豆粉

右極細。水調下。「本事。濃煎甘草

湯調下。名內托散。治一切瘡毒」精

要。又名乳香萬全散。又名托裏散。

又名乳香散。又名護心散「仙傳外科

。無乳香。有甘草節。硃砂。名百二

散。又名護心散。治疗瘡發狂」正宗

。有硃砂。甘草。名護心散。治瘡毒
內攻「纂要。有硃砂。新汲水調下。

甘草湯尤妙。名乳香救膜散」

【內消散】聖濟 治瘡腫久不愈

皂莢刺皮 乳香

右和勻。每服二錢七。酒一盞。煎七
分溫服。其毒內消。或微利是效。

【加味十全湯】精要 治癰疽後。補氣血
。進飲食。

十全大補湯。加烏藥。橘紅。五味子
。方出虛勞。

【內疎黃連湯】保命 治疽癰腫硬。嘔噦
發熱而煩。脈沉實。臍腑祕澀。當急

疎利之。

黃連 芍藥 當歸 檳榔 木香

黃芩 山梔子 薄荷 桔梗 甘草

連翹 大黃

【當歸和血散】神效名方 治瘡瘍未發出

。內痛不可忍。及婦人產前後腹痛。

當歸 沒藥 乳香 芍藥

右水煎。婦人酒煎。瘡發不用。瘡瘍

者加人參。木香。

【內托黃芪柴胡湯】試効 治附骨癰。

黃芪 柴胡 土瓜根 羌活 連翹

肉桂 生地黃 黃蘗 當歸尾

右水酒同煎。「又無土瓜根。羌活。

地黃。有黍枯子。升麻。甘草。名內托黃芪酒煎。治寒濕氣。發附骨癰於腿外側。堅硬漫腫作痛。正宗。無土瓜根。有木瓜。名內托黃芪湯。治濕熱腿內近膝股患癰。或附骨癰。

【乳香消毒散】寶鑑 專治惡瘡

大黃 黃芪 牛旁子 牡蠣 金銀花 甘草 沒藥 乳香 懸壘

【托裏溫經湯】寶鑑 治寒覆毛皮。鬱遏

經絡。不得伸越。熱伏榮中。聚而為赤腫。痛不可忍。惡寒發熱。肢體疼痛。

人參 蒼朮 芍藥 甘草 白芷

當歸身 麻黃。防風 葛根 升麻

【托裏溫中湯】寶鑑 治瘡為寒變而內陷者。膿出清解。皮膚涼。心下痞滿。腸鳴切痛。大便微溏。食則吐逆。氣短促。吃逆不絕。不得安臥。時發昏憤。

沉香 丁香 益智仁 茴香 陳皮 木香 甘草 羌活 乾薑 附子

加薑煎

【化毒為水內托散】皆効 凡患癰疽發背。對口惡疔瘡。乳花百種日無名無頭歹瘡。此藥能令內消去毒。化為黑水。從小便出萬不失一。

乳香 穿山甲 白朮 知母 貝母

半夏 金銀花 皂角 天花粉

右用無灰酒煎「正宗。名內消散」「纂要。名活命飲。又名還魂湯」

【乳香黃芪散】經驗祕方治一切惡瘡。

癰疽發背丁瘡。疼痛不可忍者。或未成者速散。已成者速潰。

黃芪 當歸 川芎 甘草 赤芍藥

陳皮 麻黃 人參 沒藥 乳香

粟殼

右水煎。「樞要。無黃芪。當歸。川

芎人參有丁香。白芷。名乳香止痛湯」「正宗。無麻黃。有地黃」又去甘草

。陳皮。參。芪。加桂。名托裏定痛散」

【玉蕊托裏散】經驗祕方治疔瘡癰疽發背。不問陰陽二症。已成未成。太醫院麻同知用大效。

黃芪 人參 芍藥 當歸 熟地黃
蓮花蕊 乳香 沒藥 甘草

左酒水煎。有熱加連翹。

【五聖散】經驗祕方治諸般惡瘡

大黃 生薑 甘草 瓜萐 皂角針

右好酒一大碗煎。

【連翹托裏散】烟霞聖効治壯實之人。多患苦瘡。

連翹 甘草 梔子 獨活 黃耆

金銀花 大黃 母蠣

【秘方奪命散】袖珍治一切癰疽。無名

惡瘡。其効不可盡述。

川山甲 赤芍藥 甘草節 當歸尾

乳香 貝母 皂角針 陳皮

金銀花 沒藥 花粉 防風 白芷

右酒煎服。「統旨。名仙方活命飲」

【內托羌活湯】奇効活尻臀患癰。堅硬

腫痛。脈緊數。

羌活 黃蘗 防風 當歸尾 藁本

連翹 蒼朮 陳皮 甘草 肉桂

黃耆

右水酒半煎「正宗。有紅花」

【犀角湯】外科集驗治石癰熱毒氣盛。

腫硬疼痛。口乾煩悶。

犀角 木香 連翹 梔子仁 射干

當歸 升麻 芍藥 玄參 枳殼

甘草 大黃

【托裏消毒飲】統旨治瘡疽已攻發不消

者。宜服此藥。未成即消。已成即潰

「十全大補湯。去地黃。桂枝。加白

芷。金銀花」樞要。有連翹「撮要補

。去白朮。加乳香。沒藥。名加味托

裏消毒散！治潰瘍餘毒。發熱作痛」

「正宗。有皂角針。桔梗。治癰疽已

成。不得內消。脾弱者。去白芷。倍人參。

【神効解毒散】撮要 治一切瘡瘍

金銀花 甘草 黃芪 皂角刺

當歸 乳香 沒藥

有酒煎爲末服

【回陽湯】樞要 治瘡瘍屬純陰

補中益氣湯。加附子。乾薑。

【神功內托散】正宗 治癰疽腦項諸發。

至十四日後。當腐潰流膿。其時不作

腐潰。更兼瘡不高腫。脈細身涼。

當歸 白朮 黃芪 人參 白芍

茯苓 陳皮 附子 川芎 木香

甘草 山甲

加薑、棗、水煎。

【透膿散】正宗 治癰疽諸毒。內膿已成

。不穿破者。宜服之立破。

黃芪 山甲 川芎 當歸 皂角針

右水煎。隨病前後服。臨入酒一杯亦

好。

【黃連苦救湯】正宗 治腦疽發鬢發頤。

及天行時毒。初起增寒壯熱，頭面耳

項俱腫。

黃連 升麻 乾葛 柴胡 赤芍

川芎 歸尾 連翹 桔梗 黃芩

羌活 防風 金銀花 甘草節

右水煎。入酒一杯。

【解毒天漿散】正宗 治腦疽積毒日深。堅腫木硬。口燥舌乾。惡心煩渴六脈沉實有力。大便閉結。

石決明 姜蠶 川山甲 防風

連翹 羌活 乳香 甘草 金銀花

黃連 當歸尾 大黃 天花粉

【固本養榮湯】正宗 治骨疽已成。骨不吐出。或既出不能收斂。由氣血之虛。脾胃弱也。宜服之。骨不出者自出。不收斂者自斂。十全大補湯。去茯苓。加山藥。山茱萸。丹皮。五味子。

疔瘡 脫疽

名家驗方選

【內托連翹飲】經驗良方 治諸般疔瘡

連翹 白芷 芍藥 生地黃 大黃

薄荷 黃梔 甘草 黃芩 朴消

加燈心。竹葉。水煎。其人喘。加人參。

【追疔奪命湯】急救仙方 能內消腫毒

羌活 獨活 防風 青皮 黃連

芍藥 細辛 甘草 蟬退 僵蠶

腳躄 河車 澤蘭 金銀花
各等分水煎。加少酒服。以衣被蓋覆

。汗出爲度。病退減後。再加大黃。利一兩次。去餘毒。此藥以藥味觀之。甚若不切然屢用屢効。萬無一失。此方。本出大成。脚蓮作獨脚茅。無河車。金銀花。「回春。作獨脚蓮。卽是鬼臼。紫河車。一名金線重樓。卽是蚤休。按外科集驗。脚蓮爲鷄爪黃連誤。大河外科。紫河車。一名金線重樓。一名大蜂窩今無蚤休。則以蜂房代之。「統旨。無黃連。脚蓮。河車。有白芷」

【黃連解毒湯】正宗 治疗毒入心。內熱口乾。煩悶恍惚。脈實者。

黃連 黃芩 黃柏 山梔 連翹
甘草 牛旁子

右燈心水煎

【疔毒復生疽】正宗 治疗疔毒走黃頭面發腫。毒氣內攻。煩悶欲死。

牡蠣 山梔 銀花 木通 連翹

牛旁子 乳香 沒藥 角刺 花粉

大黃 地骨皮

右水酒煎。便祕者加朴消。「纂要。以瓜蒌仁。代花粉。名救命仙方。治疔走黃。打滾欲死者。一服見効」

【人參精神湯】正宗 治疗瘡潰後。餘毒未盡。五心煩熱。精神恍惚。

人參 黃芪 當歸 白朮 麥門冬
陳皮 茯苓 遠志 地骨皮 甘草
柴胡 黃連
右糯米一撮水煎

【內托安神散】正宗 治疔瘡出膿時。元氣虛弱。睡臥驚悸。心志不甯。或毒未盡。流入心竅。致生健忘。

人參 茯苓 黃芪 白朮 麥門冬
玄參 陳皮 酸棗仁 遠志 甘草
石菖蒲 五味子

右水煎。臨服入朱砂末。

【解毒濟生湯】正宗 治脫疽初起。惡寒體倦。發熱作渴。或腫或紫。或麻

或痛。四肢倦怠。心神恍惚不甯。
川芎 當歸 黃柏 知母 天花粉
金銀花 麥冬 遠志 柴胡 黃芩
犀角 茯苓 甘草 紅花 升麻
牛膝

右水煎。臨服入童便一杯。

鬚疽 癭瘤 發頤

名家驗方選

【柴胡清肝散】樞要 治髮疽及肝胆三焦。風熱怒火之證。或項胸作痛。或瘡毒發熱。

柴胡 山梔 黃芩 人參 川芎

連翹 桔梗 甘草

【正宗。四物湯。和柴胡、黃芩、甘

草、山梔、花粉、防風、牛旁子、連

翹、名柴胡清肝散。治鬚疽。初起未

成者。毋論陰陽表裏。俱可服之。亦

治癰癤】

【梔子清肝散】樞要 一名柴胡梔子湯。

治三焦及足少陽經風熱。耳內作痒生

瘡。或出水疼痛。或胸乳間作痛。或

寒熱往來。

柴胡 梔子 牡丹皮各一錢 茯苓

川芎 芍藥 當歸 牛旁子各七分

甘草五分

正宗。無茯苓。有芩、連、石膏、治

少陽風熱。上攻作鬚疽。

【鼠粘子湯】正宗 治鬚疽初起。熱多寒

少。二便秘澀。煩悶疼痛。

鼠粘子 桔梗 當歸 甘草稍

赤芍 連翹 玄參 地骨皮 防風

天花粉 木通 大黃

【參苓內托散】正宗 治鬚疽已成。堅而

不潰。潰而不斂。氣血俱虛。十全大

補湯。加陳皮、山藥、附子、丹皮、

地骨皮。

【海藻玉壺湯】正宗 治癰瘤初起。或腫

或硬。或赤不赤。俱未破。

海藻 貝母 陳皮 昆布 青皮

川芎 當歸 半夏 連翹 甘草節

獨活各一錢 海帶五分

右水煎凡服此門藥餌。先斷厚味大葷

。次宜絕慾。虛心者為妙。

【十全流氣飲】正宗 治憂鬱傷肝。思慮

傷肝。致脾氣不行。逆於肉裏。乃生

氣瘰肉瘤。皮色不變。日久漸大。

陳皮 赤茯苓 烏藥 川芎 當歸

白芍 香附 青皮 甘草 木香

加薑棗水煎

【柴胡葛根湯】正宗 治頤毒表散未盡。

身熱不解。紅腫堅硬。作痛者。

柴胡 天花粉 乾葛 黃芩 桔梗

連翹 牛蒡子 石膏 甘草 升麻

【牛蒡甘桔湯】正宗 治頤毒表邪已盡。

耳項結腫。微熱不紅疼痛。

牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉

黃連 川芎 赤芍 甘草 蘇木

流注

名家驗方選

【活絡流氣飲】會元 治流注塊。或痛或

不痛者。或發乍寒乍熱。亦曰流注風

白通草 白芷 桔梗 薄荷 川芎

猪牙皂角 紅藍花 連翹 當歸

羌活 柴胡 土木鱉肉 威靈仙
升麻 生甘草

素稟虛弱。而脈微細者。加人參。黃芪。脈洪大者。加玄參。天花粉。水煎服。食遠加酒半盞。

【調和榮衛湯】正宗 治流注初起。漫腫無頭。結腫不潰。

川芎 當歸 陳皮 獨活 赤芍
白芷 烏藥 大茴香 黃芪 甘草
紅花

右水二鍾。入酒二杯煎服。下部加牛膝。

【附子八物湯】正宗 治房慾後。陰虛受

寒。致生腫塊。又或遍身腿脚疼痛。不能步履。

十全大補湯。去黃芪。加木香、附子。

【通經導滯湯】正宗 治婦人產後。敗血流注經絡 結成腫塊疼痛。

香附 赤芍 川芎 當歸 熟地
陳皮 紫蘇 牡丹皮 紅花 牛膝
枳殼 甘草節 獨活

右水酒煎

【調中大成湯】正宗 治流注潰後。膿水清稀。飲食減少。不能生肌。十全大補湯。去川芎、地黃。加山藥、丹皮、

藿香、砂仁、附子、遠志、陳皮。

【黃芪六一湯】正宗 治流注潰後。膿水出多。口乾作渴。煩躁不甯。

黃肉六錢、半生。半蜜水炒 甘草一錢五分。半生、半炙 人參一錢

右水煎。此方。本出外科集驗。無人參。理例。加人參尤効。

【散血葛根湯】正宗 治跌撲傷損。瘀血凝滯。結成流注。身發寒熱。

葛根 半夏 川芎 防風 羌活
升麻 桔梗 白芷 甘草 細辛

蘇葉 香附 紅花
右薑、葱、水煎。

乳癰

名家驗方選

【露蜂房散】聖惠 治吹爛疼痛不止。或時寒熱。

露蜂房 鹿角各一兩

右燒爲灰細研。以熱酒調下二錢。

【精效瓜樓散】精要 治婦人乳疽爛勞。神効無比。万不失一。

黃瓜樓（一箇。去皮。焙爲末）

甘草半兩 當歸半錢 沒藥別研
乳香別研各一錢

右用無灰酒三升。同於銀石器中。燉

火熬。取一升清汁。分爲三次。食後服。如毒氣已成。能化膿爲黃水。毒未成。卽內消。

【治乳癰未潰方】新効方

青皮 括樓 桃仁 連翹 川芎

橘葉 皂角刺 甘草節隨證隨時。

令加減。

右水煎。一玉機。名連翹飲子。

【治乳癰已潰方】新効方

人參 黃芪 川芎 當歸 芍藥

青皮 連翹 瓜蒌 甘草節

【牛蒡子湯】正宗 治乳癰乳疽。結腫疼痛。毋論新久。未成膿。

陳皮 牛蒡子 山梔 金銀花

甘草 瓜蒌仁 黃芩 天花粉

連翹 角針 柴胡 青皮

右水酒煎

【橘葉散】正宗 治婦人有孕胎熱。爲內吹。有兒吃乳。名外吹。致乳結成腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。

柴胡 陳皮 川芎 山梔 青皮

石膏 黃芩 連翹 甘草 橘葉

【鹿角散】正宗 治乳癰新起。結腫疼痛。增寒發熱。但未成俱効。

鹿角尖三寸。用炭火內煨。稍紅存性碾末。每服三錢。食後熱酒。一

茶鍾調服。甚者再服必消。

【方脈正宗治婦人乳汁不行乳旁腫痛者】

彙言

穿山甲 王不留行 乳香 沒藥

麻黃 天花粉 蒲公英

【消癰散毒湯】玉案 治乳癰。惡寒發熱

。焮腫疼痛。服此立消。

青皮 貝母 天花粉 蒲公英

連翹 鹿角屑 當歸

水酒各一鐘。煎服。

【治乳巖】公選良方 此病先因乳中。一

粒大如豆。漸漸大如雞蛋。七八年後

方破爛。一破則不可治矣。宜急服此

藥。

生蟹殼。數十枚。放沙鍋內。焙焦為末。每服二錢。好酒調下。須日服。不可間斷

囊癰 懸癰 腎癰

鶴口癰

名家驗方選

【解毒排膿散】魯般經後錄

連翹 川芎 柴胡 黃芩 青皮

忍冬 牛旁子 黃芪 皂角刺

大黃 當歸

【清肝滲澀湯】正宗 治囊癰。肝經濕熱結腫。發熱痲痛。

川芎 當歸 白芍 生地 柴胡

龍膽草 山梔 天花粉 黃芩

澤瀉 木通 甘草

右燈心。水煎。

【滋陰內托散】正宗 治囊癰已成。腫痛

發熱。服之有膿。即可穿潰。

當歸 川芎 白芍 熟地 黃芪

皂角針 澤瀉 山甲

【滋陰八物湯】正宗 治懸癰。初起狀如

蓮子。紅赤漸腫。悠悠作腫。

川芎 當歸 赤芍 生地 牡丹皮

天花粉 甘草節 澤瀉 大黃

右燈心。水煎。

【炙粉草膏】正宗 治懸癰。未成者即消

已成者即潰。既潰者即斂。此治懸癰良

藥也。

大粉草四兩。用長流水浸透。炭火

上炙乾。再浸再炙。如此三度切片。

。甘草三兩。當歸身三兩。水三碗

。漫火煎至稠膏。去渣再煎。稠厚

爲度。每用三錢。無灰好熟酒。一

大杯化膏。空心服之最妙。此方。

本出活人事證後集。不用當歸。本

綱引李迅癰疽方同。

還元保真湯】正宗 治懸癰已潰。瘡口

開張。膿水淋漓。不能收斂。

十全大補湯。加丹皮。枸杞子。澤

瀉。熟附。

【滋陰九寶飲】正宗 治懸癰。厚味膏梁

。蘊熱結腫。小水澀滯。大便祕結。

內熱口乾。煩渴飲冷。六脈沉實有力

。

四物湯。加知母、黃連、大黃、天

花粉、黃柏。

【活血散瘀湯】正宗 治臀癰初起。紅赤

腫痛。墜重如石。大便祕澀。

川芎 當歸 防風 赤芍 蘇木

連翹 天花粉 皂角針 紅花

黃芩 枳殼 大黃

右水煎。便通者。去大黃。加乳香。

【黃芪內托散】正宗 治臀癰已成。服前

藥勢定者。欲其潰膿。宜服。

神効解毒散。去乳香。沒藥。加川

芎。穿山甲。方出癰疽。

【滋陰除濕湯】正宗 治鶴口疽。發在尾

閭之穴。高骨頭尖。初起形似魚臍。

朝寒暮熱。日輕夜重如瘡。

柴物湯。去半夏。人參。加陳皮。

知母、貝母、澤瀉、地骨皮。

【和氣養榮湯】正宗 治前證已成。突

如鶴嘴。不得內消。

十全大補湯。去肉桂、川芎、芍藥、加陳皮、丹皮、沉香。

【滋腎保元湯】正宗 治前證元氣虛弱。膿水淋漓。久而不斂。

十全大補湯。去川芎、芍藥、加杜仲、山萸、丹皮、熟附。

下疳 便毒 黴瘡

結毒

名家驗方選

【雙解湯】直指 治便毒。內蘊熱氣。外挾寒邪。精血交滯。腫結疼痛。

辣桂 大黃 芍藥 澤瀉 牽牛

桃仁 甘草半分

右薑。水煎。小便出後。大便利。皆是稠毒。

【龍膽瀉肝湯】理例 治陰莖腫痛。或挺縱不收。或莖中作痛。筋急縮或癢。白物如精。隨溺而下。此筋疝也。

柴胡 澤瀉 車前子 木通

生地黃 當歸尾 龍膽草

右水煎。此方。本出蘭室。治陰部時復熱痒及臊臭。一又去柴胡、加黃芩、山梔、甘草、名加減龍膽瀉肝湯。治肝經濕熱。玉莖患瘡。或便毒懸癰。

。腫痛小便赤澀。陰囊腫痛」正宗。
更加連翹、黃連、大黃。

【葦蘚湯】理例 治楊梅瘡。不問新舊潰爛。或筋骨作痛。

川葦蘚俗呼土茯苓

水三鍾。煎二鍾。去粗。不拘時徐徐溫服。若患久。或服攻擊之劑。致傷脾胃氣血者。以此一味爲主。而加以兼證之劑。

【九味柴胡湯】撮要 治肝經熱毒下注。便毒腫痛。一切瘡瘍。或風毒。惡核痺癰

柴胡 黃芩 人參 山梔 半夏

龍膽草 當歸 芍藥 甘草
【換肌消毒散】樞要 治時瘡。不拘初起潰爛。

土茯苓五錢 當歸 白芷 皂角刺
薏苡仁各一錢 白蘚皮 木瓜

木通 金銀花各七分 炙草五分
右水煎。此方。本出攝生。無白芷。炙草。有防風。治諸瘡。「濟生外科經驗。去當歸、白芷、甘草。加防風。用皂莢子。名加味遺糧湯。治楊梅瘡。并楊梅瘋毒。及悞服輕粉藥。筋骨疼痛。不能動履者。此藥能除根。永無後患」本綱。名搜風解毒湯」纂要

。緊得効良方。治男婦一切下疳疔。疔蝕疔內疔外疔爛疔。無有不効。下疔日久不愈。必生楊梅瘡。此方預服。可使不起。已發可使速愈。雖是結毒。並歷神効。誠濟世之良方也。」

【蠲痺消毒散】樞要 治時瘡。肢節筋攣
薑黃 土茯苓 獨活 白朮 當歸

芍藥 白芷

【消疔敗毒散】摘要 專治下疳瘡

防風 獨活 柴胡 連翹 荊芥

知母 黃連 蒼朮 甘草 黃柏

芍藥 茯苓 木通 龍膽草

右燈心二十四寸。水煎服。若有便毒

。量人虛實。加大黃一二錢。

【茯苓湯】回春 治楊梅瘡

土茯苓 桔梗 防風 乳香 沒藥

【治楊梅瘡良方】保元 胡雲卿傳

當歸 牛膝 黃芩 大黃 金銀花

木瓜 皂角刺 蟬退 土茯苓

右葱白三根。水煎。

【二連湯】啓玄 治楊梅瘡如神。不傳非人。祕之祕之。

土茯苓 胡黃連 川黃連 當歸

川芎

右水酒。入豬胰子一個煎。「纂要。

無當歸。有牛膝。薏苡仁」

【四仙湯】仙丹 治瘋癱不能起止

土茯苓 牛膝肉 皂角刺 五加皮
右爲一服。水三碗。煎至二碗。食遠服。查并水一碗半。煎至七分。十服見効。但忌牛肉、茶、醋、燒酒、麻油。此方。治徽毒見瘋症。

【紫草飲】仙丹 治楊梅如神。

紫草 金銀花 白鮮皮 薏苡
山慈姑 白蒺藜 土茯苓

右水煎。痛加乳香。沒藥。

【一方】仙丹 治便毒

川山甲 黃芪 苦參 皂角針
乳香 沒藥 歸尾 桔梗 麻黃

山梔仁 連喬 芍藥 甘草

先一服。加大黃一兩。水二碗。煎一碗。空心服。渣再煎服。二服不用大黃。卽全消屢効。

【山甲內消散】正宗 治魚口便毒。騎馬癰。橫痃。未成膿者。

當歸梢 甘草節 大黃 穿山甲
姜蠶 黑牽牛 土木鱉

右水酒各半煎服。大便秘三四次。方吃稀粥。淡味飲食爲妙。

【紅花散瘀湯】正宗 治入房忍精。強固不泄。以致瘀精濁血凝結兩胯。或小腹之傍。結成腫痛。小水澀滯。

當歸尾 皂角針 紅花 蘇木
姜蠶 連翹 石決明 穿山甲
乳香 貝母各一錢 大黃三錢
牽牛二錢

右水酒各半煎

【黃芪內托散】正宗 治魚口便毒橫痃。
已成不得內消。

川芎 當歸 黃芪 白朮 金銀花
天花粉 皂角針 甘草 澤瀉

【升麻解毒湯】正宗 治楊梅瘡。筋骨疼痛。久而不愈。及治遠年近日。流注結毒。皮肉破爛。咽喉損破。

升麻 皂角針 土茯苓

項之以上加白芷。咽內加桔梗。胸腹加白芍。肩背加羌活。下部加牛膝。各一錢。用水八碗。煎至四碗。作四次。一日服盡。每次頓熱。加麻油三茶匙和勻。量病上下。食前後服之。

【歸靈湯】正宗 治楊梅瘡。不問新久。元氣虛弱。

川芎 當歸 白芍 熟地 米仁
木瓜 防己 天花粉 金銀花
白癬皮 人參 白朮 甘草
葶靈仙 牛膝 土茯苓

【九龍丹】正宗 治魚口便毒。騎馬癰。橫痃。初起未成膿者服之。

兒茶 血竭 一乳香 沒藥 巴豆
木香

右各等分。爲末。生蜜調成一塊。磁盒盛之。臨時旋丸安豆大。每服九丸空心熱酒一杯送下。行四五次。方吃稀粥。腫甚者間日再用一服自消。

【五寶散】正宗 治結毒。筋骨疼痛。腐爛口鼻。諸藥不効者服之。

滴乳石。如乳頭下垂。敲破易碎。

亮似蜻蜓翅者方真四錢。琥珀二錢

硃砂二錢 珍珠二錢 冰片一錢

右各研極細。對準共爲一處。再研數百轉。磁罐密收。用藥二錢。加飛羅

麵八錢。再研和勻。每用土茯苓一斤。水八碗。煎至五碗。濾清作五次。每次加五寶散一分和勻。量病上下服。一日服完。十服自愈。如鼻子腐爛。每日土茯苓內。加辛荑三錢。忌食海腥煎炒。房事等件。〔纂要名五寶遇仙丹〕

【結毒紫金丹】正宗 治遠年近日。楊梅結毒。筋骨疼痛。日久腐爛。臭敗不堪聞。或咽喉唇鼻破壞。諸藥不効者妙。

龜板。於炭火上炙焦。用新安酒漿。濃筆蘸漿塗上。反復炙塗三次。

以焦黃爲末。二兩。石決明。用九孔大者煨紅。童便內漬之一次。硃砂。明亮者各末。六錢。

共再碾極細爛。米飯爲丸。麻子大。每一錢。筋骨疼痛酒下。腐爛者土茯苓湯下。至重者四十日而愈。力勝於五寶散。

【鉛回散】正宗 治楊梅結毒。筋骨疼痛。朝輕夜重。喜熱手按揉者。

用鉛半斤。銅杓內化開。傾入水內。將鉛收起。再化再傾。如此百遍。鉛盡爲度。候半日待水澄清傾去。用鉢底內沉下鉛灰。傾在三重紙

。上下用灰。收乾水氣。取起晒乾。與硫黃等分。研細罐收。每服一錢。溫酒調服。至重者不過三次即効。

【方脈正宗】彙言治楊梅惡瘡。毒氣不起。瘡脚冷停。不攻發者。

麻黃 蟬蛻 殭蠶 肉桂 當歸

皂角刺 白芷 紅毛

羊肉湯煎服

【鄧筆峯方】彙言治關節四肢。筋骨攣痛。舉動不便。或楊梅瘡毒。悞服輕粉。致結毒不散。筋骨疼痛。

墻藤根 五加皮 木瓜 當歸

土奇良

每日水五碗。煎二碗。徐徐服。日用一劑。

【姚次先方】彙言治廣瘡結毒。爛壞鼻梁。及陰蝕陽物。

鍾乳石 乳香 沒藥瓦上焙出油

象牙末 蛀竹屑 枯白礬

俱爲細末。白蠟用鐵刀。輕輕刮下浮衣。四錢。總和勻。每早晚各二錢。

土茯苓煎湯調下。

【龍膽瀉毒湯】玉案 治一切下疳

柴胡 龍膽草 山梔 大黃 黃連

滑石 木通 甘草

加燈心三十莖煎服

【解毒至寶丹】錦囊 治楊梅瘡結毒。一切熱毒。久患骨蒸熱毒流注。六脈俱數。用之清熱解毒。神効。

人參三七微火焙 嫩滑石 眞琥珀

珍珠生用 生甘草

各研極細和勻。每服二分。加至三四分。人小者一分。加至二分。葶藶三錢。煎湯調服。

【十服神効湯】瘍醫大全 楊梅結毒流注。筋骨疼痛。不論已未破爛。神効。

升麻 皂角刺 土茯苓 頭項加白

芷 胸中喉面加桔梗 胸前加白芍

肩背加羌活 下部加牛膝

共一劑。水八碗。煎四碗。臨服入蘇油三匙。一日服一劑，十劑全愈。此神方也。

隱疹 疥癬 丹毒

天泡

名家驗方選

【升麻和氣飲】局方 治瘡疥發於四肢。

增寒發熱。浸淫浮腫。

五積散。無川芎、肉桂、麻黃、厚

朴、有升麻、乾葛、大黃。

【當歸飲子】濟生 治心血凝滯。內蘊風

熱。發見皮膚。遍身瘡疥。

當歸 芍藥 川芎 生地黃

白蒺藜 防風 荆芥穗 何首烏

黃芪 甘草

加薑水煎

【防風通聖散】宣明 治一切風熱瘡疥。

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃

薄荷葉 麻黃 連翹 芒硝 石膏

黃芩 桔梗 滑石 甘草 荆芥

白朮 梔子

右薑水煎

【平血飲】澹寮 治遍身生瘡。膿血嫩脹

。極痛且痒。

卽升麻葛根湯四味等分

右水煎。如對症。及藥材得真。則功在和氣飲之上。

【烏龍丸】精義 治遍身風瘡。痒疥癬等疾。服之消風散熱。利膈化痰唾。治肺氣。此藥推陳致新。去腸垢。

皂角肥者不以多少。炙刮去皮弦韃碎。甜水揉取濃汁去粗。銀石器內熬成膏。別放。黑牽牛不以多少。微炒令香熟。碾取頭末。

右將藥末。與皂角膏和丸。如梧桐子大。每服三五十丸。氣虛有一二十九。食後溫水送下。利三五行。不傷正

氣。

【檀花散】烟霞聖效 治遍身風瘙痒。重則昏迷不省。

檉柳花無花用葉。無葉用枝。然不及用花 蛤粉 當歸 甘草各等分 右爲末研勻。每服四錢。溫水調下。略睡良久再服。

【浮萍散】丹溪類集 治癩及風癬。
浮萍 荆芥 川芎 甘草 麻黃
或加當歸、芍藥。

右水煎。入葱白。豆豉。亦可。汗出則愈。此方。本出神効名方。
【荆防敗毒散】理例 治一切瘡瘍。時毒

腫痛。發熱脈浮數。

敗毒散。加荆芥。防風。此方。本出蘊要。有牛旁子。治大頭傷寒。

「回春。去人參。加連翹。金銀花」

【郭氏升麻牛旁子散】準繩治時毒瘡疹。脈浮洪。瘡發於頭面胸膈。

升麻 牛旁子 甘草 桔梗 葛根

玄參 麻黃 連翹

加薑水煎

【消風散】正宗治風濕浸淫血脈。致生瘡疥。搔痒不絕。及大人小兒。風熱癩疹。遍身雲片斑點。乍有乍無。並效。

當歸 生地 防風 蟬脫 知母

苦參 胡麻 荆芥 蒼朮 牛旁子

石膏 甘草 木通

【化斑解毒湯】正宗治三焦風熱上攻。致生火丹。延及遍身痒痛。

玄參 知母 石膏 人中黃 黃連

升麻 連翹 牛旁子 甘草

淡竹葉二十片。水煎。

【解毒瀉心湯】正宗治心經火旺。酷暑時臨。致天泡發及遍身。

黃連 防風 荆芥 山梔 黃芩

牛旁子 滑石 玄參 知母 石膏

甘草 木通

燈心二十根。水煎。

【羚羊角散】正宗 治葡萄疫。其患多生小兒。感受四時不正之氣。鬱於皮膚不散。結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在徧體。邪毒傳胃。牙根出血。初起宜服之。

羚羊角 防風 麥冬 玄參 知母

黃芩 牛子 甘草

竹葉十片。水煎。

【胃脾湯】正宗 治葡萄疫。久則宜滋益其內。

白朮 茯神 陳皮 遠志 麥冬
沙參 五味子 甘草

水煎服。虛弱自汗者。去沙參。加人參。黃芪。各五分。

【頑癬浮萍丸】正宗

紫背浮萍 蒼朮 蒼耳草 苦參
黃芩 姜蠶 鉤藤 希簽草
爲末。酒糊丸。白滾湯。每服二錢。隨病上下服。

【方脈正宗】彙言治斑疹時毒。及疔腮腫痛。

牛蒡子 柴胡 連翹 貝母 荊芥
各二錢
水煎

跌撲 金瘡

名家驗方選

【小品治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣】
醫心方

服蒲黃。方寸七。日五六過。○又
龍門方。和酒服。

【大膠艾湯】千金 治男子絕傷。或從高墮下。微者唾血。甚者吐血。及金瘡傷經。

芎歸膠艾湯。加乾薑。方出婦人產前。

【大黃散】千金 治腕折瘀血

大黃如指節大一枚 桃人四十枚
亂髮一握

右以布方廣四寸以繞亂髮燒之。咬咀大黃。桃人。以酒三升。煮取一升。盡服之。血盡出。千金注。引肘後云。仲景方。去敗蒲蓆。甘草童便。原無方名。今據聖惠。

【導滯散】千金 治從高墮下崩中。

當歸 大黃各二分

右下篩。酒服方寸七。日三。原無方名。今據聖惠錄。一聖惠。治從高墮下。大便下血不止。三因。去當歸。加杏仁酒煎。名鷄鳴散。治傷損血瘀

。凝積氣絕欲死」施圓。加射香少許。
。名大活血湯。治打撲損傷。內塞欲
死」醫法指南。加蘇木。紅花。酒水
煎服。治亂打血攻心」。

【沒藥散】聖惠 治馬墮撲損。內有敗血。
。疔刺疼痛不可忍。

沒藥末 騏驎竭末 黃丹微炒 白
礬燒灰各一分

右爲散。不計時候。以溫酒下。

【花蕊石散】局方 治一切金刃打撲傷損。
。猫犬咬傷。急於傷處搽藥。如內損
血入臟腑煎童子小便。入酒少許。調
一大錢。服之立效。又治產後惡血奔

心。胎死腹中。胞衣不下至死。

花蕊石搗羅麤末。一斤。

上色硫黃搗爲麤末。四兩。

右二味令勻。內瓦罐子。密泥封口了

。用炭一秤。籠疊周匝。自己午時。

從下生火。令漸漸上徹。直至經宿。

火冷炭消盡。又放經宿。罐冷。定取

細研。以絹羅子。羅至細。鑿合內盛

。依法使用。

【內托黃芪圓】得効 治針傷經絡。膿流
不止。

黃芪 當歸 肉桂 木香 乳香

洗香

右爲末。用菘豆粉四兩。薑汁煮糊圓。梧桐子大。每服五十元。不拘時候。熱水下。

【治破血在心腹】經驗良方

蘇木 南木香 沒藥 生薑

右槌破。用瓦器。以濕紙遮口。不與走氣。好酒慢火溫。時服一盞。

【當歸鬚散】入門 治打撲以致氣凝血結。胸腹脇痛。或寒熱。如挫閃。傷血不順。

歸尾 紅花 桃仁 甘草 芍藥

烏藥 香附 蘇木 官桂
水酒。各半煎。

【大成湯】正宗 治跌撲傷損。或從高墜下。以致瘀血流入藏府。昏沈不醒。大小便秘。

陳皮 當歸 蘇木 木通 紅花
厚朴 甘草 枳殼 朴消 大黃

右水煎。入蜜三匙。亦妙。

【獨參湯】正宗 治跌撲傷損。金瘡出血過多。昏沈不醒。

林氏祖方治跌撲打傷。或從高失脚下墜。內傷瘀血者。彙言

用苧根。或苧麻。燒灰。五錢。或一兩。熱湯。或熱酒調服瘀血立散。

【順血散】本朝經驗 治一切打撲傷損。及產後血運。

當歸 川芎 芍藥 蒲黃 澤瀉

枳殼 人參 大黃 沈香 茯苓

接骨木 甘草

右剉細。每服二錢。盛小麻布袋。擺沸湯中服。一方有白檀。地黃。白芷。名川芎散。

湯潑 火燒

名家驗方選

【桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯】

金匱 主火邪。

【蜀漆湯】千金

蜀漆 甘草 知母 龍骨 牡蠣

右水煎。按此方原治小兒潮熱。今用之火邪有熱候者。頗効。

【治湯火方】暴症知要

鷄黃油。如法取傅。

法用鷄子。不拘多少。煮熟去白留黃。入銅杓內。每十箇。加菜油一小酒盞。煎枯去渣。出火氣。用傅甚佳。

【四順清涼飲】正宗 治湯潑火燒。熱極逼。毒入裏。或外被涼水所汲。火毒內攻。致生煩躁。內熱口乾。大便祕實。

本方加連翹，羌活、防風、山梔、燈心水煎。方出小兒諸證。

【玄妙飲】玉案 治湯火所傷先服。恐火毒攻心。

黃連 天花粉 玄參 陳皮 桔梗
山梔

淡竹葉甘片。煎服。

【逐火丹】石室 湯火傷。內治妙法。

大黃 當歸 荆芥 生甘草 黃芩
防風 黃芪 茯苓

【清涼散】奇方類編 治湯泡火燒。敷之止疼。立愈。

大麥。淨砂鍋內炒。至漆黑爲度。

取出以紙鋪地上。出火氣。研細末。爛者乾揅。未破者以香油。桐油調揅。

上海市國醫公會會員已 實行更用之新制度量衡

新市制一錢抵舊量八分五厘二毫半。所以開一錢者如欲得舊時分量，應予酌加至（一・一七三）一錢二分；二錢者應加至（二・三四六）二錢四分；餘類推。並在藥方上加蓋新秤字樣。

處方用量表

附藥性及功用索引

(一) 解表宣祛風寒劑

藥名	性質	功能	索引	用量
蔓荊子	苦辛無毒	治頭眩痛腦鳴溼痺	一錢至	二錢
辛夷	辛溫	主治鼻淵鼻塞	一錢至	二錢
清豆卷	甘淡微涼	宣肺胃利水	三錢	三錢
薄荷	辛無毒	善治頭風痛熱	五分至	一錢
牛蒡子	辛平	清瀉熱消疹毒	一錢至	三錢

決明子	鹹平無毒	清肝明目	一兩	三錢至
草決明	苦無毒	瀉肝明目	三錢	錢半至
蟬衣	鹹甘無毒	輕散風熱透疹	七分至	錢半
馬勃	辛平無毒	治喉痺咽痛	三分至	一錢
僵蠶	辛鹹	輕宣去風化痰	一錢至	三錢
前胡	苦味	消風解表止咳	一錢至	三錢
木賊	甘苦無毒	治赤痢脫肛	八分至	二錢
桑葉	苦甘無毒	祛風明目	錢半至	三錢
杉木	辛溫	宣散風衝心毒	一錢至	三錢

臨證醫典 用量表

秦 芫 無毒 苦平	忍冬藤 無毒 甘	藁 木 無毒 辛溫	桑 枝 無毒 苦平	淡豆鼓 無毒 苦	浮 萍 辛	白 芷 無毒 辛	桔 梗 無毒 苦辛	象貝母 微毒 苦辛
養宣 血法 舒冬 絡濕	驅風濕解熱毒	頭宣 痛去 連風 腦濕	療治 手足 痿濕 痛痺	療發 燥汗 懷解 不肌 眠除 頭虛 痛煩	輕發 汗利 溼	療宣 面發 癆表 眉祛 稜風 骨散 痛熱	咽宣 痛通 載氣 諸血 藥散 上寒 浮清	痰宣 止肺 咳祛 嗽風
二錢至	三錢	八分至 錢半	一錢至 四錢	三錢	五分至 錢半	八分至 錢半	一錢至 三錢	錢半至 四錢

細 辛 無毒 辛溫	蘇 葉 苦辛	荊 芥 溫辛	防 風 無毒 辛溫	黃菊花 無毒 甘苦	甘菊花 無毒 甘苦	豨薟草 苦辛	蒼耳子 無毒 甘溫	海桐皮 無毒 苦平
欬宣 逆散 上風 氣寒	利宣 膈發 消表 痰散 寬寒	祛輕 風宣 理發 血表	頭發 項表 強祛 遍風 體勝 痛濕	治清 目熱 赤祛 疔風 毒濕	治散 頭溼 眩痺 明遊 日風	筋宣 骨去 冷風 痛濕	療輕 頭發 汗散 痛鼻 淵溼	頑宣 痺祛 疥風 瘡濕
一錢至 五分	三錢至 一錢	八分至 三錢	一錢至 三錢	一錢至 三錢	一錢至 三錢	二錢至 五錢	一錢至 三錢	一錢至 三錢

臨證醫典 用量表

生薑 辛溫	香薷 辛溫 無毒	獨活 辛溫	羌活 辛溫	桂枝 辛甘 無毒	柴胡 苦平 無毒	麻黃 辛溫 無毒	葛根 辛甘 無毒	葱頭 辛溫
宣散 止嘔 喉發 開痰	治陰暑 脚氣 水腫	宣搜風 治傷風 去濕	宣搜風 治頭痛 剛痺 柔痺	解肌 治自汗 調脈 營衛	和緩 諸瘧 解寒 升熱	傷寒 以發汗 解肌	解肌 升陽 發汗 津液	輕發 宣通 陽和 活血
一錢至 一兩	五分至 一錢	一錢至 三錢	一錢至 三錢	一錢至 五錢	一錢至 四錢	五分至 二錢	錢半至 七錢	兩枚至 七枚

吳茱萸 辛熱 有毒	川椒 辛熱	草烏 辛熱	附子 辛甘 有毒	藥名 性質	(一)溫裏劑	川芎 辛溫 無毒	西湖柳 甘鹹 無毒	升麻 苦甘
宣燥 祛風 開鬱	宣燥 補命 火	治中寒 痰飲 積	補命門 逐風寒 濕火	功能 索引		補血 宣行 氣搜 風止痛	宣發 行氣 痧子	輕宣 升脫 久泄
一錢至 三錢	八分至 二錢	五分至 七錢	一兩至 一錢	用量		一錢至 三錢	錢半至 四錢	五分至 一錢

茴香 熱辛	菟絲子 無毒辛甘	草果 無毒辛	虎骨 無毒辛	益智仁 無毒辛	胡椒 熱辛	艾絨 苦辛溫	良薑 熱辛	乾薑 大熱辛苦
暖丹 疝疔 補丸 腫門	補腎 添虛 精固	除燥 濕痰 祛寒	宣利 去風 健骨	瀉散 精和 胃氣	暖胃 快食 積痛	宣理 氣血 逐寒	宣燥 暖胃 冷散	燥回 陽宣 通脈
二錢	五錢	二錢	五錢	四錢	二錢	三錢	二錢	三錢
八分至	至	八分至	至	至	八分至	錢至	八分至	八分至

牛黃 涼甘	犀角 寒鹹	珠粉 甘鹹	藥名 質性	巴戟天 溫甘	仙茅 辛熱有毒	淫羊藿 溫辛	胡桃 甘
瀉熱 驚利	瀉心 諸血 熱熱	生肌 塗面 好顏色	功能 索引	補腎 散風 濕	助命 火益 陽道	補命 門益 精氣	補命 門 滯
一錢	錢半	三錢	用量	五錢	二錢	五錢	七錢
一分至	至	至		至	至	至	至

(三) 清熱解毒劑

臨證醫典 用量表

石膏 辛寒 無毒	青黛 鹹寒	金銀花 甘寒	柿霜 甘澹 無毒	竹瀝 甘寒	淡竹葉 甘寒 無毒	竹茹 甘寒	天竹黃 甘寒	鮮石斛 甘鹹平
引治陽明總壯熱大渴 飲神昏譫語如狂	瀉肝散鬱火	瀉熱解毒	清潤肺甯腸 胃瀉喘	瀉火滑痰潤燥	消瀉上焦煩熱 痰止煩熱渴	開胃焦煩熱涼血 胸中膨動	痰瀉熱 涼熱 驚謔	涼潤胃生熱 生津而
二錢至三兩	三錢至五分	四錢至一錢	錢半至八分	二錢至五錢	五錢至一錢	五錢至一錢	三錢至一錢	一兩至三錢

茅根 甘寒	秫米 甘 無毒	枇杷葉 平苦	桑白皮 辛甘 無毒	馬兜鈴 苦寒	蘆薈 苦寒	蘆根 甘寒	龍膽草 苦寒	知母 辛苦 寒
止瀉火補中止血 痰利小便便	祛熱安眠	治清肺和胃降氣 熱咳逆口渴	清瀉肺熱行水 痰熱止嗽	治清痰嗽喘促 肺熱喘降氣	涼清肝熱殺蟲 肝熱明殺蟲	瀉胃熱止嘔噦	苦瀉肝濕熱 降胆熱火	瀉相火補腎便 燥利二便水
一錢半至三兩	三錢至五錢	五錢至一錢	四錢至一錢	三錢至一錢	錢半至五分	三錢至三兩	錢半至三分	七錢至一錢

臨證醫典 用量表

葛花 甘平 無毒	槐實 苦寒 無毒	石決明 鹹平 無毒	地骨皮 甘淡 寒	梔子 苦寒 無毒	射干 平苦	白頭翁 苦寒 無毒	佩蘭葉 辛平 無毒	燈草 甘淡 寒
清熱 解風 醒酒	瀉風 熱血 脫肛	瀉風 骨蒸 勞熱	瀉熱 骨蒸 有汗	瀉心 煩熱 不眠	瀉火 喉痺 消痰	治痢 重涼 血熱	解毒 津止 渴氣	降心 利水 止熱
一錢至	一錢至	二錢至	一錢至	一錢至	二錢至	三錢至	一錢至	三分至
四錢	五錢	三兩	一兩	四錢	二錢	五錢	三錢	八分

連翹 苦平 無毒	天花粉 苦酸 無毒	括婁仁 苦甘 無毒	白微 鹹寒	青蒿 苦寒 無毒	生地 甘寒 無毒	大小薊 甘溫	側柏葉 苦澀 微寒	夏枯草 辛苦 微寒
瀉火 清熱	降痰 潤燥	瀉滌 痰生 潤腸	瀉血 不熱 人厥	清骨 蒸盜 汗熱	瀉心 火逆 燥熱	治瀉 吐血 安胎	補陰 涼血 證血	緩肝 氣解 內熱
一錢至	五錢	一錢至	四錢	一錢至	二錢至	一錢至	一錢至	五錢至
五錢	五錢	五錢	四錢	四錢	三兩	四錢	四錢	五錢

人中黃	甘寒	解實熱清痰火	一錢至三錢
人中白	鹹平無毒	除鼻衄勞熱 療牙疳口瘡	一錢至三錢

(四) 滋陰劑

藥名	性質	功能	索引	用量
西洋參	甘苦寒	清肺生津	滋陰	一錢至一兩
霍石斛	甘鹹無毒	補脾腎	胃中津液	一錢至五錢
金釵斛	甘平無毒	除虛熱	安神定驚	一錢至三兩
蜂蜜	甘	補中潤燥滑腸		二錢至八錢

南沙參	甘苦無毒	補肺陰	胃熱	五錢至
北沙參	甘苦微寒	補陰潤肺	熱咳以清肺火	五錢至
元參	鹹寒	滋陰除煩	利咽	錢半至四錢
天冬	甘苦無毒	清肺滋腎	止渴消痰定喘	二錢至一兩
麥冬	甘苦無毒	清心潤肺	客熱虛勞脈絕氣絕	一錢至二兩
枳椇子	甘平無毒	除煩渴	解醒酒辟毒	一錢至四錢
阿膠	甘平	和血補陰	和血補陰清肺	一錢至五錢
鱉甲	鹹平無毒	補陰治骨蒸	瘧母經阻痔核	一錢至五錢
龜版	鹹無毒	補心益腎	骨蒸陰虛血弱	二錢至一兩

(五)利尿燥濕劑

瞿麥	草薢	土茯苓	茵陳	澤瀉	豬苓	茯苓	藥名
寒苦	甘平 無毒	甘淡 無毒	苦寒 無毒	甘淡 微鹹	甘平 無毒	甘淡 溫	性質
爲通 治利 淋水 要破 藥血	療通 五去 淋風 白濕 濁補 莖下 痛焦	胃通 療祛 五楊 淋濕 白梅 濁熱 莖補 痛脾	療通 諸利 黃溼 疸熱	瀉通 勝利 膀胱 火便	治與 腫茯苓 脹同 淋而 濁不 消補 渴	赤補 者心 入脾 血通 分膀 皮脛 治行 膚水 腫	功等 能能 索引
八二 錢錢 至至	五二 錢錢 至至	一三 錢錢 至至	五錢 半至	五三 錢錢 至至	五三 錢錢 至至	一三 兩錢 至至	用 量

黃柏	白朮	茅朮	木通	通草	車前子	冬葵子	篇蓄	海金砂
苦寒 無毒	甘苦	甘溫 辛烈	甘淡 無毒	甘淡 無毒	甘寒	甘平	苦平 無毒	甘寒 無毒
除瀉 濕相 熱火 骨補 蒸腎 熱水	補脾 燥濕	升發 陽汗 散化 鬱瀉	瀉輕 小通 腸行 火水	治通 五利 淋水 水退 腫熱	涼通 血利 瀉小 熱便	利潤 便燥 消利 腫絞	通淋 利小 便	清通 熱淋 逐利 濕便
三二 錢錢 至至	一五 兩錢 至至	一五 錢錢 至至	八錢 半至	八錢 半至	五二 錢錢 至至	五二 錢錢 至至	八二 錢錢 至至	一二 兩錢 至至

臨證醫典 用量表

南星	藟衣	冬瓜皮	防己	五加皮	赤小豆	薏苡仁	黃芩	黃連
製星	豆甘平	甘平無毒	辛平無毒	辛苦	甘酸	甘淡微寒	苦寒無毒	苦寒
驚燥	補脾	消水腫除脹滿	通血行	補壯祛	治瀉行	療健補肺	解毒熱	瀉火燥
癩濕	暑除		分之瀉	筋風	痢水散	肺熱胃行	逐安	燥濕
風宣	止渴		熱下	骨濕	脚散氣	肺痿	胎濕	
痰祛								
三錢	八分至	二錢至	五錢至	三錢至	五錢至	一兩至	五錢至	三錢至

地龍	伏龍肝	葶藶	牽牛	苦參	大腹皮	栝榔	昆布	天將殼
無毒	溫辛	寒辛	辛熱有毒	苦	辛無毒	辛無毒	無毒	辛無毒
解煩熱通小便	反去	通大	利大	瀉火燥濕補陰	和消	除瀉	治消	消理
	胃濕	行瀉	小瀉	便氣分	胃浮腫	脹攻堅	瘦水	水疝
	嘔消	肺氣	治水	腫分	家腸中	積聚	疝腫	氣敷
	吐腫	水祕	水腫		脚腕	聚痞		治黃
								蛇咬
錢半	八分至	五錢至	二錢至	三錢至	五錢至	三錢至	八錢至	三錢至

滑石甘淡無毒 滑利竅通行水利便
體重瀉火氣輕解肌
二錢至七錢

(六)攻下劑

藥名	性質	功能	索引	用量
大黃	苦寒無毒	下大瀉血分積滯熱		八錢至八分至
芒硝	鹹辛	潤瀉燥腸堅胃		一錢至五錢
元明粉	甘辛	瀉熱潤燥		一錢至五錢
巴豆	辛熱大毒	水大腫瀉大痢		一分至三小
芫花	苦寒有毒	水咳飲喘急		一錢至三錢
大戟	苦寒有毒	治大腹滿急水濕		一錢至三錢

甘遂苦寒有毒 消大瀉經隧水濕
腫痰迷癩癩
一分至五分

商陸苦寒有毒 療水腫脹滿
一錢至五錢

麻仁甘平 潤燥滑腸
一錢至五錢

郁李仁甘辛 潤燥瀉氣破血
二錢至五錢

(七)引吐通竅通絡劑

藥名	性質	功能	索引	用量
常山	苦寒有毒	行除痰吐逆		一錢至三錢
南瓜蒂	甘平無毒	小宣涌吐痰藥赤		一分至三錢

威靈仙 辛鹹 無毒	桑寄生 苦平 無毒	皂角 辛鹹 無毒	絲瓜絡 甘平 無毒	橘絡 辛平 無毒	菖蒲 辛溫 無毒	麝香 辛溫	穿山甲 鹹	藜蘆 辛寒 有毒
宣行氣驅風溼和 砂仁糖醋煎治骨哽	補筋營散風濕 安胎止崩漏	通關竅開鬱 治中風痰厥	瀉熱涼血宣通總絡 化痰消浮腫發痘瘡	通經絡滯氣作痛 驅皮裏膜外積痰	宣通九竅 客忤驚瀉	香竇通諸竅療 卒中痰厥驚瀉	通經絡達病所 消腫潰癰排膿	宣引吐令人噎
一錢至 三錢	二錢至 五錢	八分至 錢半	二錢至 四錢	八分至 二錢	八分至 二錢	五厘至 三分	錢半至 四錢	二分至 八分

(八) 宣滯行氣劑

降香 辛 無毒	檀香 辛 無毒	沈香 辛苦 無毒	蘇合香 甘溫	木香 辛 無毒	藿香 辛溫 無毒	香附 甘平 無毒	藥名 性
宣辟惡氣 止血定痛	宣理氣殺蟲 止血定痛	重宣調氣平肝 療心腹諸痛	宣通竅辟惡氣	疏肝鬱和脾氣 療氣痛九種心痛	祛暑邪治霍亂 和脾胃去惡氣	調氣不解鬱 月經不調	功能 索引
一錢至 三錢	錢半至 三錢	二分至 一錢	一分至 五分	一錢至 三錢	錢半至 三錢	一錢至 四錢	用量

臨證醫典 用量表

薤白 辛溫	木瓜 酸無毒	荔枝核 甘無毒	橘核 苦平無毒	金鈴子 苦寒有毒	青皮 苦辛無毒	陳皮 辛苦無毒	佛手 辛溫無毒	丁香 苦辛溫
滑利竅助陽	補筋和斂肺舒	宣散止痛	療小腸疝氣	治濕熱利小腹痛	瀉肝除腸滯痛氣	理氣燥中濕	健脾胃進食	燥暖胃補逆
一錢至五錢	二錢至五錢	三錢至五錢	二錢至五錢	一錢至三錢	八分至三錢	一錢至五錢	一錢至三錢	三分至三錢

化橘紅 辛苦無毒	藥名性質	(九)化痰止咳劑	豆蔻 辛熱無毒	砂仁 辛香無毒	九香蟲 鹹無毒	蘇子 辛苦	白芥子 辛溫	橘白 辛平無毒
消痰止咳嗽	功能索引		溫中散寒	快氣調中寬胸	散滯諸痛氣	開鬱平氣逆	宣利氣豁痰	和中調氣
八分至二錢	用量		五分至錢半	八分至錢半	二錢至四錢	一錢至四錢	五分至錢半	一錢至二錢

白前 無毒 苦辛	旋覆花 無毒 鹹苦	杏仁 無毒 甘溫	半夏 無毒 辛溫	半竹 夏無毒 瀝辛平	半法 夏無毒 辛平	款冬 無毒 辛溫	紫菀 無毒 辛溫	川貝母 微寒 苦辛
下瀉 肺痰 止咳 嗽氣	墜下 痞氣 消痰 噫氣 結	潤肺 肌潤 止咳 燥咳 逆	止燥 嘔溼 吐痰	和潤 胃肺 清消 肅痰	止化 煩痰 嘔壅 中咳 風嗽	止潤 咳肺 嗽下 吐氣 膿逆 血	消潤 肺 止瀉 咳火	瀉宣 熱散 化肺 痰鬱
一錢至 三錢	一錢至 三錢	錢半至 五錢	錢半至 七錢	錢半至 七錢	錢半至 七錢	一錢至 四錢	一錢至 四錢	一錢至 四錢

枳實 無毒 苦寒	藥名 性質	冬瓜子 無毒 甘平	浮石 寒 鹹	經粉 無毒 辛	秋石 無毒 鹹	蠶砂 甘辛	海藻 寒 鹹
破氣 行痰 消食 積	功能 索引	補肝 明目 止咳	消瀉 上癰 焦痰 核熱	外燥 用切 殺痰 蟲涎	治虛 勞咳 痰嗽	燥濕 去痰	瀉熱 消痰 癭瘰 癰聖
一錢至 三錢	用量	錢半至 五錢	一錢至 四錢	一分至 五分	一錢至 三錢	一錢至 五錢	三錢至 七錢

(十) 消導驅蟲劑

雷丸 有苦寒毒	五穀蟲 無鹹平毒	萊菔子 無辛甘毒	鷄內金 無甘平毒	穀芽 無甘毒	麥芽 無鹹毒	神麴 無甘辛毒	山查 無酸平毒	枳殼 無苦酸毒
療殺 蟲疳 積熱	瀉熱 療疳 積	行氣 化痰 消食	消水 穀治 瀉痢	健食 消脾 積化	開胃 消健 積脾	宣痰 消行 食氣 積化	瀉滯 化氣 痰消 瀉食 積	破積 痰除 疳痞 積滿
一錢至 四錢	一錢至 三錢	一錢至 四錢	一錢至 四錢	二錢至 一兩	二錢至 一兩	二錢至 五錢	二錢至 五錢	一錢至 三錢

當歸尾 無苦溫毒	藥名 質性	獼猴肝 甘鹹溫	阿魏 無辛平毒	蕪荳 無辛平毒	使君子 無甘毒	樾實 甘瀉	百部 無甘溫毒
養血 去瘀 行	功能 索引 用量	補肝 腎止 疳痛	瀉積 牛馬 殺蟲 辟惡	療疳 蟲疳 散消 溼積	健脾胃 積要 殺蟲	潤肺 殺蟲	潤肺 殺蟲 疥癬 而
一錢至 五錢		三分至 三錢	二分至 五分	二分至 八分	一錢至 四錢	一錢至 三錢	一錢至 四錢

(十一) 祛瘀生新劑

臨證醫典 用量表

懷牛膝 甘酸 無毒	茜草 酸鹹 溫	紅花 辛 無毒	桃仁 苦甘 無毒	益母草 辛甘 無毒	牡丹皮 辛 寒	丹參 微寒 味苦	延胡 辛 溫	赤芍 苦酸 無毒
散惡血引諸藥下行 瀉熱尿血淋痛經阻	消行瘀血通止經血	潤活燥血止通痛經	通瀉破瘀血潤秘	調經善治產婦疾 通行瘀血生新血	破瀉血中伏火新血 破積血生新血	安破瘀生胎墮死胎經 安生胎墮死胎經	氣活血利氣行血中 氣滯血中血滯	清胎熱解清血熱 瀉肝火解清血熱
二錢至五錢	二錢至四錢	八分至二錢	三錢至七錢	一錢至五錢	一錢至四錢	一錢至四錢	一錢至三錢	一錢至五錢

蘇木 甘鹹 無毒	乳香 辛 無毒	沒藥 苦平 無毒	鬱金 辛苦 寒	蒲黃 甘平 無毒	地榆 苦酸 微寒	三七 甘 溫	澤蘭葉 甘苦 無毒	牡牛膝 甘寒 微毒
破瘀血止治腹撲痛傷	宣活血虛伸痛筋	宣散瘀定痛	涼行氣解瘀血鬱	炒生滑行血消瘀 用瀉止血失血瘀	瀉止下焦諸血	散止諸血定清熱	調行血消經水	破血熱解吐毒痰
二錢至八分	二錢至五錢	二錢至五錢	一錢至四錢	四錢至五錢	二錢至五錢	三錢至錢半	四錢至一錢	二錢至五錢

藕 平瀉	地鱉虫 鹹	水蛭 平鹹	血餘 寒苦	樓櫚 瀉苦	烏藥 無辛溫 無毒	琥珀 平甘	三稜 苦平 無毒	義蓬 無辛 無毒
止涼 諸血 血散 證瘀	通經 破血	破惡血除積聚	瘰癧小兒驚熱	止澀 諸熱 失斂 血脫	宣瀉氣止冷逆腹瀉滯 諸蟲婦人血凝	安瀉行 治水 五散 瀉	瀉行氣破血去瘀 瘀積阻積聚	消積破血行氣
一兩至	三錢至	四錢至	二錢至	八分至	四錢至	一錢至	三分至	四錢至

花龍骨 無甘瀉 無毒	藥名 性質	功能 索引 用量	自然銅 無辛平 無毒	荷葉 無苦平 無毒	土槿皮 無苦平 無毒	白芨 苦辛 平	五靈脂 無甘溫 無毒	學藤根 無甘寒 無毒
瘰癧多治崩帶	固精斂汗安魂	一兩至	瘰癧折傷續筋骨	輕宣升陽散瘀	活潤血燥消赤腫	逐補瘀肺生新血	散破瘀血止痛	胎瀉動熱下瘀
二錢至	二錢至	七錢至	二錢至	四分之 一張至	五錢至	四錢至	八分至	五錢至

(十一) 收斂劑

臨證醫典 用量表

覆盆子 溫酸	秦皮 無苦寒毒	烏梅 溫酸澀	禹餘糧 甘澀	赤石脂 無酸甘毒	芡實 甘平澀毒	山藥 無甘毒	白芍 無苦酸毒	牡蠣 鹹澀
平補肝腎固便	治熱痢漏	久瀉痢	重澀固下	止血而澀痢下	小補脾澀精	補脾肝澀精	補血瀉肝胎火	輕堅化痰消癭結核 斂脫療潰精崩帶止汗
二錢至五錢	一錢至五錢	一錢至四錢	二錢至三兩	二錢至一兩	二錢至一兩	錢半至五錢	一錢至一兩	二錢至三兩

蓮子 無甘澀毒	荷蒂 無苦平毒	山茱萸 酸辛溫澀	五味子 無溫酸毒	訶子 無苦毒	金櫻子 無酸澀毒	蒺藜 溫苦辛	癭桃乾 甘辛酸	浮小麥 鹹涼
補脾固精	安胎消瀉	補肝腎小澀便精	補肺腎定喘精	平瀉腸欬逆痰	泄痢夢洩便遺數精	益精明目	解熱止汗	止虛汗盜汗
一兩至三錢	五枚至兩枚	三錢至八分	錢半至五分	二錢至七分	一錢至五錢	一錢至五錢	三錢至八分	一兩至三錢

蓮蕊鬚 無毒 清 遠 精 烏 髮 髮 錢半至四錢	枯礬 無毒 燥 血 定 瘵 痛 五錢至三錢	蛤粉 無毒 與牡蠣同功 小 便 一兩至三錢	烏賊骨 無毒 治血枯 除吐 下 四錢至八分	五倍子 無毒 收 盜 汗 一兩至三錢	(十三)安神鎮痙劑		藥名 質性	功能 索引	用量	金箔 無毒 重鎮心 肝 定 志 四分之 一 張至二張	茯神 甘平 補安 魂 養 神 一兩至二錢
遠志 無毒 苦 溫 補心 腎 強志 明目 五錢至一錢	酸棗仁 無毒 平 甯 煩 斂 補 汗 一錢至五錢	柏子仁 無毒 辛 補心 脾 潤肝 腎 錢半至五錢	淮小麥 無毒 微 利養 心 除 血 煩 一兩至三錢	代赭石 寒 苦 養重 陰 血 逆 一兩至二錢			紫石英 無毒 甘 溫 肺重 鎮 心 驚 養 一兩至三錢	白石英 無毒 甘 辛 重 潤 肺 驚 欸 一兩至三錢	龍齒 無毒 清 涼 鎮心 安 神 疾 一兩至三錢	鉤藤 甘 苦 治大 兒 驚 頭 眩 目 眩 三錢至五錢	

臨證醫典 用量表

杜仲 甘辛 溫	菴蓉 甘溫 無毒	官桂 辛甘 大熱	夜交藤 苦澁 無毒	鮮首烏 甘溫 無毒	枸杞子 平甘	鹿茸 溫甘	熟地 甘溫 無毒	黃精 甘平 無毒
固攝胎墜胎漏	治腰膝發痛	療補腎填精	療大燥便瀝閉火	添補肝腎強筋骨	強筋骨延年不老	補虛勞強筋骨明目	潤肺清肝滋腎生精	補中益氣而去
七錢至	二錢至	一兩至	三錢至	一兩至	二錢至	五錢至	一兩至	三錢至

菱 甘平 無毒	狗脊 苦平 無毒	夏草 甘平	冬蟲 甘平	蛤蚧 平鹹	鍾乳 甘溫	女貞子 苦甘	旱蓮草 鹹甘	桑螵蛸 鹹平 無毒	續斷 苦辛 溫
潤心肺而去風濕	補中益氣除煩渴	強補腎固精	保肺益腎止勞嗽	定喘止咳	療虛勞下乳汁	強壯腰膝	黑髮烏鬚	通淋縮小便	療腰痠胎漏崩帶
一兩至	二錢至	一兩至	五錢至	一通對常	七錢至	一兩至	二錢至	五錢至	一錢至

藥性升降浮沈補瀉法

足厥陰肝經 味辛補酸瀉 所以氣溫補涼瀉

足少陽膽經 味辛補酸瀉 所以氣溫補涼瀉

手少陰心經 味鹹補甘瀉 所以氣熱補寒瀉

手太陽小腸經 味鹹補甘瀉 所以氣熱補寒瀉

足太陰脾經 味甘補苦補 所以氣溫涼寒熱補

足陽明胃經 味甘補苦補 所以氣溫涼寒熱補

手太陰肺經 味酸補辛瀉 所以氣涼補溫瀉

手陽明大腸經 味酸補辛瀉 所以氣涼補溫瀉

足少陰腎經 味苦補鹹瀉 所以氣寒補熱瀉

足太陽膀胱經 味苦補鹹瀉 所以氣寒補熱瀉

五臟所欲

肝欲散。急食辛以散之。以辛補之。以酸瀉之。心欲耍。急食鹹以耍之。以鹹補之。以甘瀉之。脾欲緩。急食甘以緩之。以甘補之。以苦瀉之，肺欲收。急食酸以收之。以酸補之。以辛瀉之。腎欲堅。急食苦以堅之。以苦補之。以鹹瀉之。

五臟所苦

肝苦急。急食甘以緩之。脾苦濕。急食苦以燥之。心苦緩。急食酸以收之。腎苦燥，急食辛以潤之。肺苦氣上。急食苦以泄之。

五氣凌五臟例

燥氣入肝。腥氣入肺。香氣入脾。焦氣入心。腐氣入腎。

五行五色五味走五臟主禁例

東方之木。其色青。其味酸。其臟肝。肝主筋。木曰曲直作酸。酸走肝。筋病人無多食酸。南方之火。其色赤。其味苦。其臟心。心主血凡火曰炎上作苦。苦走心。血病人無多食苦。西方之金。其色白。其味辛。其臟肺。肺主氣。金曰從革作辛。辛走肺。氣病人無多食辛。中央之土。其色黃。其味甘。其臟脾。脾主肉。土曰稼穡。

作甘。甘走脾。肉病人無多食甘，北方之水。其色黑。其味鹹。其臟腎。腎主骨。水曰潤下作鹹。鹹走腎。骨病人無多食鹹。

手足三陽表裏引經主治例

太陽足膀胱 手小腸 上羌活 下黃柏 少陰足腎 手心

上黃連 下知母 少陽足膽 手三焦 上柴胡

下青皮 厥陰足肝 手包絡 上青皮 下柴胡

陽明足胃 手大腸 上生麻 白芷 下石膏 太陰足脾 手肺

上白芍 下桔梗

諸藥瀉諸經之火邪

黃連瀉心火。梔子黃芩瀉肺火。白芍

瀉脾火。柴胡黃連瀉肝膽火。知母瀉腎火。木通瀉小腸火。黃芩瀉大腸火。柴胡黃芩瀉三焦火。黃柏瀉膀胱火。

諸藥相反例

甘草反大戟、芫花、甘遂，海藻、烏頭反半夏、括蕁、貝母、白芫、白蘆。藜蘆反細辛。芍藥、人參、沙參、苦參、丹參、元參。

十八反歌

本草明言十八反。半萋貝蘆芫攻烏。藻戟遂芫俱戰草。諸參辛芍叛藜蘆。

十九畏歌

硫黃原是火中精。朴硝一見便相爭。

水銀莫與砒霜見。狼毒最怕蜜陀僧。巴豆性烈最爲上。偏與牽牛不順情。丁香莫與鬱金見。牙硝難合京三稜。川烏草烏不順犀。人參最怕五靈脂。官桂善能調冷氣。若逢石脂便相欺。大凡修合看順逆。炮燼炙博莫相依。

六陳歌

枳殼陳皮半夏齊麻黃狼毒及茱萸。六般之藥宜陳久。入藥方知奏效奇。

五臟補瀉主治例

肝虛者。陳皮生薑之類補之。虛則補其母。腎者肝之母也。熟地黃黃柏補之。如無他症。錢氏地黃丸主之。

實則白芍藥瀉之。如無他症。錢氏瀉青丸主之。實則瀉其子。以甘草瀉心。心者肝之子也。

心虛者。炒鹽補之。虛則補其母。肝者心之母也。以生薑補肝。如無他症。錢氏安神丸主之。實則甘草瀉之。如無他症。錢氏方中重則瀉心湯。輕則導赤散。

脾虛者甘草大棗之類補之。實則黃連枳實瀉之。如無他症。錢氏益元散主之。虛則補其母。心乃脾之母。以炒鹽補心。實則瀉其子。肺乃脾之子。以桑白皮瀉肺。

肺虛者五味子補之。實則桑白皮瀉之。如無他症。錢氏阿膠散主之。虛則補其母。脾乃肺之母。以甘草大棗補脾。實則瀉其子。腎者肺之子。以澤瀉瀉腎。

腎虛者。熟地黃黃柏補之。腎無實不可瀉。錢氏止有補瀉地黃丸。無瀉腎藥。虛則補其母。肺乃腎之母。以五味子補肺。

以上五臟補瀉。素問藏氣法時論。備有之矣。欲究其詳。再著本論。

用藥凡例

頭角痛。須用川芎。血枯亦用，顛頂

痛。須用藁本。徧身肢節痛。須用羌活。風濕亦用。腹中痛。須用白芍厚朴。臍下痛。須用黃柏青皮。心下痛。須用吳茱萸。胃脘痛。須用草豆蔻。脇下痛。須用柴胡。日晡潮熱寒往來亦用。莖中痛。須用生甘草梢。氣刺痛。須用枳殼，血刺痛。須用當歸。心下痞。須用枳實。胸中寒痞。須用去白陳皮。腹中寒。須用蒼朮。破血須用桃仁。活血須用當歸。補血須用川芎。調血須用玄胡索。補元氣須用人參。調諸氣須用木香。破滯氣須用枳殼青皮。肌表熱須用黃芩。去痰

亦用。去痰用半夏。去風痰須用南星。諸虛熱須用黃耆。盜汗亦用。脾胃受濕用白朮。去痰亦用。下焦濕腫。用漢防己草龍胆。中焦濕熱用黃連。下焦濕熱用黃芩。煩渴須用白茯苓葛根。嗽者用五味子，咳有聲無痰者用生薑杏仁防風。欬有聲有痰者。用半夏枳殼防風。喘者，須用阿膠天門冬麥門冬。諸泄瀉。須用白芍白朮。諸水瀉。用白朮白茯苓澤瀉。諸痢疾。須用當歸白芍藥。上部見血用防風。中部見血用黃連。下部見血用地榆。眼暴發。須用當歸黃連防風。眼久昏

暗。用熟地黃當歸細辛。解利傷風。須用防風爲君。白朮甘草爲佐。解利傷寒。甘草爲君。防風白朮爲佐。凡諸風。須用防風天麻，諸瘡瘍。須用黃柏知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。瘡疾。須用柴胡爲君。隨所發之時。所屬經部分。以引經藥導之。

以上諸藥。此大略言之。以爲處方之階。

