

增輯

驗方

方

新編

石部

部

二卷

肩部
胸部
各種氣痛
脾胃
噎膈

手部
肋部
咳嗽
痰疾
呃逆

腋部
心部
勞傷
吐血
三消

乳部
肺部
哮喘
飲食
積滯

驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩癰癤

肩甲縫中積痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽 又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手了枝痛不可忍

手指觸着衣服痛癢破爛

手指斷落

手被咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鐵

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動

手足作痛

手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部

肩下卽是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下疙瘩

音隔答

腋下癭瘤

腋下狐臭

乳部

乳頭破裂

乳上濕瘡

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰

乳癰多至二三百頭者

乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈

乳癰久不收口

錄
目錄

石

馬方親編 卷二
乳岩

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人乳忽縮入

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳孔塞痛

婦人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多發脹

無子食乳腫痛難消

胸部

胸膈閉結不通

胸滿腹脹

胸前生孔

胸旁生瘡

龜胸

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

驗方新編卷二

肩部

擔肩癰癤 此惟擔夫有之

五楮子 燒存性 爲細末加黃丹 用水飛過 醋調敷之甚效

又方 照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之

又或

王部平 烟在 欲賦 亦 復 爲 謂 謂 想 之 詩 終

謝 賦 繼 繼

賦 賦

謝 賦 繼 繼

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一個

目赤腹無

八字文者忌用

破去腸雜

不可破胆胆汁沾指更痛

將瘡頭套住用繩紮好並

將蝦蟆心肝焙枯研末沖酒服以免毒氣攻心約一對時

破口出膿而愈套住之後瘡頭猶如針刺痛更難忍甚至

心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急服護心散

見癰毒諸方

或服麻油一盞

菜子油亦可

心自安定蝦蟆能拔極重

惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘

誤將蝦蟆揭去別藥難醫為害不小去膿後如發昏暈亦

不必驚慌用高麗參三四錢以砂罐煮濃汁服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃厚易見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若再腫痛此毒氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃膿盡即不再發此瘡最爲陰惡此方極屬神效不可輕視

又方鳳仙花下半截連根不用水洗和甜酒糟搗融敷有人指頭

生瘡腫大如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦

蟆方尤爲神速又方用磁片將瘡刺破查照疔瘡方

內蜘蛛拔毒治之見癰毒諸疾疔瘡門止痛消腫最爲神效

又方蜈蚣焙枯爲末猪膽調搽神效

又方 鷄蛋一個穿一小孔入信石壹分套指頭上熱則

再換立刻止痛如神真仙方也較前各方功效更大

又方 雄黃 枯礬 各等分研末用麻油或醋敷亦極

效驗 又方 白蘿蔔挖孔入雄黃三分蒸半熟套指頭

或用真烏梅仁嚼爛敷之均極效驗 又方 如色白者

照後脫骨疽陽和湯各方治之又方雞子清磨雄黃敷之
又方陳柿餅雄黃搗敷

脫骨疽

此症生手足各指或云生手足
第四指者是或生指頭或生指節指縫

初生或白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟紅

棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐爛黑陷

痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜用 頂大

甘草研極細末用香麻油調敷要敷極厚一日一換不可

閒斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用 金銀花

元參各叁兩當歸貳兩甘草壹兩水煎服一連十劑永無

後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要

又方 大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸均見

陰疽色紅者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百

中之方也 又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷

數日必愈神效

甲疽又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒壹

兩黃芪貳兩醋浸一宿入猪油五兩微火上煎取二兩絞

去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方也

又方用乳香外膽礬外研細時時敷之此病須剔去甲不

藥亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效

又方用皂礬五錢火煨候冷研末先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之

舊紬裹定一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼

痛又方陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪

去肉中爪甲外用蛇退燒灰雄黃壹錢為末乾摻或香油

調敷又方輕粉乳香沒藥各壹錢黃丹貳錢赤石

驗方新編 卷二 手部

脂五錢

寒水石叁錢

煨

共為末濕則乾摻乾則油調最妙

又方甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效

又方又見頭部頭角太陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上削去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花

又名指花

連根蒂葉搗敷指甲上用布包好

一日一換月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰

查藥物備要便知

和銀硃共搗擦之若延遲不治必生蛇

頭蛀節等疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣之類效

又衣指頭畏冷未融稠蠶絲其味...

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡

入自愈生黃豆柳蠟燭其效...

生藤手足指頭羅紋生瘡消...

生橄欖核有鹽者煮去鹽味用切兩段醋磨鷄毛蘸搽二十日後漸

消...

此各指節生瘡...

名曰蛀節生黃豆嚼融敷須先漱即愈

各指指甲下生瘡...

手部

名曰蛙甲治與上蛙節同

十日十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用 赤茯苓 白茯苓 胡黃連各錢半煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早

治即爛入手大指二指間為虎口又名義指

生蒲公英搥融敷之數日即愈

又方 生黃豆嚼融敷將口漱淨再嚼甚效

又方 通草為末用雞蛋清調敷其腫即消

又方 白芨叁錢研末蟾酥壹錢共和雞蛋清搽神效

又方 白芷 滑石 黃丹各等分研極細末敷之神效

此等手並枝痛不可忍白并盤用生桐子研末用

通草研末生雞蛋白調敷即愈如不效更敷不離

用發手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自

好倘一經抓擦則纏綿難愈用麻白芷煎黃丹 滑石各

等分研極細末敷之神效或用玉真散見跌打敷之亦極

更效手指斷落

方見卷十三跌打損傷門之輒效如用白曲膏時敷之

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇蟲咬傷門蘇頌制蘇蘇不日肉必消

手足及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必有

手蟲

猪肝切片和桃葉搥融敷之神效或用白油膏見腿貼之

更妙

手指手掌皮厚如鐵

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擊疽又曰托盤用生附子切片貼之或用

生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作痛作癢切
不可用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉一分
貼之必愈

又方 白鹽 花椒 末 等分醋和敷之未破者極效已破
者勿用

又方 塘雞糞敷之或用鮮桑葉搗敷均極效如腫而不
甚紅又不甚痛者照卷十一陰疽各方治之爲要

鷺掌風

生手掌上紫白斑點叠起白皮堅硬乾燥甚則叠叠脫皮
血肉外露或癢或痛久則成癬難愈用一大碗以紙緊糊

碗口

紙上用針刺破多孔

上鋪細米糠二三寸厚手鎊燃炭放糠上

緩緩燒之燒至離紙三分光景將炭與糠一并棄去

將紙不可

穿取碗中糠油時時搽之數日斷根屢試神效有人患此

筋肉現露十餘年不愈照此醫痊永不復發

又方

真小磨麻油

壹兩

紅砒

壹錢

敲細入油煎至砒枯

烟盡為度去砒留油冷透火氣用火烘油擦三五次十日

即愈血寒者最宜此林屋山人極驗方也

又方

鉛彈子

貳個如核桃大

每日在手內搓弄搓熱將鉛彈子

握緊晝夜不歇如此十餘日即愈愈後再搓一二月則不

復發

手腕生物如豆紅紫疼痛

治法見卷十一癰毒門葡萄瘡內

如大手臂生瘡腫大如拳

以小刀畧破其皮

或用癰毒門代刀散

敷之即破

真硼砂

上

冰片

各壹

輕粉

五釐

為末摻之即化為水而愈矣

猪油和羊糞塗之或水煮馬糞洗之

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解

黃蘆

酒浸一夜焙乾研末每服二錢酒調下頗效

手足作痛

手足痛入以為脾經之熱不知非脾也乃肝木之鬱結也

散其鬱氣則手足之痛自去用逍遙散見內外備用諸方加梔子

參錢

製半夏 白芥子

各貳錢

水煎服二劑其痛若失蓋肝

木作祟則脾不敢當其鋒氣散於四肢結而不伸所以作

痛今一旦平其肝氣而脾氣自舒脾舒而痛在手足有不

盡除者乎

手足生瘡久不收口

取大路口多人撒尿木板爛成白色者以炭火煨化研細

末加冰片少許摻之即愈或照癰毒門瘡不收口諸方

治之

小兒手軟

豆豉

薏仁 當歸 秦芫 酸棗仁 防風 羌活 各五錢 其爲

末蜜丸芡實大荆芥湯化下

新增不二散 采驗方拔萃

治手足患毒橫紋區處並蛇頭眼腹等症拔毒去腐如神

幸勿泛視 杜蜈蚣 八錢曬乾生研 雄精 四錢 上藥兩味共研細

末臨用看症輕重酌量同雄猪膽汁調和敷患上或生指

頭將藥入猪膽套在指上如乾加膽汁不二散立刻止痛

套三四次即潰潰後摻前藥膏蓋即拔膿去腐再上生肌

桃花八寶散收功忌開刀開即翻花綿延難愈灸即痛苦

異常萬勿用生降拔提之藥倘誤用致橫肉吊空腫脹實

驗方行編 卷二 手部 上

難收口此鑿治失宜反增痛苦耳慎之慎之初起用飛龍
奪命丹一二服汗之汗之未愈內宜服仙方活命飲外用
不二散此余應手治法也

新增誤斷指頭

用降香細末搽之包以絲棉七日即痊不可落水冒風親

試有驗 采驗方拔萃

腋部 肩下即是

其腋下腫硬形如鴨蛋內恐人聞便取量出此六封

色紅者照癰毒各方治之皮色不變者照陰疽各方治之

又式腋下疔瘡 音隔答

如豆如米或麻或痛恐是疔瘡查疔瘡門辨別治之

又式腋下癭瘤

治法見癭瘤門日心湖卦連前衣衣前野輒認百發百中

如出腋下狐臭賦神餅一發其而末日熱煖穴神香之日

用蒸餅一個劈作兩片放蜜陀僧細末共二錢急夾在腋

下略睡片時候冷棄去如係一腋狐臭只用一片夾之有

腋方斤編 卷二 腋部 三 石

人患此二十餘年照治斷根屢試不爽

又方 頂大蜘蛛一個 或用小蜘蛛兩個亦可 黃泥包好火內燒紅

取出候冷去泥加輕粉一錢共研末日搽數次輕者二日

即愈重則三四日必斷根較前方尤簡便神驗百發百中

又方 蜜陀僧 潮腦 各四兩 枯白礬 貳兩 輕粉 叁錢 右為

細末頻擦兩腋擦至半月見效不可開斷半年全愈

又方 麝香 壹分 膽礬 貳分 水粉 叁分 取田螺 貳個 將

音掩起開以各藥入螺中過一夜螺肉即化為水將水擦腋

下其臭從大便出宜埋土內恐人聞則頭眩暈也此方極

效不可輕視

勻置銅器中炙溫敷之日二次即愈神驗非常

乳癰

紅腫疼痛者是
男女皆有此症

炒白芷

製乳香

製沒藥

製法見藥
物備要門

浙貝

歸身

各

等分研末每服五錢酒送一服全消如已潰爛用醒消丸
酒送一服以止其痛外貼洞天膏自愈如色白者照流注
治法倘潰爛不堪者以洞天救苦丹按法與服七日後接
服大棗丸收功此林屋山人秘法也醒消諸方見癰毒門
又方 生蒲公英搗爛沖酒服渣敷乳上略睡片時數次
即愈此為乳癰聖藥屢著神奇不可輕視

又方

豆腐店棹上做豆腐淋下之水

桶入鍋熬乾成

膏冷透火氣厚厚敷之乾卽再敷乳上結塊自消五七次
必愈屢試神驗有人借貸五百金無力歸還以此方神效
奉贈後試之果驗人稱之五百金方此方雖治乳癰旣稱
乳上結塊自消則乳岩似亦可治

又方 並治乳吹 葱連根搗爛敷上用瓦罐盛炭火蓋
葱上一時蒸熱出汗卽愈穩而神效未試者試之
乳癰多至二三百頭者

柳樹根刮去皮搗爛蒸熟布包熨之冷則隨換過一宿卽
愈此孫真八千金方也

乳癰腫及頭面

照卷十五瘟疫門大頭瘟蚯蚓方治之其效如神
乳癰日久腫痛不愈

蝦醬用好醋蒸熱敷之諸藥不效者治之奇效
乳癰久不收口

用茅屋上陳年舊茅草剪尾一束研末加頂上梅花冰片
少許敷患處愈

乳岩 男女皆有此症

此症乳内生一小粒初如豆大漸大如塊如棗如圍碁子
不癢不痛至一年後或二三年漸漸腫痛臭爛孔深亦有
初起色白堅硬一塊作痛此係陰疽最爲險惡因哀哭憂

愁患難驚恐所致急宜早治遲則難愈初生用犀黃丸每

服叁錢

酒送十服全愈或以陽和湯加土貝

五錢

煎服數

日可消倘悞貼膏藥必漸腫大內作一抽之痛已覺遲治

倘皮色變異難以挽回勉以陽和湯日服或以犀黃丸日

服或二藥每日早晚輪服服至自破而痛者外用大蟾

即癩

蟻六隻每日早晚取一隻破腹刺多孔連腸雜去膽貼於

患口以拔其毒一日一換連貼數日若爛孔深大須將蟾

腹腸雜填孔每日用葱湯溫洗一次內服千金托裏散三

日後接服犀黃丸可救十中三四乳岩最不易治此方極

爲穩妥古來名方皆不及此若破後不痛而癢極者無一

毫挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一活一婦兩乳皆
患乳岩兩載如桂圓大從未醫治因子死悲哭形大如盃
以五通犀黃丸每日早晚輪服九日全消又一男子亦患
乳岩因用鯽魚膏貼上兩日發大如拳色紅令其揭下與
服陽和湯四劑倘色轉白可救色若仍紅無救矣四日患
色仍紅哀懇求治以犀黃丸陽和湯輪服至十六日四處
皆消獨瘡頭破爛用蟾拔毒之法半月收功又一婦患乳
岩寒熱痛甚余以陽和湯同二陳湯煎服止痛安睡連進
三服全愈又一婦患亦相同其弟以夏枯草粉連翹橘葉
等藥連服五劑號痛不絕余視白色已變微紅難以全消

卽用肉桂炮薑麻黃加二陳湯煎服服下痛止瘡亦縮小
連服數劑瘡頂不痛而破貼陽和解凝膏收功此林屋山
人治驗秘法也犀黃丸諸方見陰疽門

又方 已潰爛者用洞天救苦丹見癰毒諸方 每服三錢陳酒

送下隔兩日一服數日膿盡收功神效或用陽和解凝膏

貼之或用蝦蟆散見同前 或照上蝦蟆拔毒之法俱極神效

又方 如初起者用 夏枯草 蒲公英 漏蘆 橘葉

雄鼠糞兩頭尖者是 甘菊 貝母 紫花地丁 山慈姑 連

翹 白芷 瓜蘖仁 炙草 廣皮 茵根 乳香 沒

藥 銀花各二錢研末另用 夏枯草熬膏和勻爲丸如

驗方斤編 卷二 乳部 二

梧子大每服五錢滾水送下至重二服全消屢試神驗此
王晉三經驗方也價廉易製貧寒之家最宜

男子乳忽壅腫如婦人乳

金銀花 各壹 蒲公英 各壹 花粉 白芥子 各五 製附子 木

通 各壹 柴胡 貳 白芍 通草 梔子 茯苓 各叁 水煎服

婦人乳忽縮入

急用兩手緊緊抓住取公雞一隻約重十兩內外連毛破

開去腸雜加真麝香 壹錢 入雞肚內覆肚臍上即愈

婦人產後兩乳伸長細小如腸垂過小腹痛不可忍

川芎 當歸 各四 瓦器煎水時時服之另用川芎 當

歸各壹斤

切大塊於爐內慢火燒烟安病人面前桌下務使

烟氣不絕令伏桌上將口鼻及兩乳常吸烟氣如藥盡未
痊仍如前法煎服燒薰必安如藥已用過三料兩乳雖縮
上而不復舊用冷水磨葷蒜子一粒塗頭頂心俟乳縮即
時洗去

又代婦人乳吹時時吹氣有聲肉不硬也

硃砂筆寫子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥等字於本婦所

戴簪上

本命所屬

之字不寫戴之即愈於初起時用之最妙

又方照上乳癰葱蒸法治之

婦人乳孔塞痛參看婦人科產後擠乳頭方

石

用核桃肉數顆搗碎滾酒沖服即愈

婦人乳汁不通

貝母 知母 牡蠣粉 各等分爲末用猪蹄湯調服二

錢即通此秘方也

又方 鮮蝦壹筋 去皮鬚足用肉不拘多少淨磁器內搗

爛陳酒熱服盡量飲之少時有乳再用猪蹄湯飲之日飲

幾次乳如湧泉效驗如神但蝦止服一次猪蹄湯可以長

服 又方 內服前藥外用木梳梳乳周回百餘遍即通

乳汁自流不止

此虛極也宜服十全大補湯

見內外備用諸方

或請名醫調理

乳多發脹

紅花 歸尾 赤芍 牛膝各壹錢 煎服即愈

無子食乳腫痛難消

麥芽壹兩炒 川芎 壹錢 當歸 白芍各叁錢 生地貳錢 煎服即愈

又方 麥芽壹兩炒 煎水當茶服即止

又方 用本夫穿過包腳布敷乳過夜腫消痛止而愈或

本婦現穿之鞋包乳上過夜亦消

醫方類編 卷之九 乳部 石

用核桃肉製成餅酒沖服即愈

婦人乳作不消

貝母 知母 杜鵑 各等分 為末 酒服

本誠更察之 辨於其上 嚴對衣箱

天式 根本夫察嚴回 職守應為 嚴所輒能 融土與魚

又式 芝菜製成 煎末當茶 煎服 用猪蹄湯飲之 日

多美 言酒 白芍 各等分 煎服 煎服 煎服 煎服

無子食其 煎服 煎服 煎服 煎服

煎服 煎服 煎服 煎服

煎服 煎服 煎服 煎服

胸部 與心脾各部參看

胸膈閉結不通

按之極痛或通而復結氣喘煩燥狂亂而熱極者取生

蚯蚓又名曲蟥四條洗淨研如泥入生薑汁薄荷汁各壹匙茶挑壹匙蜂蜜

半酒盃井水調服若熱甚者加真梅花水片一二分服再揉

心下片時汗出而愈神效如因寒熱痰痞水食結胸者照

卷十四傷寒門葱薑熨法最妙如因飲食積滯結胸者查

卷四飲食積滯門外治法治之若痰氣結胸查後痰疾各

方治之

胸滿腹脹

胸滿腹脹 木屎引木來致土結也甚至良面黃腫水

此脾土衰弱肝木氣旺木來尅土故也甚至身面黃腫亦

有不黃腫者用 蒼朮 貳筋淘米水泡一日兩夜燒存性 甜酒麴 四兩燒存性

皂礬 壹筋醋泡曬乾入瓶內煨存性 加平胃散共為末醋為丸如梧子大

每服三四十九酒下 米湯亦可 日服兩次神效此仙方也

胸前生孔

有人胸生一孔咳嗽則與此孔相應隨有膿血而出此肺

痿也用 黨參 生黃芪 當歸 金銀花 各叁錢 生甘草

連翹 各錢半 官桂 壹錢 煎服數次自愈

胸旁生瘡

凡大人小兒胸閒兩旁各生紅白癩泡濕爛疼癢每處直

長一條連生十餘個不等名曰簾珠倒掛久則難治諸藥不效用端午日人家簷口所挂菖蒲連根葉切碎瓦上焙枯研末香油調搽五六次卽愈屢試屢效

龜胸

龜尿時時擦之久久自平龜尿難得以鏡對龜照之尿自出也

馬刀嘉納

嘉納

嘉納

嘉納

嘉納

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

此名淵疽症百藥難效惟用

隔蒜灸法

見癰毒通治門

在兩小

腿陽陵泉穴

穴在膝下外邊一寸以腿縮攏有一窩卽是

各燒七下或十四下

卽愈如不見效色紅者照癰毒方治皮色不變者照陰疽

方治

式節

晴愈暖不長效已為

照期刻泉穴明海

此合開竅益百藥獲效

眼可生靈人眼育靈

眼痛

驗方新編卷三目錄

心部

心氣疼痛

心痛喉腫閉目不語

心氣怔忡

心胸煩滿

水停心中有聲如雷口眼歪斜不省人事

心膈飽脹腹中又飢又痛

心中饑雜似辣非辣似餓非餓似痛非痛得食暫止

或兼噯氣或兼惡心

一切寒熱痰痞水食結住心胸

心下堅大如碗邊如旋盤

心疼忽長肉一條手不可近

心口生疽烈熱水食禁心窩成漏

肺部兼劉尿逆兼惡心

肺癰潮熱吐痰非熱以潤其燥以燥其津以寒其熱以熱其寒

各種氣痛如胸中又膈又腹

心胃氣痛胃糧破雷口即至香鬱散

銀黃散小薑附散

失笑散小腎氣上衝心痛

走注氣痛忽有一處如打撲之狀痛不可忍走注不

定靜時其處冷如霜雪

心胃蟲疾作痛

酒食凝滯攻衝作痛或有形或無形鄉人稱為穿心

箭痛

咳嗽

胸膈脹滿

咳嗽不安

咳嗽痰喘

咳嗽氣喘

咳嗽氣喘遇寒即發

諸般咳嗽

肺虛咳嗽

肺痿咳嗽

咳嗽痰血

寒咳

熱咳

咳嗽嗆逆落枕即發

年久咳嗽

咳嗽喘逆

久嗽連至四五十聲者

年老久嗽不能臥

咳嗽聲啞

小兒晝夜咳嗽食少髮黃

勞傷吐血

勞症諸方

吐血治法

咳血

咯血痰帶血絲

驗癆蟲法

灸癆蟲法

治癆蟲法

童子癆

新增嗜咳帶血湧不止

哮喘

喉內有聲而氣喘者是

治哮喘妙法

新增哮喘各方

驗方新編卷三

心部

與胸及脾胃各部參看

心氣疼痛

方見後各種氣痛門

心痛喉腫閉目不語

方見咽喉門

心氣怔忡

龍眼核

壹斤即桂圓核

去黑皮長流水煮極爛加大黑棗壹斤去核

搗爛如泥為丸每晨淡鹽湯下叁錢即愈

又方 焦白朮時時煎服極效有人心忡百葯不效後一

名醫云是脾虛常服白朮自愈試之果效白朮多食橫

中滯氣惟用荷葉包裹久蒸或用蜜炙則可服也

又方 積猪心

闡割者為積猪

蒸熟切片蘸真硃砂

少許

飯後食

之三五次即愈硃砂不可多服

又方

白蓮肉

去皮

煮食久之自愈

心胸煩滿

一人心胸煩滿兩年不愈後服

雄黃

五錢

並飲清油半

碗吐出一蟲而愈

水停心中有聲如雷口眼歪斜不省人事

膽礬

壹分

為末温甜酒送下以吐盡痰為度

又一婦人

心胸脹悶口流涎沫自言心中有聲如雷亦服此藥吐出
一蟲斷之乃一髮也 又一人患此服膽礬不效後服

雄黃 五錢 清油 半碗 吐出一蟲而愈

心膈飽脹腹中又飢又痛

胡椒 七粒 研末好酒沖服即愈

心中饑雜似辣非辣似餓非餓似痛非痛得食暫止

或兼噯氣或兼惡心

乃火動其痰也 焦朮 四兩 川連 五錢 橘紅 壹兩 共為末

神糲煮汁為丸如菉豆大每服五十丸食遠薑湯下立效

又方 猪護心油蒸糯米食之即愈

一切寒熱痰痞水食結住心胸

見傷寒門葱薑熨法

心下堅大如碗邊如旋盤

此乃氣分因飲水所結也用

白朮

四錢

枳實貳錢

煎服

心痛忽長肉一條手不可近

此腎火也

真礪砂

真梅花冰片

各壹分

點之立化為水

內服六味地黃丸二料全愈並用吳萸研末醋調敷兩足

心過一晝夜一換敷至數日為止

心口生疽

此名井泉疽又名慢心銳毒初起若心口內有塊漸大心

口發高毒陷卽死醫皆縮手諸書亦無藥治之法惟余家
秘集載以本人兩手十指以線量其長短共有若干積於
一線放喉管正中處雙環至背脊之中看兩線合攏盡頭
處爲中穴又以本人中指之中一節用竹片量準作一寸
放在中穴之左右各遠一寸各以墨記分立三穴如_∞形
樣每穴用艾三團一齊火灸灸畢全愈此林屋山人秘方
也

心窩成漏

一人胸口一片如碗大無皮潰爛成漏膿血時流經久不
愈用 葶薺磨成粉摻之數日卽愈神效非常

肺部

肺癰

又名肺疽與咳嗽門參看

諸患易識獨肺中患毒難知有人秘傳兩腳骨疼痛者或
腳骨不痛而舌下生如細豆一粒者再心口之上內微痛
或兩脇微痛及咳嗽口渴喉乾此皆肺中生毒之證也卽
用甘草桔梗各叁錢煎服服下如覺稍安肺之患毒無疑
矣以犀黃丸見陰瘰癧門服至一料全愈此是預識預治百無一
死世人但知腳痛醫腳咳嗽醫舌下一粒便以刀刺且
此一粒癰未成膿定然色淡癰愈亦消重則其色紫黑如
用刀刺立害諸書皆云口吐臭痰胸中發腥作痛者肺癰

也又稱症有三不治時吐臭痰久如硬米飯者不治嘔膿
不止者不治白面變赤者不治惟嘔而膿自出者易治治
之之藥惟地黃保生歸脾等湯輪服而已並無預知早治
之法直至吐臭痰發腥始知肺癰猶小舟飄入大洋也此
等立論安可爲後學津梁余每見此症吐膿膿色皆白用
犀黃丸治無不效貧寒不能治藥者用陳年醃芥菜滷每
早取半杯用豆腐漿沖服服後胸中一塊塞上塞下塞至
數次吐出惡膿數日膿盡自愈神效凡患此症者終身戒
食鴨蛋白鰲紅蘿蔔石首魚蒼甲魚食則復發難治此林
屋山人秘法也 又肺癰腸癰皆吐臭痰用棉花捲竹片

上醮油點火使本人觀之若肺癰看火頭是二個腸癰火頭只壹個

又方 薏苡仁各炒為末糯米湯調服或煮粥或水服當

下膿血而安效

又方 竹葉絞汁半盞服之吐出膿血自愈

又方 元參半斤天冬四兩桔梗貳兩炙草壹兩水十碗

煎至三碗另加蒲公英金銀花各五錢再煎煎至一

碗食後即服初起即消日久即愈極效無比

又方 生芪炒白芨炒銀花各壹錢桔梗各壹錢苡仁五錢貝母

壹錢六分陳皮各壹錢甘草節貳分甜葶炒八分生薑壹片

水貳鍾煎半食後徐徐服初起者去黃芪加防風壹錢

久不愈者加槿樹皮壹錢未成即消已成即潰已潰即

愈其效如神

肺癰葦莖湯數劑即愈神效

葦莖湯方

老葦莖

即蘆根再老者去節一兩

苡仁三錢

絲瓜瓣

即絲瓜子三錢

單桃仁去皮尖一錢

水二碗煎一碗服早晚

各服一劑甚效

各種氣痛
治心胃氣痛

心胃氣痛
治心胃氣痛

真沉香 木香 公丁香 乳香 沒藥 靈脂 蘇合 前胡

以上各 真麝香 壹分 共研為末 收入磁瓶 以蠟封口 不可

洩氣 每服七分 開水下 此方專治男女心胃各種氣痛 有

氣痛 滴水入口 卽吐者 有痛極難忍 抓破衣物者 服之 卽

愈 神效非常 百無一失 如不見效 卽是蟲痛 照後蟲積各

方治之

香鬱散 此方得自仙傳 凡各項心胃氣痛 服之 止痛如

神 有人照此方送藥 數十年無不應手 奏效 青皮 橘子

驗方 各種氣痛

壹百

香附

壹斤

鬱金

四兩

先將橘子鋪大蒸籠內蒂眼朝

上用新布墊底再將香鬱三味研末摻入於挨晚時蓋好

蒸極透熟每桶蒂眼上放生薑壹薄片薑上加艾絨壹小

團將艾燒燃燒過另換薑艾連燒三次曬過一天次晚再

蒸接連蒸曬九次每蒸一次照前法連燒三次無日曬即

風吹亦可製好用磁器收貯每服連橘蒂藥共一錢用水

煎壹服可煎兩三次宜於冬天配製以免霉壞性口不可

銀黃散 專治心胃寒痛年久者三次斷根並治寒痧及

肚腹寒痛屢試如神百發百中 銀硝半斤 黃丹飛淨

大銀窩

銀店傾

放炭火上

火要大又不可太猛

將銀硝放窩內用銅

篋不住手順攪不可逆再將黃丹分作數次加入銀硝卽

化爲水攪至半個時辰硝丹合爲一色傾入冷水內俟冷

定取出研細磁瓶收貯埋地下一月拔去火毒每用五分

體弱者用三分滾燒酒沖服如不知氣痛是寒是熱先服

胡椒末其痛略緩者是寒然後再服此方必對症也

良附散 良薑 酒炒 香附 醋炒 共爲末米湯爲丸每服叁

四錢食遠服凡心胃一切氣痛立止如神因寒而痛者良

薑加倍用因氣而痛者香附加倍用有人心胃疼痛十數

年不愈服此除根

又方 失笑散 五靈脂 叁錢 蒲黃 貳錢 各炒研末好醋

石

煮透加水連渣服凡男婦老少心腹胸肋瘀血作痛小腹
疝氣腳氣及胎前產後血崩血暈一切氣痛屢用皆效真
神方也 又方 專治肝氣 夏枯草 壹兩 煎水體虛者加瘦猪
肉四兩同煮 當茶飲服過叁四兩斷根此藥能舒肝氣養肝血
止肝風故能奏效如神屢試屢驗而本草不言其能治肝
病何哉又凡肝病最忌食雞終身忌食椿芽爲要

又方 草菓 元胡索 五靈脂 沒藥各五錢爲末每

服叁錢酒調下各種氣痛其效如神歌曰草菓元胡索五
靈脂沒藥酒調服叁錢一似手拈卻 又方 良薑 川

樸薑汁五靈脂各等分研末每服壹錢滾醋調下卽止神效

又方曰丹參壹兩檀香錢砂仁各錢水煎服即愈婦人更

效又方元胡索末叁錢酒下極效有人因食蕎麵滯

氣心胸痛不可忍大便不通百藥入口即吐後服此藥而

愈又一老人下痢腹痛將死棺木已備亦服此藥而愈凡

氣痛諸藥不效者服此方必效又方生地黄搗爛取

汁冷服甚效有人心胃疼痛百藥不效後用此方吐出一

蟲而愈又一人服此泄下一蟲斷根又方醋泡過二

三年大蒜頭食數顆立刻止痛或用生蒜頭煮食亦可

又方凡氣痛急切無藥以食鹽一撮放刀口上炭火燒

紅淬入水中乘熱飲之即愈愈後戒食腳魚

驗方新編 卷三 各種氣痛 石

又方 照鼻部 鼻血第一方 燒少商穴法即愈

腎氣上衝心痛 照藥以食鹽一匙於口中生艾火煎

方見前陰門 食燥解法 煎艾火煎

走注氣痛忽有一處如打撲之狀痛不可忍走注不

定靜時其處冷如霜雪

此因暴寒所傷用 楊柳白皮酒煮布包乘熱熨之有赤

點處刺出血更妙凡諸急痛熨之皆止

心胃蟲疾作痛

或滴水入口即吐或口渴飲水不止或吐清水者皆是用

葱白汁一杯飲下隨飲真小磨麻油一杯少頃即愈蟲

當化水除根雖痛至牙閉欲死者亦效 又方 真川椒

真烏梅 生薑煎湯服即愈 又方 病發時用艾葉

十張揉碎在銅器內炒乾 不住手用 篋撥動 將鹽滷 要豆腐店內 不會加水者

半小酒盃傾入候焙乾倒出研末用熱燒酒一盃送下俟

腹內作響或降氣或吐出清水即愈 此藥須現製現服

隔夜即不效服後戒茶與葷腥三日愈後每逢初一十六

日用淡鹽湯喫一服永不再發其效如神 又方 白鱓

一名 鰻魚 淡煮飽食三五次即愈此魚最能殺蟲故也

酒食凝滯攻衝作痛或有形或無形鄉人稱為穿心

箭痛方書無所稽考法宜宣通血絡

用川練子去核酒炒錢半元胡索五靈脂桃仁去皮尖研蒲黃

各壹錢水煎服其效如神此葉天士先生方也

胃脘隱痛

胃脘一點隱痛喜按多年不愈用快氣溫胃殺蟲諸治不效者乃肝鬱不伸胃上受尅久則胃中沖和之氣不供於用辛熱清潤徒劫津壅氣經云下脘不行上脘不通地氣不升清陽欲結久易延為噎膈之症宜用整荷葉一個

存性生香附米一兩研九香蟲九枚甘草水製研元胡索三錢酒炒研用大

棗去核皮薑壹兩煮搗入上藥為丸日服一錢開水送下

鏡堂新增

又方用多年陳白蜆殼又名蛤蜊殼燒過存性研極細末米

湯服壹錢一日叁服神效又方麻皂角叁片肥皂更好蟲蛀者忌

用去皮子弦一片入麻油炒過巴豆十粒一片入薑

汁製過杏仁去皮十粒一片入蜜製過小半夏十粒俱

用火炙黃色共研末每用五釐安手心臨臥以薑湯送服

神效之至又方雪梨四兩生薑壹兩共搗汁去渣加蜜

四兩共煎數沸入瓷器內封固不拘時服一劑即愈無病

亦可服最能滋陰降火忌食蘿蔔又方藕汁梨汁

白菓汁各貳兩銅鍋內熬成膏隨意服之又方元

參生甘草麥冬各壹兩金銀花八兩當歸貳兩水煎服神

效或加白芍兼治肺癰

咳嗽氣喘

生山藥半碗搗爛

甘蔗汁半碗和勻炖微熱服立止

咳嗽氣喘遇寒即發

乾薑

泡皂角

泡去皮子粒 蟲蛀者忌用

肉桂紫色者 去皮

各等分共搗篩白

蜜和勻杵三千下為丸如梧子大每服三丸開水下嗽發

即服日服數次忌葱麪油膩其效如神

諸般咳嗽

桔梗

炒荆芥

炒紫苑

飯上蒸一次再炒

百部

飯上蒸一次再炒

白前

飯上蒸一次再炒

上各入兩共磨細末每服叁錢臨時開水調服如初感風

咳方所屬

卷三 咳嗽

三

石

寒者生薑湯調下予製此藥普送服者多效或問藥極
細微而取效甚廣何也予曰藥不貴險峻惟期中病而已
此方係予苦心揣摩而出之蓋肺屬金畏火者也遇熱則
咳金性剛燥惡冷者也遇寒則咳且肺爲嬌臟攻擊之劑
旣不任受而外主皮毛最易受邪不行表散則邪氣留連
而不解經云微寒微咳寒之感也若小寇然啟門逐之卽
愈矣醫者不審妄用清涼酸澇之劑未免閉門留寇矣寇
欲出而無門必致穿窬而走則咳而見紅肺有二竅一在
鼻一在喉鼻竅貴開而不閉喉竅貴閉而不開今鼻竅不
開則喉竅將啟能無慮乎此方溫潤和平不寒不熱旣無

攻擊過當之虞大有啟門驅賊之勢是以容邪易散肺氣
安恬宜其投之有效也又方枇杷膏見後勞傷血門最爲

神效又方款冬花川貝母知母各壹煎數滾用

冰糖向燈火上溶化滴入藥內服之屢試神效並治咽喉

發乾又方細茶葉加紅沙糖拌炒乾冷透每服三四

錢神效

肺虛咳嗽

凡肺虛胸熱咳嗽氣急煩滿咽喉燥渴欲飲冷水體倦肌
瘦發熱減食喉嚨音嘶不出用半黃蠟溶瀝極淨用酸漿
水煮過八兩入銅器內化溶作一百二十九蛤粉四兩爲

衣養藥每服一九核桃半個細嚼溫水下靜臥閉口不語
日服二丸漸漸平愈忌食雞半年造酸漿水法用清水
入飯少許浸四五日卽酸或用隔一二日米泔水代之亦
可

肺痿咳嗽

凡感受風寒停留肺中或勞力內傷以致咳嗽聲重胸膈
隱痛頸項強硬不能轉側此肺癰也久則鼻流清涕咳吐
膿痰黃色腥穢重則胸脇脹滿呼吸不及飲食減少脉洪
自汗漸至咳吐痰血寒熱往來形體消瘦聲啞喉痛轉爲
肺痿此危症也用大瓜萸一個開一孔內有子多少粒

用杏仁去皮尖照數配入封好外用黃泥包裏燒紅燒至無

烟取出用物蓋住候冷去泥又用川貝母照瓜瓞子粒數配入其研

細末臨臥時每用貳錢白蜜調勻燈心煎水送下

白芨咳嗽痰血涎唾中有少血散漫者此腎經相火炎上之血也若血如紅縷從痰中咳出者此脈

絡受熱傷之血也若咳出白血淺紅色似肉似肺者必死又咯出痰中有血絲屬腎經咳嗽有血屬

肺經嘔吐成盆成碗者屬胃經自兩脇逆上吐出屬肝經溺血屬小腸經便血屬大腸經牙宣出血

未再服屬胃腎虛火

真青黛 括藁仁去油海石炒黑山樞炒黑訶子肉等分

蜜為丸噙化嗽甚加杏仁食蘇荷等不封效

又方 欵冬花 百合蒸焙等分為末蜜丸龍眼大每臥

驗方新編 卷三 咳嗽 五

葷腥煎炒另用 百合四兩冰糖四錢早晚蒸服不可間斷

輕則十日可愈重則半月自痊有老人咳嗽三十餘年服

此月餘脫然除根靈驗無比切勿輕視

又方 蘇芫飲 紫蘇芫七個煎濃汁早晚沖雞蛋服雖

數十年咳嗽無不神效 又方 麻黃壹錢熬濃汁一碗

去渣加水糖貳兩熬至滴水成珠為丸如蓮子大每服二

三丸日服數次服完即愈咳嗽嗆逆不能落枕者更效

又方 治咳嗽嗆逆 淨麻黃 紅棗皮 南薄荷各五分

上邊桂 紫蘇葉 桑白皮 杏仁去皮 大腹皮各四分

分炙草六分 水煎服放膽用之百發百中 又方 雄黃

壹錢 研細黃紙 叁張

用雞蛋白將雄黃調勻搽黃紙上曬乾捲

成紙管插入筆管或烟筒內燒燃吸之如吃烟樣少頃嘔

吐嗽止一日一次忌食諸物七日惟食白粥此孫真人干

金方也神效非常不可輕視如嫌氣味難受食白煮猪肉

卽解 又方 小豬肺一副不見水去心不用將香油 約壹

杯灌入肺管內以線紮管頭入砂罐內加水先夜炖熟早

晨空心吃肺不用鹽送先將浮油去淨其湯隨吃幾口餘

湯泡飯連吃二肺全愈屢試如神 又方 陳海蜃皮 漂

鹽水糖拌蒸食陰虛久嗽者極效 又方 生地 沙參

各貳兩 川貝母 去心 牡丹皮 各壹兩 元參 黃芩 桔梗 知

驗方新編 卷三 咳嗽 七 石

母 百合 百部 欵冬花 天門冬 去心 廣皮 枳壳

各壹兩 甘草 八分 用水煎汁去渣再熬成膏每早空心滾水

調服甚效 又方 大雪梨 四個 老薑 四兩 同搗取汁蜂

蜜 四兩 黑豆 一升 炒 研末乘熱和勻七蒸七曬不拘時服

又方 酸醋和水煮鯉魚不用鹽送飯食 又方 猪板

油蒸南棗去棗皮惟食棗肉早晚吃三五個數日而愈

久嗽連至四五十聲者

生薑汁 半杯 白蜜 貳匙 同放茶碗內滾水沖溫服三四次

即愈或用前紫蘇沖蛋方最效

年老久嗽不能臥

猪板油

糯米糖

蜂蜜

各四兩

共熬成膏時常挑服壹匙

口中噙化三五日即止

又方

核桃肉

皮不去

生薑

各壹兩

研膏蜜為丸貳錢壹顆每臥時嚼一丸薑湯下氣促難臥

服此立定

又方

潞黨

壹錢

陳皮

桔梗

紫蘇

各錢半

五味子

十五粒

水煎食遠溫服

咳嗽聲啞

訶子皮

五倍子

蒸五味子

黃芩

甘草

各等分為

末蜜丸櫻桃大每一丸噙化嚥下

又方

訶子皮

叁錢半生半炒

桔梗

五錢半生半炒

甘草

貳錢半生半炒

木通

叁錢

水煎去滓入生地黃汁

壹小盞

臨臥嚥下

驗方新編

卷三

咳嗽

石

又方 杏仁並去皮尖並去油搗融兌開水取汁炖熱服切忌煎熬

又方 白菓仁四兩真白厚茯苓取整個切用藥店中切成片者皆米粉假造斷

不可桑白皮各貳兩黑豆半升白蜜半斤煮熟曬乾為末以

人乳半杯拌濕九蒸九曬為丸如綠豆大每服三五十九

開水下神效

又方 青蒿貳錢童便煮服極效

小兒晝夜咳嗽食少髮黃東史

此脾虛也用 真山藥壹味煮熟加糖調服神效之至

勞傷吐血 勞病火動陽物易舉方見前陰門

凡勞傷吐血咳嗽等症忌食椿芽食則病發難愈

勞症諸方

枇杷膏 專治勞傷虛損吐血咳嗽發燒身體瘦弱四肢酸軟精神疲倦腰背疼痛飲食不進以及一切不足弱症服之屢效咳嗽尤應驗如神輕者二三料全愈重者四五料除根貧富可用不必另服別藥免致誤用害事即無病常服可保身強神旺此方得自仙授藥極平易功最神奇見者廣傳功德無量

枇杷葉

五十六片新鮮者更佳洗淨毛

大梨

貳個深臍者佳去皮心切片用

白蜜

半鍾先熬滴水

成珠大便乾燥者多加大便大棗半斤或黑棗建蓮肉四兩

塘瀉者不用以白糖代之滋棗皆可

不去皮先將枇杷葉放銅鍋內砂鍋亦可以河水煎出濃湯

用紬漚清汁去葉與渣不用後將梨棗蓮蜜和入煎熬以

蓮肉融爛為止用磁瓶收貯隨意溫熱食之凡虛病服藥

多則脾胃受傷飲食減少病更加重虛弱咳嗽者若不早

治肺損難治惟此方最益臟肺治咳嗽應效如神如虛弱

並不咳嗽者枇杷葉不用只用河水同煮咳嗽多痰者加

川貝母壹兩研極細末俟煮熟時入內煮一二滾取起若

吐血用藕節貳拾壹個搗汁同煮冬月多製久收不壞夏月隨

食隨製

飴糖飲 治男婦五勞七傷身體燒熱精神困倦不思飲

食等症咳嗽吐血者忌服 好燒酒 貳斤 白糯米糖 四兩

核桃肉 七個 裝入磁瓶內不可太滿滾湯煮一炷香久埋

土內七日去火毒隨便每日服一二杯不可過多大有效

元霜膏 治虛勞咳嗽吐血下血燒熱困倦其效如神

真烏梅汁 梨汁 蘿蔔汁 柿霜 白沙糖 白蜜 各

兩 薑汁 壹兩 赤苓末 欵冬花 乳汁浸 紫苑末 各貳

兩 入砂鍋熬成膏為丸每服叁錢臨臥時含口中緩緩嚥下

加味四物湯 治癆熱咳嗽如神 當歸 熟地 各叁 川

芎 芎藥 各貳 柳樹根 壹兩 水煎服奇效

驗方新編 卷三 勞傷吐血

鵬胡飲 治虛勞咳嗽吐血吐膿雖垂危亦可用也 菱

菱細根約三四兩搗碎用好陳酒煮服每日壹貳次半月

全安

坎離丸 治一切虛勞立見神效 黑豆炒熟研末 紅

棗量用煮熟去皮核二味共搗爲丸每服三四錢鹽湯送

下或酒下

外治法 治一切虛勞咳嗽吐血燒熱等症但脉息有神

無不效應 箭頭砂 壹兩 明雄 五錢 共研細末綿紙包固

選未曾行經十二三歲童女身體壯實無病者將藥貼放

童女臍內用布捆緊過一週時取下稱藥比前多重一二

錢者更妙卽刻搗於病人臍上先備人乳十餘碗俟病者
口乾發燥飲之渴止然後解去臍上之藥其病自去再照
枇杷膏調養一月百無一失斷不可服別藥以免誤事

人紅丸 專治童子虛勞咳嗽吐血燒熱屢試神驗大人

亦治切勿輕視 景人龍 卽虬蟲廿一條童便洗淨瓦上焙乾以黃色為度黑色則不效

破皮紅棗 三十個飯上蒸熟去皮核 蘿蔔子 壹錢五分炒研末 大熟地 五錢煮爛成膏

自製真藕粉 壹兩五錢 真川連 六分酒拌炒研末 以上共搗為丸如桐

子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增二粒加至二十

一粒為止服至一料全愈

吐血治法

金方新編 卷三 勞傷吐血 三

血吐在水內浮者肺血也羊肺煮熟醮白芨焙研末食沉者

肝血也羊肝煮熟醮白芨食半沉半浮者脾心血也羊心

羊脾煮熟醮白芨食極效此聖惠摘玄方也脾肺之血

係屬氣虛以補氣益脾為主肝血係屬勞傷以滋陰降火

為主如概用滋陰之藥則殺人如草菅矣俗謂非勞病而

治成勞病卽此是也吐血最忌用參無論人參高麗參當參

均不可服此係名醫秘傳人多不信後有時醫試之每治

吐血之症用參者多不能愈不用參者全活甚多

又方 凡勞傷咳嗽吐血用童便之清利者日日飲之勿

閒或自己戒食葱蒜等臭濁之物並戒房事則小便日清

去其頭尾數滴日飲二三次每服南棗三個自不惡心一月見效久服除根身體強健吐血服小便者百無一死服寒涼者百無一生此屢試屢驗良法也

又方

足紋銀一塊

約重五六錢

放碗內早起將自己小便去

頭尾撒碗內

色黃者不可用

乘熱飲下數日即止忌酒與酸辣煎

炒等物一年愈後將銀傾化已輕而奇臭蓋臊氣被銀收

去也

又方

蓮藕

藕節更妙

日日煎湯飲之不可閒斷輕則

三月重則半年斷根無鮮藕時用藕粉亦可藕粉以自製為真買者多假無益有損

又方

凡吐血多者用三四兩重大當歸壹枝切細取好

陳酒壹觔慢火煎至一滿碗候將要吐時口中有血務必
含住取藥一口連血嚥下其血必止隨將酒分作幾次飲
完卽此一劑而愈後不再發每有醫家阻云吐血尙要戒
酒豈可用酒煮藥殊不知神驗非常此方活人甚多從無
一誤如一時煎熬不及急用當歸一二寸嚼融帶血吞下

卽能漸止不致大吐亦可救急此林屋山人經驗方也

又方 真桂元七枚 紅棗十四枚 白蓮子二十粒 小黒去核

豆九粒 水煎連菓空心食大有奇效

又方 猪肺 一個 洗極淨以 硃砂 三分 川椒 每歲灌入 一粒

再將肺挖七孔每孔安桃仁壹粒放瓦鉢內蒸出自然汁

不用放水連肺食盡其效如神

又方 薺菜叁斤俗名地菜連根帶葉煮雞蛋三四七晝夜不斷

火隨時取食即愈極效方也

又方 用上白細粘米於清明前後浸水一二日平時亦可磨

細日曬夜露曬極乾以銅鍋炒黃色不可太過每用滾水

和成如指頭大煮熟連湯食不可加鹽與別物或少加白糖亦可

無論時候但覺咳嗽即服一日須服五六次切莫服藥服

後忌茶酒腥辣等物一月戒房事半年有人吐血年餘百

藥不效遇一道人指授此方十日即愈

又方 子雞一隻男用雌雞未生蛋者女用雄雞未曾啼者先擇無人走動處

驗方新編 卷三 勞傷吐血 三

挖一地坑用竹刀或磁片忌銅鐵將雞在坑內宰殺血滴坑內乾搏去毛破開腸雜收拾乾淨腸雜毛糞均放坑內不可遺一點在地雞亦不可沾水只將乾布內外擦淨取六月雪草按病人年紀每歲用草嫩頭一個同雞肝雞肫納入雞腹中用新瓦鉢兩個合雞在內以紙密封口再用鐵鍋兩個合瓦鉢在內並將鍋口封緊鍋中鉢中總要拭乾不要灑水用稻草三大把穀殼七八斤緩緩而煨約半時久雞自爛熟取出撿去六月雪草將雞用手折碎空心食之食雞三隻總無不愈真奇方也愈後須戒殺放生方免復發

又方 上肉桂去皮五分研末冲服忌火 當歸 桔梗 枳壳各七分 大

黃酒微煮 厚樸薑汁炒 川鬱金 真紫蘇各八分 水煎加童便半

鍾薑汁二茶挑先服三劑再用 續斷壹錢 麥冬貳錢 遠

志六分去骨 真山藥四分 赤芍七分 益母草三分 川貝母壹分

另研末冲服 水煎服十劑 此二方不論男女遠年近日血症

只要現在吐血之日先服前方二劑後服次方十劑立時

全愈永不再發慎勿加減藥味亦斷不可服寒涼藥如從

前誤食寒涼藥以致寒血凝滯者服此十劑後自然漸次

全愈不必再服屢試屢驗功效如神若體弱者服六味地

黃丸空咳不止者服健脾丸即愈

咳血 痰內有血出於肺與上咳嗽門參看

欵冬花 百合 百部蒸焙各等分爲末蜜丸龍眼大每臥

時薑湯下一丸

又方 大蘿蔔壹個切頂剝去肉一半入黃米糖令滿原

頂蓋之火內煨熟食效

咯血 痰帶血絲出於腎與上咳嗽門參看

天冬壹兩 茯苓 杏仁 貝母 甘草各五錢 共研末煉蜜

爲丸梧桐子大每服二三十丸

又方 柳花焙乾研末 米湯調服壹錢神效

驗癆蟲法

用乳香燒烟薰病人手背男左女右以綢帕蓋手掌心良久有毛從掌中出白者宜治紅者難治黑者不治無毛者即無癩蟲

灸癩蟲法

用濕紙條貼背脊上紙先乾者即癩蟲處以墨點記用老蒜切片貼上以艾一團放蒜片上燒之多燒為妙無蒜用薑亦可先備火盆鐵鉗如蟲出即用鉗夾火盆內或遠送野外埋入土內恐飛入人口鼻內須謹防之

治癩蟲法

雄精

硃砂

硫黃

去沙泥

麝香

壹分

各研極細末磁罐

收貯以頂好燒酒和勻用獨大蒜頭去蒂醮藥從尾間脊
骨徐徐逐節擦上如有腫處或極痛之處卽係癩蟲所在
須於腫痛處多擦數次其蟲自滅不拘新久一切癩病皆
能除根如病重者須擇天醫吉日總以午時擦之爲妙端
午日更佳忌戊日己日除日此藥能開背後三重關竅卽
虛怯疰夏之人於端午擦之亦能神清氣爽經絡流通大
有裨益此方傳自海外屢試如神

又方 八月初一日早收取百草頭上露水點膏背穴在背

上第四節骨左 最爲神效
右兩旁各三寸

童子癩 並治傳屍癩

貓糞

取屋上曬白者

用黃土包裹火內煨焦取出用碗蓋住候冷

去土研末黃糖和為丸每服三四錢效若仙丹屢試屢驗

此林屋山人方也

嗆咳帶血方

如嗆咳痰多帶血便溏甚至喘滿妨食脉弦無力及豁大無倫已成癆瘵久服滋清不應者服此方神效蓋此方重在後天脾土以有形而護無形經云見痰休治痰見血休治血本方毫無血藥而血自止方用北沙參三錢生白

扁豆一兩

黃芪皮

四錢炙

炙甘草

五錢

叭杏仁

三錢

淮山藥

五錢

霍石斛

四錢

淮牛夕

酒炒錢半

煎服久則見益或送大補

陰丸叁錢尤妙

鏡堂新增

新增湧血不止

伯駕札記

驟然吐血湧注不止急以全當歸四兩無灰酒二大碗煮透飲之如量小人分日飲之亦可但不可牛飲須細細吞之切切

哮喘 喉內有聲而氣喘者是

治哮喘妙法

病發先一時用鳳仙花

又名指甲花

連根帶葉熬出濃汁乘熱

蘸汁在背心上用力擦洗冷則隨換以擦至極熱為止

無則

用生薑擦之

再用

白芥子

叁兩

輕粉

白芷

各叁錢

共研爲末

蜂蜜調勻作餅火上烘熱貼背心第三節骨上貼過熱痛

難受正是拔動病根務必極力忍耐切勿輕易揭去冷則

將藥餅放下烘熱再貼一餅可貼二三日無論病愈未愈

多備藥餅換貼不可間斷輕則貼一二日重則貼三四日

或五六日永不復發有人患哮喘四十餘年貼至數日斷

根無論寒熱虛實鹽醬醋酒哮喘皆治神驗第一方也藥

味不可加減並治痰氣結胸及痰喘咳嗽

又方海螵蛸瓦上焙枯為末大人五錢小人二錢紅沙糖拌

勻調服數次斷根

補治哮喘方

用雞蛋浸童便內夏三日冬七日取出漂淨日煮一枚食

之久能斷根鏡堂新增

又方四君子各等分煎湯送葶藶大棗丸壯者二錢弱

者一錢鏡堂新增

新增哮喘經驗方

麥芽糖入高粱酒內浸化

斤酒斤糖

冬至起每日隨量飲之

不可

間亦不可取醉

盡九乃止痊後每年九九飲之匪特不發舊恙且

能益人有人患此症峻劑竒方雜進罔應新城陳分轉季

湖瀚

教以此方飲畢九九沉疴若失斯疾嬰身多成宿痼

丸散紛如取效蓋寡此方和平而有竒效不可忽視

又

分轉之兄紹方太守

航

言凡哮喘猝發用大磨麻油半斤

入麥芽糖半斤飯鍋上燉融挑三四錢開水冲服早晚三

數次立效久服亦能斷根已治驗多人太守淵雅好學而

耽味靈素與分轉同擅越人之譽爲時稱重

新增治哮喘 伯孺札記

一女患哮喘不愈後道人教以取瓜蒂七枚為末服之吐膠痰斗許三服疾良已取吐諸疾宜天色晴明巳午以前為妙病人先夜勿食瘁病不拘

新增中寒喉間痰涎有聲若齶喘初起者

此寒邪襲肺俞所致失治者大或釀成哮喘小亦嗆咳不休宜令人用手掌心貼繫肺俞穴穴在脊第三椎左右向下推熨至

三五十次背椎作熱即愈或用吳茱萸酒炒熱熨之亦能

祛寒

驗方新編卷四目錄

脾胃

惡心吞酸

胃口虛脹手足厥冷

涼藥服多嘔吐惡食

冷水服多

胃脘冷滯

脾胃虛冷不思飲食

脾家冷積食後胸滿

胸胃積滯

胃寒嘔吐黃水

新增胃熱吞酸胃氣痛

痰疾

新增

回癩湯

逐呆仙丹

收呆至神湯

啟迷丹

痰凝

痰飲

中痰氣絕

下痰丸

茯苓丸

痰氣結胸

痰飲吐水

痰疾癲狂

癡笑不止

羊癲風

增補痰迷

方 譚語

三消

渴而飲水不止為上消飲水多而作瀉為下消多食易飢為中消

消渴飲水不止

多年消渴飲水百藥不效

飲水不止小便如膏

飲水不止小便時流

久病消渴不止

消食易飢

腹中易飢食下片時即吐

飲食積滯

飲食積外治法

飲食凝滯作痛

飲食過多脹滿不安

魚肉積滯

食魚積滯

生魚積滯

食犬積滯

食牛腹脹

食鴨積滯

鴨蛋積滯

雞蛋積滯

食整煮雞蛋積滯

食鹽蛋積滯

食索粉涼粉積滯

食瓜菓腹脹作痛

食西瓜並諸瓜過傷

食荔枝腹脹

食菱角腹脹

食豆不消

食麩不消

糯米積滯

飯食凝滯腹痛

食茶成癖

食積痞塊

噎膈

噎膈諸方

傷寒膈食

膈食初愈飲食宜少

反胃嘔吐

上吐下瀉

一二日一吐氣味變酸

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化

朝食暮吐暮食朝吐

飢餓嘔吐

乾嘔不出

酒後乾嘔

食物下喉即吐

見食即吐

食後少頃即吐

嘔物不化

嘔吐清水

欲嘔而不嘔

口吐白沫欲嘔而不出 欲嘔而不嘔面紅流淚

聞藥即吐百藥不效 嘔吐不能服藥必有虵在胸膈

脾胃虛弱食不消化 嘔吐痰水 新增治噎隔

呃逆


偶然呃逆 氣熱呃逆

陰寒呃逆 體虛常呃逆二三聲

呃逆日久不愈一連四五十聲者

新增治呃逆

出
 谷聖而不聖面珠於其
 聖且不翁照樂
 聖且不翁照樂
 聖且不翁照樂



驗方新編卷四

脾胃

惡心吞酸

此脾胃虛冷也

吳萸

四錢滾水
泡去苦味

水煎食遠服有人患此

多年一服即愈或加乾薑壹錢亦可忌夜食並忌生冷食

物 又方 核桃嚼爛薑湯送下

胃口虛脹手足厥冷

山藥半炒半生研細米湯下貳錢日二次忌鐵器

涼藥服多嘔吐惡食

前三方及後 鯽魚 橘皮二方均可用

冷水服多

沙子炒焦再加水煮澄清飲之即消

又方 食生蒜頭二三枚亦效或服砂仁一二錢亦可

胃脘冷滯

有人胃中冷滯多年不愈後遇名醫診之曰此尸疰也用
死人棺中枕煮水服之而愈

脾胃虛冷不思飲食

鯽魚和豆豉胡椒老薑陳皮烹煮空心食

脾家冷積食後胸滿兼治一切痰氣

橘皮

壹斤柑橙皮勿用

甘草

食鹽

各四兩

水五碗漫火煮乾焙爲

末每服貳叁錢白滾水沖服有人得此疾百藥不效偶食
橘皮散似屬相宜遂連日服之一日忽覺一物墜下大驚
自汗如雨須臾腹痛遺下數塊如鐵彈子臭不可聞從此
胸次霍然其疾頓愈蓋脾之冷積也

胸胃積滯

有人食白煮雞蛋過多胸胃積滯數年不愈後用
半斤煮食吐出一團開視已成小雞連服數次吐出十餘
團而愈

胃寒嘔吐黃水

並治痰飲吐水

暖胃膏

生薑

壹斤

搗取自然汁碗許入牛皮膠

乳香

末錢各五沒藥末錢各五同煎膠化離火將藥作三四大膏藥以

一張貼胃腕痛處用綢綁捆三個時辰然後取週歲小孩

所穿之鞋一雙銅鑼上烘極熱在膏上輪流熨之熨至膏

硬換膏再貼再綁三時再熨至愈為止止後用紫油厚

朴叁斤用老薑貳斤切片乾薑四兩用甘草二兩同將二

味炒乾為細末黑棗煮湯去核為丸每服二錢開水送下

久服斷根此方名熨胃丸功能溫中降氣暖胃消痰大有

奇效此林屋山人經驗方也

專治胃熱吞酸方鏡堂增

惡心吞酸固屬脾胃虛冷而吐酸心辣又當別論經云諸

嘔吐酸皆屬於熱諸逆衝上皆屬於火如服前方不應其
為胞絡鬱火乘胃虛而上僭明矣不可概作虛冷治也宜
遵丹溪心法治胃熱嘔吐之方治之方用 北沙參 壹錢

五分

元胡索

一錢酒炒

川芎

六分

生薑

貳錢

川棟子

壹錢

橘紅

衣

壹錢鹽水炒

梔皮

壹錢五分炒

麥冬

貳錢

苦桔梗

七分

知母

壹錢

粉甘草

五分

水煎溫服有痰加竹茹法夏各

壹錢

新增胃氣痛

伯孺札記

方用烏梅二枚砂仁少許同焙研細末和服

又痰疾頭刺無第一式命之靈效

中痰氣絕刺熱痰濕不化

方見卷十二急救門 白蜜

下痰丸 治一切風痰眩暈癩癡久不愈者

白礬壹兩 細茶葉五錢 為末煉蜜丸梧子大食遠薑湯下

五十丸久服痰自大便出

扶苓丸 治痰症手臂疼痛並治婦人產後發喘四

肢浮腫

生半夏貳兩 扶苓貳兩 枳壳去瓢麩炒五錢 風化硝貳錢五分 如

但以朴硝撒在竹盤中少時盛其為細末生薑汁煮糊為

驗方新編 卷四 痰疾 石

馬刀藥錄 卷四
丸如梧子大每服三十丸薑湯送下有人為痰所苦夜間咳嗽如人抽搐兩手發戰不能舉物服此隨愈

痰氣結胸

真淨銀硃

五錢

明礬

壹兩

同研用熨斗盛火瓦器盛藥鎔

化急刮搓丸每服

壹錢

好茶入薑汁少許服之心上隱隱

有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀硃破積

故也

又方 梨汁

一鍾

薑汁

白蜜

各半

薄荷

叁錢

研細末和

水煮十餘滾服降痰如奔馬

又方 照哮喘第一方治之極效

痰飲吐水

凡食冷物過度或氣虛脾弱不能消化飲食入胃皆變成

水嘔吐無時名曰痰飲 好赤石脂壹斤 研末每服貳錢酒送

下至多服叁錢服至壹斤則終身不吐痰水又不下痢此

藥能補五臟令人肥健有人痰飲百藥不效服此而愈

又方 暖胃膏熨胃丸二方見前脾 胃門極效

痰疾癩狂

狂病有因傷寒而得之者此一時之狂也照仲景張公傷

寒門治之用白虎湯以瀉火矣更有終年狂病而不愈者

或持刀殺人罵官不認父母妻子見水則喜見食則怒此

驗方新編 卷四 痰疾 七

乃心氣之虛而熱邪乘之痰氣侵之遂成狂矣此等欲瀉
火而火在心不可瀉也欲消痰而痰在心之中不易消也
惟有補脾胃之氣則心自得養不必祛痰痰自化不必瀉
火火自無矣方爲化狂丹

高麗參

叁錢

白朮

茯神

各壹兩

甘草

菖蒲

各壹錢

半夏製

兔絲子

各叁錢

附子

壹分

水煎服

一劑狂定

二劑病痊

此方

妙在補心脾胃之三經而化其痰不去瀉火蓋瀉火則心
氣愈傷而痰涎愈盛狂將何止乎尤妙在附子一分引補
心消痰之劑直入心中而氣尤易補而痰尤易消又何用
瀉火之多事乎此所以奏功如神也

又方 青橄欖十斤打破砂鍋內熬十數滾去核入石臼內搗

爛再熬熬至無味去渣熬成膏用白礬八錢研末加入攪

勻每日早晚取膏叁錢開水送下服完自愈凡癡癩羊頭

風等症皆痰迷心竅所致服此甚效此林屋山人經驗方

也 又方 藜蘆又名藜蒿煎水多服甚效生者煮食炒食俱

妙有婦人風癩每一二年一發或三四年一發久則一日

發十餘次昏癡不愈後服此方吐出痰涎二斗汗出如洗

更覺昏困三日全愈

又方 真川鬱金七兩白礬叁兩薄荷水為丸硃砂為衣

如梧子大每早服一錢開水下有婦人瘋癩十餘年服至

四五十日心閒如有物脫去再服數十日而愈以鬱金入
心去惡血白礬化頑痰硃砂安神故也愈後須用天王補
心丹加減調治方免後患

又方 先將病人綁住在離當心下三指之處艾火燒七

次或九次再燒兩太陽七次次用辰砂川貝各叁錢酒

煎服二次再用海風藤鳳尾草川貝各錢半石菖蒲

叁錢煎服五六劑或再服紫金錠一二錢愈後用蘆蒂棗

肉爲丸每丸三分服至三丸全愈屢試如神

又方 絲綿一尺燒灰開水下兌酒服更妙

癡笑不止

食鹽燒紅河水煎飲過片時用手指入喉抵住舌根使作

嘔吐嘔出熱痰數次即愈

羊癲風

菜葉放口中

青草亦可

立時蘇醒仍照前煎橄欖膏服之可以

斷根

痰迷譫語方

鮮豬心

壹具

辰砂

壹錢

甘遂

貳錢

二味合研為末藏豬心

中外用牛糞煨熱取出藥末和作兩丸將豬心煮汁和丸

吞下即愈

新增回癲湯

治羊癲忽然倒卧作羊馬之聲口中吐痰如湧痰連心竅

因寒而成感寒則發也一劑全愈永不再發方用 人參

三錢 白朮一兩 茯苓五錢 山藥三錢 薏仁五錢 肉桂一錢

附子一錢 半夏三錢 右藥煎服按此症得之小兒之時居

多內傷脾胃外感風寒結成在胸膈之中所以一遇風寒

便發舊痰今純用補正之藥不盡祛痰轉能去其病根也

若作風痰治之雖亦奏效終不能一正而不再發 採串雅編

新增收呆至神湯 採串雅編

呆病鬱抑不舒憤怒而成者有之羞恚而成者有之方用

人參一兩 柴胡一兩 當歸一兩 白芍四兩 半夏二兩 甘草

半兩

生棗仁

壹兩

天南星

半兩

附子

壹錢

菖蒲

壹兩

神麩

半兩

茯苓

叁兩

鬱金

半兩

右水十碗煎一碗灌之彼不肯

飲以雙手執其頭髮兩人拿其左右手以一人托住下頰

一人將羊角去尖插入其口一人以手拿住其頭一人傾

藥入羊角內灌之倘或吐出不妨陸續灌完彼必詈罵少

頃人困欲睡聽其自醒切勿驚動使彼自醒則全愈驚醒

則半愈矣

新增逐呆仙丹

採串雅編

呆病如癡默默不言如飢而悠悠若失意欲癲而不能心

欲狂而不敢有時睡數日不醒有時坐數日不眠有時將

驗方新編

卷四

痰疾

七

石

己身衣服密密縫完有時將他人物件深深藏掩與人言
則無語而神遊背人言則低聲而泣訴與之食則厭薄而
不吞不與之食則吞炭而若快此等症皆由痰氣若以尋
常三陳湯治之安得獲效方用 人參 壹兩 白朮 貳兩 茯
神 參兩 半夏 半兩 白芥子 壹兩 附子 五分 兔絲子 壹兩 白
薇 參錢 丹砂 參錢 研末 右先將各藥煎湯調丹砂末與半碗彼
不肯服以炭給之欣然服矣又給之又服半碗然後聽其
自便彼必倦怠欲臥矣乘其熟睡將其衣服被褥盡行火
化單留身上所服之衣另用新被蓋之切不可驚醒此一
睡有至數日者醒來必覓衣而衣無覓被而被非故物彼

必大哭然後又以前藥與一劑必不肯服卽給之炭亦斷不肯矣不妨以鞭責之動其怒氣用有力之人將藥執而灌之彼必大怒已而又睡去矣此時斷須預備新鮮衣服被褥等項半日卽醒心中恍然如悟必又大笑而病全愈

新增啟迷丹 采串雅編

治發厥口不能言眼閉手撒喉中作酣聲痰氣甚盛有一日卽死者有二三日而死者因素有痰氣而發也 方用

生半夏 半兩 人參 半兩 菖蒲 貳錢 兔絲子 壹兩 甘草 叁分

扶神 叁分 皂莢 壹錢 生薑 壹錢 右水煎服

近人氣質薄弱多嬰痰症攻補兩難國王袖手馴至痼

廢躬竊閱然串雅

黃君曉窗手錄本

雖係走方然既立一方必

有所試采入以備一格世有高明或審取斯乃區區所

尸祝也

新增痰凝皮裏膜外不紅腫而奇痛外皮反冷

方用 白芥子炒研為末用甜酒糟和勻熱敷患處包裹

至一炷香時拂去即愈如久延片刻則熱痛如烙起白胞

潰矣切切 再此恙不急治多見膿潰至骨廢人肢體此

方異傳濟人甚溥

伯孺札記

新增治痰飲方

氣實有餘者宜之

單瓣桃花三月三日取不拘多少揀淨袋盛陰乾煎服效

大三消 渴而飲水不止為上消飲水多而
作瀉為下消多食易飢為中消

消渴飲水不止

三消湯 真台黨 白朮 當歸 茯苓 生地 各壹錢 黃

栢 知母 黃連 麥冬 天花粉 黃芩 各七分 甘草 五分

水煎服神效三消皆治

天池膏 天花粉 黃連 真台黨 知母 白朮

五味 各叁兩 麥冬 六兩 生地汁 藕汁 各貳兩 人乳 牛乳 各壹

碗 生薑汁 貳碗 先將天花粉七味切片用淘米水十六碗

桑柴火慢熬出汁盡五六碗瀝清入生地等汁慢慢煎熬

加白蜜一兩煎去沫熬如膏收人磁罐用水浸三日去火

毒每用二三匙白滾水送下甚效三消通治

兔絲丸

兔絲子

酒浸選淨焙乾十兩

茯苓

蓮肉

各參兩

五味子

壹兩

共為末另研真山藥末六兩酒煮搗數百杵丸如梧子大每服五十丸空心米湯下三消皆治

又方

綠豆煮汁並作粥食

最妙

又方

好梨日日食之多食必效或多食蘿蔔更妙

又方

蠶繭壳

七個絲綿亦可

煎湯當茶飲之神效縑絲水飲一

二碗更佳

又方

黨參

壹兩

蜜炙研末開水泡透蒸熟為丸如梧子

大日服五丸酒下或茄根煎湯下日加五丸加至三十九

爲止不可多服服五六次後以飲水惡心爲度惡心時以乾物食之其渴自止奇效

又方 五倍子煎水飲之或作丸服之久則生津止渴

又方

半膝

五兩研末

生地黃

五斤

搗融蜜丸梧子大空心酒

下三十丸下元虛損宜久服爲妙

又方 苦楝樹根新白皮

五錢

切片瓦上焙乾入麝香

少許

水煎空心飲之有人口渴不止遇道人傳此方服之下蟲

三四條而愈愈後人必困頓用黨參貳兩煎水飲之

又方 如一日飲水至一石者浮萍搗汁服之

又方 如飲水多而小便不利者葵花根五兩煎湯清早

服之

多年消渴飲水百藥不效

每日食好梨二三個或食蘿蔔亦可均極神效

又方 白芍甘草等分爲末每用一錢開水送下日三服

七日而愈有人渴飲九年時發時止服此斷根

飲水不止小便如膏

茴香

炒

苦楝子

炒

各壹錢研末空心酒調服

飲水不止小便時流

以上各方可以通治

雞蛋

叁個要頭窩生者

去壳攪融用燒酒四兩燒開沖服服後卽

蓋被睡下睡醒禁風一日卽愈有人一日飲水數桶上飲

下流服此而止神效非常

又方 有人日飲水數斗小便時流飯量亦加服消渴諸

藥年餘其病更甚後用真麝香分酒為丸用枳椇子又名棘枸

子又名雞距子煎湯服之遂愈問其故乃食菓成積及飲酒過度

積熱在脾致有此疾麝香能治酒菓棘枸亦治酒病故能

奏效也

久病消渴不止 並治泄瀉口渴

七味白朮散 白朮 高麗參 真茯苓 藿香葉 大乾

葛各壹錢 炙草五分 水煎當茶飲另用木香叁分 磨汁兌服

屢試如神

消食易飢

以上消渴各方可以通治

好梨日日食之多食自愈
又方肉蓯蓉白山茱萸五味子爲末蜜丸梧子大每服二十丸鹽水下

腹中易飢食下片刻卽吐

此蛇積也用醋泡夫蒜汁飲數碗吐出一蛇卽愈不吐再服數碗自愈
又方雄黃錢五調水服數次卽愈

飲食積滯 與痞瘕門參看

食積外治法

凡飲食停滯胸膈脹滿或大便不通或大便泄瀉或年老

或體虛難以攻擊內消者用亂髮一團

剪斷

酒麴

一個小者

二三個亦可

葱白七個老薑二錢胡椒七粒以雞蛋一個破壳

傾入碗中將各藥搗融和入調勻用隔夜燈油煎成一餅

貼病人心坎下胃脘處

先用燈油於胃脘處順擦七次再貼如嫌太熱用紙隔貼亦可

布帶束住冷則煎熱再貼約一二時似覺鬆動即便取去

其病立愈此法極穩而效屢試如神若治小兒藥料可以

稍減

又方

紫蘇熨法

見傷寒門

亦極神效

飲食凝滯攻衝作痛或有形或無形

方見各項氣痛門

飲食過多脹滿不安

用鹽擦牙溫水嗽下二三次如湯沃雪也

魚肉積滯

狗糞燒存性爲末酒服二錢日三服其積自大便出

又方 山查炭研末爲丸每服四錢數次卽愈

食魚積滯

紅曲三合煮爛連渣服積從大便出連服三次卽愈

生魚積滯

取水中石子數十枚燒紅投冷水中七次卽熱飲之三五次其積從大便出

又方食生薑汁和紫蘇汁飲之卽消

肉豆食犬積滯

山查肉杏仁

去皮尖

各二十四粒煎濃湯飲自化

食牛腹脹

乾稻草一把煎濃湯熱飲自消

食鴨積滯

淘糯米水煮熟飲一盞卽消

鴨蛋積滯

馬方新編 卷四
治法與上同

雞蛋積滯

飲好醋即消或飲豆豉水亦消

食整煮雞蛋積滯

腹中若有雞子鳴者多食大蒜即可吐出

山查食鹽蛋積滯

肉豆蔻壹個煨去油煎服連服數個自消

又食索粉涼粉積滯

杏仁五十粒蒸熟搗碎滾開水沖服即消

瓜菓腹脹作痛

此食水中火煎煨之三五六

肉桂 研末 飯和丸菘豆大每服五分開水下

又方 食鹽湯即愈

食西瓜並諸瓜過傷 煎水為湯

瓜皮煎湯解之諸瓜皆同

食荔枝腹脹

荔枝壳煎水服即消 未服開水不嫌日口中嚼香其

食菱角腹脹

取生薑汁飲立消

食豆不消

生蘿蔔汁飲之即消

食積滯

食麪不消

生薑汁沖好酒熱服自化

又方 生蘿蔔取汁炖熱服神效凡食麪用醋斷不作脹

糯米積滯

神曲炒爲末加木香末鹽開水下數日口中聞酒香其積
卽散

飯食凝滯腹痛

飯搓成團加鹽少許燒枯煎水飲卽消

食茶成癖

花椒 脂麻等分爲末以蒸麪餅爲丸如桐子大每服十

丸茶送下百日遂愈 又方每日食榧子七個以愈爲度

又方 青礬 四兩 大小鑊內泥封火煨一夜取出紅棗二

斤煮去皮核共搗爲丸每服叁錢或酒或茶下神效

又方 新鞋一隻將茶葉盛滿任意食之食完再盛一鞋
連食三鞋自不食也男用女鞋女用男鞋可效

食積痞塊

木賊草 五錢 研細末每服五分開水空心調服年近者一

料卽消年遠者不過兩料全愈屢試如神

噎膈 按膈噎各有五五膈氣食酒痰蟲五噎氣食勞憂思也勃膈通治之

此症有氣膈食膈酒膈痰膈蟲膈數種惟氣膈及老人

膈食者難治然施治得法亦可愈也

噎膈諸方 凡患膈食鼓脹愈後必戒殺放生方免復發至要至要

牛涎丸 專治膈食 糯米粉以老牛口涎拌和為小丸

煮熟食之神效或用牛涎和水服亦妙取牛涎法以水洗

盡老牛口角鹽塗之少頃涎自出愈後終身戒食牛肉

又方 牛反草煎水服其效如神無論何項噎膈皆治牛

食百草之後必將所食之草吐出慢慢嚼食所吐之草即

名牛反草此草吐出復食最為難得須令牧牛兒俟吐出

時故意搶奪隨搶隨還俟數日搶慣之後乘其不備搶着走開即可得也若一搶即走牛必怒奪恐致傷人

又方

鹿肚草

用活鹿破腹取其腹內所食之草

陳倉米

五年以外的方可用越陳越妙

灶心土

以家中自取者為真各三錢

水煎服五服後飲食如常再將陳

倉米熬湯當茶時飲一盞二月後永不再發如鹿肚草有

多者照方服十餘劑更妙鹿肚草難以驟得先飲陳倉米

湯救急免病加增再覓鹿肚草配藥服之可也無鹿肚草

用牛反草亦可

又方

豬肺管

四兩

鮮藕

四兩如無鮮藕乾藕節亦可

舊羅底

壹個麪鋪所用

羅麪之黃絲籬底要黃的黑白者不用

以上三味新瓦上焙枯研細末用生

薑一兩搗爛取汁白沙糖一兩沖服初服必吐吐後再服服至三次卽不吐矣服後忌食各色豆一月此方活人甚多神效莫測珍之寶之並忌食豆腐豆芽菜一月

又方 小兒胎髮一個以陰陽瓦焙焦存性研細末陳酒送下極效

又方 先用雄雞壹隻去毛與腸雜洗淨裝入大碗內上用紙數層封固飯上蒸熟取出用鷓鴣管或小竹管將紙上戳破一孔插入以一頭含口中令熱氣沖入喉內其關自開預先取山羊糞一斗浸瓦缸內三日暑熱天只每日清晨用竹枝攪一次澄清取清水煎後藥服之如係酒膈用

葛花叁錢 雲苓 製半夏各貳錢 陳皮去白 甘草壹錢 氣

隔用貳錢 烏藥 雲苓各貳錢 陳皮去白 砂仁各壹錢 香附三錢

酒炒 製半夏錢半 甘草八分 食隔用 神曲貳錢 山查肉

炒雲苓各錢半 陳皮八分 法夏壹錢 甘草八分 服三劑後卽

思飲食屢試皆驗

又方 淨牛乳以當面取者爲佳 少加白糖時時炖熱飲之凡患

噎膈大便燥結者服此必效

又方 驢尿黑驢更佳 乘熱飲二三合極效此尿有毒不可過

多病重者七日方效

又方 用平地或牆邊人糞要乾結者稀糞不用 以向東者爲佳取

回用陰瓦上焙枯

以烟盡為度

研末每服叁錢淡酒送下不過

三服卽思飲食屢試如神有起死回生之妙

又方

製黃蛆

壹錢半研末

真細松蘿茶

七分五釐

廣木香

壹分五釐製

豆蔻

四分五釐

共研極細末五更時空心溫燒酒半茶鍾調服

不飲者用水酒調服戒麪食葷腥數日雖水米不進者無

不應驗

製黃蛆法用糞坑中蛆愈大愈好撈出以長流

水洗淨放瓦罐內鹽水和泥封固木炭火燒一炷香久以

蛆至黃色為度如尙未黃入砂鍋內再炒黃忌銅鐵器

又方 猪毛連粗皮及蹄尖不拘多少曬極乾放淨石上

用明火點之燒至如膏藥樣住火冷定研極細末每服叁

錢滾開水下此方年在五十內者百發百中真仙方也

又方

荔枝

壹枚

去核將蜒蚰

壹條查藥物備要便知

放荔枝肉內

再摻好冰片

二釐

於蜒蚰上卽將荔枝裏好仍放殼內以

線縛好病人含口內有冷涎水滲出徐徐嚥下一時許蜒

蚰化完無水滲出吐出只須一次可以立進飲食

又方 用雞蛋內白皮四十九個加胡椒一斤入好燒酒

蒸四十九日曬四十九次收貯磁瓶遇有患膈食者每早

以開水吞胡椒叁錢三次卽愈神效

又方 生薑不拘多少五月五日午時用布袋裝好浸於

不見天之糞坑內四十九日取起用長流水洗淨懸空吊

曬極乾爲末病二年者用薑末三分病一年者用薑末二分入麝香一釐滾開水沖服只須一服而愈忌葷腥鹽醬五十日永不再發此方極效無比存心濟世者宜預製以救人功德無量糞坑要無婦女大小便者方好

又方

陳皮多年者爲佳

用數十年之陳壁土拌炒去土取陳

皮研末對酒服一二錢數服卽愈痰膈氣膈均效

又方

山梔五錢炒黑研末

酒沖服一服卽愈無論老少神效無

比惟胃寒者不宜

又方

逢日食時自初虧起用白乾麩二斤水調揉熟向

日和成丸如桂圓核大以日色復元爲止卽將麩丸於是

日曬乾收好按一歲一丸空心煮食平淡而有奇功麩圓
外質內虛尤爲奇異不可輕忽多製可以濟人價廉功大
不見日則不效

又方 生藕汁 生薑汁 梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁

蜂蜜 白菓汁 竹瀝各壹盞和勻飯上蒸熟隨意飲之

又方 韭汁 梨汁 薑汁 人乳各壹盞飯上蒸熟服之

三日後再服極效

又方 天生泉水時時熬服極效

又方 白蜜滾水調服每服一兩數服自愈

又方 黑沙糖壹斤生薑壹斤共搗如泥入磁罐封固埋

乾燥地下七日取出每日調開水送下痰膈食膈均極效

又方 做米糖舖內杵過頭造之糟壹斤加生薑四兩共

搗爛做成薄餅曬乾磨末磁罐收貯每早以開水調服二

錢其味最美可以代茶

又方 穀樹子又名楮樹又名構樹煎水服因食甜物而噎膈者服

此最效

又方 食一人噎膈飲食不下華陀見之云是蛇瘕用醋

泡大蒜汁陳者佳飲二三碗並多食大蒜後吐大蛇一條而愈

又方 油透木梳一把燒枯為末酒調一鍾服下半日即

能飲食此方救人無數不可輕視

又方 有肝旺脾弱食即嘔吐屢治不效者此木尅土也

宜用平肝補脾之藥治之必愈不可認為噎膈也

又方 患此症者有蟲藏於肺管時長時縮長則飲食難

進或食後少頃即吐皆有蟲也用靛青葉搗汁無葉即用藍靛亦可

兌淡酒飲之立愈百不效者此方最為神效

又方 此症胸前必有二小骨漸漸交合則不能食而死

取生鵝血對口乘熱灌之其骨自化飲食可進永戒食鵝

牛一物一僧患膈食病臨死語其徒云胸中有物作梗死

後必為剖出其徒剖得一骨後殺鵝血偶滴骨上骨即消

化其徒亦患此病因飲鵝血而愈屢試如神

與世傷寒膈食

核桃十五枚放砂鍋內水浸核桃高一指深煮四五滾取水

飲之

凡膈食初愈飲食宜少

凡膈食初愈飲食不可驟進須先以米湯飲三日再以清
清稀粥服一二日再以濃粥服一二日每次只可一小碗
俟七日方可食乾飯每食不過一小碗日漸遞加切不可
食飽緣胃氣初復驟然飽食反致傷胃則不可救矣卽病
人要食生氣亦須聽之愈後忌鹽醬五十日仍請名醫調

理

反胃嘔吐凡患嘔吐以上噎膈各方可以通治

生薑壹大塊直切薄片勿令斷層層摻鹽以線紮緊外用

草紙七層包之水泡濕慢火煨熟取起搗爛和米煎服立

止又方 生薑汁壹盃煎滾聽用蜂蜜四兩煉熟聽用每服用薑汁一匙

蜜二匙白湯調服每日五六次效

又方 胡椒八分酒藥壹個為末葱頭五根搥融有用熱茶炒

或熱酒炒貼心窩

又方 用極大枳壳兩半個去內穢將 眞阿魏六七分

杏仁拾貳粒去皮尖共搗爛入枳壳內將兩半壳合口外用綿紙

裹好線紮入滾水內大火煮半日取起去壳內藥將壳

焙乾爲末燒酒送下重者不過二次卽愈

又方 眞頭道糯米酒釀去糟好醬油各半和勻溫服卽

止嘔能進飲食

又方 年久陳石灰炒研好醋爲丸如豆大每服七丸薑湯

下三日卽愈

又方 柿餅 拌乾飯蒸熟連食八日不飲滴水極重者

八日必愈屢試屢驗萬無一失 又方 藕二枝陰乾三

四日去其頭二三段單吃藕梢一段吞汁吞渣一日一段

二日服完卽愈 又方 甘蔗汁一升入生薑汁二合溫

熱作五次服甚效 又方 甘蔗搗汁數碗加乾香櫟煮

爛再加白糖四兩搗勻揉碎不拘時服凡積食久而反胃
極重者三四次即愈又方每早用滾開水兌冷水各
半碗服之久服斷根

又方用老薑一大塊挖孔納紅棗一枚紅棗去核內包
砂仁一顆外用黃泥包裹煨透去泥與薑棗只取砂仁嚼
食每食數顆數次即愈極效或將薑棗砂仁煎湯服之亦
效胃寒者最宜又方蚯蚓糞壹兩木香叁錢大黃七錢

為末每服五錢無根水調服忌煎炒酒醋椒薑熱物一二
服即愈其效如神因熱而嘔吐者最宜

上吐下瀉

此尋常吐瀉也如因暑熱吐瀉
不止急照卷十五霍亂門治之

樟木煎水服立止屢試如神並治霍亂亦效不加

又方韭菜搗汁隔水炖熱微溫服極效三又方陳鹽梅

壹個

瓦土焙枯加生薑壹大

同煎服屢試神驗吳用

又方一入腹痛上吐下瀉服六和湯藿香正氣散平胃

散理中湯皆不效因思傷寒書云胸中有熱而嘔吐胃中

有寒而腹痛用黃連吳英水炒透黃芩育生白芍人甘草

黨參 乾薑 法夏 陳皮 日雲苓煎服即愈

又方小兒吐瀉不止用舊鐵釘有銹者煎水飲入口止即

一二日一吐氣味變酸法不加將銀合外麻紙一太

有人飲食一二日之後一齊吐出氣味變酸百藥不效用

豬板油

十兩熬去渣

白蜜

八兩煉淨

二味再入銅鍋內熬數滾入生

薑自然汁三兩和勻成膏取起不時挑服含化初服一次

尚吐連服三次全愈

一二日一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化

此名胃囊症生於胃旁其形如囊凡有飲食必入此囊雖

食飽而肚仍飢餓因此物閒隔於上飲食不能入腹故也

初起一二日一吐吐出食物並無氣味肉食則化米食不

化久則三四日一吐若至五六日一吐則難救矣用製

附子

五錢

雲苓

壹兩

每日煎服二次服至三日吐出食物

必變氣味再服三日則吐一半再服三日則不吐矣不吐

之後用六味地黃湯見內外備用諸方加油當歸火麻仁研末煉

蜜為丸每早服五錢晚服芝蔴五錢服至數日後胃囊必

從大便而出重者形如牛皮輕則如紙此病人多不知諸

書不載方係仙傳萬金難得珍之寶之

朝食暮吐暮食朝吐

此腎虛也用熟地貳兩山萸肉叁兩水五碗煎至一碗

加肉桂一錢研末兌入空心服一日一劑十日必愈愈後

服六味地黃丸一二料方可斷根

飢餓嘔吐

凡人飢餓每有螻蟲上胃食物必吐若誤用翻胃之藥其

吐更甚宜用川椒煎湯飲即安

乾嘔不出

此極惡之症用甘蔗汁加生薑汁和勻溫熱服

酒後乾嘔

甘蔗汁飲數次極效

食物下喉即吐

此腎水虧也用

熟地

貳兩

萸肉

叁兩

麥冬

叁錢

煎服連

服十劑即愈後服六味地黃丸一二料不致再發

見食即吐

此胃經嘔也紅棗

貳個

胡椒

貳粒

打碎

紙包煨過煎湯服

去核入棗內

外用米壹盃炒熟酒藥壹個共研勻貼心窩

食後少頃即吐

此胃脘有蟲也白馬尿飲一二升極效或查卷五蟲疾方

治之

嘔物不化

此大腸嘔也黃糖貳錢酒藥貳錢陳壁土共煎湯服外用酒藥

貳個半煨細茶叁錢艾葉貳錢共搗爛茶炒貼心窩

嘔吐清水

此膽經嘔也生薑壹塊切開甘草研末入薑內紙裹合住

煨熟取薑內甘草入薑一片煎湯服外用蠟樹根去粗皮

驗方新編 卷四 噎隔

馬之系糸 名曰
瓦上霜 路旁陳茅草 一皂角灰共搗碎茶炒貼心窩

吐瀉欲嘔而不嘔 中法一五甘草 正合入薑內添藥合

此小腸經嘔也 楓樹皮 甘草煎服 外用燕子泥樟樹皮共

搗碎有熱用茶炒無熱用酒炒貼心窩

又方 車前草 燈心 藥梲 木葉煎湯服

又方 如嘔後小便不利者 楓樹漿作膏用皂角灰摻上

貼臍眼用燈火在喉下燒三次

吐胃口吐白沫欲嘔而不出 二托蘇按 迦查谷 五蟲共六

此膀胱經嘔也 菘豆 糯米 鹽共炒搗碎加黃糖煎服

又方 蚯蚓 胡椒 艾葉 皂角灰共研碎清油炒貼

心窩 又方 如嘔後氣不散者用艾葉搗碎醋炒貼心窩

欲嘔而不嘔面發紅眼流淚

此三焦嘔也生藕洗淨搗汁如無以藕節代乳汁 乾柿蒂 鳳凰壳

煎服神效 又方 桑樹皮 茶葉 四季葱共搗爛炒

熱貼心窩如二便不通加皂角灰黃糖水調貼肚臍

又方 黃豆研童便和勻貼心窩

又方 上不嘔下不瀉如霍亂者用豉菜豆 糯米 鹽

胡椒 竈心土共爲末以刀燒紅將藥放刀上陰陽水沖

服外用 二酒糟 皂角灰同炒貼心窩如不愈用針刺

驗方新編 卷四 噎膈 七

中指出血即愈

中取出血即愈

貼淋聞藥即吐百藥不效

取家中竈心土

藥店買者不真則不效

水為丸塞兩鼻孔即不吐矣

極效

嘔吐不能服藥必有虵在胸膈

川椒

十粒

煎服或於嘔吐藥中加川椒飲之

又方 陳鹽梅二個和滑石末交搥作餅紙包火上煨枯

開水泡服甚效

脾胃虛弱食不消化湯飲不下

粟米

半升

磨成粉水為丸梧子大每用七粒煮熟入鹽少

許空心和汁服或加醋吞服 又方 真橘皮去白五更

安五分於掌心舐之即睡三日必效

又方 大鯽魚壹條去腸留鱗入皂礬末令滿泥包煨存性研末

每次飲服一錢日二服 又方 有人因服涼藥過多漸

至嘔吐旬日之後進口即吐竟致粒米不下湯水亦吐已

七日矣請醫診視脉不散亂尙有神氣雖因寒涼而阻隔

但絕食以來大便不通小便短濇即用製大黃又枳壳

各壹錢煎湯服之竟不吐出亦不思食次日復進一劑下咽

一時後大小便通利而思食矣誠哉藥之對症其效如此

嘔吐痰水

金匱要略 卷四 嘔膈 七

見痰疾門熱水

一 新增治噎隔方 伯壽札記 婦姑藥之性其效吸也

燕窩之真者常服自效燕根功同純白無邊無毛者偽如

糙米色者良根色紅紫者良就又鷺血能愈噎隔反胃

此日矣前習錄頭風不效

益神補血日之資口唯如竟楚米不可

海狗精補一難日二娘補又氏交洋人因服藥

又水泡大鴨魚 豐補去 人阜馨未命散張回

安正長然掌心甜之哨翅三臥必效

情空心味甘眠起低醋吞煎下又古用薑蘇又

呃逆

偶然呃逆

紙撚通鼻取嚏即止

又方 此績溪黃曉窗傳試之頗效新增

氣熱呃逆

柿蒂煎水飲即止

陰寒呃逆

乳香錢 硫黃

陳艾

各貳錢

為細末用好酒一鍾煎數沸乘

熱氣使病人用鼻嗅之外用生薑擦胸前最效

又方

雄黃

貳錢

燒酒

壹盞

煎七分急令病人嗅其熱氣

即止

又方

川椒

去子及閉口者炒四兩

麩糊為丸如桐子大每

服十九醋湯送下食遠服神效
又方荔枝
七個連壳
核燒枯研

末滾水調下食遠服立止
又方黃蠟燒烟薰二三

即止
又方砂仁
炒生薑連皮等分搗爛熱酒食遠泡

服二錢神效
又方
刀豆子燒灰存性開水調服二錢

即止

體虛常呃逆二三聲

公丁香
參拾
柴粒
白蓮子
去心貳
拾柒個
二味同煮爛去滓加煨薑一

糯米
半升
煮粥食即止

呃逆日久不愈一連四五十聲者

用生薑搗汁一合加蜜一匙溫熱服