

影印傷寒論

趙開羨刻本

字

傷寒論卷第四

漢 張仲景述 晉 王叔和撰次

宋 林 億校正

明 趙開美校刻

沈 琳全校

辨太陽病脉證并治下第七

合三十九法。方三十首。并見太

陽少陽  
合病法。

結胷項強。如柔痓狀。下則和。宜大陷胷丸。第一。

六味。前後有結  
胷藏結病六證。

太陽病。心中懊惱。陽氣內陷。心下鞕。大陷胷湯

傷寒六七日。結胷熱實。脉沈緊。心下痛。大陷胷  
湯主之。第三。用前第二方。

傷寒十餘日。熱結在裏。往來寒熱者。與大柴胡  
湯。第四。七味水。用前第二方。

太陽病。重發汗。復下之。不大便五六日。舌燥而  
渴。潮熱從心下至少腹。滿痛不可近者。大陷胷  
湯主之。第五。用前第二方。

小結胷病。正在心下。按之痛。脉浮滑者。小陷胷  
湯主之。第六。三味。下有太陽病二證。

病在陽。應以汗解。反以水濱。熱不得去。益煩不渴。服文蛤散。不差與五苓散。寒實結胷。無熱證者。與三物小陷胷湯。白散亦可服。第七。

文蛤散  
一味。五

苓散五味。小陷胷湯用  
前第六方。白散三味。

太陽少陽併病。頭痛眩冒。心下痞者。刺肺俞肝俞。不可發汗。發汗則讞語。讞語不止。當刺期門。第八。

婦人中風。經水適來。熱除脉遲。脅下滿讞語。當刺期門。第九。

婦人中風。七八日寒熱。經水適斷。血結如瘡狀。

婦人傷寒經水適來。讞語無犯胃氣及上二焦。自愈。第十一。

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節疼。微嘔。心下支結。柴胡桂枝湯主之。第十二。九味

傷寒五六日。已發汗復下之。胷脅滿。小便不利。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱。心煩。柴胡桂枝乾薑湯主之。第十三。七味

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。不欲食。大便鞶。脉細者為陽微結。非少陰也。可與

小柴胡湯第十四。

用前第  
十方

傷寒五六日。嘔而發熱。以他藥下之。柴胡證仍  
在。可與柴胡湯。蒸蒸而振。却發熱汗出解。心滿  
痛者。為結脣。但滿而不痛。為痞。宜半夏瀉心湯。

第十五。

七味。下有太陽併病。并氣痞二證。

太陽中風。下利嘔逆。表解乃可攻之。十棗湯主  
之。第十六。

三味。下有太陽一證。

心下痞。按之濡者。大黃黃連瀉心湯主之。第十

七。二味。

心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。第

十八 四味

心下痞。與瀉心湯。不解者。五苓散主之。第十九。

七  
用前第  
證方

傷寒汗解後。胃中不和。心下痞。生薑瀉心湯主之。第二十。八味

傷寒中風。反下之。心下痞。醫復下之。痞益甚。甘草瀉心湯主之。第二十一。六味

傷寒服藥利不止。心下痞。與理中。利益甚。宜赤石脂禹餘粮湯。第二十二。二味。下有  
痞一證。

傷寒發汗。若吐下。心下痞。噫不除者。旋復代赭

湯主之。第二十三。七味

下後不可更行桂枝湯。汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯。第二十四。四味

太陽病外未除數下之。遂協熱而利。桂枝人參湯主之。第二十五。五味

傷寒大下後復發汗。心下痞惡寒者不可攻痞。先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜

大黃黃連瀉心湯。第二十六。瀉心湯用前第十七方

傷寒發熱。汗出不解。心中痞。嘔吐下利者。大柴

胡湯主之。第二十七。用前第十四方

病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脉浮。胷中痞。氣上衝不得息。當吐之。宜瓜蒂散。第二十八  
下有三味。

不可與瓜  
蒂散證。

病脅下素有痞。連脣痛引少腹者。此名藏結。第十九

傷寒。若吐下後不解。熱結在裏。惡風大渴。白虎加人參湯主之。第三十  
五味。下有不可與白虎證。

傷寒無大熱。口燥渴。背微寒者。白虎加人參湯主之。第三十一  
用前方。

傷寒脉浮。發熱無汗。表未解。不可與白虎湯。渴

者。白虎加人參湯主之。第三十二。

用前第  
三十方

太陽少陽併病。心下鞶。頸項強而眩者。刺大椎  
肺俞。肝俞。慎勿下之。第三十三。

太陽少陽合病。自下利。黃芩湯。若嘔。黃芩加半

夏生薑湯主之。第三十四。

黃芩湯四味加半  
夏生薑湯六味。

傷寒。胃中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔者。黃  
連湯主之。第三十五。七味

傷寒八九日。風濕相搏。身疼煩。不能轉側。不嘔  
不渴。脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。大便鞶。  
小便自利者。去桂加白朮湯主之。第

一云。臍下更。下

三十六湯。並五味。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。汗出短氣。  
小便不利。惡風。或身微腫者。甘草附子湯主之。

第三十七。四味

傷寒脉浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。第  
三十八。四味

傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。第三十九。

九味

問曰。病有結胷。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。寸  
脉浮。關脉沈。名曰結胷也。

何謂藏結。答曰。如結胷狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沈緊。名曰藏結。舌上白胎滑者。難治。

藏結無陽證。不往来寒熱。一云。寒而不熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病發於陽。而反下之。熱入因作結胷。病發於陰。而反下之。汗出一作因作痞也。所以成結胷者。以下之太早故也。結胷者。項亦強。如柔痓狀。下之則和。宜大陷胷丸。方一。

大黃半斤

葶苈子半升

芒消半升

杏仁

尖熬黑

右四味。擣篩二味。內杏仁芒消。合研如脂。和散。  
取如彈丸一枚。別擣甘遂末一錢七。白蜜二合。  
水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。  
更服。取下為效。禁如藥法。

結胷證。其脉浮大者。不可下。下之則死。  
結胷證悉具。煩躁者亦死。

太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為  
痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表  
未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。  
一云頭胃痛即眩。

中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊惱。陽氣內陷。  
心下因鞭。則為結胷。大陷胷湯主之。若不結胷。但  
頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃。

大陷胷湯方二。

大黃

六兩去皮。

芒消一升

甘遂一錢

右三味。以水六升。先煮大黃取二升。去滓。內芒  
消。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利止後  
服。

傷寒六七日。結胷熱實。脉沈而緊。心下痛。按之石  
鞭者。大陷胷湯主之。  
二用前第  
方

傷寒十餘日。熱結在裏。復往来寒熱者。與大柴胡湯。但結在胃無大熱者。此為水結在胃脅也。但頭微汗出者。大陷胃湯主之。

四用前第  
二方

### 大柴胡湯方

大柴胡半斤

枳實四枚

生薑五兩

黃芩三兩

芍藥三兩

半夏半升

大棗十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓再煎。溫服一升。日三服。一方加大黃二兩。若不加。恐不

名大柴胡湯。

太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。一云。日晡所。發心腎大煩。從心下至少腹。鞭滿而痛不可近者。大陷胷湯主之。五用前第

二方

小結胷病。正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胷湯主之。方六。

黃連

一兩

半夏

半升洗。

栝樓實

大者一枚

右三味。以水六升。先煮栝樓。取三升去滓。內諸藥。煮取二升。去滓分溫三服。

太陽病。二三日。不能臥。但欲起。心下必結。脉微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結胷。未止。

者。四日復下之。此作協熱利也。

太陽病。下之其脉促。縱一作不結胷者。此為欲解也。脉浮者。必結胷。脉緊者。必咽痛。脉弦者。必兩脅拘急。脉細數者。頭痛未止。脉沈緊者。必欲嘔。脉沈滑者。協熱利。脉浮滑者。必下血。

病在陽。應以汗解之。反以冷水濱之。若灌之。其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差者。與五苓散。寒實結胷。無熟證者。與三物小陷胷湯。用前第  
六方

白散亦可服。七。

物小白散。  
云與三

文蛤散方

文蛤五兩

右一味為散。以沸湯和一方寸七服。湯用五合。

五苓散方

猪苓十八銖去黑皮。

白朮十八銖去黑皮。

澤瀉一兩六銖去皮。

茯苓十八銖去皮。

桂枝半兩去皮。

右五味為散。更於臼中杵之。白飲和方寸七服。之日三服。多飲煖水汙出愈。

白散方

桔梗三分

巴豆一分去皮心。

熬黑研如脂。

貝母三分去皮心。

右三味為散。內巴豆更於臼中杵之。以白飲和服。強人半錢七。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一杯。身熱皮粟不解。欲引衣自覆。若以水漬之洗之。益令熱劫不得出。當汗而不汗。則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥三兩如上法。

太陽與少陽併病。頭項強痛。或眩冒。時如結胷。心下痞鞕者。當刺大椎第一閒。肺俞肝俞。慎不可發汗。發汗則讞語脉弦。五日讞語不止。當刺期門八。婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除。

而脉遲身涼。曾脅下滿。如結胷狀。讖語者。此為熱入血室也。當刺期門。隨其實而取之。九婦人中風。七八日續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此為熱入血室。其血必結。故使如瘡狀發作有時。小紫胡湯主之。方十。

紫胡

半斤

黃芩

三兩

人參

三兩

半夏

半升洗

甘草

三兩

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

婦人傷寒。發熱。經水適來。晝日明了。暮則讞語如見鬼狀者。此為熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。必自愈。十一。

傷寒六七日。發熱。微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下支結。外證未去者。紫胡桂枝湯主之。方十二。

桂枝

去皮

黃芩

一兩半

人參

一兩半

甘草

炙一兩

半夏

二合半洗

芍藥

一兩半

大棗

擘六枚

生薑

一兩半切

紫胡

四兩

右九味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。本云。人參湯。作如桂枝法。加半夏。紫胡。黃芩。復如

紫胡法。今用人參作半劑。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胷脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往来寒熱。心煩者。此為未解也。紫胡桂枝乾薑湯主之。方十三。

紫胡半斤

桂枝三兩去皮

乾薑二兩

栝樓根四兩

黃芩三兩去皮

牡蠣熬二兩

甘草二兩炙

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞭。脉細者。此為陽微結。必有表。復有裏也。脉沈亦在裏也。汗出為陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此為半在裏半在外也。脉雖沈緊。不得為少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小紫胡湯。設不了了者。得屎而解。

十四用前第  
十方

傷寒五六日。嘔而發熱者。紫胡湯證具。而以他藥下之。紫胡證仍在者。復與紫胡湯。此雖已下之。不為逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而

鞭痛者。此為結胷也。大陷胷湯主之。但滿而不痛者。此為痞。紫胡不中與之。宜半夏瀉心湯。方十五。

半夏

洗半升

黃芩

乾薑

人參

甘草

炙各三兩

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。須大陷胷湯者。方用前第二

法。

一方用半夏一升

太陽少陽併病。而反下之。成結胷。心下鞭。下利不止。水漿不下。其人心煩。

脉浮而緊。而復下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。

但氣痞耳。

太陽中風。下利嘔逆。表鮮者。乃可攻之。其人熱。汗出。發作有時。頭痛。心下痞。鞭滿。引脅下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。此表鮮裏未和也。十棗湯主之。方十六

芫花熬

甘遂

大戟

右三味等分。各別擣為散。以水一升半。先煮大棗肥者十枚。取八合。去滓。內藥末。強人服一錢。七羸人服半錢。溫服之。平旦服。若下少病不除者。明日更服。加半錢。得快下利後。糜粥自養。

太陽病。醫發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽氣並竭。無陽則陰獨。復加燒針。因曾煩。面色青黃。膚瞞者。難治。今色微黃。手足溫者。易愈。

心下痞。按之濡。其脉關上浮者。大黃黃連瀉心湯。主之。方十七。

大黃二兩 黃連一兩

右二味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫

再服。

臣億等看詳大黃黃連瀉心湯。諸本皆二味。

又後附子瀉心湯。用大黃黃連黃芩附

子。恐是前方中亦有黃芩。後但加附子也。故後云附子瀉心湯。本云加附子也。

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之方十  
八。

大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩

附子一枚。炮去皮。別煮取汁。

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去  
滓內附子汁分溫再服。

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而  
口燥煩小便不利者五苓散主之十九一方云忍  
之一日乃愈用前第  
七證方

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭。

脅下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。

方二十。

生薑

四兩切。

甘草

三兩炙。

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半升洗。

黃連

一兩

大棗

十枚擘。

右八味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。附子瀉心湯。本云。加附子。半夏瀉心湯。甘草瀉心湯。同體別名耳。生薑瀉心湯。本云。理中人參黃芩湯。去桂枝。加黃連。并

瀉肝法。

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。  
腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。乾嘔心煩不得安。醫見  
心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但  
以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。

方二十一。

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升

大棗

十二枚

黃連

一兩

右六味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。  
溫服一升。日三服。

臣億等謹按上生薑瀉心湯法。本云理中人參黃芩湯。今

詳瀉心以療痞。痞氣因發陰而生。是半夏生薑甘草瀉心三方。皆本於理中也。其方必各有人

參。今其草瀉心中無者。脫落之也。又按于金并外臺祕要治傷寒。醫食。用此方。皆有人參。知脫

落無

疑。

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞鞕。服瀉心湯已。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復不止者。當利其小便。赤石脂禹餘糧湯方二十二

赤石脂碎。

一斤。

太一禹餘糧碎。

一斤。

右二味。以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。傷寒吐下後。發汗。虛煩。脉甚微。八九日心下痞鞕。脅下痛。氣上衝咽喉。眩冒。經脈動惕者。久而成痿。

傷寒發汗。若吐若下。解後心下痞鞕。噫氣不除者。  
旋復代赭湯主之。方二十三。

旋復花

三兩

人參

二兩

生薑

五兩

代赭

一兩

甘草

三兩

半夏

半升洗

大棗

十二枚擘

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。  
溫服一升。日三服。

下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大熱者。可  
與麻黃杏子甘草石膏湯。方二十四。

麻黃

四兩

杏仁

五十箇去皮尖

甘草

二兩炙

石膏

半斤。碎。綿裹。

右四味以水七升先煮麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升本云黃耳杯太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不鮮者桂枝人參湯主之方二十五

桂枝

四兩。別切。

甘草

四兩。炙。

白朮

三兩。

人參

三兩。

乾薑

三兩。

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯二十六瀉心湯用前第十七方

傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者大柴胡湯主之二十七用前第十四方

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胷中痞鞕氣上衝喉咽不得息者此為胷有寒也當吐之宜瓜蒂散方二十八

瓜蒂一分熬黃

赤小豆一分

右二味各別擣篩為散已合治之取一錢匕以

香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓。取汁。和散。溫頓服之。不吐者。少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家。不可與瓜蒂散。

病脅下素有痞連在臍傍。痛引少腹。入陰筋者。此名藏結死。二十九

傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。方三十

知母六兩

石膏碎一斤

甘草二兩炙

人參二兩

粳米六合

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。  
日三服。此方立夏後立秋前。乃可服。立秋後不可服。正月二月三月。尚凜冷。亦不可與服之。與之則嘔利而腹痛。諸亡血虛家。亦不可與。得之則腹痛利者。但可溫之。當愈。

傷寒無大熱。口燥渴。心煩。背微惡寒者。白虎加人參湯主之。二十 用前方

傷寒脉浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。三十二 用前

方

太陽少陽併病。心下鞭。頸項強而眩者。當刺大椎  
肺俞。肝俞。慎勿下之。三十三。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃  
芩加半夏生薑湯主之。三十四。

### 黃芩湯方

黃芩

三兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

大棗

十二枚擘

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日  
再夜一服。

### 黃芩加半夏生薑湯方

黃芩

三兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

大棗

十二枚擘

半夏半升。洗。生薑三兩。切。

右六味以水一斗。煮取三升去滓。溫服一升。日再夜一服。

傷寒胃中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。方三十五。

黃連

三兩。甘草三兩。炙。

乾薑

三兩。半升。洗。

桂枝

三兩。十二枚。擘。

人參

二兩。半升。

大棗

十二枚。擘。

右七味以水一斗。煮取六升去滓。溫服。晝三夜。

二疑非仲景方。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不

嘔不渴脉浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。若其人  
大便鞭一云。臍下。心下。小便自利者。去桂加白朮湯主  
之。三十六

桂枝附子湯方

桂枝四兩

附子三枚

炮去皮破

生薑三兩

切

大棗一枚

擘

甘草二兩

炙

右五味以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。  
去桂加白朮湯方

附子三枚

炮去皮破

四兩

白朮三兩

切

生薑三兩

切

甘草二兩

炙

大棗十枚

擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服初  
一服其人身如痺半日許復服之三服都盡其  
人如冒狀勿怪此以附子术併走皮內逐水氣  
未得除故使之耳法當加桂四兩此本一方二  
法以大便鞭小便自利去桂也以大便不鞭小  
便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產  
婦宜減服之

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇。  
汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者。  
甘草附子湯主之方三十七。

甘草二兩。炙。

附子二枚。炮。

白术二兩。去皮破。

白朮二兩。炮。

桂枝四兩。去皮。

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服初服得微汗則解能食汗止復煩者將服五合恐一升多者宜服六七合為始

傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之方

三十八

知母六兩。

石膏一斤。碎。

甘草二兩。炙。

粳米六合。

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升

日三服

臣億等謹按前篇云。熱結在裏。表裏俱  
熱者。白虎湯主之。又云其表不解不可。

與白虎湯此云脉浮滑表有熱裏有寒者必表  
裏字差矣。又陽明一證云脉浮遲表熱裏寒。四  
逆湯主之。又少陰一證云裏寒外熱通脈四逆  
湯主之。以此表裏自差明矣。千金翼云白通湯  
非也。

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方三十九

甘草

四兩炙。

生薑

三兩切。

人參

二兩

生地黃

一斤

桂枝

三兩去皮。

阿膠

二兩

麥門冬

半升去心。

麻仁

半升去皮。


大棗

三十枚擘。

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升。  
去滓內膠烊消盡溫服一升日三服一名復脉

湯

脉按之来緩時一止復來者名曰結。又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結。陰也。脉來動而中止不能自還因而復動者名曰代。陰也。得此脉者必難治。



傷寒論卷第五

漢 張仲景述

晉 王叔和撰次

宋 林 億校正

明 趙開美校刻

沈 琳全校

辨陽明病脉證并治第八

辨少陽病脉證并治第九

辨陽明病脉證并治第十合四十四法。方一  
首。一方附。并見

陽明少陽  
合病法。

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。第

卷五  
一。三味。前有陽明病。二十七證。

陽明病。脉遲。汗出不惡寒。身重短氣。腹滿潮熱。大便鞭。大承氣湯主之。若腹大滿不通者。與小承氣湯。第二。大承氣四味。小承氣三味。

陽明病。潮熱。大便微鞭者。可與大承氣湯。若不大便六七日。恐有燥屎。與小承氣湯。若不轉失氣。不可攻之。後發熱復鞭者。小承氣湯和之。第三。用前第二方。下有二病證。

傷寒若吐下不解。至十餘日。潮熱不惡寒。如見鬼狀。微喘直視。大承氣湯主之。第四。用前第二方。

陽明病。多汗。胃中燥。大便鞭。讞語。小承氣湯主之。第五。用前第  
二方。

陽明病。讞語。潮熱。脉滑疾者。小承氣湯主之。第六。用前第  
二方。

陽明病。讞語。潮熱。不能食。胃中有燥屎。宜大承氣湯下之。第七。用前第二方。下。  
有陽明病一證。

汗出讞語。有燥屎在胃中。過經乃可下之。宜大承氣湯。第八。用前第二方。下。  
有傷寒病一證。

三陽合病。腹滿身重。讞語遺尿。白虎湯主之。第九。四味。

二陽併病。太陽證罷。潮熱汗出。大便難讞語者。

宜大承氣湯。第十一。

用前第  
二方

陽明病。脈浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。  
惡熱身重。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中  
懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。第十一。  
二味

若渴欲飲水。舌燥者。白虎加人參湯主之。第十

二。五味

若脉浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主  
之。第十三。  
五味下有不可  
與猪苓湯一證。

脉浮遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。第

十四

三味下有  
二病證。

陽明病下之外有熱。手足溫不結胷。心中懊惱。不能食。但頭汗出。梔子豉湯主之。第十五。第十六。用前。

方一

陽明病。發潮熱。大便溏。脅滿不去者。與小紫胡湯。第十六。七味。

陽明病。脅下滿。不大便。而嘔。舌上胎者。與小紫胡湯。第十七。用上。

陽明中風。脈弦浮大。短氣腹滿。脅下及心痛。鼻乾不得汗。嗜臥。身黃。小便難。潮熱而曖。與小紫

胡湯第十八用上

脉但浮無餘證者。與麻黃湯。第十九。四味。

陽明病。自汗出。若發汗。小便利。津液內竭。雖鞭不可攻之。須自大便蜜煎導而通之。若土瓜根。

豬膽汁。第二十。

一味。猪膽。方附。二味。

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒。表未解。宜桂枝湯。

第二十一。五味。

陽明病。脉浮。無汗而喘。發汗則愈。宜麻黃湯。第

二十二。

用前第十九方

陽明病。但頭汗出。小便不利。身必發黃。茵陳蒿

湯主之。第二十三。三味

陽明證。喜忘。必有畜血。大便黑。宜抵當湯下之。

二十四。四味

陽明病。下之。心中懊惓而煩。胃中有燥屎者。宜

大承氣湯。第二十五。

用前第二方。  
下有一病證。

病人煩熱。汗出解。如瘡狀曰晡發熱。脉實者。宜大承氣湯。脉浮虛者。宜桂枝湯。第二十六。

大承氣湯

用前第二方。桂枝湯。

大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛。本有宿食。宜大承氣湯。第二十七。

用前第二方。

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。宜大

承氣湯。第二十八。

用前第  
二方

食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。第二十九。

四味

太陽病發熱汗出惡寒。不嘔心下痞。此以醫下之也。如不下。不惡寒而渴。屬陽明。但以法救之。宜五苓散。第三十。

五味下有  
二病證

趺陽脉浮而濇。小便數。大便鞭。其脾為約。麻子仁丸主之。第三十一。

六味

太陽病三日發汗不解。蒸蒸熱者。調胃承氣湯

主之。第三十二。

用前第  
一方

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯。第三十三。

用前第  
一方

太陽病若吐下發汗後微煩大便鞕與小承氣

湯和之。第三十四。

用前第  
二方

得病二三日脉弱無太陽狀胡證煩躁心下鞕。

小便利屎定鞕宜大承氣湯。第三十五。

用前第  
二方

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大

便難宜大承氣湯。第三十六。

用前第  
二方

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯。第三

十七。用前第  
二方

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。第三。

十八。用前第  
二方

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。第三。

十九。用前第  
二方

陽明少陽合病。必下利。脉滑而數。有宿食也。當  
下之。宜大承氣湯。第四十。  
用前第  
二方

病人無表裏證。發熱七八日。脉數。可下之。假令  
已下。不大便者。有瘀血。宜抵當湯。第四十一。  
用前

第二十四方。  
下有二病證。

傷寒七八日。身黃如橘色。小便不利。茵陳蒿湯。

主之。第四十二。

用前第  
十三方

傷寒身黃發熱。梔子蘖皮湯主之。第四十三。三味  
傷寒瘀熱在裏。身必黃。麻黃連芩赤小豆湯主  
之。第四十四。八味

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約一云絡。是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。

陽明之為病。胃家實一作寒。是也。

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實大便難者。此名陽明也。

問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。即自汗出而惡熱也。

問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中。主土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此為陽明病也。

本太陽。初得病時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。傷寒發熱。無汗。嘔不能食。而反汗出濶濶然者。是轉屬陽明也。

傷寒三日。陽明脉大。

傷寒脉浮而緩。手足自溫者。是為繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日大便鞕者。為陽明病也。

傷寒轉繫陽明者。其人濶然微汗出也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脉浮而緊。若下之。則腹滿小便難也。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。  
陽明病。若中寒者。不能食。小便不利。手足濶然汗出。此欲作固瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷。水穀不別故也。

陽明病。初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濶然汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共并。脉緊則愈。

陽明病。欲解時。從申至戌上。

陽明病。不能食。攻其熱必嘔。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。攻其熱必嘔。

陽明病。脈遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。  
此欲作穀癰。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故  
也。

陽明病。法多汗。反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此  
以久虛故也。

陽明病。反無汗。而小便利。二三日嘔而欬。手足厥  
者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。頭不痛。  
一云。冬

明。  
冬陽

陽明病。但頭眩不惡寒。故能食而欬。其人咽必痛。  
若不欬者。咽不痛。  
一云。冬

陽明病無汗小便不利心中懊惱者身必發黃。  
陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃。  
陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出。

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄。

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此必大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也。

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。

陽明病。心下鞭滿者。不可攻之。攻之利遂不止者死。利止者愈。

陽明病。面白色赤。不可攻之。必發熱。色黃者。小便不利也。

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。方一。

甘草

炙二兩

芒消

半升

大黃

四兩洗清

右三味。切以水三升。煮二物至一升。去滓。內芒消。更上微火一二沸。溫頓服之。以調胃氣。

陽明病。脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣腹

滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濶然汗出者。此大便已鞭也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。一法與桂枝湯。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄下。大承氣湯方二。

大黃

四兩酒洗。

厚朴

半斤去皮炙。

枳實

五枚炙。

芒消

三合

右四味。以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。內大黃。更煮取二升。去滓。內芒消。更上微火。一兩沸。分溫再服。得下餘勿服。

小承氣湯方

大黃酒洗。四兩。

厚朴去皮。二兩。

枳實三枚。大者。炙。

右三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯瀉當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者勿服之。

陽明病。潮熱。大便微鞕者。可與大承氣湯。不鞕者。不可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉失氣者。此有燥屎也。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞕。後必溏。不可攻之。攻之必脹滿不能食也。欲飲水者。與水則

其後發熱者。必大便復鞭而少也。以小承氣湯。用前  
和之。不轉失氣者。慎不可攻也。小承氣湯三。第二

夫實則讞語。虛則鄭聲。鄭聲者。重語也。直視讞語。  
喘滿者死。下利者亦死。  
發汗多。若重發汗者。亡其陽。讞語。脉短者死。脉自  
和者不死。

傷寒。若吐。若下。後不解。不大便。五六日。上至十餘  
日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。  
發則不識人。循衣摸牀。惕而不安。一云順衣妄惕不安。微

喘直視。脉弦者生。濇者死。微者。但發熱讞語者。大

承氣湯主之。若一服利。則止後服。

四。用前第  
二方

陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞶。鞶則讞語。小承氣湯主之。若一服讞語止者。更莫

復服。

五。用前第  
二方

陽明病。讞語發潮熱。脉滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一升。腹中轉氣者。更服一升。若不轉氣者。勿更與之。明日又不大便。脉反微濇者。裏虛也。為難治。不可更與承氣湯也。

六。用前第  
二方

陽明病。讞語有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎。

五六枚也。若能食者但鞶耳。宜大承氣湯下之。七。

用前第  
二方

陽明病。下血讞語者。此為熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而寫之。濁然汗出則愈。

汗汗作臥。一出讞語者。以有燥屎在胃中。此為風也。須

下者過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛

裏實故也。下之愈。宜大承氣湯。入用前第二方。一  
云大柴胡湯。

傷寒四五日。脉沈而喘滿。沈為在裏。而反發其汗。津液越出。大便為難。表虛裏實。久則讞語。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁。面垢。枯。一作

云向譏語遺尿。發汗則譏語下之。則額上生汗。手經。

足逆冷。若自汗出者白虎湯主之。方九。

知母六兩

石膏一斤碎

甘草二兩炙

粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升。  
日三服。

二陽併病太陽證罷。但發潮熱。手足熱。熱汗出。大便難而譏語者。下之則愈。宜大承氣湯。十用前第十二方

陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱。身重。若發汗則躁。心憒憒。切公對反

讞語。若加溫針。必恍惱煩躁。不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懨。舌上胎者。梔子豉湯主之。方十一。

肥梔子

一枚。擘。

香豉

四合。綿裹。

右二味。以水四升。煮梔子取二升半。去滓。內豉。更煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得快吐者。止後服。

若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。方十二。

知母

六兩

石膏

一斤。碎。

甘草

二兩。炙。

粳米六合

人參三兩

右五味。以水一斗。煮米熟。湯成去滓。溫服一升。  
日三服。

若脉浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。  
方十三。

猪苓

去皮

茯苓

澤瀉

阿膠

滑石

碎各一兩。

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內阿膠烊消。溫服七合。日三服。

陽明病。汗出多而渴者。不可與猪苓湯。以汗多胃

中燥。猪苓湯復利其小便故也。

脉浮而遲。表熱裏寒。下利清穀者。四逆湯主之。方十四。

甘草

二兩。炙。

乾薑

一兩。半。

附子

一枚。生皮破八片用去。

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫二服。強人可大附子一枚。乾薑三兩。

若胃中虛冷不能食者飲水則噦。

脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄。

陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊惓。飢不能食但頭汗出者。梔子豉湯主之。十五

用前第十

方一

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。胷脅滿不去者。  
與小紫胡湯。方十六。

紫胡

半斤

黃芩

三兩

人參

三兩

半夏

洗半升

甘草

三兩

生薑

三兩

大棗

十枚擘

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取  
三升。溫服一升。日三服。

陽明病。脅下鞭滿。不大便。而嘔。舌上白胎者。可與  
小紫胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濶然。

汗出而解。十七。方

用上

陽明中風。脉弦浮大。而短氣。腹都滿。脅下及心痛。  
久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。一身及目悉黃。  
小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫。刺之小差。外不  
解。病過十日。脉續浮者。與小柴胡湯。十八。方

用上

脉但浮。無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加噦者。  
不治。麻黃湯。方十九。

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

一兩

杏仁

七十箇去皮尖

右四味。以水九升。煮麻黃減二升。去白沫。內諸

藥煮取二升半。去滓溫服八合。覆取微似汗。  
陽明病自汗出。若發汗小便自利者。此為津液內  
竭。雖鞭不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通  
之。若土瓜根及大猪膽汁。皆可為導。二十。

蜜煎方

食蜜七合

右一味。於銅器內。微火煎。當須凝如飴狀。攬之  
勿令焦著。欲可丸。併手捻作挺。令頭銳。大如指。  
長二寸許。當熬時急作。冷則鞭。以內穀道中。以  
手急抱。欲大便時乃去之。疑非仲景意。已試甚

良。

又大猪膽一枚瀉汁。和少許法醋。以灌穀道內。  
如一食頃。當大便出宿食惡物。甚效。

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。  
宜桂枝湯。二十一。

桂枝

三兩去皮。

芍藥

三兩

生薑

三兩

甘草

二兩炙。

大棗

十二枚擘。

右五味。以水七升。煮取三升。去滓。溫服一升。須  
臾啜熱稀粥一升。以助藥力取汗。

陽明病。脈浮。無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。二

十二。用前第十九方

陽明病。發熱汗出者。此為熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此為瘀熱在裏。身必發黃。茵陳蒿湯主之。方二十三。

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚擘

大黃

二兩去皮

右三味。以水一斗二升。先煮茵陳減六升。內二味。煮取三升。去滓。分三服。小便當利尿如皂莢汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

陽明證。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜忘。屎雖鞭大便反易。其色必黑者。宜

抵當湯下之方二十四

水蛭熬

蟲去皮

各三十箇熬

大黃三兩

酒洗

桃仁二十箇

尖及兩人者

箇去皮

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不  
下更服。

陽明病下之心中懊惱而煩胃中有燥屎者可攻  
腹微滿初頭顛後必溏不可攻之若有燥屎者宜  
大承氣湯二十五用前第二方

病人不大便五六日繞脅痛煩躁發作有時者此  
有燥屎故使不大便也。

病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬

陽明也。脉實者。宜下之。脉浮虛者。宜發汗。下之與

大承氣湯。發汗宜桂枝湯。二十六。

大承氣湯用前第二方。桂枝湯。

十一用前第二方。

大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥

屎也。所以然者。本有宿食故也。宜大承氣湯。二十

七。用前第二方。

病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒一

不能臥者。有燥屎也。宜大承氣湯。二十八。

用前第二

方

食穀欲嘔。屬陽明也。吳茱萸湯主之。得湯反劇者。  
屬上焦也。吳茱萸湯方二十九。

吳茱萸

一升。洗。

人參

三兩

生薑

六兩。切。

大棗

十二枚。擘。

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日  
三服。

太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發熱汗出。復惡寒。不  
嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人  
不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必  
鞶。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但

以法救之。渴者宜五苓散。方三十。

猪苓

去皮

白术

茯苓

各十  
八銖

澤瀉

一兩  
六銖

桂枝

半兩  
去皮

右五味為散。白飲和。服方寸匕。日三服。

脉陽微而汗出少者。為自和。如一作也。汗出多者。為太過。陽脉實。因發其汗。出多者。亦為太過。太過者。為陽絕於裏。亡津液。大便因鞕也。

脉浮而芤。浮為陽。芤為陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

趺陽脉浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相

搏大便則鞭其脾為約。麻子仁丸主之。方三十一。

麻子仁

二升  
芍藥半斤

枳實炙

大黃

一斤去皮。

厚朴

一尺炙去皮。

杏仁

一升熬別作脂尖。

右六味蜜和丸如梧桐子大飲服十丸日三服。

漸加以知為度。

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃

承氣湯主之。

三十二用前第  
一方

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯。

三十三用前第一

方

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因

鞭者。與小承氣湯和之愈。三十四。

用前第  
二方

得病二三日。脉弱。無太陽柴胡證。煩躁心下鞭。至四五日。雖能食。以小承氣湯。稍稍與微和之。令小安。至六日。與承氣湯一升。若不大便。六七日。小便少者。雖不受食。一云不但初頭鞭。後必溏。未定成鞭。攻之必溏。須小便利。屎定鞭。乃可攻之。宜大承氣湯。三十五。

用前第  
二方

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此為實也。急下之。宜大承氣湯。三十

六。  
用前第  
二方

陽明病。發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。二十七。

用前第二方。一。  
云。大柴胡湯。

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜大承氣湯。三十八。

用前第一  
二方

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。三十九。

用前第一  
二方

陽明少陽合病。必下利。其脉不負者為順也。負者失也。互相剋贊。名為負也。脉滑而數者。有宿食也。

當下之。宜大承氣湯。四十。  
用前第一  
二方

病人無表裏證。發熱七八日。雖脉浮數者。可下之。

假令已下。脉數不解。合熱則消穀喜飢。至六七日。  
不大便者。有瘀血。宜抵當湯。四十一。

用前第二  
十四方

若脉數不解。而下不止。必協熱便膿血也。

傷寒發汗已。身目為黃。所以然者。以寒濕一作溫在裏不解故也。以為不可下也。於寒濕中求之。

傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。

茵陳蒿湯主之。四十二。

用前第二  
十三方

傷寒身黃發熱。梔子蘖皮湯主之。方四十三。

肥梔子

十五箇

甘草

一兩

黃蘖

二兩

右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。

傷寒瘀熱在裏。身必黃。麻黃連。軻赤小豆湯。主之。

方四十四。

麻黃

二兩去節。

連軻

二兩連翹根是。

杏仁

四十箇去皮尖。

赤小豆

一升。

大棗

十二枚擘。

生梓白皮

切一升。

生薑

二兩切。

甘草

二兩炙。

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫。內諸藥煮取三升去滓分溫三服半日服盡。

辨少陽病脉證并治第九

方一首。并見三陽合病法。

太陽病不解轉入少陽。脅下鞭滿。乾嘔不能食。往来寒熱尚未吐下。脉沈緊者與小柴胡湯。第

一。七味

少陽之為病。口苦咽乾目眩也。

少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胷中滿而煩者。不可吐下。吐下則悸而驚。

傷寒。脉弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則讞語。此屬胃。胃和則愈。胃不和。煩而悸。一云躁

躁

本太陽病不解。轉入少陽者。脅下鞭滿。乾嘔不能食。往来寒熱。尚未吐下。脉沈緊者。與小柴胡湯。方

一。

紫胡八兩 人參三兩

黃芩三兩

甘草

三兩  
炙。

半夏

半升  
洗。

生薑

三兩  
切。

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

若已吐下。發汗。溫針。讞語。紫胡湯證罷。此為壞病。知犯何逆。以法治之。

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠睡。目合則汗。傷寒六七日。無大熱。其人躁煩者。此為陽去入陰故也。

傷寒三日。三陽為盡。三陰當受邪。其人反能食而不嘔。此為三陰不受邪也。

傷寒三日。少陽脉小者。欲已也。

少陽病欲解時。從寅至辰上。