

孫真人千金方卷之五十

箴十

孫真人備急千金要方卷之五十

箴十

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

脾臟方

冷利第八論

論曰舊治痢於貴勝用建脾丸多效今治積

久冷痢先以溫脾湯下訖後以建脾丸補之
未有不效者貧家難以克辦亦無可將息也
溫脾湯治積久冷熱赤白痢者方

大黃

桂心

附子

乾薑

人參

各三兩
各二兩

右五味以水七升煮取二升半分三

服與前温脾湯小異

建脾圓治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不

消雷鳴腹脹泄痢不止方

鍾乳粉

三兩

赤石脂

好麴

箴十

大麥蘖

當歸

黃連

人參

細辛

龍骨

乾薑

茯苓

石斛

桂心

各二兩

附子

一兩

蜀椒

六兩

右十五味為末白蜜丸如梧子酒服十九

日三加至三十九丸弱者飲服此方通治男

女集驗無細
辛龍骨

增損建脾圓治丈夫虛勞五臟六腑傷敗受
冷初作滯下久則變五色赤黑如爛腸極臭
穢者方

鍾乳粉

赤石脂三兩

礞石一用礞石

乾薑

茯苓

桂心

石斛

五味子

澤瀉

遠志

寄生

栝子仁

人參

白頭翁

天雄

當歸

石榴皮

牡蠣

龍骨

甘草 各三兩

右二十味為末蜜丸酒服二十九日三加至四十九此二方止痢神驗

駐車圓治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日

歲十

夜無節度腹痛不可堪忍者方

黃連

六兩

乾薑

二兩

當歸

阿膠

各三兩

右四味為末以大酢八合烱膠和之併手丸如大豆許候乾大人飲服三十九小兒

百日以還三九暮年者五九餘以意加減
日三服

大桃花湯治冷白滯痢腹痛方

赤石脂

乾薑

當歸

龍骨

牡蠣

附子

白朮

甘草

芍藥

人參

一兩半

右十味以咀以水一斗二升煮朮取九升
內諸藥煮取三升分三服膿者加厚朴三
兩嘔者加橘皮三兩

又方

龍骨

兩六

厚朴

當歸

兩各三

赤石脂

兩五

右四味以水七升煮取二升半分三

服熱加白頭翁二兩半牡蠣三兩

歲十

三

桃花圓治下冷臍下攪痛方

乾薑

赤石脂 兩各十

右二味蜜丸如豌豆服十九日三服加至

二十九

倉米湯治小腹冷氣積聚結成冷痢日夜三

四十行方

倉粳米半升淨

薤白一握去青如細

羊脂一升 香豉三升以水一斗

右四味先以羊脂煎薤白令黃并米內豉汁中煎取四升旦空腹溫服一升如行十

里久更進一升得快利止若利不止更服

如前利後進粳米豉粥若復作更服一劑

永瘥

附子湯治暴下積日不住及久痢方

附子一枚 石榴皮一枚 阿膠二兩

龍骨

甘草

芍藥

乾薑

黃連

黃芩

粳米三合

各一兩

半兩

右十味以水八升煮取三升分三服

治卒下痢湯方

黃連五兩

生薑一斤

右二味以水五升煮取一升頓服未

止更合服必效

治久冷痢下純白者由積卧冷處經久病不

遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛發

可忍凡白痢屬冷赤痢屬熱方

好麴末五升微熬令香溫清醇酒令熱
和麴末一升空腹頓服之日三服若至
食時擣蒜一升令至熟下薑椒末調和
如常食之法惟須稠勿加鹽以水和麴

歲十

四

二升作餹餅極爛煮之乾漉熱內蒜薑
曰中相和一頓食之少與餘食至飢時
仍準前食麴末酒比至瘥來少食餘食
以此法治不過兩日無有不瘥

治久冷或痢不痢間但腰腹患苦冷方

上等新蜀椒三升用醋宿漬之以麴三升和椒一升緊拌煮作粥空腹頓服之加葱豉鹽任性調和不瘥更作以瘥為限不過三升椒即愈此方不但治冷大治諸虛損冷極有所益久當自知耳

馬藺子圓治積冷痢下白膿方

馬藺子

一升熟熨附子二兩

乾薑

甘草

各二兩半

神麴

麥蘖

阿膠

各五兩

黃連

三兩

蜀椒

五合

右九味為末蜜丸如梧子服二十九日二

以知為度或作散酒調服方寸匕亦佳

厚朴湯治三十年久痢不止方

厚朴

乾薑

阿膠各二兩

黃連五兩

艾葉

石榴皮各三兩

右六味以水七升煮取二升分再服

歲十

五

四續圓治三十年注痢骨立痿黃腸滑不瘥

方一名蠟煎丸

雲實五合

龍骨三兩

附子

女萎各二兩

白朮二兩半

右五味為末以蠟煎烱用丸藥如梧子大

服五丸日三不過五六服瘥

椒艾圓治三十年下痢所食之物皆不消化
或青或黃四肢沈重起即眩倒骨肉消盡兩
足逆冷腹中熱苦筋轉起止須扶陰冷無子
方

蜀椒

三百粒

烏梅

二百枚

熟艾

一升

乾薑

三兩

赤石脂

二兩

右五味椒薑艾下篩梅著一斗米下蒸令

飯熟去核內薑椒末合擣三千杵蜜和丸

如梧子服十九日三服不瘥加至二十九

加黃連一升

下痢圓治數十年痢下氣消穀令人能食夏
月長將服之不霍亂方

大麥蘖

法麴各一升

烏梅二升半

附子

乾薑

黃連

黃蘖

桂心各三兩

蜀椒半兩

吳茱萸四兩

右十味為末蜜和丸如梧子食後服十九
日三加至二十九三食三服亦可至四十

丸

麴藥圓治數十年下痢不止消穀下氣補虛

羸方

大麥蘖

好麴各一升

附子

當歸

桂心各二兩

吳茱萸四兩

蜀椒一兩

黃連

烏梅肉

乾薑各四兩

右十味為末蜜丸如梧子食後服二十九

日三

烏梅圓治久痢諸藥不瘥數十年者消穀下

氣補虛方

烏梅肉

黃連

乾薑

吳茱萸

各四兩

桂心

二兩

當歸

三兩

蜀椒

一兩半

右七味為末蜜丸如梧子食後服十九日

三

又方治冷痢久下方

烏梅

三百枚

乾薑

黃連

各十兩

當歸

蜀椒

各四兩

細辛

附子

桂心

人參

黃蘗

各六兩一方用麥蘗一

右十味為末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸
五升米下別擣如泥盤中攪令相得蜜和
擣二千杵丸如梧子食前服十九日三服
稍增至二十九

七味散治痢下久不瘥神驗方

黃連分八

歲十

龍骨

七

赤石脂

厚朴

烏梅肉

各二分

甘草

一分

阿膠分三

右治下篩漿水服二方寸七日二小兒一

錢七

方 猪肝圓治下痢腸滑飲食及服藥俱完出者

猪肝 一斤 熬乾 黃連 烏梅肉

阿膠 各二兩 胡粉 七基子

右五味為末蜜丸如梧子酒服二十九日

三亦可散服方寸匕

羊脂煎大治諸久痢不瘥方

羊脂 一基子 白蠟 兩基子

黃連 升末一

酢 七合煎取稠 蜜 七合煎取五合

烏梅肉 二兩

亂髮 灰汁洗去垢臍燒末一升

右七味合內銅器中湯上煎之攪可丸飲
服如梧子大三十九丸日三基子大小如方
寸七

又方

羊脂

阿膠

蠟各二兩

黍米二升

右四味合煮作粥一服令盡即瘥

治大下後腹中空竭胃中虛滿不下食方

芍藥

甘草

半夏

各一兩

厚朴

當歸

桂心

各三兩

生薑兩五

右七味咬咀以水八升煮取三升分三服
服三劑最佳

治下痢心胃滿不快腹中雷鳴或嘔吐方

黃連兩五

橘皮

甘草各二兩

箴十

龍骨

生薑

半夏各三兩

人參兩一

大棗十五枚

右八味咬咀以水一斗先煮一大沸乃內
藥煮取三升分四服并姓娘良

斷痢湯治心胃下伏水方

半夏升一

生薑兩五

茯苓

甘草

龍骨兩各二

附子兩一

人參

黃連兩各三

大棗枚十二

右九味咬咀以水八升煮取三升分三服

香蘇湯治下後煩氣暴上方

生蘇一把冬用
蘇子三兩

香豉兩五

右二味以水五升煮取二升頓服之

方 瀉心湯治卒大下痢熱脣乾口燥嘔逆引飲

人參

甘草

黃芩

桔萋根

橘皮各一兩

黃連二兩

半夏三兩

乾薑一兩半

右八味以水六升煮取二升分三服

期治云治老小利水穀不化腹中雷鳴心下痞滿乾嘔不安無橘皮枯萋若寒加附子一枚渴加桔萋一兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩仲景用大棗十二枚

歲十

九

治夏月暴冷忽壯熱泄痢引飲熱湯下斷變
通身浮腫成冷下結脈沈細小數方

澤瀉一兩半

吳茱萸

茯苓

白朮

當歸

桔梗

犀角

青木香

海藻

芍藥

大黃各二兩

右十一味，以水九升，煮取三升，分三服。下後消息，五六日許，可與女麴散。女麴散治痢後虛腫、水腫者，服此藥，小便利，得止腫亦消。

女麴升一

乾薑

細辛

椒目

附子

桂心各一兩

右六味，治下篩，酒服，方寸匕，不知，加至二

三七日。三產後虛滿者，大良。

治卒暴冷，下下部疼悶方。

燒輒令熱大酢沃之三重布覆坐上即
瘥

孫真人備急千金要方卷之五十



