

東醫寶鑑雜病篇卷之五下

東醫寶鑑雜病篇卷之五下
臣許浚奉教撰

咳嗽

咳嗽病因。內經曰人感於寒微則爲咳。因着爲泄爲痛而咳發爲痿厥納。

形寒飲冷則傷肺。肺傷則咳嗽。秋傷于濕冬必咳嗽者。蓋秋傷于濕積于脾也。大抵素秋之氣宜清而肅。若反動之則氣必上衝而爲咳嗽。甚則動脾濕而爲痰也。是知脾無留濕則雖傷肺氣亦不爲痰。若有痰而寒多熱少故咳嗽咳嗽非專主乎肺病。以肺主皮毛而司于外者。故風寒先能傷之也。經曰五臟六腑皆能使人咳。非獨肺也。各以其時主之而受病。非其時則

傳以與之也所病不等寒燥濕風火皆能令人咳
惟濕病痰飲入胃留之而不行上入于肺則爲嗽
假令濕在心經則謂熱痰濕在肝經則謂風痰濕
在肺經則謂氣痰濕在腎經則謂寒痰所治不同
各隨證用藥潤○咳謂無痰而有聲肺氣傷而不
清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而爲痰也咳嗽者
有痰而有聲因傷肺氣動于脾濕故咳而兼嗽也
齁○咳者聲咳之咳俗謂之嗽是也肺主氣形寒
飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽
令喉中淫淫如痒習習如梗是冷嗽甚者續續不
已連連不息坐臥不安言語
不竟動引百骸聲聞四隣矣齁

脈法

咳嗽者飲食傷肺左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當
嗽嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉寒實熱洪
滑多疾弦溫少血形盛脈細不足以息沉小伏薩

皆是死脉惟有浮大而數者生外證內脈參考
停獘。關上脉微爲咳。脉弦或緊爲寒。脉浮
爲風。脉細爲濕。脉數爲熱。脉沉爲留飲。
沉數爲實熱。洪滑爲多痰。脉浮軟者生沉小
伏匿者死癱。喘急脈沉肺脹停水氣逆填胃脈
必伏取沉而實滑身溫易愈身冷脉浮尺檣難補
翻。喘脉滑而浮者生濫而數者死大抵宜浮遲
不宜急數癱。喘鳴有息者脈實大也緩則生急
則死癱。喘脉滑而手足溫者生脈濶而手足寒
者死數者亦死爲其形損故也癱。咳逆脈浮而
緩者難治。弦急而按之不鼓者難治。脉結或
促或微皆可治。脉代者危。右關脈弦者木乘
土位難治癱。咳逆上氣脈散者死散卽數。咳逆
脈數爲火形金必死。咳唾膿血脈數虛爲肺
痿數實爲肺癰。肺痿唾血脈緊強者
死。滑者生癱。寸數虛溫肺痿之形。

咳嗽雖屬肺亦有臟腑之異

內經曰咳嗽氣上厥在督中過在手陽明肺太陰肺

○帝曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者皆肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺系上至于肺則肺寒肺寒內外合邪因而客之則爲肺咳五臟各以其時受病非其時各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺咳之狀咳而喘息有聲甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中嗁嗁如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀咳則兩脅下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾咳之狀咳則右胠下痛隱隱引肩背甚則不可以動動則咳剝腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎帝曰此病之核奈可安所受病皮自白五臟之久核乃

移于六腑則肺咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔甚則長出肝咳不已則胆受之胆咳之狀咳嘔脾汁肺咳不已則大腸受之大腸咳狀咳而遺矢心咳不已則小腸受之小腸咳狀咳而失氣腎咳不已則膀胱受之膀胱咳狀咳而遺尿久咳不已則三焦受之三焦咳狀咳而腹滿不欲食飲此皆聚于胃關于肺使人多渴咳而面浮腫氣逆也

內經

臟腑治咳藥

肺咳宜藤黃湯
勸門心咳宜桔梗湯
肝咳宜小柴胡湯
勸門脾咳宜升麻湯
腎咳宜麻黃附子細辛湯
勸門胃咳宜烏梅湯
膽大腸咳宜黃芩湯加半夏生薑
勸門二錢藥煎
大腸咳宜赤石脂禹餘糧湯
勸門小腸咳宜芍藥甘草湯
人參三焦咳宜錢氏異功散
勸門桂枝甘草湯各二錢

嗽作有四時早晚之異

凡咳嗽春是春升之氣夏是火

炎上最重秋是濕熱傷肺冬是

風寒外束

○大槩春氣上升宜潤肺益肝夏火

上炎宜清金降火秋濕熱甚宜清熱瀉

濕冬風寒

甚宜解表行痰用藥發散之後以半夏等藥逐其

痰庶不再來

○早晨咳多者胃中有食積至斯

時火氣流入于肺中瀉白散加知母或二母散

火散加知母貝母石膏降胃

丸散加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈

丸散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物湯加知母炒黃柏

散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物合

二陳湯加知母貝母炒黃柏先降其火

散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物合

散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物合

散加知母貝母炒黃柏先降其火

火一云

上半日嗽多者午也前胃中有實火石膏

丸散加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈

丸散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物合

散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物合

散加知母貝母炒黃柏先降其火

一云午後嗽多屬陰虛四物合

散加知母貝母炒黃柏先降其火

半夏加貝母瓜萎青黛梔子黃芩桑白皮○夜嗽用降陰分火研○風寒鬱熱夜嗽者三物湯加知

母黃芩

生薑鹽

桔梗湯除痰止咳嗽又治心咳半夏桔梗製陳皮去白各一兩枳實二錢右爲龜末每三錢姜五

水煎

服粥

二母散治諸般咳嗽兼治痰喘知母貝母各一兩巴豆十粒作霜右爲末每服一字與姜三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其

嗽卽定亦治嗽久不愈門

咳嗽諸證有風嗽寒嗽濕嗽熱嗽鬱嗽勞嗽食積嗽氣嗽通治咳嗽藥○咳則氣動爲聲嗽乃血化爲痰肺氣動則咳脾濕動則嗽肺脾二臟俱動則咳嗽

俱作
也門

風嗽

風乘肺則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳嗽。

傷風

咳者脈浮增寒壯熱有汗惡風口乾煩燥鼻

流清涕

欲語未竟而咳

鑿

○傷風咳嗽宜神术散

款冬花散

人參荆芥散勦覩金沸薑湯三拗湯五

拗湯加減

三拗湯

據

神术散

治傷風頭痛鼻塞聲重咳嗽蒼术二錢羌活

川芎

白芷細辛甘草各一錢右剉作一貼姜

三葱

一

煎服

得

款冬花散

治寒壅相交肺氣不利咳嗽痰盛麻黃貝

母桑白皮半夏

款冬花各五分

阿膠珠各二錢杏仁甘草炙各一錢知

母桑白皮半夏

款冬花各五分

阿膠珠各二錢杏仁甘草炙各一錢知

右剉作

一帖姜三片水煎服

得

金沸草散

治肺風寒咳嗽
芥穗二錢旋覆花前胡各一錢半麻黃赤

茯苓各一錢半

夏七分半細辛甘草各三分石

剉作一貼

入薑三棗二水煎縮滙去滓服

三拗湯

治感風寒咳嗽鼻塞聲重失音麻黃不去根

半右剉作一貼入

薑五片水煎服

五拗湯

治感風寒咳嗽聲重胸痛三拗湯加荆芥穗桔梗各一錢煎服如上法

加減三拗湯

治風喘嗽麻黃三錢杏仁桑白皮各一錢半甘草一錢蘿子前胡各六分右剉

作一貼入薑三

片水煎服

寒嗽

寒傷肺者咳自緊聲啞。脈緊增寒發熱無汗又惡寒煩躁不渴遇寒而咳。風寒者鼻塞聲

重惡寒二陳湯加麻黃杏仁桔梗鑑○一種咳嗽
每遇寒則發乃寒包熱也解散則熱自除枳梗湯
榔榔加麻黃防風杏仁陳皮紫蘇葉木通黃芩

附

肺

脾

肺

皆

受

寒

邪

則

面

白

脈

弦

微

涎

出

口

甘

水

反侮土寡子畏也腹中大寒痰白作泡口甘涎沫
者胃中寒而不和以辛甘熱去之疎○寒漱宜九

寶飲華蓋散杏子湯紫蘿飲子橘蘇飲薑桂丸人
參欵花膏半夏溫肺湯杏蘿湯白圓子人參潤肺

湯溫肺湯加味理中湯八
味欵冬花散飴薑元脯

九寶飲治諸般咳嗽皮寒嗽久嗽陳皮薄荷麻黃桂
枝桑白皮紫蘇葉杏仁大腹皮甘草各一錢

右剉作一貼入薑五

梅一箇水煎服

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣鼻塞聲重麻黃二錢
赤芍荅蘇子陳皮桑白皮杏仁一錢甘草

卷五
右剉作一貼入薑

三片桑二枚水煎服

附

門

杏子湯

治感風寒、痰盛咳嗽尤宜。冷嗽人參半夏赤芍芩白芍藥細辛乾薑桂皮杏仁五倍子各一錢甘草五分右剉作一貼入薑

五梅一水煎服加麻黃尤佳。鷄

紫蘿飲子

治肺虛寒咳嗽痰盛。紫蘿葉桑白皮青皮杏仁五味子麻黃陳皮甘草各一錢人

參半夏各六分右剉作

一貼入薑三水煎服

橘蘿散

治傷寒咳嗽身熱有汗脈浮數服杏子湯不得者宜服此橘紅紫蘿葉杏仁白朮半夏桑

白皮貝母五味子各

一錢甘草五分右剉作一貼姜三水煎服

分右剉作

一貼姜三水煎服

薑桂丸

治寒痰咳嗽桂皮二兩南星半夏並製各一兩右爲末姜汁浸蒸餅和丸菉豆大姜湯下

丸

人參欬花膏

治肺胃虛寒久嗽不已欬冬花人參五味子桑白皮紫菀各一兩右爲末蜜丸

芩實大

每一丸以淡姜湯嚼下含化亦得

湯嚼

下含化亦得

目

半夏溫肺湯

治虛寒咳嗽中脘有痰水冷氣心下注洋漕雜多唾清水脉沉弦細遲此胃虛

冷也半夏細辛桂心旋覆花陳皮人參桔梗白芍藥甘草各一錢赤茯苓六分

右剉作一貼入姜五水煎服

杏

仁紫蘿蔔桑白皮陳皮半夏貝母白朮五味子各一錢甘草五分

右剉作

一貼入

服

目

人參潤肺湯 治傷寒咳嗽人參乾薑白芷麻黃

三葱二水

煎服

溫肺湯

治肺虛客寒喘咳嘔吐痰沫乾薑桂皮半夏陳皮五味子杏仁甘草各一錢細辛阿膠珠

各五分右剉作一貼入

薑三棗二水

煎服

搗

加味理中湯

治肺胃俱寒咳嗽人參白朮乾姜甘草赤茯苓半夏陳皮細辛五味子各一錢

右剉作一貼

入薑

三棗二水

煎服

八味欬冬花散

治肺經寒熱不調涎嗽不已桑白皮紫蘿葉杏仁麻黃各一錢半欬冬花

紫蘿茸五味子甘草各一錢

右剉作一貼水

煎去滓入黃蠟皂角子大再煎熔化服之

飴薑元治冷嗽黑糖一斤乾薑細末四兩右先焙

糖次下薑未和勺待凝作片常常嚼下

熱嗽

傷于暑熱而得咳則口燥聲嘶吐沫臘○傷暑咳者脈數煩熱引飲口燥或吐涎沫聲嘶咯血醫

凡咳嗽面赤胃脅脇常熱惟尼乍有涼時其脈洪

滑者熱痰在內也宜小陷胸湯勦覈能治熱嗽曾

滿膈○熱嗽宜辰砂六一散噙洗肺散人參湯

肺湯貝母散參术調中湯芩半丸黃連化痰丸小

黃丸四

汁膏方

洗肺散

治咳嗽痰盛有熱肺氣不清利半夏三錢黃芩二錢天門冬麥門冬五味子各一錢半杏仁一錢甘草五分右剉作

一貼入薑三片水煎服

人參瀉肺湯

治熱咳卽涼膈散燒去朴硝加人參
枳殼桔梗杏仁桑白皮等分剉煎服臘

貝母散治火嗽久嗽杏仁三錢桑白皮二錢知母一錢

錢半貝母桑白皮五味子甘草各一錢右剉

作一貼入姜三

片水煎服

附

參术調中湯

除熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食桑白皮一錢黃芪八分人參白术白茯苓

甘草各六分地骨皮麥門冬陳皮各四分青皮

二分五味子二十粒右剉作一貼水煎服

嗽

芩平丸

治熱嗽生痰黃芩半夏各一兩右爲末

姜汁糊

和丸柏子大姜湯下七十九丸

小黃丸

治熱痰咳嗽肺洪而赤煩渴黃芩一兩半南

星半夏

夏華製各一兩右爲末姜汁浸蒸餅和

丸梧子大姜湯

下五七十丸

鴟

黃連化痰丸

治熱痰咳嗽苦寒連吳茱萸各一錢半陳皮五錢半夏一兩半右爲末姜汁糊和

菉豆大薑湯

吞下一百丸

四汁膏止咳嗽消痰降火雪梨汁藕汁生蘿蔔汁生薄荷汁右藥分入砂糖屑和勻慢火熬成膏

以匙抄

服門

濕嗽濕勝肺者咳則身重骨節煩疼酒淅門○濕傷咳嗽者脉細骨節煩疼四肢重着或有汗小便不利醫○濕嗽宜不換金正氣

散方
寒門
白术湯白术九

白术湯治濕嗽痰多身體重着脈濶細白术三錢半夏橘紅白茯苓五味子各一錢半甘草五分

右剉作一貼入

姜五水煎服

白术丸治濕痰咳嗽身重脉緩白术一兩半南星半夏並製各一兩右末姜汁糊和丸薑湯下五

丸暢

鬱嗽卽火咳甚者乾咳而無痰乃腎水焦枯邪火獨炎于肺宜瀉白散昉觀清化丸訶黎勒丸霞天膏助

咽○火鬱者有聲痰少面赤
者是也宜用清金降火湯

清化丸治肺鬱痰嗽睡不安貝母一兩杏仁五錢青黛三錢右爲末砂糖入薑汁糊和丸彈子大

噙化

訶

訶黎勒丸治勞嗽乾嗽及肺脹喘急訶子皮五錢梅粉爪蔓仁青黛杏仁貝母便香附各二錢

牛右爲末薑汁和蜜爲丸

櫻桃大噙化徐徐嚥下

門

清金降火湯治熱咳能瀉肺中之火火降則痰消嗽止陳皮杏仁各一錢半赤茯苓半夏桔

梗貝母前胡瓜萎仁黃芩石膏各一錢枳殼八分
甘草三分右剉作一貼入生薑三片水煎服食後
驅

勞嗽虛勞咳嗽也○勞嗽者盜汗出兼痰多作寒熱宜
補陰清金四物湯加竹瀝姜汗○陰虛火動而嗽
四物合二陳加黃柏知母○陰虛喘嗽或吐血四
物加黃柏知母五味子麥門冬桑白皮地骨皮鑄
○好色之人元氣虛弱咳嗽不愈宜瓊玉膏射規
治虛勞乾咳嗽最捷丹○勞嗽宜人參清肺湯加
味二丹丸人參芎歸湯加味人參紫菀散潤肺丸
補肺湯溫金散大寧嗽湯知母湯寧嗽膏大阿膠
元祐口洒色過度虛勞少血津液內耗心火自焚
遂復燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潤其嗽連續而
不已須用六味地黃丸羸

加橘紅貝母黃芩知母臘

人參清肺湯治久嗽勞嗽及肺痿唾血腥臭人參桑杏仁桔梗甘草各一錢右剉作一貼入大棗烏梅各一枚水煎去滓入蜜一匙攪勻澄清吸服效。

一名人參

清肺湯

加味二母元治久嗽勞嗽食積嗽知母貝母同巴豆炒黃色去巴豆同法入白礬白芨四味等分右爲末和姜汁入蜜爲丸芡實大含化嚥下或加麥門冬陳皮阿膠珠亦好

人參葛歸湯

治乾嗽因虛勞少血燥熱乘肺咯唾膿血動輒冒寒咳嗽當歸川芎白芍藥各

一錢半赤茯苓人參半夏陳皮阿膠珠細辛五味子甘草各七分右剉作一貼薑三棗二水煎服

加味人參紫菀散

治虛勞咳嗽人參五味子紫菀杏陳皮紫蘿葉貝母桑白皮白茯苓

各一錢杏仁甘草各七分生川芎半夏麴各一

錢阿膠珠五分右剉作一貼姜五棗二梅一水煎

服

潤肺丸

治燥痰乾咳勞嗽貝母一兩瓜蒌仁青黛各五錢右爲末姜汁蜜調成膏噙化

補肺湯

治勞嗽桑白皮蜜炒熟地黃各三錢人參紫苑黃芪各五味子各一錢右剉作一貼水煎入

蜜一匙

服胡

溫金散

治勞嗽防風桑白皮黃芩甘草各一兩杏仁去皮尖二十粒人參茯神各五錢麥門冬

二錢半右取前五味入米泔水浸一宿晒乾次入

大麥茯神麥門冬同爲末每取三錢入黃蠟大豆

許前

大寧嗽湯 治勞嗽 神效半夏二錢王冰川砂仁一錢
白皮紫蘿葉陳皮桔梗杏仁阿膠珠嬰粟

穀竈各一錢細辛甘草各五分右剉
作一貼入薑三棗二梅一水煎服胡

知母湯

治虛勞咳嗽唾膿血心肺有熱黃芪蜜灸一
錢半白芍藥生乾地黃黃芩麥門冬人參白

茯苓桔梗知母各一錢甘草五分右剉作一
貼入薑三片竹葉三片小麥一撮水煎服胡

寧嗽膏

治陰虛火動咳嗽咯血天門冬白朮各八兩
百部根杏仁貝母百合各四兩款冬花三兩

紫菀三兩右剉以長流水一斗煎取三升又易
新水煎取三升如此三次合取汁入飴糖八兩蜜

十六兩再煎入阿膠四兩白茯苓細末
四兩和勻成膏每服三五匙不以時

鑄

大阿膠元

治虛弱咳嗽吐唾血發熱消瘦山藥五味
子熟地黃阿膠珠白茯苓各一兩麥門冬

丹參貝母防風茯神柏子仁百部根杜仲各五錢
遠志人參各二錢半右爲末蜜和作丸彈子大每

一丸以小水略

前和滓呷服

食積

嗽

因食積生痰

咳

胸滿噫酸

二陳湯加厚朴山

查麥芽

枳

加厚朴山

查麥芽

查麥芽

枳

加厚朴山

查麥芽

枳

加厚朴山

查麥芽

枳

加厚朴山

查麥芽

云有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路一

黃一白者是也

○食積痰嗽發熱者半夏南星並

製爲君

瓜萎實蘿苗子爲臣

青黛石礬爲使

薑汁

糊丸服研

○又一方用三補丸

糊丸服研

○又一方用三補丸

糊丸服研

○又一方用三補丸

糊丸服研

○又一方用三補丸

糊丸服研

○又一方用三補丸

糊丸服研

嗽宜瓜萎壳青金丸二母寧嗽丸溫脾湯香附丸

篇

瓜萎丸

治食痰壅滯喘嗽瓜萎壳半夏麴山楂干神

下五七
十九册

青金丸 治食積火鬱嗽劫藥也貝母知母各五錢巴豆霜五分右末薑汁糊和丸青黛爲衣白湯

下五七

十九丸

二母寧嗽湯

治傷飲食胃火上炎衝逼肺氣痰嗽久不愈一服卽差石膏二錢貝母知母各

一錢半桔子黃芩各一錢二分桑白皮赤茯苓爪蔓仁陳皮各一錢枳實七分生甘草二分五味子十粒右剉作一

貼薑三煎服

繡金丸

溫脾湯

治食飽則咳甘草四兩大棗二十枚右剉水五升煮至二升分三服針

香附丸

治食積痰嗽蒼朮三兩香附子一兩半蘿蔔子炒瓜萎仁杏仁半夏各一兩黃芩赤茯苓

各五錢川芎二錢右爲末薑汁

樹和丸淡薑湯下五十九劑

氣嗽七氣積傷或咳嗽痰涎凝結或如敗絮或如梅核

滯塞咽喉咯不出嚥不下婦人多有之○氣嗽

宣蘿子降氣湯勑喉加味四七湯勑喉團參飲子

青龍散三子養親湯蘿子煎玉粉丸星香九橘薑

丸

團參飲子

治七情咳嗽勞傷肺脾多睡膿血漸成肺

痿將作勞瘵人參半夏紫菀阿膠百合

款冬花天門冬杏仁經霜桑葉各一錢細辛甘草

各五分五味子十五粒右剉作一貼薑三煎服

青龍散

治咳上氣不得臥人參陳皮紫蘿葉

五味子右剉一兩薑二水煎服

三子養親湯

治咳嗽氣急養脾進食紫蘇子蘿蔔子

煎太過
味苦

桔子煎

治老虛人上氣咳嗽紫蘿子一升另擣爲末杏仁去皮尖一枚仁一升另研爲泥生薑汁生

地黃汁白蜜各一升蘿杏二味以二汁澆之綫取

汁其滓再搗再綃令味盡出乃合蜜攬勻盛器中

重湯煮如飼每服一大匙日

或去地黃汁代竹瀝亦佳

玉粉丸

治氣痰咳嗽喘急陳皮二兩南星半夏各一兩右爲末以薑汁浸蒸餅和丸薑湯下五七

十九

芻

星香丸

治氣嗽生痰南星半夏各三兩白礔一兩研和水浸二味一宿陳皮五兩泔浸一晝夜去

自取三兩香附子三兩皂角水浸一伏時晒乾右不見火爲末姜汁糊和丸梧子大姜湯下五七十

九此乃家傳
秘方累驗

心

橘薑丸

治久患氣嗽

聖藥陳皮生薑同搗焙乾各二

兩右爲末神麴二兩作糊和丸梧子大

米飯

下三五

十九門

痰嗽

者痰出嗽止胷膈多痛蓋濕痰在胃上下午于肺則必作咳嗽門○痰嗽者嗽動便有痰聲痰出則嗽

止也

○痰鬱肺經咳則涎多二陳湯加枳殼桔梗

瓜蒌仁

黃芩貝母又用半瓜丸○寒熱交作而

痰嗽者

小柴胡湯勦門加知母白芍藥五味子桑

白皮

葛根盛有熱宜滾痰丸勦門○痰嗽宜洗

肺散橘

甘散滴油散二丹散玉芷元澄

清飲三聖丹

藍漆煎安肺散人參散

半瓜丸

治痰嗽半夏瓜蒌仁各五兩貝母桔梗各二

餅和丸梧子大薑湯下五七十九半
夏須从浸薑汁炒黃色否則辣喉齧

橘甘散

治氣嗽痰嗽甚效橘皮生薑焙乾神麴炒各等分右爲末溫水和丸梧子大米飲下五七

十九日

再驅

滴油散治痰嗽面浮如盤蚌粉新瓦上炒令通紅枚池上出火毒每半兩加青黛一錢以淡薑水

滴入麻油數點

調服即愈鑑

玉芝元

治風熱痰盛咳嗽聲重半夏麴六兩人參薄荷白茯苓白礬桔南星泔浸焙各三兩右爲

末薑

汁煮麪糊和丸梧子

大薑湯

下五七十九半

澄清飲

治痰嗽服他嗽不效者南星半夏並製蚌粉知母貝母白礬各一錢右剉作一貼姜五煎

澄清徐
服效

三聖丹

治久痰嗽極效半夏製二兩南星煨一兩甘草生半兩有以半星二味爲末姜汁拌勻合

作麴

冬十夏五春秋七日取出再爲末入甘草末

和勻竹瀝

一椀拌和作餅子焙乾又將竹瀝沃瀝

焙乾

如此十數次以竹瀝盡爲度再研爲末煉蜜

調和如餳

臨臥抄一匙于口內噙化以竹瀝漱口

嚥下

正

藍漆前元

治痰嗽藍漆二兩人參杏仁胡桃肉各一兩右爲末蜜丸彈子大每一丸薑湯或米

飲嚼

下藥

安肺散

治痰嗽不問新久鶯粟殼炒黃色四兩麻黃

甘草少許各二兩古方未每

錢烏梅一箇同

人參散

寒痰通用半夏麌二錢人參桔梗五味子細辛枳殼赤芍芩杏仁各一錢甘草五分右剉

作一貼入薑五

梅一水煎服

白圓子

治風痰咳嗽有一種咳嗽直至頓吐飲食痰物俱出盡方小定此乃肝未克脾土風痰壅盛

所至宜以白元子方作生料勵覲加木香丁

香橘紅天麻全蝎白僵蚕水煎和姜汁服

乾嗽

乾嗽者無痰有聲是也此證本于氣澀澀微者連咳嗽十數聲方有痰出溫甚者雖咳至十餘聲亦無

痰出是爲乾咳嗽也

肺乾咳嗽極難治此係火鬱之證乃痰鬱火邪

在肺中用苦桔梗以開之下用滋陰降火之劑不

已則成勞須行倒倉之法此不得志者用之四物

湯加竹瀝炒黃柏之類研。燥痰不出者用蜜水
吐之蜜煎生薑湯蜜煎陳皮湯燒生薑胡桃方皆
治無痰而嗽者以辛甘潤其肺也。楊氏治乾嗽補
肺生地黃二斤洗淨杏仁二兩生薑蜂蜜各四兩
右搗如泥盛磁器置飯上蒸五七度每于五更挑
三匙噙下。又方白蜜一斤生薑二斤取汁先
秤銅器知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微
火煮令盡惟蜜斤兩在則止每服如棗子大
含化日三針。乾嗽宜用瓊玉膏方見潤肺散

加味二母丸訶黎勒丸抑痰丸

方見潤喉門

血嗽

瘀血咳嗽者喉間有腥氣或吐唾血瘀因打撲傷
損而致。四物湯加大黃蘿木爲末酒調服或冰煎

服。生桃仁七粒以韭汁送下最佳。仍宜服人參百合湯桑皮散當歸飲婦

人參百合湯

治勞嗽吐紅白朮白芍芩百合阿膠珠

黃半夏杏仁各七分細辛紅花桂皮
甘草各二分右剗作一貼水煎服

桑皮散

治上焦有熱血壅脾悶嗽聲連併氣不得透
桑皮散甘草一錢半薄荷桔梗川芎防風桑白皮黃
芩前胡紫蘇葉柴胡赤芍芩枳殼各八分
右剗作一貼入薑三片棗二水煎服

當歸飲

因打撲損傷肺氣咳嗽吐黑血大黃蘇木生
乾地黃當歸赤芍藥各等分右爲末每三錢

溫酒調

服婦

酒性太熱因傷引飲冷與熱凝于胃中不散而成
酒嗽濕故痰作亥嗽○飲酒多咳嗽青黛瓜萎仁右
爲末薑汁煉蜜和丸櫻桃大常常含化散肺毒
○酒傷肺成痰嗽以竹瀝煎紫蘿入韭汁就吞瓜

蔓杏連丸

又

宜蜂薑丸

瓜蔓杏連丸

治酒痰嗽瓜蔓仁杏仁黃連各等分
右爲末以竹瀝薑湯煮糊和丸服

蜂薑丸

治酒痰嗽及積痰久嗽留肺脫粘滯如膠氣
不升降便香附白礆蚕炒海粉瓜蔓仁蜂

房杏仁神麴各等分

右爲末以薑汁竹瀝入蜜和丸服

九櫻桃大含化嚥下

一方無香附有茜根味

久嗽

乃積痰肺脫久留粘滯如膠氣不升降或挾溫與
酒而作劇○久嗽宜蜂薑丸加味二母丸人參清

肺湯貝母湯九仙散

人參欵芷散天鼠散清

肺湯馬兜鈴丸加味

百花膏潤肺除敷飲

貝母湯

治諸般久嗽貝母姜製乾姜生五味子陳皮
半夏製柴胡桂心各五錢黃芩桑白皮各二

錢生木香甘草各一錢二分半右籠末每五錢入

製杏仁七箇生姜七片水煎服○一婦患積年嗽

服此一帖卽

九仙散

治久嗽乃收功後兼收斂之劑也
鷺粟殼蜜炒二錢人參款冬花桑白皮桔梗阿膠珠五

味子各一錢貝母半錢右剉作

一貼入薑三梅一水煎服

人參款花散

治久嗽鷺粟殼蜜炒黃色一兩人參款

冬花各五錢知母貝母半夏製各三錢

右爲籠末每五錢

梅一箇同水煎服

天鼠散

治久咳嗽上氣十年諸藥不效蝠蝠去翅足燒令焦爲末和飲服之妙

清肺湯

治久嗽及痰嗽肺腫嗽黃芩一錢半桔梗赤芍芩桑白皮陳皮貝母各一錢當歸天門冬

梔子杏仁麥門冬各七分五味子七粒甘草三分

右剉作一貼姜三棗二水煎服

馬兜鈴丸

治久嗽神效馬兜鈴半夏杏仁各一兩另研巴豆二十一粒去皮心油另研右細末

和勻以皂角煎膏和丸梧子大雄黃爲末以烏梅根下丸以利爲度

加味百花膏

治久嗽不愈紫菀款冬花各一兩百部根各五錢右爲末每三錢姜三梅一湯

調下食

後附

潤肺除嗽飲

治遠年咳嗽如神款冬花紫菀薜麻黃陳皮石膏粉桔梗半夏桑白皮枳實烏

梅肉鴛粟殼各七分人參杏仁薄荷生甘草各五

分五味子九粒右剉作一貼姜三片細茶一撮同

煎服

傳

火嗽

火嗽有聲痰少面赤者是或煩渴引飲脈洪數脉火嗽。火嗽宜貝母散清肺散柴胡枳桔湯清金降火

湯二母寧嗽湯抑心清肺丸玄霜雪梨

清肺飲

治肺熱咳嗽前胡桔梗白芷枳殼各一兩
知母貝母薄荷赤茯苓桔梗紫蘿葉阿膠珠

杏仁天門冬甘草各七分右剉

作一貼大姜三片一水煎服

柴胡枳桔湯

治傷寒自省痛引驚咳喘痰盛麻黃杏仁枳殼桔梗柴胡黃芩半夏知母石膏

乾葛各一錢甘草五分右剉

作一貼入姜三水煎服

抑心清肺丸

治肺熱咳嗽血卽黃連阿膠元也少
啾啾盡黃連亦茯苓能抑心火肺得其清

則嗽自

止嘔

玄霜雪梨膏

治勞嗽久不愈消痰止嗽生津止咯唾
血雪梨六十箇去心皮取汁二十鍾酸

者勿用

桔汁十鍾生地黃汁十鍾麥門冬煎取汁
五鍾生蘿蔔汁五鍾茅根汁十鍾右汁重瀝去滓

火上煎煉入蜜十六兩飴糖八兩柿霜八兩姜汁
半盞火上再煎加稀糊則成膏矣每服三五匙

醫鑑

人參清鎮丸

半生黃芩半夏甘草各七錢半麥門冬

三錢陳皮五味子各二錢青黛六錢右末

水糊和丸梧子大白湯下

三十五丸

正

滋陰清化膏

止咳嗽清痰火滋化源肺腎乃人身之化源也生地黃熟地黃並酒浸天門冬

麥門冬各二兩

黃柏甘草酒炒一兩半白茯苓山藥

枸杞子白芍藥酒炒知母鹽酒炒玄參薏苡仁炒

各二兩五味子七錢甘草生五錢右爲末

蜜丸彈丸

子大每一丸空心噙化嚥下

痰嗽甚加陳皮貝

母各一

兩翻

海清丸

治火鬱敷及肺脹氣急息重訶子皮海蛤粉

瓜蒂上青黛半夏製更香附子各一兩右爲

豆大薑湯下三十五丸

夜嗽

夜間咳嗽屬陰虛宜降陰分火門。陰分較者多屬陰虛治之用知母止嗽勿用生薑以其辛散故也。胡○凡夜嗽久嗽多屬腎氣虧損火炎水涸或津液涌而爲痰須用六味地黃丸加黃柏知母天門冬貝母橘紅以滋化源滋陰降火湯火加黃柏知亦佳。

麻黃蒼朮湯

治秋冬夜嗽不絕至曉方緩口苦脣痞

五錢黃連一錢半草豆蔻六分柴胡羌活各五分防風當歸梢生甘草各四分灸甘草黃芩各三分

五味子十石粒右剉分作二貼水煎服

天行嗽

時令不正人多感冒咳嗽宜人參飲子一服散
癆○四時感冒咳嗽宜服參蘿飲方。

人參飲子

治天行咳嗽痰盛寒熱人參桔梗五味子赤茯苓半夏各一錢半枳殼甘草各七分

右剉作

一貼薑五水煎服。

○寒暑之時氣盛人衣

厚作壅

忽痰盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗

必成大病

此方佳處在赤茯苓能導

心熱枳殼能疏利壅故易爲效用

得

一服散

治時行暴嗽大半夏三箇杏仁七箇鶯粟殼二箇烏梅二箇阿膠二片生姜十片紫蘿十

葉甘草一錢右剉

作一貼水煎服

得

通治咳嗽藥

咳而無痰者以辛甘潤其肺故咳嗽治痰爲先治痰者下氣爲上是南星半夏以勝

其痰而咳嗽自愈枳殼橘紅利其氣而痰飲自下

者厚朴湯飭未疎導之夏月嗽而發熱者謂之熱

嗽小兒陽明而舌苔白者

加小兒丹四兩石膏一兩加五錢冬青散

大體也。楊。

○咳之爲病有一咳卽出痰者脾濕勝

而痰滑也有連咳十數不能出痰者肺燥勝

也。滑者宜南星半夏皂角皮之屬燥其脾濕者宜

枳殼紫蘿蔔仁之屬利其肺。

○外感久則鬱熱

內傷久則火炎俱宜開鬱潤燥。

○嗽而脅下痛

宜以青皮陳皮氣兼用白芥子之類後以二陳湯

加南星香附青皮黃芩甘草。

○嗽而火盛

湯治咳嗽去痰伐病根之藥除陰虛血虛火盛

咳嗽者勿用胡口。

○咳嗽通用清金飲五嗽丸。

○諸般咳嗽杏仁白茯苓各一錢半橘紅一

清金飲

治諸般咳嗽。

○二分五味子桔梗甘草各一錢右剉作一

貼水煎服。

○二名

杏仁五味子湯。

○明

備急五嗽丸

○一曰氣嗽二曰飲嗽三曰燥嗽四曰冷

嗽五曰邪嗽晝夜不止面目浮腫飲食

不下肉丸乾姜皂莢各等分右爲
未蜜丸梧子大溫水下十五丸

方略

喘證有八

喘急者氣因火鬱而成稠痰在肺胃也。喘○呼吸而急

促者謂之喘

喉中有聲響者謂之哮○虛者氣乏身

冷痰如冰實者氣壯

腎滿身熱使硬○喘者肺

主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝衝而

氣急喝

喝而息數張口擡肩搖身滾肚者是爲喘

也○有起居如故而息有音者乃肺之經絡逆

而不得隨經上下故也○火氣甚爲夏熱衰爲

冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息龕

又寒水爲陰主乎遲緩熱火爲陽主乎急數是以

寒則息遲氣微熱則息數氣盛而爲喘也○喘○

非風寒傷肺則發火脹肺風寒則發散痰火則疎

導但火急者亦可不糞用苦寒宜溫以利之利藥

見下臥○凡喘未發以火正氣爲主已發以散邪

喘胃虛喘陰虛喘諸病發喘嗽通治喘嗽藥喘

風寒喘

尋常感胃風寒內鬱肺脹逆而爲喘風宜金沸草散方見麻黃散人參潤肺散九寶飲方見

寒宜加味三拗湯人參定喘湯小青龍湯射門參
蘿溫肺湯五味子湯五虎湯九味理中湯止喘元
方○冷喘則通寒而發醫○肺寒肺虛必有氣之表怯冷痰如水之證醫

麻黃散

治傷風喘急痰壅涕唾稠粘麻黃二錢桂皮一錢二分款冬花荳子皮甘草各一錢杏仁六分右剉作一貼入細

茶一錢水煎服

劑

人參潤肺散

治感風寒咳嗽喘急痰壅鼻塞麻黃二錢貝母杏仁各一錢半人參甘草各一

錢桔梗阿膠各五分橘紅三分半右剉作一貼

入紫蘆葉二片同煎服

劑

人參定喘湯治肺感寒邪喘急亦治咳嗽鴛粟殼蜜

炒二錢五味子一錢牛麻黃人參半夏

阿膠珠甘草各一錢桑白皮

五分右剉作一貼姜三煎服

參蘿溫肺湯治形寒飲冷則傷肺

喝喘煩心胷滿短氣人參紫蘿葉肉桂木香五味子陳皮

半夏桑白皮白朮白茯苓各一錢甘

草五分右剉作一貼姜三水煎服

五味子湯治寒喘麻黃二錢五味子杏仁橘紅各一

錢半乾生薑杜皮甘草各一錢右剉作一

貼紫蘇三

葉煎服

加味三拗湯治寒喘麻黃二錢陳皮一錢半杏仁五

味子各一錢二分桂皮一錢甘草五分

右剉作一貼

姜二兩服得

九味理中湯

治寒喘者手足冷脈沉細也
研乾姜炮蘿子厚朴桂皮陳皮甘草灸
砂

各一錢

沉香木香各五分並水磨取汁右剉

作一貼

姜三水煎入沉香木香汁調服

五虎湯

治傷寒喘急麻黃三錢石膏五錢杏仁一錢
甘草一錢細茶一撮桑白皮一錢半右剉作

一貼入姜三片葱

白一莖水煎服

醫

止喘元

治冷喘草撥胡椒人參胡桃肉各等分右爲
末蜜和分作三十丸每一丸細嚼溫水下

痰喘

喘者凡喘便有痰聲門○肺實肺熱必有壅盛
胃滿外聞土炎之狀

醫

○痰喘宜平經湯千繙導

於湯加減三奇湯貝母散平肺散紫蘿半夏湯定

雷化痰湯潤肺膏橘子導痰降氣湯大蘿皂丸

丸○凡喘正發時無痰而將愈時却吐痰者

乃痰在正發之時閃寒不通而喘當其時開其痰者

略則易安宜桔梗瓜蒌仁枳殼杏仁蘿葉前胡等
引出其痰然後調其虛實實者用沉香滾痰丸助
酸虛者補以

參芪歸木

附

千緒湯 治痰喘數服卽安半夏七枚炮四破皂角灸

甘草灸各一寸南星炮一錢右剉作一貼姜

五水煎

附

千緒導痰湯 治痰喘不能臥 一服卽安半夏七枚炮

切作四片南星陳皮赤茯苓枳殼各一

錢皂角甘草各一寸並灸右剉

作一貼人生薑五片水煎服醫

加減三奇湯 治咳喘上氣痰涎不利半夏二錢桔梗

陳皮青皮八參桑白皮紫蘇葉杏仁五

味子各一錢甘草五分右剉

附人姜三水煎服

附

貝母散

治熱嗽及痰喘辰時服酒時可安卽上二母散也

平肺散

治喘嗽痰盛寒熱往來
半夏 鳶粟殼 薄荷 紫蘇葉 烏梅肉 柴胡 知母

桑白皮

五味子 杏仁 桔梗 各七分甘草

五分

右剉作一

貼薑

三水煎服

心

紫蘿牛夏湯

治喘嗽痰盛寒熱往來
桑白皮 二錢 杏仁 一錢 半夏 陳皮 紫蘿葉 五味子 紫

荳各一錢

右剉作一

貼薑

一水煎服

定喘化痰湯

治咳嗽痰喘陳皮二錢 半夏 南星 並製
各一錢 半杏仁 二錢 五味子 甘草 各八

分

款冬花 人參 各七分 右剉

作一

貼薑 五片 水煎服

心

潤肺膏

治同上
紫蘿杏仁 款冬花 各一兩 麻黃 桔梗
荳子 細辛 各五分 枯白礬 一錢 胡桃仁 一兩

生薑二兩取津清油八兩蜜一斤右先將油煉熟

次入蜜煉去沫却下藥末攪勻每服二三匙白湯

調下臨

臥時服

蘿子導痰降氣湯

治痰喘上氣蘿子二錢半夏當歸各一錢牛南星陳皮各一錢前胡

厚朴枳實赤茯苓各七分甘草五分

右剉作一貼入薑三棗二水煎服

大蘿皇湯

治氣喘痰喘風痰食痰酒痰癰等證蘿
蔴子炒二兩皂角燒存性一兩南星半夏

並製杏仁瓜蔞仁便香附青黛陳皮各五錢右爲
末神麴糊和丸梧子大薑湯吞下六七十九丸

祛痰丸

治風痰喘嗽人參木香天麻陳皮赤茯苓青
皮白朮各一兩皂角九錢槐角子半夏各七

錢半右爲末薑汁糊和丸梧子大

臥時服或薑湯吞下

氣喘七情所傷氣急而無聲響○驚憂氣鬱陽惕則

○驚憂氣鬱陽惕則

引息鼻張呼吸急促而無痰聲者是也○喘者上氣急促不能以息之謂也○醫氣虛氣短而喘不可用苦寒之藥火盛故也宜用人參蜜炙黃柏

麥門冬地骨皮之類

○氣實人因服黃芪過多而喘用三拗湯方見

以瀉其氣

○氣喘宜加味

四七湯

神門四磨湯清金湯蘿子降氣湯六磨湯

方氣門加味白朮散定肺湯杏仁半夏湯杏蘿飲調

降湯加味四君子湯

沉香降氣湯

方氣門

四磨湯

治七情鬱結上氣喘急人參檳榔沉香烏藥

右各等分濃磨水取七分盞煎三七沸微溫

服不拘

時陳

大磨湯

治同上又治腎中氣虧甚卽四磨湯加木香枳殼等分製法服法同上

陳

清金湯

治咳嗽喘急胸滿氣逆坐卧不安陳皮赤芍

芩杏仁

阿膠珠五味子桑白皮薏苡仁紫蘿

葉百合貝母半夏

麴款冬花各七分鴛栗殼人參

甘草各三分右剉作一貼入薑三棗二梅一箇同

煎服

瞬

加味白朮散

治氣虛喘急飲食不進又治喘嗽飲食必發者卽參苓白朮散加陳皮半

夏各一錢右作一服入薑一

片桑白皮七寸同煎服

剉

定肺湯

治上氣喘嗽紫菀葛根五味子橘皮蘋子杏仁

桑白皮半夏枳殼

甘草各一錢右剉作一貼

入薑五片紫蘿

水煎服

五葉水煎服

杏仁半夏湯

治肺氣不足喘嗽杏仁半夏桔梗陳皮

滅瀉白散湯陰降火湯火加味生脈散瀉火清
肺湯玉液散玉華散歸○華佗云盛則爲喘減則
爲枯活人書云發喘者氣有餘也凡看文字須會
得本意肺氣若盛而有餘則當清肅下行而不喘
以其火入于肺衰與不足而爲喘焉故言盛者言
肺中之火盛也有餘者言肺中之火有餘也故瀉
肺火以苦寒之劑實補肺也

雙玉散 治熱喘痰漏如泉寒水石石膏各等分

右爲細末每取三錢人參湯調下

麥門冬湯

治火喘麥門冬三錢半夏二錢人參一錢甘草五分粳米一合大棗三枚右剉作一

貼水煎服日二服○肺脹滿膨脹而咳嗽者多用
五味子而人參次之麥門冬又次之黃連少許甚
則交而手而薈者真氣大虛也若氣短加黃芪五
味子人參皆氣盛去五味子人參加黃連荊芥穗

城○一婦素有痰嗽忽一日大喘痰出如泉身汗
如油脈浮而洪似將命絕速用麥門冬四錢人參
二錢五味子一錢半煎服一貼喘定汗止三貼痰
漸少再加瓜蔓仁一錢半白朮當歸芍藥黃芩各
一錢服二十餘帖而安此麥門冬五味子人參之功也

加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嗽喘促桑白
皮一錢半地骨皮赤茯苓各一錢二分
人參八分陳皮五味子各五分青皮甘草
各三分粳米一撮右剉作一貼水煎服

加味生脈散治脉伏喘促手足厥逆用此散之五味
子三錢人參麥門冬杏仁陳皮各二錢

右剉作一貼入姜三棗二水煎服○氣虛喘甚者
單人參湯頻服之喘定者生不定者死或元氣素
虛傷寒下後氣短氣促氣喘自利

瀉火清肺湯

消火喘片夢一錢梔子枳實桑白皮陳

杏仁赤茯苓蘆子麥門冬貝母各八

分沉香五分水磨取汁朱砂五分水飛右剉

作一貼水煎入沉香朱砂末竹瀝調服

治喘嗽口乾煩渴瓜萎根知母貝母炒各一

玉液散兩人參甘草各五錢右爲末每二錢先

水煎服

蠟一錢入米飲

同調服之

傅

玉華散

治咳嗽上喘清肺氣利脅膈甜葶苈炒桑白皮炒天門冬馬兜鈴半夏紫菀杏仁貝母百

合人參各一錢百部根甘草各五分

右剉作一貼入薑四棗二水煎服

研

水喘

水氣者漉漉有聲怔忡喘息宜葶苈散附○病人飲水多必暴喘漏○支飲喘不得息葶苈大棗湯

肺湯甚效

附○水腫腹脹而喘者葢喘必生脹脹

必生喘二證相因皆小便不利肺主氣先喘而後

利

脹者宜清金降火而行水次之肺主濕先脹而後喘者宜燥濕行水而清金次之肺○支飲喘不得臥加短氣倚息其脉平小青龍湯勦肺主之肺○大不得臥臥則喘者是水氣之客也水者循津液而流也腎者水臟主津液主臥與喘也宜神秘湯瞞○濕熱作喘宜平氣散加減瀉白散醫○水喘停飲胃膈滿悶脚先腫也宜平肺湯杏蘿飲治

葶苈子炒黃爲末

葶苈子炒黃爲末

治水喘或面浮葶苈子炒黃爲末

大棗十枚濃煎去棗調二錢服

葶苈大棗瀉肺湯治肺壅喘不得臥又治支飲喘急葶苈子炒黃色爲末蜜和大如彈丸

以大棗二十枚水三升煎取二升去棗入一丸

更煎取一升頓服之○孫兆治一人吐痰項間已

及一升喘咳不已服此一貼已

見四中快利客無痰垂矣綱

神秘湯

治上氣喘急不得臥臥則喘者水氣逆行上乘于肺肺得水而浮使氣不得流通其脉沉

大宜服此

紫蘿葉橘紅桑白皮各二錢人參赤芍

芩半夏各一錢木香五分右剉作一貼入生薑五

片水煎服

日二服

平氣散

治濕熱喘急白牽牛頭末二兩半生半炒大黃七錢陳皮去白五錢青皮檳榔各三錢右

細末每三錢薑湯調下。一婦人本肥盛霖雨時

因飲酒及溼乳得腹脹喘滿殼聞舍外不得安臥

大小便澀滯氣口脈大兩倍然人迎沉緩有力此

因濕熱大盛而爲虛邪氣盛則實實者宜下之用

此藥一服減半再服喘止但有胃滿口

乾時時咳嗽再與加減瀉白散全愈

加減瀉白散

桑白皮地骨皮知母桔梗陳皮青皮各一錢片芩甘草各五分右剉作一貼水

煎服

平肺湯

肺與腎皆以至陰積水喘急咳嗽益水乘之
也。葶苈子炒二錢桑白皮桔梗枳殼半夏炒
紫菀葉各一錢麻黃七分半甘草

五分右剉作一貼姜五水煎服

隨

久喘

久病氣短不能接續似喘者單人參湯或煎調中

益氣湯

防風

服之

諸喘久咸宜小蘿皂丸或人

參清肺飲

坊見信入粟殼溫之帖

○久喘未發時

服人參半夏丸已發時用沉香滾痰丸

防風

研末

○久喘未發時用沉香滾痰丸

防風

研末

○久喘未發時用沉香滾痰丸

喘湯

當前散

金不換散人參潤肺丸

隨

○久喘宜用人參紫菀湯定

隨

○久喘宜用人參紫菀湯定

單人參湯

治氣虛喘急人參一兩剉水煎頻服之

帖

一人傷寒咳嗽喉中聲如齁與獨參湯

隨

一人傷寒咳嗽喉中聲如齁與獨參湯

隨

一服齁聲除服

小蘿皂丸治久喘最妙蘿苗子蒸二兩皂角殼五錢

右爲末薑汁入蜜和勻搗

作丸櫻桃大含化嚥下

日

人參半夏丸

化痰墜涎止嗽定喘治風痰茶痰食痰一切痰病海蛤粉三兩半夏乾薑白薑

寒水石各一兩人參赤芍芥薄荷南星炮各五錢藿香二錢半右爲末水糊和丸梧子大姜湯下三

十九日

三疊

人參紫菀湯

治咳嗽喘急久不愈鶯粟殼薑製二錢縮砂一錢半杏仁欬冬花各一錢五珠

子桂枝各五分人參紫菀甘草各四分

右剉作一貼入姜五梅一箇水煎服

定喘湯

治肺虛久喘歌曰和劑須捉定喘湯阿膠半夏及麻黃人參四兩同甘草四兩桑皮五味

強鷺粟二錢須蜜灸三錢煎服用生薑多年氣喘
從今愈始信良醫有妙方鑑。此方與人參定喘
湯同但兩錢

之數異宜考

蠟煎散

治虛勞久喘嗽或咯血腥杏仁人參麥門冬山藥白芍芩貝母百合鹿角膠

膠阿膠甘草

灸各等分右爲龍末每三錢入

黃蠟皂角子大同水煎溫服

金不換散

治喘嗽久不已鷺粟殼蜜炒五錢枳殼四錢杏仁甘草各三錢右剉作二貼入薑三

梅一煎

服婢

人參潤肺丸

治肺虛咳嗽日久成勞知母三錢桔梗桂皮各二兩半人參款冬花杏仁細辛

甘草各二兩右爲末蜜丸芡實

胃虛喘

胃虛極則氣上逆○虛肩○喘而不休生脉散加杏仁陳皮白朮服之○胃喘則身熱而頻經

云胃爲氣逆

又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之

則人六腑

人六腑則身熱不時臥上爲喘呼又云

陽明厥明

喘而惋惋則惡人或喘而死者或喘而

生者何也厥逆

連臟則死連經則生此胃喘宜加

減白虎湯

之類

陰虛喘

血虛則陽無所依附而上奔宜四物湯倍芍藥加八參五味子以收之○

直衝清道

而上宜降氣滋陰○

陰虛者氣從臍下

火補真陰

益精血四物湯合二陳湯加枳殼黃芩

知母黃柏

芩○陰虛火動痰喘不絕聲者急則治

其標宜玄霜雪梨膏緩則治其本宜滋陰清化膏

去痰○凡喘不得臥其脈浮按之虛而濶者爲陰虛

去死不遠慎勿下之必死宜四物湯加竹瀝童便

青黛麥門冬五味子枳殼紫蘿葉
○陰虛喘

宜寧肺湯潤肺豁痰寧嗽湯人參五味子散

方

寧肺湯治肺虛咳嗽喘急發熱自汗阿膠一錢半川

芍當歸白芍藥熟地黃白术五味子麥門冬

人參桑白皮白茯苓甘草各七

分右剉作一貼入薑五煎服

橘

潤肺豁痰寧嗽湯

治陰虛喘急及痰嗽陳皮半夏熟地黃黃柏知母二味並酒炒各八

分白茯苓七分黃芩酒洗貝母天門冬麥門冬紫
苑酒洗款冬花酒洗桔梗當歸甘草各六分右剉

作一貼人薑

三水煎服

橘

人參五味子散

治氣血勞傷虛損喘嗽腥血寒熱盜

地黃當歸甘草各七分地骨皮前胡桑白皮枳殼

橘

五分桔梗

一貼入薑三片冰

煎服日
三胡

諸傷勞喘嗽

凡人夜行則喘出于腎溼氣病肺有所墮恐喘出于肝溼氣害脾有所驚恐喘出于

肺溼氣傷心脾水跌撲

喘出于腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者着而爲病也

內○吃酸成嗽

宜甘膽丸食熱致嗽宜

葶藶散紫荳甘湯渡水跌

仆致嗽宜杏參散打撲致嗽宜當歸飲坊

見

甘膽丸

治吃酸捨喉因成喘嗽不止諸藥無效甘草

二兩去皮作二寸段中半劈開用猪膽赤汁

五枚浸三日取出炙乾爲細末煉蜜和丸茶大

每服四五十丸茶清吞下臥服神效曾有人患此

病諸藥不效用

此一服愈

葶藶散

治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及治肺

癰甜葶藶子炒瓜蔓仁薏苡仁桑白皮五味

葛根桔梗各一錢甘草五分
右剉作一貼姜三水煎服

紫菀茸散

治過食煎燙邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多喘急
肠痛紫菀茸經霜桑葉款冬花百合杏

仁阿膠珠貝母蒲黃炒半夏各一錢

犀角入參甘草各五分右剉作一貼姜五水煎服

杏參散

治墜墮驚恐渡水跌作喘急不安杏仁人參
大腹皮陳皮檳榔白朮訶子半夏桂心紫菀

桑白皮紫蘆葉甘草各七分

右剉作一貼姜三水煎服

附：一貼姜三水煎服

喘嗽通治藥

宜杏參散含膏丸定喘化痰散杏膠飲雞鳴丸二方

杏參散

通治咳嗽喘急杏仁人參桑白皮桃仁各一錢半右剉作一貼姜三棗三煎服

金匱丸

主治喘嗽葶苈子一兩隔紙熬令黑知母貝母各一錢右同爲末以棗肉半兩別消砂糖

一兩半和勻爲丸如彈子大新綿裏
九合之徐徐嚥津甚

不遇三丸效
肺化涎猪蹄甲四十九箇

定喘化痰散

治喘至妙

用入半夏白朮各一字入

罐內封閉勿令烟

飲調下一錢

藥通赤放冷細

杏膠飲

治十六般寒

杏仁朋膠各一兩馬兜鈴半

蓋薑三片煎至七分臨臥服

心嗽加薑湯○肝

嗽加烏梅一箇大米十四粒○脾嗽人薑三片棗

仁芩茶清調下

二枝○胃嗽入蛤粉煎○膽嗽加茯苓

○肺嗽入桑白皮煎○膈嗽薑汁調嚥下○勞嗽

人秦艽煎○冷嗽入葱白三寸煎○血嗽入當歸

棗子煎○暴嗽入烏梅生薑煎○產嗽入甘草三

寸黃蠟少許煎○氣嗽入青皮煎○熟嗽蜜一匙

嗽自煎○哮嗽入半夏三枚煎○腎嗽入黃芪白

金匱要略

卽效丸

飴糖煎服

雞鳴丸

治十八般咳嗽哮喘吐血諸證如神知母炒
四兩旋覆花陳皮馬兜鈴麻黃甘草炙各一

兩桔梗人參各五錢阿膠珠欵冬花五味子各四
錢杏仁葶苈子炒半夏製各三錢右爲末蜜丸彈

子大每丸烏梅棗煎湯嚼下日三。十八般
者肝咳心咳脾咳肺咳腎咳胃咳小腸咳大腸咳
膽咳膀胱咳三焦咳內因咳外因咳不
内外因咳氣咳寒咳熱咳暴咳也

雞鳴丸

通治喘嗽知母酒炒貝母炒陳皮去白桑白
皮蜜炒欵冬花旋覆花天門冬麥門冬人參

葶苈子炒桔梗杏仁麸炒半夏薑製阿膠珠甘草
各等分右爲末蜜丸彈子大以烏梅湯或薑湯化

喘嗽宜辨寒熱。因風者，則嗽甚，實者，則有聲。
的但問遇夜飲酒，夜間如何？若喫酒後，嗽甚，則有
熱也。喫酒後，嗽減，則有寒也。涎清白者，有寒也；黃
濁者，有熱也。渴也。

喘嗽宜分虛實

治法最要分肺虛實。若肺虛久嗽，宜五味子、欵冬、花紫菀、花馬兜鈴類補之。

肺實有火邪，或新嗽，宜黃芩、天花粉、桑白皮、草薢、子之類瀉之。久病氣虛而喘，宜阿膠、人參、五味子、新病氣實而喘，宜桑白皮、苦葶苈。肺之生病，嗽喘大抵秋冬則實，春夏則虛。若實則面赤，飲水身熱，痰盛涕唾稠粘，或咽乾面腫，若虛則面白，脫色，氣少不語。喉中有声，痰唾清利。肺感微寒，八九月間，肺氣大旺，病嗽者，病必實，非久病也。宜瀉之。

錢

喘嗽聲嘶喘嗽声嘶乃血虛受熱青黛蛤粉爲末蜜丸

常常噙化。宜用芩連四物湯噙鑑音噙

喘嗽上氣出腎虛

夫腎虛爲病不能納諸氣以歸元神故氣逆而上咳嗽痰盛或喘或脹滿

體虛多睡足冷骨瘦

百骸俱爲之牽掣其嗽

愈重其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也。

抑猶有說焉肺出氣也腎納氣也肺爲氣之主腎爲氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下

逆奔而上此腎虛不能收氣也當以補骨脂安腎

元効驗主之毋徒從事於寧肺攝。下元虛冷腎

氣不得歸元上喘氣急宜寧腎元八味丸

克効門人參湯吞下空心服。咳嗽煩冤者腎氣之逆也

續

喘敷荆藥諸喘不止椒目極細末每二錢薑湯調服

上之上後因痰苔黃因火台火虛陽者勿用

右爲末薑汁加蜜丸服研。治嗽却藥五味子五

錢甘草二錢半五棓子芒硝各一錢用蜜丸噙化

研各一錢用蜜丸噙化

喘嗽熏藥

久喘嗽非此不除南星欬冬花鷺管石礞

礞

佛耳草雄黃等分爲末拌艾以生姜一片

留舌上次用艾燒之須令烟入喉中一方無佛耳

草有鬱金砂。久咳夜咳冬咳風入肺竅者宜熏

之。久嗽風入肺鷺管石雄黃鬱金各一錢欬

冬花三錢爲末每取二錢拌艾捲作筒子燒烟吸

入口中溫茶常呷下。欬冬花如雞子大蜜拌

潤之用有背丸餅中燒藥却以餅膏當口吸烟嚥

之甚效。欬冬花則用

紫菀茸如上法熏之亦佳。研

哮證

哮以聲響言喘以氣息言。哮卽痰喘甚而常發

者。哮吼者肺竅中有痰氣也。翻。治哮專主

乎痰宜吐法吐藥中多用醋不可用涼藥必帶表
散此寒包熱也必須薄滋味研。哮喘遇冷則發
者有二證一者中內皆寒宜東垣參蘿潤肺湯
坊見二者屬寒宜越婢加半夏湯等發表之
劑坊見或預於未寒之時用承氣湯勦覬
下其熱至冬寒時勦熱可包自不發作。一少
年病哮十月則發一遍正當九月十月之交此疾
不得汗泄宜溫散麻黃黃芩每貼用一錢半爲細
末入薑汁水煎臨臥時服之與小胃丹方略十二
丸津嚥下。喘促喉中如水雞響者謂之哮氣
促而連續不能以息者謂之喘離。哮病氣實者
用紫金丹二十丸去其痰虛者止服二三丸則
不吐臨發時用此剗之丹溪方去豆豉更妙。水
嗽首因幼時水蓄於肺爲痰宜金沸草散坊見小
青龍湯射門或葶苈散。風痰嗽吼千緝導痰湯
坊見。欬斯根者宜服定喘湯黃芩劑隔此坊觀

○過厚味發者潤金丸○久不得睡者撲鈴丸
○哮喘宜用奪命丹立定散解表二陳湯五虎二

陳湯三
白丸諸

紫金丹

治哮喘不得卧須三年後者可服信砒末一錢淡豆豉搗爛一兩精猪肉細切四兩三味

拌和分作三分用紙筋泥包裹烘合泥乾却用炭火煅青烟出盡爲度放地上一宿出火毒取爲末

湯浸蒸餅和丸茶豆大食後冷茶清下大人

二十九小兒七丸忌一應鹹物湯水之類勿

紫金丹

凡遇天氣欲作雨便發齁喘甚至坐卧不得飲食不進此乃肺竅巾積有冷痰乘天陰寒

氣從背口鼻而入則肺脹作聲此病有苦至終身者亦有子母相傳者每發卽服不過七八次覺痰

腥臭吐出白色是絕其根本也白砒一錢生用研白礬三錢另研淡豆豉一兩水潤去皮蒸研如泥

右末合利撲作如茶豆大冷茶送下七丸甚者八九丸以不喘爲愈不必多服久服之奏效必矣

翻

定喘湯歌

曰諸病原來有藥方惟愁齁喘最難當麻黃桑杏尋蘿子白果欬花更又良甘草黃芩

同半夏水煎百沸

不須薑病人遇此仙丹藥服後

方知定喘湯

○治哮喘神方麻黃三錢杏仁一錢

半片芩半夏桑白皮蘿子

欬冬花甘草各一錢白

果

銀二十一箇去殼碎炒黃色右剉作一貼水

煎服不

拘時翻

清金丸

治哮喘遇厚味發者蘿蔔子洗淘蒸熟晒乾爲末一兩皂角燒存性爲末二錢右末薑汁

浸蒸餅和丸如蘿蔔子大每取三四

丸炎膏吞下丸。一名青金丹

兜鈴丸

治肺喘不得臥馬兜鈴杏仁蟬退各一兩信硯煅

三錢右爲末棗肉和九葵子大臨

臥以冷葱茶清

送下六七丸

門

奪命丹

治齁喘

嗽上氣信砒一錢白礬一錢白附

白礬於石器內

火燶紅出火黃色爲度切不可犯

鐵器鄰入餘藥

末和勻薑汁麪糊和丸如黍米大

朱砂爲衣每服

七丸小兒三丸井水吞下忌食熱

毒物○此方治

痰喘割劑也病安之後卽用知母

茯苓湯人參五

味散寧

肺湯以補虛可

也

立定散

治哮吼秘方

大皂角一箇劈開去子入巴豆

肉鑊線挑紫絛焦黃色末

每錢用半夏杏

仁各一錢香油

煮黃俱爲細末每柿餅

一枚入一錢細

嚼服之溫水送下

躉

解表二陳湯

治哮喘二陳湯
陳皮一貼加紫蘿葉麻黃杏仁桑白皮紫菀貝母桔梗各五分

右薑三水

煎服

鹽

五虎

陳湯

治哮喘喉急痰盛石膏二錢麻黃杏仁陳皮半夏赤芍芩各一錢人參八分甘草五分木香沉香各五分水磨取汁右對作一貼

入薑三葱二蜜

少許水煎後入二香汁調和服鹽

三白九

治吼氣大白半夏一兩生

用白砒白礬雄黃巴豆霜各三錢右將白礬熔化入砒末於礬

內焙乾取出搗爛再炒成砂同前藥爲末薑汁

糊和丸粟米大桑白皮湯吞下十九粒○一各雄黃丸

茄

肺脹證

咳而上氣煩燥者爲肺脹欲作風水發汗卽愈

大者越婢加半夏湯主之○肺脹咳而上氣燥
而喘脉浮者心下有水氣小青龍湯剗服加石膏
主之○肺脹主收斂用荳子青黛杏仁佐以海
粉便香附爪藪仁半夏麴姜汁與蜜調和作丸噙

化○肺脹而嗽或左或右不得眠此痰掩瘀血得
氣而病宜養血以流動乎氣降火疏肝以清痰四
物湯加桃仁詞子青皮竹瀝之類明

○肺脹痰嗽睡不安宜清化丸

附

越婢湯石膏四錢麻黃二錢甘草一錢右剉作一貼
人生薑五片大棗二枚加半夏二錢右剉水

煎服

之

匱

肺痆證

熱

在上焦者因咳爲肺痆之病從何得之肺痆

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數
或從便難又被快藥下利重亡津液故得之○肺
痆吐涎沫而咳者宜用生薑甘草湯○肺痆吐涎
沫而咳者宜用生薑甘草湯○肺痆吐涎沫而咳

而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然者以
上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多吐涎甘
草乾薑湯以溫之肺寒而脾虛則生痰水○肺痿咳唾嚥燥欲飲水者
自愈自張口者氣短也肺寒而脾虛則生痰水○寸口脈數其人咳口
中反有濁唾沫者此爲肺痿之病若口中辟辟
燥咳晝中隱隱痛脈反潤數此爲肺癰肺寒而脾虛則生痰水○肺痿
之證寒熱往來自汗咳甜口小涎多知毋誤荅湯
主之火盛者人參平肺散主之或爲丸含化喘急
面浮者薄棗散見大棗養肺養氣養血清金降火散○肺痿將變爲癰宜柴芩散門○咳嗽有濁
唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血名曰熱痿熱在
上焦故也宜門冬清肺飲人參養肺湯割勞散噙
化仙

方

生薑甘草湯

治肺痿咳吐涎沫生薑五錢人參二錢

煎服由
二驗

甘草乾薑湯

治肺痿吐涎沫而不咳甘草炙四錢
乾薑炮二錢右剉作一貼水煎服

知母茯苓湯

治肺痿喘嗽寒熱往來自汗知母赤茯
苓黃芩各一錢人參半夏製各七分五

味子桔梗桂枝麥門冬柴胡各五分白朮甘草
各六分川芎阿膠珠各四分薄荷三分右剉作一

貼水煎

服以

人參平肺散

治心火刑肺傳爲肺痿咳嗽喘逼痰涎
壅盛寒熱盜汗桑白皮二錢知母人參

地骨皮甘草炙各一錢天門冬赤芍各八分陳
皮青皮各五分五味子二十粒右剉作一貼薑三

水煎

服以

紫菀散治肺痿咳唾膿如欲變成癰紫菀知母貝母

各一錢半人參桔梗赤茯苓各一錢阿膠珠

甘草各五分五味子三十粒

右剉作

一貼薑三水煎服

附

門冬清肺飲

治肺胃虛弱氣促氣喘或吐唾血將成
肺痿證紫菀茸二錢黃芪白芍藥甘草

各一錢半人參麥門冬各一錢當歸六分

五味子十五粒右剉作一貼水煎服

附

人參養肺湯

治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲嘶者
柴胡二錢桑白皮一錢赤茯苓五味子

貝母杏仁枳實桔梗各七分人參阿膠珠甘

草各五分右剉作一貼薑三水煎服

附

剝勞散治心腎俱虛勞嗽

二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠飲食減少體劣

黃瘦此藥能治微嗽唾中有紅線名曰肺

附

本草綱目之卷之二十一

見虛勞

嚙化仙方

治痰盛咳嗽時癟血名曰肺癆甜梨汁生

蘿蔔汁生薑汁白砂糖款冬花桔梗紫菀

各二兩五味子一兩右共熬去滓成膏入人

參末二兩和丸彈子大臨臥噙化一丸

春

咳逆證

一曰吃逆乃氣病也氣自腑下直衝上出於口而作聲之謂也內經曰諸逆衝上皆屬於

火古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰爲降火孰爲補虛人

之陰氣依胃爲養胃土損傷則木來侮之矣陰爲火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而

上言胃弱者陰弱也虛之甚也○孫真人云咳

逆逼氣方論無此名稱若嚙逆者嚙逆之名古人以咳逆爲咳耳大抵咳逆者卽內經所謂病甚者其聲噏是攬瘧者今一類謂乾嘔是也○咳逆

者氣逆上衝而作聲也俗謂之催逆是也其發也或三五聲而且或七八聲而止或有連續不絕收

氣不回者或有病久脾胃衰敗而發咳逆額上出汗連聲不經者最爲惡候乃不治之證也醫鑑

咳逆與噦爲一

或病成無已許學士謂之吃逆是也或

爲咳逆何也答曰靈樞經云數以草刺鼻令嚏嚏而已無息而喉逆引之立已大驚之亦可已詳此

三法正是治吃逆之法今人用紙撲刺鼻令嚏嚏則吃逆過止或閉口鼻氣使之無鼻亦立已或作完盜賊六驚駭之亦已此以噦爲咳逆爲得經旨也謂之噦者吃聲之重也謂之吃者噦聲之輕也皆因聲病之輕重而名之也綱

○咳逆古人謂之噦是也聯

咳逆治法

咳逆當分有餘不足者若內傷及大病後發其證胃弱面青肢冷便軟○有餘者因

外感胃燥及大怒大飽而發其證面紅體熱便明

或至八九聲相連收氣不回。至於驚人者若傷寒

及久病得此甚惡呕。咳逆陰證胃寒脈細或吐

下虛極宜橘皮乾薑湯橘皮半夏生薑湯下香柿

蒂散羌活附子湯或三香散。咳逆陽證發熱口

苦督蒲脈數宜小柴胡湯寒加橘皮竹茹或橘

皮竹茹湯半夏生姜湯。傷寒熱病陽明內實

失下而致嘔者宜調胃承氣湯大柴胡湯。咳逆

者火熱奔急上行而肺陰不納何其當哉故便秘

者大承氣湯下之便軟者瀉心湯主之勦覲

老易。又有雜病咳逆五條詳見于下

痢後咳逆

痢後咳逆以人參白朮煎湯調益元散助

作者宜補中益氣湯勦覲加竹茹生薑炮附子一

片煎服。氣從腑下逆上夜分轉甚者四物湯加

黃柏知母陳皮竹茹生薑附子。凡咳逆多發於痢

後由中氣虛甚也補中益氣湯調中益氣湯勦覲

多用甚

佳臥

食塞咳逆

飲食填塞胃中或食物太甚噎而不下發爲咳逆宜二陳湯加枳殼縮砂紫蘿葉或

三香散臘

○帝曰人之嘑者何氣使然岐伯曰穀入于胃胃氣上薰于肺今有故寒氣與新穀氣俱

還入于胃新故相亂真邪相攻并氣相逆復出

于胃故爲嘑

○恒服藥且取嚏以通之臘

痰閉咳逆

痰閉於上火動於下無別證忽然發嘑從曾中起者宜用二陳湯加芩連桔梗梔子

薑汁炒煎服或人參蘆煎湯服而吐之則愈蓋參

蘆瀉肺肺衰氣降而火土復位矣臘○痰挾氣虛

發嘑宜六君子

湯方

現臘門

水結咳逆

胃中虛冷不能食者飲水則嘑。或飲水過量水結胃而發嘑宜小陷胸湯或

小青龍湯去麻黃加炮附子煎服
飲水過多而吃逆者別無惡候五芩散主之斯覲

過笑咳逆

美嘯食嘯皆屬有餘之證以紙
燃探鼻取嘯或久閉氣可止

喘逆易治難治證

嘯氣頻密相連者爲實可治若半時
一聲者爲虛難治多死死在朝夕

○嘯逆至七八聲相連

敗氣不回者難治

橘皮乾薑湯

治胃寒咳逆橘皮二錢人參一錢半通
草乾薑桂心甘草炙各一錢右剉作一

貼水煎

服大

橘皮半夏生薑湯

治同上陳皮半夏各二錢乾生薑
人參通草各一錢右剉作一貼水

之癟
煎服

丁香柿蒂散

治大病後胃中虛寒，咳逆。丁香柿蒂人參白茯苓橘皮良薑半夏製各五錢，甘草二錢半，生姜七錢半，右爲末，每三錢水煎須乘

熱頓服，或調蘿合香元服之，尤妙。

一方七味各一錢，甘草半錢，剉煎服亦

可。一名溫中散，醫

羌活附子湯

治同上。羌活附子炮茴香炒乾姜炮木香丁香各一錢，右剉作一貼，入鹽一撮

同前

服醫

三香散

治胃冷咳逆沉香、白荳蔻、紫蘇葉各等分，右爲末，每一錢以柿蒂煎湯調下。

橘皮竹茹湯

治胃虛膈熱而咳逆，橘皮三錢，人參二錢，竹茹一錢，甘草一錢，右四味同煎。

入薑五兩陳二水煎服加白朮枳殼尤妙○一名陳皮竹茹湯

門

半夏生薑湯治噦欲死半夏製五錢生薑切一兩右剉入青竹茹雞子大水煎服

一名

湯
鮮陳

取嚏法

一人患傷寒將愈忽患咳逆百藥無效遂用皂角末吹鼻得嚏而止少時又吃又吹又止凡百

餘次自是漸疎二三日而止此

合靈樞草刺鼻嚏之法

同綱

擤法

宜用擤法灸法治之

硫黃擤法

硫黃乳香各二錢以酒煎之急令患者常嗅之

雄黃擤法

雄黃一錢酒一盞煎至七分急令患者嗅其熱氣即止

一方

治咳逆久不止將乳香帶捲竹筒燒烟熏鼻中吸之

禁忌法

凡火嗽忌用人參陳皮半夏等燥藥吼○凡氣

嗽忌用鷺粟殼肉豆蔻等溫藥吼○

凡咳嗽口

乾咽燥

有痰者不可用南星半夏宜用瓜萎仁貝母若飲水者又不宜瓜萎恐沉膈不鬆快耳

嗽喘咳逆不治證

咳而羸瘦脈堅大者死○咳而脫形發熱脈小堅急者死

臘○凡咳嗽至

肺脹有咽瘡失音者必死

門○脈數有熱喘咳吐血上氣不得卧者死○上氣面浮腫有息脈浮大

不治又加腫尤甚

○咳嗽肺脹鬱遏不得眠者難治

臘○凡喘煩躁無脉身冷神昏者死

臘○髮

汗如油

汗出如珠不流擗肩擗肚喘而不休○胃

前高起手足厥冷

脈散及數者皆死

門○汗出髮

潤喘者爲肺絕

○身汗如油喘者爲命絕○直視

諸有驚病

汗氣欬絕之時那

氣盛行多逆而角然則喘之危惡又安可以
等常目之。搥○从嗽不止或勞或聲啞或喉生瘡
者不治。詎○凡咳逆小便閉澀或腹滿者不治脉
見沉細散者死。神○瀉利後咳逆及傷寒結脅發
黃而咳逆俱難治。參○傷寒及从病得咳逆俱爲
惡候服藥不效則宜灸之必差矣。灸而不差則不
救矣。

生

單方

凡二十二種有人參

參胡桃湯參桃湯

人參

主肺虛氣短氣促咳嗽喘急。人參膏勑咽獨參
湯勑咽皆有奇效。胡○治氣虛喘人參一寸胡

桃二箇去核不去皮右剉入薑五水煎服。名人參
胡桃湯一名參桃湯。蓋人參定喘帶皮胡桃斂肺

也。搥○肺虛合用人參如初感風寒邪盛又久嗽
欬熱不可用反增喘澀嗽劇宜以沙參或立參代

翊之

五味子

主咳嗽上氣身熱○五味收肺氣乃火熱尤
用之藥也○人參五味子麥門冬治肺虛自

汗或少氣而喘

蓋聖藥也細

○久嗽必用五味子

東垣之法

然驟用之恐閉住其邪必先發散之或

兼用可

也翊

生薑

主咳嗽上氣○生與乾並治嗽本○治嗽多用
生薑以其辛能發散也驅○咳嗽喘急生薑一

升半砂糖

五兩同煎減半常服之針○久患咳

逆生薑汁半合蜜一匙煎令溫熱分三服本

瓜萎

治痰嗽利胸膈或實服大者剖開取子淨洗

切焙爲末用洗瓜萎水并子瓢同煎成膏研細爲

切焙爲末用洗瓜萎水并子瓢同煎成膏研細爲

潤肺降氣宜爲
治嗽要藥也

半夏 治痰嗽上氣及形寒飲冷傷肺而咳

半夏製生薑切各半面煎服卽安

期

苧麻子

主肺氣壅上氣喘促或面浮取子炒黃色爲末二錢棗湯調下

得

苧麻根

治哮喘取根和砂糖爛煮時細嚼燕下承綰病根神效

馬兜鈴

王咳嗽喘促氣急坐息不得兜鈴二兩去殼只取裡面子童便拌炒甘草炙一兩右爲末

每錢水煎溫呷或含末嚥汁亦得
幹○馬兜鈴去肺熱補肺也

桑白皮

治肺氣喘滿咳嗽或吐血桑皮四兩泔浸三宿剉細糯米一兩焙乾右同爲末米飲調下

一二錢幹○桑白皮瀉肺氣然性不純良用之多者當戒蓋以出上者有毒故也

期也

皂莢 治咳嗽上氣唾濁坐不得臥酥炙爲末
蜜丸梧子大棗湯吞下三丸日三服

鯉魚肉 主咳嗽燒爲灰糯米飲調下一二錢
或取肉作膾以姜醋食之亦佳

橘皮 治咳嗽上氣橘紅四兩甘草炙一兩爲末每二
錢白湯點服日二○又治吃逆橘皮一兩濃煎

乘熱頓

服

胡桃 治痰喘能斂肺取胡桃三箇去殼不去皮
與生姜三片臨臥細嚼以溫湯呷下得

杏仁 主咳嗽上氣喘促及哮嗽杏仁一兩去皮尖童
便浸半月每日一搜尿取出研取每服一棗子

大薄荷葉蜜水 少許煎服二劑永差同○又治老
人多喘嗽杏仁胡桃仁等分蜜丸彈子大薑湯嚼
下同○杏仁散肺氣風熱然性實有熱因于寒者

爲宜同○童更兼杏仁取其利肺氣潤利也同

梨

主熱嗽○卒嗽嗽梨一顆，刺作五孔，細孔，搗

一粒，麪裹煨熟，停冷去核食之。○喉瘡，去核，食之，可

取雪梨去心納蜜。

蒸熟停冷食之。附

紫蘿子

治肺氣喘急咳嗽。蘿子水擣取汁，和

鷄粟殼

○鷄粟殼，米煮粥食之，和杏仁汁尤佳。韓

一錢蜜湯

調下。

也

雞子

○治喉喘，取十箇，置敲損殼，不得損膜，浸尿缸內，經三日，臨夜暫煮食之，連日服，益能去風痰，故

猪肺

○治咳，嗽，喘急，肺痿，吐血。猪肺一箇，洗去血水，若病人每歲用杏仁一箇，去皮尖，將肺以竹簽穿

服每服人杏仁一箇麻扎重湯煮熟去杏仁只吃

肺卽效。

○上氣咳嗽身熱口乾猪肋骨一斤切

碎煮熟入鹽豉

調和食之。

阿膠

○治肺虛損極咳嗽唾膿血非阿膠不補○喘甚須用阿膠潤○阿膠妙爲末米飲調服止喘。

獵肉

○主上氣咳嗽灸爲末每二錢溫酒和服日二

貓頭肉

○治哮喘不得睡取頭骨燒爲灰溫酒調下一錢卽止。

人尿

○主咳喘肺癆又止勞渴嗽取溫尿飲之童子尿尤好又主久嗽失音。

鍼灸法

○咳嗽有痰宜灸天突肺俞以泄火熱瀉肺氣。○咳嗽上氣多唾冷痰灸肺俞五十壯又灸兩

乳下黑白肉際各百壯○咳嗽聲破喉嘶灸天突

五十壯○久患喘疾不可得氣夏月亦衣被溫。

背心是督脉之經。○久嗽宜灸腎經。

- 次灸肺俞。
○傷寒咳甚，灸天突卽差。
穴卽愈如不愈，其病不可治矣。
艾炷如小豆大灸三壯。
男左女右，鑿。
○喉喘灸肺俞，又取天突、膻中、璇璣、肺府、乳根、氣海、墮。
○咳喘不得卧，取雲門、太淵、瞤。
○氣逆發噦，取膻中、中脘、肺俞三里、行間、瞤。
○吃逆服藥無效，灸中脘、膻中、期門必效。
○吃逆灸開元七壯立愈。
○又法乳下指許正一與。

東醫寶鑑雜病篇卷之五下終

東醫寶鑑雜病篇卷六上

東醫忠勤夏亮扈 畢功臣崇祿大夫陽平君

臣

許涉

奉 教 撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷臟臟傷則虛風雨襲虛則病起於上畱着於脉稽出不去息而成

積。著於陽明之經則挾脅而居飽食則益大飢則益小。著於緩筋也以陽明之積飽食則痛飢則安飢則痛。著於脾胃之膜原痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛。著於督筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得。清濁裏虛則病起於下積之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足悅足悅生脛寒脛寒則血脉凝滯血脉凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁殊追聚

不得散日以成積。卒然多飲食則脹滿起居不
節用力過度則陽絡脉傷陽絡傷則血外溢陰絡
傷則血內溢血內溢則後血謂蹶分也腸胃之絡傷
則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合
凝聚不得散而積成矣。帝曰人之善病腸中積
聚者何以候之少俞答曰皮膚薄而不澤肉不堅
而淖澤如此則腸胃惡惡則邪氣留止積聚乃成
腸胃之間寒溫不次邪氣稍至蓄積留止大聚乃
起。內經曰寒氣客於小腸膜原之間絡血之中
血澁不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而
成積

矣

論五積六聚

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所

積名曰積氣之所聚名曰聚積者五臟所生聚者六腑所成積者合氣也其治發有常處其病不難

其始發無根本上不無所留止其痛無常處故以是別知積聚也。病有積有聚有榮氣何謂也。師曰積者臟病也終不移聚者腑病也發作有時展轉痛移爲可治榮氣者脇下痛按之則愈復發爲榮氣。肝之積名曰肥氣在左脇下如覆盆有頭足久不愈令人發咳逆脇痛痃癆連歲不已。心之積名曰伏梁梁心下橫起臍上大如盃上至心下久不愈令人煩心。脾之積名曰痞氣臍皯稍在胃脘覆大如盤盃作久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚。肺之積名曰息竇喘積在右脇下覆大如盃久不已令人酒淅寒熱喘咳發肺癰。腎之積名曰奔豚膀胱之奔發於小腹上至心下若脉狀或下或上無時久不已令人喘逆骨痿少氣。肝積面青脈弦而長細作定在左脇下。心積面赤脈數而實定在心

下。脾積面白黃脈大血虛一作滯定在中脘。肺積面白脈數而浮定在右脇下。腎積面白黑脈寸而大實一作絳沉

定在小腹

漏

伏梁有二證帝曰病有小腹盛上下左右皆有根此爲血居腸胃之外不可治治之無功按之致死。帝曰人有身體髀股脄皆腫環臍而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於肓膜之原在臍下故環臍而痛不可動之動之爲水尿瀦之病此二病

同名而實異也

納

脉法臂脉多沉伏或結或促或代攣。臂脉沉濶積脉弦堅。病在右脇有積氣得肺脉結甚則積甚結微則積微肺脉雖不見右手脉當沉伏攣。

積其脉皆大曠。脈弦緊爲積。脈強堅爲微。微者
癥也。夫癥瘕積聚之脉皆弦緊在心下卽寸弦緊
在胃脘卽關弦緊在臍下卽尺弦緊。內有積不
見脉難治。見一脉相應爲易治。診積聚其脉堅
強急者生虛弱者死。○脈弦而伏者腹中有瘕不
可轉也必死不治。○五臟爲積六腑爲聚。積在
本位聚無定處。趺緊浮牢小而沉實或結或伏爲
聚。爲積實强者生沉小者死。○五臟屬陰沉伏
附骨肝弦心肺腎沉急滑脾實且長肺浮喘卒。
六聚結沉病則浮結。又有癥瘕其脉多弦弦急
痕疾弦細癥堅。沉重中散食成癖。痃左轉沉重
氣。瘕胷前若是肉癥右轉橫旋。積聚癥瘕緊則
痛。經虛弱者死。實强者生。○痃。腹中有積脉忘虛
弱。○診婦人癥瘕積聚之脉弦急者生虛弱小
者死。

六鬱爲積聚癰瘕痃癖之本

氣血冲和百病不生一有

怫鬱諸病生焉鬱者病結

不散也。軀。熱鬱而成痰。痰鬱而成癖。血鬱而成

癥。

此必然之理也。

又氣鬱而潔

濡濕滯而成熱。熱鬱而成痰。痰滯而血不行。血滯

而食不消化而遂成痞塊。此六者相因而爲病也。

軀。鬱者積聚而不得發越也。當升者不得升。當

降者不得降。當變化者不得變化也。此爲傳化失

常。六鬱之病見矣。軀。一曰氣鬱二曰潔鬱三曰

熱鬱四曰痰鬱五曰血鬱六曰食鬱此六鬱也。六

鬱不言風寒者。風寒鬱則爲熱故也。軀。治鬱之

法順氣爲先。降火化痰消積分多少而治。蒼木蕉

芎總解諸鬱。內經曰木鬱達之火鬱發之土

鬱。尊之金鬱泄之水鬱折之張子和曰木鬱達之

謂吐之令其條達也。火鬱發之謂汗之令其躁散

泄解表利小便也。水鬱折之謂抑之制其衝逆此治五鬱之大要耳。驅諸鬱通用六鬱湯或

丸麴保和丸

加味麴保和丸

六鬱湯

通治六鬱。香附子二錢。川芎。蒼朮各一錢。半

陳皮。半夏製各一錢。赤茯苓。梔子仁各七分。

縮砂。甘草各五分。右剉作一貼。薑三片。水煎服。調。

氣鬱加木香。檀榔。烏藥。紫蘇葉。滋鬱加白朮。羌

活。防已。熱鬱加黃連。連翹。痰鬱加南星。瓜萎。

仁海粉。血鬱加桃仁。牡丹皮。韭汁。食鬱加山

楂子神麵

麥芽

六鬱湯

開諸鬱火。便香附。蒼朮。神麴。梔子。連翹。陳皮。川芎。赤茯苓。貝母。枳殼。紫蘇葉各一錢。甘草

五分。右剉各一貼。

薑三片。水煎服。驅。

卷之二
金匱要略

穀鞠丸

解諸鬱蒼术便香附川芎神麴炒梔子炒各等分右爲末水和丸如茶豆大溫水下七丸

十九丸。穀鞠丸細麴丸二名芎术丸凡願欲不遂如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧或久病不愈者皆

宜服此門

穀鞠保和丸

開鬱行氣消積散熱白术三兩山楂肉二兩蒼术川芎神麴炒便香附陳皮半

夏白茯苓枳實黃連酒

炒當歸酒洗各一兩梔子炒連翹蘿蔔子炒木香各五錢右爲末

餅和九梧桐子大

薑湯下五十九丸

加味穀鞠丸

解諸鬱開胸膈進飲食蒼术泔浸薑汁炒蕷芎便香附神麴炒梔子炒各四兩

陳皮去白白术炒黃芩炒各一兩半山楂肉蒸二

氣鬱

胸滿脹滿則消渴。宜用香附子、甘草、桂枝、白芍、柴胡、升麻。

木香調氣散解鬱。調胃湯、蕤蕤丸。二陳湯煎水

吞下交感丹

方見肺門

門

濕鬱

周身關節走痛。首如物蒙足重遇陰寒便發。脉沉濡。宜用荅术川芎白芷赤茯苓。宜服滲濕湯。

濶

門

胃

散

肺門

貌

目蒙

口乾舌燥小便赤濁。脈沉數。宜用青黛香附

熱鬱

附子、川芎、桔梗。宜服升陽散火湯。火鬱湯。

附子

門

附子

痰鬱

胸滿動則喘急。起卧急惰。脉沉滑。宜用海石香附子、瓜蒌仁、南星。宜服瓜蒌枳殼湯。升發二

陳

門

附子

湯

血欝

四肢無力能食小便淋大便紅脈沉芤澁宜用桃仁紅花青黛川芎香附子㕮。宜服生韭飲順氣

丸當歸

活血湯

食欝

噫酸惡食黃疽鼓脹痞塊脉氣口緊盛宜用蒼朮香附山楂子神麴鍼砂醋炒㕮。宜服香砂平胃散

欝湯

木香調氣散

治氣欝烏藥香附枳殼青皮陳皮厚朴蕪薺蒼朮各一錢木香縮砂各五分桂

皮甘草各三分右剉作

一貼薑三片水煎服

解欝調胃湯

治氣分之火壅遏於中時作刺痛皆由怒憂思慮勞心所致也梔子鹽水炒當歸酒洗各一錢二分白朮陳皮白茯苓各一錢赤

草各四分右剉作一貼薑三片水煎服

瓜蔞枳殼湯

治癰鬱瓜蔞仁枳實桔梗川芎荅木香附杏仁片芩酒炒貝母炒陳皮各一錢

縮砂木香各五分甘草三分右剉

作一貼水煎入竹瀝薑汁調服

升發二陳湯

治痰鬱半夏二錢陳皮蕷芎赤茯苓各一錢半柴胡防風升麻甘草各一錢右

剉作一貼入薑

三片煎服

生韭飲

治血鬱胃脘有瘀血作痛生桃仁七箇連皮細嚼以生韭汁一盞送下卽效

順氣丸

治血鬱香附子八兩以童便浸乾爲末以粟米糊和丸服

當歸活血湯

治血鬱當歸赤芍藥川芎桃仁各一錢牡丹皮香附子烏藥枳殼青皮各八分

紅花五分桂皮乾薑炮甘草各三

分右剉作一貼

入薑三水煎服

翻

香附平胃散

治食鬱。蒼朮厚朴陳皮便香附各一錢山楂肉縮砂枳殼麥芽神曲乾薑木香

各五分甘草炙三分右剉作一貼

入薑三蘿蔔子炒研一撮

煎服

散鬱湯

治食鬱。陳皮赤茯苓各一錢半蒼朮白芍藥川芎梔子各一錢二分枳殼香附各一錢甘草五分右剉作一貼

入薑三煎服。

鬱則胃熱。鬱則氣生

散則上焦行下膀通水穀之陰自滋沛身中之陰矣

氣自生

痞塊積聚所屬部分

凡痞塊積聚在中爲痰飲。在右爲血塊。右爲食積。中爲痰飲。此言誠然。夫左關肝

爲血塊。右爲食積。中爲痰飲。此言誠然。夫左關肝

則爲水穀出入之道路所以左爲血塊右爲食積中爲痰飲其理昭然畊

痞塊證治
塊是有形之物氣不能成塊乃痰與食積死血也宜用化塊丸。凡痞塊在皮裏膜外俱宜二陳湯加補氣行氣藥先須斷厚味。治塊當降火消食積卽痰行死血塊去後須大補之訛。凡婦人有塊多屬是血塊。痞塊一名癭瘕其不能移動者是癭塊也或有或無或上或下或左或右者是瘕塊也俱用潰堅湯丸爲主訛。腹下有塊宜當歸龍鬚丸五味子加桃仁薑黃各一兩蜜丸服之。驚氣成塊者妙應丹方加穿山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五七十九丸以利爲度。痞塊宜用連蘿丸消塊丸加味柴平湯消積保中丸開懷散柴香散保和丸化痞丹兼用膏藥外貼之。凡腹中有塊不問積聚癥痕俱爲惡疾切勿視爲尋常若脹滿已成

胸腹鼓急雖倉扁復生
亦莫能救其萬一也

傳

化塊丸

治痞塊及血塊海粉酒煮三稜蓬术並諸煮

紅花桃仁五靈脂香附子各一兩石礫五錢

右爲末醋糊和丸梧子大

白术湯下三五十丸

連蘿丸

治食積死血痰飲成塊在兩脇作痛雷鳴嘈雜眩暉黃連一兩半取一半以吳茱萸五錢

同炒去茱萸一半以益智五錢同炒去益智白芥子蘿蔔子並炒各一兩半梔子川芎三稜蓬术桃

仁香附子山楂肉神麴各一兩青皮五錢右爲末蒸餅和丸梧子大白湯吞下五六十九丸

一名白芥丸

名消積丸

消塊丸治痞塊癥瘕大黃四兩硝石三兩人參甘草

附子一兩半白芍五錢東硝王升置器內先納

大黃煎不住手撮微沸盡一升下飲藥未熟至
可丸則丸如梧子大米飲下三十九當利如鷄肝
惡物門。一

名消石丸

金

加味柴平湯

治積塊有熱柴胡黃芩半夏蒼术厚朴陳皮山楂肉青皮枳殼神曲三稜蓬术

各七分甘草五分六對作

一貼入薑三枣二煎服

春

消積保中丸

散痞除塊白朮土炒三兩陳皮去白二兩半夏白芍芩香附醋炒蘿蔔子炒白

芥子炒神曲炒黃連薑汁炒梔子薑汁炒各一兩

檳榔七錢蓬朮三稜並醋炒各八錢麥芽炒六錢

乾漆炒五錢青皮香油炒縮砂炒各四錢木香阿

魏各三錢右爲末以薑汁酒糊和丸梧子大白湯

下八十

丸鑑

開懷散 治心下積塊痞悶或發熱柴胡草豆蔻各一錢三稜蓬术並醋炒青皮陳皮半夏白茯苓

香附子檀榔枳實紅花甘草各七分右剉作一貼薑三煎服

七分右剉作一貼薑三煎服

柴香散 治心腹有氣一塊畧通或臌脹寒熱枳實地骨皮三稜蓬术各一錢柴胡黃芩各七分赤芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分

甘草三分右剉作一貼水煎服

保和丸 治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消白朮五兩陳皮半夏茯苓神麌山楂肉各三兩

連翹香附子酒炒厚朴蘿蔔子炒各二兩枳實麥芽黃連酒炒黃芩酒炒各一兩右末薑汁糊和丸梧子大清茶下

五七十九

化痞丹 消積塊專攻之剉大黃四兩醋浸七日日晒

香附子便漫炒桃仁各一兩紅花二錢青黛五分

右爲末將大黃和好醋煮爲糊和丸菉豆大茅根葛根煎湯下

五七十丸

水

積聚治法

治積當察其所痛以知其病有餘不足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如高者越之

結者散之客者除之留者行之堅者削之強者奪之鹹者更之苦以瀉之全真氣藥補之隨所利而

行之節飲食慎起居和其中外可使必已歟。凡

積病不可用下藥徒損真氣病亦不退當用消積藥使之融化則自消除根矣。經曰治積聚有化積消積按積磨積而無下積之說蓋不可直使

取下以傷胃氣也。諸積勿輕吐下徒損真氣積亦不去奔豚尤不可吐。五積古有五方今增損

五積丸更妙也。內經曰破積用毒藥衰其大半而止藥凡大積大聚消其大半乃止藥過劑則死

疎

○肝積用肥氣丸

○心積用伏梁丸

○脾積用

○肺積用息賁丸

○腎積用奔豚丸

○六

○九臥

○積初爲寒宜辛溫消導大七氣湯

○大阿魏丸

○大安

○聚宜用散

○聚湯香稜丸

○大七氣湯

○大阿魏丸

○久則爲熱宜辛寒推蕩木香檳榔丸

○貽

○隙通玄二八丹消魂丸

○臥。治積要法大抵以所

○惡者攻之所喜者誘之則易愈

○如硼砂水銀治

○治內積

○內積

○神麴麥芽

○治酒積

○水蛭虫

○治血積

○木香檳榔

○治氣積

○牽牛甘遂

○治水積

○雄黃膩粉

○治痰積

○礞石

○巴豆

○治食積

○各從其類也

○鞶

○又

○云三棱蓬

○木治血積

○香附枳實

○治食積

○山楂阿魏

○治肉積

○海粉礞石

○治痰積

○雄黃白礬

○治中積乾薑

○巴豆

○治寒積

○黃連大黃

○治熱積

○砂

○五積六聚通

○用增損

○五積丸

○消積

○正元散

○肥氣丸

○伏梁丸

○痞氣丸

○奔豚丸

○又有奔豚

○湯散

○聚湯香稜丸

○大

○光息賁丸

○奔豚丸

○又有奔豚

○湯散

○聚湯香稜丸

○大

○光息賁丸

○奔豚丸

○又有奔豚

○湯散

○宿食端

○化氣

○出房

○清

○整

○陽

○陰

○人北藏

○陽

○諸

○宿食端

氣凝結爲癥。腹中痞塊堅硬。作楚當以破氣。代之或以類相從。如貯桃治風癇。銅屑治龍瘕。麯

藥治米瘕石。

灰治髮痕。

嫩

增損五積丸

通治五積。黃連肝積五錢。脾腎積七錢。肺積八錢。川烏肝肺積一兩半。厚朴心腎肺積五

分。乾姜肝心積五分。肺脾腎一錢半。人參肝

心脾肺積二錢。腎積五分。茯苓一錢半。巴豆霜

五分。右爲末。蜜丸梧子大。初服二丸。漸加以微。溏

爲度。治積塊不拘。疇上下左右。通用。

如肝積加

柴胡一兩。川椒四錢。蓬术三錢。皂角昆布各二錢

半。心積加黃芩三錢。肉桂。荻神丹。參各一錢。菖

蒲五分。肺積加桔梗三稜。天門冬。青皮。陳皮。白

豆蔻各一錢。紫菀。川椒各一錢半。脾積加莫茱萸。黃芩。縮砂各二錢。澤鴻茵。陳各一錢。川椒五分。

○腎積加玄胡索三錢苦練肉全蝎附子獨活各一錢澤瀉菖蒲各二錢肉桂三分丁香五分

附入門

消積正元散

治痰飲氣血鬱結食積氣不升降積聚

索海粉各一錢赤茯苓陳皮青皮縮砂麥芽

山楂肉甘草各七分右剉作一貼鹽三水煎服

各開鬱正元散

癰癧附入門

肥氣丸

治肝積柴胡一兩黃連七錢厚朴五錢川椒

角白芍各一錢半乾姜巴豆霜各五分川烏二

分石爲末蜜丸梧子大如服二丸日加一丸二日

加二丸至大便溏便漸減服

周而復始塊減半勿服

伏梁丸

治心積黃連一两半厚朴人參各五錢黃芩

烏各五分紅豆蔻二分右爲末密
丸梧子大黃連湯下服如上法
傳

痞氣丸 治脾積黃連八錢厚朴四錢莫茱萸三錢黃芩二錢縮砂一錢半白茯苓人參澤瀉各一錢茵陳乾姜各一錢半川烏川椒各五分桂皮巴豆霜各四分白朮二分右爲末蜜丸梧子大甘草湯下服

上法

正

息責丸 治肺積黃連一兩三錢厚朴八錢川烏桔梗白茯苓川椒紫菀各一錢半青皮巴豆霜各五分右爲末蜜丸梧子大薑湯吞下服如上法
奔豚丸 治腎積厚朴七錢黃連五錢川鍊子三錢白茯苓澤瀉菖蒲各二錢玄胡索一錢半全蝎附子獨活各一錢川烏丁香巴豆霜各五分肉桂二分右末蜜丸梧子大鹽湯不服如上法
傳

通玄二八丹

治積聚黃連八兩芍藥當歸生地黃烏梅各五錢爲末雄猪肚一旦入藥於內

以線縫之鋪韭菜二斤於鍋內蒸之一日以藥熟爲度取出搗丸梧子大空心薑湯下七十丸或鴨

一二次以

粥補住臘

奔豚湯

治腎積半夏二錢川芎當歸各一錢半甘李根皮乾葛各一錢黃芩芍藥甘草各七分右

剉作一貼

大薑三束

二水煎空心服

散聚湯

治六聚及癥瘕隨氣上下心腹刺痛二便不利厚朴莫茱萸枳殼各一錢半陳皮杏仁桂

皮赤茯苓各一錢川芎附子炮甘草炙各五分半夏檳榔當歸各四分右剉作一貼薑三水煎服

香稜丸

治五積六聚氣塊三稜檳榔各三兩山楂肉

砂當歸尾木香甘草各五錢右爲末醋糊和丸梧子大白湯下

三五十丸門

大七氣湯

治五積六聚心腹痛脹二便不利三稜蓬

桂甘草各一錢右剉作一貼

姜三枣二水煎服。

一方加大黃檳榔各一錢

治諸般痞積面色萎黃

四肢無力皆緣內有虫積或好食生米或壁土或

茶炭礬等物只此一服除根用水煎露一宿空

心溫服不得些少飲食不然則藥力減而虫積不行矣服後心腹痛當下惡物如魚陳虫蟹至日午

下積盡方用

溫粥止之醫

潰堅湯

治五積六聚諸般痞塊當歸白朮半夏陳皮枳實山楂肉香附子厚朴縮砂各一錢木香

東醫寶鏡 卷之三
五分水磨取汁右剉作一

貼水煎調木香汁服之

潰堅丸

治同上方加海粉瓦龍子鱉甲炙爲細末
將阿魏醋煮化入姜汁糊和丸梧子大酒下

五七十

丸

回

真人化鐵湯

治五積六聚痃癖癥瘕三棱蓬朮青皮
陳皮山楂肉神翹香附子枳實厚朴黃

連當歸川芎桃仁檳榔各五分紅花木香甘

草各三分右剉作一貼

姜二枣一煎服

回

癰瘕痃癖證治

癰者堅而不移瘕者堅而能移皆因痰
飲食積死血而成塊積聚癰瘕痃癖其

實一也。一也。○癰名有七蛟龍魚鱉癰狐蛇是也亦

曰蛇蛟鱉肉髮虱米也瘕名有八青黃燥血脂狐
蛇鱉是也此等病偶因食物相感而然瘕比癰稍

瘡塊之異名也。瘕者微也。腹中堅硬者，其之屬也。處曰癥，瘕者假也。腹中雖硬而忽聚忽散，無有常門。癥瘕入於婦人子臟，則絕產；入於胞絡，則經閉。治法詳見婦人門。痃者，在腹內近臍左右各有一條經脉，急痛如臂如指如弦之狀，名曰痃。瘕者偏僻在兩脇之間，有時而痛，名曰癰。凡癰瘕得冷則痛，得熱則緩。積者，跡也。挾痰血以成形跡，亦鬱積至人之謂也。聚者，緒也。依元氣以爲端緒，亦聚散不常之意也。癥者，徵也。又精也。以其有所徵驗，及久而成精萃也。瘕者，假也。又退也。以其假借氣血成形，及歷年遐遠之謂也。痃癖者，懸絕陰僻，又玄妙莫測之名也。大抵瘡與痃癖，乃胸膈間之病，積與聚爲肚腹內之病，其爲上中二焦之病，多見於男子。其瘕與痃，獨見於臍下，是爲下焦之疾，故常得於婦人也。癰。治法同積聚。

○腸覃石瘕血蠱見下腸覃生於腸外

月事時下石瘕生於胞中月事不下針

養正積自除

易老云養正積自除譬如滿座皆君子縱有一小人自無容地而出令人真氣實胃

氣強則積自消矣更能斷厚味節色慾戒暴怒正

思慮庶乎萬全而無害焉

。壯人無積虛人則有

之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積

若遽以磨積破結之藥治之疾似去而人已衰矣

治法當先補虛使氣血壯則積自消宜用木香枳

殼丸附。又治五積六聚癰瘕積塊元氣虛弱瘦

怯飲食不進四肢沉困宜補中益氣湯方見內編加三

稜蓬术青皮香附桔梗藿香益智肉桂桂

附。凡攻

擊之藥有病則病受之無病則胃氣受傷胃氣者清純冲和之氣也惟與穀肉菜果相宜蓋藥石皆偏勝之氣雖參芪性

木香枳殼丸

治飲食積聚心腹脹滿嘔逆吞酸黑疸

厚朴半夏

人參木香青皮陳皮三稜蓬术檀榔神曲白术

蔻麥芽各一兩

乾生姜枳實各五錢右爲末姜汁

糊和丸梧子大薑湯下七十丸。

凡人有積病則氣滯而餒此方攻補兼施真得古人養正積自除之理宜誠

心服之

訛

腸覃石瘕血蠱證治

腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏結而爲瘕覃延日久膿肉乃生始

如雞卵久如懷胎按之堅推之移月事時下或多

或少此氣病而血未病也

宜二陳湯加香附三稜

蓬术鱉甲並醋炒。

石瘕者胞中傷損瘀血結成

久則堅硬如石塞於子門大如懷孕月事不下乃

先感寒氣而後血壅所致宜用歸露丸石英散通

經丸欃丸桃仁煎。

血蠱卽癰瘕之甚者腹肚堅

硬如石宜用醋煮三稜丸二稜煎元

萬病丸桃仁散抱甕丸斑玄丸端

晞露丸治腸覃惡病血成癰痕作痛三稜蓬术各一

兩並酒浸以巴豆三十粒去皮同炒黃去巴

豆乾漆炒烟盡川烏炒各五錢硝砂四錢並研茴

香鹽炒青皮去白雄黃另研各三錢穿山甲炮二

錢麝香五分輕粉另研一錢右爲末薑汁麪

糊和丸梧子大溫酒或薑湯下二三十九個

石英散治石瘕紫石英醋淬一兩當歸尾馬鞭草紅

花炒烏梅肉各五錢蓬术三稜並醋炒蘇木

節各三錢沒藥虎珀甘草各一錢右爲末以

濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒薑湯調下

桃仁煎各一兩蜜虫炒五錢朴硝一兩右爲末先以

醇醋一升二合銀石器中慢火煎取七合許下桃

之丸如梧子大煎一日不吃晚飯五更初溫酒吞
下五丸取下惡物如豆汁雞肝末下再服見鮮血

卽止

藥針

醋煮三稜丸

治血盡三稜四兩醋煮竹刀切晒乾川芎二兩醋煮大黃五錢醋煨右爲末醋

糊和丸梧子大每三十

丸醋湯下

一月見效

三稜煎元

治婦人血積血塊血盡大黃八兩爲末三稜蓬术各一兩並煨爲末右將大黃醋煮

令稠和丸

桑豆大白

湯下三十五丸

鑑

萬病丸

治室女月經不通臍下堅結大如盃升寒熱羸瘦若生肉痕不可爲也乾漆炒合烟盡牛膝酒浸一宿各一兩六錢生地黃四兩八錢取汁

右銀石器內下地黃汁入二

藥末慢火熬丸如梧

子大酒

下一二

丸病去卽止

配

桃奴散

治血蠱及瘀血停積經水不通桃奴假鼠糞胡索肉桂五靈脂香附子各炒過縮砂桃

仁各等分右爲末每服

三錢以溫酒調下臥

抱甕丸

治血蠱及婦人鬼胎如抱一甕芫花吳茱萸川烏秦艽柴胡白蘚垂巴戟巴豆各等分右

爲末蜜丸梧子大每服七丸蜜酒吞下惡物立出而愈臘口輕者去芫花巴豆巴戟三味名曰斬鬼丹

饼丹

斑玄丸

治鬼胎惑於妖魅狀似瘢痕及一切血病斑
點玄胡索各等分右爲末醋糊和丸酒下三

丸胎墮

丸胎墮

息積病

帝曰人有病則下泄氣逆二三歲不已是爲向病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可炙刺

積爲導引服藥藥不能獨治也納○

宜服磨積丸化氣湯兼行導引法

效得

磨積丸

治腸胃因虛氣滯於盲膜之外流於季脇氣逆息難積月頻年醫所不治久則榮衛停凝

一朝敗瀉潰爲癰膿多致不救胡椒一百五十粒木香二錢半全蝎十箇右爲末栗米飯和丸菉豆

大橘皮湯

下

十五丸

效得

化氣湯

治息積癖於腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食諸藥不能療蓬朮乾生薑陳皮青皮丁香皮

茴香炒甘草炙各五錢縮砂桂心木香各二錢半

胡椒沉香各一錢一字右爲末只取二錢以生薑

紫蘇葉鹽少許

煎湯調下

效得

導引法 治血積以兩手拇指壓無名指本節作掌按

髀跌坐叩齒三十六屏氣二十一息嚙氣三

口再屏息再嚙如是三作以氣

通爲效遇子午卯酉時則行之

諸物傷成積

凡人脾胃虛弱或飲食過常或生冷過度不能消化致成積聚結塊心腹脹滿噫氣

吞酸面青肌瘦一曰食積二曰酒積三曰麯積四曰肉積五曰魚鱗積六曰果菜積七曰茶積八曰

水積九曰血積

十曰虫積

食積

食不消化成積痞悶宜用平胃散防覬加縮砂香附子神麴麥芽人生薑紫蘇葉煎服之。食積宜

用保和丸大安丸連蘿丸

坊見紅元子佐脾丸諸

酒積

酒傷成積者面黃黑腹脹時嘔痰水宜用對金飲

宜用熟藥。酒積丸治酒積。一錢爲末。以猪槽頭肉一兩細切搗爛和藥末作一丸。濕紙裹火煨令香熟出取。臨睡細嚼以酒送下。又方。黃連酒浸一宿。焙爲末。以橘紅葛根湯調下一錢。清○葛花解醒湯常服亦佳。陳氏。

仙丹

成益

。蛇膽保和丸

烏白丸

並治酒積。

附

麥積

食麵過多成積。取阿魏元以濃煎蘿蔔子湯吞下。

○糍糕傷成積。噫酸心脇作痛。百藥不效。取青木

香元煎。一百粒白丁香十粒神麴二錢同爲末。

入巴豆三粒更研和白蒸餅爲丸。菉豆大以生

姜橘皮湯下二三十丸。滯去自安。

○素粉

積以紫蘇葉濃煎湯加杏仁泥服卽散。

得

肉積

食肉過多成積。宜用阿魏。

元小阿魏丸

稜前元門

附

鮑卿多加生姜

魚蝦積

食魚蝦過傷成積。香蘇散。

鮑卿多加生姜

木香煎服。妙應丹遇仙丹。蛇膽保和丸。並佳。

得

果菜積多食果菜成積用平胃散加丁香麝香爲末熱鹽湯調服日三。果菜積宜用桂香丸妙應丹

得

茶積喜吃茶成積成癖及食乾茶者石膏黃芩升麻爲末砂糖水調下得。茶積取川椒爲末麪糊和丸梧子大茶清下十丸得。茶癖茶

積宜用星朮丸內傷磨積元得

水積多飲水漿成積胃脇引痛瀝洛有聲宜十枣湯貯。寒三花神佑丸得。芎夏湯貯。癰破積導飲丸服之並

佳樹

血積瘀血成積或因打撲或因墮落以致蓄於胸腹面黃芩黑豆宜用抵當湯方。桃仁承氣湯貯。勝紅

元增味四物湯三稜

前三棱煎丸方。觀

蟲積

飲食積聚變化成虫宜用此方

九

保和丸

治食積酒積山楂肉一兩半夏姜製蘿蔔子

炒黃連炒陳皮各五錢神麴炒三錢麥芽炒

二錢右爲末神麴糊和丸梧子大白湯下五七十

丸

一 方

山楂五兩神麴半夏各三兩茯苓陳

皮蘿蔔子連翹麥芽炒各一兩右末

別以神麴五兩爲末作糊丸服

正傳

大安丸

治食積乃脾經消導之劑也山楂肉白朮各

二兩神麴

半夏茯苓各一兩陳皮連翹蘿蔔

子炒各五錢右爲末

子炒各五錢右爲末

神麴糊和丸服如上法

正傳

紅圓子

治食積酒積脾積血氣諸般癥塊三稜蓬术

青皮陳皮各五兩胡椒乾姜各一兩右爲末

醋煮麪糊和丸梧子大箬紅

爲衣姜湯吞下五七十丸

神麴糊

佐脾丸 治食積山楂肉三兩陳皮連翹蘿蔔子炒各五錢赤茯苓半夏各一錢右爲末和丸菉豆

大溫水吞下

五七十丸研

麴蘖元 消酒癖不消腹脹吞酸嘔逆不食神麴炒麥芽炒各一兩黃連五錢巴豆肉三粒同炒去巴豆右爲末沸湯和丸梧

子大姜湯下五七十丸研

酒積丸 治酒積烏梅肉黃連酒浸一宿各一兩半夏麴七錢枳實縮砂各五錢木香四錢杏仁三

錢巴豆霜一錢右爲末蒸餅和丸

茱豆大白湯吞下八丸或十九丸

烏白丸 治酒積消痰食烏梅肉生姜各四兩白礬半夏各二兩搗勻以新瓦夾定火焙三日夜入

神麴麥芽陳皮青皮蓬朮丁香皮大腹子炒殼各一兩右爲末酒糊和丸梧子大姜湯下五十丸研

阿魏元

食變食生寒過多不能克化致成積脾癰腫

炒蘿蔔子青皮白朮乾姜各五錢百草霜三

錢巴豆二七粒去皮油右爲末薄糊和丸菉豆大

薑湯下二三十丸

麪傷用麪湯

吞下生果菜傷以麝香湯下

燉

阿魏丸

治肉積及食積成塊阿魏一兩醋煮軟山楂

子蘿蔔子神麴麥芽陳皮青皮香附子各二

兩右爲末

炊餅和丸服酒。一方阿魏山楂各一

兩黃連六錢半連翹五錢右爲末

醋糊和丸服名

曰小阿

魏丸

三稜煎元

治肉積脾虛爲肉食所傷腹滿臟痛三稜

生細剉爲末八兩以醋三升石器熬成膏

神麴麥芽並炒各三兩青皮乾漆炒蘿蔔子炒各

二兩杏仁研砂飛研各一兩右爲末

以三稜膏和

九梧子大姜湯

下二三十丸姆

妙應丹

治飲食中蟲毒或食水中果蓏子卯入腹而生虫蛇魚鱉或宿食留飲結爲癥瘕附子四

箇七錢重者生去皮曬剝作末入勑砂共一兩七

錢重麪裹煨熟去麪不用薑擦木香青皮破故紙

各三兩半右爲末麪糊和九梧

子大生姜橘皮湯下三十丸姆

桂香丸

治多食雜菸果子成積腹脹氣急桂心一兩

麝香一錢右爲末飯丸

菉豆大白湯吞下十

五丸

門入

磨積丸

治茶積飲食減少面黃腹痛陳倉米半升巴豆肉七粒同炒令赤去巴豆入青皮橘紅

各二兩右爲末好醋拌和爲丸

豌豆大姜湯下二三十丸姆

勝紅元

治血積酒積及婦人脾血積氣三稜蓬术並

子

醋炒二兩右爲末醋糊和丸

梧子

大薑湯下三五十丸

增味四物湯

治血積四物湯料加三稜蓬术

乾漆炒肉桂各等分煎服

三稜煎

治食癥酒癰血瘕氣塊三稜蓬术各四兩芫花一兩同入磁器中米醋五盞浸之封口交

火煨令乾取出稜术將芫花以餘醋炒令微焦其焰乾爲末醋糊和丸茱豆大薑湯下十五丸

一方

三稜蓬术各二兩青皮半夏麥芽炒各一

西米醋六升同煮乾

培爲末製法服法同上

破積導飲丸

治水積痰飲積木香檀榔陳皮青皮枳實枳殼蓬术三稜半夏神麴麥芽茯苓

乾姜澤瀉甘草各五錢白丑頭末六錢巴豆二十

粒去皮心膜油右爲末

薑汁糊和丸梧子大薑湯

十九 瞬

積聚癰瘍痃癖痞塊通治藥

宜用溫白元萬病元金露
元荆蓬煎元秘方化滯丸

三稜消積丸寬中丸萬應丸

延年護命丹桃溪氣寶丸

溫白元

治積聚癰瘍黃疸鼓脹十種水氣八種痞塞

溫白元五種淋疾九種心痛遠年瘧疾及療七十二

種風三十六種口瘡癩狂邪祟一切腹中諸疾川

鳥炮二兩半吳茱萸桔梗柴胡菖蒲紫菀黃連乾

姜地肉桂川椒炒巴豆霜赤茯苓皂角灰厚朴人

參各五錢右爲末煉蜜和丸梧子大薑湯下二丸

或五丸至七丸搗。一名萬病紫菀丸海。治婦

人腹中積聚有似懷孕瀉痢困弊或歌哭如邪祟

服此藥自愈久病服之則皆

萬病元

七種飛尸

十一種蠱毒

五種黃疸

十二種瘡

一和瘧疾

一和瘧疾

疾十種水疾八種大風十二種濕痺及積聚脹滿久遠心腹痛疽蚘寸白諸虫久積痰飲消瘦疲困或婦人子藏中瘀血癥滯因此斷產服此藥以三丸爲一劑不過三劑其病悉除說無窮盡故稱爲

萬病元芍藥川椒肉桂芍藥乾薑防風巴豆霜當歸犀角鈎桔梗芫花醋炒赤茯苓人參黃芩黃連桑白皮蒲黃前胡大戟葶苈子炒麝香細辛雄黃朱砂紫菀禹餘輝醋淬研水飛甘遂牛黃各一兩蛤蚧十二節去頭足炙莞青二十八箇糯米同炒米黃色取去翹足蜥蜴去頭尾足炙四寸右爲末蜜丸小豆大溫水或薑湯

下三丸以吐利爲度

丸

金露元治腹內一切積聚癥塊作痛與萬病元同功草烏炮黃連各一兩生乾地黃貝母巴豆霜

桔梗柴胡紫莞吳茱萸菖蒲乾薑白茯苓桂心芎
窮人參甘草防風厚朴枳殼鱉甲川椒甘遂各五
錢右爲末麪糊和丸梧子

大薑湯下三九或五丸

燭

荆蓬煎元

消癩塊冷熱積聚破瘀滯消化宿食三稜蓬术並酒浸三日夏則一日取出同巴豆

內三十八粒石器內同炒黃色去巴豆却用湯浸去白各二兩木香枳殼青皮茴香炒檳榔各一兩右爲末麪糊和丸菜豆

大薑湯下三五十九

燭

秘方化滯丸

理一切氣化一切積久堅沉痼磨之自消暴積乍留導之立去奪造化有通塞

之功調陰陽有補瀉之妙三稜蓬术並煨各四錢八分半夏麴木香丁香青皮陳皮並去白黃連各二錢半巴豆肉醋浸一宿熬乾六錢烏梅肉焙乾出味五錢白蜜水以燭海末入白麴少許煮作糊

和丸參大每服五丸十五粒通利以
湯下欲磨積則以陳皮湯下欲止泄則飲冷水

三稜化積丸

治諸般積聚三稜酒煮六兩山楂肉四

香青皮陳皮香附子醋炒枳實厚朴縮砂神麴炒

麥芽炒南星薑湯泡半夏薑

製蘿蔔子炒黃連炒

桃仁乾漆炒甘草各一兩右爲末

醋

糊和丸梧子大白湯下四五十丸

醋

寬中丸

治七癥八瘕五積六聚痃癖氣塊胸腹脹痛

面黃肌瘦一切沉滯之疾蒼朮炒烏藥香附

子各二兩三稜蓬术並醋煮

焙青皮陳皮薑炮

良薑炮茴香炒神麴炒麥芽炒各一兩右爲末

醋

糊和丸梧子大薑

湯下五十丸

顆

萬應丸

破一切積散一切氣氣蠱血塊癥瘕積聚食
積肉積酒積鼓脹浮腫癰癧等證硝砂水飛

阿魏醋研大黃吳茱萸青礞石與焰硝同煅肉桂
木香青皮玄胡索五靈脂齒香炒穿山甲蛤粉炒
乳香沒藥當歸菖蒲皂角乾漆炒檳榔陳皮枳殼
三稜蓬术並醋煨丁香良薑炒甘遂芫花大戟雄

黃各二錢半巴豆霜一錢半右爲末醋

糊和丸梧子大薑湯下三五十丸

顆

延年護命丹治三十六般積二十四般氣及血積虫
積大黃十兩半生半醋浸切作片焙乾

黑丑頭末一兩蓬术三稜並炮芫花鱉甲醋炙各
五錢陳皮二錢半與芫花同醋浸一夜焙乾沒藥
乳香輕粉各一錢右爲末蜜和搗干杵每一兩分
作四丸細嚼一丸溫水送下臨卧時明日取下惡
物爲效三日只喫白粥

將息忌生冷油膩

顆

桃溪氣寶丸治積聚癰瘕腹脇如抱一塊瘦瘠露骨

一切氣積食積大便祕泄寒熱往來黑

王頭末二兩大黃一兩半樟榔青皮各一兩羌活

川芎陳皮茴香炒木香當歸各五錢右爲末熬皂

角膏和丸姜湯

下五七十九類

類

外貼法

凡積聚痞塊用藥外貼令消散可用

三聖膏

貼積塊風化石灰半斤爲末瓦器炒令淡紅

三聖膏

色提出候熱稍減次下大黃末一兩就爐外

炒候熱減入桂心末五錢畧炒入米

醋蒸成黑膏厚紙攤開貼患處

門

琥珀膏

治同上大黃朴硝各一兩爲末大蒜搗爲膏和勻作片貼之。一方加麝香五分名硝

黃膏

臘

五仙膏

治一切痞塊積聚癰疾大黃皂角生薑生葱大蒜各半斤右共搗爛水煎取汁去渣再熬

成膏黑色爲度攤絹帛上先

以鍼刺患處後貼膏藥

貼痞膏

水紅花子二錢大黃朴硝山梔石灰各一錢
酒酵一塊鷄子大共搗成膏用布攤開貼痞

塊上再用湯瓶熨手帕勒之三日

後揭起肉黑如墨是其效也

慰癥法

吳茱萸三升碎之酒和煮熱布裹熨

癥上冷更妙熨移走則逐而熨之

握藥宣積

巴豆乾姜芥子良姜硫黃甘遂檳榔各等分
右爲末飯丸如中指頭大早朝先以川椒湯

洗手了麻油塗手掌中握藥一圓移

時便瀉欲止瀉卽以冷水洗手

婢

難治證

積聚癥瘕不轉動者難治必死。五積中奔豚
證最爲難治奔豚從小腹起上衝咽喉發作欲

死復還止皆從驚恐得之越人曰驚者神上越也
死亦神上越故也。抑嘗

論之醫爲病所困者惟陰虛之難補久積之難除
玉山自創陰虛之謂也養虎遺患久積之謂也人
之罹此二患者

可不懼哉

單方

凡二十

四種

牛膝

破癥結及卒暴癰腹中有如石刺
取一兩細剉酒煎溫服空心韎

三稜

主老癰癩瘕結塊取三稜濃煎
成膏每朝取一七酒服日二韎

玄胡索

破癥癩與三積鱉甲大黃
等分爲末酒服二錢效韎

大黃

破癥瘕積聚推陳致新最效大黃爲末醋煮成
膏入蜜更煎丸如梧子姜湯下三十九○疎風

熟去積滯大黃黑丑頭末半生半炒等

分蜜丸梧子大茶清下十五丸空心韎

商陸

主暴癰腹中有物如石痛刺若不治百日死多取商陸根搗爛蒸之以布藉腹上安藥熨之冷

復易自

消鞞

牽牛子

治五般積聚痃癖氣塊黑丑取頭末半生半炒蜜丸梧子大臨卧時以薑湯吞下甚妙鞞

葫蘆

主暴癰腹中堅如石痛欲死葫蘆根一小束細切酒一瓶浸三宿溫五合日三神效鞞

續隨子

宣一切積滯日服十粒若渴多取薄酸冷粥喫之卽止鞞

桑耳

主血病癰痕積聚取燒爲末酒調服之鞞

虎杖根

主癥結暴痕痛欲死取根爲龜末酒漬飲日三鞞

郁李仁

療癰取仁湯浸去皮爲細末每三錢白麪搜和作丸餅空心食之當快利若不止飲冷醋

湯
髓

白楊木 療癬癬堅如石積年不差取東南枝細剉五升熬令黃以酒五升漬之封口經二宿每服

一合日

三鉢

魚膾

主腹內伏梁痃癖氣塊以蒜
薑姜醋食之鯉魚膶尤佳鉢

鱉甲

主癩瘕痃癖燒黃爲末
酒服二錢日二次鉢

甜殼

治冷氣癥癖能消血塊又能消痰一名瓦壘子
火煅醋淬三次爲末醋糊和丸姜湯吞下臚

黍米泔

患鱉瘕者以新熟赤黍米淘取泔
汁生服一升不過三兩度愈臚

白頸蚯蚓

主蛇瘕取
汁服之臚

桃花萼
破積聚花落時取萼和麪作燒餅食之

和麪作燒餅食之

桃奴

治伏梁氣在心下結聚不散桃奴三兩爲末空心酒調二錢服之

蓼

主痃癖積氣每日取一握水煮空心服

大蒜

爛痃癖可常食之

白馬尿

治蟹癩取飲之卽消。○癩積滿腹諸藥不差白馬尿服之愈。

雄雀屎

主癩瘕痃癖伏梁諸塊爲末蜜丸空心以米飲吞下

人尿

主癓積滿腹諸藥不差人尿溫服一升空心童子尿尤佳

鍼灸法

奔豚上氣心痛欲絕急以溫湯浸手足數數易

壯嫗。癥瘕多足踝後宛宛中灸隨年壯火灸氣海百壯中腕二百壯嫗。癥瘕積塊先於塊上鍼之甚者又於塊首一鍼塊尾一鍼立應鍼訖灸之又灸三里綱。積聚取中腕懸樞脾俞商曲補尺澤大谿綱。伏梁取上腕三里。息賁取巨闕期門。奔豚取玉泉極少章門。積塊取章門中腕氣海天樞上腕通谷綱。專治痞塊取痞根穴穴在三十顧下各開三寸半多灸左邊如左右俱有左右俱灸。又法用捍心量患人足大指齊量至足後跟中住將此捍從屍骨尖量至捍盡處兩傍各開一韭葉許在左灸右在右灸左鍼三分灸七壯神效。又注於足第二指岐父處灸五七壯左患灸右右患灸左灸後一晚多覺腹中響動是驗也

浮腫

浮腫之因

腫者鍾也寒熱氣所鍾聚也鑑。諸濕腫滿皆屬脾土納。

○三陰結謂之水註曰山陰結

謂肺脾之脉俱寒結也

○脾肺寒結則氣化爲水納

○下焦溢爲水註曰下焦爲分注之所氣室不鴻

則爲溢水納。

○問曰少陰何主腎腎何以主水對

曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰

者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也問曰

腎何以能聚水而生病對曰腎者胃之關也關閉

不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故爲附

腫附腫者聚水而生病也納。

○附腫謂皮肉俱腫按之陷下泥而不起也納。

○陰陽氣道不通四海

閉塞三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別

爲水脹摶。

○水腫由脾虛濕膀疑閉滲道水漬每

于迴腸留於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則

行故通身面目手足皆浮而腫皮薄而光手按成

陷即滿是地或腹大如鼓而面目四肢不肿

○行故通身面目手足皆浮而腫皮薄而光手按成

陷即滿是地或腹大如鼓而面目四肢不肿

○行故通身面目手足皆浮而腫皮薄而光手按成

陷即滿是地或腹大如鼓而面目四肢不肿

○行故通身面目手足皆浮而腫皮薄而光手按成

者名曰脈滿又名鼓脹皆脾也。其熱氣病則脹而
脹重也。肺熱傳於膀胱熱盛逆於肺胃脾虛
而不能制腎水脾主四肢故流走而身面皆腫也。
若加喘者重也何以然腎水勝而克退脾土反勝
心火心又勝肺肺爲心冠故喘也。

久喘久瘧久痢羸悴之餘皆患此病

久瘧久瘧久痢羸悴之餘皆患此病

浮腫微兆諸有水氣者微腫先見於目下也。帝曰何以
言之岐伯曰水者陰也目下亦陰也。腹者至
陰之所居故水在腹者必使目下腫也。目裏
微腫如蚕起之狀曰水綯。頸脉動喘疾咳曰
水綯。足脛腫曰水綯。視人之目窠上微腫如
蚕新吐起之狀其頸脉動時咳按其手足上首而
不起者風水膚腫也。鼻頭色微黑者有水氣也。
腰脊者身之大關節也。肢脛者人之管以趨翔也。
垂垂者身中之機陰精之候津液之道也。故飲食
不節喜怒不時津液內溢乃下流於經血道不通

口大不休俛仰不便趨翔

不能此病榮然有水也

靈

浮腫形證

水病下爲箭腫大腹上爲喘呼不得卧者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得

卧經

。濕甚則濡泄甚則水閉附腫納。水病有

五種一曰風

水其脉自浮外證附腫按之沒指不碍風其

二曰戾水

脉亦浮外證附腫按之沒指不碍風其

腹如鼓

不渴當發其汗。三曰正水其脈沉遲外

證自喘。

四曰石水其脈自沉外證腹滿不喘。

五曰黃汗

其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久

不愈必致癰膿

又曰久則肌肉潰爛陰囊足脣水

出

仲景。又有五臟水心水者其身重而少氣不得

卧煩而躁其陰大腫。

肝水者其腹大不能自轉

側脇下腹中痛時時鳴瀉。

脾水者其腹大四肢

者身腫小便難時時

鳴瀉。肺水者其腹大四肢

大腑腫腹痛不得湯陰下濕如牛鼻其見過
冷而黃瘦羸。其狀曰胞上微腫如裹水通身
浮腫咳喘恆忪股間清冷小便澁黃皮溝而光手
按成窟舉手卽溝是浮腫也搘。又有陽水陰水
陽水多外因澁水冒而或感風寒暑濕其證先腫
上體肩背于背熱渴而二便閉。陰水多內因飲
水及茶酒飢飽勞役房勞其證先腫下體腰腹脛
跗身冷大便利吼。煩渴小便赤澁大便秘結此
爲陽水。不煩渴大便溏小便不赤澁此爲陰水
鞶。又曰石水者腎水停在臍下小腹腫大便硬
如石故云石水。肺水者流溢皮膚遍身皆腫但
腹如故不滿亦不渴。水蠱者水毒之氣結聚於
內令腹漸大動搖有聲常欲飲水皮膚龐惡顰。
朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛朝暮急氣俱虛

脉法 脉得諸沉當則有水身體腫重臘。○水病脈云大者可治微細者不可治。○水病腹大如鼓脈實者生虛者死。

水氣浮大則宜沉細則愈而復作。○上氣浮腫浮滑可安微細難療。○水腫脈多沉伏。○病陽水兼陽證脈必沉數病陰水兼陰證脈必沉遲緩。

沉伏相搏名白水陽

虛陰實爲水必矣。

四

水腫治法 治腫脹大法宜補中行濕利小便以人參白朮爲君蒼朮陳皮茯苓爲臣黃芩麥門冬爲

使以制肝木少加厚朴以消腹脹氣不運加木香木通氣下陷加升麻柴胡此補中治濕湯方也。肺

○治浮腫宜以辛散之以苦泄之以淡滲利之使上下分消其濕正所謂開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也。○夫爲腫之水

因之而化水欲其形一此非之遺醫氣以利之殊
不知脾病則金氣衰木寡於畏而來侮土脾欲不
病不可得矣治法宜清心經之火補養脾土全運
化之職肺氣下降滲道開通使敗濁之氣稍清者
復回而爲氣爲血爲津液甚者在上爲汗在下爲
尿以漸而分消矣。肺當發汗乃愈宜麻黃甘草湯
小便宜五苓散。大便宜瀉濁散。神助散。腰以上腫
當發汗乃愈宜麻黃甘草湯。越婢湯。防己茯苓湯
小便宜五苓散。大便宜瀉濁散。神助散。腰以上腫
當發汗乃愈宜麻黃甘草湯。越婢湯。防己茯苓湯
陽水宜入正散。大便宜瀉濁散。神助散。腰以上腫
當發汗乃愈宜麻黃甘草湯。越婢湯。防己茯苓湯
陰水宜實脾散。胃苓湯。大便宜瀉濁散。神助散。
宜平胃散。內傷加白朮。赤茯苓草豆蔻。宜服導滯
通經湯。飲水過多而浮腫宜胃苓湯。方見加減。
胃苓湯退腫瘍氣散。久喘後水氣宜分氣
飲芩蘆丸。久瘧變水氣宜黃甲丸。大便宜瀉濁散。
退腹瀉。久痢變水氣宜加味腎氣丸。或補中益氣

湯昉覲加炮附子久服。瘡癰後通用五皮散。門
○水蠱證宜黃米丸。漆雄丸。青木香元臘。瀉濕
泄水宜三花神祐丸。附覲煨腎丸。神助散。瘡
疥變水腫宜赤小豆湯臘。水腫泄瀉宜葶苈木

香散大橘

皮湯臘

補中治濕湯

通治水病補中行濕人參白朮各一錢
蒼朮陳皮赤茯苓麥門冬木適當歸各

七分黃芩五分厚朴升麻各

三分右剗作一貼水煎服

櫻

澤瀉散

治水腫二便澁澤瀉赤茯苓枳殼猪苓木通
檳榔黑牽牛頭末各等分右爲末生姜葱白

湯調下

二錢

神助散

治遍身水腫喘急小便澁黑丑頭末三錢葶
苈子炒熟研末一錢半諸藥帶酒冰酒香格

一錢右爲末先以漿水一盞葱白三莖煎至半盞入酒半盞調藥三錢絕早面東服如人行十里久以漿米煮葱白粥入酒五合熱啜當利小便三四升隔日再服須斷滋味及房事三年，通

麻黃甘草湯

治腰上浮腫麻黃三錢甘草二錢右剉作一貼水煎服溫覆令出汗不汗再服

糾。有人患氣促積久不差

遂成水腫服此湯卽效

越脾湯

治腹上浮腫咳喘麻黃三錢蒼朮二錢石膏甘草各一錢右剉作一貼入姜五片枣二枚水煎

水煎服

防已茯苓湯

治皮水上體腫赤茯苓三錢防己黃芪桂枝各一錢半甘草一錢右剉作一貼水煎

水煎服

實脾散 治陰水發腫先實脾土厚朴白朮木瓜草果

大腹子

附子炮

白茯苓各一錢

木香葛姜炮

甘草炙各五分右剉作一

貼姜三枣二水煎服

嫩

復元丹 夫心腎真火能生肺脾真土今真火既虧不
能滋養真土故土不制水水液妄行三焦不

濕

樞機不運脛脹滿溢喘息奔急股冷舌乾不能

正偃小便不通澤瀉二兩半

附子炮二兩

木香茴

正炒川椒獨活厚朴白朮略炒橘皮吳茱萸桂心

各一兩

肉豆蔻煨

柏子各五錢

右爲末糊丸梧子

大紫蘇湯下五十丸此藥世傳屢驗其間君臣佐使與造物同炒當屏去諸藥一日三服且禁慾絕

鹹半

年婦

導滯通經湯

赤茯苓澤瀉各二錢

陳皮桑白皮白朮

大腹子

附子炮

白芍各一錢

木香各一錢

右剉水煎服。

許

痛飲食減少脈弦細而緩此脾胃虛弱而濕氣盛也先服平胃散加白朮赤茯苓草豆蔻諸證皆愈止有四肢浮腫用此藥全愈寶鑑

退腫塌氣散

治積水驚水或飲水過多積於脾故四肢浮腫而身熱赤小豆陳皮蘿蔔子炒各

二錢甘草一錢木香五分右剉作一貼入薑三枣一水煎服

分氣飲

治腫脹喘急桔梗赤茯苓陳皮桑白皮大腹皮枳殼半夏麴蘇子炒蘇葉各一錢草果甘草各五分右剉作一貼

入姜三枣二水煎服效

葶藶丸

治肺氣喘促面目浮腫葶藶子防己木通杏仁貝母各一兩右爲末蒸枣取肉和丸梧子

大桑白皮湯

下五十丸

加味腎氣丸治腎虛不能行水以致浮腫附子炮二
兩白茯苓澤鴻肉桂牛膝車前子炒山

藥山茱萸牡丹皮各一兩熟地黃五兩右爲末

蜜丸如梧子大空心米飲下七十丸或百丸

黃米丸治水蠱乾絲瓜一棒去皮剪碎和巴豆肉十

四粒同炒以巴豆色黃爲度去巴豆入陳倉

米如絲瓜之多少同炒米黃色去瓜取米爲末水

丸梧子大每湯下百丸數服卽愈益絲瓜如人脉

絡引巴豆之氣

入皮膚也

門

漆雄丸治水蠱真生漆一兩鍋內熔化麻布絞去滓
復入鍋內熬乾雄黃一兩爲末右兩末醋糊

和丸梧子大每四丸

麥芽煎湯吞下

門

三花神佑丸治中滿腹脹喘嗽淋閉一切水濕浮

煨腎丸

治脾虛邪水流注腰膝冷腫而痛甘遂生

錢木香一兩右爲末

每錢猪腰子一枚水

開去筋膜擦藥在內薄荷葉裹定外用濕紙四五

重慢火煨熟臨卧細嚼溫酒送下利去黃水爲月

期

五皮散

因他病變作水腫浮虛大腹皮狹苓皮生姜皮桑白皮陳皮各一錢半右剉作一貼水煎

服

赤小豆湯

治年少氣血俱熱生瘡疥變爲腫滿赤小豆猪苓桑白皮防己連翹澤瀉當歸商陸

赤芍藥各一錢右剉作

一貼入姜五水煎服

得

葶苈水香散

治水腫腹脹小便赤大便滑泄滑石三兩白术葶苈子猪苓赤茯苓各一兩木

香澤鴻木通桂皮甘草各五

錢右爲末白湯調下三錢

礪

大橘皮湯

治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利大便滑泄滑石三錢陳皮一錢半白朮赤

茯苓猪苓澤鴻各一錢桂皮七分檳榔六分木香

五分甘草炙四分右剗作一貼入姜五片煎服必

十水證

一曰青水先從左右脇腫起根在心用大戟。二曰赤水先從舌根腫起根在肝用大戟。

三曰黃水先從腰腹腫起根在脾用甘遂。西曰

白水先從腳腫起根在肺用桑白皮。五曰黑水

先從外腎腫起根在腎用連翹。六曰玄水先從

而腫起根在外腎用芫花。七曰風水先從四肢

腫起根在骨用澤鴻。八曰石水先從腎腫起根

在膀胱用藁本。九曰高水先從小腹腫起根在

小腸用巴豆。十曰氣水或盛

或衰根在大腸用赤小豆

十水丸

治十種水氣在十一謂看病相測陰一脉俗名

內經曰君餘九味等分修製焙爲細末蜜丸梧子

大以赤茯苓湯吞下三丸或五丸日二三服忌食

生冷油膩鹹鹽及諸魚酒麪一百二十日。神助

散亦佳

方本草

結陽證之氣濕熱爭故爲腫也邪氣漸盛正氣漸微陽氣衰少致邪伐正氣不宣通故四維發腫諸陽受氣於四肢也今人見手足關節腫痛全以爲風治者誤矣犀角

湯主之

正

犀角湯

治結陽證四肢腫閉犀角玄參各一錢升麻木通各八分連翹柴胡各六分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四

分右剉作一貼水煎服

附水煎服

氣分證血分證

氣爲飲隔痞滿腹鳴骨痛冷痢則曰氣分亦曰水分。經脈不行血化爲水。

四肢紅腫則曰血分皆水氣之所由作也。

氣分宜桂术湯

血分宜桂苓湯

並貼

婦人門詳

桂术湯治氣分桂皮一錢半

白术麻黃細辛甘草各一錢枳殼乾姜各七分半

右剗作一貼醫五

片水煎

服血

桂苓湯治血分桂皮赤茯苓當歸川芎赤芍藥蓬术

三棱桑白皮檳榔蒼朮大腹皮瞿麥青皮陳皮甘草各三分

半右剗作一貼入薑五片水煎搗

婦人產前後浮腫

詳見婦人門

不服藥自去水方

用丹房奇術塗
膏藥消可耕

丹房奇術

治用酒水銀粉硫黃研去巴豆研去油四錢

用新綿一片布臍上次以餅掩之外用帛縛如人

行三五里許自然瀉下惡水待下三五次去藥以

粥補住

鑿○久患者隔日取水一餅可救二三十人

帛縛定水自

小便出

心

塗臍膏

治水腫小便絕少地龍生研猪苓甘遂鍼砂各五錢右爲末搗葱涎調成膏敷臍中約一寸以絹帛束之以小便

多爲度日兩易之婿

消河餅

治水腫臌脹大田螺四箇大蒜五箇車前子末三錢右研成餅貼臍中以帕縛之少時尿

出如注

卽愈

浮腫通治藥

宜加減胃苓湯四苓五皮湯集香湯實脾飲沉香琥珀丸三仁丸椒豉元海金沙散

橘

加減胃苓湯

治浮腫蒼朮一錢半陳皮澤瀉白朮赤茯苓木瓜各一錢厚朴猪苓神麴檀榔

各八分山楂肉縮砂各七分香附子薑汁炒大腹皮各六分甘草炙三分右剉作一貼入薑三燈心

一團水

煎服

四苓五皮湯

治浮腫桑白皮陳皮地骨皮茯苓皮生姜皮大腹皮蒼朮白朮澤瀉猪苓青皮

車前子炒各一錢右

剉作

一貼水煎服

辨疑

集香湯

治虛腫先用此以透關絡然後審證癥之木香

沈香丁香各二錢乳石一錢牛角粉一錢
蜜末每三錢入姜三斤紫蘇五葉煎服空心

實脾飲

治水腫臍脹蒼朮白朮厚朴赤茯苓猪苓澤瀉砂附子枳殼陳皮大腹皮木香

枳殼取

汁各七分

右剉作一貼入燈心

一塊前去滓調木香末服之

回

沉香琥珀丸

治水腫尿澁葶苈子炒佛手仁沉香各

一兩半琥珀

杏仁蘇子赤茯苓澤瀉

鴟各

五錢右爲末

蜜丸梧子大麝香爲衣每

三十丸至五十丸

以蘿蔔子煎湯下

瓣

三仁丸

治水腫喘急大小便不利郁李仁杏仁薏苡仁各一兩右爲末

糊丸梧子大米飲下四五

十九

瓣

椒豉元

治浮腫神方椒目一錢豉二七粒巴豆一箇

去皮心熬右研細滴水和丸菉豆大溫水吞

下三丸或五元以微注爲度氣
盛者巴豆或二箇或三箇治人

海金沙散

治脾濕太過腫脹喘急黑丑頭末一兩半
一半炒一半生白朮一兩甘遂五錢海金
沙三錢右爲末每二錢前

倒流水一盞食前調下陳

一方

治外腎腫大莖物水泡透明方木香流氣飲財
門加白芷木通紫蘇葉煎湯吞下青木香元貯

陰前百粒

效指

又方

腫滿後作瘡或發水疱成瘡是脾土崩壞宜平

胃散

方覲細末清油調付濕則乾摻立愈得

可治不治證

凡浮腫陰囊軟者可治

人

○患腫人腹上

可治

醫書。腫滿善證男

從上而腫下文從下而腫上所患未久宜利腫退

端定則愈矣。男從鄉下腫而止故從頭上腫

而下皆

不治。

男從脚女從頭上腫起皆爲逆

門。

腫起皆爲逆

陰陽微妙如此

門。

大凡虛腫先起於腹而後散

於四肢者可治先起於四肢而後歸於腹者不治

○至若盡脹而肚上有青筋。腹滿而大便滑泄

○久瘡而轉作虛浮。與夫唇黑傷肝缺盆平傷

心臍矣傷脾足心平傷腎背平傷肺皆爲不治之

證○或肉硬或手掌平皆不治疽○唇腫齒焦者

死○卒唇腫而蒼黑者死○掌中無紋者死○臍

腫凸出者死○缺盆平者死○陰囊莖俱腫者死

○脉絕口張足腫者死○足趺腫膝加斗者死

正傳

○凡水腫大喘氣壅不食乃腎水

盈溢上行傍浸於肺也不治得

禁忌法

凡水腫惟忌鹽雖毫末許不得入口若無以爲

滋味卽水病去後宜以醋少許調和飲食不能忌

鹽勿服菜果欲去病切須忌鹽竭○尤忌鹹刺犯

之流水而死○凡水腫極忌甘藥助濕作満臘○

病嗽反水全

宜禁鹽本

單方 飲二氣散雞醴飲

桑柴灰汁 桑柴灰水淋取清汁煮赤小豆作粥服大下水脹

桑白皮 治水腫喘急桑白皮四兩青梁米四合同煮爛取消飲名桑白皮飲

白术 治四肢腫滿白术三兩剉大

澤鴻 或爲末白湯調下日二三帖
逐膀胱三焦停水或剉煎服

葶藶子 治頭面手足虛腫又治水氣喘急葶藶子隔紙炒爲末枣肉和丸小豆大麻子煎湯下十

丸日三頓。治水腫葶藶三兩爲細末防已末四兩綠頭鵝切頭壓血於白中令血盡納藥末和鳴

頭更搗五千枚丸如梧子空心白
湯下十丸此藥利小便如神
鞞

商陸能瀉十種水病取白色生根細切雜生鯉魚煮作羹湯服之鞞

牽牛子治水氣蠱脹白丑黑丑頭末各取二錢大麥麴二兩和作燒餅臨卧茶清嚼下降氣爲驗名曰二氣散飴○水屬腎行腎之水無如黑牽牛取細末入於猪腎慢火煨熟而溫酒嚼下則借腎大腎兩得其便惡水既泄不復泛溢矣鞞

草麻子治十種水氣五蠱瘴氣草麻子去殼用麻布包壓去油薄攤在木杓內仰放在鍋中水面
上以蓋合住煮二十餘沸以藥無白色爲度取出
每服六錢滾水化開空心溫服不過二三劑以小
便大利爲效鞞

東醫寶鏡

卷之三

郁李仁

治水腫腹脹喘急大小便秘澁。郁李仁一兩研取汁，薏苡仁末二合和煮粥食之。又

方：郁李仁一合爲末，和麪作燒餅。

與喫節大便通利氣便差。

鯉魚

治水腫脚滿氣急。鯉魚肉十兩，葱白一握，麻子

一升

取汁煮作羹，入鹽豉姜椒調和空心食之。

啾。

又方：大鯉魚取肉赤小豆二升，以水一斗

司煮取

二升許，汁去滓分三服，當下利。卽差。

蠆蟇

治十種水病。腫滿喘促，生土狗一箇，手足全者研細，入縮砂末等分，用酒調下，一匙。

五月

日取蠆蟇不拘多少，可見日焙乾，每一病以

七箇爲度，先用七箇頭治上次，用腹治中次，用足

治下，皆爲末，空心

好酒調下。

黑豆

治浮腫。黑豆一升水五升煮取三升，汁去滓，納酒五升，更煮取三升，去滓分三服，不差再合服。

赤小豆

治水腫下水氣和桑白皮或通草煮服之。
又方赤小豆五合葫一頭生姜三錢並碎白

色商陸一條切同水煮豆爛湯成去葫姜商陸只
細嚼豆空腹食之旋旋啜汁令盡腫立消便止鞣

冬瓜

水病初得危急冬瓜不限多少任
喫神效或取汁服久病忌之

芒瓠

瓠治浮腫下水取白瓠實捻如大豆粒以綿裹
煮一沸空心服七枚水自出不止大瘦乃差
三年內慎日味鞣○苦瓠須擇

用細理潔淨者不爾有毒

羶

雞屎

治水腫氣腫濕腫皆效乾雞糞一升炒黃好清
酒三碗淬下煮作一碗瀘去滓令飲之少頃腹
中大轉動作鳴從大便利下於膝脚及臍上下先
作皴起其腫漸消病未盡再服一劑以田螺二枚

後酒淖熟食之卽

止名雞酥飲醫

青頭鴨治十種水病垂死青頭鴨一隻治如食法和米並五味煮令極熟作粥空腹食之白鳴亦

好。鴨頭能利

水而涼血故也

門

蝦蟆

治水腫鼓脹如神大蝦蟆一箇以縮砂七粒推入其口使吞入腹用罐子盛益泥封固炭火煅

通紅烟盡取出候冷去泥研爲末作一服或酒或

陳皮湯送下候撒屁多乃效

散

。又方治水

腫脹滿癩蝦蟆

二三枚裝在雄豬肚內酒煮一伏時去蝦蟆將肚與酒食盡大便屁如雷或水下其

腫自

消癩

猪肝

治浮腫滿猪肝一具細切以醋洗

蒜鹽食之又以熱水漁單熱亦可

瑞肉治十種水不善垂死瑞肉半斤以粳米三合水
三升入葱椒姜豉作粥食之○又作羹臘食之

下水大

效熱

鍼灸法四肢及面皆浮種灸水分氣海卽消○水腫惟得鍼水溝餘穴則鍼之水盡卽死庸醫多爲人鍼水分殺人多矣惟灸水分最爲要穴蓋此穴能分水不使妄行有人患水腫灸水分與氣海翌日面如削

矣蠶

東醫寶鑑雜病篇卷六上終



東醫寶鑑雜病篇卷之六下

東醫忠勤龜扈 聖居崇祿大夫陽平君許謙奉 教撰

脹滿

脹滿之源身也 常然並脉循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五臟更始四時有序五穀乃化然後厥氣在下榮衛留止寒氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合爲脹也 榮氣循麻衛氣逆爲脈脹衛氣並脉循分爲膚脹也○凡人七情內傷六淫外侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃受水穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否於是清濁相混墜道壅塞氣化濁血瘀鬱爲熱熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經

曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似乎鼓其病者固難以治療故又名曰癰若蟲侵仲有癰之義○飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則脹滿閉塞○濁氣在上則生脹脹注曰濁氣謂寒氣也寒氣在上聚而不散則成脹○足太陰之脈病腹脹足陽明之脈病亦腹脹○太陰所至爲畜滿脾爲陰中之太陰庶陽則不能化五穀乃大寒爲脹滿故脈經云胃中寒則脹滿此之謂也○凡脹初起是氣久則成水治此水腫更難蓋水腫飲食如常鼓脹飲食不及常病根深固必三五年而後成治腫氣補中行濕足矣治脹必補中行濕兼以消導更斷鹽醬音樂妄想不責速效乃可萬全

形證中滿腹脹者其面目四肢不腫而腹脹起脹滿形證中滿腹脹者其面目四肢不腫而腹脹起脹滿形證中滿腹脹者其面目四肢不腫而腹脹起

水行月用正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
滿腹脹肢滿胠腸下厥上胃過在足太陰陽明鉤
○服有虛實虛脹爲邪吐利不食時脹則減按之
則陷而軟○實脹陽熱爲邪身熱咽乾常脹內痛
按之不陷而硬凹○腹滿按之不痛爲虛痛者爲
實可下之○腹脹時減復如故此爲寒宜溫之○
腹滿不減減不足

言須當下之肺

脈法其脉大堅其濶者脹也○體○脉盛而緊曰脹納○
脈滿脉弦脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒浮爲虛
滿緊則中實浮則可治虛則危急渺○關上脉虛
則內脹○遲而滑若脹○虛而緊弦者脹○或弦
而遲或浮而數皆脹也○癥○語
氣脹滿浮大可療虛小難保

脈病有七夫脹者皆在於臟腑之外排臟腑而郭胸脅
張皮膚故命名脹癰○脹有寒脹熱脹穀脹

水脹氣脹血脹蠱脹○脹病亦謂鼓脹○其脅痛
面黑是氣蠱○脇滿小腹脹滿身上有血絲縷是
血鼓○嘂氣作酸飽悶腹脹是食鼓○惡寒手足
厥冷瀉去清水是水鼓○朐腹脹滿有塊如鼓者
是痞散

成鼓

謂

寒脹

者腹滿濡時減吐

劖

利厥冷宜溫之

劖

熱脹

者以陽并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內
熱脉必浮數浮則爲虛數則爲熱陰虛不能宣導

飲食如故腹中脹

滿者爲熱脹

效得

穀脹

失飢傷飽痞悶停酸朝則陰消陽長穀氣易行故
能食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是爲穀
脹

水脹

脾土受濕水積於腸胃而溢於皮膚

滌滌

有聲

怔忪

喘息

是爲水脹

指

指

指

指

指

氣脹

七情鬱結氣道壅塞

上不得降

下不得

升

身體腫大四肢瘦削

是爲氣脹

指

指

指

指

血脹

煩燥漱水迷忘驚狂痛悶

嘔逆小便

赤大便黑婦人多有之

是爲血脹

指

指

指

指

指

指

脹滿治法

適寒涼者脹下之則脹已

納

於內納

○諸腹脹大皆屬於熱

大抵寒脹多

而熱脹少也

納

○鼓脹宜補中行濕此脾虛之甚

必須遠音樂斷厚味大劑

人參白朮佐以陳皮茯

苓蒼朮之類

○治法理宜補脾又須養肺金以

制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得清

化之令却

滋味以防助邪

斷妄想以保母氣無有

不安醫者不察病源急於取效病者苦於脹急喜

行利築以求一時之快殊不知寬得一日半日其

脹愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠此病之起

不遠

此病之起

不遠

因非一年根深蒂固欲取速效自求禍耳知王道者可以語此也。○凡腹脹須用姜製厚朴初得是氣脹宜行氣疏导之劑木香檳榔枳殼青皮陳皮之劑久則成水脹宜行濕利水之劑蒼朮白朮茯苓澤瀉防已之類。○肥人腹脹是濕宜蒼朮茯苓滑石澤瀉○瘦人腹脹是熱宜連芩梔子厚朴○色白人是氣虛宜人參白朮白茯苓陳皮。○中滿比脹稍輕俗云倒飽是也。○詳覘內傷○服有穀脹水脹氣脹血脹又有寒脹熱脹蠱脹。

穀脹

宜雞矢醴散
大異香散

雞矢醴散治穀脹朝食則不能暮食又治氣腫水腫爲末每二錢姜湯調服一升方揭雞屎一大匙炒

黃色細末百沸湯三升取汁每取一大盞調木香

平爲期名曰雞矢醴飲傳

大異香散 治穀脹亦治氣脹 三棱蓬朮青皮陳皮藿香半夏麴桔梗益智仁香附子枳殼各一錢

甘草二分半右剉作一貼入姜五枣二水煎服

水脹 宜防已椒蘚丸木香散

防已椒蘚丸 治水脹凡脹病腹滿口舌乾燥此腸胃間有水氣也 防已椒目葶藶子炒大黃各一兩右爲末蜜丸梧子

大白湯 吞下十九日三匙

木香散 治水脹水香大戟白丑頭朮各等分右爲細末取豬腰子一隻批片摻薑末二錢在內煨熟空心細嚼溫酒送下如食右腰子則揚右臂食左腰子則揚左臂而卧如未全愈則於用上滿塗

甘遂末
却飲甘

草湯則便去

氣脹宜三和湯分心氣飲

勑覘氣鍼元金嚙散

三和湯

治氣脹大小便不利白朮陳皮厚朴各一錢
枳殼海金沙甘草各五分右剉作一貼

姜三水煎服

一名絜矩三和湯傳

氣鍼元

專治氣膨

姜黃青皮各一兩木香丁香胡椒

全蝎肉豆蔻煨各五錢右爲末蘿蔔子二兩

爛研和匀用紅酒生姜汁各少許煮糊和丸

梧子大以紫蘇葉陳皮煎湯下四五十丸

每服

金蟾散治氣鼓如神大蝦蟆一箇以縮砂推大其口

使吞入腹以滿爲度用泥罐封固火煅通紅

烟盡取出候冷去泥細研末爲一服或酒

或陳皮湯調下候屁散多乃覘其效靈

血脹宜人參芎歸湯散

血消腫湯桃奴丸

人參芎歸湯治血脹是瘀血凝聚成脹滿也川芎二錢當歸半夏各一錢半蓬木木香縮砂

烏藥甘草各一錢人參桂皮五靈脂各五分右剉作一貼入姜五枣二紫蘇葉四片水煎服

散血消腫湯

治血脹煩躁漱口與上人參芎歸湯同而無烏藥有芍藥耳

桃奴丸

治血脹及婦人月經不通漸成脹滿與男子血蠱病同桃奴假鼠糞玄胡索肉桂香附子

五靈脂縮砂

桃仁各等分右爲末每三錢溫酒調

下劑○或醋糊和丸梧子大醋湯下三五十丸

寒脹宜中滿分消湯溫胃湯順

氣木香散厚朴橘皮煎

中滿分消湯

治中滿寒脹大小便不通益智仁半夏木香赤茯苓升麻各七分半川芎人參

青皮當歸柴胡生姜乾姜草澄茄黃連黃芪吳茱萸草豆蔻厚朴各五分右判作一貼水煎服

溫胃湯治胃氣虛冷脹滿食不下乾姜炮一錢半附子炮半夏麴厚朴人參陳皮甘草炙當歸各一錢二分半川椒炒一錢

右判作一貼水煎服

搗

順氣木香散治寒脹心腹刺痛面黃氣悶或泄瀉縮

砂丁香皮良姜炮肉桂乾姜陳皮厚朴桔梗茴香炒蒼朮炒各一錢甘草炙五分右判作一貼入姜三枣二水煎服○或爲末益盐沸湯點服

二錢

得

厚朴橘皮煎治傷冷肚腹脹脹如覆榜榜喘息奔急

厚朴三兩枳殼乾姜良姜各一兩二錢

青皮陳皮肉桂全蝎各七錢右爲末醋糊

和丸梧子大生姜橘皮湯下三五十丸服

丸

丸

丸

丸

丸

熱脹 宜七物厚朴湯 桔殼剉散中滿分消丸

七物厚朴湯

治熱脹厚朴三錢 桔實一錢 半大黃廿草各一錢 桂心五分 右剉作一貼 姜五

枣二煎

服婿

枳殼剉散

治熱脹厚朴枳殼桔梗各二錢 大黃蒸廿草炙各一錢 右剉作一貼 姜五枣二水煎

服婦

中滿分消散

治中滿鼓脹及氣脹水脹然只冷熱脹不治寒脹厚朴一兩人參白朮 茯苓 黃芩 黃連 枳實 半夏各五錢 知母四錢 潤澤陳皮各

三錢 白茯苓縮砂乾生姜各二錢 猪苓甘草各一錢 右爲末水浸蒸餅和丸

梧子大熱湯下百丸

鹽脹子諸鹽保命丹
宜消鹽湯消脹飲

消鹽湯 治氣作鹽脹但腹脹而四肢頭面不腫半夏
蘿蔔子炒甘草炙各七分半紫蘇莖葉縮砂
肉豆蔻枳殼青皮陳皮三棱蓬朮檳榔官桂白豆
蔻草豆蔻木香各五分右剉作一貼姜三枣二煎

服

消脹飲子

治鹽脹單腹脹猪苓澤瀉人參白朮赤芍
芩半夏陳皮青皮厚朴紫蘇葉香附子縮

砂木香

檳榔大腹皮木通蘿蔔子

甘草各

五分右剉作一貼

姜五枣二水煎服

醫

諸鹽保命丹

治蜘蛛鹽脹肉蓯蓉三兩青凡紅枣香

附子各一斤

麥芽

一斤半

並爲末先將

蕶蓉束凡入罐內同火煅

烟盡和藥末糊丸梧子大而四散

大每二三十粒食後酒下

○勞單腹脹大而四肢

極瘦者各日熟蠶古方雖有八物湯虛羸去地
黃倍參术加黃連厚朴及諸蠶保命丹蝦蟆煮胞
法訪觀然此皆脾氣虛極
真臟已傷病也不治歟

脹滿通治藥

宜半夏厚朴湯廣木瀆堅湯濟生紫蘇子
湯大正氣散四香散撞開飲子沉香飲分

消湯四聖丸杏柏榔丸同枳殼丸木香
分氣丸消張元木香消張元草澄茄子等

半夏厚朴湯

通治脹滿諸證半夏一錢月朴八分神
麴六分蘇木紅花各五分二粒當歸稍

猪苓升麻各四分內桂蒼朮白茯苓澤瀉柴胡陳
皮生黃芩草豆蔻生甘草各三分木香青皮各二
分吳茱萸黃連乾生姜各一分桃仁七
個且布少許右剉作一貼水煎服

廣木瀆堅湯

治中滿腹脹內有積聚堅硬如石大小
便澀滯半夏一錢牛黃連厚朴黃芩益

智仁草豆蔻當歸各七分陳皮青皮神麌澤瀉柴
胡甘草各五分蓬术升麻吳茱萸各三分紅花二
分右剉作一貼姜三水煎服○服此藥中

滿減半止有積塊乃服半夏厚朴湯

濟生紫蘇子湯治憂思傷脾肺心腹膨脹喘促胸滿

腸鳴

大小便不利肺虛緊而澀白术

二錢蘇子人參各一錢大腹皮草果半夏厚朴木
香陳皮枳殼甘草各五分右剉作一貼入姜三片

枣二枚水

煎服

大正氣散

治風寒暑濕所傷成脹滿白朮蒼朮陳皮

厚朴藿香半夏各一錢枳殼檳榔各七分

桂枝乾姜甘草各五分右剉作

一貼入姜五枣二水煎服

四香散

治脾氣血氣血虧氣盡水盡石蠶揮張似箭
糞木香沉香乳香甘草各二錢川芎葛根

撞關飲子

治脹滿用此衝開關格使脹自消香附子二錢烏藥一錢二分厚朴一錢縮砂八分

三稜白豆蔻甘草各五分丁香沉香各三分右剉作一貼入姜三水煎服○右爲末紫蘇湯調下二

門人
錢

沉香飲

治腹脹氣喘坐卧不得蘿蔔子炒研二錢沉香木香枳殼各一錢右剉作一貼入姜三片水煎服

服婢

分消湯

治中滿成鼓脹滿悶瘡朮白朮陳皮厚朴枳實赤茯苓各一錢香附子猪苓澤瀉大腹皮各八分縮砂六分木香三分右剉作

一貼入姜二片燈心一團水煎服

翻

四聖丸治小兒心腹虛脹全蝎炒一兩胡椒木香青皮去白各一錢半右爲末飯和作丸禁豆大

姜橘湯下五七丸○腹脹由脾胃虛氣攻作也肺與脾爲子母肺主目胞腮之類脾主四肢子母皆虛則目胞腮腫四肢黃色用場氣丸漸消

之場氣丸卽四聖丸去木香青皮也

錢

木香檳榔丸

疎導三焦通利大小便下濕痰凝滯則脹滿自消最爲神效半夏麴皂角酥炙

去皮茲子郁李仁各二兩

木香檳榔枳殼杏仁麴

炒青皮各一兩

右爲末別以皂角四兩沉漿水搓

揉熬膏去滓入練蜜少許和丸

梧子大姜湯下五七十九丸

糊

四炒枳殼丸

治氣血凝滯成鼓脹積聚枳殼米泔浸一兩以水同煮乾炒黃色去茶末一分蘿蔔子一分茴香

去瓢切片四兩分作四分○一分茶末

一分蘿蔔子一分茴香

一兩以水同煮乾炒黃色去茴香○一分乾漆一
兩以水同煮乾炒黃色去乾漆○香附子醋浸炒

二兩○三稜蓬朮各二兩童便並浸一宿次日用

去殼巴豆三十粒同水煮乾炒黃色去巴豆不用

○右爲末用前同炒蒼朮蘿蔔子茴香乾漆同煮
取汁好酒一碗打糊麪和丸梧子大米飲下七九

十九

翻

木香分氣丸

治脾胃不和腹脇膨脹痰嗽喘急飲食
不化木香檳榔青皮蓬朮生乾姜當歸

姜黃玄胡索白朮枳殼三稜赤茯苓陳皮肉豆蔻

右爲末透糊和光小豆大姜湯吞下三五十九個

消脹元

快氣寬中除脹消食黑丑頭末蘿蔔子炒木

香檳榔各等分右爲末滴水和丸梧子大姜

湯下三五十九丸

一名小檳榔元

木香消脹元

治脹滿蘿蔔子炒二兩陳皮大腹子枳殼桑白皮蘇子炒木香附子各一兩檀

榔五錢

木香二錢半右爲末麪糊和丸

梧子大

姜湯或枣湯下五七十九

革澄茄元

治痞滿脹滿穀氣脹革澄茄白豆蔻縮砂青皮蘿蔔子木香陳皮各七錢半肉豆

蔻茴香桂皮丁香各三錢

七分半右爲末

麴糊和丸

梧子大陳皮湯下三五十九

指

濁氣在上則生脹脹

內經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生脹脹註曰濁氣寒氣也

寒在上焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而爲

脹滿○一人患脹夜分尤急脈弦而細正是濁氣土

在上生脢脹也先炙中脘欲引胃中生發之氣土

行陽道後以木香順氣湯服之良愈贛○吳茱萸

湯沉香交泰丸

亦治此證

木香順氣湯

周朴白茯苓澤瀉牛夏各一錢大八

各五分益智仁吳茱萸各三分木香乾生姜升麻

柴胡甘草各四分右剉作一貼入姜三水煎服

○經曰留者行之結者散之以柴胡升麻之苦平行少陽少陰二經發散清氣運行陽分爲君以生

姜半夏草豆蔻益智仁之辛甘大熱消散中寒爲

臣以厚朴木香蒼术青皮之苦辛火溫通順滯氣

當歸人參陳皮之辛甘溫調理榮衛滋養中氣氣

之薄者陽中之陰茯苓甘草澤瀉之氣薄導引濁

陰之氣自天而下故以爲佐濁氣不降以苦泄之

吳茱萸苦熱泄之者也故以爲使氣味相合散之

之上之下之使清濁

之氣各安其位也

吳茱萸湯

治濁氣在上生脢脹乃陰盛生寒腹滿脢脹常如飽不欲食飲吳茱萸厚朴官桂乾

姜各一錢白朮陳皮川椒炒各五分右剉作

一貼水煎服○或爲末每二錢姜湯調服

沉香交泰丸

治濁氣在上生胸脹吳茱萸大黃酒浸各一兩厚朴五錢沉香白朮陳皮各二錢

白茯苓澤瀉當歸木香青皮各二錢右爲末湯浸蒸餅和丸梧子大溫水下七八十九丸研

傷寒熱病腹脹

詳見寒門

脹滿乃真臟病也

脹滿由脾虛之極乃真臟病也如反胃勞瘵亦然皆真臟病也凡人之病

真臟不病則五行相生相制以適於平雖不服藥

而有愈如火極傷金則有水以制之有土以生之如木極克土則有金以制之有火以生之所謂亢則害承迺制也雖然亦有惡藥忌醫而誤之者蓋正氣與病邪不相兩立一勝則一負久則病劇正脫而不免於死然則有病不服藥可乎不用醫可

附

脹滿泄瀉腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃爲氣脫最難救取益智仁濃煎湯服之立愈

附

外敷法 治積聚服滿血蠱等病
宜外敷神膏及外敷藥

外敷神膏

大黃朴硝各四兩麝香一錢爲末
每二兩和大蒜搗成膏敷患處

外敷藥

治腹脹硬如石先用熱水嚼甘草嚥下後用
大戟芫花甘遂海藻等分爲末醋調遍塗腹

上
鵝

可治不可治證 脹滿得之未久或脹或消臍皮稍軟不
泄不喘隨治隨差若臍心突起利後臍

脹久急病羸乏喘息不得安名曰脾腎俱敗不治
謂○腹脹身熱脉大是一逆也○腹鳴而滿四肢清泄其脉大是二逆也○腹大脹四肢青脫形泄甚是三逆也○腹脹血便其脉大時絕是四逆也並不治
謂○腹滿或兼身熱或兼如瘧皆不可治
而下泄不治謂○腹滿或兼身熱或兼如瘧皆不可治
可治瞬○久病羸乏卒然脹滿喘息不得與
夫臍心突起或下利頻頻未見一愈者耳謂

單方

凡十
四種

厚朴治腹脹乃結者散之神藥也謂○有人心腹脹片同煎服滓又煎服五六次卽愈
謂○腹脹必少佐以厚朴者蓋其味辛能散以氣聚上焦故也
胡大戟法治脹取大戟一斗置鍋內與大戟同水煮熟去大戟不用旋旋吃來無時寒盡卽效

鷓鴣屎

治腹滿取黃色作末每一錢溫水調下
卽效○雷公云體寒腹大全賴鷄鴣是也

蝦墓

治蠱脹取一個去內腸入蠅蛆七枚
新瓦上焙焦乾爲末糊丸酒服噙

雞屎

治穀脹及諸脹取屎白炒
黃湯漬之取青汁服之

黑豆

和桑柴灰汁煮服
下水鼓腹脹效

赤小豆

下水煮作粥常服
水煮以桑柴灰

紫蘿莖葉

治心腹脹滿煮作
飲如茶常服

蔓菁子

治心腹脹取一合搗爛水一升和研濾取汁
一盞頓服或自吐或利或汗腹中自寬

蘿蔔子

治腹脹滿炒研水煮如茶常服妙

○蘿蔔取子陳根煮服亦佳

施

大麥麪治脹常食最佳

大麥飯亦好

粥

桑枝茶

下氣消脹常服最佳○或和赤小豆作粥亦良

穀

烏牛屎

治久患氣脹取熱屎空心服一升日一服氣散卽止

椒目

治水蟲能行水作末溫水調一錢服之

鍼灸法

腹中膨脹取內庭○水蟲取偏歷○鼓脹取胸上下左右各刺二寸二分○單蟲服取水

分鍼

八二寸半或灸五十壯○張滿取足三里渴

之○凡脹皆取三里是脹之要穴也○又取中腕

氣海或鍼

或炙瞓

消渴

消渴之源

內經曰二陽結謂之消註曰二陽結謂胃及大腸俱熱結也腸胃藏熱則喜消水穀也

手陽明大腸主津液所生病熱則目黃口乾是津

液不足也足陽明胃主血所生病熱則消穀善飢

血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病也轉○消者燒也如火烹燒物理者

也門○心移寒於肺爲肺消肺消者飲一溲二死

不治註曰金受火邪肺臟消鍊氣無所持故飲一

而溲二也

紺○心移熱於肺傳爲膈消註曰心肺

之間中有斜膈膜膈膜下際內連於橫膈膜故心

熱入肺久久傳化內爲膜熱消渴而多飲也紺○

熟中多食數溲謂之消中紺○凡消癰肥貴人則

膏梁之疾也此人因數食甘美而多肥故其氣上

溢轉爲消渴註曰食肥則勝理密而陽氣不得外

泄故肥令人內熱甘者性氣和緩而發散逆故甘

令人中滿然內熱則陽氣炎上炎上則欲飲而嗌乾中滿則陽氣有餘有餘脾氣上溢故轉爲消渴
納○喜渴者由心熱也心主便汗便汗出多則腎中虛燥故令渴凡夏月渴而汗出多則小便少冬月不汗故小便多

皆平人之常也

聖經

消渴形證渴病有三曰消渴曰消中曰消腎○熱氣上舌赤脣紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴○熱蓄於中脾虛受之復陽蒸胃消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩小便數而甜病屬中焦謂之消中○熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節疼痛精走體虛引水自救飲水不多隨卽尿下小便多而濁病屬下焦謂之渴腎○自消腎而折之又有五石過度之人真氣既盡石勢獨留陽○其強不交精泄謂之強中消渴輕也

消中甚焉。若強中則其氣可立待也。

○上消者肺也。又謂之膈。消多飲水而飲食大便如常。小便清利。○中消者胃也。渴而飲食多。小便亦黃。○下消者腎也。小便濁淋。如膏油之狀。面黑耳焦而形瘦。

○渴而多飲爲上消。消穀善飢爲中消。渴而尿數有膏油爲下消。○五臟六腑皆有津液。熱氣在內。則津液竭少。故爲渴。夫渴者數飲水。其人必頭目眩。背寒而嘔。皆因裏虛故也。

○少傾即吐者火邪假渴耳。呴

○飲水而安睡者實熱也。飲

脈法

○消渴脉實。大病久可治。脉懸小堅。病久不可治。納脈當得緊實。而數反得沉濇而微者死。細爲渴滑者陽氣勝也。○心脉微小爲消痺。○脉數大者生沉小者死。○心脉滑甚爲喜渴。○跌陽脉數。胃中有熱。卽穀消引飲。大便必堅。小便卽

數艸○消渴脉宜
數大忌虛小醫

消渴有三

上消者舌上赤裂大渴引飲膈消是也白虎加人參湯主之卽人參白芍陽門治能食而渴

若不能食而渴宜加味錢氏白朮散又麥門冬飲

子降心湯人參石膏湯

清心蓮子飲和血益氣湯

生津養血湯黃芩湯皆治上消○中消者善食而

瘦自汗大便硬小便數

所謂瘧成爲消中者是也

調胃承氣湯

寒方加減三黃丸

火燒加減三黃丸

火燒

人參甘露湯順氣散

人參散黃連猪肚丸

藕汁膏皆可用○下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便

如膏腮膝枯絰所謂焦煩水易虧者是也六味地

黃丸主之勸飴又宜人參茯苓散加減八味元貯

五加減腎氣丸補腎地黃元鹿茸丸

火

加減腎氣丸補腎地黃元鹿茸丸

○養肺降火

生血爲主分上中下治之

○三消多屬血虛不生津液宜以四物湯飴爲主治上消加人參

五味子麥門冬天花粉煎入牛乳汁生地黃汁生
藕汁酒容生葛根汁調服○中消加知母石膏寒

水石滑石○下消加黃柏知母熟地黃五味子研
○消渴病小便反多如飲水一斗小便亦一斗腎

氣丸

勸飴

主之

加味錢氏白朮散

治消渴不能食又治消中善飢乾

葛二錢人參白朮白茯苓藿香甘

草各一錢

木香柴胡枳殼五味子

各五分右剉

作一貼水煎服

燙

麥門冬飲子

治膈消麥門冬二錢知母天花粉人參

五味子葛根茯神生地黃甘草各一錢

右剉作一貼入竹

葉十片煎服

酽

降心湯

治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉二錢人參遠志當歸地黃白茯苓炙

黃芪蜜炒五味子甘草各一錢

右剉作一貼入枣二水煎服效得

人參石膏湯

治膈消石膏四錢知母二錢三分人參一錢七分甘草一錢三分右剉作一貼

水煎

服得效

清心蓮子飲

治心火上炎口乾煩渴小便赤澀蓮子二錢赤茯苓人參黃芪各一錢黃芩車前子炒麥門冬地骨皮甘草各

七分右剉作一貼水煎服

和血益氣湯

治消渴小便數舌上赤脉肌體枯瘦黃酒洗各八分石膏杏仁桃仁各六分知母防已羌活各五分當歸稍四分柴胡麻黃根生甘草炙甘草各三分紅花少許右

剉作一貼水煎服

生津養血湯

治上消當歸白芍藥生地黃麥門冬各一錢川芎黃連各八分天花粉七分知母黃柏並蜜浸蓮肉烏梅薄荷甘草各五分右剉作一貼水煎服

醫鑑
草各五分右剉作一貼水煎服

黃芩湯

治上消片芩梔子桔梗麥門冬當歸生地黃天花粉乾葛人參白芍藥各一錢右剉作一

貼入烏梅一

個水煎服

蘭香飲子

治消渴善食而瘦二便結數石膏三錢知母一錢半生甘草防風各一錢炙甘草人參蘭香葉連翹白豆蔻桔梗升麻各五分半夏二

錢右爲末蒸餅糊調成餅晒乾爲末每二錢淡姜湯調

下嗽

生津甘露湯

治消中能食而瘦大便燥小便數石膏草龍膽黃柏各一錢柴胡羌活黃芪酒

知母酒黃芩炙甘草各八分當歸身六分升麻四分防風防已生地黃生甘草各三分杏仁十個桃仁五個紅花少許右剉作一貼水二盞煎至一盞加酒一匙稍熟服不拘時○一名清涼飲子疎

順氣散治消中能飮食小便黃赤以此微利至不飲食而愈厚朴二錢半大黃二錢枳實一錢右

剉作一貼水煎

服不拘時

研

人參散治消中滑石二兩寒水石甘草各一兩石膏五錢人參二錢半右爲末每取二錢溫水調

和研

黃連豬肚丸

治消渴消中亦治強中證雄猪肚一個黃連五兩麥門冬知母瓜萎根各四兩

右四味爲末入猪肚內以線封口置甑中蒸爛於石臼中令搗爛入密少許作丸梧子大米飲下百

傳正

藕汁膏

治胃熱消中
黃連天花粉末佐以姜汁白蜜爲膏以匙抄

取徐徐留舌上以白

湯送下日三四次

訛

人參茯苓散

治腎消尿濁如膏滑石寒水石各一錢半甘草七分赤茯苓乾葛黃芩薄荷大

黃各五分連翹三分人參白朮澤瀉桔梗梔子天花粉縮砂各二分右剉作一貼水煎服

醫鑑

○一名

人參

散

加減腎氣丸

治腎消口燥煩渴兩脚枯瘦熟地黃二
兩牡丹皮白茯苓山茱萸五味子澤瀉

鹿茸山藥各一兩肉桂沉香各五錢右爲

末蜜丸梧子大空心鹽湯下七八十丸

補腎地黃丸

治腎消能降心火益腎水止消渴明耳目
黃柏一斤剉同地黃晒乾生地黃半

斤

酒浸二日蒸爛研膏與黃連拌晒乾白茯苓四

兩熟

地黃天門冬人參甘菊各二兩條芩酒炒當

歸枳殼

麥門冬片夢生各一兩右爲末

水丸

梧子大空心鹽水下七十八十九粒

鹿茸丸

治腎虛消渴小便無度麥門冬二兩鹿茸熟地黃黃芪五味子雞肫腔炒肉從蓉酒浸

山茱萸破故帛炒牛膝酒浸人參各七錢半白茯苓

地骨皮玄參各五錢右爲末蜜丸梧子大空心米飲下五

七十丸

砂

食休證

內經曰大腸移熱於胃善食而瘦亦謂之食休○胃移熱於膽亦曰食休註曰休易也飲

食移易

而過不生肌膚也治法與消中同

消渴小便甜

消渴者腎虛所致每發則小便以甜以物理推之淋鶴醋酒作輔法須臾卽甜足明

入之食後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸炎氣化成精氣下入骨髓其次爲脂膏又其次爲血內其餘則爲小便故小便色黃血之餘也五藏之氣鹹潤者則下味也若腰腎旣虛冷則不能蒸化穀氣盡下爲小便故味甘不寔其色清冷則肌膚枯槁也

消渴由坎火衰少

肺爲五臟華蓋若下有暖氣蒸則肺潤若下冷極則陽不能升故肺乾而渴易乾上坤下其卦爲否陽無陰不降陰無陽不升故成否也譬如釜中有水以火煖之又以版覆

則暖氣上騰故版能潤若無火力則水氣不能上升此版終不得潤火力者腰腎強盛常須煖補腎氣飲食得火力則潤上而易消亦免渴乾之患宜服八味腎氣丸神子元祐軒

卷下雜病篇

東醫寶鏡

卷之三

消渴與胠氣相反

消渴與胠氣雖皆爲腎虛所致其爲病則相反胠氣始發於二三月盛於

五六月衰於七八月

消渴始發於七八月盛於十

一十二月衰於二三月

其故何也蓋胠氣壅疾也

消渴宣疾也

春夏陽氣上故壅疾發而宣疾愈秋

冬陽氣下故宣疾發而壅疾愈審此二者疾可理

也

脉

消渴通治藥

宜滋陰養榮湯活血潤燥生津飲白桑皮

湯梅花湯大黃甘草飲子清神補血湯黃

芪湯

大花散黃連地黃湯生地黃飲子門冬飲子

王泉散玄菟丹

三消丸玉泉丸五汁玉泉丸生地

黃膏荔枝膏衛

生天花丸

脯

滋陰養榮湯

治消渴亡津液口燥咽乾當歸一錢人參生地黃各一錢半麥門冬白芍知母

黃柏並蜜水炒各一錢甘草五分五味子十五粒右剉作一貼水煎服

活血潤燥生津飲

通治消渴天門冬麥門冬五味子
瓜蔞仁麻子仁當歸熟地黃生地

黃天花粉甘草各一錢

右剉作一貼水煎服

桑白皮湯

治三消渴疾童根桑白皮細末二錢白朮
芩人參麥門冬乾葛山藥桂皮各一錢甘

草五分右剉作

一貼水煎服

嫩

梅花湯

治三消渴利神效糯穀旋炒作曝桑根白皮
厚者細切各五錢右作一貼水煎服則飲之

不拘

時嫩

大黃甘草飲之

治一切消渴大黃一两半甘草大者四兩剉黑豆五升另煮三沸去苦水

右用井水一桶同煮爛令病人
食豆飲汁無時不三劑病去

清神補氣湯

消渴證總愈止。一口乾此藥主之。升麻一錢半。柴胡當歸身荆芥穗防已桃仁

泥各一錢。黃柏酒洗。黃連酒洗。知母生甘草各五分。石膏熟地黃各四分。生地黃細辛各二分。杏仁六個。川椒二粒。紅花少許。右剉作一

貼水煎服。○一名辛潤緩肌湯。蠅

黃芪湯

治諸渴。生乾地黃各二錢。黃芪茯苓天花粉麥冬各一錢。五味子甘草各五分。右剉作一

貼水煎

服

罐

天花散

治消渴。天花粉生乾地黃各二錢。乾葛麥門冬五味子各一錢。甘草五分。右剉作一貼。粳

米百粒

煎服

黃連地黃湯

治三消黃連生地黃天花粉五味子當歸人參乾葛白茯苓麥門冬甘草各一錢右剉作一貼姜二枣同煎服

錢右剉作一貼姜二枣同煎服

生地黃飲子

治消渴人參生乾地黃熟地黃黃芩天門冬麥門冬枳殼石斛枇杷葉無則條之澤瀉各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服○

此方乃二蔭元合廿露飲材也生津補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼導二府使心火下行則小便清利肺經潤澤則大便流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙

無踰此

效得

門冬飲子

治老虛人消渴麥門冬二錢五味子人參地骨皮白茯苓甘草各一錢右剉作一貼

姜三片

煎服

玉泉散

治消渴之聖藥天花粉二錢葛根麥門冬生地五味子甘草各一錢右剉作一貼糯米一

合煎

服醫

玄菟丹

治三消渴利神藥禁遺精止白濁延年兔絲子十兩酒浸製五味子七兩白茯苓蓮子肉

山藥

各三兩右爲末別研山藥末三兩將兔絲子所浸酒煮糊和丸梧子大空心米飲下五七十丸

○煉蜜和

丸亦佳

燉

三消丸

通治消渴黃連淨爲細末不以多少冬瓜搗取自然汁和作餅陰乾再寫末再浸再乾至

七次卽用

冬瓜汁和丸梧子大煎大麥仁

湯送下

五七十丸

一名瓜蓮丸

玉泉丸

治消渴口乾天花粉乾葛各一兩半麥門冬人參白茯苓黃芪半生半蜜炒烏梅甘草各

一兩右爲末蜜丸下

肺

五汁玉泉丸

治消渴黃連乾葛天花粉知母麥門冬

甘草各

一兩右爲末另取人乳汁牛乳汁甘蔗汁

以糖用梨汁藕汁先將各汁入蜜一斤半煎成稀

膏後將各藥末和前蜜五七沸每取五膏

茶匙米飲調下日二三服忌辛熱之物

春

生地黃膏

治渴通用生地黃二斤蜜一碗白茯苓一
兩人參五錢右地黃洗擣取汁與蜜煎至

半次入參芩末拌和磁器

盛以匙挑服溫水送下

燭

荔枝膏

止消渴生津液乳糖二十六兩清蜜十四兩
烏梅肉八兩生姜五兩取汁麝香五分右先

取清蜜烏梅肉以水一斗五升熬至半濾去渣下
乳糖熬候糖熔化入姜汁再熬乃入麝和勻每取

一大匙新水調
下日二三匙

衛生天花元

歌曰消渴消中消腎病三焦五臟生虛熱惟有膀胱冷似冰意中飲水無休歇

小便晝夜不流通骨冷皮焦心肺裂本因飲酒多

傳多酒餘色慾勞無節飲水喫食日加增肌骨精

髓轉枯竭璇渾甜如蜜滑如油口苦咽乾舌如血三

消病狀最爲危有此仙方真妙訣○黃連童便浸

三日三兩白扁豆炒二兩蘆薈七錢半辰砂白茯

苓牡蠣粉知母苦參鐵粉天花粉各五錢金銀箔

各二十片右爲末生瓜蔓根汁和生蜜

爲丸梧子大麥門冬湯下三五十丸

治嗜酒積熱津枯燥煩渴引飲專嗜冷物宜龍鳳

元烏枚木瓜湯五豆湯酒蒸黃連丸勗隈朱砂黃

連元

酒渴

龍鳳丸

治酒渴山茱萸絲子各二兩鹿茸火燉酒浸一兩右爲末蜜丸梧子大米飲下三五十

丸得

烏梅木瓜湯

治酒熱消渴烏梅打碎不去仁木瓜各二錢麥芽炒草果甘草各一錢右剉作

一貼姜五片

水煎服

婢

五豆湯

解酒毒止消渴乾葛甘草並剉各一斤貫衆八兩黑豆黃豆綠豆青豆赤小豆各一兩右

以水五斗五升

臘八日

剗入

用大鍋熬至熟濾去

滓盛磁器封口

春夏月開用隨意飲之大人渴後

生瘡最妙酒

後渴尤好

翊

朱砂黃連元

治酣飲成消渴黃連二兩生乾地黃二兩朱砂一兩右爲末蜜丸梧子大燭心

東湯吞下三

五十九瓣

蟲渴

虫在臟腑耗其津液而
成消渴宜苦練湯效得

苦練湯

治虫渴苦練根皮一握切焙入麝香少許水
二盞煎至一盞空心飲之雖困頓不妨自後

下虫三四條其痛頓止乃知消

渴

一證有虫耗其精液也瓣

強中證

多因耽嗜色慾或服丹石真氣既脫熱邪獨盛
飲食如湯消雪肌膚曰削小便如膏油陽強興

盛不交精泄三消之中最爲難治姑錄一二

方

聊爲備用宜石子齊荅湯黃連猪肚丸瓣

石子齊荅湯

治強中證齊荅石羔各一錢半人參茯

苓

神曲蓼根磁石知母乾葛黃芩甘草各

一錢右剉作一貼先以水三盞猪腰子一個黑豆

一合煮至一盞半去滓入藥煎至七分去滓食後

服次投

下藥

黃連豬肚丸

治同上服上藥後服此雄豬肚一個黃連小麥炒各五兩天花粉陳神各樣四

兩麥門冬二兩右爲末入脂肚中封口安臘中蒸爛搗爛作丸梧子大米飲下七十九丸入練蜜少

許亦可得

消渴傳變證

消渴之疾未傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆爲不治之證

潔古人

分而治之能食而渴者白虎加大參湯

勑覲

主之或加減白虎湯不飲食而渴者錢氏白

术散

彷彿倍加葛根與之或加減白术散上中既

平不復傳下消矣

○或曰未傳癰疽者何也此

火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也未傳

中滿者何也如上消中消制之太急寒

藥傷胃久

而成中滿之疾所謂上熱未除中寒復生也○
消渴久病變成發癰疽或成水病或雙目失明
○甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹爲腫滿猛火自
炎留於分肉則發爲癰疽此又病之深而證之變
者也○瀕○渴利者謂隨飲卽小便也由腎氣虛不
能制水液故隨飲卽小便也以其內熱故小便利
小便利則津液竭津液竭則經絡濕經絡濕則榮
衛不行榮衛不行則熱氣留溢故成癰疽也○瀕
加減白虎湯 石羔二錢半知母一錢人參黃柏各七分玄参甘草各五分五味子十粒右剉

作一貼入糯米

蜜

百粒水煎服

右剉作一貼

水煎服

蜜

加減白朮散

乾葛二錢人參白朮白茯苓各一錢木香知母黃柏甘草各五分五味子九粒

消渴須預防癰疽

消渴之人常須慮患大癰必於骨節間忽發癰疽而卒須預防之宜加減

八味元黃芪六一湯

勸觀忍冬元長

服爲妙又益元散

勸觀

井水調服

加減八味元

勸觀

此方有五味子最爲得力不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加壯

忍冬元

渴疾須預防發癰疽忍冬草不拘多少根莖花葉皆可用右剉酒浸糠火煨一宿取出晒

乾入甘草少許搗爲末以所浸酒爲糊和丸梧子

大酒飲任下百丸此不特治癰疽亦能止渴

不治證

內經曰肺消者飲一溲二死不治蓋肺藏氣

筋骨血脉餘者爲溲肺病則津液無氣管攝而精微者亦隨溲下故飲一溲二而如膏油也津液下

微者亦隨溲下故飲一溲二而如膏油也津液下

脫未能榮養故漸形瘦焦乾也或問經云飲一溲二死不治仲景復用八味丸治之何也曰飲一未至溲二者病尙淺猶可治故仲景腎氣丸治飲水一升小便亦一升之證若小便過於所飲則無及矣謂消渴之餘傳爲脹溌發

爲癰疽及強中證皆不治

禁忌法內經曰熱中消中不可服膏粱芳草石藥○消渴病宜慎者有三一飲酒二房勞三鹹食及麯能慎此三者雖不服藥亦可自愈針○凡消渴大忌飲酒房事及食炙燭辛熱鹹藏之物○百日以上不可鍼灸鍼灸則瘡中出膿水不止而死謂渴疾大忌半夏南星燥劑陳

單方十種

石膏主消渴搗末取五錢和糯米煮取汁飲

竹葉

主消渴取青葉煮汁飲之

滑石

治消渴爲末取三錢井水或蜜水調下卽益元散也

醫鑑

地漿

治熱渴心悶取一盞飲之

竹瀝

治消渴不拘時恣飲之妙雷公云久渴心煩宜投竹瀝

麥門冬

治消渴及口乾燥渴去心煮湯飲之

黃柏

治消渴水煎服又作末水丸服之

黃連

治消渴要藥酒浸蒸晒乾爲末蜜丸白湯下五十九

黃芪

治消渴凡消渴而欲發瘡或病癰疽而後渴宜多取黃芪煮湯服之妙

葛根

主消渴取五錢水煎飲之
又取生者搗汁亦好
根

瓜萎根

卽天花粉也治消渴之聖藥也
水煎取汁隨意飲之甚佳
根

漬苧汁

主消渴取生苧水
漬取汁飲之
根

地骨皮

治消渴取苧水
漬取汁飲之
根

蚊蛤

卽五棓子也最能回津止渴
爲末沸湯調下二錢最妙
入

忍冬草

治消渴水煮取
汁四時長服
根

桑枝茶

療口乾如茶
常服爲佳
根

桑根白皮

主熱渴水煎飲之○黑椹搗濾去滓入石
器中入蜜熬膏每取一二三匙沸湯點服止
根

渴生津

神
韓

牡蠣肉

治酒渴和姜醋生

食之俗名石花韓

蚌蛤

主消渴煮食或和

姜醋生食並佳韓

鮑魚涎

主三消取涎拌黃連末作丸
烏梅湯下五十丸渴頓減韓

田螺

治消渴小便數取螺五升水一斗浸經宿取
水飲之每日易水又取螺煮汁飲食肉良韓

生藕

取汁一盞入蜜一合
分三服止渴再好瞞

紅柿

止渴取啖之韓

烏梅

療口乾止消渴作
湯和少蜜常服韓

東醫錄 卷之三
梨止消渴取消

梨常常啖之最治心熱渴

韓

獮鵠桃止消渴取霜後熟者常啖之

五味子止消渴最良作飲常啜之

又作丸久服生津止渴

韓

麻仁止消渴麻仁一升搗碎之水

三升煮取汁溫涼任服

韓

粟米泔酸者取消渴甚良常取飲之泔久留則酸

韓

菉豆治消渴煮汁飲之或研取汁服並佳

韓

青粱米主熱中消渴煮取汁飲之或煮粥或作飯常食佳

韓

糯米主消渴润取泔飲之又水研取白汁恣飲之以差爲度○糯稻稈灰淋汁飲之甚妙一人病渴

殆死有人教以糯稻稈斬去穗及根取中心净器
中燒作灰每取一合湯水一碗沃浸良久澄去滓

取清頓飲之卽

取效如神

本草

冬瓜

主三消渴搗絞取汁飲之

又作美

作虆常食佳

蓴

虆常食佳

本草

菘菜

治消渴常食最佳或取汁飲亦可

本草

雄雞

治三消渴疾退雄雞湯澄清飲之神效

本草

○白雄雞尤佳

本草

白鷺

主消渴煮取

汁飲之

黃雌雞

主消渴煮熟取汁飲之內亦可食

本草

牛乳

主消渴取生乳渴則飲之
又作酥粥常食亦佳

猪肚

止渴利爛蒸和
姜醋食之

黃疸

黃疸之因

經曰濕熱相交民病瘡瘍卽黃單陽而無陰也

○附

○諸發黃皆小便不利惟瘀血發黃小

便有利

○蓋熱結下焦則熱耗津液而小便不利

○結下焦則熱

○但耗血而不耗津液故小便有利

○發黃譬如會翹五疽同歸濕熱蓋濕熱熏蒸血

○熱色黃上行而目延及爪甲身體俱黃黃卽疽也

○附

○蓋黃疸者濕熱與宿穀故也俗謂之食勞黃

○附

○食勞瘡黃一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲景以十八日爲期食勞黃者宿病也至有久不愈者

○凡病當汗而不汗則生黃當利小便而不

利亦生黃疽脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合故
也癰○五疽同是濕熱終無寒熱之異體○脉沉
渴欲飲水小便不利者必發黃疽○腹脹滿而萎
黃躁不得睡屬黃家癰○凡時行感胃及伏暑未
解宿食未消皆能發黃疽○時行疫癘亦能發黃
殺人最急門○傷寒病遇太陽太陰司天若下之
太過往往變成陰黃寒水太過

土氣不及故多變此疾癰

黃疽有五身癟而色微黃齒垢黃爪甲上黃皆黃疽也
黃赤也納○尿黃赤安卧者曰黃疽註曰安卧而尿
疽納○疽病有五一曰黃疽二曰酒疽三曰穀疽
四曰女勞疽

五曰黃汗

黃疽者小便面目牙齒肢體如金因暴熱用冷水洗浴
熱留胃中故食已善眠安卧懶動門○已食如飢

但欲安卧小便如

柏汁者黃疽

酒疽

病酒發疽必小便不利其候心中熱足下熱是其證也

疽

○心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒

疽

○酒疽黃色心中結熱而煩

○繒

○飲酒常

多進食常少心中懊憹鼻燥足熱是謂酒疽

○疽

○酒疽指

穀疽

穀疽之爲病寒熱不食食則頭眩心中不安久久

○穀疽

○穀疽者食已頭眩

○腹脹因胃熱大飢過

○食停滯所致

○食則腹滿

○拂鬱眩心松

○是爲穀疽

○指

女勞疽

○上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小

○便自利名曰女勞疽

○大勞當慾大熱交接

○以致發熱惡寒小腹滿急

○是謂色疽亦曰女勞疽

○指

黃汗

○黃汗之病身腫發熱汗出

○而渴汗出染衣色正黃

○如蓄柏汁以汗出時人水浴得之紓

○發熱不渴

○指

剉作一貼姜三片燈心一撮水
煎服小便不利合五苓散服

加減胃苓湯

治黃疸飲食無味行步倦怠脉濁而濡
胃苓湯方

大觀

去桂加霍香半夏大腹皮

山楂子蘿蔔子三稜蓬

术青皮各

五分

右剉作一貼入姜三枣二水煎服

醫門

二水煎服

茵陳散

治濕熱黃疸茵陳梔子赤茯苓

猪苓澤瀉蒼

术枳實黃連厚朴滑石各

一錢右剉作一貼

燈心一握

同煎服

春

酒疽

宜半溫半熱湯梔子大黃湯葛术湯酒浸黃連

元勸觀酒後犯房成疽宜辰砂妙香散

散

防覲

方

前胡

神

胡

半溫半熱湯

治酒疽半夏赤茯苓白术各一錢前胡

枳殼大戟甘草各七分黃芩當歸茵陳

各五分右剉作一貼

姜三片水煎服

火

方

梔子大黃湯 治酒疸梔子大黃各二錢枳實一錢
錢豉一合右剉作一貼水煎服

葛术湯

治酒疸葛根蒼术各二錢枳實梔子甘草各一錢豆豉一合右剉作一貼水煎服

當歸白朮湯

治酒疸有飲癖心胸堅溼不進飲食小便赤黃赤茯苓一錢半蒼术枳實杏仁

前胡葛根甘草各七錢半夏一分半當歸黃芩

茵陳各五分右剉作一貼姜三水煎服

宜茵陳梔子湯茵陳湯牛黃散子紫金丹

穀疽

丹穀疽丸小溫中丸大溫中丸鍼砂丸

茵陳梔子湯

治穀疽茵陳三錢大黃梔子各一錢右剉作一貼水煎服

效得

茵陳湯

治穀疽茵陳三錢大黃梔子各一錢右剉作一貼水煎服

效得

牛黃散子

治穀疽酒疸及水氣蠱脹黑丑取頭末春八分夏九分秋七分冬一錢○大黃春分

身腫而汗汗如黃

柏汁曰黃汗

指

脈法

五疽實熱脉必洪數其或微澀證屬虛弱
辨○疽脉緩大者順弦急而堅者逆

黃疽治法

諸疽小便

黃赤色者爲濕熱

當作濕熱治

仲景

○諸疽小便

不利爲裏

實宜利小便

或下之利小便

宜茵陳五苓散下之

仲景

虛寒證當作虛勞治之

仲景○諸疽小便

不利爲裏

宜黃連散

○無汗爲表實

宜發汗或吐之

發汗宜

麻黃醇酒湯

吐之宜瓜蒂散

仲景

○色如烟熏黃乃

濕病也

一身盡痛色如橘子

黃乃黃病也

一身不

痛濕家之黃色暗

不明熱家之黃

如橘子色甚者

似輕則滲利重則大下

黃自退矣

○治黃疽與濕熱相

積者下其食積其餘但利小便

爲先小便利白其黃自退

辨

○黃疽因食

積者下其食積其餘但利小便

爲先小便利白其黃自退

辨

黃連散

治黃疽壅熱二便秘澀夫黃醋炒一兩黃芩

黃連甘草各一兩右爲細末溫水調下二錢

日二服

先用爪蒂散橘鼻取下黃水却服

此藥外以生姜茵陳同搗爛遍身擦之

麻黃醇酒湯

治黃疽麻黃一兩好酒一升半煮至半去滓頓服之冬用酒春夏用米泔

黃疽

宜茵陳五苓散茵陳三物湯陶氏茵陳湯加減胃苓湯茵陳散

茵陳五苓散

治濕熱黃疽茵陳一兩五苓散五錢右爲末每二錢米飲調下○或剉一兩水

煎服亦可入門

茵陳三物湯

治黃疽小便不利茵陳三錢梔子黃連各二錢右剉作一貼水煎服之

陶氏茵陳湯

治黃疽熱盛大便不利茵陳二錢大黃梔子仁厚朴枳實黃芩甘草各一錢右

未夏九分秋七分冬一錢○檳榔春八分夏九分
秋七分冬四分○甘草春八分夏九分秋七分冬

四分○

右細末每服三錢五更時面東

南井華

水調服疾隨下卽愈忌生冷

醫

穀疽丸

治胃暑瘍熱食穀不消熟鬱發黃苦參三兩

草龍膽一兩

人參七錢半梔子仁五錢右爲

末牛膽汁

猪胰和

丸梧子大以大粥

飲下五十丸

日二門

一名苦參元

婢

小溫中湯

治食積疽白朮三兩山楂肉青皮蒼朮神

麵各二兩

香附子便製一兩半鍼砂一兩

右爲末

醋糊和丸梧子大空心益湯下七

八十丸脾虛者須以參术陳甘湯使

附

大溫中湯

治黃疽黃胖黃腫香附子一兩半鍼砂一

兩陳皮蒼朮厚朴青皮三棱蓬朮黃連苦

參白朮各五錢生甘草一錢製法服法同上○可

借此爲制肝燥皮之用○鍼砂代以青礬亦妙

附

鍼砂丸

治穀疽酒疽濕熱發黃等證鍼砂炒紅醋淬八兩香附子童便製蒼朮各四兩神麃炒茵

陳姜汁

炒麥芽炒各二兩芍藥當歸生地黃川芎

青皮各一兩半三稜蓬朮並醋煮陳皮各一兩梔

子炒姜黃升麻乾漆炒各五錢右爲末

醋糊和

丸梧子大姜湯下六七十丸

正

紫金丹

治食勞氣勞遍身黃腫欲變成水膽礬三兩黃蟾二兩大枣五十枚右以銀石器內入好

醋三升先

下礬末慢火熬半日取出枣去皮核次

下礬熬一二時如膏入蠟

茶末二兩和丸梧子大

每服二十九茶酒任下礬以鴻肝枣以補脾極

妙丸○無膽礬用綠礬○一人患酒疽下血面如

蠟服此

卽愈

丸

女勞疽

宜藜硝散石膏散

秦艽飲子腎疽湯

礬硝散 治女勞疽白礬硝石各一錢右爲末以大麥粥飲調下一服○一方去硝石代滑石治濕疽

附

石膏散

治女勞疽身黃額黑日脯發熱小腹急足下石膏煅滑石各等分右爲末每二錢大麥

粥飲調

下婦

秦艽飲子

治女勞疽秦艽當歸芍藥白术桂皮赤芍芩陳皮熟地黃川芎小草各一錢半夏甘草各五分右剉作一

貼姜五片水煎服

效

腎疽湯

治腎疽目黃尿赤蒼朮一錢升麻姜活防風藁本獨活柴葛根白术各五分豬苓四分

澤鴻神

人參甘草各三分黃芩黃柏各二分右剉作一貼水煎服

效

東醫寶鑑

黃汗
宜芪陳湯桂枝黃芪湯

芪陳湯

治黃汗石膏二錢黃芪赤芍藥茵陳麥門冬豆豉各一錢甘草五分右剉作一貼入姜五

片水煎服臥

一名黃芪散臥

桂枝黃芪湯

治黃汗黃芪二錢半桂枝芍藥各一錢半甘草一錢右剉作一貼好酒三合水

一盞半煎服得名黃芪桂

桂枝湯

仲景

○又名桂枝苦酒湯

明人

酒疽最重

五疽之中惟酒疽變證最多蓋酒之爲物隨人性最不同有盈石而不醉者有濡脣而輒

亂者以醞釀而成有大熱毒滲入百脉不止發黃而已溢於皮膚爲黑爲腫流於清氣道中則眼黃

鼻艱種種

不同也

效得

黑疽難治

脾與腎俱病爲黑疽色疽又名女勞疽身黃額黑疽○黃家日晡時當發熱反惡寒此爲

女勞得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因而作黑疽腹脹如水狀大便黑或時溏此女勞之病非水也腹滿者難治○酒疽因下之久久變爲黑疽目青面黑心中如咬蒜壘狀大便正黑小便亦或

黑難治

仲景

陰黃 治陰黃身體但黃肢體沉重皆寒身冷心下痞梗自汗小便利脉緊細空虛此寒冷過度變陽爲陰也或遇太陽太陰司天之歲寒濕太過亦變此疾宜茵陳湯加八六方及茵陳附子乾姜湯膈○理中湯方寒加茵

陳

茯苓亦效

茵陳茯苓湯

治陰黃小便不利煩燥而渴茵陳一錢作一貼加茯苓猪苓滑石當歸官桂各

一錢煎
服活

茵陳橘皮湯

治陰黃煩燥喘嘔不渴茵陳一物湯加陳皮白朮生姜半夏茯苓各一錢也

茵陳附子湯

治陰黃遍身冷茵陳一物湯加附子炮甘草炙各一錢也

茵陳薑逆湯

治陰黃肢體逆冷自汗茵陳一物湯加附子炮乾姜炮甘草炙各一錢也

茵陳薑附湯

治陰黃冷汗不止茵陳一物湯加附子炮乾姜炮各一錢也

茵陳吳茱萸湯

治陰黃曾服姜附諸藥未愈脉尚遲者茵陳一物湯加吳茱萸附子炮乾姜炮木通當歸各一錢也

太遲發黃脉沉細遲無力

次第用藥至茵陳四逆湯大效活

湯大效○一人傷寒發黃脉微弱身

冷次第用藥至茵陳四逆湯大效活

茵陳附子乾薑湯

治陰黃附子炮乾姜炮各二錢茵陳一錢二分草豆蔻一錢枳實半

夏澤鴻各五分白朮四分白茯苓橘紅

各三分右剉作一貼姜五片水煎服

疫癘發黃

天行疫癘亦能發黃謂之瘟黃殺人最急宜

瘡疽丸

瘡疽丸茵陳鴻黃湯濟生茵陳湯苦參散

瑞

治天行病急黃及瘡疽發黃茵陳梔子大黃四錢豆豉二錢右爲末蒸餅和丸梧子大每三丸或五丸溫水吞下以吐利爲效門○得效方梔子

元同卽今

茵陳丸也

茵陳鴻黃湯

治時氣發熱變爲黃疽所謂瘟黃葛根一錢半茵陳黃連姜汁炒梔子炒白朮

赤茯苓白芍藥厚朴木通人參各一錢木香七分右剉作一貼入姜三片水煎服

瀨

濟生茵陳湯

治時行熱鬱通身發黃茵陳四錢大黃二錢梔子一錢右判作一貼水煎服

苦參散

治人無故忽然振寒皮膚麴塵出小便赤瀝大便秘諸藥不除因爲久黃芩蘆子炒五錢苦參黃連瓜蒂黃柏大黃各二錢半右爲

末每二錢米飲調服當吐

下消息服之

效得

搐鼻退黃法

凡黃疽由濕熱毒氣侵入清氣道中宜納藥鼻中滴出黃水卽愈宜搐鼻瓜蒂散如

散神

搐鼻瓜蒂散

治黃疽渾身如金色瓜蒂二錢丁香一錢

黍米四十九粒赤小豆半錢右爲末

臨卧時先含水一口却於兩鼻孔

半字便睡至

明取出黃水便服黃連散或茵陳五苓散慎不可

吹入

抹

如神散治酒毒發黃苦匏子苦葫蘆子各三七個黃

黍米三百粒安息香二皂子大右爲末取

字搐人鼻中滴盡黃水苦過多則以黍穰燒灰麝香末各少許受濕鼻中立愈得

黃疽通治藥

黃疽之疾脾大要熱鬱而不行亦多有腹脹之候治法搐人疎導濕熱於大小便之

中宜胃苓湯

方

大便加茵陳及茯苓滲濕湯又退黃

散一清飲石膏

茵陳湯茵陳大黃湯必效散退黃

丸綠礬丸

褪金丸

子綠礬丸並可

用

茯苓滲濕湯

治濕熱黃疽茵陳二錢赤茯苓澤瀉猪苓各一錢黃連黃芩梔子防已白朮蒼朮陳皮青皮枳實各五分右判作一

貼水煎服

一名茯苓除濕湯

蜜

退黃散

治黃疽身面如金小便如黃柏汁柴胡升麻草龍膽茵陳黃連黃芩梔子黃柏本

逼滑石

各一錢甘草五分右剗作一

貼入燈心一握水煎服

蠶

一清飲

治黃疽柴胡三錢赤茯苓二錢川芎桑白皮各一錢甘草五分右剗作一貼入姜三枣二

水煎

服

入門

石膏茵陳散

治黃疽一身皆黃食已卽飢石膏二錢梔子仁茵陳木通大黃各一錢甘草五

分瓜萎實

一個右剗作一貼

大姜五葱白

二莖水煎服

數

茵陳大黃湯

治傷寒大熱發黃疽茵陳梔子柴胡黃柏黃芩升麻大黃各一錢草龍膽五分

右剗作一貼

水煎服

歸

必效散

黃疽通用草薢子炒草龍膽梔子黃芩各一錢茵陳二錢右剗作一貼水煎服

歸

退黃丸

治黃疸水腫腹脹泄瀉等症青礬二兩鍋內
熔化入陳黃米四升用醋拌勻慢火炒令烟

盡入平胃散六兩同炒少頃去火毒爲末醋糊丸

梧子大每七十丸空心臨卧米飲下忌糯米油麪
生冷硬物○此方卽周益公陰陽丸也葢青礬乃
銅之精液用醋製以平肝愈於針砂如服鍼砂必
忌鹽而後復發青礬

則不忌鹽不復發臥

綠藜丸

治黃腫病最捷五棓子炒黑神麴炒黃各八
兩鍼砂炒紅醋淬綠藜姜汁炒白各四兩右

爲末姜汁煮枣肉和丸梧子大溫酒下六七十丸
不飲酒米飲下終身忌食蕎麥犯之再發則難

治

褪金丸

治黃腫絕妙鍼砂鐵紅醋淬香附子便浸各
六兩蒼朮白朮各二兩半陳皮神麴麥芽各

一劑

一兩半厚朴甘草各一兩右爲末麴糊和丸梧子
大米飲下五十九忌魚腥濕麴生冷等物○有

塊加三稜蓬朮並

醋煮各一兩半

僵

棗子綠礬丸

治黃疽胖病鍼砂假紅醋淬綠礬炒蒼
朮厚朴陳皮神麴各一兩甘草五錢右

爲末蒸枣肉和丸梧子大米飲下五十九

切忌蕎麥羊肉母猪肉食之急死無醫

回

痘癬愛喫土炭生米茶葉

宜用四寶丹及
治癬三方

方譜

四寶丹治黃病喫生米茶葉黃土黑炭等物○食生
米者麥芽一斤使君子肉二兩檳榔南星姜

製各一兩○食茶葉者茶葉一斤使君子肉二兩

檳榔南星姜製各一兩○食黃土者壁土一斤使

君子肉二兩檳榔南星姜製各一兩○食黑炭者

黑炭一斤使君子肉二兩檳榔南星姜製各一兩

○右爲末蜜丸梧子大早

晨砂糖水下五十丸臘

一方

治黃疽愛食茶葉蒼术白术各三兩石膏白芍藥黃芩南星陳皮各一兩薄荷七錢右爲末砂

糖水煮神麴作糊和丸梧子大

砂糖水空心吞下五七十丸臘

一方

治黃疽喜喫生米白朮一錢半蒼术一錢三分白芍藥陳皮神麴麥芽山楂內白茯苓石膏各

一錢厚朴七分藿香五分甘草三分右剉

作一貼水煎臨熱入冰糖末一匙調服臘

一方

通用使君子肉二兩南星姜製檳榔各一兩。

喫生米用麥芽一斤炒過○喫茶葉用茶葉一

斤炒過○喫土用壁土一斤炒過○喫炭用黑炭

一斤炒過○右爲末蜜丸梧子大空心砂糖水下

五十

丸臘

可治不治證

黃疽之病當以十八日爲期治之十日已上宜差反劇爲難治

鞶

○疽而

不渴者可

治疽而渴者難治發於陰部其人必嘔

發於陽部

○

其人振寒而發熱

鞶

○凡黃家候其寸口脈近掌

無脈口鼻冷黑色並不可治

鞶

○形體如烟熏直

視搖頭爲心絕環口黧黑柔汗發黃爲脾絕

鞶

○不

治鞶○黃疽以十八日爲期十日以外入腹喘滿

鞶

○

煩渴面黑者死

鞶

○

脾胃稍實更斷厚味則可治

鞶

○

傷酒色慾口腹者難治

鞶

○疽

病面黑黃作渴腹脹難治

鞶

○

凡三十種有

單方

酒煮茵陳湯

凡三十種有

臘雪水

治黃疽微

溫飲之

最治黃疽

搗

車前草

取汁服之極效

茵陳蒿 主黃疽通身發黃小便赤以水濃煎服生食亦良 韩○治酒疽取一两清酒煎服名酒煮

茵陳

湯

鹽

葛根

解酒疽小便赤澀

取一两水煎服

瓜蔞根

主食疽身面黃

水煎服之

酸漿草

主黃疽根味絕苦搗

取汁飲之多效

萱草根

主酒疽搗取汁飲

又嫩煮食之

王瓜根

治酒疽變成黑疽醫不能治取根搗取汁空心頓服一小升當有黃水隨小便出不效再

服

東醫寶鏡 卷之二
青蒿 治熱黃心扁搗
取汁飲之

篇蓄 治熱黃搗取汁
煎服一小升

黃蘖 主黃疽水
煎服之

梔子 主胃熱食疸
水煎飲之

小麥苗 治酒疽搗取汁
服或煮食之

大麥苗 亦主黃疽
取汁服

鮒魚 主黃疽作膿和五味食之又取活者
置水中常常看之日一易最效

鯉魚 治黃疽如鮒魚
魚法用之

鼈 治酒疸烹熟如常法
作美食數個愈

鹽

桃根 治黃疽身面如金色取黑引桃根一握細切水
二鍾煎至半空心頃服三五日候其黃離離如

薄雲散惟眼最後差可時時飲一

盞清酒則易散忌熱麪猪魚韓

蔓菁子 主急黃黃疽及內黃腹結不通取子搗細和
水服二三錢當瀉出惡物黃水砂石草髮並

出差

韎

韎差

甜瓜蒂

治黃疽初發及時氣急黃瓜蒂爲末搗兩鼻
中出黃水又取一錢調溫水服得吐黃水便

絲瓜

治積傷酒麴發黃完絲瓜連皮子燒取爲末因
麴得病麴湯調下因酒得病酒調下服即愈

矣種香

水芹

治五種黃病取汁飲之作羹
或煮食或生食並得宜常食

生葱

治傷寒發黃目不識人生葱火煨熟去皮取心批出汁蘸香油點兩目大小皆立明○又燒

酒口噙令病人開口

噴之其眼目明

醯

苦瓠

去黃疽煎取汁滴鼻中出黃水差

絲葷

治熱疽作羹作佳

冬葵

治時行黃病煮汁飲

又作羹作羹常食

白烏雞

傷寒發黃朐心昏悶不省死在須臾白烏雞一隻去毛及腸屎以刀爛切鋪心頭上少

項卽
活鑄

熊膽 療天行黃疽取
少許和水服

猪糞 治同上取糞漬
水取清頓服

猪脂 治五疽及胃中有乾屎發黃煎豬脂
取三合日三服大便乾屎下乃愈