

宣
台
理
辯

辰

始

順

初出血點
淡紅潤色

出

逆

刑如蚕種
紫黑乾枯

圖

陰

圓暈成形
乾紅少潤

一二日既出之象如粟

先發三四點交紅潤色者順之兆也順者不治

自愈為氣得其正血得其行其毒不得妄行津

其虐也○于天庭司空太陽印堂方廣之處先

發者逆之兆也逆者不治為氣滯血滯致毒妄

奉陽位無以當其勢○雖稠而紅潤澤成筒者

險也險者毒雖犯上其氣血未離憂虞之象未

可加治俟其氣血交會之後以保元湯加桂主

之謹防氣洩血散將無逮也○若陰始交陽之

際陽交陰會之初憂虞之象未可加治恐其藥

性紊亂氣血交會之機若氣始定位血初歸附

吉凶得失由此生焉苟失其正則宜治矣不然

恐其氣血虧弱毒必內攻業是者當加調燮氣

尊血附乾坤道濟足以見陰陽造化其全功矣

圓

混

圖

順



氣溢血附
飽滿光潔

逆



氣失血散
枯澀不榮

陰



頂陷不滿
光潔有神

二三日根窠員混氣之冲滿也氣之冲滿血必
滯附為順者不治自愈為氣血得其道也○
根窠無暈氣離血散為逆者氣血交會不足
致毒乘機而犯內也○根窠雖員而頂陷者血
亦難聚為陰者為氣弱不能領袖其血也以
保元湯加芍桂豈有不痊者哉

形 色 圖

順

鮮明光澤
氣滿血榮

逆

綿密加泡
黑紫乾紅

險

根窠雖起
色慘不明

四五日觀痘勢之形色則知氣血之壯弱受毒之淺深此治法之大要也其形尖員光澤大小不一等氣和血就順也順者自愈為氣滯血附各得其道而毒自釋○其形綿密如蚕種黑陷乾紅紫泡者逆也逆而不治為氣血相離縱毒內攻也○其形根窠雖起色不光潔生意猶在險也險而治為氣弱血盛勢雖挾毒犯上然得交會分明用保元湯加芍藥桂米助衛劑養好為調攝之妙

起

發

圓

順

逆

險

氣會血附

紅活鮮明

氣背血離
乾枯綿密

氣弱血榮
色昏紅紫

五六口氣盛血榮于內則發揚于外為順上者
自愈為氣血豐厚毒受制也。氣雖旺而血不
滯附其色灰陷或紫陷或發為水泡瘡塌為逆
上者不治為氣弱血衰致毒下陷而外剥也。○
氣雖旺血雖滯附不厚其色光白不榮為險上
者易治為氣盈血弱不及滯附用保元湯加水
香歸考助血滯附氣位以全中和之道也。

四五口則血衰之類也限以餘血之類也

漿

順

○

氣化漿行
光潔飽滿

行

逆

○

漿毒不行
神去色枯

圓

險

○

氣血少足
光潤有神

五六日氣盈血附其毒自化也則成漿順也順者不治自愈為氣血得中其毒自解也○氣陷血衰其毒為伏也則不成漿逆也逆者不治為氣血相離不能制毒而外剝也○氣交不旺血雖附不能成漿險也險者須急治之為氣血少寒不能振作急投保元湯加桂米助其成漿而收濟惠之功也

漿

順

○

氣足血微
神全光潤

足

逆

○

氣隔不滿
色枯乾紫

圖

險

○

氣弱血附
光潤不枯

七八日氣旺血附其毒化漿順也順則不頑
而自愈為氣旺拘血化毒之故也○氣血爭難
其毒不化漿逆也逆則難治為氣血不及不能
振作以制其毒以發癰發疔者可生外剝內傷
者必死○其氣血少緩毒雖化而漿不滿險也
險則可治為氣血有礙不能大振以保元湯加
桂米發揚助漿斯可以保全矣

順

◎ 氣壯血化
毒始去身

逆

◎ 氣陷不滿
毒成外剝

陰

◎ 氣平少冲
紅黃色潤

八九日漿足氣血之功成矣氣血功成生命定矣如無他症順而也已○漿不足者氣血盡矣氣血盡而大命臨之逆也○漿不冲滿血附線紅氣弱而陰也以保元湯加姜米以助其氣而駕其血斯漿成也

血

盡

圖

順

逆

險

○

◎

○

氣平血收
光色始斂

氣弱血凝
枯朽剝極

氣少冲滿
血亦有力

十一二日血盡毒解氣調漿足此生仁自然之
理也為順○或血淡而漿薄或血凝而漿滯以
見氣虧而毒不解為逆○血盡漿足濕潤不斂
者內虛也為險以保元湯加苓朮助其收斂而
結痂也

結

痲

圖

順

逆

險

◎

◎

◎

氣血滯本
神化功全

氣血不全
功虧一篑

氣血効功
神化太過

十三四日氣血滯本毒既殄滅漿老結痲順也
○毒未脫形諸邪並作雖云結痲此其逆也○
毒雖盡解漿老結痲之際或有雜症相仍以保
元湯隨症加減不可峻用寒涼大熱之劑恐致
內損之患也

還

元

圖

順

逆

險



氣血無恙

痲落癩明

氣血兩虧

天年盡矣

氣血功收

神化少全

十四五日氣血功成痲落而無他症順之徵也
○痲未易落寒戰咬牙讖語狂煩疔腫作者無
可生路逆之兆也○痲落潮熱唇紅口渴不食
者險之勢也以四君子加陳皮山查黃連湯其
加參苓白朮散不解以六連翹飲去黃芩病去
之後多有內損或餘毒未解此則尤難治也

立獨勝受傷圖

痘之初發陰陽交會不得其一則諸惡症生矣蓋氣血不能勝毒甚至滅亡得
其生者百有一焉予嘗闖其痘之惡症七日前後為陷為泡為癰為疔為疔塌
為倒陷如此者有因毒勝而不治有因毒勝而日痊難予知識療理惟其陽毒
內潰前孽於表裏受傷之初又非血氣能勝其所勝而救其危也故另立治法
圖式開陳于後尚冀治是者當加慎密

頂陷圖



陽虛陰實
之象故性
好下陷也

七日前後五陷者氣不足也氣不足不能收血
而毒不能成漿蓋氣不勝毒故也七日前後見
此宜治以保元湯加芎藭糯米溫胃助氣又以
水楊湯沃洗之血不榮加歸至十二日方纔足
者亦有之如血氣光澤有起勢者亦不可過于
治也深恐滿而過盛反虛百骸或血如死灰漿
不滿足其血雖附不榮而兼內症者不可保矣

圖 陷 倒

內外俱虛
之象氣血
勢離故滿
而復陷也

七日前後倒陷者氣血衰也七日後根窠發足
漿行之次因瀉氣陷毒即隨氣血而反陷也如
血不走滯附鮮明護衛之力猶在治必有可拯
之理其血不顧亦必挾毒攻內禍復起于蕭牆
豈可救乎急以保元湯加參朮肉豆蔻湯以參
苓白朮散又有峻用發泄毒劑致傷元氣而氣
血隨毒氣反陷伏者有之用于保元湯豈有是
哉

陽

毒

圖



外實內虛
陽之象也
故性外旺

七日前陽毒者凡瘡也或瘡未痊及初結癰處
肉分必虛毒平氣血相擊周流百脉必趨虛處
而出也蓋陽毒陰毒溷雜一黨反勝諸毒而名
之也其毒濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿
也其毒枯燥乾紅氣血俱弱毒與諸瘡相抗而
俱不成漿也治法同彼頂陷如枯轉潤紅變白
其漿白溢于此可見治者之功效也

圖

毒

癰



七日後發癰者陽毒也痘之毒併聚一處而假其名也蓋氣血不能拘收乘載其毒使氣弱血盛陽分空虛血則載毒傳注四肢合處合者海也曲池委中是也毒不成漿七日前後發者宜縱之發其毒併從此而出也若治其毒必隨痘而散內攻藏府必無可生之理如痘毒已解血氣豐盛宜解散其餘毒以保元湯加解毒湯為妙

疔

毒

圖



中實外虛
陰之象也
故性犯內

九日後發之疔疔釘也毒叅陽位聚而自成窠穴也蓋氣位弱而血分不密其毒性不能自散故聚結而成其形如氣固血盛則毒受制歸附豈有是耶結於四肢或小或大不近藏府雖抵穿筋骨者易治結于頭面腹背逼于內者其勢必攻穿藏府難治如不穿者急治治不可加峻以保元湯加牛旁子當歸荆芥助氣逐毒待毒液滿自釋也

內 潰 圖

腹形凶象也

七日前內潰者，胃爛也。蓋因風寒所中，脘理固
 密，陰陽二分壅塞不通，其毒內攻，氣既不能，和
 血，血又不能載毒藏府之間，毒火炮熾，則潰而
 成膿，口舌皆白，是其驗也。如此尅害生靈，何其
 慘毒識者，知痘毒未出之時，或有風寒阻塞氣
 粗熱盛身，必戰動腹肚急疼，謹此患以和餅湯
 升麻湯逐散寒邪，開泄腠理，殺毒而出，豈有是
 症者哉。

痘治附方

生地黄汁一

生油劑二

三豆飲子三

葛根汁四

葛根散五

樺皮湯六

必勝散七

涼驚丸八

枯萸散九

升麻湯十

惺惺散十一

荊芥散十二

羌活散十三

奪命散十四

牛旁散十五

葛根橘皮湯十六

薄荷散十七

獨勝散十八

抱龍丸十九

紫草膏

紅綿散二十

五積散二十一

麻黃湯二十二

紫草飲子二十三

髮灰飲二十四

牛旁其草飲二十五

兔肉醬二十六

安斑散二十七

蘿蔔湯二十八

紅子湯二十九

快班散 三十

耳草散 三十一

紫草如勝散 三十二

化毒湯 三十三

調中散 三十四

紫草木通湯 三十五

如聖湯 三十六

蟬退耳草湯 三十七

紫草枳殼湯 三十八

當歸散 三十九

快毒丹 四十

胡荽酒 四十一

葡萄酒 四十二

辟惡氣 四十三

燒乳香 四十四

黃土散 四十五

芒硝猪膽汁 四十六

黑牛糞 四十七

黃藥膏 四十八

白芥子散 四十九

爛肉汁 五十

蟬蛻散 五十一

猴黎酒 五十二

麻黃紫草湯 五十六

水解散 五十四

玄參升麻湯 五十五

麻黃黃苓湯 五十七

升麻黃苓湯 五十七

葛根散 五十八

四順散 五十九

利毒丸 六十

紫霜丸 六十一

消毒散 六十二

化班散 六十三

地黄雄黃飲 六十四 犀角散 六十五

紫河車散 六十六

玳瑁湯 六十七

白虎湯 六十八

人參竹葉湯 六十九

三物散 七十

青黛散 七十一

野通散 七十二

無比散 七十三

黑豆湯 七十四

透肌散 七十五

黃連散 七十六

通關散 七十七

紫雪 七十八

竹葉湯 七十九

導赤散 八十

救生散 八十一

犀角湯 八十二

午黃散 八十三

玉露散 八十四

犀角欬子 八十五

犀角地黃湯 八十六

猪尾膏 八十七

益心散 八十八

獨味麻湯 八十九

南金散 九十

消石散 九十一

橄欖核水 九十二

快毒丹 九十三

紅粉丹 九十四

乳香猪血膏 九十五

紫金散 九十六

釣藤紫草散 九十七

射香猪血丸 九十八

木星飲子 九十九

四聖散 一百

脫殼散 一百一

山梔子湯 一百二

化毒散 一百三

宣毒膏 一百四

百祥丸 一百五

牛李膏 一百六

倍金散 一百七

抵聖丸 一百八

濕生蟲散 一百九

白花蛇散 一百十

敗毒牛黃丹 一百十一

大黃丸 一百十二

川黃散 一百十三

大承氣湯 一百十四

益黃散 一百十五

參朮丸 一百十六

二和散 一百十七

六神散 一百十八

治中湯 一百十九

胃風湯 一百二十

乾姜甘草湯 一百二十一

胃爰散 一百二十二

勻氣湯 一百二十三

豆乳散 一百二十四

姜附湯 一百二十五

七珍散 一百二十六

薤白湯 一百二十七

活血散 一百二十八

六齒散 百二十九

內補散 百三

赤茯苓湯 百三十一

小柴胡湯 百三十二

大青四物湯 百三十三

砂糖水 百三十四

藍根散 百三十五

甘露飲 百三十六

槐花散 百三十七

淨心散 百三十八

青金丹 百三十九

黃芩散 百四十

灯心湯 百四十一

黃耆散 百四十二

硃砂膏 百四十三

宣風散 百四十四

耳枯湯 百四十五

定命硃砂散 百四十六

鼠粘子湯 百四十七

斑瘡入眼 百四十八


乾葛雞頭湯 百四十九

人參青膈散 百五十

六味人參麥門冬散 百五十一

七味人參白朮散 百五十二

敗草散 百五十三



八面通百主

山崩崩百主

水林林百主

小華國百主

大青四國百主

野地地百主

竹器器百主

林外外百主

水地地百主

齊金金百主

黃地地百主

山山山百主

黃青青百主

山山山百主

山山山百主

林林林百主

水水水百主

山山山百主

綠綠綠百主

山山山百主

山山山百主

山山山百主

山山山百主

痘治附方

新安祁門朴里汪機省之編輯刊

附方總一百五十三道皆諸論中之所載也以魏君所定十六方觀之則一百五十三方似皆無所用矣今猶附之篇末意欲輯為全書有論無方非所以廣見聞也且臨症施治亦有便于於閱免致為其所惑焉

一 初生服生地黃汁仲景云以兒初生下時用生地黃汁點在兒口中即下黑糞終身不害痘疹

二 冬溫服生油劑小兒藏府伏於熱毒未成瘡疹四肢微澆有熱食物似減頭髮乾或時額多微熱用生油一小盞以溫水一小盞旋傾入油盞內以杖子打撓水尽

更打令勻如蜜即止夜卧時百日一醉至三歲每服二
蜆殼五歲至七歲三蜆殼八歲至十五歲服半合大人
一合至二合量大小增減服後良久令卧少時服三五
服大小便利四肢熱退瘡痘不生也但瘡痘已出不可
服惟服和平藥解其大熱慮熱毒太盛也

三

冬温服三豆飲子凡有時行瘟毒天行瘡痘者宜預服

之 黑豆 藜豆 赤小豆 各半 甘草 一兩 用水九

斗煮豆熟為度逐日空心任意飲之七日後瘡必發快
冬月温煖小兒必發瘡痘宜預服之

四

茜根汁治時行瘟毒痘瘡正發預煎汁入酒飲之則不
患瘡痘累用甚應 本草云茜味若治一切血病痔瘻

癩癧排膿

(五)葛根散治天行熱氣欲發痘瘡壯熱作疼宜此解肌出

汗 葛根 麻黃各一兩 石膏二兩 黃苓 芍藥 桂枝

甘草各半兩 右為粗末二服四錢水一盞煎至半觔溫

服取少汗若先自汗者去麻黃

(六)樺皮湯治傷寒時氣疏二瘡毒

樺皮剉水煎溫服取汗 樺皮味若平無毒治肌熱黃

疸時熱毒瘡癧腫及乳癰初作腫硬

(七)必勝散治瘡泡出未能一遍此藥透肌解毒或未及利

而瘡毒已先發宜此服之 牛旁子不限多少炒熟杵

細末每服一錢入荊芥二穗水一觔同煎至七分溫服

如瘡疹已出服尤妙 本草牛蒡子通十二經則瘡疹
出齊無阻矣又云癩未破服一枚能出癩頭故出而未
透勻者宜之

(八)涼驚丸治瘡疹五藏皆見木勝土木歸心預防發癩

龍膽草

防風

青黛

各三分

釣藤二錢

牛黃

麝香

一分

黃連

五分

龍腦

一錢

右同研末麪糊丸

如粟米大每服三五丸至一二十丸煎金銀湯送下
溫服

(九)枯萋散治癩生于心心生熱熱生風風屬肝二藏相搏

風火相爭故發搗也以此瀉心肝補其母

括萋根

白耳遂

右同慢火炒焦黃研勻每服一

字煎射香薄荷湯調下無時

(十) 升麻湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛足冷脉數發熱肢
躄煩疼及瘡疹疑貳之間或未經解利而瘡毒已發又
云瘡疹大便如常者並宜服之 升麻若寒無毒主解
百毒瘡痘亦毒也 葛根性平治消渴大熱解肌發表
開腠理治頭痛大抵瘡疹是蘊熱毒葛根解熱升麻去
毒且二藥皆治伏熱動心恍惚驚悸煩躁 芍藥治時
行寒熱又活血痺使瘡疹易出又利小便瘡疹有大熱
者利小便也用甘草調和之且瘡疹渴燥甚者亦用炙
甘草四者為治瘡疹之要藥也是瘡疹服之則毒滅而
愈矣若傷風傷寒傷食驚搐兼患痘疹而稟氣怯者皆

發虛熱而非實熱若服之反以為害但有壯熱面青目
白睛不黃赤大便不秘小便清者皆不可服裏無蘊熱
故也此治瘡未發前瘡愈之後服之消毒非正出時服
升麻 葛根 芍藥 甘草 等分 為粗末每服二錢水
一觥煎至半觥去滓溫服無時亦可為細末湯調服身
心煩熱則溫服寒多則熱服

(十) 惺惺散大抵渾身壯熱必由風熱瘡疹傷寒時氣且先
與此也其頭痛目溢鼻流清涕者用細辛喘粗者用桔
梗人參多睡者用茯苓恐傷寒時氣胃氣弱者用白朮
風熱瘡疹用枯萸根枯萸根若寒治身熱煩滿大熱除
腸中痼熱燥渴熱而胸痺不下乳皆攻其熱也故非裏

寒者可用裏寒者身雖大熱不渴大便反利亦便不赤
面青目白睛不黃赤其中雖有白木之溫終非虛熱者
所宜人之藏府寒則寒藥先効熱藥未必能制之熱則
熱藥先効寒藥亦莫能制之此勢之自然也用藥宜得
不辨表裏冷熱小兒傷風壯熱當先服此大効如壯熱
未退功不可與通利大便及涼藥恐是瘡疹反有誤矣
若桔梗 細辛 人參 甘草 芫花根 白茯苓
白木各等 為細末每服一錢水一盞薄荷二葉同煎
至三分去粗溫服要和氣入姜煎服時身雖壯熱大便
自利者不可服

(二十) 荆芥散治麻子蕪瘙痒或癩疹大便自過用荆芥少許

研爛以新井水將帛瀝過入麻油一滴打勻令飲之便
不悶亂 麻痘已出用黃蠟煎牛皮膠水飲則安荆芥
治血風麻子是疹子常言風瘙癢疹皆出于皮膚其毒
輕而浮用麻油取其滑竅黃蠟煎牛膠水滋血行榮衛
二既順麻疹出矣一方加薄荷

三十

羌活散解熱散毒治風壅欲作痘疹者

羌活 獨活 川芎 桔梗 蟬退 前胡 柴胡

地骨皮 甘草 枳殼 天麻 荆芥 防風

各等分

為細末每服一錢水三分盞薄荷三葉煎至二分溫服
量大小加減藥水 此治風治寒治驚下痰涼脾治血
熱透肌但屬實熱無不治之或稟受弱脾胃弱裏無熱

者不可輕用

〔四〕奪命散瘡疹已發未發並宜服之出痘疹熱毒甚者服之鮮蘊熱利小便痘疹初發氣盛亦宜服

升麻

糯米甘草紫草

各半兩

木通

三錢

右剉為散每服一大錢水七分煎四分去滓溫服

〔五〕牛旁散涼風解毒小兒冬有非即之煖及春月天氣暄

煖或肥甘之過或重衣溫厚傷皮膚害血脈瘡瘍發黃

致生多疾宜常預服之

牛旁子炒為末水煎一盞服之

〔六〕葛根橘皮湯治冬溫未即病春被積寒所折不得發至

夏熱其寒得解冬溫始發肌肉班爛癰疹如錦紋而咳

心悶但嘔吐清汁

葛根

橘皮去白

杏仁去皮

知母

黃芩

麻黃去節

甘草

炙各別

散每服抄三錢水一觥

同煎半觥去滓溫

服無時

(七)

薄荷散小兒稟受雄實總竟是瘡若毒氣甚者宜服之

薄荷葉一兩

麻黃去節

甘草

炙

為細末每服二

錢水一中盞棗二枚姜三片同煎至六分去粗日三兩

次溫服 此方服之汗出即服調中散服後若作寒熱

脉反遲者進脫齒散以溫之詳此非下藥也實者服之

未必安虛者服之必危殆

(八)

獨聖散

又名牛旁

小兒發瘡早微熱晚大熱日黃脇動

手冷發甚如驚者 牛旁子半兩白殭蚕一分為粗末
每服一大錢水六分觥紫草二七寸同煎至四分盡連
進三服其痘便出 牛旁子出瘡透肌白僵蚕治遍身
癩疹疼痛成瘡為末酒調服之立瘥紫草能利竅瘡疹
無虛寒症者服之立出

(九)

抱龍丸治小兒一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡效
嗽痰盛面赤手足冷温吐睡中驚搐不寧脉洪數頭痛

南星

取裏白者為末用臘月黃牛膽汁和
和為劑却入膽中令乾再為末半斤天竺黃 二兩

硃砂

二錢研雄黃半兩射香一錢牛黃一字同研極細

滴水和丸如鷄頭實大二歲兒竹葉薄竒湯化下一丸
無時錢氏云因驚而生熱用桑發散熱入于表故表熱

而生班宜服之

紫草膏治麻痘不快
紫草 白附子 錢各一 麻黃 去節

甘草 錢各二 全歌 十箇 僵蚕 十箇 為末用蜜一兩酒半盞

入紫草煎數沸旋和入前藥丸如皂子大每服一粒

用紫草煎湯化下續用黃耆散調治此上等藥也紫草

膏治瘡痘兼此藥治驚癇風疾又治瘡痘出不快如瘡

初症似傷風傷寒驚風疑貳之間服之皆有主治不至

敗事鑿家常蓄為妙

紅綿散 一石天 麻散 天麻 荆芥 各一 麻黃 去節 甘草 各二錢

全歌 七箇 為末每服一錢水半盞薄荷二葉酒四五滴

煎二三沸帶熱服之如疹未出再進一服相次又進一

服若是傷風服亦不妨大抵身有大熱面赤氣粗無汗為表未解也可服之此藥以天麻麻黃為主治有汗不得服麻黃膜理已開不宜便發汗也若有汗而熱者則惺惺散為和解之藥故仲景論表症有發汗者有和解者有調和榮衛者今有汗而熱則和解為宜如虛而熱者則宜調榮衛如和中散之類是也 此藥荆芥主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡下瘀血天麻治諸毒惡氣皮膚壅滯熱毒癰腫全歇治諸風癰疹筋脉諸風小兒驚風其劑芥天麻全歇皆性平治瘡理血故宜于瘡痘也

廿

五積散治

傷寒寒痰內傷生冷者瘡瘰本蘊熱毒小兒

熱盛渴則

飲冷熱則當風致被風寒所伏寒熱相搏面

青發熱心煩自利宜此散其內外寒毒然後熱氣上行
或汗或瘡痘或癰疹皆愈矣 方見寒門

〔廿〕麻黃湯主瘡疹煩喘甚者 麻黃去節杏仁去皮甘草

桑白皮

蜜炙

右剉為散每藥一錢用水七分盞同煎

至四分釵去粗溫服若脉數熱未退者入竹瀝少許咽
喉痛或嗽者煎熟入射香少許服

〔廿〕紫草飲子治小兒瘡疹三四日隱在肌膚而未出及
瘡出遲蓋紫草通水道去心腹邪氣內除積熱又能利
竅使瘡易出 紫草二兩細剉以百沸湯一大盞沃以
物合定勿令洩氣量兒大小溫服雖瘡出亦輕

〔廿〕髮灰飲治斑瘡豌豆古方以亂髮治下腫骨疽小兒熱

瘡痰熱諸般血病髮本血之餘今治諸血症淺其類也
頭髮煨灰存性飲調服之

廿五 牛旁耳草散治麻痘初作服此則稀 牛旁子髮炒

耳草錢一為細末每服一字或二字胡荽煎湯調服無時

廿六 兔肉醬用臘月兔肉作醬食去痘瘡兔肉平寒涼血故

也蒸臘兔毛煎湯洗痘瘡及兔毛傳良 兔腦主凍瘡

兔骨醋磨傳久疥兔毛灰主灸瘡 兔頭皮主鬼疰毒

氣在皮膚如針刺者又主鼠瘻已上兔之所主皆治皮

膚瘡瘍蓋兔肉多食令人色痿損陽事絕血脉此亦涼

血散熱故也

廿七 安班散此為涼血解毒生肌寬腸導熱利小便快膈蒸

也瘡痘有熱無寒者可服之 升麻 赤茯苓 羌活

黃耆 人參 桔梗炒 枳殼麩炒 甘草各等分 為細末

每服一錢 水七分 盍紫草薄芎少許同煎至四分 釵溫

服量兒大小增減

(八) 蘿葡湯用開花蘿葡煎汁時 飲之開花取其欲出之

義蘿葡治嗽定喘下氣消脹解毒解渴解麩毒皆勻氣

消壅藥也 氣勻則瘡疹出快矣

(九) 紅子湯平調瘡疹 紅花子 紫草茸各一兩 麻黃去節

升麻各半兩 為細末每服半錢煎薄芎湯入酒一滴調下

此用麻黃表毒氣令出升麻解蘊毒紫草滑竅紅花子

本草治天行瘡不出吞數粒即出故用之

十三 快班散此用貫衆味微寒主腹中諸熱邪毒患痘煩渴

咽燥喘急大便閉小便赤澀口乾目赤皆裏熱也宜服

之如無裏熱反為害矣若常服不服亦為害也

貫衆 赤芍藥 各一兩 升麻 枳殼 各半兩

為細末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五分盞去滓

溫服量大小與之

卅 甘草散治瘡未出及已出燥渴者 大甘草不以多少

炙為末每服一錢或二錢水一盞煎至六分去滓溫服

無時呷之以解利熱毒 瘡出遲者常服紫草飲子可

針兩腕硯子骨間男左女右取之或灸一壯亦助發瘡

痘毒氣已發不必用

三

紫草如聖散瘡痘初出急服吃乳嬰兒與乳母兼服四

五歲外只令兒服之 紫草二兩陳皮去白為細末每

服一錢水一小盞入葱白五寸煎至五分盞去粗溫服

量兒大小服之夫瘡疹氣勻則出快紫草滑竅去心腹

三

化毒湯治痘疹已出未出 紫草 升麻 甘草各半兩

剉如麻豆大水二盞煎糯米五十粒煎至一盞去粗放

溫分作數服 此方名為化毒至于主治無不切要痘

瘡欲出渾身壯熱不思飲食服此一貼即內消已有一

兩顆出即解其半若令出則自頭焦只三服差瘡疹無

他病相兼者無不愈又在人稟受虛實不同感風寒食

驚不一仲景云正患傷寒如其人有故疾發動則兼以
故疾藥攻之活人書云傷寒病中又感異氣乃時令寒暑燥
溫風不節脉息與少陽相異證候與傷寒不同當隨宜
以法治之不可泥于一曲也此藥但能化實熱之毒若
稟虛而浮熱伏冷者皆當調適以平為期

四冊 調中散 白茯苓 紫河車 人參 甘草炙等

為細末每服二錢水一盞生姜二片棗三枚煎至六分
去粗作兩三次溫服

五冊 紫草木通湯 木通 紫草 人參 茯苓

糯米各一兩 甘草炙半兩 為粗末每抄四錢水一盞半煎至

一盞分溫三服 痘瘡熱甚則出而心主熱熱甚則小

便赤澁其熱蘊畜而生病此以木通導心火糯米歸脾
土心清則不生他病脾平則五藏自安也

六册

如聖湯治瘡痘毒攻咽喉腫痛 桔梗炒 甘草炙

牛旁子 各一兩 麥門冬 去心兩 為細末每服二錢沸湯點細

細呷服入竹葉煎尤妙

七册

蟬退甘草湯發痘疹 大蟬退 二十一箇去足 甘草 一錢半

用水半椀煎至一小盞旋二服之已驗

八册

紫草桔殼湯 治瘡出不快倒靨 紫草 木通

甘草炙 枳殼 麩炒等分 為粗末每服二錢水一小盞煎至

半盞去滓温服大抵壅瘀則榮衛不行令出不快則倒

靨用枳殼寬腸木通利小便紫草滑竅治蘊畜邪氣皆

其出大小便祕澁者無不可用

補

初起疥癩便驚狂身熱汗出不增寒不惡風

深效者當下之痘未發前宜服 當歸一兩 甘草

二錢水一中盞豆豉十粒煎至半盞去滓

量兒大小服以利為度逐日冷吃其草汁三歲已下

歲已上加減服之

十

決毒丹瘡疹氣勻則出快蓋血與氣相隨內有邪熱則

而妄行使氣不勻宜服瘡出亦可服

桑子黑者炒木香各一分肉豆寇半兩青皮生一兩半熟

蘘羅細末滴水丸如黍米大每服七粒 一十粒濃煎紫

草葱白湯下乳前服量大小加減

三四 胡荽酒治瘡已發未發蓋心主瘡瘍主煩躁主驚悸主
痛痒胡荽味辛能通心竅而通之則瘡易出若大便秘
者紫草胡荽皆未可用紫草性寒胡荽利大腸故也宜
先溫藏府如常瘡症未退可用 胡荽三兩細切以酒
二大盞煎沸沃胡荽以物合定不令洩氣候冷去滓滓
頂面頰眼目背脊兩脚胸腹微 塗之令遍惟面勿塗
然氏用好酒二盞煎一兩沸入胡荽四兩再煎 又云病
人左右上下常令有胡荽氣令辟汗氣惡氣及外人穢
觸便瘡痘出快既不可受風冷然亦不可壅遏常令衣
服得中

三四

葡萄酒

葡萄酒其平利小便取穗出快之義研酒飲

三四 痘疹未出之間房中宜燒蒼朮猪甲二物以辟惡氣

母正或色慾令人守門勿使外人入房觸犯則痘難出

或觸犯而病上喘面青黃者猶輕因此犯而死者不少

四四 瘡痘正發忌諸臭穢惡氣以逆榮衛恐陷伏倒靨也房

中常燒乳香不絕可去惡氣

五 痘瘡已出不可發表 虛更增斑爛若發膿痛甚者用

乾淨黃土羅為細末傅之仍數 食蜜為妙

六 芒消猪膽汁治瘡斑爛因表太過一手一足面腦腹背

名為一片瘡相似令人不忍觀之用芒消猪膽汁調塗

瘡上勿令動觸直候疔落有瘡膿汁不通卧席宜麥飯

簞卧持息為妙

四 治膿泡出煨黑牛糞貼之令速愈而無癢痕口出未平

忌勞力 狐臭人薰觸未愈不可當風 則成瘡癤

四 黃栢膏欲用胡荽酒噴時先用此方塗面上然後實四

肢大人小兒愛護面目悉宜用之 黃栢一兩 甘草四兩

豇豆粉兩半搗羅細末以生麻油調如薄膏灌耳前眼

唇並厚塗三五遍早用塗面 無瘡痘塗邊縱有瘡痘

亦少

九 白芥子散治痘令不入目 白芥子為末水調傳脚心

引熱歸下則瘡不入目矣

五 治痘瘡用爛肉汁洗之乾脯亦得

五 蟬脫散治痘疹身熱似傷寒只耳尖脚稍冷或腹

便秘者是痘疹也用蟬蛻二十一箇洗去泥為末水一
盞慢火煎至半盞去滓量兒大小溫服三五次不是
痘亦無害欲痘發出加甘草一錢煎一盞旋服累効
小兒伏所蘊熱毒蟬蛻鹹寒可以制之况有暴感風寒
作熱客于表者蟬蛻亦治風毒克于皮膚瘙痒不止驚
癇夜啼癩疾寒熱驚悸皆宜用之

三五 猴梨酒治痘出不快 猴梨子五箇又名山查子酒煎入水侵

服痘瘡即出

三五 麻黃紫草湯治痘不出 麻黃去節人參各一分杏仁七枚

去皮為粗末每服二錢水二盞紫草五寸煎至一盞去

粗分四服作二日服未可服諸藥

四五 水解散治瘡出不快煩躁不得眠或出而身躰尚熱者

大黃 黃芩 桂心 甘草 芍藥 各二錢

麻黃去節為末患者以生熟湯浴訖煖水調下二錢相

次二服得汗利便差強實人服二方寸七氣實者亦用

三飲中亦宜用之若去大黃則春夏通用凡人飲酒食

瓜果多以生熟湯浸身皆為酒及瓜氣味此用浴身亦

欲出其毒也

五五 玄參升麻湯治傷風傷寒風熱驚食等熱運于肌或汗

或下後毒氣不散表虛裏實熱發于外故身班如錦紋

甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛 玄參 升麻 甘草

後等 剉如麻豆每抄三錢水一小盞煎至半盞去粗溫

服無時

六五 麻黃黃芩湯治痘出不快煩躁不得眠

麻黃去兩 黃芩赤芍 各半 甘草炙 官桂去皮各

為細末每服二錢煖水調日三服薰治天行熱氣痘瘡

不快煩躁昏聩或痘出身尚熱疼麻時飲大小便赤

七五 升麻黃芩湯 升麻 黃芩 乾葛 芍藥 錢三

甘草炙 錢 剉如麻豆每服二錢水一中盞煎至六分去

滓溫服治時行瘡出不快煩躁不得眠者加木香半錢

八五 葛根散治天行熱毒氣欲發瘡痘作熱甚疼者宜此解

肌出汗 葛根 麻黃 各一兩 石膏 二兩 黃芩 芍藥

桂枝 甘草 各半 為粗末每服四錢水一盞煎至半盞

去相温服無時自出汗者去麻黃

五 四順散治瘡痘四五日不大便瘡又盛出却喘粗氣急

腹脹小便赤澁宜此 大黃 耳草多為藥 當歸各等分

為粗末每服抄三錢水一盞煎至六分去滓温服無時

若得氣通不喘膈不脹止服 初竟有赤點大便如常

小便赤澁用此通利令出快也若色紅而快不須通也

十六 利毒丸治痘瘡欲出胃熱發温壯氣粗滿大小便赤澁

睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎实脉沉大

滑數便宜服此 大黃半兩 膩粉 大青銘一 龍腦

朱砂谷 錢 栴櫚 生牽牛 黃苓 青黛各錢

右為細末麪糊丸如黃米大二歲服八九生姜蜜水下

不動再服量見大小 血實加減

一六 紫霜丸治夾食頭疼壯熱腹脹為夾食方見和劑方

三六 消毒散治痘瘡已出未能勻透毒氣壅遏出不快壯熱

狂躁咽膈壅塞睡卧不安大便秘澀及大人上膈壅熱

咽嚙腫痛胸膈不利加防風名鼠粘子湯牛旁子炒六兩甘草二兩

荊芥一兩為粗末每服一錢水七分盞煎至四分去滓

食後臨卧服此治大便秘澀是治裏熱也牛旁子辛平

性涼治風腫暴殄熱肉生風咽喉四肢風腫解丹石毒

能透肌出瘡為痘疹所宜大便利不可服

三六 化斑散加知母名石膏膏石膏紙裹煨令透或用泥瓦燒

知母等分為末熟水調下一字或調塗唇上去頭痛除

皆發泄瘡子治小兒瘡班此二方極妙後方恐大涼

四六

地黃雄黃飲治瘟毒發班瘡痘出不快者乃冬應寒反

熱或被積寒暴發熱毒不得宣泄令身班如錦文心悶

咳但吐清汁為根橘皮湯地黃雄黃飲 淡豆豉

地黃各四兩以猪脂一斤和勻露一宿煎三分減去一分

去滓下雄黃末一錢射香半錢攪勻量兒大小服過多

五六

反有所損 犀解散治瘡疹不惡寒煩躁多渴小便赤澁或赤班點

犀角錢 甘草各半兩 防風二兩 黃芩半兩

五六

為粗末每服抄三錢水一盞煎至七分去滓溫服無時

紫何草散治斑瘡毒 不解攻咽喉音不出舌頰生

瘡過逆煩悶潮熱面赤 紫何車 茜根 貫衆

各三 芍藥 甘草炙 為粗末每服一錢水七分盞

生薑一片煎至四分去滓溫服牛旁子

七六 玳瑁湯治特行痘瘡及赤瘡疹子未發令內消已發解

利毒令不太盛 生玳瑁 生犀各以冷水濃磨汁二合 同撓令

勻每服半合微溫一日四五服為佳又云毒氣內攻紫

黑色出不快用玳瑁水磨濃汁一合入獾猪心血二皂

子大以紫草濃煎湯都作一服服之 二藥微寒用治

熱毒知其無失且主瘟疫蠱瘴解百毒通血脉消癰腫

用解蘊毒宜哉

八六 白虎湯治痘疱麤瘡斑瘡赤黑出不快及瘡毒餘熱并

溫熱病暑中氣煩躁熱渴大便秘小便赤四時天氣大

熱及冬月天氣大溫則可服之 石膏四兩知母兩半

甘草炙三人參半兩為粗末每服抄三錢水一小盞

米二十粒煎至半盞去粗溫服無時 此藥治中暑及

痘瘡天氣大熱與肌熱心熱相應煩躁狂亂渴水發黃

鼻衄吐血便血淋秘夏月痘瘡煩躁加麥門冬竹葉名

竹葉湯

九六

人參竹葉湯治夏月壯熱煩躁心煩乾渴心神不寧痰

壅阻逆及瘡後餘毒小便赤澀成赤斑兼治中暑虛煩

半夏湯泡洗人參當歸淡竹葉法天門冬法

等分為粗末每服抄二錢水一小盞姜三片煎至半盞

云萍温服無時瘡痘不惡寒但煩躁小便赤澁多渴成赤班點者宜之

〔七〕三物散治瘡痕毒氣少倒伏不出大小便利

生地黄炒 地黄炒 硃砂一另研為細末每服一字煎

胡荽酒少許同温湯調下

〔八〕青黛散治瘡未作膿痛甚心膈煩躁睡卧不安宜服

用波斯青黛如枣核大以水調服一方用磨刀水調

〔九〕野通散治痘出不快并傷寒不語 乾野人糞炭火

片腦 射香略少為細末每服一錢新汲水入蜜調下

野人弥猴也黃色尾長面赤糞治蜘蛛咬瘡此治痘疹

出快明矣若人家養者肉及屎違其本真不用

蜘蛛咬瘡久而不愈其絲延蔓遍身用雄黃青黛射香
水調以蜘蛛試之則化爲水果驗

三無比散治痘出不快及黑瘡子一切惡候

硃砂一兩牛黃

片腦

射香

膩粉各一

右同研細小兒一字大人半錢水銀少許入小獐猪尾
血二三滴新汲水少許調服若得寧睡然後下如爛魚
腸葡萄穗及臭涎惡物即安小兒用乳汁數滴尤妙

古人論症處方固有不相對下咽則死也如傷寒有用硝黃而
愈者有用姜附硫桂著艾而愈者此合用而用之也
設若合用涼而反用熱合用熱而反用寒豈不下咽

則死矣 無比散治痘瘡熱毒太盛壅滯榮衛不行
外不得泄內不得通毒氣在裏外則瘡疹黑色內則
有腹滿喘急譫語昏困大小便不通者宜服之也此
有其毒則用其藥固無不效設或痘瘡黑靨裏無膿
脹喘急譫語昏困大便如常或反利則此藥不可用
矣常言對症用藥是也

一士夫子第八歲患痘黑靨診其胃脉大弱言平時胃
弱不能進食今痘黑靨鑿用升麻湯羌活散葳蕤日
夜數次米谷不化後用溫葳蕤府藥更不止而卒故下
藥先審病之虛實寒熱豈可見黑靨一藥便投涼劑
寧不誤人

四七 黑痘湯治瘡痘未作膿心膈躁睡不安

用黑豆煮汁徐溫服之

五七 透肌散 治痘與三十
三化毒湯同

六七 黃連散治痘瘡毒氣上衝口舌并下部有瘡而熱者黃

連一兩去毛為末每服一錢水一盞煎至五分去滓服

無時量大小虛實與服痘瘡初發亦宜服之

七七 通關散治斑瘡水痘心悶煩躁發渴小便赤澀口舌生

瘡通心經利小便 山梔子 大黃 炒各一分 木通 瞿麥

甘草炙 車前子炒 茯苓 人參 滑石 各三分

篇蓄半兩為細末每服一字二三歲者水半盞灯心煎

至三分 稟受弱者五苓散導赤散人參白朮散亦得

八
紫雲治大人小兒一切熱毒胃熱發斑消痘疱熱疹及

傷寒胃熱發斑并驚癇涎壅走馬急疔熱疔黃瘦喉痺

及瘡痘毒攻咽此水不一黃金兩一百寒水石

石膏各三犀角各羚羊角各玄參一斤沉香

木香一斤丁香一斤耳屎兩升麻六兩

用水五斗煮金至三斗去金入諸藥再煎至一斗濾去

粗投好芒硝二斤半微火煎柳篋不住手攪候微凝入

盆中更入硃砂射香末各三兩急攪候凝冷貯密器中

勿令見風每服一錢溫水化下小兒半錢或一字咽漿

危急祗少許乾嚥之

九
竹葉湯治痘疹不惡寒但煩躁小便赤澁多渴成赤斑

煎者宜此與犀角散
石膏四兩知母二兩麥門冬去心

甘草炙為粗末每服抄二錢水一盞竹葉一握煎至

半盞去粗溫服無時

〔八〕導赤散治痘疹心經蘊熱瞞目不寧煩躁小便不利面

赤多渴貪乳者渴也
人參 木通 麥門冬去心

生地黃 甘草炙等分為粗末每服抄二錢水一小盞

煎至半盞去粗溫服無時

〔十〕救生散治膿疱惡候危困陷下黑陷此藥治熱毒倒

入藏府者不得已而用之
攢猪血臘月以新磁瓶盛掛當風陰乾

馬牙硝各一兩硃砂 牛黃 片腦 射香錢一

同研極細每服一字新汲水調下大便下惡物瘡轉紅

色為度不過再服神驗

犀角湯又名調肝散治痘疹及赤瘡子 犀角鎊 大黃炒

鈞藤 桑白皮蜜炙 甘草炙 黃去 龍膽半錢 石膏

枯萋 黃耆半兩 為粗末每服一錢水一小盞煎至

四分去粗溫服量兒大小加減服瘡子退後濃磨犀角

水塗之更良 錢氏亦用此藥治痘疹太盛令不入目

此治風盛氣實心肝血熱津液內燥大便不通毒氣上

盛衣熱未散也 大黃瓜蒌治內燥鈞藤龍膽治風血

熱桑白皮石膏治上焦熱麻黃苦著散肌熱犀角甘草

解毒熱大抵用藥貴乎與病相去則病去而正氣自復

否則反為大害如犀角散自非大便數日不通喘急悶

亂煩躁譫語豈可用乎 恐藥病不相主也

三 牛黃散治痘疹陽毒入胃日夜便血腹痛啼哭

牛黃一分 鬱金一兩 為細末每服半錢以漿水半盞煎

至三分去滓馮服量也 大小增減日二服

四 玉露散治暑月痘疹煩 一熱渴 寒水石半兩軟而微青黑中有細

紋者 甘草一兩 方解白有墻壁手不可折者是如

是半兩 皆方者同為細末 每服一字或半錢一錢食後溫

湯調下

五 犀角散子解熱毒 犀角 甘草後略 防風二兩

黃苓 一兩 為粗末每服 錢水一小盞煎至半盞去滓

溫服無時

犀角地黃湯活人書云傷寒及瘟疫應發汗而不發汗
或鼻衄吐血不尽內有瘀血面黃大便黑此主消化
血兼治痘疹太盛

犀角 一兩 生地黃 半斤 芍藥 三分 牡丹皮 一兩

劉如麻豆每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者
加黃芩 兩二 其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不

用黃芩

猪毛膏 人名龍腦膏 治痘瘡初作未能出透及已出尺內外

熱毒貫注血泡如豆在于肌皮不結痂疔二者皆用之

且瘡疹蘊伏毒熱欲出而未能透則熱甚動心心煩狂

躄妄語或見鬼神此皆心熱也蓋心榮于血血熱則瘡

痰則色敗未出者則為鬼瘡子一出而便黑也已出者
為黑靨大抵痘瘡自紅班成血疱血疱五七日結膿窠
至七日不結結膿窠者此是毒氣彌滿恐復入裏古人
用龍腦涼心血行榮衛用猪心血者以心歸心猪尾血
者取其常動欲散外也况有狂躁煩悶未省者耶以溫
酒化卜欲散而行榮衛也皆治熱毒太盛者間有虛而
陷伏者亦用之悞人多矣又有當用一字却用一錢熱
不能當之亦反為害如合用一字者且與半字如
寒渴甚當與水一斗且與玉升正此意也既有心經
熱有他虛寒症見者又不可輕服如吐瀉人發熱煩
心便赤則不可全作寒治煩躁人大便自利小便清

則

內

熱

便

熱

不可全作熟治在醫者兩審不致偏局可也

右用片腦半字許研細旋滴猪心血和丸以紫草湯

下煩躁狂悶未省者以溫酒浸服錢氏用猪尾血其

皆通

控心散斑疹一服而出全蠍二十四箇炒麻黃去節雄黃

為細末每服一錢胡荽煎酒調下蝎治癩疹中風

身不遂口眼喎斜語澁抽掣此能透諸筋脉砒黃

惡瘡疽痔透百節治疥瘍并痘疹毒氣不出也麻黃

肌泄邪惡氣消赤黑斑毒三藥治痘當出而不出者

自然出者不須服也

八

獨味麻黃湯治倒靨用麻黃三十寸去節蜜拌

紫色為度水一盞煎五六分服

一人得此方後知兗州仙源縣有工筆李用之
瘡倒靨已至危困投此一服便出其應如神未
爛便血者皆可治也

南金散治痘已出而復隱其勢甚危諸藥不效者

一失紫背荷葉
霜後貼水
白殭蚕直者炒

為細末每服一錢小兒半錢研胡荽汁和酒下來飲亦
得在処印貼施人全活者衆有用龍腦人齒卒難得
惟此無毒効速

滑石散治瘡痘出遲惡癢壅黑色膈上煩熱多渴小便
赤澁面青氣粗大便不利此藥滑竅令瘡出快

滑石 甘草各分為細末每服一錢鷄子清酒各少許

調服

二九 橄欖核水治瘡倒靨 橄欖核中截斷水磨少許服發

三九 快毒丹治痘疹氣勻即出快蓋血與氣相隨內有邪熱

則血妄便氣不勻大抵痘瘡氣快自勻痘疹出亦宜服

黑丑炒 木香各一 肉豆寇半 兩麩 青皮生一兩半

為細末滴水丸如黍米大每服七丸至十九丸濃煎紫草

葱白湯下乳前服量兒大小加減

四九 紅粉丹治藏府熱瘡出不勻 龍腦一錢 坯子 臘脂

天竺黃 硃砂各一 南星臘月 乾牛膽中 為細末煉蜜

和丸如鷄頭實大每服一九煎入參湯化下

五 乳香猪血膏治班痘不發

乳香研細猪心血丸如櫻桃大每服一九用水磨化下

六 紫金散治瘡痘倒靨及出不快

紫草 蛇退 炒焦

牛旁子炒各半兩為粗末每服一錢水七分盞煎至四分去

滓温服無時 蛇退治一切惡瘡十年不愈者用之良

七 釣藤紫草散發瘡疹令出快

釣藤鈎子 紫草茸等分

為細末每服一字或半錢温酒調下無時 紫草滑竅

利小便散十一經毒氣釣藤治小兒寒熱十二驚癇蓋

瘡瘍煩躁痛痒皆出于心驚癇心病也瘡瘍亦心所主

故用之

八 射香猪血丸治痘疹出不透

旋取猪心血調射香少

許塗兩手心并塗些少口唇上即無極驗

元 木星飲子治瘡疹不出及出不快 朱砂一分 鬱金兩半

為細末每服一字或二字量大小入片腦少許以新汲

水茶脚少許調勻然後刺猪尾血滴三點入藥汁令服

不過一二時辰瘡出紅活神効 鬱金辛寒主血積下

氣生肌止血破惡血尿血金瘡今痘疹出于心由于熱

也朱砂微寒治熱安心熱有蘊蓄則壅瘀而不出用鬱

金下氣消惡血則無壅瘀而不出遲矣

百一 四聖散又名紫草散治痘出不快及倒靨紫草木通

甘草多枳殼 麩炒 黃耆 切焙 為粗末每服一錢水一中

盞煎六分去粗溫服 內紫草發散黃耆上痛解毒生肌 枳殼治腹脹今大小腸不氣通

導心熱而利小便以甘草和之古人用藥有至理焉

一百 脫殼散 取鷄哺出殼于新瓦上焙乾去膜取殼研如

粉若痘疹倒靨不出或便血糞黑頭瘡昏腫用酒調一

字塗兒唇上令舐或以酒調塗風池穴上心前或以熱

湯調一字服

二百 山梔子湯治麤疹及班毒毒盛黑色杖如蚊蚤所嚙者

山梔仁 白鮮皮 赤芍藥 升麻各一兩 寒水石

甘草各兩 為粗末每服一錢水八分釥入紫草薄苛少

許煎至五分去粗溫服

三百 化毒散 欬金一枚 甘草各一兩 用水半碗煎令水乾去

甘草將欬金切片令乾為末用腦子半錢研勻入猪血

研成稀膏煎薄荷湯化下一錢不過一服毒氣泛手足

心出乃差此五死一生之症若便血瘡壞無膿者不治

一法 蟬脫末一錢好腦子一皂角子大大猪心血

皂子大和作膏熱酒浸紫草令溫化下移時當發大熱

瘡毒頭出然後依症調治

四百

宣毒膏治毒盛瘡已出不快倒靨急服此藥曾經大

効 獷猪尾血臘八日取一升新瓦器盛 硃砂 乳香各一 甘草

馬牙硝各半兩 片腦 射香 同為細末猪心血拌勻

用竹筒一箇番底節入諸藥在內用紙數重繫定掛

大糞缸梁上至清明日取出暴乾更入腦射各一錢研

勻滴水丸如皂角子大煎入參湯化下一丸毒盛瘡

黑靨服之痘轉紅活綻突神驗

百祥丸瘡疹黑陷耳尻及熱者為逆用百祥丸牛李膏
各三服又云紫黑乾陷者百祥丸下之不黑者謹勿下
黑者無問何時十難救一或寒戰噤牙或耳黃腫紫急
以百祥丸下之復惡寒身冷汗出耳聾及熱者死身
溫欲飲水者可治又云黑陷不發寒者病未因宜百祥
丸以牛李膏為助各一大服五日瘡復紅舌血潤而愈
紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮軟去骨曬乾復入汁
中煮汁尽焙乾為末水丸如粟大每服一二九研赤
芝麻湯下無時吐利同

六百 牛李膏又名必勝膏治倒靨又云已出未出決者宜裝

草散玳瑁散之類重者牛李膏又云痘疹毒氣不散出

不快及解犯黑色者宜用之牛李七八月結實黑圓成

穗埭黑熟者盆內研汁綿濾去滓銀石器盛慢火熬成

膏磁器收常令透風每服一皂角子大煎杏膠化如人

行二十里再進一服瘡疹自然紅色毒氣亦慢此藥神

妙一切瘡出不快並可服無生者市肆乾者為末水熬

代用

董汲幼年病瘡見皮膚下不出及出不快及紫黑乾陷

惡症極危父母不忍見之遇錢乙下此藥得安因懇求

真方遂傳于世但收採失時亦無全効九月後收取瀝

汁成膏每膏二兩研入射香半錢用不津器貯或用

桃膠半兩牛李子一兩炒為粗末每服一錢水七分盞煎至四分去滓溫服治療亦同

七百 倍金散治瘡痘倒靨黑色 鼠粘子炒二兩 山查子炒二兩

減杖華一兩 為粗末每服一錢水一盞入荆芥穗紫葳

十根煎至四分去粗溫服

八百 抵聖丸治班瘡不出反入 取十二月老鴉左翅不計

多少風中令乾辰日燒為灰用中等積猪鬃上刺血丸

如鷄頭實大每服一丸取積猪尾血少許溫水同化下

未効二三時間再一服

九百 溫生虫散治倒靨

取濕生虫不計多少炒乾為末酒調下一字

頂 白花蛇散治痘瘡倒靨 白花蛇 連骨一兩火 夾令乾勿焦 大丁香

二十枚為細末每服一錢小兒半錢 以水解淡酒調下如

黑靨者服之移時重紅如聖

一百十 敗毒牛黃丹瘡子出定大便不通瘡中不乾

真牛黃 大黃略 粉霜 珍珠略

同研勻煉蜜丸如黍米大每服十粒煎人參湯下量兒

大小加減

二百十 大黃丸瘡痂起而能食用此下之 錢氏曰未可以

能食為有熱而便下須兼他症參看瘡痂起而能食食

而腹滿不大便喘急昏甚謔語者方可下下藥但使去

熱毒不為瘡害也若因能食一症便下之則不穩蓋熱

氣未深故也如傷寒發厥瀕在六七日後蓋氣深方能

發厥厥而下之表裏皆解 大黃一兩酒浸一

川芎半兩 黑牽牛各半生半熟 為末 糯米糊丸如麻子大

每服量兒大小蜜湯下以澹利為度

百十 川黃散治麤疹及班瘡大便不通

大黃剉微 川芎各兩 甘草炙 黃苓 枳殼炒各半兩 為粗末

每服一錢水一小盞紫草少許煎至半小盞去滓温服

無時 痘瘡大便不通不為大害不可便下瀕看大便

欲通而不得通腹脹滿心胃悶喘急面赤睡中譫語有

此諸症方可下之有諸熱症大便如常此又不可下熱

在表故也常與小柴胡湯五苓散又看熱氣淺深藥當

隨熱淺深而多少之可也

〔四十〕大承氣湯治昏甚謔語妄言大便不通腹脹手心脈

下有汗目睛黃赤喘急者 厚朴 八兩 大黃 四兩 枳實

一兩 送炒為粗末每服五錢水半盞煎至二分入芒消一字

去滓溫服無時

〔五十〕益黃散治胃冷嘔吐脾虛泄瀉或因瘡煩燥渴水飲

冷過多致傷脾胃 丁香 訶子 煨青皮 去瓤陳皮 白

木香 各一 為細末每服一錢水半盞煎至三分盞去滓

溫服無時

〔六十〕參朮丸治脾胃傷冷外熱裏寒不思飲食身常壯熱

大便或澹色白或患痘疹身有大熱因食冷物或冷藥

過度或瀉或腹脹或瘡出癩白無血色此由裏寒脾胃
伏冷榮衛不行致令毒氣內伏不出服之其瘡癩白無
血色者則淡四圍紅暈再作膿結痂而愈

人參 白朮 乾姜炮 甘草一分 為細末米糕泡糊丸

如麻子大每服百餘丸溫水或米飲吞下食前

仲景治傷寒輕者用理中湯重者用四逆湯此足陽明

胃經而感寒邪胃乃中州之府故曰理中以辛甘發散

為陽而退寒邪也或煉蜜丸之曰理中丸蜜其入脾嚼

下便化于中焦今參朮丸以粳米糕丸者取其難化服

在胃中滲漉漸化則中焦得煖脾胃嘉燥其熱自歸此

所以能治熱也

七十 二和散治瘡疹并傷寒冷熱不和陰陽痞脹氣不升

降服之調榮衛和冷熱升降氣消食快氣 藿香葉

香附子炒去毛等分為細末每服抄一字溫水調下無時

八十 六神散治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發虛熱

人參 白朮 茯苓 甘草 白扁豆炒黃耆蜜炒

等分為細末每服抄二錢水半盞生姜一片棗一枚煎

至三分去滓溫服無時身熱甚者加烏梅少許煎服

九十 治中湯治痘作時熱渴或飲冷水或食寒物嘔吐下

利不食身雖熱其中寒 人參 白朮 乾姜 地 甘草

青皮 陳皮去白分為細末每服一錢水半盞煎至三分

去滓溫服無時量大小加減

百二 胃風湯 症候并方見集驗方

百二 乾姜甘草湯 治瘡疹 服冷藥太過 欬手足冷 脉遲

自利 嘔吐不食 乾姜 炮 甘草 各四錢 剉為散水一升 二

合煎至四合 去滓 溫服

百二 胃爰散 調理脾胃 吐瀉 斑瘡 未出 鑿者不識 形症 便

將冷藥 冰却 瘡疹 致令 內伏 不出 將此 調理 如無汗 用

控心 散發 之後 下 蒸 活散 胃爰散

糯米 一兩 乾淡木瓜 三分 甘草 一分 丁香 同炒 藿香葉

紫蘇葉 各一分 同研為細末 每服一錢 或半錢 煎粟米 粳

子湯 調下

百三 勻氣湯 取餘毒後 調理

桔梗

洗五兩乾

甘草

炙二兩

白乾姜

分縮砂

陳皮

白朮

茴香

各

洗

一兩為細末每服半錢或一錢用霜木瓜或紫草鹽煎湯

調下

霜四豆乳散治痘疹間偶滑泄不止甚者宜服

肉豆寇

一枚

乳香

大一豆

為細末米飲調下

十百五姜附湯治痘半出半不出或出盛時却下利肢厥嘔

逆腹脹吃噫急與理中丸四逆姜附湯之類不須疑已

試驗也大便秘自利腹脹者是熱毒被冷所擋不能出則

為下利其毒小得出則為腹脹當此以理中丸四逆姜

附等溫之則利止熱毒復出脹自消瘡亦自出矣又有

痘疹半出半不出或出盛時大便不通小便赤澀喘粗

腹脹唇齒乾口燥渴引飲譫語者當急下之此是毒氣
壅滯欲出而出不辦故腹脹下之熱毒散榮衛伸則裏
脹消外瘡出合溫合下皆得其宜若下膿血而腹脹者
又非此症宜南金散乳香猪血膏理中丸姜附湯之類
(百六)七珍散調胃進食滋養榮衛

人參 白朮 茯苓 山藥 黃耆 蜜炙 甘草 炙 白扁豆 炒

等分為細末每服抄二錢水一盞姜三片棗一枚煎至
六分盞連滓溫服無時加粟米名八珍散

昔人患不食諸藥不效用此數日飲食大進脾土居中
燥濕皆非所宜但得其中則水升火降脾受谷味矣

(百七)薤白湯治痘疹下利黃赤膿血及身熱

薤白 薤白 豆豉 薑山梔子 水五盞煎薤白爛為度
去滓量大小服解去惡積也

〔百八〕活血散認是瘡症不出或出遲或倒靨

白芍藥妙為細末溫酒調服如欲止痛用溫熱水調服
此調榮衛藥也大抵瘡疹氣勻則出快榮衛無阻則氣
行矣為藥主時行寒熱消癰腫則治瘡疹矣經云足得
血行目得血明手得血握活云感寒脉大尺弱兩足拘
孛為下焦血少用白芍藥六兩甘草半兩煎湯三服遂
脚伸能行此亦活血行榮衛也

〔百九〕人盡散治瘡疹已出不快既出倒靨瘡疹作熱脉反
遲或攻皮膚而出遲或面額赤脉不洪大或服涼藥過

多血溢氣弱而出不快隱隱在皮膚間以酒調服之

錢乙治瘡疹倒靨入射香酒調服之尤佳或加赤小豆
七粒薄荷酒調服之若黑色者名鬼瘡子用獾猪血調
下二錢移時再服 用人齒脫落者磁瓶固濟大火煨
令通赤候冷取出為末薄荷酒調服半錢良久脉平毒
散瘡如粟米而出此為發出瘡疹之藥 昔有患瘡疹
已出而稍遲遂用正氣散加白芍藥又用胡荽酒猴黎
酒尚出遲渠家謂藥大緩夜來自燒人齒五枚酒調服
之一身瘡疹尽出于聞大駭再診其脉已微觀腦後并
兩脚尽白色是榮衛弱毒氣少而藥力太過陽氣少而
無以應接故無血色也陽氣尽出于外則裏寒二氣成

温。必濡瀉急以二氣川為小丸服至半兩水瀉二日
方止。又服內補散治瘡痘。成斑爛遍躰成片將息月
餘方愈。此因人齒散表過故也。如傷寒發汗須看榮衛
之淺深瘡疹表出須看蘊熱之多少。若蘊熱少而用藥
過則為斑爛。故已出未快者宜活血散。猴黎酒。葡萄酒
之類。既出而倒靨與稟受弱者須人齒散。則藥病合宜
而相當也。不尔則病輕藥重。反以為累。後人不究毒氣
輕重。一槩用藥。因茲天橫者多矣。人齒治乳癰。破腫
出箭。鏃則表瘡疹宜矣。若悞用早為斑爛。為虛脫。為重
寒。不可不知。前云服人齒散。脉微而瘡色白。為外陽微
也。濡瀉為內陰盛也。先用二氣丹。後尚濡泄。若用之遲。

豈不虛脫 又有田舍及市井小兒患痘行走當風狂

服硝黃無害者恐富貴之稟非負荷者比各隨耳而治

補散治正患痘中或感外寒或內傷生冷或服涼

藥過多因生吐瀉脾虛血溢痘疹遲不出肌瘦而無

血色宜內服調脾胃藥外服此方滋養血氣瘡毒得出

人參 黃耆 白芷 當歸 肉桂 桔梗 炒 川芎

木香 甘草 防風 厚朴 阿膠 橘皮 去白

等分 為細末每服一錢入酒二匙溫湯浸調服無時

王子建云仲景論症多而用藥少男子詳而婦人略此

亦不考也若使仲景存日其方有餘用矣蓋無壞病也

本醫治病唯利是圖動輒差悞後賢处方皆是救其差

誤故方愈多耳治瘡用內補散亦救其差誤也俗云瘡
是熱毒見藥稍溫便以為誤殊不知傷寒是傷于寒間
用硝黃升麻知母之類此皆救一時不及不可偏執使
緩急療病以致敗事

〔預〕赤茯苓湯治痘出後欬逆脇痛不下食脇痛者由病

後毒氣溷亂阻于升降左右為陰陽之道路氣之所行
裏今氣滯為脇痛以枳殼寬腸下氣令氣順脇不痛也
大青梔子去蘊熟升麻解毒赤茯苓導心火利小腸使
熱不傷于肺則欬逆自平耳 赤茯苓 甘草 大青

升麻 枳殼麩炒各半兩 梔子一分 為粗末每服一錢水一小

盞入苦竹葉七片豆豉三十粒煎至五分盞去滓分為

三服日三四服量大小以意加減

三小柴胡湯治發熱甚而嘔者 柴胡 人參 黃芩

甘草炙半夏潑二兩半七次為粗末每服三錢水一盞

姜二片棗一枚煎至半盞去滓溫服 欬嗽加五味子

頭熱發熱肢節疼四味升麻湯 大便不通四順飲

大便自利黃黑色者此毒亦有所出不必廣服湯劑

大便自然通瘡亦稀少而快利只與四味升麻湯荆芥

散不可以溫藥助之下利甚者却與少溫之

十三大青四物湯治熱病十日已上發汗及吐利後熱不

除身上斑出 大青四兩豆豉八合阿膠 甘草炙各一兩

劉如麻豆每服抄五錢煎至六分去滓炮河膠令化服

百三 砂糖水 瘡作膿窠是毒氣尽出在肌但未結靨

調砂糖水與則瘡乾若服血泡未成膿泡乃毒未出尽

便與砂糖水損目者多矣不特此也糖蜜棗柿即瘡入目

及煮鵝鴨雞卵兒聞卵氣目中即生翳膜更不可食也

滅癩瘡子將欲乾時須與搗去茄令血出定無癩若泛他

乾定隱有癩也

百五 藍根散 板藍根兩 甘草分三 剉為細末每服半錢

或一錢取雄鷄冠血三兩點温酒少許調下食後

百六 甘露飲 解胃熱痘瘡已發後餘熱温壯齒齦宣腫牙

痛不能嚙物飢而不欲食煩熱面黃及病後瘡疱乳母

俱可服 甘草 山茵陳 石斛 枳殼 枇杷葉

黃芩 生地黄 麥門冬 去心 等分為粗末 每服抄二

錢水一盞煎至八分食後溫服 牙齦動搖并服

^{百七}槐花散治班瘡餘熱不退 赤小豆 槐花 各錢炒

射香 鈔為細末 每服半錢 蜜湯調服 無時

^{百八}淨心散治痘出欲尽便服之 如入眼即自退

蛇脫 燒一條 灰 皂角 不姓者十 為細末 每服一錢 小兒半錢

熱水調下 加甘草 生用

^{百九}青金丹治瘡疹病後取下餘毒 滑石 白丁香 過研

天南星 青黛 細羅 輕粉 水銀 各二錢 先以鉛二錢和

馮地 上川巴豆 去皮心膜七十三片 無缺損者用

右藥和勻軟飯丸如梧桐子大巴豆不去油依形症用

湯使 傷寒後取積痰煎葱白湯下 痺虫牛肉汁下
驚風肚中緊硬面青黑金銀薄荷葱白湯下 因傷着
肚中及腹皮上微熱腹脹夜間作熱似痺又不是痺面
青黃色眼微黃腹中有積用皂子二七粒灰內煨過水
一盞煎至半盞送下 有積作瀉魚酢湯下 氣積妙
茴香湯下 周歲十四九二歲十八九七歲二十四九
看大小加減瀆是四更初天明通下積來及時可依形
症用藥補之臨服恐先吐下涎來不妨

(百四) 黃苓散治瘡出尽恐毒入目極妙

黃苓 山梔子 黃丹 等分細末牛旁子葉取汁調

塗頂門

百四 灯心湯治痘後煩喘小便不利 灯心一把 驚甲醋

黃二劉散每服一兩水八合煎取四分服量大小加減

百四 黃耆散治壯熱不退涼肌膚散熱 黃耆 柴胡

乾葛 甘草各為末每服一錢薄荷三葉水半盞煎

至三分約三呷潔心服之發熱類日未退恐是瘡疹量

其虛實用之

百三 硃砂膏治驚積驚熱病後可常服 硃砂兩 鵬砂

馬牙硝各 珍珠末一錢 玄明粉上二錢已并研 片腦 射各一錢

各為末一匙拌和用好蜜煉成膏 諸般驚用藥一黃

豆大金銀薄荷湯少許化下如遍身潮熱甘草煎湯化

下一月內小兒不通下藥用乳調塗乳上令兒吮之

百四 宣風散治身熱煩渴腹滿而喘大小便赤澀面

亂若大吐當利小便不吐者宜此 檳榔二陳皮

甘草 較酪黑牽牛 四兩半炒 為細末三兩成蜜湯調下

錢已上者一錢食前服

百四 其桔湯治痘疹咽喉疼痛生瘡 桔梗 二兩 味

其草 較 二 為細末每服二大錢水一盞煎至五分食後

溫服如肺熱手撮眉目鼻面加阿膠半片炒過同煎至

五分服

百六 定命珠砂散治痘疹毒氣不出或出後乾黑色服此

發出毒氣瘡當細紅而出也 朱砂 半兩 生龍腦 滴乳

馬牙硝 四味 研甘草 二錢 五味研勻用臘月新獐猪血半

并同研取青竹筒二尺留兩節開一頭作竅子注藥在
內黃臘塞竅油絹裹封勿令洩氣埋地中一百五十日
取出水洗掛風中四十九日劈開取藥研末每服半錢
新汲水下

(百四)鼠粘子湯即消毒散加防風治療相同主痘出大盛

(百四)班瘡入眼 牛旁子 人參 各二兩

同研細末每服二錢糯米薄粥調下神効不可且述

(百九)治瘡出不快既出不正色

取粉乾葛為細末每服三錢用雄鷄頭一箇搗爛入葛
末用水二鍾煎至一鍾去粗服其驗如神

(百五)人參清膈散 人參 柴胡 當歸 芍藥 知母

桑白皮 蜜炙 黃耆 蜜炙 白木 紫苑 去土 茯苓 石膏

滑石 地骨皮 銹 牡蛎 右剉 水煎食遠溫服

百五 六味人參麥門冬散 麥門冬 去心 人參 白木

甘草 陳皮 去白 厚朴 煨 汁各兩半 咬咀 水煎溫服無時

百五 七味人參白木散 即錢氏白木散

百五 敗草散 乃蓋屋或蓋墻多年爛草取其多經霜雪

雨露感 **天** 地陰陽之氣善解痘毒不以多少曬乾或焙

乾為極細末若瘡汁不乾粘衣惹席濕爛不能轉動

用二三升攤席上任其晒卧為妙