

湯頭錢數抉微

湯頭歌訣原叙

古人治病藥有君臣方有奇偶劑有大小此湯頭所由來也仲景為方書之祖其傷寒論中既曰太陽症少陽症太陰症少陰症矣而又曰麻黃症桂枝症柴胡症承氣症等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合症而後用之豈苟然而已哉今人不辨症候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以己病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深長如金科玉律以為後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不揣愚瞽重為編輯併以所主病症括入歌中間及古人用藥製方之意某病某湯門分義悉理法兼備體用具全千古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取使用者得歌二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知簡則易從以此提綱挈領苟能觸類旁通可應無窮之變矣是在善讀者加之意耳

康熙甲戌休寧八十老人汪昇題

章氏補正湯頭歌括例言

一汪訛菴此書本為初學便讀起見風行一時幾已家經戶誦不才如僕何敢作貂尾之續但古方精神全在所用之分兩而原歌於分兩漏不編入是為缺點特取而訂正之。今醫於某病某湯講求者衆獨於所用分兩往往輕視處方時隨意填寫幾成習慣殊不知同此一藥重用之則治此病者輕用之則治彼病矣試取經方而細辨之方信余言之不謬是編於此等處無費苦心間為指出舉一反三是在學者。

一古方於今醫所視為虎狼藥者往往有重用至二三兩遵古則駭俗減輕則失其本意而藥必不靈是在神而明之隨機應變故余於此等古方歌括中不插分兩悉仍其舊且有深意願學者細心辨之。

一僕於醫道雖寢餵有年惟醫學高深究難自信此篇僅藉一得之愚為後學計耳非敢問世倘海內鴻達匡而正之尤所厚望

錢數抉微自叙

予不喜筆墨獨閱醫書二十餘載無一不確求底蘊竊以靈素難經仲景叔和註釋彰明自唐宋以下名醫輩出蠟陳方書已無遺漏惟分兩一道自古迄今訖未道破絕少發明不第學者茫然即近代名醫往往視為細微忽畧不講然考諸經義治上中下三焦者自一二錢以至三錢各有定分參致古方神效之由實在錢數製化之妙爰就一得之愚載

諸簡編以公同好雖小慧而為之猶賢也乎。

民國二年夏月紹興納川章方汎題

重訂補註湯頭歌全括

休寧汪昂設菴原輯

紹興章納川方汎重編

補益之劑

四君子湯

白术、茯苓各二錢。甘草半錢。味中和。散名君子一錢。

益以夏陳名六君子。

除祛痰補氣陽虛餌。

二味除痰。四君補氣。脾弱陽虛宜之。

除却半夏名異功。

散或加香砂胃寒已。

加木青砂。

仁行氣溫中。名六君子湯。諸方分兩亦有定別。求古方茲不備。章納川曰。參术苓甘補氣健脾。不偏不倚。故名君子。蓋人參之氣直。白朮之氣橫。人參無白朮。其氣不入。絡白朮無人參。

其氣不入經。故多吃白朮。其氣左右不能出。胸悶飽滿者多。參术同用。共相依符。方能達貫。通身臟腑之間。獨吃人參。其氣亦不久留。因參之氣直。如口中酒氣上能出。下亦能泄。取快一時而不久。蓋人之氣血日耗。全藉日生。陽虛氣弱之人。得參术相助。乃能運化日用飲食之物。夫食化津液。血氣運化速。自然氣旺。血冲。藥性雖去。已無妨也。脾為濕土。恐有阻滯之患。故佐茯苓泄濁下走。尤能升清氣上行。故為陰中之陽。與別藥滲濕。直走於下者不同。甘草和中。調和諸藥。不使其急去。補氣利濕之藥雖多。此方竟無一藥可代。古人用藥精妙之意如此。又四君子湯為中州之藥。獨守中州。其分兩用二錢者。亦中州之錢數也。

升陽益胃湯

東垣

二錢羌獨芍防五分先參夏草分陳茯四木鴻柴胡三分煎黃連二分

加姜棗分兩條屬分算填章納川曰此湯原註不無悞會蓋不論湯中分兩僅照藥性
表而論故李東垣乃醫中亞聖藥性最屬精詳四子中尊為第一其方非深究本屬
難知但升陽益胃湯確不為補脾胃而設因內留邪濕熱不運胃口不開方用此湯
看其所用分兩大有出入分兩必須照用則升陽益胃所謂輕者浮而升之為也若分
兩加重則成表補同用之亂方矣故其中大有意義觀黃芪為君因其有固表之能陳
藏器諸虛用藥門客熱客寒均用黃芪可見黃芪非一定補藥也况羌獨芍防亦不輕
用明係以風藥燥濕又加夏苓木濁利濕健脾而助黃芪之力然利濕者中土之氣必
傷故用參甘只有二十分之一却不使其補不使其傷以守神氣邪濕雖輕然脾胃衰
極不能推出微邪以致固積不解所以一方之中用兩法一法升陽一法燥濕所謂偶
方也此用法祛病之偶方豈可照藥性表面註解而列於補益之中大大深察後人一
見參木芪甘便為補方悞之已久茲特闡明未識海內諸君鑒許否○又濕滯於中胃
口不開者今醫每以利濕之中加清食之品冠伐脾胃名曰開胃而東垣除濕之中尚
且防滲泄胃氣故用此湯扶胃去病此東垣醫道之高並非東垣首重脾胃良由可重
則重豈方用參木芪耶成方具在可考而知今者無論有無精食一聞胃口不開便
用穀麥芽或焦山楂消伐胃氣反云開胃實不知藥性治病之法耳所插分兩參夏草

分者。一分也陳茯四者。四分也木鴻柴三者三分也慄然原方每服三錢之數而分配

之。原註黃芪二兩。人參半夏矣。草各一錢。生淮歸各三錢。黃連二錢。每服三錢加姜東煎。

黃芪盤甲散羅天五錢。骨羌活柴三錢。專紫苑知母草夏芍地黃桑皮二錢半。錢半肉桂

參勞熱。

此作兩劑加薑煎。

治虛勞骨蒸。煥熱咳嗽。食少益汗。黃芪盤甲天門冬五錢。地

草各二錢半。人參肉桂。桔梗各

錢半。每服二兩加薑煎。

骨參羌活芩桑胡各三錢。紫苑半夏知母生地白芍桑皮半夏。

同前汗多倍黃芪。此方加青蒿烏梅皆飯汗通利之意。

章納川曰。此湯一劑分兩劑服。

錢裏一劑分兩劑服亦無妨也。

秦艽扶羸

湯直指

柴二錢。羌活骨歸參錢半。姜棗二錢。苑夏草肺勞蒸喉服之安。

治肺勞骨吸。汗體倦。柴胡二錢。秦艽盤甲地骨皮當歸人參各錢半。紫苑半夏甘草失各一錢。生地白芍桑皮各一錢。

加姜棗煎。按黃芪盤甲散蓋本此方除當歸加餘藥。○透肌解熱。柴胡秦艽乾葛為要。刺故骨蒸方中多用之此方雖未經交治。而以柴胡為君。

紫苑湯中

海藏

知貝母阿膠一錢五味十。參茯甘桔各五分。肺咳血痰勞熱益

勞熱久嗽。味。治肺傷氣短。

痰。吐血。肺痿。肺癆。紫苑知母貝母阿膠各一錢。人參茯苓甘草桔梗各五分。五味十二粒。一方加連子。○以人肺止嗽為君。故用阿膠五味以清火化痰為臣。故用知母貝母。佐以參苓甘草扶土以生金。使以桔梗上浮而利膈。

百合固金

湯直指

百合固金。當歸芍草當貝母一錢。二地黃。麥冬錢半。立桔八。喘咳痰血大肺傷。生地二錢。

參冬錢半。貝母百合當歸白芍甘草各一錢。立參桔梗各八分。○大旺則金傷。故以立參二地助腎滋水。麥冬百合保肺安神。芍藥當歸平肝養血。甘桔貝母清金化痰。皆以立

甘寒培木不減以苦
寒傷生發之氣也

章納川曰。燥大旺者相宜。若陰虛濕大旺者便不相宜。今之治虛損者。不辨宜與不宜。均以養陰清熱之藥。死者多矣。

補肺阿膠散錢八錢定五錢鼠糯草菟鈴四錢杏仁肺大盛順氣生津嗽便寧。

阿膠利肺潤喉杏仁降氣潤喉。李時珍曰。馬

菟鈴非取其補肺。取其清熱降氣。肺自安也。其中阿膠糊米乃補肺者之正藥也。

章納川曰。補肺阿膠散此症虛大上升燥金三焦皆無津液已為陰大燔病勢不輕。

原方分量未始不可用。因恐病家畏之。故減少一半。尚可效用。

益氣聰明湯東垣葛根六參芪錢草分黃柏芍四升麻三足氣升陽耳目清。

參芪各五錢葛根四錢

各三錢黃柏白芍各二錢升麻錢半錢。○失草一錢每服四錢。○人之中氣不足。清陽不升。則耳目不聰明。葛根升葛升其清氣。參芪甘草補其中氣。而以芍藥平肝木。黃柏滋腎水也。

小建中湯仲景芍六錢。即桂子加芍藥湯。再加饴糖名建中桂薑減半草一錢。鈴糖兩六一二棗。虛勞腹痛補。

中臟草芍藥六兩桂枝生姜各三兩甘草十二錢。鈴糖一升。增入黃芪名亦爾。

再加黃芪兩半。名黃芪建中湯。

湯不名建中矣。今人用建中者。絕不用鈴糖。而用桂枝。桂枝生姜者。用之陽虛者。出陽虛者。用之陰虛者。

○章納川曰。癥在四肢。汗出陽虛者。用之桂枝。桂枝生姜者。用之陰虛者。漢紅隱隱微。見肌表。此寒伏於下。逼其無根之火。薰肺而然。若服寒藥五劑。

斑勞損起沉疴。亦有陰症發旺者。漢紅隱隱微。見肌表。此寒伏於下。逼其無根之火。薰肺而然。若服寒藥五劑。

十全大補加附子。麥夏

旋谷仔細嘴。即十全大補湯加附子。麥冬半夏肉桂。蓉名十四味。建中湯治同。

十全除

却芩麥木芳地旋谷大建歌。

章納川曰。一方有一方之分量。豈可輕言加減。以桂枝芍藥論。芍藥倍於桂枝治內傷。若芍藥之分量同於桂枝。則治傷寒矣。錢數多寡之間。治病懸殊。湯名亦異。以此思之。醫不可學。亦不敢學矣。然一法通萬法。通如此湯之治虛勞腹痛。其病由於氣血皆寒。寒故血凝作痛。夫血分之邪。非桂不達。其性又辛溫。而燥。辛溫能散。凝精之寒邪。燥又適為脾家之所喜。并佐以生姜之辛潤。以制燥而散寒。又以虛勞之人。豈可用此大溫大表走而不守之品。故重用白芍。竚住脾陰。草姜飴糖。調復陽明胃土。譬之用兵。自固既嚴。則任聽溫表之姜桂。攝動陰中積滯。反成和營之良方。補後天之妙法。不可謂虛人不能服。開散藥。苟能配合得宜。陳疴立起。今病家每每不肯服。治病藥喜吃。菓子方。或補益藥。殊不知菓子方。服猶不眠。尚無大碍。若補益藥用之失當。反致傷生。誠以補藥補虛而不治病。迨服補藥而不愈。或服補藥而不受。是有病也。何獨知是虛。而不知是病。反視治病藥如虎狼耶。余濟世為懷。能不為病家惜故。表而出之。又余於此湯減少分量。實係仿照原方分量。均勻分配。一齊減少。仍與古方相符。試用亦效。



發表之劑

麻黃湯仲中桂枝二杏仁七十甘草兩發熱惡寒頭項痛傷寒服此汗淋漓

麻黃去節三兩桂枝二兩

杏仁七十桂枝去皮尖草一兩傷寒太陽表症無汗用此發之○麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不令大發也按桂麻兩湯雖治太陽症而先正每云皆肺藥

○以傷寒深自皮毛入而桂麻又入肺經矣。○納川云輕則入肺重用達膀胱經矣。

章納川曰此等古方所用分量重則不行於

世輕則無益於病如本方用麻黃至三兩之多或謂古人身體不如今人之弱故分量

極重或云古時戰秆與今時不同殊不知分量可謬為不同而古方桂枝有用附子一

枚者則又何說且仲景方治傷寒寒積於胸之三白散用巴豆僅止二分則明明有多

有少氣體戰秆之說臆度可知而如本方乃治傷寒之正方傷寒一日太陽膀胱為病

膀胱屬下焦麻黃乃輕虛上浮之藥若不重用豈能達到下焦今人不敢輕用麻黃者

以其發汗力過大殊不知傷寒本宜汗解不若溫病之不能大汗用得其當則大汗適

足愈病故仲聖用之三兩之多况古者煎藥用大鍋若今人之煎大料補藥然煎透後

令病者於一個時辰服藥一碗以病止為度若服一碗而病止則棄其餘並不限定碗

數并不限定料數病止之後傷寒遂不至傳經而自愈現時用藥輕桂枝傳經必俟十

日之外而病始愈豈不冤哉故余於本方歌括雖仍插入分量而後凡有類乎此者可以類推

桂枝湯仲治太陽風芍草薑東各三用

桂枝芍藥生姜各三兩炙草三兩大棗十二枚溫太陽中風有汗用此解肌以和營衛中有傷也仲

湯頭錢數抉微

卷二

四

聖傷寒
論通用

桂麻相合名各半湯

太陽如瘧

此為功

熱多寒少

如章納川曰

古無藥鋪

各散

瘧狀者宜之

此說代遠年湮實無考究

以理度之

斷斷不是如此

已於麻黃湯中註之明矣

今凡有一料

分作十劑者

不過明大小數之

錢與兩以便遇正傷寒用兩遇雜感用錢

因正傷寒必須全料大劑且必時時服之

其

病可不俾經而解

雜感每日一劑可也

全料與一劑之用以此為辨

麻黃桂枝等湯在

傷寒論條填全料分量在傷寒書中不得不爾

後人不知分別看傷寒論中似乎宜重

者雜感之中似乎太重以致左右莫决或謂古今

之體質不同或謂古今

戰程輕重

互異各執一詞即照古之一兩即今之三錢零之法減之

三三見尤尚有兩許仍不敢

用實不知傷寒與雜症大相懸殊不但治傷寒之分量不能治雜症即治雜症之分兩

亦不能治傷寒易地皆然其故蓋可思矣

大青龍湯仲麻黃六桂草膏姜三棗杏

麻黃六兩桂枝三兩芍藥三兩甘草三兩杏仁四十粒石膏一斤生姜三兩蜜十二枚

太陽無汗

兼煩躁

煩為陽為風躁為陰為寒必太陽症兼煩躁者方可用之以杏草佐麻黃發表

雨降熱煩躁而煩躁方解也

風寒兩解此為良

麻黃湯治寒桂枝湯治風

天青龍湯治風

若少陰煩躁而煩躁此則逆

風寒兩解此為良寒而兩解之桂枝湯治寒而桂枝湯治風

天青龍湯治風

今人

小青龍湯治水氣喘咳嘔渴利慰

太陽表症未解心下有水氣者用之或喘或嘔或利或短氣或小便祕皆水氣內清所發

薑桂麻芍甘辛二兩倍半夏兼五味

羌活或葛根或桂枝或黃芩藥酒炒。大草細辛各二兩半升舊註。桂指傷寒用小青龍湯證語。

章納川曰。予觀仲景傷寒論一書。以小青龍湯治傷寒而傷寒之藥必須時時服之。故

用全料大劑以期即解。又觀仲景金匱仍以小青龍湯治咳逆而咳逆之藥每日祇服一次。故後賢以治咳逆其錢數照傷寒祇十分之一。病亦即解。一方而中兩病。因其病根剗一也。病根同而錢數亦同。不過傷寒一時服一劑而咳逆一日服一劑微有區別。試重言以明之。仲景湯所書之分兩皆指十劑之分兩而言也。因傷寒煎一料。一時服一劑。咳逆煎一劑。一日服一劑。以此兩證合辨一料非一劑已可想而知矣。故仲景不明言。然而何必明言。知湯知藥知錢數之理者。孰不知仲景所填者。係一料錢數也。所以後賢以治咳逆必以十中取一而用之。可為余所作錢數表之証佐也。後人不及細解。因見後賢之減錢數以治病意為古之戰秆。與今不同。今人體質與古有異。獨不思仲聖之論傷寒用小青龍湯分兩何以重後賢之治療飲用小青龍湯分兩何以輕。苟知乎此。知先聖後聖其揆一也。不知乎此。徒以小青龍為仲景之方。不知一料十劑之區別。所謂盡信書則不如無書也。故用小青龍湯之症錢數可定而待也。而古湯之分兩。方方不宜加減者為此病根同錢數亦無不同。如可不同。則多而有益。何為而不多。若少而無損。何為而不少。仲聖不必註錢數。隨後人之斟酌可也。後賢不必以十中取

一亦聽後人隨便填用可也。可見錢數之於病實有一定不易之道在欲知一定不易之錢數必須先知病源。故予謂用藥必先論病。金匱云：欬逆倚息不得卧。小青龍湯主之。蓋咳逆倚息不得卧者，膈間有水氣故也。膈間之水氣即胸中之痰飲沾着胃口而嘔逆則此病在胸膈之間明矣。又小青龍湯者其中所用之麻黃原註二兩係是以十中取一即二錢也。細辛麻桂為上焦心肺之藥以一錢入心肺予於錢數表本言上焦之藥用治上焦正數一錢。借治中焦者三錢之數今之病飲在膈間而胸膈在心肺之下在脾胃之上二錢之數豈非適合胸膈之處。麻桂用酒炒者酒能引藥氣升上使其先入肺中後入胸膈所以炙草不用酒炒不要其同入肺中恐甘緩留連致麻黃久停肺中既使麻桂入肺又不欲其久停何也因咳嗽之總機關在肺其病究在胸膈之中逆嘔之總機關究屬在胃故又用干薑白芍各二錢者薑芍中焦藥二錢者本中焦之錢數用以保護陽明蓋姜芍亦用酒炒者先使其保護胃口因胃口與胸膈相近痰噦多粘胃口則嘔逆又用半夏五味子各半升者以十取一即八錢用半夏以消三焦之痰病至如此其痰三焦必皆有也用五味以斂三焦之正氣使麻薑桂辛推蕩痰飲水氣不耗正氣此小青龍湯及錢數合病之本義也。湯即藥也藥隨病用錢數亦隨病用相依相伏而錢數必合於湯義如湯無意義一病用一藥醫之可也何必合劑伊尹作湯液療病之靈有過於鍼石者意義本屬深長故仲景遵而用之一湯之中有多端之

奧義今者連錢數之大意不知安望其療病耶。而湯義之明必合於錢數。如錢數不合於湯義即是不合於病源。錢數無用矣。一錢可也。二錢亦可也。錢數不必用耳。任藥鋪中隨便點放可也。如以錢數不足輕重論。即以小青龍湯言之。譬如辛夏五味用二錢。細辛麻黃用八錢可乎。不可服也。如謂方中錢數配藥必有制合。五味應多。桂麻細辛應少。藥乃可服。固矣。而錢數之於病。獨無出入。乃病所在胸膈。而胸膈無引經之藥。錢數不作主將。何法使藥入胸膈耶。夫病必須以藥到而病始瘳。今亂填錢數。何能包管其必入胸膈耶。如謂消痰飲之藥入咽過胸。而胸中之痰飲可消。吾知其斷斷不能消也。如曰可消而下焦之病乃藥下咽入胃。而磨煉消化而變屎變糞。其藥已無藥之本性矣。下焦之病而藥不但不能到。而且不能過其病。豈非不能愈乎。如無論何臟何腑之病。藥到脾胃能愈。不必論其達病所與否。必無此理也。如曰有此理。用藥如用兵。然試以兵比之。病強盜也。藥兵將也。今以強盜羣聚一城以為禍。使兵士尅之。而兵士但於其城外走過一次能尅乎。即走過十次百次亦不能尅也。必須以久攻直入。然後可破其巢穴。而獲盜首。以解脅從其盜乃平。如此則飲藥但過膈間。將何法使藥直入病所。而愈其病乎。試問彼不信錢數之理者。胸膈飲病之錢數。必何如填法。可直中胸膈病源。倘能說明。應甜拜而受之。余謂細辛麻桂各用二錢者。適中胸膈之病。其理甚精姑不明言。待將來註別項醫書內。再行詳論。若於此下即詳盡言明。聞者省過一遍。仍不

深會於心。不深會。仍屬無用。不如不即明言。或者反能細思。何法使藥直入之理。而能豁然貫通也。○余於此書註成之後。有友人謂先生既抉千古不傳之秘。留此直達胸膈之法。秘而不宣。不成全書。在知者因知。先生苦心作養。俾讀者歸而求之。之深意。在不知者。反謂先生亦不知此理。故作疑陳以欺人。余避其言。而故於直達胸膈之理。復詳舉而盡言之。蓋藥入咽。必先入胃。何臟之藥。由胃氣必先送入何臟。然亦有不合法而送不到者。亦有此臟之病。欲送其此臟。若錢數及各藥配合。不得法。而偏合於彼臟之法者。則送於彼臟矣。其病不變。幸耳。安望其愈耶。今言麻黃二錢。因一錢為肺藥之錢數。今用二錢。既非入胃。又非入肺。故服後。胃氣僅送到胸膈而止。因二錢之藥重於一錢。是以僅能送之肺之下。胃之上也。豈非用麻黃二錢。正所以治胸膈之錢數耶。又有謂麻黃用至二錢。氣必濃厚。運送必效有力。何致反難達到肺部。殊不知藥重。則汗亦隨之。而重氣為陽。味為陰。氣厚者浮而升。味厚者沉而降。用二錢。則氣雖厚。而味亦厚。互相牽掣。適獲其平。欲其達到何處。仍仗分兩為之主也。又今之治痰咳。用小青龍湯者。其錢數。比十中取一之錢數更減。以致藥輕。不達病所。所以少有愈者。祛飲不盡。故也。錢數之義。不可不究。有如此者。又謬云。麻黃不上錢。而不知有五味子配合。致於無妨。制配之道大矣哉。格物之功也。否則仲聖豈肯遵伊尹而學其湯頭。而治病耶。亦即事理之淺者。必不佳。八卦之深奧。亦是配合功夫。能知過去未來。而方藥之配合。治

病最靈無有謬云。好像吃藥一般靈。如服之不動不變。此等藥方最無本領。

查湯頭歌訣無論舊木板新石印。姜桂麻芍草平均是二兩與錢數表之法相符。當

時汪認菴亦必合準。

葛根湯仲內麻黃三二味加入桂枝湯。葛根麻黃為主藥。桂芍草二姜棗三。

桂枝芍藥各二兩。姜各一兩。

三兩。葛根十二枝。此桂枝湯也。加葛根五兩。麻黃三兩。輕可去實。因無汗。

中風表實。故汗不出。十劑曰。

也。加葛根五兩。此桂枝湯也。景治太陽有汗惡。

十劑曰。也有汗加葛

無麻黃名桂枝加葛根湯。○新註大棗十二枚。亦約有三兩矣。

升麻葛根湯。升麻三葛芍二錢草二錢。實。辛能達表。故用升葛發散。

陽明表邪。陽邪盛

則陰氣虛。故加芍藥。微陰和血。升麻甘草升陽解毒。故亦治時疫。

及目癆鼻癆。亦

治時疫與陽斑。痘疹已出慎勿使。恐升散重

九味羌活湯。張元素用防風。蒼术錢半。白芷。芩地甘錢細辛五。

三錢。白芷川芎黃芩生地甘草各一錢。細辛五分。加生姜葱白煎。

陰虛氣弱人禁用。加減臨時在變通。

羌活。防風。蒼术各錢。

十神湯局裏葛升麻陳草芩蘇白芷加。麻黃赤芍兼香附。時行疫。感胃效堪諦。

十神湯。先

疫。姜白芷。川芎。葛根。升麻。陳草。芩蘇。白芷。芍藥。各一錢。

葛根向無錢數。不敢善擇。然十神湯。

脾胃表藥。分量。照中焦選用。可也。

神木散局通用蒼木錢半草葉芳芷羌半。蒼

木二兩。各一兩。每服四錢。生姜薑白煎。

名走一經祛

風濕。太陰蒼木。少陰細辛。厥陰少陽川芎。太陽羌活。藁本。陽明白芷。此湯意同。加藁本。陰黃芩生地。防風較羌活湯更捷。

風寒泄瀉總堪

嘗。太無神木。歲太無丹。即平胃。兼加入葛蒲與藿香。陳皮為君。二錢。蒼木厚朴各一錢。

漢之師。即平胃。兼加入葛蒲與藿香。陳皮為君。二錢。蒼木厚朴各一錢。

治羸瘦。

之。治羸瘦。

瘡時海藏神木散蒼防草太陽無汗代麻黃蒼木防風各二量。大草一量用代。若以白氣。

木易荅木太陽有汗此湯良名白虎湯。用代桂枝湯治太陽傷風。有汗二木主治畧同。特有止汗發汗之異。○上減半也。今所

腋之錢數減其每四錢之數減算。

麻黃附子細辛湯仲景。麻黃細辛各二兩。附子一枚水來泡發表溫經兩法彰。

二兩附子一錢。少陰症。微沉。

根治○麻黃發太陽之汗。附子溫太陽之經。細辛為督經表藥。治屬其陽。若非表裏相兼治少陰反熱曷能康復。裏富無熱。

今反發熱為太陽表症未除。

人參敗毒散活人毒即熱濕也。錢苓草。枳桔柴前卷獨芳薄荷少許姜三片。時行感冒有奇功。

扶正參。

只壳桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩。甘草五錢。每服一兩。加薄荷生姜煎。○卷理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛。川芎柴胡和血升清。只壳前胡行痰降氣。甘桔參茯清肺強胃。輔正匡邪也。前嘉言曰。暑濕熱三去參名為敗毒散。加入消氣門中。推此方為第一。俗醫減却人參。曾與他方有別耳。

風風門治亦同。消風敗毒散○章納川將人參敗毒散一劑減作十劑。正與舊錢要每

服一兩相符。可見納川所云錢數之理信不誤矣。

再造散節用參芪甘桂附姜防芎芍泰。細辛加棗煨姜煎。陽虛無汗法當諳。

人參黃芪甘草川芎白芍。

酒炒。羌活防風。桂子附子炮細辛炮姜。大棗熟。○以參芪甘姜桂附大補其陽助芎芍姜防細。散寒發表。加芍藥者。于陽中微陰。腹中有此也。問節卷曰。發熱頭痛惡寒無汗。服汗劑。汗不出者。為陽虛不能作汗。名無陽症。庸醫不識。不論時令。遂以麻黃重劑利去其汗。誤人死者多矣。又曰。人第知參芪能止汗。而不知其能發汗。以在表藥隊中。則助表藥而解散也。○章納川曰。此湯此法不可不熟於胸中。然陽虛不能作汗之人。身體必虧。諸藥不可重用。節卷雖曰參芪能助氣發汗。祇可少少與之。則助表藥而解散也。多則不應。

又無陽者故可用附子。無陽即無氣故可用參芪而病者平。古方真真有味則用之當靈極妙極。

麻黃人參芍藥湯。麻芍芩歸草錢梟參麥三分桂味五汗補虛人外感康。

麻黃當歸甘草黃

炙各一錢。人參參冬各三分。桂子五分。五味子五粒。○東垣治一人內虛寒。桂枝補表虛寒而吐血。法仲景麻黃湯加補劑。製此方一服而愈。原解曰。麻黃散外寒。桂枝補表虛。

黃芩甘草補脾。芍藥安太陰。當歸和血養血。

○章納川曰。李東垣醫中亞聖。藥性精詳。

此等方藥惟東垣能之。若無東垣之功候。錢數中稍有差悞。為害不淺。試觀麻黃人參芍藥湯。雖云治傷寒。却非仲景所論之太陽傷寒。如係治太陽傷寒。則下焦太陽為寒所罩。非此輕微之錢數所可達到。下焦而解。觀麻黃人參芍藥湯。舊註謂東垣治一內虛。感傷寒。製此方一服而愈。此太陰為寒所罩。腠裏不開之傷寒也。故醫太陰傷寒與太陽傷寒。亦多有解不清者。譬之麻黃湯。原註汪訏菴謂先正每云麻黃湯。皆肺藥。以傷寒必自皮毛入。而桂麻又入肺經也。云云。所云傷寒乃作太陰傷寒者。故以麻黃湯作太陰傷寒藥。詎不知麻黃湯錢數輕者為太陰藥。錢數重者為太陽藥。且應用麻黃湯施治之傷寒症。古賢亦有稱麻黃證者。亦有稱太陽症者。以此例彼。不更明白曉暢乎。蓋麻黃湯確為太陽膀胱之表藥。彼謂皆肺藥者。其實不知真有太陽症。并不知麻黃湯。真是太陽藥。

神白散

衛生家實用白芷甘姜葱淡豉與相參。

白芷一兩。甘草五錢。淡豉五十片。

卷二

一切風寒皆可

服分量可照時法填

煎要至誠婦入難。天寒之要至誠婦入難。

肘後單煎葱白豉湯一

用代麻黃湯

功不懶

傷寒初覺頭痛身熱使宣服之可代麻黃湯。

攻裏之劑

大承氣湯

仲景

三芒硝大四實一朴八枚

大黃四兩酒洗芒硝三錢大黃四錢只實五枚○

三合作二兩算。只實救陰瀉熱功偏擅急下陽明有數條

新註之意芒硝三錢大黃四錢只實五枚○

五枚作兩算。只實救陰瀉熱功偏擅急下陽明有數條

大黃治大實芒硝治大滿只實治大滿○

天滿只實治瘧二味治無形蟲藥

毒傳入陽明胃腑病滿堵實堅全見難症三焦實

並須以此下之○胃為水谷之海土為萬物之母四旁有病皆能傳入

胃已入胃腑能傳入陽明○

則不復傳他經矣

傳入陽明胃腑病滿堵實堅全見難症三焦實

最緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性躁急故不輕用○

章納川曰

大承氣湯之症必須大劑煎之時時飲服以見瀉為度如病重藥輕遲通一日為害不

淺三焦大熱大實之症傷陰最速倘或陰氣傷盡以致不可救藥觀仲聖立此重劑亦

是此意况藥之物有病則病受之瀉熱即以救陰有何不可重用之理陶節菴云不可

輕用恐悞於世大承氣湯之證與小承氣湯之症不同有何次之又次之之理

小承氣湯

仲景

上中焦下焦無熱試芒硝朴二大四實三枚

大黃四兩厚朴二兩半錢只實三枚○

上焦強熱在上焦則滿在中焦則脾胃有燥熱

音硬

則語不用芒硝者恐傷下焦真陰也

詳用承氣治二便加羌活治風中風體

詳實者可懷用

然涉虛者多不可輕投○

○章納川曰下焦無熱芒硝為傷陰之物本湯

故不用芒硝也如大承氣湯三焦有熱用之瀉熱即是救陰不可悞視若悞視必入陶

節菴之流禍世無窮

調胃承氣

清仲

硝黃

一甘草減半

將胃保

大黃酒浸芒硝各一兩。甘草尖五錢。甘草甘以緩之。硝和胃氣勿令大泄下。

不用朴

實傷上焦

不用厚朴只實火。傷上焦氣也。

中焦燥實服之好

○章納川曰

厚朴只實人但知下氣

和中如藥性高名者知朴實能傷上焦之氣反不重于世也。如虛氣逆胸中之症高手不用朴實而俗醫庸手個個謂其方不對症高妙之極者以反不能得盛名因受一

知半解者之謗也

木香橘柳

九張子和

青陳皮殼柏連枝蓬五錢附牽二兩大黃一

芒硝水九量服之

一切實積

能推蕩滯痢食癥用咸宜

木香橘柳青皮附牽各五錢。大黃酒浸一兩。香附牽斗各二兩。

芒硝水九量服之

○木香青皮附牽各五錢。大黃酒浸一兩。香附牽斗各二兩。

無痞滿後重之患矣

○連柏燥溼清熱柏連行氣破血硝黃去血中伏熱並為推堅峻品

溫熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿

痼不除清陽終不得升亦通因通用之意也

○章納川曰丸者緩也湯者蕩也故宜於

丸藥之症與宜於湯藥之症有別故丸方不可改湯方不可不知

枳實導滯

九東垣

兩大黃芩連殼麴五錢

匡三錢木茯澤瀉二

濕熱積滯力能攘

只實髮炒大黃一兩

○枳實炒黃連酒炒神曲炒各五錢白朮生炒

荳蔻各三錢

大黃酒炒各三錢

○大黃酒炒神曲佐之以利潤

神曲佐之以消食又恐

苦寒力峻故加

苦寒力峻故加

苦寒力峻故加

白朮補土固中若還後重兼氣滯木香導滯

九加橘柳

溫脾

金湯干

參附草芒錢大黃五錢三歸乾寒熱並行治寒積臍腹絃結痛難言

入參附子

甘草芒硝

各一兩

○大黃五兩當歸乾姜各三兩煎服日三

本方除歸硝亦名溫脾湯治久痢赤白

脾胃冷實不清○硝黃以蕩其積姜附以祛其寒參草當歸以保其氣血按古人方中

多有硝黃相連與姜茱桂附寒熱並用者亦有參木硝黃補瀉並用者亦有

大黃麻黃汗下並行者今人罕識其指姑錄此方以見治癒之妙不一端也

○章納川

曰。此湯之意極易識耳。寒能積熱其氣必衰。故用參以補氣。附以祛寒。積當下。故用硝黃。而硝黃寒。故多加溫藥。硝黃不至於寒矣。况臍腹絞痛一劑而標本同治。法無移漏。有何罕識耶。今不知醫。而行醫者甚多。無怪有醫謂余之方。方不對症。淺醫不知方義之故耳。

蜜煎導法通大便

仲景用蜜煎如餉。捨作挺子。捲入。

丸角末。乘熱納

於道中。或捲臍

或搘臍

或將

猪膽汁灌肛中。

用猪胆汁。醋和以

竹管。插肛門中。將

汁灌入。項當大便。名

猪膽汁通法神靈。

汗灌入。項當大便。名不欲苦寒。傷胃腑。陽明無熱勿輕攻。

謂腑無熱。而使

者為汗多

津液不足。不宜用承氣。妄攻

此仲景心法。援人罕知。

藏鍼二方。於臍下之東。

涌吐之劑

汗吐下和。乃治療之四法。經曰。在上者。涌之。其高者。因而越之。裁古人治

病。用吐法者。最多。朱丹溪曰。吐。就有發散之義。

張子和曰。諸汗法。古方多

有之。惟以吐發汗者。世罕知之。

今人醫癥。惟用汗下和而吐法。絕置不用。可見時

師之誤。署特補。涌吐一方。方藥雖簡。而法不可廢也。

若丹溪用四物四君引吐。又

治小便不通亦治吐法。

是又在用者之圖。神矣。

○章納川曰。今不用吐法。所以疾症哮喘無愈人。皆不遵

經旨。正法治之故也。詎不知經旨於百病。無微不至。其法無可遁。不遵經旨能愈病者。未之有也。奈何今因不知經旨。而反生不信經旨之人甚多。因此中國醫道日下。已非

一日矣。且不獨此症然也。今之醫者。不熟七劑十方之法。而亦醫人。不究病根來由。而

亦醫病。見證治症。稱為名醫。由來已久。以致死亡接踵。噫。余心不慎。而饒舌也。眼見陽虛吐血。諸醫聞血出為熱。用涼藥止血。用涼藥補血。詎不知血藉氣生。陰藉陽生。不補陽氣。而陽虛之病根。不復暨。必復吐醫。見血出已多。稱為陰虛。藥用養陰。清熱。陽氣俞。

妄竟不知覺藥服三五年而死。明明醫殺之也。乃世上無知醫。更無至醫。殺三四年反讚其生三四年。嗟醫竟不知人賴陽生。人竟不知陽一分不淨不死之語真所謂盲人遇瞽目。焉得復見天日耳。

瓜蒂散

仲景

細瓜蒂炒黃研末共為末

熟水或薑水調量虛實服

或入藜蘆等金漆

張子和去赤苓加藜蘆

防風一方去赤苓加藜蘆

金漆汁俱名三聖散

共為末

金漆汁俱名三聖散

鵝翎探吐並治風痰此吐實熱與風痰

金帝吐實熱

虛者參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子十四枚或

四合治陽寒後虛煩劇痰烏附丸方透蒂危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

若吐虛煩危政湯仲景危子十四枚或

治風寒後虛煩劇痰烏附丸方透蒂危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

升瘡治許白雲用瓜蒂危政湯仲景危子苦參蘆散

吐不透後以薑水和烏附丸服始得大吐

古人尚有燒鹽方一切積滯功能奏效

燒鹽熱湯調腸以指探吐治

著亂宿食冷痛等症千全曰

著亂宿食冷痛等症千全曰

著亂宿食冷痛等症千全曰

著亂宿食冷痛等症千全曰

著亂宿食冷痛等症千全曰

凡病宜用大勝用藥

稀涎

嚴和仲景

龍軟橘皮去皮搗成

通竅專制風木此脊門之兵也

初中時宜用

或一藜蘆散

通關散

通關散用細辛

通關散用細辛

或一藜蘆散

通關散用細辛

通關散用細辛

通關散用細辛

通關散用細辛

通關散用細辛

通關散用細辛

通關散用細辛

通關散用細辛

和解之劑

小柴胡湯

仲和解供半夏三錢參草芩各一錢加姜棗少陽百病此為宗

柴胡八兩半升人參

甘草黃芩生姜各三兩大棗十二枚治一切桂來寒熱胸滿賜痛心煩喜呕

但無一症即是不必患矣○膽府清淨無虛無

火半夏桂枝芍藥甘草半夏半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

火半夏桂枝芍藥甘草半夏半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

火半夏桂枝芍藥甘草半夏半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

火半夏桂枝芍藥甘草半夏半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

胡於外感症不可多用不可每用究屬半表半裏之性恐其餘氣留在胆中而病亦不

能隨藥以即去。若內傷久積之病，正可多用俾留連引拔而出。所謂醫者意也。

四逆散仲聖裏二柴胡芍藥枳實甘草須。柴胡芍藥炒。只實題妙。甘草炙等分。此是陽邪成厥逆。陽邪入裏四散逆而不溫。

欬陰泄熱平劑扶。

黃連湯仲仲內用乾姜枝草三錢參二錢半夏八錢兼大棗寒熱平調嘔痛忘。黃連炒。乾姜泡。桂枝各三兩。人參二兩半夏半升。大棗十二枚治胸中有熱而欬喘。胃中有寒而作痛。或丹

田有熱肺中有寒者。仲景亦用此湯○按此湯與小柴胡湯同意。以桂枝易柴胡。以黃連易黃芩。此湯屬太陽陽明藥也。○章納川曰。黃連湯減少分兩用之亦

效。指治雜症而言。又舊注此與小柴胡湯同意。並非同意。此曰與小柴胡湯同法立方。

黃芩湯仲三甘芍二二陽合利棗加烹。

治太陽少陽合病下利。黃芩三兩芍藥甘草各二兩。棗十二枚○陽邪入裏故以黃芩微其熱。甘草

大棗和此方。遂為治痢祖。後人加味或更名。利潤泄也。痢渴下也。仲景本治傷寒下利。

其太陰。加木香枳榔大黃。黃連當歸官桂名芍藥湯。澤古治

藥黃芩。且用於初病。以致不能即愈。時師因治痢祖三字。不辨症候而極用之。以致危

者多矣。再加生姜與半夏。名黃芩加生姜。前症兼嘔。此能平。單用芍藥與甘草。利潤泄也。痢渴下也。仲景本治傷寒下利。

機要用此治痢。更名黃芩芍藥湯。澤古治

湯仲散逆止痛能和營。虞天畏曰。白芍不惟治血虛。兼能行氣腹痛者營氣不和。達於

胃。半夏湯仲景。前症兼嘔。此能平。單用芍藥與甘草。芍藥甘草等分名

天畏所言藥性。對少陽症而言。後之觀者不可。以白芍之性能行營氣想因少陽以酸為濁。

逍遙散

方用當歸芍藥芩木錢草姜薄荷。

當歸酒拌。白芍酒炒。白术土炒。茯苓炒。除蒸

功最奇。

肝虛則血病。歸芍養血。平肝木盛則土衰。木盛則土衰。木火則土勞。土勞則金傷。金傷則木勝。五行相因。自然之理也。余以一方治木勝。而諸勝皆解。逍遙散是也。

利濕宣心。生姜暖胃祛痰。薄荷清風理血。醫貴曰。方中柴胡薄荷二味最妙。蓋木喜風搖。寒即損姜溫即發生。木勝則太鬱。人鬱則土勞。土勞則金傷。金傷則木勝。五行相因。自然之理也。余以一方治木勝。而諸勝皆解。逍遙散是也。

調經八味

丹梔着

加丹皮。梔子名八味。通氣治肝傷血方。

藿香正氣散

局

大腹蘇茯苓白芷八分使陳木樸桔夏五分甘草三分姜棗治丸吞三錢

湯應培感傷風

外感瘡並能驅。藿香大腹紫蘇茯苓白芷各三兩陳皮土炒白木梨川

藿香理氣和中辟惡止

瀉芩木甘草益脾去濕以輔正氣正氣通暢則邪逐自除矣。○章曰。今所填錢數其

全料減少大畧而言係上焦之錢數如病在中焦或

在胃口之間尚須隨時照錢數表法增減可也。

六和方湯局藿朴杏砂呈半夏木瓜赤茯苓參术篇荳同甘草薑棗煎之六氣平

藿香厚朴杏仁砂仁半夏木瓜赤茯苓白木入參葛荳甘草加姜東煎龍柴風寒暑濕燥火六氣散曰六和主脾胃既強則諸邪不能干耳。或益香薷或蘇葉傷寒傷暑用須明傷寒加蘇葉傷暑加香薷。○章納川曰。六和湯與藿香正氣散乃夏秋感胃之妙藥。如能隨症隨時加減而運用之其妙無窮所以古

人錢數不便註定余亦不敢擅佔。

清脾飲

嚴用朴柴青芩甘木薑皆八分夏苓錢半姜煎服熟多陽瘧此方清青皮厚朴

黃芩半夏姜製矣。草狀苓白术王妙草葉壞加姜煎。瘧不止加酒炒常山一錢烏梅兩個大渴加麥冬知母。○瘧疾一名脾寒蓋因脾胃受傷者居多此湯乃加減小柴胡湯。

從溫脾諸方而一變也。青柴平肝破滯朴夏平胃祛瘀芩清熱利濕木草補脾調中草薑散太陰積寒除痰截瘧。

痛瀉要方

劉草當富翁草四錢木三防一陳錢半白木土炒三兩白芍酒炒四兩陳皮炒兩半防風一兩或煎或丸。久瀉加升麻補土瀉

木理肝脾

陳皮理氣補脾若作食傷醫便錯吳鞠草曰傷食腹痛得涼便減吟

章納川曰痛瀉要方乃強木冲入濕土之症必致土木二氣膠積一團瀉其肝陽則痛

瀉彌甚拔木而土亦帶入故也。况痛瀉者本是肝氣上升脾氣下陷其方本非易立。劉草窗此方為肝木侮土之主後人宗之然其立方之妙實在所填之錢數耳。苟非深知藥性者不辨故特表而出之。第知白芍有瀉木補土之功多不究其何以瀉木何以補土之細底蓋因白芍性涼酸能瀉肝臟之逆氣又其味酸能收脾中散失之陰逆氣降散氣收自然肝和而不妄動肝不妄動則不耗土而土自和所謂補土也。此方重用白芍管住肝陽不使變動固所要緊。又白木之氣橫力也故次用白朮從橫穿住脾氣不使下陷不使隨木上下。次用陳皮理氣分離土木不致膠粘木上。又用防風以瀉風木輕輕一拔拔出土中木氣則土氣不致帶桂。古賢用藥之妙如此今人但知伐木補脾而不知肝俞伐而俞病肝俞病而氣俞逆肝木不和未有不傷脾土者也。況脾為肝魁之臟雖補無益。劉草窗深得醫理藥性之妙故方傳萬世。○煨防風散風瀉木升脾之藥其性燥故合於脾。

表裏之劑

大柴胡湯

仲景

大黃二

柴夏各八

實一餘芩芍棗三

生姜五

表裏內攻併外齊

柴胡八兩大黃二兩只宜

只宜

大黃八兩

四枝半夏半升

黃芩芍藥各三

兩大棗十二

枝治陽邪入裏

表症未除裏症又急者○

柴胡解表大黃只宜攻裏黃芩清熱芍藥微使半夏和胃止嘔姜棗調和營衛按本方

次方治少陽陽明後方治太陽陽明為不同

柴胡加芒硝湯

義亦爾

小柴胡加芒硝六兩仲景仍有桂枝

加大黃湯

桂枝桂枝仲景又有桂枝加大黃湯桂枝桂枝

太陽誤下轉屬太陰大實痛者○

章納川曰仲景湯之分兩均係一料之分兩今之所

謂大劑是也。然今之大劑一煎飲盡，仲聖之大劑一時服一碗，必至病止為度。其一料本係一帖，故不填明錢與兩之數。大棗十二枚約三兩之則，故曰三。

防風通聖散

可間

荆硝黃梔芍翹芎歸麻黃薄木五錢草一兩桔芩膏兩滑三兩表裏交攻

陽蒸威外科

瘍毒總能消

大黃酒蒸芒硝防風荆芥麻黃黑梔白芍炒連翹川芎當歸

雨加姜葱薑○別防薄荷麻黃發汗而散熱，以風梔子滑石硝黃利便而降火

益膏清肺潤胃川芎歸芍養血補肝連翹散氣聚血凝甘木能補中燥濕散能汗不傷

表下不可傷裏也

五積散治局

方五積散寒積血積食積氣積痰積血積疫積八分芍藥歸芍桔梗六分白芷蒼朴陳四分麻夏惟壳七

肉桂乾姜甘草三

重表桂枝葱姜吃

大黃酒蒸川芎白芍扶苓桔梗各八分蒼木白芷厚朴

姜川草各三分重表者用桂枝扶苓利水姜芷桂寒溫相扶利膈腸一方統治多病。唯善用者變而通之。

除桂枳陳餘畧炒

三味生用餘藥微熟料尤增溫散速溫中解表祛寒濕散痞調經用

有益

節卷曰：凡陰症傷寒脉浮沉無力均當服之亦可加附子。○章納川曰：節卷所註陰症傷寒，又是平常感冒

之傷寒，非仲景所論之正傷寒也。

三黃石膏湯

七錢膏兩半施子八錢麻豉兩姜棗細茶煎熱服

寒因

表裏三焦熱宣石膏

黃芩黃柏黃連各七錢梔子三十個麻黃淡豉各二合

一兩姜三片棗二枚茶一大匙大熱退，紅斑退身目復黃○黃芩酒上焦黃連中焦黃柏泻下

而解表石膏體重能溌肺胃火大氣輕亦能解肌也

葛根黃芩連湯

仲景治太陽桂枝症醫誤下之邪入陽明揚下利肺促

甘草四般治二陽

治太陽桂枝症醫誤下之邪入陽明揚下利肺促

易
頤
錢
數
快
微

卷三

十二

雨解表清熱兼和胃喘汗自利保平康或無已曰。邪在裏宜見陰脈促為陽感知寒未

出為裏熱氣熱與此方散表邪清裏熱脉數而止曰促用葛根者專主陽明之來。

參蘇飲元戎用共二錢枳壳前胡半夏甘草葛木香陳桔梗內傷外感此方先入參紫蘇前

胡半夏姜棗各一錢半陳皮枳壳桂枝炒桔梗木香甘草各二錢每服二錢加姜棗煎治外

感內傷發熱頭痛嘔逆咳嗽痰脛風溼外感重者去東加葱白○蘇葛前胡解表參芩

甘草補中陳皮木香行氣破溼半夏枳桔梗去痰參前若去芎柴入飲號芎蘇治不差去入參前胡加川芎柴

破溼半夏枳桔梗去痰參前若去芎柴入飲號芎蘇治不差去入參前胡加川芎柴

宣香蘇飲局元僅陳皮草感傷內外亦稱佳青附炒紫蘇葉各二錢陳皮去白一錢甘草七分加姜葱煎○章納川曰。

微微之小邪以香蘇飲順氣而已因虛人忘表之故也若本方錢數最輕因寒初感時由肩甲而漸入于肺病在上焦故錢數不重不可錯者。

茵陳丸臺外二鱉施硝五兩大黃三常杏一兩巴豆蜜九服汗吐下兼三法迨時氣毒癘及

瘧痢一丸兩服量病調茵陳芒硝鱉甲矣梔子各二兩大黃五兩青山杏仁炒各三兩巴豆一兩去心皮炒五合蜜丸梔子大每服一丸或吐或汗

或利不應再服一起不應以熱湯投之○梔子洗取梔頭湯也合常山可以涌吐合杏仁可以解肌大黃芒硝承氣湯也可以湯熱去實合茵陳可以利濕退黃加巴豆大熱

此方備汗吐下三法雖云利水以退血分寒熱以桂枝陳皮加梔子炒熟以追血分寒熱

九味羌活加木連防己知獨各用錢即九味羌活加防己知獨活黃連爲大羌活謂內用生地川芎知母各兩桂枝各三錢每服五錢散

熱培陰表裏和傷寒兩感差堪安雨感傷寒一日太陽與少陰俱病二日陽明與太陰俱病三日少陽與厥陰俱病陰陽表裏同時俱病欲下則有表症經曰其兩感于寒者必死仲景不出治法復吉為製此方

汗明有裏症欲下則有表症經曰其兩感于寒者必死仲景不出治法復吉為製此方間有生者○羌獨蒼防細辛以兼寒發表芩連防己知母芎地以清裏培陰白朮甘草

消補之劑

平胃散局是蒼二錢朴陳草一秉姜煎。蒼术米泔水浸二錢厚朴橘紅甘草尖各一錢。姜東煎除濕散滿驅瘴氣。調胃諸方從此擴。蒼术燥濕厚朴散滿平胃陳皮利氣行痰甘草和中補土泄中有補也。或合一陳名平陳湯治痰或五苓名胃苓湯。治硝黃參麴均堪着。加麥芽神曲消食。若合小柴胡名柴平湯煎加姜棗能除癰。又不換金正氣散即是此方加夏薑。半夏

保和丸神麴與山查各夏陳翹菔子加麴糊為丸二錢下亦可方中用麥芽。

山查去核三兩神麴茯苓三錢

半夏各一兩陳皮藏子微炒連翹各五錢○山查消肉食參芽消穀食神曲消食解酒之品消而化之不必攻補也。大安丸內加白朮。兩消中兼補效堪誇。○章納川曰：保和丸舊註治飲食輕傷並不差誤而飲食少而能傷者脾胃亦不見旺。重用恐消伐胃氣二錢足矣。且內傷脾胃不旺飲食難化而加病者用之前清末年之俗醫無論溫病或傷風寒六氣竟不知表病忌消導皆用保和丸消伐以致輕病重重病危病家不知庸醫不曉不如改名消食丸不更彰明乎。

健脾丸參木二實三山查兩半陳麥兩麴糊作丸米飲下消補兼行胃弱強。

參土炒各二兩陳白朮炒參芽各一兩山查兩半麴糊只實三兩○陳只實利氣化積山查消肉食參消飯食人參白朮益氣強脾枳實丸古亦消兼補。

只實荷葉燒飯上升淡胃氣及少陽甲胆之氣上升。

參芩白朮。陳藥斤。甘蓮砂。薏桔半。臨篇。蓋十二上行。利氣。建脾。桔梗。載葉。共三錢。秉湯。服益脾神。人參。茯苓。白朮。土炒。陳皮。山藥。甘草。各一斤。加。篇。蓋。十二兩。加。蓮。章納川曰。若改用煎湯。陳皮不可少用。恐氣閉。胃氣上僭。古人用藥妙極。此方妙在桔梗。今人開方補脾藥中。能用到此味否。獨補所謂呆補。母補而仍議子。古賢立方。無不如此立法。此亦梨湯之一法式也。

枳實消痞。連五錢。四君麥夏朴三錢。乾姜二錢。和陰陽。消積破滿。補虛痊。只實越炒。炒各五錢。人參白朮。王妙。麥芽妙。半夏炮。厚朴。姜汁妙。茯苓各三錢。甘草。姜各二錢。○黃連。尺實治痞。君藥。參夏姜朴。溫胃散滿。參。木。苓。草。瑾。溫補脾。使氣足。牌運。痞乃化。

鱉甲飲子。治癰母。甘陳耆木。芍。芎。藁。枳。朴等分。姜三分。棗二枚。許各分。施。鱉甲醋炙。黃連姜汁。甘草。陳皮。川芎。白芍。酒炒。草葉。翹根。新梢。厚朴等分。姜三分。棗二枚。烏梅少許。煎。○醫甲入肝。退熱散結為君。甘陳耆木助陽。補氣。川芎。白芍。養血。和陰。草葉。溫胃。枳。朴。破積。

厚朴散。滿甘草和中。烏梅酸鹹。姜末和營。術。

葛花解醒湯。砂仁十分。參。芩。青。术。陳。四分。麵。姜。豬。澤。二。溫中。和。濕。木。一分。葛花砂仁。且
青一分。茯苓。人參。白朮。王妙。青皮。陳皮。各四分。神。匙。炒。乾。姜。豬。苓。澤。滿。各三分。專。治。酒。積。
及。吐。瀉。痞。塞。○砂。蔻。神。匙。皆。能。解。酒。青。陳。木。香。乾。姜。行。氣。溫。中。葛。花。引。溫。熱。從。肌。肉。出。
芩。瀉。引。熱。熱。從。小。便。出。
益。以。參。木。固。其。中。氣。也。

理氣之劑

補中益氣。湯。東。著。錢。半。木。陳。歸。五。參。甘。錢。升。柴。三。分。加。姜。棗。內。傷。陽。虛。及。外。感。木。香。蒼。木。

易歸未

調中益氣

暢脾胃

福

黃耆蜜炙

錢半人參

甘草安各一錢

白朮土炒陳皮

附身各

升麻柴胡各三

分加姜棗黃耆

表虛者升麻用蜜水炙用

○東垣曰升柴味薄性陽能引脾胃清氣行于陽道以資春氣之和。又引參者甘草上行。尤實脉理使衛外為固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也○虛人感冒不任發散者北方可以代之或加平散藥○除當歸白朮加木香蒼朮名調中益氣湯俱李東垣方○中益氣湯前方加白芍五味子發中有收亦名調中益氣湯俱李東垣方○章納川曰。

欲知湯藥及錢數之義者必須先識病情然後能知其妙用前之所解尚畧非於醫學已入門者不知今之所解者係與病湯藥錢數合解更易明其妙用此湯之症是中氣虛邪氣盛為邪氣阻滯中焦則中焦之正氣與上下主氣納氣之處不通因脾胃能生氣肺主氣腎納氣三焦皆困則虛而勞矣伐邪必碍於正氣扶正因邪盛必為邪所奪因其病重在脾與肺之氣道隔絕補伐本非治法且病根究屬虛勞氣少李東垣製補中益氣湯之藥仍不離乎補中而實不為中焦所用破邪氣之阻礙通三焦之正道其神妙全在錢數上來按參术芪歸草棗姜歸身皆是中焦之藥餌若仍用二錢乃中焦之錢數得其所矣况外有邪氣阻擋必無上入肺金之想妙在用一錢者五分者配合能引脾中清氣行於肺中兵多氣勇而邪氣不能阻遏於是肺氣一盛肺氣盛則能右降於腎而納之三焦皆通邪氣自退其於錢數中求活法變化無窮有如是也故其藥並不補中乃純為助正冲邪行於陽道之作用耳何謂補中益氣蓋所補中二字因脾胃能升氣指根本之義而取名益氣二字因氣虛必陷以升柴升其氣因其升柴有益於

氣故為之益氣。又木香蒼术易當歸白朮為調中益氣湯者。何為調中。因補中益氣湯清陽為邪陽阻遏之症。今調中益氣湯者。邪氣與正氣混雜一處之症。故用木香蒼术散動其邪氣。而順正氣為之調中。又或加白芍五味者。邪盛正衰本不可用。則或加而用之。猶恐邪氣未去。正氣割斷之意深矣。

烏藥順氣

湯屬

用和橘二錢。芎芷只桔麻黃半。五分殼姜草姜棗中氣厥逆此方。祥。麻逆寒也。

身溫為中風。身冷為中氣。中風多痰涎。中氣無痰涎。以此為辨。詳學士云。中氣之症。不可作中風治。喻嘉言曰。中風症多挾中氣。烏藥橘紅各二錢。川芎白芷只壳桔梗麻黃各一錢。殼姜去熱嘴炒。炮姜炙。草各五分。加姜半錢。○麻梗芎芷發汗散寒。以順未病。烏姜附行氣祛痰。以順裏氣。加瓊參清化順風。甘草協和諸藥。古云氣順則風散。風

邪卒中當

先治標也

越鞠丸

丹溪治六般鬱氣血痰火濕食因。此六般也。芎蒼香附兼梔榔。氣暢鬱舒痞閟。伸。吳鞠

開氣鬱。蒼木塔潤鬱。梔榔潤血鬱。梔子清大鬱。神曲消食鬱。各等分梔榔為君。又澤瀉加桔梗。白芷。天蓼。加青黛。痰鬱加星夏桔梗。海石。血鬱加梔仁。紅花。氣鬱加木香。枳橘。

食鬱加麥芽。山楂。又六鬱湯。蒼芎附甘芩橘半梔砂仁。○蒼木川芎。香附。甘草。橘芩。橘紅。

扶食加吳茱萸。○此前方加一味。

蕙治痰鬱。看六鬱中之重者。為君。橘藥施加減用之。

蘇子降氣

湯局。橘夏歸前後一錢桂草半。下虛上盛。痰嗽喘亦有加參五味。沉蘇子橘紅。

前胡厚朴姜汁炒各一錢。肉桂炭。甘草各五分。加姜煎。一方無桂。加沉香。○蘇子前胡橘紅。半夏降氣。行痰。氣行則痰行也。數葉蘿蔴能發表。加當歸和血。甘草緩中。下虛上盛。故又用當桂引大歸元。如氣虛亦有加入參五味子者。

四七湯

三理七情氣。夏五秋四朴三蘇。○辛夏姜汁炒五錢。厚朴姜汁炒三錢。橘芩四錢。蘇

葉三錢。○勞雖有乎氣亦多痰濕扶痰散。以辛夏

厚朴治痰散滿。伏苓蘇葉利溼。姜棗煎之舒鬱結。疾涎嘔痛盡能紓。又有局方名四七湯。參桂夏草各錢以人參官桂半夏各一錢。香草五分加姜煎。○人參補氣。官桂平肝。喜怒憂愁恚也亦名七氣。

四磨方

湯氣

治七情侵入參烏藥及橘沉

人參烏藥橘沉人參烏藥橘沉香等分

○氣逆或以氣順。○人參補氣。官桂平肝。

加入木香枳

貨五磨氣厥白酒斟

白酒磨服治氣死名氣厥

代赭旋覆

湯半斤

姜五夏八二參甘東臨鎮逆鹹軟痞痞噦噫氣應加倍

參附二兩。○金匱石一兩。○青附八錢。○高藥二錢。

調經止痛天香散香四烏一二分姜乾姜蘇陳五分舒鬱痛氣行血活自經句

○金匱方橘皮竹茹各二升人參一兩。甘草五兩。生姜半斤。大棗三十枚。名橘皮竹茹湯。治噦逆即呃逆也。後人加半夏麥冬赤茯苓。桔梗。○呃逆由胃火上冲。肝脾之大動。透肺金之氣不得下。降也。竹茹麥冬桔梗。○病虛心火生姜呕家聖藥。尤病虛病。故以參甘大棗扶其胃氣。病後寒呃丁蒂。二參一錢。生姜五片。人參五片。姜一錢。人參五片。姜一錢。○古方單用桔梗取其苦溫降氣。薄荷生姜取其開鬱散痰。加參者扶其胃氣也。

定喘湯

白藥炒八雙杏芩八分一蘇桑錢半麻夏疑姜草肺寒膈熱喘哮嘔

○白藥三十枚。炒黃。麻黃半錢。○黃芩桑皮甘草散表寒而清肺氣。款冬溫潤白藥散溫定喘而清金。黃芩清熱。蘇子降氣。半夏培土功成。散寒殊壅之功。

理血之劑

四物湯局歸地各三錢芍二川芎錢半安

當歸酒洗生地各三錢白芍二錢川芎錢半安。

心腎並血為臣芍藥酸寒入肝脾微陰為佐川芎辛溫通行血中之氣為使

八珍合入四君子氣血雙療功獨崇

四君補氣再加黃芪與肉桂加黃芪助陽固衛

大補湯補方雄

補方元首十全除却天地草除生地黃加粟米百煎之名胃風

泄完氣及癰瘍牙齦

人參養營湯即十全除却川芎五味聯陳及遠志加姜棗脾肺氣血補方先

十全大補湯附川芎加五

味陳皮遠志薛立齋曰氣血兩虛變生諸症不問脈病但服此湯諸症悉退

歸脾湯濟內木參神棗仁龍眼二錢行歸志一錢益草錢五草木薑棗益心脾恆中健忘俱

可却腸風崩漏總能醫

人參五錢白朮茯神棗仁龍眼肉各二錢蜜炙黃芪錢半酒洗

可却腸風崩漏總能醫

當歸炒遠志各一錢木香炙草各五錢○血不歸脾則妄行參

以補心當歸養血木香調氣氣壯則自能攝血矣

○章納川曰歸脾湯歸諸臟之氣

而入於脾也故用四臟之藥而皆用脾中之錢數此方為之足經方譬如心肺肝腎四

臟之飯放在脾土家中則四臟之氣自然向脾家去矣蓋脾土無水則燥所以要腎水

之氣歸脾滋土無火則溫所以要心大之氣歸脾溫土無木則實所以要肝木之氣歸

脾疏土無金則死所以要肺金之氣歸脾養土此四臟之氣歸脾脾氣旺矣脾土為萬物之母脾氣旺則仍以轉佈四臟榮養氣血則無怔忡健忘之患矣至於木香香醒脾

氣芳悅肝氣。本方分兩祇用五分照錢數而論。不足入脾肝之用。而不知木香不能見大。必須作末冲服。較諸與煎湯有數倍之功。又於當歸遠志。本方一錢不足為肝腎之用。現龍云。黃芪與當歸棗仁與遠志。有相須之理。且當歸遠志能通調膈下二臟。然則不啻為下焦之藥也。下焦之藥用治中焦者。照錢數表本屬一錢。其用固不悖也。凡方中錢數有似乎此者。可以類推。

養心湯用皆六分。二茯芪歸夏細芎。下宜分半。須戰淮棗草遠味桂柏參。黃葛蜜矣。茯苓
酒洗。半夏。細芎各一兩。甘草尖一錢。人參。柏子仁去油。肉桂五味子。遠志棗仁炒各二錢。
仁收心氣之散越。半夏去機心之痰涎。甘草補土以培心子。肉桂引藥以達心經。○章納川曰。心無補法。亦無補理。今不得已而用補法。亦在心包絡之間。但心包絡亦切不可多補。若常川服之。其人要呆。經曰。心無補者。亦此意也。又心肺在上焦。凡治心肺膈上之病者。錢數皆宜輕。此輕浮於上。重沉於下之義。故養心湯分兩亦極輕。

當歸四逆湯仲景桂枝芍細辛三錢草通二大棗三枚治陰厥脈細陽虛由血弱。當歸桂枝
芍細辛三錢草通二大棗三枚治陰厥脈細陽虛由血弱。當歸桂枝芍細辛三錢草通二大
棗三枚。甘草炙。术通各二兩。棗二十五枚。○盛氏曰。通脈者必先入心補血。當歸之苦
以治心血。心苦緩急食酸以收之。芍藥之酸以收心氣。肝苦急急食甘以緩之。甘草大
棗木通。以緩陰血。內有久寒加姜茱升。姜有久寒者。加吳茱萸半升。生姜半升。桂枝
茱升。酒煎名四逆。加吳茱萸半升。生姜半升。桂枝。桂枝半錢。當歸四逆在于回陽
經。當歸木通經復脉。不用附子及乾姜助陽過劑陰反灼。姜附四逆在于益血
後脉。故雖內有久寒。止加生姜吳茱。不用乾姜附子。恐反灼其陰也。○章納川曰。陽虛血弱或吐血。或產後外傷於寒。若

分兩過輕病久留連必至陰陽兩絕而莫救况傷寒之症妙法本在汗解初感之時大汗無妨分量不可再減

桃仁承氣湯仲桃五粒大四芒桂甘二錢

桃仁五十枚去皮尖研大黃四兩半硝甘草桂枝各二兩○硝黃甘草調胃承氣也熱甚搏血

未除故加桃仁潤燥緩肝表症

解表。熱結膀胱小腹脹如狂畜血最相當小腹脹而小便自利知為血蓄下焦蓄血發熱故如狂○章納

川曰舊註桂枝調營調營者溫表血分之邪也血分之邪非桂不達故耳仲景云表邪

未盡者不可用桃仁承氣湯指表邪而言此處舊註云表症未除故加桂枝調營解表

係指裏邪而言裏邪即表邪陷入營分之邪也如外表之邪未盡用桃仁承氣解其裏

邪外邪必從桃仁之引又傳入裏其血又畜先聖之言固是後賢之言亦是今見醫學

白話報議論錯薦故辨而正之

犀角地黃湯芍藥丹生地兩半白芍一兩丹皮半錢

解胃熱而清心火芍藥酸寒和陰而散肝火丹皮苦寒澆血中之伏火生地大寒涼血而滋水以共平諸經之滑逆也

或益柴芩總伐肝者加柴胡

或曰血虛寒則動分兩不

黃犀角丹皮三分用芍藥錢半地培添可多用古方錢數均有講究

咳血方升中訶子一桔梗海石山梔十青黛蜜丸口噙化咳嗽痰血服之瘳

訶子壞氣肉桔梗仁去油海石去砂梔子炒黑青黛水飛等分蜜丸噙甚加香仁○青黛清肝澆大梔子清肺止嗽詞子鹹肺定喘不用血藥者尤退而血自止也○

章曰咳血終有氣火上升如訶子多用恐欬住火氣故定十中之一足矣

東垣秦光白朮丸歸尾桃仁一兩搘皂子枳實澤瀉五糊丸血痔便難難

大腸燥結說便海石去砂梔子炒黑青黛水飛等分蜜丸噙甚加香仁○青黛清肝澆大梔子清肺止嗽詞子鹹肺定喘不用血藥者尤退而血自止也○

尾酒洗。桃仁研地榆各一兩。片實泄胃熱。澤瀉。皂角子。燒存性。各五錢。桃仁。歸尾。桃仁。以活血。春光。兒子以潤燥。尺實泄胃熱。澤瀉。治濕邪。地榆以破血止血。白木。以燥濕益氣。仍有蒼木防風。側柏潤血疏風。燥濕安經。本方除白木當歸地榆。加蒼木防風。大黃。升麻。柴胡。陳皮。甘草。黃柏。大黃。

紅花。名春光。除風濕。治並同。

下及

理血疏風○章曰湯不及

散寒。散者速。兼未在下。

槐花散用治腸風。側柏三錢。黑荆從枳壳減半。為末服。米湯飲下。涼血風。

槐花柏葉涼血。只壳寬腸荆芥。

小蘿蔔子。蘿蔔黃。炒木通滑石生地裏。歸草黑施淡竹葉等分。

血淋熱結服之良。小蘿蔔

血。生地涼血。蒲黃止血。木通。清心利尿。心火。達小腸。桃子。散熱大出陽胎。

竹葉清肺涼心。滑石清熱利尿。當歸引血歸經。甘草和中調氣。

四生丸。生用三般葉。側柏父荷生地。協荷葉。生地黃等分。生搗如泥。熱妄行吐衄。

側柏生地補陰涼血。荷葉生者性溫。理氣止血。

留好血。艾葉生者性溫。理氣止血。

複元活血。明發。柴二錢。花粉當歸穿山甲。甘草。紅花。各二錢。桃仁五十枚去皮尖研。大黃一兩。每服一兩酒煎。○血精必于兩歸肝膽經。故以柴胡引用為君。以當歸活血脈。以甘草緩其急。以大黃桃仁。

紅花。山甲。花粉。破血潤血。

祛風之劑十二首附方四

小續命湯。桂麻芍杏芩已草八分。防風加四附減四六。經風中此方通。

通治六經中風。喝邪不透。

語言。寒溫及附。柔二錢。赤芍。川芎。酒洗。黃芩。酒炒。防己。甘草。吳茱萸。各八分。附子四分。薑。東薑。○麻黃。杏仁。治寒注。桂枝芍藥桂枝湯也。治風。參草。補氣。芍藥養血。防風治風淫。防己治濕淫。附子也。治寒。桂枝芍藥桂枝湯也。治寒。黃芩治熱淫。故為治風通劑。劉宗厚曰。此方無分經絡。不辨寒熱虛實。雖多亦

矣以爲易。按此方今人罕用。然古今風方多從此方。補益爲治。○章納川曰。余知參可助陽。裁去舊用之人參八分。未知薄內明腎見許否。又劉宗厚云。小續命湯無分經。絕不辨寒熱。產家雖多。亦莫以爲此。觀諸似是而實非也。明乎上註。

大秦光湯

膏半。羌獨防芷茯甘四物五分半減半。風邪散見可通嘗。

治中風。風邪散見。不拘一時。

經者。秦光石膏各三兩。羌活獨活防風川芎白芷黃芩酒炒。生地酒洗熟。地當歸酒洗。湯雖補血之藥。而行經散風之劑。居其大半。將何以養血而益筋骨也。曷後治風有三法。解表及裏。行中道也。初中必扶外感。用風藥解表散寒。而用血藥氣藥調裏。活血降火。大。

○章納川曰。風中筋骨。非大秦光湯不能散經絡之風。使之從外表散。然雖從外

表散。未免有餘風入內。故用血藥石膏作墻堵其入。內宗厚曰。血藥爲養血之用。吾謂保護血分之用。蓋補血故不可少。多亦無益。因病在風而行經散風之劑。宜居大半。昂

按與機要相見皆同。宗厚不及似乎忠厚耳。

三生飲

局方。風四錢。星烏附二錢。木八分。生南星兩。生川烏附子。加參對半扶元氣。每服一兩。加參

卒中疾。速服此靈。

烏附燥熱。行經通寒。南星辛烈。除痰散風。重用入參。以扶元氣。少佐

木香以行逆氣。醫贊曰。此行經散疾之劑。斬關擒王之將。宜急用。

之。凡中風口開爲心絕。手撮爲肺絕。眼合爲肝絕。遺尿爲腎絕。鼻鼾爲肺絕。汗出如珠者皆不治。若服此湯。間有生者。

星香散亦

治卒中體肥不渴邪。在經。

中藏中府者重中經者。重中經者。補輕。胆星八錢。散痰木香二錢。行氣爲木。服易簡。加姜煎服。名星香散。

地黃飲子

河山茱萸。麥味。菖蒲。遠志。茯苓。蕤英。肉桂。附子。地黃。陳皮。石斛。麥冬。五味。

巴戟天等分。每服五錢。加薄荷少許煎服。

熟地以滋根本之陰。桂枝蕘蓉巴戟以返真元之大。山茱萸。平胃溫肝。志參味保肺以滋本源。木大既交。風火自息矣。劉河間曰。中

中水生木

芩菖蒲。補心通腎。參味保肺以滋本源。木大既交。風火自息矣。劉河間曰。中

風非外中之風。良由將息失宜。心大累甚。腎水虛衰。不能制之。故卒倒無知也。治宜和。桂附能引火歸元。大歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。

獨活湯

丹中羌獨防芎歸辛桂參夏葛神志白薇草薑棗癰瘍昏憤各錢。正氣氣急。能於土中治風順矣。

卷治獨活方當歸川芎

細辛桂心人參。夏葛蒲茯神。達志白芍。各五錢。炙草二錢半。每服一兩。加姜紫苑。○肝屬風而主筋。故癲瘍為肝邪。二活防風治風。半桂溫經。半夏除疾。芎歸和血。血活則

○桂附能引火歸元。大歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。

風散也。肝移熱于心。則昏憤。人參補心氣。葛蒲開心竅。茯神退熱。止風。風靜大息。血活神寧。病癒自己矣。

順風匀氣

桑木二錢烏藥錢半五參天三蘇青沉芷瓜草喘僻偏枯口舌瘡。正氣氣急。能於土中治風順矣。

口眼喎斜。偏枯不遂。皆由

宗氣不能周于一身。自本二錢。鵝鶴錢半。天麻八分。參各五分。蘇葉白芷。木瓜青皮。甘草。失沉青磨各三分。加姜煎。○天麻蘇芷以疏風氣。烏藥青沉以行滯。桑參木尖草以補

○桂附能引火歸元。大歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。

黃柏蒼木南星二己下桃胆行芷

上行芎下行。桂枝紅花行威靈仙。下行羌活。正氣氣急。能於土中治風順矣。

卷治獨活方當歸川芎

二錢半糊丸痛風濕熱與瘀血。上中下通用之丸。

酒炒黃柏。浸蒼木。姜製南星。各二

錢。桂枝。白芷。川芎。芍藥。各三錢。半桂糊丸。各上中下通用。痛風方。丹湯。○

黃柏清熱。蒼木燥濕。龍膽鴻大。防己利水。曰者治濕與熱。桃仁紅花。活血去瘀。川芎。血中氣藥。南星。飛風。燥。四者治血與瘀。去百節風。白芷去頭面風。桂枝。威靈。去臂體風。四者所以治風。加神曲者。消中州陳積之氣也。症不兼者。加減為治。

○桂附能引火歸元。大歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。

卷治獨活方當歸川芎

獨活寄生湯

千光防辛。四物桂苓。膝仲參。共用四錢。加草酒冷風禦。痔瘻能伸。生春羌防。

卷治獨活方當歸川芎

芩桂草川芎。芍酒洗。當歸酒炒熟。地桂心炒。若去寄生加耆。續黃耆。○桂附能引火歸元。大歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。

○桂附能引火歸元。大歸水中。則水能生木。木不生風。而風自息矣。

卷治獨活方當歸川芎

古方珍

勝風溼。桂心勝寒。細辛獨活通肺氣。凡治三氣聚虛成癰者。宜早服此。

卷治獨活方當歸川芎

章納川曰

獨活寄生湯妙義最長。獨活遇風能獨立而不搖。寄生附桑樹而生。必見肝

卷治獨活方當歸川芎

未而依附。獨立一依附相互相制。本有無窮之妙。且能疏通寒濕。則筋骨自利。

消風散內卷防參。茯苓蠶蟬葛五分。荆桂陳草二分下。滿末茶調或酒行。頭痛目昏項背

急癩。

麻癰疹服之清。人參防風。茯苓川芎。桂枝。薄荷。桔梗。白芷。甘草。各五錢。每服三錢。茶調下。

瘡瘍酒下。○卷

汗。芳荆治頭目項背之風。歸脾丸。桂枝。芍藥。甘草。厚朴。去姜。散滿。

參苓甘橘橘正調中。○章納川曰。消風散獨受風。不受寒。

之方也。錢數隨便。少少用之可也。古人所以共用三錢重用動血。而氣反不宣。風反不走。此方本為宣氣走風之法。故用人參扶正調中。俾氣足而風自宣。

川芎茶調散局薄錢半。芎荆減半防三分。卷芷草三細辛二直用茶調減半行目昏鼻寒

風攻上正偏頭痛。悉平康。甘草。荷八錢。川芎。荆芥。各四錢。防風。錢半。細辛一錢。卷芷。薄荷。白芷。治陽明頭痛。川芎。治少陽厥陰頭痛。細辛治太陽頭痛。

芩。紫風熱而清頭目。以風熱攻上。宜于升散。蘇。頭之。上。惟風葉可列也。加甘草以緩中。

加茶調。方內若加殭蠶。葛。菊花茶調。散用亦藏。菊花清頭目。

以清降。以上矣。

青空垣。芎草柴芩連卷防少加入頂頭滿末茶調三錢。服正偏頭痛一時。蠲。川芎五錢。矣。

七號。酒炒黃芩酒炒黃連。卷活防風各一兩。每服三錢。○風寒濕熱上攻頭脹則痛。頭

兩旁屬少陽。偏頭痛屬少陽。相火。芩連苦寒。以卷防芎柴升之則能去。濕熱于高頭之上矣。

人參荆芥。柴枳地棗蟹黃羚木五分。宣防草歸芎桂三分。血風勞作風虛禱。

血脈空疏。乃感風邪。

寒熱盜汗。久病成勞。人參荆芥。柴枳。桂心。各三分。加姜煎。○荆防柴羚。以肆風平木。地黃蟹甲以退熱。滋陰。芎歸桂枝以止痛。調經。參木。矣。草棗仁以散汗補虛。陰順進食。○章納川曰。血風勞本有刲勞歲內用八珍湯去川

芎加半夏五味子阿膠亦氣血兩補欽汗瘧風不用升散之藥荆芎防。凡人參荆芥散靈穩多矣而升散之藥虛極之人終所不宜服也

祛寒之劑

十二首附方二

理中湯

仲景曰理中主木二錢。

參草炮薑一錢先

白朮土炒二兩。人參乾姜甘草炙各

臣○人參補氣益脾為君。白朮健脾燥濕為臣。甘草和中補土為佐。乾姜溫胃散寒為使。

○章納川曰治脾之湯無有不兼肺。治肺之湯無有不兼脾。如瀉白散內加糯米和湯○

中之類。今理中湯在不知者以為就表面論並無理中之功用。故仲景申明之曰理中者。理中焦。因欲理中焦必先溫肺。如肺寒而虛僅溫脾而不及肺。則肺氣終不下臨氣運亦何從而化。雖溫脾而反耗其津也。且理中湯病不甚重。若中寒甚。則有附子理中湯。且寒症絕陽最速。病至亦速。予民國八年秋治癰羅痧。用附子理中湯加味。活人無數。蓋附子能祛陰回陽。陽一分不盡不死。仙經之言也。

真武湯

仲景壯腎中陽附一生薑茯木三

附子一枚炮。白朮二兩炒

少陰腹痛有水氣。悸眩

○頭眩汗多亡陽。故目瞤筋惕。○頭眩汗多亡陽。故目瞤筋惕。

○潤音。能動胞宮。○茶木補利水以療悸眩。○薑附回陽益火以逐虛寒。○藥能和營以止腹痛。真

○武北方案。腎不足水乃歸元此。○腎之陽壯大而利水哉。名此。

四逆湯

仲景三方水神腎足水乃歸元此。

附子一枚生用。乾姜一兩。甘草炙二兩。冷加減。

○附子一枝。生用。乾姜一兩。甘草炙二兩。冷加減。

○附子一枚。生用。乾姜一兩。甘草炙二兩。冷加減。

○附子一枚。生用。乾姜一兩。甘草炙二兩。冷加減。

○附子一枚。生用。乾姜一兩。甘草炙二兩。冷加減。

姜以載
逆氣

白通加人尿猪胆汁

陽仲景尿音焉去聲。此白通湯也。

白通湯子一載燒姜一兩葱白四

蜜姜附以通陰寒。加入人熱。因寒用妙義深。陰盛格陽厥無脈。逆無脈。既格陽于外。故厥

藥以引不得入。故于熱劑中加尿汁。寒

小便也。俗讀平聲。通薑附一。一四葱白。

薑此白通湯也。葱白以通陽。

吳茱萸湯

仲景四錢泡參東三錢生薑培陽明寒嘔。

太陽熱忘用少陰下利厥陰頭痛皆能保。

吳茱萸參東補

黃一升。池入參三兩生姜六兩東十二枚。○姜茱萸參東補上散寒。茱萸辛熱能入厥陰治肝氣上逆而致嘔利腹痛。

○章納川曰。此湯雖曰治陽明寒嘔。實肝寒如胃寒何必用茱萸湯。故用下焦之錢數。而肝腎在下也。寒症亦服此

湯者以其肝腎為病也。

戴陽湯

活人附與乾姜麥味知連參草將。

黃連人參草。○父輩辛熱能回陽。薑參東薑煎入

童便

內寒外熱名戴陽。

○此陰盛格陽之症。而毒身熱不煩而燥。但微水不入口。為

熱因寒藥為引。用也。被內熱曰煩。為有根之大外熱。曰

煩為無根之大。故但煩不煩及先煩後煩者皆不治。

○章納川曰。益元湯改為戴陽。

湯以便顧名思義益元者無非以童便而取名也。且又嫌益元歲與益元湯相混。

回陽救急湯

即四逆湯。味九粒。薑附桂參各五分。木茯苓半陳夏七甘草三分引姜煎。泡干

夏陳皮各七分。甘草三分。五味九粒。姜煎加麝三釐或。猪膽汁三陰寒厥見奇熱。附子。其陰寒。六君溫補助其陰氣。五味入參以生其。○章納川曰。生脈散回陽治無寒之敗。如麝香者。以通其氣。加胆汁者。熟因寒用也。

症。回陽救急湯治有寒之症法意相同。故分數亦輕。

四神丸 故紙炒四兩、味三萸一錢、大棗百枚、薑八兩。破故紙四兩、酒浸炒。吳茱萸一兩、鹽水炒。肉豆蔻二兩、麵裹煨。

五味子三兩、炒。東生姜同煎。去姜搗，肉為。丸。臨臥鹽湯下。若早服不能眠，一夜之陰寒也。**五更腎瀉大衰扶**。內腎命大衰，不能交陽分。陽虛不能鍛開而泄瀉。不可專責脾胃也。故紙半溫能補相火，以通君火。大盛乃龍生土，肉蔻緩胃固腸。吳茱萸脾去濕。五味補腎瀉精，生姜溫中。大棗補土，亦以防也。

厚朴溫中湯 陳一錢、草苓、草蔻、木香半錢、乾姜三分、生二片、虛寒脹滿痛皆腎。

厚朴陳皮各一錢、甘草茯苓半錢。

芩草荳蔻木香各五分。乾姜三分加姜煎。○十姜草蔻半錢，以散其寒。陳皮木香半錢，以調其氣。厚朴半錢，以散溼。○甘草淡以利溫。甘平以和中寒。散氣行痛。脈自己矣。

疝氣方 滌用荔枝核、梔子、山楂枳殼益。

荔枝雙結，梔子殼，尤能入肝腎。辟寒散。浦梔子潤大利水。枳壳行氣，破積山楂散。磨積掌音，阜腎。

子再入吳茱萸暖厥陰病。○川桂苦寒入肝舒筋，能導小腸膀胱之經。○川桂苦寒入肝舒筋，能導小腸膀胱之經。

以肝脈絡陰器也。長流水煎，痛釋等分，或為病。以肝脈絡陰器也。

橘核丸 生棟、薄昆桃一兩、桂心、厚朴實延木通。通木香上五錢、癩疝痛，頑鹽酒吞。

橘核川棟子海薄海帶昆

布桃仁各二兩。桂心厚朴只實延胡索，木通木香各五錢。酒糊為丸鹽或酒下。○橘核木香能入厥陰氣分而行氣。桃仁延胡能入厥陰血分而活血。川棟木通能導小腸膀胱之經。官桂能祛肝腎之寒。厚朴只實行結水而破積血。昆布薄帶寒行水而鹹軟堅。

祛暑之劑

五首附方十

三物香薷飲 局方

豆樸先

香薷半溫，厚樸除濕，散寒。扁豆清暑，和脾。

若云熱盛加黃連。

名黃連香薷飲。

活人治中暑熱，或口渴心煩。

或加荳草

荳草甘草名五物飲

利濕祛暑木瓜宣。

加木瓜名六味香薷飲。木瓜荳草治濕盛，再

加參耆與陳木兼治內傷十味全。

六味加參耆陳皮白术名十味香薷飯。合香蘇飲。

飲。香附紫蘇陳皮蒼木名二
香散治外感內傷。身熱頭暉。仍有藿薷湯。

葛根名香薷湯。

治暑月傷風。

香薷湯治伏暑吐瀉。

三物香薷飯。

加葛根。

清暑益氣湯

東垣

參柏芪麵澤青陳一錢宜升葛三分歸味七蒼白麥草錢半依

入參黃芪甘草火當

歸酒洗參冬五味青皮。葛根炒陳皮留白神妙。黃柏酒炮葛根蒼木白术王妙。升麻澤
鴻和姜棗熟。○熱傷氣參葛補氣缺汗濕傷脾。二木燥濕強脾。天旺則金病而水衰。故
用麥味保肺生津。黃柏濶大濕水。青皮理氣而破滯。當歸養血而和陰。葛根升清。澤鴻以降濁也。

○章納川曰清暑益氣湯

向無錢數不敢擅專。但遇此湯之症。錢數當輕用。因暑傷氣病根在太陰。不可以中焦
有濕着想。核查得錢數過輕。民國十年始以加入。

縮脾飲用清暑氣草葉烏梅砂草。葛根扁豆一錢加吐瀉煩渴溫脾胃

砂仁草葉梗烏梅甘草尖各四兩扁豆

豆炒研葛根各二兩。○暑必兼濕而濕屬脾土。故用砂仁草葉利氣溫脾。扁豆解暑滲濕。葛根升陽生津。甘草補中和中。烏梅清熱止渴。古人治暑多用溫
如香薷飯。○大順散之類。

暑為陰症。此所謂症為不足。經曰。脈虛身熱。得之傷暑。○古人治暑多用溫
散之類。

○大順散杏仁姜

桂甘暑月飲冷傷脾胃。先將甘草白砂炒次入乾姜杏仁炒合肉桂為末。每服二錢。吳鶴臯曰。此非治暑。乃治暑月飲冷受傷之脾胃耳。

○

章納川曰。大順散吳鶴臯所注無差。但不是暑月飲冷。脾胃受傷亦佳。

生脈散參味與人參八三分保肺心暑淫氣少汗多渴病危脈絕急煎斟。人參五分參
子九粒。○人參大補肺氣參冬甘寒潤肺。五味酸收欽肺並能滋大生津。蓋心主肺。肺
朝百脉。補肺清心則氣充而脉復。將死脉絕者服之能令復生。夏月大旺燥金。尤宜服
之。

加減則靈。人參輕用則升，重用則上下貫通無升降之功矣。所以陰虛上盛者多用到無妨碍。少則升氣於上，則上俞盛，胸悶不快等疾見矣。不知者每謂虛不受補，所以陽虛下陷者宜輕重則反不能升陽助肺。下陷如故，究屬先天真氣何能補？仍藉後天而生，不過肺氣機後天脾胃不能消化飲食。人參能升陽氣助肺，則飲食得化氣血，自生。僅知參能補氣，而不知藥之實性者，反以吾言為怪謬。要知將死脈絕，古人豈不知病已深重，如多用有益，何反少用耶？茲用五分，正與吾意暗合。信古人足証吾言矣。五味子麥冬，重用則下走中焦，百藥皆然。上焦之病，藥宜輕正。此謂也。舊註並能瀉火。七月大旺，燉金尤宜服之。其實非也。升氣欽瀉之方，何能瀉火？又熱傷氣，陽虛人，忍防夏月傷氣，忍防火旺，燉金先服則可。如已燉金，切不可服。

六一散滑石同甘草解肌行水兼清燥統治表裏及三焦熱渴暑煩瀉痢保

滑石六兩。甘草一兩。瑩心水。故能通治上下表裏之溫熱。甘草鴻大和中。又以酸滑石之寒滑此。

益元散碧玉散

與雞蘇、散砂礫、薄荷加之外好。前方加辰砂者，蓋元散取其清心。加青黛者，碧玉散取其涼肝。加薄荷者，名雞蘇散。取其散肺也。

利濕之劑

十三首附方八

五苓

景龍

太陽澤瀉倍，猪苓苓术八分也。太陽經熱傳入膀胱，腑者用之。

膀胱腑者，用之。

利便消暑煩渴清。

猪苓茯苓白朮芍各十八錢。澤瀉一兩六錢。桂半兩。每服三錢。

○二苓甘淡利水，能入肺腎而通膀胱導水。以泄火邪。加白朮者，所以補土制水。加官桂者，氣化乃能出也。謂曰：膀胱者州都之官。津液藏焉，氣化則能出矣。

○章納川曰：澤瀉加倍者一錢六分也。今時所

用無一錢六填法終填錢半而已然即一錢半照算多二分半。又猪苓末八分照算多五厘所以錢數如此插入理合聲明。

除桂名為四苓散無寒但渴服之

靈

渴勝則氣不得施化故利其濕則渴自止

○猪苓湯

仲除桂與木加入

阿膠滑石停

諸苓茯苓澤瀉阿膠滑石各一兩能行水○吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿膠以存津液

此為利濕兼瀉熱

○清石瀉大解肌

○此為利濕兼瀉熱

疸黃小便閉渴嘔寧

五苓治渴陽諸苓兼熱勝○吳鶴臯曰以諸藥過燥故加阿膠以存津液

○章納川曰五苓散皆知為行水之妙劑並有官桂

化膀胱之氣以為水可必行殊不知以此為知末也

不知其本雖五苓亦何能行其水

耶。即或利矣小便必點滴而流即病者亦不自知其小便少頃仍閉然亦有不閉而常

流者仲景所作此散豈為如是也

皆由不完分兩不知分兩為何用任意填用即失本

散之義本散之義全在錢數藥之共用三錢者使藥先入於肺試觀用官桂化膀胱之

氣而肺實主氣故肺為膀胱之本必先入肺而後入膀胱其病自愈若錢數一重直走

膀胱與肺漠不相關豈非舍其本而求其末耶要知肺主氣管領一身諸氣肺氣化則

膀胱之氣無不化肺氣積膀胱之氣無不積大溲小便必須肺氣下臨如肺氣不臨膀

胱雖氣化而獨開則尿點滴而流矣水道不通本由肺氣不化而不下降使然如是可

知由肺一氣貫串之病必須由肺統治之方五苓散本下滲之品不用下焦之錢數而

用上焦之錢數原本使其先利肺中之濕濕去則肺氣得施而下降肺氣降

則膀胱自

利尤恐膀胱久積難開故少加官桂以化其氣則水豈有不行也耶仲聖之意如此不

可謂錢數無考究也。又五苓散之方識者多矣。何須焦舌。因近時不遵用原方錢數桂
桂無效。故特表而出之。不可因不知而不考究。不可因錢數之概而棄之。古湯之妙多
在錢數之中。宜留意也。切切。又大橘皮湯中亦有五苓散錢數亦輕。與仲聖稍不同。然
而終是仲聖為正法。五苓散註共用三錢。却與大橘皮湯中相合。汪訣菴註五苓散中
分兩十八銖。一兩六銖。以仲聖方十中取一為一劑。共約三錢。相去不遠。况大橘皮湯
為謂自信不誤。吾亦為其理甚通。然而總以仲聖為正。又仲聖方中分兩每有十八銖。
二十四銖者。或云十六銖為兩。十六兩為斤。吾謂此臆度之詞也。如若十六銖為兩。本
散中既云澤瀉兩六銖。而不言甘二銖。何以二苓白朮則云十八銖。不言兩二銖也。其
實二十四銖為兩。何以言之。余知一銖者五銖錢也。以五銖錢作標準。一五銖錢。二苓
之粉約五分零。又古有秤無戥。本方肉桂所以書半兩。不書五錢。又二苓。書十八銖。因
七錢半。秤不能秤。故仍用五銖錢以量算焉。然五苓散與大橘皮湯亦稍有異。五苓散
以澤瀉為主者。因膀胱不利。而澤瀉味鹹。與膀胱氣味相投。故入膀胱能行其邪水。為
之膀胱藥。大橘皮湯以赤苓為主者。因小腸不利。而赤苓淡滲能泄小腸之水。小腸為
丙火。其色赤。故赤苓能入小腸。色相投也。所以各為君耳。

大橘皮中赤苓錢澤瀉猪朮桂五分填陳皮錢半木橘三枳一全料每五錢濕熟小腫及瀉
泄。六一半料可全煎。用五苓散赤茯苓一錢。猪朮桂各三分。澤瀉白朮桂各三分。木橘半錢。清石

六錢。甘草一錢加陳皮錢半。木香桂榔各三分。每服五錢。加姜煎。

○小水解入大腸哉。小腸不利而大便泄濁。二散皆行水滯熱之藥。加枳榔。○章納川岐下陳皮木香利氣以利小便而實大便也。水腫亦濕熱為病。故皆治之。

曰。本方獨減六一散半料亦可。餘皆可照方煎服。此湯係仿五苓散錢數。既照仲聖五苓散

之式。尚何必再減耶。又吾謂仲聖湯之分兩係一料而言。實有十劑。小青龍湯中已言之明矣。今觀仲聖五苓散共服三錢與吾一料分十劑之意相同。大橘皮湯中之五苓散錢數亦如此用法。又相同足見仲聖湯之分兩實係分作十劑直可為吾說之証佐也。

小半夏加茯苓湯

神行水散痞有生姜

半斤。一升。茯苓三兩。生姜半斤。除茯苓名小半夏湯。加桂除夏治悸厥。茯苓

甘草湯名彰

半夏六兩。生姜八錢。苓三錢。妙義長

加桂枝甘草除半夏名茯苓甘草湯。

仲聖治傷寒水氣乘心。厥而心下悸。

者。先治其水。却治其厥。○大因水而下行。則止而居滿清矣。

腎着

白木炒各二兩。○麻藥行水補

生芪防己

各二錢。甘木七錢。甘草尖五錢。加姜東煎。防

風水

與諸濕身重汗出服之賢

黃芪防己各一兩。白木七錢。甘草尖五錢。加姜東煎。防

濕強脾並能止汗。加甘草者益土。

○章納川曰。此等金匱方而錢數照十中取一分用

之無不中病。其靈真如吃藥之靈。

舟車

九河牽四大黃二遂葛芫花青陳一輕粉一錢。木香五錢。實陽水却相當

口渴面赤

氣粗便閉

而睡脹者為楊水。黑牽牛四兩炒。大黃二兩酒浸。甘遂。葛根。芫花。醋炒。大戟。細辛。木香。

青陳以行氣。葛根粉以透經絡。非實症不可輕投。

疏鑿欽枳榔及商陸。芩皮大腹同椒目。赤芷羌活木通煎。益姜皮陽水服。芩大腹皮椒

目赤小豆秦艽羌活澤瀉木通等分加姜皮棗前○降芩腹姜皮行水於皮膚。椒豆商椒㕮水于腹裏亦上下表裏分消之意。

實脾氣屬芩木與木瓜甘草木香大腹加草蔻附薑兼厚朴虛寒陰水效堪諦。使利不渴

為陰水。茯苓白朮王妙木瓜甘草木香大腹子。草荳蔻附桂附子。炮黑姜厚朴妙加姜裏前○脾虛補以芩木甘草。脾寒溫以蔻附黑姜。脾溫利以芩大腹。脾歸導以厚朴木青。入土之不足。由于木之有餘。木瓜木香皆能平肝瀉木。使木不犯土。而脾和則土能制水而脾實矣。經曰溫勝則地泥。實土正所以制水也。

五皮飲用五般皮陳茯苓桑大腹寄。陳皮大腹皮或用五加皮易桑白皮。脾虛脅

此方司。脾不能為胃行其津液。哉水脈平身以上宜汗。半身以下宜利小便。此方於湯水之中。仍屬調補之意。皆用皮者。水溢皮膚。以皮行度也。○章氏曰。以上三方。

向無袋與。不敢擅佔。

羌活勝濕湯。局卷獨錢芎草藁防減半腎濕氣在表頭腰重痛發汗升陽。有異功風能勝

濕升能降。氣勝則蔓荆三分寒附防。濕氣在表宜汗。又風能勝濕。故用風藥上升。使濕水自降。蔓荆。獨活各一錢。加芎草藁。本防風。

各五分。蔓荆子三分。如有若除獨活芎草藁。除濕湯升麻蒼朮羌活。除獨活川芎。荆芥甘寒濕加附子。防己。溫湯治風。

茵陳蒿湯。仲治痘黃。茵六黃二梔十四。陽黃大黃梔子入。瘀熱在裏。口渴便閉。身如橘色。暗使滻者。除梔子大黃。亦有不用茵陳者。仲聖柏皮梔子湯。黃柏二兩。梔子十五枚。甘草一兩。據陽黃胃有熱者。宜下之。如發熱者。則勢外出而不內入。不必汗下。惟清熱利濕以和解之。若小便利。色白無熱者。仲聖作產勞治。用小建中湯。

八正散

木通與車前扁蓄大黃滑石研

草梢瞿麥兼梔子煎加燈草痛淋蠲

一方有木香治

濕熱下注。口渴咽乾。淋痛尿血。小腹急滿。○木通。燈草。瞿麥。降心火。入小腸。車前清肝火。入膀胱。梔子。滑石。大黃。滑石。滴水。大利水之捷藥。扁蓄利便通淋。草薢入膀胱止痛。

必二焦通利。水乃下行也。

草薢分清飲石菖蒲

甘草稍烏藥益智俱

甘草稍減半

或益茯苓鹽煎服

少許通心固腎

濁精驅

透精白芍。○草薢龍湫風陰陽明溼熱去潤分清烏藥疏通氣而止便氣益智

固脾腎而開鬱結。石菖蒲開九竅而通心。草稍達腎莖而止痛。使溫熱去而心

腎通則氣化行而淋渾止矣。此以淋泄為禁止者也。

縮泉丸

益智同烏藥

等山藥糊丸使數需藍湯下。治

章納川曰等分者皆不上錢之謂也。又曰等分者一分也。又曰等分者各藥錢數輕重

相同也。集解中亦止曰等分而無的數。吾核其治意亦正不必重用。

當歸沾痛

東垣防升猪澤茵陳芩葛朋二木苦參知母草瘡瘍濕熱服皆應

當歸酒洗

升麻葛芩澤鴻菌陳黃芩酒炒。萬根蒼术白木土炒。苦參知母至酒炒。甘草炙。○羣活

通體節防風散。留濕苦參黃芩茵陳知母以泄溫熱。當歸以和氣血。升葛助陽而升清。

芩

芩。溼溫而降濁。參甘二木補正固中。使苦寒不傷胃。疏泄不損

氣也。

劉宗厚曰

此方東垣本治溫熱脚氣。復入用治諸瘡甚驗。

潤燥之劑

十三首附方二

矣草

湯仲

參桂桂三錢生地六兩阿二錢麻仁參四加酒服

虛勞肺痿呃逆全

參生姜桂

枝各三兩。阿膠蛤粉炒二兩。生地一斤。參冬麻仁研各半。生地十二枚。水酒各半。前仲

聖治陽寒。麻結合代心動悸及肺痿唾多。干金翼用治虛勞。寶鑑用治呃逆。外臺用治肺痿。

○參草麥冬益氣復脉。阿膠生地補血養陰。

○章納川曰。肺痿呃逆之症獨見胃氣上

沖。無肺氣下降之力。益津乾液絕。肺已難堪矣。其病已篤。而非此湯之藥何能救耶。

生地有一兩六之多。養陰即是降胃逆。恐生地之性太寒。有姜桂兼助之。故能補血。若無姜桂散邪。兼溫脾臟。恐生地涼血。則應補血。則訛也。總言仲聖之方不必疑惑。錢數照用可也。設菴云。補血二字。其心中自知。不言明故也。所以修園有識詞耳。設菴註湯中藥性。每每照湯中藥配藥性而言。所以人多誤會。知藥性者亦有不識藥方之義者。必須熟覽綱目。於湯藥之配合。自然了諸心目間耳。

滋燥養榮湯

兩地黃芩甘歸芍及羌防

羌防風潤劑

歸二條一防甘半瓜枯風秘燼金傷

當歸酒洗

二錢生地熟地白芍炒黃芩酒炒

活血潤燥生津飲

歸芍熟地一錢尋二冬桔八紅桃五利祕通幽善澤枯

熟地當歸芍各一錢天

冬參冬桔薑各八分桃仁研紅花各五分

○章納川曰。人至津枯。血枯內燥。大便難解。其身體亦可謂敝極矣。如活血潤燥生津飲之藥。錢數照用。則潤臟重。則不及施化。則滑腸也。雖大便可解。

一二次實無益於腸胃。不如少用之有益。故通幽者。錢數皆輕。

韭汁牛乳一六錢

漢反胃噎膈潤腸營五汁安中飲

張氏薑梨藕三般加入各一分牛乳半升生菜

汁少許。淡湯煩渴。名韭汁牛乳飲。牛乳六分。韭汁姜汁蘿蔔汁梨汁各一分。和服。各五分。要中微並治噎膈。○反胃噎膈。由大盛血枯。或有瘀血。寒痰阻滯胃口。故食入反吐也。

牛乳潤燥養血。為君。韭汁蘿蔔汁。消瘀益胃。姜汁溫胃散疾。梨汁清痰除火。能審症用之。或加陳酒亦佳。以酒乃未汁也。

○章納川曰。中消之症。由陽明胃腑燥熱。反胃之症。由陽明胃。胃大燥寒。今之醫者。知其寒。而不知其燥。故每治無效。

潤腸丸

東垣用兩桃麻五錢。歸尾。大黃。歸尾。大黃。桃仁。潤燥活血。羌活。大黃。破結通

幽麻仁清

或加羌防燒皂子

子得溫則消善通使秘羌防治風

風秘血秘善通腸風

大便秘

通幽湯

中二地少一錢桃仁當歸草升麻升清以降濁噎塞便閉此方妙

清不升則陰

通陽

紅花當歸身甘草炙升麻各五分

桃仁研一錢

有加麻仁大黃者當歸潤腸湯如寶

上藥皆潤

搜風順氣丸

大黃五藥膝車茱麻郁三鬼防獨積枳殼二蜜丸加酒妙異當中風風秘及

氣秘腸風下血總堪嘗大黃九蒸九酒五兩大麻仁郁李仁去皮山藥酒蒸車前子牛

膝酒蒸山藥肉各三兩克桃仁子酒浸防獨活枳榔枳殼炒各一

雨蜜丸○防獨活搜風

利潤燥通幽牛膝車前下行利水加山藥山藥鬼頭固水益陽不使過于攻散也

大黃經蒸晒則性稍和緩可二三清

消渴方

漢中花粉連翹汁生地汁牛乳研諸升調服或加薑汁蜜為膏服瀉大生津益血

搜風順氣丸

大黃五藥膝車茱麻郁三鬼防獨積枳殼二蜜丸加酒妙異當中風風秘及

氣秘腸風下血總堪嘗大黃九蒸九酒五兩大麻仁郁李仁去皮山藥酒蒸車前子牛

膝酒蒸山藥肉各三兩克桃仁子酒浸防獨活枳榔枳殼炒各一

搜風順氣丸

大黃五藥膝車茱麻郁三鬼防獨積枳殼二蜜丸加酒妙異當中風風秘及

氣秘腸風下血總堪嘗大黃九蒸九酒五兩大麻仁郁李仁去皮山藥酒蒸車前子牛

膝酒蒸山藥肉各三兩克桃仁子酒浸防獨活枳榔枳殼炒各一

白茯苓丸治腎消

花粉連翹草人玄參熟地覆盆各一兩解床七錢肺三十

音均屬翹草度也白茯苓花粉黃

連翹草人參玄參熟地黃覆盆子各一兩石斛葛根各七錢半熟床皮三十其根炒

蜜丸○

石湯下○黃連降心火石斛平胃熟地玄參生腎水覆盆葛根固腎精人參補

氣利膈消食石色黑屬水假之入腎也

猪腎

蔥尾湯金牛參膏兩磁茯苓葛草粉豆腎代水各七錢強中消渴分三餌

音均屬翹草度也白茯苓花粉葛根甘草花粉各二兩先者益腎去津下藥分三餌○

不交精出名弦中條服邪術熱與而毒盛也

猪腎一具大豆一升葛根人參石膏各三

兩磁石歸裏茯苓神知母黃芩葛根甘草花粉各二兩先者益腎去津下藥分三餌○

知芩石膏以潤邪火人參甘草以固正氣葛根花粉

以生津葛根黑豆最能解毒磁石豬腎引之入腎也

地黃飲子

易簡參薯草二地二冬祐解春澤瀉枳實疏二腑燥煩消渴血枯含

人參黃芪甘草失火冬參

冬生地 枳杞 茶蜜 石斛 潤肺和胃 治虛火。每服三錢。○參芪甘草以補其氣，氣能生水。二地二冬各以潤其燥。潤能益血。石斛平胃。枳杞下氣。津潤濡潤膀胱之火。枳實宣大腸。之善使二物清則心肺二臟也。○章納川曰。地黃飲子治消渴煩躁。此非平常之消渴。氣得以下降。而渴自止。

煩燥可此驗其方法藥味配合其佳惟各味錢數向未註明但云每三錢
法大可深思故葉天士每逢無可如何之症謂用地黃飲子最宜
酥蜜膏酒針用飴糖二汁百部及生姜杏棗補脾兼潤肺聲嘶氣憊酒溫膏

久百部汁。生姜汁。共煎一帖。
溫酒細細啜服之。

清燥 湯東垣 陳木瀉五分。黃芪錢半。蒼錢行。猪麥歸地。麴草柏。以上二分柴連分。參茯升三

五味丸肺經濕熱癆方首

錢半蒼錢行。猪麥歸地。麵草柏以上二分柴連分外茯升三
一治肺金受溫熱之邪。壅鬱喘促口乾便赤。黃芩錢半。蒼木炒
一錢。白朮炒陳皮澤瀉各五分。人參茯苓升麻各三分。當歸
炒炒黃柏酒炒。諸芩各二分。紫胡黃連炒各一分。五味丸
為庚金主津燥。金受溫熱之邪。則寒水生化之源絕而壅鬱

○肺為辛金主氣天陽生地參冬甘草火神水潤喉清降濁則燥全經此無東垣所云者蓋指肺與大腸為燥金

鴻大之劑

黃連解毒湯 治心火上炎也

柏黃芩梔子備等躁狂大熱嘔不眠吐血衄鼻血音斑黃均
加麻黃及淡豉見表此為傷寒溫毒盛三焦表裏相兼治梔
葛門

子金花 尤加大黃

附子瀉心清神用三黃黃芩

聖濤仲用

三黃黃芩

黃連一

大富圖

東二
雨林

子秋寒

加熱樂

神陽雨

大黃二

兩附子一粒。附子一粒。惡寒加附始相當。心下痛。按之軟。關脉浮者。大黃黃連湯。大黃細辛二兩。附子一枚。來泡製溫藥下之。妙異常。大黃細辛各二兩。附子一枚。泡金匱。入罕識。其指。

半夏瀉心湯。仲用八錢。薑參草裹芩三錢。川連一錢。治虛痞。法在降陽而和陰。半夏半升。黃連一兩。

乾姜黃芩甘草矣。人參各三兩。大棗十枚。治寒下之。具胸滿而不痛者。為病身寒而呕。飲食不下。非柴胡症。凡用瀉心者。多屬諸下。非傳經熱邪。○否而不泰。為痞滿心

者。必以苦哉。用芩連散者。必以平。故用姜夏。破。交。陰。陽。通。上。下。者。必。和。其。中。故。用。參。甘。大。棗。

白虎仲石膏用八錢。知母三錢。甘草錢。粳米百粒。有加參。燥煩口渴舌生胎。

石膏一斤。知母六兩。甘草

二兩。粳米六合。品入參。名入參白虎湯。白虎西方金神。此方清肝金而潤胃火。故名。第必實體方可。用之。或有血虛身熱。脾虛發熱。及陰盛格陽類白虎湯症。誤投之。不可救也。按白虎症。脈洪大有力。類白虎症。脉大而虛。以此○章納川曰。白虎湯之大劑。本非為辨。又當觀其小便赤者。為內熱。白者。為內寒也。○

章納川曰。白虎湯之大劑。本非一煎飲盡如飲之一半而病已者。即止。如病未已。仍復再飲。一晝夜飲完。今石膏減用八錢。約大劑中服一次之數。如熱不退。一日當服三五劑。又不必論古今戰秆不同。則分兩本已。一齊減少。二則古今戰秆不同。又無憑據。今之所定八錢。照民國之戰秆而言。此定之後。無得再減。何以故。白虎西方金神。本為上焦肺熱之湯。因肺大熱。猶如烈日當空。三焦皆熱。其勢有必然者。故用八錢。使三焦皆得其涼。如再少。不足為三焦之用。必八九錢。其藥氣始能滿佈。再減。則藥氣不能滿佈。肺大。豈能解耶。

竹葉石膏湯

聖仲

一斤。人參三兩。草二行。夏梗半升。麥冬一升。暑煩熱渴脉虛尋。

竹葉二把。石膏一斤。人參

三兩。甘草一兩。麥冬二兩。夏梗半升。加姜煎治傷寒解後。咽渴少氣。

○竹葉

石膏之辛寒。以散除熱。參甘梗麥之甘平。以補虛生津。姜煎之辛溫。以豁痰止嘔。

升陽散火

垣東

柴八錢。葛升羌獨芍人參五分。二草防風半錢。棗大薑發之靈。

葛根升麻。

羌活獨活人參白芍各五錢。防風二錢半。炙甘草三錢。生甘草二錢。每服五錢。加姜棗

煎。○大發多在肝膽之經。以木或能生火而二經俱疾。相火大哉。以柴胡龍肝為君。羌防以發太陽之大升葛以發陽明之大獨活以發少陰之大加參甘者。

補王以泄大加白芍者。濁肝而益脾且令散中有補。發中有收也。

涼膈散

局

分服二錢。翹一錢。硝黃及甘草五分。芩薄焦山梔竹葉蜜煎。膈上清。

竹葉生竹上散治上

鴆○連翹四兩。大黃酒炒。芒硝甘草各二兩。梔子炒黑。黃芩酒炒。薄荷各一兩。為末。每

服三錢。加竹葉生蜜煎。○連翹薄荷竹葉以升散于上。梔芩硝黃以推濁于下。使上升下行而膈自清矣。加甘草生蜜者。病在膈甘以緩之也。潘恩報曰。仲景謂曰。仲景謂曰。上焦景調胃承氣湯。後人加味一變而為涼膈散。再變而為防風通聖散。○章納川曰。上焦之病藥宜輕。觀涼膈已可知矣。今所定錢數。照本散共用三錢而論。尚多一半。乃用開水泡可也。試過甚效。若用煎尚可少一半。

清心蓮子

飲局

石連參赤苓柴著三錢。芩地骨車前麥草二躁煩消渴及崩淋。

石蓮人參柴胡赤茯

芩黃芩各三錢。黃芩酒炒。地骨皮麥冬。車前子甘草尖各二錢。○參葛甘草補虛潤燥。

桑胡地骨退熱平肝。黃芩麥冬清熱止煩。赤茯苓車前利濕下部。中以石蓮交其心腎也。

甘露散

局

茵陳二地冬芩枳杞斛解草同脾胃濕熱齒肉腫桂苓犀角可加從。

生地熟地

枳杞葉天冬。麥冬等分煎。○二地二冬。甘草石斛平胃腎之虛熱。清而兼補黃芩茵陳

折熱而去熱。枳壳枳杞抑氣而降火。加茯苓肉桂名桂苓甘露散。本事方加犀角通治胃中溫熱。○章納川曰。甘露飲沉降重濁之品。用治中下二焦。其用上焦錢數要其先解中焦。後解下焦。故也。看其錢數用法亦與吾錢數表相合。又查甘露飲共用五錢。

清胃散

垣用升麻黃連當歸生地牡丹全或益石膏平胃熱口瘡吐衄及牙宣

○黃連瀉出

心火亦鴻脾丸丹皮生地平血熱當歸引血歸經石膏瀉陽明之火升

○章納川曰古麻升陽明之清昂按古人治血多用升麻然上升之藥終

方無有不合我心者見汪叔菴清胃散中所批有古人治血多用升麻然上升之藥終不可輕施之語其言甚混而批于清胃方中其理更無虛寒血症不得用升散藥固是若實熱血症涼之不解非升散不可可知升陽散陽之理乎

瀉黃

草二風四錢石膏五分梔子錢炒香蜜酒調和服胃火口瘡功見先

○防風四兩甘草二兩黑梔

中甘草補脾滻熱重用防風者能發脾中伏火又能于土中瀉木也○章納川曰古者無藥鋪各散由醫生帶箱自備瀉黃散之錢數舊註係一料之錢數也今一劑分為十

劑其義甚合防風木為上焦藥用治中焦者本要三錢因其性又升於本湯故用四錢古人之意與我相合所以錢數有一定之法也甘草三焦之藥用治中焦二錢固是正數石膏雖是肺藥其質究屬重沉故用五分及梔子一錢瀉肺火以涼口瘡各味均與錢數未不合而合。蒼香辟惡辟口中瘡毒之惡氣生甘草補脾滲熱防風能發脾中伏火又能於土中瀉木蓋土既病則木無有不侮土者也先人識病故能擇藥精妙有如是也

錢乙瀉黃

草升防芷錢半芩夏斛甘枳一錢胃熱及口瘡大鬱發之斯為知

○升麻防風白芷各錢半黃芩枳壳半夏石膏各一錢甘草七分○升防白芷以散

胃大芩夏枳壳以清熱開鬱石膏甘草以平胃調中

○章納川曰瀉黃散係瀉脾熱

為主錢乙瀉黃散以瀉胃熱為主因胃熱而肺無有不熱故用藥發上中二焦鬱火此即大鬱發之之法也。

瀉白

散錢乙

桑皮地骨錢粳米百粒五分甘。桑白皮地骨錢各一錢。甘草五分。粳米百粒。

和中清肺李時珍曰。此瀉肺諸方之半絕也。

參茯知芩皆可入人參茯苓知母黃芩。肺火喘嗽此方施。○

章納川曰瀉白散為肺之湯一錢者可入肺之錢數也然肺熱胃無有不熱胃熱肺亦無有不熱乃病必然之勢也所以用生甘粳米以和中古人之製方周到如此。

瀉青丸

錢乙

用龍胆梔下行瀉火大黃滑。羌防升上芎歸潤。大鬱肝經用此宜。○龍膽草黑梔

羌活防風川芎當歸酒洗等分。蜜丸竹葉湯下。○羌活引大上升梔胆大黃柳大下降芎歸養肝血而潤肝燥。

龍胆瀉肝

湯局

梔芩柴。生地車前澤瀉倍。木通甘草當歸合。肝經濕熱力能排。梔子酒炒。

黃芩酒炒生地酒炒。柴胡車前子澤瀉木通當歸生甘草。○龍膽柴胡瀉肝膽之火。黃芩梔子瀉肺與三焦之熱以佐之。澤瀉瀉腎經之濁。木通車前瀉小腸膀胱之熱以佐之。

心歸地養血補肝。甘草緩中益胃。不令苦寒過泄下也。○章納川曰。瀉熱宜瀉不宜升人皆知之。柴胡透發上升

之藥因肝胆無下出之路必要從上升出所以雖瀉熱。大膽可用柴胡恐人少知故抑之一切古方無疑義。疑古方者醫不精而一知半解之人也何足道哉。

當歸龍脣

丸宣明

梔連柏黃芩各酒炒一兩。大黃薑黃各五錢麝香五分蜜為丸木香二錢。

薑湯下。

一切肝火盡能攘。○當歸酒洗。○柏黃酒洗。○梔子炒黑。○黃連酒炒。○黃柏酒炒。○黃芩酒。○分蜜丸姜湯下。○肝木為生火之原。諸經之火因之而起。故以青黛龍膽入肝恐諸藥過于折之而以大黃芩連梔柏通平上之下三焦之火。蓋大善大寒氣燥入肝恐諸藥過于直

寒傷試用當歸養血補肝。用姜湯半溫為引。加木香麝香。取其行氣通竅也。然非實熱不可輕投。

左金

漢丸

茱連六一丸。肝經火鬱吐吞酸。

黃連六兩

姜汁炒。

吳茱萸一兩

鹽湯泡亦名茱

連。心清火伏大不剋。則金能制水而肝平矣。吳茱萸入厥陰。行氣解鬱。又能引熱下行散。以為反佐。寒者正治。熱者反治。使其相濟以立功也。左金者。使肺右之金得行于左而平用也。再加芍藥名戊己。

丸。

熟瀉熟痢服之安。

戊為胃土。己為脾土。加芍

藥伐肝安脾。使木不剋土。連附六一治

胃痛。

寒因熱用。

理一般。

黃連六兩。

附子一兩。

亦反佐也。

導赤

黃連

生地與木通。

甘草稍竹葉四般攻。

口瘻。

林痛。

小腸

大

小腸

草稍

竹葉

四般

攻。

口瘻

林痛

小腸

大

引熱同歸小便中。

等分煎

生地

木通

甘草

稍

竹葉

四般

攻。

口瘻

林痛

小腸

大

引熱同歸小便中。

等分煎

生地

木通

甘草

稍

竹葉

四般

攻。

清骨散

用柴錢半。

胡連

羌活

地骨皮

知母

一錢

草減半。

骨蒸勞

熟保無虞。

銀柴胡

胡連

秦艽

葛根

甲

引諸藥

入骨

而補陰

甘草

和諸藥

而滿火。

○章納川曰。

骨蒸勞

熟用清骨散

亦必不能愈。

其方中本無名字。

宜不傳名于後世也。

用之者亦不過安病人之心耳。

普濟消毒

散

五苓連玄甘桔柴陳二錢

板藍

梔馬荷翹一錢

升七分

為末含。

黃連酒炒。

各五錢。

玄參甘草生用

桔梗柴胡陳皮去白各二錢。

真桔子板藍

根馬勃連翹薄荷各一錢。

荳蔻升麻各七分

未服或蜜丸噙化。

或加入參及大黃。

加參。

便聞如

大頭天行力能安。

大頭天行親戚不相訪問。

惡者多不救。

○原文曰。

苓連湯心。

肺之熱為君。

立參陳皮甘草

大補肺為臣。

連翹薄荷梔桔

板藍根梔

秦艽升麻

葛根。

引諸藥。

上以頭面為勝。

以承氣湯之陽。

桂枝為舟楫。

不令下行。

為載。

李東垣曰。

此邪熱客心。

肺之間。

全活甚良。

清震湯 河治雷頭風升麻蒼朮兩般壳二味而方升麻湯荷葉一枚升胃氣邪從上散不傳中。面

腫痛癰瘍名雷頭風。一云頭如雷鳴。東垣曰。都在三陽不可過。

用寒藥重劑。殊復無過處。清震湯升陽解毒。蓋取震為雷之義。

桔梗湯 滌中五分巴桑皮貝姜苡歸枳杏仁百合草三分黃芪七分薑煎此

桔梗防已瓜分杏仁百合甘草各三分姜煎。甘桔開膈氣血。

吉仁苡仁桑皮百合補肺清大括。姜貝母潤肺除痰。甘桔開膈氣血。

利肺散寒防已散。腎陰風濁溫清熱。當歸以和其血。只壳以利其氣。

清咽太平丸 薄十芳柿甘犀蜜及防風桔梗三兩治膈熱早間咯血煩當紅。

兩翅肺肝之本旺之時。未或生大朱。翹肺金薄荷十兩川芎柿甘草防風犀角各二兩。桔梗三兩。

寒火○川芎血中氣藥散瘀升清防風血藥之使。搜肝濁肺薄荷理血散熱。清咽降蒸。

消斑青黛散 桃連犀知母立參生地齊石膏柴胡人參甘草便實參去大黃躉去人參大黃薑棗

煎加一匙醋。陽邪裏實此方稽發斑雖有胃熱亦諸經之大有以助之青黛黃連清肝火。桃子清心肺之火。元參知母生地清腎火。犀角石膏

清胃丸引以柴胡使達脫表。使以棗姜以和營衛。熟地入○章納川曰。陶節菴消斑青

黛飯並無錢數。因其方開得尚可。而錢數不合病情。故而摘去而無分兩。要知留傳後

世之方。昔日必經明眼鑑定。故知其錢數必不合於方證而去之。不然各方均有錢數

刊入方書。以成全功。而消斑青黛飯獨不為列入。不成乾坤。何厚於此而薄於彼耶。又

舊註云。加酸者酸而收之。此言汪叔菴又照藥性表面而談也。而火證豈可收斂乎。若照叔菴之說。節菴差之甚矣。此方何以傳。胃熱發斑之症。乃熱毒入裏。傷於血分。而此

湯之用醋者。因醋能錯。尤能益血。引諸藥鑽入於裏之血。分則有之。故一劑之中。祇加

一匙。餘藥錢數不註。加醋一匙。偏註之。其妙在一匙。而少可知。其方所以傳也。

辛夷散

風裏臺本

防風。白芷升麻。與木通。芎細甘草。茶調服。鼻生瘻肉三錢。攻

肺熱

上藥於

瘻

入鼻而生瘻肉。猶溫地得熱而生芝菌也。諸藥等分。末服三錢。半夷升麻。白芷能引胃

中清陽。上行頭腦。防風臺本能入頭頂。燥熱祛風。細辛散熱。通竅。川芎散鬱。疏肝

木通。茶清溝火下行。甘草

甘平緩其辛散也。

蒼耳散

陳無

揮

辛夷各二錢。白芷一兩。末服。

○凡頭面之疾。皆由清陽不升。濁陰通上。壅于職。則鼻流濁涕。為潤藥。山藥升陽。通竅。降溫散熱。哉治之也。

○章納川曰。

散有

子二錢半。薄荷二錢半。薄荷

辛夷各二錢。白芷一兩。末服。

○凡頭面之疾。皆由清陽不升。濁陰通上。壅于職。則鼻流濁涕。為潤藥。山藥升陽。通竅。降溫散熱。哉治之也。

○章納川曰。

散有

末服亦有煎服。此散末服。非一劑之錢。亦是一料之錢。要亦是十次服可也。

妙香散

王公

山藥姜炒。二驚悸。鬱結夢中。遣桔草三錢。辰砂二一兩。神志參。芩麝一木香。

○山藥固精。參。芩。麝。氣。遠志。二茯。清心寧神。桔梗。木香。疏肝。昇麝。鎮心。

二錢半。每服二錢。酒下。

○山藥固精。參。芩。麝。氣。遠志。二茯。清心寧神。桔梗。木香。疏肝。昇麝。鎮心。

散。鬱。辟邪。甘草補中。協和諸藥。使精氣神相保。邪大自退。不用固濡之藥。為淡。良劑。

以。其。安。神。利。氣。散。

音。治。驚。性。鬱。姑。

除痰之劑

二陳湯

局用

半夏二陳草五分。

半夏。姜製。二錢。陳皮去白。五分加姜煎。

利氣調中。兼去濕。一

切痰飲

此為珍。

陳皮利氣。甘草和中。苓。夏。導。痰。湯。內。加。星。枳。頑。痰。膠。固。力。能。馴。以。助。半。

夏。加。枳。實。以。成。

若。加。竹。茹。與。枳。實。

湯。名。溫。胆。可。安。神。

溫。胆。湯。治。胆。虛。不。眠。

潤。下。九。溪。丹。

術。矯。例。壁。之。功。

若。加。竹。茹。與。枳。實。

湯。名。溫。胆。可。安。神。

溫。胆。湯。治。胆。虛。不。眠。

潤。下。九。溪。丹。

僅陳皮草利氣祛痰妙絕倫。陳皮去白八兩。鹽五錢水浸洗。甘草二兩蜜炙。蒸餅糊丸。
損元氣。多服恐○章納川曰。脾本多濕氣。遇濕則滯。蓋一滯百滯。故水停而變痰矣。二陳湯為治痰之通劑也。因半夏能燥脾濕。故用二錢。使其入脾以燥濕。茯苓能利痰水。陳皮又能利氣。各用一錢。使其入肺。俾先清肅肺中之痰。肺清而氣得降。運用之權如此。脾既燥矣。氣既順矣。而脾胃之痰尚能不降乎。又用甘草五分。以調脾胃之津液。此即瀉中有補之意也。又茯苓實為治痰之正藥。如中焦痰多。則肺中之痰一經降下。更多而不走。故加茯苓。硬下其痰水。蓋此湯之茯苓。可以變通而加者。因其祛痰之通劑故也。若非通劑不可以為例。

滌痰方。夏星二錢半。橘實、茯二參、葛錢、竹茹七分。甘草五分。加姜煎。此即導痰湯。加入參扶正。萬病開痰。竹茹清金。

青州白丸夏七兩。星附二兩。烏五錢。晒露糊丸。薑薄引。風痰癱瘓。小兒驚。半夏水浸生衣子各二兩。川烏去皮臍五錢。四味俱生用為末。袋盛水糊出。粉再搗再糊。以盡為度。確然。○度之生也。由于風寒濕。星夏半溫。祛痰勝。烏附半熟散。寒逐風浸而裏之。殺其毒也。

清氣化痰丸。星夏兩。裏仁橘實、芩、杏六錢。姜汁為糊丸。氣順大消痰自淡。半夏姜製胆紅枳實、炒杏仁去皮尖。橘裏仁去油。黃芩酒炒。茯苓各一兩。姜汁糊丸。淡姜湯下。
水濕大熱皆生痰。肺否逆氣机。實破滯氣。芩桔平熱氣。星夏婦潤氣。茯苓行水氣。哉化痰必以清氣為本也。

順氣消食化痰丸

王氏

半夏南星一觔

山查青皮蘇菔子

神曲麥芽製香附葛根杏仁

各一兩蒸餅滿丸姜汁搏半夏姜製胆星各一斤橘紅青皮蘇子沉水者炒。茱蘋子生

一兩姜汁和熟餅為糊丸。病由溫生。星夏端濕。病因氣升。蘇子杏仁降氣接因氣滑止。青皮香附導溼。病生於酒食。越葛解酒。查麥消食。溫毒食消。則病不生。氣順則喘自矣。

滾痰丸

王氏

用礞石

兩芩黃八兩沉五錢

百病多因痰作祟

頑痰怪症力能匡

青礞石一兩

用橘紅

硝

用半夏

用白芍

用甘草

用桔梗

用陳皮

用半夏

用橘紅

用白芍

金沸草散

王氏

入錢前半錢

半荆芥

夏五分

甘三赤六加姜

桑葉

嗽風寒頭目顰

細辛各一錢

用礞石

用橘紅

用半夏

用白芍

用陳皮

用半夏

用橘紅

用白芍

半夏天麻白木湯

王氏

太陰痰厥頭痛當

木髮

細辛

桂枝

芍藥

甘草

大棗

細辛

桂枝

芍藥

甘草

大棗

細辛

桂枝

芍藥

芽使三分

干姜酒

柏當

半夏

天麻

白木

神曲

柏當

細辛

桂枝

芍藥

甘草

大棗

細辛

桂枝

芍藥

甘草

半夏天麻白木湯

王氏

乃瘦厥頭痛之症

由於氣弱脾不旋

運而生痰

木少金制而風動

氣弱則陽下陷

痰乘風而上升

故瘦厥頭痛

東垣定半夏白木天麻湯舊註藥性係照

方義一而論故云參著鴻大實係升陽

陽升則濁降

有似大鴻耳

天麻定風而濁疾降

下之時無阻碍之患。半夏除痰實係降痰之力大。二木燥濕不使再生新痰。陳皮麴不但滌脾中陳垢。益且使降下之痰一刻不得逗遛于中宮。芩瀉即領其下出。干姜滌中寒。忍中焦寒滯。清陽不能上升。重用尤恐動其濁熱。至於黃柏非瀉病中之火。而解參芪之溫。何以言之。參芪既升陽於上。陽上則參芪之氣盡隨陽而上升。巔頂參芪之溫力不盡。清陽無右降之功。若夫陽氣欲其升。又欲其降。不降亦病也。黃柏本苦寒沉降之品。故用酒洗合雷公燉升者。以酒製之法可載于巔頂之上。故極三分而已。如錢囊重。雖酒製亦何能效。

常山飲

局用二錢炒

一錢妙姜棗酒水煎露之。叔疾截瘧烏梅高常山

二錢知母目

母草葉梗枳榔各一錢。烏梅二個。一方加川山甲甘草。未發時面東溫服。○知母治陽明猶勝之熱。草葉治太陰猶勝之寒。二經和則陰陽不致交爭矣。常山吐痰行水。枳榔下氣破積。見母清大蟲瘻。烏梅斂陰退熱。

頻用在發散表邪及提出陽分之機為宜。

截瘧七寶

局用易常山藥枳榔朴草青陳粉水酒合煎露一宵。陽經實瘧服之安。

常山酒炒草葉梗枳榔

各半錢。露之發日早辰面東溫服。○常山破瘧枳榔

金鎖固精丸

芙蓉龍骨蒺藜牡蠣連粉糊九鹽酒下。潘精秘氣滑遺無。

黃沙苑蒺藜

各二兩。龍骨酥炙牡蠣鹽水煮一日夜瓶封。各二兩。蓮子粉為糊丸鹽湯或酒下。○

品。

茯苓丹

局用方療精滑脫。茯苓五味石蓮末酒煮。山藥為糊丸亦治強中及消渴。

強中者下清

之人。莖長興

糊丸不交精也。莫然子十兩酒浸五味子八兩白朮芩石蓮各三兩。山藥六兩酒者為
精生水。石蓮清心止濁。山藥利濕固脾。

茯苓甘淡而清于補正中能泄腎邪也。

治濁固本丸

鬚連二砂柏夏茯苓三兩甘草三兩清熱利濕固本之中。

黃連炒各二兩砂仁黃柏益智仁半夏姜製茯苓各一兩猪苓二兩甘草陳三錢○利濁多由濕熱與瘀。連柏清熱二苓利濕。半夏降痰。濕多由鬱滯。砂智利氣兼能固腎強脾甘草補土和中。

訶子散

東垣用七分煨粟壳姜橘五分也。訶子限火分。炮姜六分。御米壳去蒂蜜炙橘紅各五分末服。○粟壳固腎。蜜炙橘紅各

逐冷補陽散。皮升陽調氣散。河間訶子

木香訶草連仍用木芍煎湯下。訶子一兩半生半煨木香五錢。

白芍湯調腹人滿以止之。不加厚朴二錢。

一方一熟一平故亦主脫肛便血者。

桑螵蛸散

治便數。參芩龍龜歸遠昌。卧服二錢參湯下。補腎安心健忘覺。

桑螵蛸鹽水炒入參茯苓龍骨。

瓶燒板。麻尖菖蒲益母。遠志當歸等分為末。臨卧服二錢。入參蠅蠅補元。熱則使火散。以龜板滿心。當歸潤之。菖蒲散心遠志並能清心熱而通心腎。使心藏清則小腸之大自寧也。

真人養藏湯

訶子散。肉桂當歸桂木香。木芍參甘為濁劑。脫肛久痢四錢膏。訶子炮裏。

錢。瞿麥壳去蒂。蜜炙三兩。六錢肉桂。龜頭裏煨五錢。當歸白朮芍白芍酒炒。人參各六錢。木香二兩。四錢桂八錢。生甘草一兩。八錢。每服四錢。藏寒甚。加附子一方。無當歸。一方有干姜。○脫肛由于虛寒。參术甘草以補虛。官桂。菖蒲以補其寒。木香調氣。當歸和血。芍藥酸以收斂。訶子粟壳酒以止脫。

當歸六黃湯

治汗出。酸而汗出曰自汗。而汗出曰盜汗。芪倍柏芩連二地當歸黃連芩二地等分。黃芪加倍。

復滋陰。汗出以潤其火。汗出以表其虛。地以滋其陰。汗出以表其表。用黃芪以固其表。加麻黃根功更異。

李時珍曰。麻黃根走表。能引諸

藥至衛分而固腠理。或云此藥太苦寒，胃弱氣虛在所忌。○章納川曰：常人自汗盜汗皆有者，臟氣熱也。苦寒何妨？因歌中後兩句乃不合病之言，必誤於世，故抑之。而虛損自盜汗，在此例。

盜汗二兩柏子仁九參术牡蠣麻黃根半夏五味各一兩麥麯五分棗丸存。

柏子仁炒研去油二兩人

參白术牡蠣麻黃根半夏五味各一兩。桂心寧神。牡蠣麥麯治心火脫。五味飴汗。半夏燥濕。麻黃根治走肌表用。

參術本以固

陽虛自汗牡麻根黃芪一錢浮麥增。

牡蠣煅研黃芪麻黃根各一錢。浮小麦百粒煎。

○模

法芎藁牡蠣粉。

模汗法白术藁本川芎各二錢半。

為末。袋盛通身擦之。或將龍骨牡蠣搗。

龍骨牡蠣為末合

汗。

殺蟲之劑

烏梅丸仲用細辛桂入參附子椒薑繼黃連黃柏及當歸溫藏安蛇寒厥劑。

烏梅三百箇浸蒸細辛桂枝附子炮人參黃柏各六兩黃連一斤干姜十兩川椒去汗當歸各四兩治傷寒厥

桂枝附子炮人參黃柏各六兩黃連一斤干姜十兩川椒去汗當歸各四兩治傷寒厥陰症寒厥吐衄此○蟲搏酸則伏故用烏梅得苦附安故用連柏蛇因寒而動故用附子

川椒姜當歸補肝人參助脾細辛發腎都桂枝散表風

桂即謂曰各曰安蛇實是安胃故仲景云保主下利。

桂即謂曰各曰安蛇實是安胃故仲景云保主下利。

化蟲九散鵝虱炒棟根枳榔五錢枯礬存使君蕪夷二錢半腸胃諸蟲永絕氣。

鵝鵝虱炒柏散各五錢柏脂二錢米麯糊丸亦可末服

之品單服尚可治之。桑芽為丸而火馬有不死者。

者。

癰瘍之劑

真人活命散銀花二粉甘貝芷乳錢五歸橘錢半防風半沒皂五分穿三片。

金銀花二錢當歸酒洗神

度去白各錢半。防風七分。白芷甘草節臍母天花粉乳香各一錢。沒藥五分。二味另研。

候藥熱下皂角刺五分。穿山甲三片。對蛤粉妙去粉用好酒煎服。忌飯盡醉○恩冬甘草散熱解毒癰瘡聖藥花粉貝母天花粉乳香各一錢。沒藥五分。二味另研。

氣。丸者托裏護心。沒藥散瘀清腫。山甲角刺透經絡而清堅。加酒以行藥勢也。

酒

煎癰疽能潰散已成者潰後忌服用無差。

大黃便實可加使鐵器酸物勿沾牙。

金銀花酒加甘草。奇癘惡毒皆能保。

金銀花五兩。生者更佳。甘草護膜須用蠟珀九二兩。一兩酒水煎。一日夜服盡。

白芷一兩。溶化為丸酒服十九加至百丸則有力。

毒不攻心。一方加雄黃。名雄碧丸。蛇咬尤宜服之。

托裏十補散即局方參芪芍歸桂甘芍桔樸風各用一錢酒調服癰瘡脈弱賴之充入參

當歸各二錢川芎桂心白芷甘草桔梗防風厚朴各一錢。熟酒調服。○參芪補氣當歸和血。甘草解毒。防風發表。厚朴散滿。桂枝桔梗排膿。未裏氣而文治。共成內托之功。

托裏溫中湯桂姜附卷三錢茴木丁沉香陳皮益智甘草一寒癘內陷嘔瀉良。

附子炮四錢。炮姜卷活各三錢。木香一錢。生茴香丁香沉香益智仁陳皮甘草各一錢。加姜五片。舊治瘧疾。內陷心癆。使溏滯就音曉○病寒內陷。故用姜附溫中助陽。卷活通關節安草益智元。益智丁沉以止。兜連食茴木陳皮以散滿除痞。此亦指時從症之變法也。孫

托裏定痛湯四物兼乳香沒藥桂心添再加蜜炒瞿粟壳清癰虛痛去如拈。

瞿粟壳取龍止諸痛。桂

外心四物活血托裏克乳香能引毒氣。外出不致內攻。與沒藥並能消腫止痛。

散腫清堅湯東知柏胆花粉桔昆各五錢升麻翹草稜莪三歸尾葛芍一錢腎柴胡四錢

黃芩八錢半。酒炒半生用。知母黃柏酒炒花粉胆草酒炒。葛根炒。柴胡四錢。升麻連翹甘草炙三錢酒炒。歲道

黃連一每服五錢先浸煎。

黃芩八錢半。酒炒半生用。知母黃柏酒炒花粉胆草酒炒。葛根炒。柴胡四錢。升麻連翹甘草炙三錢酒炒。歲道

酒洗炒各三錢葛根歸尾酒洗白芍酒炒。各二錢黃連一錢。每服五六錢先浸後煎○

連翹升葛解毒升陽甘桔花粉排膿利膈歸芍活血。罷布散瘡破血行氣。龍胆知

酒洗炒各三錢葛根歸尾酒洗白芍酒炒。各二錢黃連一錢。每服五六錢先浸後煎○連翹升葛解毒升陽甘桔花粉排膿利膈歸芍活血。罷布散瘡破血行氣。龍胆知

柏琴連
諸經之大也

經產之劑

婦人病與男子同惟行經期

則不可以例治此立經產一門

海藏妊娠表證因外感莫用四物湯傷寒表虛地骨桂

表虛自汗發熱惡寒頭痛解而解浮而

肌實表虛表實細辛兼麻黃

頭痛身熱無汗脉緊加桂枝地骨皮各二錢二藥解

可加此二味表裏解表苦口苦肺主心陽病心煩喜呕口苦肺主

陽症加柴胡解表黃芩清裏為少陽明石膏知母藏

火熱煩渴脉大而長為陽小便不利

陽症加白虎湯清肺胃

加芩鴻加葛苓澤不眠黃芩梔子良

汗下後不得眠加黃芩梔子養陰除煩

心熱脉浮加桂枝風搏風

虛症加厚朴散薄消痞

桂枝加葛芩澤不眠黃芩梔子良

汗下後不得眠加黃芩梔子養陰除煩

當歸散金益婦人妊娠一錢芎歸芍子芩白术八錢宜常服產後胎前功效深

婦人懷孕宜

易產且無東疾當歸川芎芍藥黃芩各一兩白术半斤為末酒調服○丹溪曰黃芩白术安胎之聖藥蓋惟此宜清熱涼血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能除胃熱白术

補脾亦除胃熱脾胃健則能化血養胎自無半產胎動血渴之患也

黑神散局中黑豆倍歸芍地草桂炮薑蒲黃四錢童便酒消瘀下胎痛逆忘

瘀血攻衝作痛血脹脹不行

下亦由血滯不行諸藥各四兩黑荳炒去殼升酒童便各煎○熟地歸芍潤以蒲黃黑荳滑以行血黑姜官桂熱以破血緩以甘草散以童便行以酒力也

章納川曰瘀血攻衝心中作痛胞胎不下不但血滯直是混身經絡氣血强硬不行本屬逆產即使隨後胎不攻衝交骨終不能開必致難產而死者非黑神散照方服不可今雖減其分兩切忌有誤如服後一二時無效仍當一時服一劑必無誤矣如胎上攻

必是難產真者

清魂散用澤蘭參草各三分參五分荆芥一錢理風血產中督暉神魂帖

澤蘭入參草火各三分

川芎五分荆芥一錢酒調下○川芎澤蘭和血人參甘草補氣外感風邪潤荳龍脉血中之風財賦魂散曰清魂

羚羊角散本事一錢尋杏獨慧防寒歸芍茯神五分木香二子癪風中可回春一錢

羚羊角屑各三分加姜煎治癲癇中

薏仁防風獨活川芎當歸茯神東仁炒各五分木香甘草各二分半加姜煎治癲癇中風延潮僵朴口噤搐掣名子癇○羚羊平肝大防獨散風邪東枝以寧神皆歸以和血杏仁木香以利氣薏仁甘草以調脾

當歸生薑羊肉湯金匱當歸三兩生薑五兩羊肉一斤生薑五兩歸三兩羊肉一斤補血氣產中腹痛勞

匡度後發熱自行身痛名薑房膜亦有加入參芪者此確性血○羊肉辛熱用氣血引福者瘀血未去新血不生也

入氣分以生新血。參芪者氣血交補。**千金四物甘桂姜草**干羊內湯。芎歸芍地。

草干姜肉桂加羊肉煎。

達生。丹漢達小羊也。取其易生。

三錢大腹皮參木蘇陳歸芍二甘草

慈葉黃楊臘孕婦臨盆先服之。

五味黃楊膠七個。○歸芍以益其血。參木以補其氣。陳臘蘇慈以疏其壅。一錢青蔻難矣。若將川芎易白朮名紫蘇飲子。

女子懸宜。胎氣不和。心脾名子懸。

妊娠轉胞參木飲。丹漢謂轉胞者。氣血不足。或痰飲阻塞。胎為胞逼壓在一邊。致胎下急痛。而小便或難或閉也。

八珍除苓加夏陳煎加姜引脾不痛氣升胎舉自如常。

此即八珍湯。除茯苓加陳皮半夏以除痰。加姜煎。

牡丹皮散。良方。治血癥。三分延丹桂心歸赤芍膝羌六分使四分三稜酒水加。

丹皮。○桂心。丹皮。酒水各半。

赤芍。牛膝以行其血。三錢。莪廷歸尾。延胡。兼行血中氣滞。氣中血滞。則結者散矣。

章納川謂牡丹皮散。破血之藥。自當重用。夫血積成癥。病非一日。若大劑則欲其消散。或致血崩所必然也。牡丹皮散重藥輕用。正合遠病近治之法。而古人

用藥實係先得我心耳。

固經丸。婦人用龜板四。柏芍三兩。芩二兩。樗皮香附各兩。半漏下崩中色黑。殷。

止。色紫黑不

者。酒炒熱。龜板炒四兩。黃柏炒。芍藥酒炒各二兩。柏皮炒。香附童便浸炒各兩半。黃芩炒。二兩。酒丸。

○陰虛不能治胎熱之大匙。經多。龜板芍藥濕陰壯水。黃芩清上焦。黃柏清下焦。柏膏炒。皮清以收胎。

柏子仁丸。良方。兩熟地蜜丸未飲愈可期。三兩續斷澤蘭葉五錢。柏仁牛膝宜卷柏加之通血脉。經枯血少。腎肝松。柏子仁去油。牛膝酒浸。卷柏各五錢。熟地一兩。續斷澤蘭各三錢。柏膏炒。皮清以收胎。

益腎養心熱地榆
澤蘭卷柏活血通經。牛膝補肝

附使用雜方

望梅丸

用鹽梅肉蘇葉薄荷與柿霜茶末麥冬糖共搗旅行費服勝瓊漿。

每去心薄

荷葉去梗柿霜半斤各一兩紫蘇葉去梗五錢為極加末白霜四兩共搗丸如豆大放打帶之每含一丸生津止渴加參一兩尤妙。

骨灰固齒

散猪羊骨臘月醃成蝦研之骨能補骨髓補腎堅牙健齒老尤奇。

羊骨大蝦細猪

而研其細益妙頭上齒骨亦佳。

軟脚散

中芎芷防細辛四味研如霜輕撒鞋中行遠道足無篤疚汗皆香。

防風白芷各五

(二) **瘧** **半** **為** **木** **行** **遠** **路** **者** **撒** **少** **許** **于** **鞋**

內步履輕便不生篤疚足汗皆香。

湯頭歌括後

附小兒稀痘方

稀痘神功

以丹三種荳粉草細末竹筒裝臘月廁中浸洗淨風乾配入梅花良藥瓜藤絲煎湯。

服一年一次三年光

用赤小豆黑豆黃豆粉草各一兩細末入竹筒中削皮留節鑿孔入

即乾 **大者** **服** **一** **錢** **小者** **五** **分**

以霜後熟瓜簾上小簾熱煎湯空腹服忘草鞋十二日解

出黑瘡為驗 **每年服** **一** **次** **可** **補** **三** **次** **水** **不出** **矣**

又方蜜調忍冬末 **糊** **不住服** **之** **効** **亦** **强** **調** **不住** **服** **之** **更** **有**

立參兔絲子

江王 **蜜丸** **如** **彈** **空** **心** **嘗** **白** **酒** **調** **花** **日** **二** **次** **兔** **絲** **子** **半** **酒** **浸** **二** **宿** **者** **乾** **去** **底**

白湯調下 **或** **加** **犀角** **生地黃**

四 **錢** **犀角** **二** **兩** **此** **皆** **驗** **過** **稀** **痘** **法** **為** **力** **簡** **易** **免** **倉** **皇**

每日 **二** **次**