

王機微義卷之四十六

霍亂門

○內經叙霍亂所因

經曰。歲土不及。風乃大行。云云民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇併

按此言土運不及。木乃太過。木乘土而爲病。宜詳玩本文

○論霍亂脉證

內經曰。脉伏者霍亂

傷寒論曰。病嘔吐而利。名曰霍亂。或發熱頭痛。身疼惡寒。吐利。或自吐下。又利止復更發熱也。皆是霍亂。

證傷寒其脉微澀者。本是霍亂。今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利。本嘔下利者。不可治也。

保命集云。傷寒霍亂轉筋。身熱脈長。陽明本病也。脾胃受濕熱。中焦氣滯。或因冷飲。或傷冷水。或感濕氣。冷熱不調。水火相干。陰陽相搏。上下相離。榮衛不能相維。故轉筋攣痛。經絡亂行。暴熱吐瀉。中焦胃氣所主也。

謹按傷寒傳變爲霍亂者殊少。惟夏秋之間暄熱。人腠理疏。感風濕暑之氣。而生此證多。有陰陽虛實不同。脉來浮洪者可治。微而遲。氣少不語者爲難治。

○論霍亂分三因

陳無樞曰。霍亂者。心腹卒痛。嘔吐下利。增寒壯熱。頭痛眩暉。先心痛則先吐。先腹痛則先利。心腹俱痛。吐利並作。甚則轉筋。入腹則斃。霍亂惡證。無越於斯。蓋陰陽反戾。清濁相干。陽氣暴升。陰氣頓墜。陰陽痞滿。上下奔逸。治之唯宜溫緩。更詳別三因以調之外。因諸風則惡風有汗。傷寒則惡寒無汗。胃濕則重著。傷暑則熱煩。內因九氣所致。鬱聚痰涎。飲痞膈不通。遂致滿悶。隨其勝復必作吐利。或諸飽食膾炙恣飧乳酪。冰脯寒漿。旨酒。胃既膜脹。脾臟停凝。必內鬱發。遂成吐利。當從不內外因也。

按此具霍亂三因稍備。但立方未能以盡其變學者。自宜推格。

○論霍亂轉筋

陳氏曰。轉筋者。以陽明養宗筋。屬胃與太腸。今暴吐下。津液頓亡。外感四氣。內積七情。飲食甜膩。攻消諸脉枯削於筋。宗筋失養。必致攣縮。甚則牙縮舌卷。爲難治。

按此言霍亂者多轉筋。大抵冷熱不調。陰陽相搏。故轉筋攣痛甚者。遍體轉筋。此實陰陽之氣反戾。風寒乘之。筋失氣血所榮。而爲攣縮急痛也。

○論乾霍亂

陳氏曰。乾霍亂者。忽然心腹脹滿。絞刺疼痛。蟲毒煩
冤。欲吐不吐。欲利不利。狀若神靈所附。頃刻之間。便
致悶絕。亦涉三因。或臟虛。或腸胃素厚。故吐利不行。
按此謂人腸胃素厚。形氣實者。故感四氣。則吐利
不行。而乾揮霍掠亂也。太抵熱勝。瘀鬱則悶亂。濕
勝飲鬱。則吐下形氣虛者。禡不旋踵。嚴氏謂胃中
諸食結而不消。陰陽二氣擁而反戾。揮霍之間。變
成吐利。然飲食致者。亦有有餘不足。如飲食自倍。
外感濕賜。而乾霍亂者。宜吐之。或下之。過傷者宜
消導之。瘀者劫之。寒者溫之。熱者清之。要在適事。
爲故也。

○論霍亂煩渴

陳氏曰。煩渴者。以陰陽反戾。清濁相干。水與穀併。小便秘滯。旣走津液。腎必枯燥。引水自救。煩渴必矣。

按吐利必渴。况腎水竭者乎。與水者。唯宜溫緩熟甚者。天水輩以甘緩火也。

○霍亂治例

保命集云。霍亂陽明證。宜和中平胃建中輩。或四君子湯。脉浮自汗。四君子加桂主之。脉浮無汗。四君子加麻黃主之。吐利轉筋。脇下痛。脈弦者。木尅土也。故痛甚。平胃加木瓜五錢。或建中加柴胡木瓜。○吐利轉筋。腹中痛。體重。脈沉而細者。四君子加白芍良姜。

○吐利四肢拘急脉沉而遲。此少陰霍亂。四君子加
薑附厚朴。○吐利四肢厥冷脉微緩屬厥陰。建中加
歸附。○吐利頭痛而身熱。熱多欲飲水者。五苓散。寒
多不用水者。理中丸主之。

元戎云。太陰證霍亂者。理中加橘紅。名治中湯。○若
吐下心腹作痛。手足逆冷。理中去白朮加熟附。名四
順湯。○若吐利後轉筋者。理中加火煅石膏一兩。

霍亂治法

○和中之劑

四君子湯

平胃散

建中湯

並治證見前
方見虛損門

○治寒之劑

機要漿水散。治暴泄如水。周身汗出盡冷。脈弱不能

語言甚者加吐

半夏

二錢

附子

乾生薑

炙甘草

桂

各半錢

良姜

二分半

右爲末。作一服。漿水煎服之。

薑附湯。治霍亂轉筋。手足厥冷。多汗嘔逆。

乾姜

一兩

附子

一箇生用

通脉四逆湯。治霍亂多寒。身冷。脉絕。

吳茱萸

二兩炒

附子

一兩炮

桂心

通草

細辛

白芍藥

甘草

炙各半兩

當歸

三錢

右㕮咀。每服四錢。水酒各半。加生姜煎。

理中湯治過食生冷。遂成霍亂。吐下脹滿。食不消。心

腹痛

方見寒門

加橘皮名橘皮治中湯

嚴氏曰。若臍上築動者。腎氣動也。去术加桂。吐多者去术加生姜半夏。利多者仍用术。心悸者加茯苓。腹痛者加乾姜。腹滿者去术加附子厚朴。

○治濕之劑

三因茯苓澤瀉湯治霍亂吐利後。煩渴渴飲水。

五苓減猪苓加甘草

按此太陽例藥也

○治暑之劑

局方五苓散治霍亂頭痛吐下煩渴濕門

嚴氏水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調口乾煩渴

黃丹一兩
分炒

巴豆二十五箇
去皮心

右同研勻用黃蠟作汁爲丸如梧子大每服五丸以水浸少頃別以新汲水吞下

按此却劑也

加味香薷飲治伏暑吐利不止煩悶多渴

本方加檳榔 黃連

右咬咀每服五錢水酒各半煎服

冷香飲子。治伏暑吐利煩燥。

草果仁

三兩

附子

橘紅

各一兩

甘草

半兩

右咬咀每服一兩入姜煎水旋冷服

按以上並太陽例藥也。有寒熱陰陽不同要在脉

證相符而行也

○溫經之劑

三因木瓜湯。治霍亂吐下。舉體轉筋。入腹則悶絕。

乾木瓜

兩

吳茱萸

半兩

茴香

炙甘草

各一錢

右㕮咀每服四五錢。入薑三片蘇葉十片煎。
按此陽明例藥也。大抵轉筋亦有所兼之證不同。
用者自宜推格。

○墜痰溫補之劑

三因胃氣丸。治憂思過度。肺脾氣閉聚結痰飲留滯。
腸胃氣鬱於陰凝之於陽。陰陽反戾。吐利交作。四肢厥冷。頭目暉眩。或復發熱。

硫黃不以多少。入猪臘內縛定頭。米泔酒童便
一碗煮乾。一半取出洗去臘。乾秤十兩

半夏洗去滑
五兩

人參

白茯苓各一
兩

石膏半
兩

右爲末。生姜汁浸炒餅爲丸。如梧子大。每五十丸。
至百丸。空心食前米湯下。

○理氣溫中之劑

三因七氣湯。治七氣發鬱。致臟氣刑尅。陰陽反戾變。
成吐利。交作寒熱。眩暈痞滿。咽塞。

半夏五錢

厚朴

桂心各三錢

茯苓

白芍藥

紫蘇

橘皮

各二錢

人參一錢

右㕮咀。每服四五錢。入薑棗煎。

訶子散。治心脾冷痛。霍亂吐利。如神。

訶子

甘草

炙

厚朴

製

乾姜

草果

陳皮

良姜

茯苓

神麴炒

麴各等分

右爲末。每服二錢。入益些小水煎服。

按以上並足陽明經藥也。

○消食之劑

三因紅丸子。治脾胃虛冷。飲食失節。宿食留飲。聚癖
腸胃。或因食不調。衝冒寒濕。忽作霍亂。吐利並作。
心腹絞痛。

蓬术

三稜各二兩同用米

胡椒一兩

青皮三兩

阿魏二錢

右爲末。化阿魏入陳米粉爲丸如梧子大。硃砂爲

衣每服百丸至二百丸。不拘時。生薑甘草湯下。

○雜方

嚴氏洗法。治霍亂轉筋。

蓼一把去兩頭。水二升煮一升。放溫熏洗。
漬法。治霍亂轉筋入腹。

益多用煎湯於槽中暖瀆之。

三因吐法。治乾霍亂。蠱毒宿食不消。積冷心腹煩滿。
鬼氣極鹹。益湯三升。熱飲一升。刺口令吐。宿食便
盡。不吐更服。吐訖復飲三升。乃止。此法大勝諸治。

俗人以爲田舍淺近鄙。而不用守死而已。凡有此
證。即先用之。元戎云。吐定用理中湯。

灸法治霍亂已死。腹中有暖氣者。

鹽內臍中。灸二十七壯。

玉機微義卷之四十七

厥門

○內經論厥證所因

論曰。陽氣衰於下。則爲寒厥。陰氣衰於下。則爲熱厥。人質壯以秋冬奪於所用。下氣上爭不能復。精氣溢下。邪氣因從之而上也。氣因於中。由陽氣衰不能滲營其經絡。陽氣日損。陰氣獨在。故手足爲之寒厥也。陰氣衰於下。則爲熱厥。由醉飽入房。內亡精氣。中虛熱入腎氣。日衰。陽盛陰虛。故手足爲之熱也。陰氣盛於上。則下虛。下虛則腹脹滿。腹滿則下氣重。而邪氣逆。逆則陽氣亂。陽氣亂則令人暴不知人。或至半日。

遠一日乃知人也。名曰尸厥。

按本論叙六經厥狀與六經厥逆甚詳。宜玩本文大抵六經之厥。陽證至爲駢仆。爲癲疾。爲妄見。陰證至爲腹脹。大小便不利。或嘔或心痛之類皆素多痰氣。因虛所乘之爲病也。惟有輕重之殊爾。如成無巳註傷寒論云。厥者手足冷也。四逆者。四肢不溫也。邪在三陽。則手足必熱傳到三陰。則手足厥冷。厥者逆也。而有陰陽之殊。熱極而成厥逆者。陽極似陰也。寒極而成厥逆者。獨陰無陽也。

○論卒厥脉法

脈經曰。脉至如喘。名曰氣厥。氣厥者不知與人言。

金匱方論曰。寸脉沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實爲入腑即愈。此爲卒厥。

按腑者爲傳道出內之所。其氣通。故入腑即愈也。

○論諸厥證寒熱不同

ナラカラ

陳無擇曰。經論粗分六經。殊不出寒熱二證。所因欲求備治。當歷明之。寒厥則因多慾而奪其精。故致陽衰。陰盛。熱厥則因醉飽入房。精虛。則熱入。故致陰虛陽盛。攷其厥因。多以不勝乘其所勝。氣不得行。遂致厥逆。如心移熱於腎。則火乘于水。火旣不行。乃成寒厥。如心移熱於腎。則火乘于水。火旣不行。乃成熱厥。

六經皆然。可次第論也。尸厥亦然。正由臟氣相刑。或與外邪相忤。則氣遏不行。閉於經絡。諸脈匿伏。昏不知人。唯當隨其臟氣而通之。寒則熱。熱則寒。閉則通。經中以數醉爲熱厥之因。學者不可拘此。蓋傷寒溫病。皆有熱厥。仲景所謂熱深厥深。經意以酒能發百脉。熱故舉此以爲例耳。寒厥者。初得之。四肢冷。脉沉微而不數。多惡寒。引衣自覆。下利清穀。外證多惺惺。熱厥者。初得之。必發熱頭疼。脉雖沉伏。按之必數。其人或畏熱喜冷。揚手掉足。煩燥不眠。大小便秘。赤外證多昏冒。傷寒亦然。

謹按寒熱發厥。固宜隨其陰陽勝負爲治。如其厥

逆者。不外乎傷寒、寒熱二證。求陰陽厥逆之淺深。
厥卒厥。又非以上寒熱積熱發厥。至若陰陽竭閉。尸
其臘。何治例殊未少具爾。

○論寒熱厥證宜吐下

子和曰。厥之爲病。手足至膝下。或寒或熱也。熱厥爲
手足熱。寒厥爲手足寒也。陽經起于足指之表。陰經
起于足心之下。陽氣盛。則足下熱。陰氣盛。則足下寒。
熱厥者。寒在上也。寒厥者。熱在上也。寒在上者。以溫
劑補肺金。熱在上者。以涼劑清心火。則愈矣。若尸厥
瘡厥氣厥酒厥。可一涌而醒。次服降火。益水和血通

氣之藥使粥食調養無不瘥者若其餘諸厥倣此行
之

謹按厥證寒熱亦有陰陽虛實不同如形氣稍實
者宜從子和之法吐下之虛甚者惟宜隨其所因
而調理之可也陳氏論臟氣相刑或與外邪相忤
氣遏不行閉經絡脉伏昏不知人至爲尸厥今世
俗多作風治鮮不致斃如傳引華陀治虢太子尸
厥爲陽脉下墜陰脉上爭會氣閉而不通上有絕
陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已發脉亂
故形靜如死狀此與經言陰陽之氣盛衰爲厥之
旨甚微後人安能得證治之彷彿乎而以陰陽證

人可驗者較之。若傷寒手足厥逆。昏不知人邪
正已極。溫下之間。稍或遲緩。禱不旋踵。或汗不解
暴効。不知人而厥。或雜病得吐衄血而厥不知人。
者。或二日。或三日。必間。間則爲愈矣。蓋陰氣尚實。
必身不熱。熱則不厥。厥則爲血溫。身熱主死矣。暴
氣厥而形實者。七情所致。痰飲內鬱而厥。必半日。
或一二時。必間。形虛而氣逆甚者。多致不救。此又
可見氣血爲厥。陰陽暴逆之甚也。故不可斷作風

治

厥證治法

○通關竅之劑

蘇合香丸。治卒暴厥不知人。未辨風痰氣厥。宜與此

膏化濃湯灌之。惺後却議脉證用藥。

○吐劑

瓜蒂散

方見葵
飲門

口噤者或先用搐鼻藥

○升發之劑

三因追魂湯。治卒厥暴死。及主客忤鬼擊飛尸氣絕

不覺口噤

即黃
湯

麻黃湯

方見
寒門

右咬咀水煎嚥之不下者。分病人髮左右捉搦。按肩引之令服取効。千金方加桂。

按此治感中邪氣之劑也。

○治寒之劑

四逆湯。治寒厥表熱裏寒下利清穀。食入則吐。脈沉。

伏手足冷

方見寒門


按此治寒熱之劑並出寒暑例。然內因氣血之劑詳見各門。宜對證選用。茲不詳錄。

○治熱之劑

白虎湯。治熱厥腹滿。身重難以轉側。面垢譫語遺溺。

手足厥冷自汗脉沉滑

方見暑門



王機微義卷之四十八

痺證門

○內經叙痺

經曰。風寒濕三氣雜至合而爲痺。其風氣勝者爲行
痺。寒氣勝者爲痛痺。濕氣勝者爲著痺。以冬遇此爲
骨痺。以春遇此爲筋痺。以夏遇此爲脉痺。以至陰遇
此爲肌痺。以秋遇此爲皮痺。

按本論備五臟等痺甚詳。宜玩本文。

○脈法

脈經曰。脈澀而緊。痺病

○論痺證所因不同

陳無擇云雖三氣合痺其用不同。三氣襲人經絡。入於筋脉皮肉肌骨。久而不已。則入五臟。煩滿喘而嘔者是痺客於肺。煩心上氣嗌乾。恐噫厥脹滿者。是痺客於心。多飲數小便。小腹痛如懷姪。夜卧則驚者。是痺客于肝。善服尻以代踵。脊以代頭者。是痺客於腎。四肢懈墮。發欬嘔沫。上爲大寒者。是痺客於脾。又有腸痺。胞痺。及六腑各有俞。風寒濕所中。治之隨其腑俞。以施針灸之法。仍服逐三氣發散等藥。則病自愈。大抵痺之爲病。寒多則痛。風多則行。濕多則著。在骨則重而不舉。在皮則寒。逢寒則急。逢熱則縱。又有血痺。

以類相從外有支飲作痺

謹按痺之爲證。有筋攣不伸肌肉不仁者。與風證絕相似。故世俗多類於風痺。痺證通治。此千古之弊也。徐先生已於卷首分出痺證一門。大抵固當分其所因。風則陽受之。痺感風寒三之氣則陰受之。爲病多重痛沉著。患者易得難去。如錢仲陽爲宋之一代明醫。自患周痺。止能移於手足。爲之偏廢。不能盡去。可見其爲難治也。况今世俗多類於風證通治。宜乎不能得其病情也。

○論痺因虛所致

嚴氏曰。痺證因體虛腠理空踈受之而成。逢寒則急

逢熱則縱隨所受邪氣而生證也。診其脈大而濇爲
痺。脈來急亦爲痺。脈濇而緊者亦爲痺。又有風血痺。
陰邪入於血經故也。

謹按人感三氣爲痺者。正因形虛血虛爾。但有在
肌皮血脉淺深之異。故入臟者死。雖陳氏具絕論
頗詳。而其方未能以盡其變。學者自宜擴充

痺證治法

○溫經勝濕之劑

三因附子湯治風寒濕痺。骨節疼痛。皮膚不仁。肌肉
重著。四肢緩縱。

附子 生

白芍藥

桂心

甘草

白芍苓

人參各三兩

白朮一兩

乾姜兩

右咬咀。每服四錢。水煎服。

按此太陽例藥。溫中解表之劑。

○踈風養血之劑

三因黃芪五物湯。治人骨弱肌重。因疲勞汗出。卧不
能動搖。加以微風。遂作血痺。脉當陰陽俱微。尺中
少緊。身體如風痺狀。

黃芪

白芍藥

桂心

等分

右咬咀。每服四五錢。入薑棗煎服。

嚴氏蠲痺湯。治身體煩疼。項背拘急。或痛或重。舉動
艱難。手足冷痺。腰腿沉重。筋脈無力。

當歸

白芍藥

黃芪

片子薑黃

羌活

各一兩半

甘草

炙半兩

右咬咀。每服四五錢。入姜棗煎服。

黃芪酒。治風濕痺。身體頑麻。皮膚癩痒。筋脉攣急。言

語蹇澁。手足不遂。時覺不仁。

黃芪

防風

桂

天麻

草薢

石斛

虎骨

灸

白芍藥

當歸

雲母粉

白朮

茵芋葉

木香

仙靈脾

甘草

川續斷各等分

右剉如麻豆大以生絹袋盛好酒一斗浸之春五
夏三秋七冬十日每服一盞溫服之不拘時

防風湯治血痺皮膚不仁

防風二兩

川獨活

川當歸

赤茯苓

秦艽

赤芍藥

黃芩各一兩

桂心

杏仁

甘草炙各半兩

右㕮咀每四五錢入薑煎服

獨活寄生湯治肝腎虛弱感風濕致痺。兩腫緩縱痺

弱不仁方見肺氣門

謹按已上方多太陽例藥也大抵痺證有兼風兼

濕寒熱獨勝。腑臟所受不同。用者自宜擴充。然此證因虛而感。既著體不去。須製對證藥。日夜飲之。雖留連不愈。能守病禁。不去。須製對證藥。日夜飲之。錢仲陽取茯苓其大逾斗者。以法啜之。閱月乃盡。由此雖偏廢。而氣骨堅悍。如無疾者。壽八十二而終。惜乎其方無傳。

○治癰飲之劑

茯苓湯。治支飲手足麻痺多唾。眩冒。

半夏

赤茯苓

橘紅

各一兩

枳實

桔梗

甘草

各半兩

右㕮咀。每服四五錢。入姜七片。水煎服。

按此言支飲能爲痺證。即飲能爲脚氣證是也。大抵因虛而傳注邪客日久。榮衛壅鬱。多致濕熱。經綏不能自收持。如逢熱則縱也。已上方未能盡其例。用者自宜通變也。

玉機微義卷之四十九

婦人門

○論經閉不行

內經陰陽別論云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月其傳爲風消爲息者死不治。東垣曰婦人脾胃久虛。或形羸氣血俱衰。而致經水斷絕不行。或病中消胃熱善食漸瘦。津液不生。夫經者血脉津液所化津液既絕爲熱所燼肌肉消瘦時見渴燥血海枯竭。病名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱補益氣血。自行矣。此證或經適行而有子。子不安爲胎病者有矣。或心包脉洪數燥作時見大便秘澀。小便雖清不

利而經水閉絕不行此乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣內經所謂小腸移熱於大腸爲癥瘕爲沉月澁不利則月事沉滯而不利故云爲癥瘕爲沉也或因勞心心火上行月事不來安心補血瀉火經自行矣故內經云月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下故月事不來也曾治驗裴澤之夫人病寒熱而月事不至者數年矣已加喘嗽醫者率以蛤蚧桂附等投之日不然夫人病陰爲陽所搏溫劑太過故無益而反害投以涼血和血之藥則經行矣已而果然

要略曰婦人之病因虛積冷結氣爲證經水斷絕至

有歷牛血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎
唾久成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇
疼痛與臍相連或結熱中痛在關元脉數無常經候
不勻令陰掣痛少腹惡寒或引腰脊下根氣衝云云

謹按良方言婦人月水不通由勞傷血氣致令體
虛受風寒邪氣客於胞內損衛任之脉并手太陽
少陰二經致胞絡內血絕不通如以上病機皆略
之不議且血病經閉又豈止手太陽少陰二經耶
然亦有不因寒熱或痰飲積聚疝瘕所致如七情
所動其爲氣病血從一也况陰道常虛不足者實
多宜覩血證門血屬陰難成易虧論及後丹溪先

生等說

○論經水不調或紫或黑

丹溪曰。經水者陰血也。陰必從陽。故其色紅。稟火色也。血爲氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣凝則凝。氣滯則滯。氣清則清。氣濁則濁。上應於月。其行有常名之曰經。爲氣之配。因氣而行。成塊者氣之凝也。將行而痛者氣之滯也。來後作痛者氣血俱虛也。色淡者亦虛也。而有水混之也。錯經妄行者氣之亂也。紫者氣之熱也。黑者熱之甚也。今人但見其紫者。黑者。作痛者。成塊者。率指爲風冷乘之而行溫熱之劑。禱不旋踵矣。良由病源論月水之病皆

曰風冷乘之。宜其相習而成俗也。或曰黑者北方水之色也。紫者黑之漸也。非冷而何。予曰經云。亢則害承。乃制熱甚者必兼水化。所以熱則紫甚。則黑也。况婦人性執而鄙。嗜欲加倍。臟腑厥陽之火。無日不起。非熱而何。若曰風冷必湏外得。設或有之。吾恐十百而一二也。

按此論經病甚詳。大抵不得率指爲風冷所乘者。此由良方所言。世俗往往因之。悞人故戒慎之也。然冷證外邪初感入經。必痛。或不痛者。久則鬱而變熱矣。且寒則癥。旣行而紫黑。故非寒也。

○論經漏不止

內經陰陽別論云。陰虛陽搏謂之崩東垣曰。婦人脾胃虛損。致命門脈沉細而數疾。或沉弦而洪大有力。寸關脉亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相火相合。濕熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脉必弦細。寒作於中。中有赤帶者。其脉洪數。疾熱明矣。必腰痛或臍下痛。臨經欲行。先見寒熱。往來兩脇急縮。兼脾胃證出見。或四肢困熱。心煩不得眠。卧心下懸。宜大補脾胃而升舉血氣。可一服而愈。或人故貴脫勢。人事蹣少。或先富後貧。心氣不足。其火大熾。旺於血脉之中。又致脾胃飲食失節。火乘其中。形質肌肉容顏似不病者。此心病者。不行於診。

故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳爲脉痿此之謂也

良方論曰婦人崩中由臟腑傷損衝任血氣俱虛故也衝任爲經脈之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調適若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然

暴下或由陰陽相搏爲熱所乘。攻傷衝任血得熱則流散甚者至於昏悶其脉數疾小爲順大甚者逆按此備言經脈致病之因本於臟腑傷損合前東垣所論極言因熱因虛或悲哀七情等所致病機殆無餘蘊矣

○脉法

脉經曰。尺脉滑血氣實婦人經脈不利○少陰脉弱而微微則少血少陰脉滑而數者陰中則生瘡○寸口脉浮而弱浮則爲虛弱則無血○脉來至狀如琴弦若少腹痛主月水不利孔竅生瘡○肝脉沉主月水不利腰腹痛○尺脉來而斷絕者月水不利○寸

關調如故而尺脉絕不至者。月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也。○經不通繞脅寒疝痛其脉沉緊此由寒氣客於血室血凝不行結積血爲氣所衝新血與故血相搏故痛。○漏血下赤白脉遲者脉小虛滑者生急疾者大緊實數者死。○暴崩下血寸口脉微遲尺脉微弦微遲爲寒在上焦但吐爾今尺寸脉微弦如此即小腹痛引腰脊痛者必下血也。○寸口弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏脉則爲革婦人則半產漏下。○尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自下赤。○漏下赤白日下血數斗脉急疾者死遲者生。○尺寸脉虛者漏

血漏血脉浮不可治也

○論赤白帶下

機要云。赤者熱入小腸。白者熱入大腸。其本實熱。究結于脉不散。故爲赤白帶下也。冤屈也。結也。屈滯而病熱不散。先以十棗湯下之後。服苦棟丸。大玄胡散。調下之。熱去濕除。病自除也。

按此正是論有餘之證也。論見下

良方論云。帶下起於風氣寒熱之所傷。或產後早起不避風邪。風邪之氣入於胞門。或中經脈。流轉臟腑而發下血。名爲帶下。若傷足厥陰肝之經。其色青如泥。傷手少陰心之經。其色赤如紅津。傷手太陰肺之

經。其色白形如涕。傷足太陰脾之經。則其色黃如爛瓜。傷足少陰腎之經。則色黑如衃血。此其因也。

按此言風氣寒熱之所傷諸臘致證似言外邪。大抵此證多有本於陰虛陽竭。榮氣不升。經脉凝泣。衛氣下陷。精氣累滯於下焦奇經之分。蘊積而成其病。或醉飽房勞。服食燥劑所致也。白物如涕之狀。故言帶者亦病形也。經云帶脈爲病而得名。而白者屬氣赤屬血。東垣舉脈訣云。崩中日久爲白帶。漏下多時骨木枯。言崩中者始病血崩。久則血少復亡其陽。故白滑之物下流不止。此可見未得全拘於帶脉矣。詳病亦有濕痰流注於下焦。或腎

肝陰滯之濕勝。或因驚恐。而木乘土位。濁液下流。
或思慕爲筋痿。內經所謂二陽之證發心脾。是也。
或餘經濕熱。屈滯於少腹。小腹之下。而病本殊。則
皆爲氣血虛損。榮衛之精氣累滯而成。其病標一
也。前人立論。殆盡病機。則治法無定。若戴人以帶
下得。兩手脉俱滑大而有力。乃上用宣去痰飲。下
以導水丸泄濕熱。繼以淡劑滲之。此爲瀉實也。如
其詣脉微細。或沉緊而澀。按之空虛。或洪大而澀。
按之無力。正爲元氣不足。陰虛筋痿。虛極中寒等
證。東垣有補陽調經固真等例。乃兼責虛也。丹溪
先生治因濕痰下注。用海石南星椿根皮之類較

之前人下之而復吐以提其氣或發中兼補補中
兼利燥中兼升發潤中益氣溫而兼收澁之例不
同。蓋病機有輕重淺深之異爾。

○論師尼寡婦異乎妻妾之治

寶鑑曰。宋褚澄療師尼寡婦別製方。蓋有爲也。此二
種寡居。獨陰無陽。慾心萌而多不遂。是以陰陽交爭。
乍寒乍熱。全類溫瘡久則爲勞。史記倉公傳載濟北
王侍人韓女病腰背痛寒熱。衆醫多以爲寒熱。倉公
曰。病得之欲男子不可得也。何以知。診得其脉。肝脉
弦出寸口。是以知之。蓋男子以精爲主。婦人以血爲
主。男子精盛以思室。女人血盛以懷胎也。如厥陰脉

亥出寸口。又上魚際。則陰盛可知。故知褚氏之言有
謂矣。

○論胎產諸證

病機機要云。治胎產之病。從厥陰經論之。無犯胃氣。
及上二焦。爲之三禁。不可汗。不可下。不可利小便。發
汗者同傷寒下早之證。利太便則脈數而已。動於脾。
利小便則內亡津液。胃中枯燥。製藥之法。能不犯三
禁。則榮衛自和。而寒熱止矣。如發渴而白虎氣弱。則
黃芪血刺痛而用當歸。腹中痛而加之芍藥。大抵產
病天行。從增損柴胡雜證。從增損四物。宜詳察脉證
而用之。

謹按已上云胎產禁例。大抵主於原氣本病爲要。
至於病體所因不同。學者又必當處於權變也。且
胎前之證。良方悉具。但每證治例殊少。如胎漏。胎
痛。子煩。子腫等證。出方皆是治本病之例。設所因
不同。或有所兼之證。如胎漏下血。亦有氣虛血熱。
腹痛亦有濕熱者。或形志苦樂不一。七情所動。氣
動血病。胎氣即損。雖治例未能以盡其變。然欲學
者臨證。自推充而行之爾。今於諸證。未能一一悉
具。聊以證治數例。附于後云。

○胎自墮論

丹溪曰。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛乏。不足榮養。其

胎則墮。譬言如枝枯則果落。藤痿則花墜。又有勞恐傷情。內火便動。亦能墮胎。譬如風撼其木。人折其枝也。火能消物。造化自然。病源乃謂風冷傷於子臟而墮此。未得病情者也。予見賈氏婦。但有孕至三箇月。左右必墮。診其脉。左手大而無力。重則濇。知其血少也。以其壯年。只補中氣。使血自榮。時正初夏。教以濃煎白木湯。下黃芩末一錢。與數十貼。得保全而生。因而思之。墮於內熱而虛者。於理爲多。曰熱曰虛。蓋孕至三月。正屬相火。所以易墮。不然何以黃芩。熟艾。阿膠等。爲安胎妙藥耶。

○難產論

丹溪曰。世之難產者。往往見於鬱悶安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤者鮮有之。古方止有瘦胎飲一論。而其方爲湖陽公主作也。恐非至到之言。蓋用之者其難自若。予族妹苦於難產。遇胎則觸而去之。予甚憫焉。視其形肥而勤於女工。知其氣虛。久坐氣不運而愈若見在胞胎。因母氣虛不能自運耳。當補其母之氣。則兒健易產。令其有孕至五六月來告。遂於大全良方紫蘇飲加補氣藥。與之數十貼。因得男甚快。因以此方隨母之性稟。與時令加減。服者無不應用。臨蓐時腹不覺痛。產母亦無病。因名方曰達生散云。

○論局方胎產用藥之誤

丹溪曰。或問婦人一門。無非經候胎產。用藥溫熱。於理頗通。吾子其妄言乎。予曰。婦人以血爲主。血屬陰。易於虧久。非善於調攝者。不能保全也。餘方是否。若神仙聚寶丹。則有不能忘言者。其方治血海虛寒。虛熱盜汗。理宜補養。琥珀之燥。麝香之散。可以用乎。面色痿黃。肢體浮腫。理宜導濕。乳香沒藥。自可治血。可以用乎。胎前產後。虛實不同。遂敗養新。攻補難並。積塊堅癥。赤白崩漏。宜於彼者。必妨於此。而欲以一方通治乎。世人以其品貴名雅。又喜其常服。可以安神去邪。令人有子。殊不知積溫成熟。香竈散氣。服者無不被禍。自非五臟能言。醫者終不知覺。及至變生他

證。悖理。肉汁發陰經之火。易成內傷之病。先哲具有
訓戒。胡以羊雞濃汁作糜。而又常服。當歸丸。當歸建
中湯。四順理中丸。雖是滋補。悉犯桂附乾姜僭熱之
劑。臟腑無寒。何處消受。若夫兒之初生。母腹頓寬。便
啖雞子。且喫火薑。不思雞子難化。火薑發熱。展轉爲
病。醫者不識。委指他病。率爾用藥。寧不誤人乎。每見
產婦之無疾者。必教以却去黑神散。與夫雞子火薑。
諸般肉食。且與白粥。將理。間以些小石首。鰐魚。令甘
淡食之。至半月以後。與少肉。雖雞子亦須豁開煮之。
大能養胃。却痰。彼當富貴之家。驕恣之婦。率有白帶
頭風。氣痛。膈滿痰逆。口乾經事。不調髮脫。體熱。皆是

陽勝陰虛之病。天生血氣本自和平。日勝日虛。又焉知此等繆妄有以啓之耶。

○論婦人服熱劑求子之誤

丹溪曰。無子之因多起於父氣之不足。豈可獨歸罪於母血之虛寒。况母之血病奚止虛與寒而已哉。然古方治婦人無子。惟秦桂丸一方。其性熱。其辭確。今之欲得子者。率皆服之。無疑矣。夫求子於陰血。何至輕用熱劑耶。或曰。春氣溫和則物生。冬氣寒凜則物消。不假熱劑。何由子臟得暖而成胎乎。曰。詩言婦人和平。則樂有子。和則氣血不爭。平則陰陽不乖。今得此亢。經血必轉紫黑。漸成衰少。或先或後。始則飲食聚。

進久則口苦舌乾。陰陽不平。血氣不和。焉能成胎。縱使有成。子亦多病。以其能損真陰也。鄭憲史子生七

箇月得淋

云云見淋閥門

謹按婦人無子。多因經血不調。或陰虛血少。積聚痰氣嗜慾等致種種不同。奚已虛與寒而已。然經寒者亦有之。但不可例爲常法爾。是以先生論此戒後人不得病機之的者。斯藥勿妄行也。况無子之因。亦豈止於婦室者。如東垣云。李和叔問中年以來得一子。至一歲之後。身生紅絲瘤。不救。後三四子。至一二歲。皆病瘤而死。何緣至此疾。翌日思之。謂曰。汝乃腎中伏火。精氣中多有紅絲。以氣相

傳生子。故有此疾俗名胎癆是也。汝試視之。果如其言。遂以滋腎丸數服。以潤腎中火邪。補真陰不足。忌酒辛熱之物。其妻與六味地黃丸。以養陰血。受胎五月之後。以黃芩白朮二味作散。啖五七服。後生子。至三歲前。證不復作。今已年壯。憲合觀先生已上所論。則其旨深矣。

婦人治法

○調經之劑

局方四物湯。治衝任虛損。月水不調。脅腹疼痛。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃各等分

右㕮咀。每半兩水煎服。

按此手足太陰厥陰藥也

逍遙散。治血虛煩熱。月水不調。脅腹脹痛。痰嗽潮熱。

甘草炙半兩

當歸

茯苓

白芍藥

白术

柴胡各一兩

右㕮咀。每半兩。入姜薄荷葉煎服。

按此足三陽三陰藥也。散血中濕熱之劑。

膠艾湯。治勞傷血氣。衝任虛損。月水過多。淋瀝不斷。

阿膠炒

川芎

甘草炙各二兩

當歸

艾葉炒各三兩

熟地黃

白芍藥各四兩

右㕮咀。每半兩水煎。

按此溫經補血之藥也。厥陰例。

良方溫經湯。治婦人血海虛寒。月水不利。

當歸

川芎

赤芍藥

桂心

牡丹皮

莪朶各半

人參

甘草

牛膝各一兩

右㕮咀。每五錢水煎服。

薑黃散。治血臘久冷。月水不調。膚腹刺痛。

當歸

牡丹皮

延胡各二兩

赤芍藥三兩

川芎

紅花

桂心

莪朶各一兩

川薑黃四兩

右爲末。每一錢水煎服。酒同煎亦可。

按此二方通經之劑。破血之藥。非止於溫經也。臘

冷氣血滯者可用。姑存之

加減四物湯

經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱。脉微數。本方去地黃川芎。加澤蘭葉三倍甘草半分

經候過多。本方去熟地黃。加生地黃

經行身熱。脈數頭昏。本方加柴胡黃芩各半兩

經行微少或脹或疼四肢疼痛。加延胡沒藥白芷

與本方等淡醋湯調下末子

經候不調心腹疼痛。只用芎歸二味名君臣散

鹿茸丸治衝任虛損。又爲風寒所乘尺脉微小甚者

可灸關元穴

鹿茸
灸

赤石脂

禹餘糧
各一兩

續斷

柏葉
各二兩

附子
炮一兩

熟地黃

當歸
酒浸

艾葉
各二兩

右爲末。酒糊丸。梧子大。每五十丸。空心溫酒下。
按此足少陰厥陰藥也。今人多用之。故收入治血。
虛濕勝帶下甚捷。

元戎加味四物湯

氣充經脉。故月事頻併。脣下多痛。本方加芍藥。
經欲行。膝腹絞痛。本方加玄胡。檳榔。苦棟木。香
經木過多。本方加黃芩。白朮。

經水澁少。本方加葵花。紅花。

經水適來適斷。或有往來寒熱。宜先服小柴胡去。

寒熱後以四物湯和之

丹溪加味四物湯

經候過而作疼。血氣俱虛也。宜本方對四君子湯
服之

經候將來作痛者。血實也。本方加桃仁。黃連。香附。
經水不及期。血熱也。本方加黃連。

過期。血少也。本方加參术。帶疼加半夏陳皮。

過期紫黑有塊者。血熱也。必作痛。本方加香附黃

連

過期而淡色者。癰多也。芎歸二味合二陳湯服。

紫色成塊者。熱也。本方加黃連柴胡。

肥人不及日數而多瘳者。多血虛有熱。本方加香

附南星半夏黃連白朮

瘦人血枯經閉者。本方加桃仁紅花。或越鞠丸

方見

門血

簡易當歸散。治經候不勺。或三四月不行。或一月至。或婦人天癸過期。經脈不調。

當歸

川芎

白芍藥

黃芩

白朮各半兩

山茱萸肉一兩半

右爲末。每二錢空心溫酒調下。日三次。

按此足厥陰少陰藥也。

寶鑑生地黃丸。治婦人血實，厥陰脈弦而長，病惡風體倦，乍寒乍熱，面赤心忪，或時自汗如傷寒狀。

服抑陰藥

生地黃

二兩

柴胡

秦艽

黃芩

各半兩

芍藥

一兩

右末蜜丸梧子大。每三十九。烏梅湯吞下。日三次。
按此手足少陰大陰足少陽藥也。

謹按以上諸方皆調理法也。然血分成木氣陽禪等證。詳見各門。茲不備錄。大抵經病實者攻之。虛者散之。虛者補之。要在適事爲故也。

○理氣之劑

澹寮煮附丸。治經候不調。血氣刺痛。腹脹脹脹。頭暉
惡心。崩漏帶下。並宜服之。

香附子

擦去皮。不以多少。米醋浸一
日。用瓦鉢煮令醋盡。

右醋糊爲丸。梧子大。日乾。每五十丸。淡醋湯下。

一方香附一斤。艾葉四兩。當歸二兩。製同。名艾君丸。

嚴氏抑氣散。治婦人氣盛於血。變生諸證。頭暉脹脹。

香附

四兩

芥神

甘草

炙各一兩

陳皮

二兩

右爲末。每二錢。食前沸湯調下。

按此方主於氣。煮附丸則氣中之血藥也。然氣鬱甚者。宜於氣證門選用。不必拘此。

東垣益胃升陽湯。治婦人經候不調。或血脫後脉弱。

食少水泄日三二行

黃芪

二錢

人參

甘草

炙

當歸身

陳皮

各一錢

白术

三錢

升麻

柴胡

各一錢

炒麵

半錢

黃芩

半錢秋去之

右㕮咀。每半兩水煎。腹痛加芍藥。

補中益氣湯治婦人室女經候不調。脉微食少體倦

或熱

方見熟門

按此二方氣血之藥。血脫益氣之大法也。

母氣正氣天香湯。治婦人一切氣。氣上湊心心曾攻

無語。動轉。漏月水不調。

二
長
壽
多

八
香附子

八錢

陳皮

金匱要略

乾姜半錢

半錢

桂心一十八錢水煎服

卷之二十一
七情六鬱
人無病多有因於七情六鬱致者故集已
以宣之義大抵氣行不失其常則經血亦行

良方通經丸治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成
血瘕

川椒炒

蓬术

乾漆炒

當歸一錢半

肓皮

乾姜

大黃

桃仁炒

川烏

桂心各一

錢

右爲末。將一半用米醋熬成膏。和餘藥成劑。日中
杵之。丸如梧子大。陰乾每三五十丸。醋湯下。

嚴氏方無川馬有紅花

加味四物湯嚴氏名合湯治婦室經事不行。腹中結塊。疼

痛腰痛

本方加桂蓬末

等分

右㕮咀每四錢水煎服

紅花當歸散。治婦人血臟虛竭。或積瘀血。經候不行。
時作腹痛。腰胯重疼。小腹堅硬。及室女經不通。

紅花

當歸尾

紫葳

牛膝

甘草

蘇木

剉各三兩

白芷

桂心

各一兩半

赤芍藥九 劉寄奴五

石爲細末。空心熱酒調三錢。一名凌霄花散。
桂枝桃仁湯。治經不通。繞臍寒痛。其脉沉緊。此由
寒客於血室。血凝不行。

桂枝

赤芍藥

生地黃各二兩

桃仁

五十箇

甘草一

右爲粗末。每服五錢。水煎入薑棗。

地黃通經丸。治經不行。結積成塊。臍下如覆杯。

熟地黃三兩

童蟲足炒去頭

水蛭炒糯米

桃仁各十五箇

右爲細末。煉蜜丸如梧子大。空心溫酒下五丸。未

知加至七丸

嚴氏琥珀散。治婦人室女月事凝滯。腹脇脹痛。及血逆攻心。眩暈不省人事。

劉寄奴

牡丹皮

熟地黃

玄胡索

烏藥

赤芍藥

莪朶

三棱

當歸

桂各一兩

右用前五味用烏豆一升。生姜半斤切片。米醋四升同煮。豆爛爲度。焙乾入後五味。同爲細末。每服二錢。用溫酒調服。空心食前。

戴人玉燭散。治經候不通。腹脹或痛。

四物湯對調胃承氣湯

右㕮咀煎服

按以上諸方。並出厥陰例藥也。然有本於氣血。蓋血虛痰積等內不同。宜於前調經理氣諸方內選用。

○治崩漏之劑

生地黃散。治經漏下血。脈虛洪經水紫黑。方見血證門

簡易黃芩湯。治崩中下血。陽乘陰經水沸溢。

黃芩不以多少

右爲末。每一二錢燒剝。鉗淬酒調下。

按此二方治熱之劑也。

一法用此味。治天癸當任。每月却行。或過多不止。

出瑞竹堂方名芩心丸

伏龍肝散治氣血勞傷衝任經虛血非時崩下。臍腹
冷痛脉遲弱食少或赤白帶下

伏龍肝

赤石脂

麥門冬各一

甘草免半兩

川芎三兩

當歸

乾姜七錢半

桂半兩

文葉三兩

熟地黃二兩

右件為粗末。每四錢入棗煎
接此名羹。効藜補血固虛之劑也。

金玉丸子血崩不止

香附子

四兩

當歸尾一兩

二錢

五靈脂一兩

炒

右每末五錢。淡醋湯調空心食前服。一方只用

香樹一味

生薑茶補心湯。治婦人亡血過多或氣逆心悶。

四物湯

一分

參蘇飲

三分

右四味入量煎

據以上方理氣補榮之劑也

良方縮砂散治血崩

新羅砂不以多少。瓦上炒香爲細末。米飲調下。

三錢

王蠶膠散治血崩不止。

靈脂十兩水煎去滓澄清。每煎成膏。入神麯二

兩和丸如梧子大。每三二十丸溫酒下。

荆芥散治崩中不止

用此一味。於麻油燈上燒焦爲末。每三錢童便

調下。

瑞竹堂方蒲黃散治崩中不能止

破故紙

蒲黃

千古石灰

各等分
炒過

右爲末。每二三錢。淡酒或淡醋湯調下

按已上諸方皆劫劑也

東垣升陽除濕湯治婦人女子漏下惡血。月事不調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食失節。或勞傷形體。或素有心氣不足。因飲食勞倦。致令心火乘脾。其脉緩而弦。急按之洪大。皆脾土受邪也。

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪各一
錢半

防風

甘草炙

升麻

藁本各一
錢

蔓荆子分七

獨活

當歸各半
錢

右㕮咀作一服水煎食前服

涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞

絡相火故血走而崩也

生地黃半

黃連

羌活

柴胡

防風各三

黃柏

知母

升麻

藁本

細辛

川芎各二

甘草一
錢

荆芥穗

蔓荆子

黃芩各一

當歸半
錢

紅花少許

右㕮咀作一服水煎

按已上二方升劑也。經漏不止。氣血下陷。非此不

能治

當歸芍藥湯。治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。或先因勞役。脾胃虛損。氣短氣逆。自汗不止。身熱食慶。大便或泄。體倦無力。

黃芪一錢

白朮

蒼朮

當歸身

白芍藥各一錢

熟地黃半錢

甘草炙

生地黃各三分

陳皮半錢

柴胡二分

右㕮咀作一服水煎

按此補劑也

○治帶下之劑

千金方治帶下脉數者

枸杞根一兩

生地黃五兩

右二味酒煮一升至三合作一服

按此治熱例藥也

元戎六合湯治婦人赤白帶下。脈沉微。腹痛。或陰中

痛。

四物湯四兩

桂

附子炮五錢

右㕮咀。每五錢水煎食前服

按此治寒之劑也

宣明導水丸治濕熱鬱於下焦之分。赤白帶下不止。

躁熱煩渴

方見濕門

按此治濕熱之藥下劑也

嚴氏當歸煎丸。治赤白帶下。腹內疼痛不飲食羸瘦。

當歸

赤芍藥炒

牡蠣煅

熟地黃

阿膠炒

白芍藥炒

續斷酒浸各

地榆五錢

右爲末。醋糊丸梧子大。每五十丸。空心米飲下。
按此治血虛之劑。潤燥藥也。

良方白芷散。治赤白帶下。

白芷一兩

海螵蛸二錢

胎髮一團

右爲細末。空心溫酒調下二錢。

伏龍肝散。治婦人赤白帶下。久患不瘥。肌瘦黃瘁多。

困乏力

棕櫚不以多少燒灰火
燃急以盆蓋蔭

伏龍肝

於鑄竈直下
取炒令烟盡

屋梁上塵

懸長者如無竈頭虛
空中者炒令烟盡

右三味等分研和令停入龍腦麝香各少許每服二錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安按已上方皆刲劑也

益母草散治赤白惡露下不止

益母草開花時採陰乾爲細末空心溫酒調二十

錢日三服

東垣固真丸治白帶久不止臍腹冷痛陰中亦然

白石脂一錢火
燒赤

乾姜炮四錢

黃柏酒製

白芍藥各一錢

白龍骨二錢

柴胡一錢

當歸身二錢

右除石脂龍骨別研外。同爲細末。水煮糊丸如桐子大。每十九丸。食前煎水下。

按此寒熱之劑。又止澁藥也。

桂附湯。治白帶腥臭多悲不樂大寒。

肉桂一錢

附子三錢

黃柏

知母

甘草炙

升麻各半錢

黃芪

一錢

人參

七分

右㕮咀作一服。水煎食前服。

按此補陽氣極虛用黃柏等爲引用。又升降陰陽

之藥也。

補經固真湯。治白帶下流不止。始病崩中。日久血少。
復亡其陽。故白滑之物不止也。

柴胡
甘草
郁李仁研

黃芩各一錢

乾姜二錢
橘皮半錢
人參二錢

白葵花去萼一朵

右㕮咀水煎空心服

按此補氣例藥也

衛生湯。治帶下不止。脈微弱腹痛。

白芍藥炒
當歸各二兩
黃芪三兩
甘草一兩

右㕮咀。或末。每五錢。水煎空心服。下苦棟丸三十粒。

按此補血之劑也

苦棟丸。治赤白帶下

苦棟浸碎酒

茴香炒

當歸各等分

右爲末。酒糊丸桐子大。每五十丸空心酒下。

按此謂邪入小腸故用此燥內藥也。

酒煮當歸丸。治癩疝白帶下注脚氣腰已下如在冰
雪中。以火焙乾。厚衣蓋其上。猶寒冷不任寒之極
者。面白如枯魚之象。肌肉瘦削。小便不上與白帶
常流不禁。病甚者。

當歸一兩

茴香半兩

良姜

附子各等分

炮七錢

已上四味㕮咀。以好酒一升半。煮至乾再焙乾。

炒黃芩

全蝎各三錢

丁香

苦棟

甘草炙各半錢

柴胡二錢

升麻

木香各一錢

玄胡索四錢

右與前同爲細末。酒煮糊爲丸。如梧子大。每五十丸。空心淡醋湯下。忌酒濕麵油膩物。

按此升陽勝濕之劑。氣血藥也。

升陽燥濕湯。治白帶下。陰戶痛。控心急痛。身黃皮緩。身重如山。陰中如水。

防風

良姜

乾姜

郁李仁

甘草

各一錢

柴胡

三分一錢

橘皮

黃芩

各半錢

白葵花

七錢

右㕮咀分作二服。水煎空心服。

按此升散之劑也

坐藥勝陰舟

三柰子

川烏頭

大椒各半

柴胡

羌活各二分

全蝎三

蒜七分

甘松二分

破故紙八分與蒜同煮

升麻

枯礬各二分

麝香少許

右爲細末。煉蜜丸如彈子大。綿裹留系在外。納丸藥於陰戶內。

按此刲藥也。

○灸法

氣海一穴在臍下一寸五分。主月事不調帶下崩中。

因產惡露不止。繞臍疼痛。灸五壯。

帶脉二穴。在季脇下一寸八分陷者宛中。灸七壯。
主婦人月水不調。及閉不通。赤白帶下氣轉運。背
引痛不可忍。

血海二穴。在膝腹上內廉白肉際二寸半。治女子漏
下惡血。月事不調。逆氣腹脹。灸三壯。

陰谷二穴。在膝內輔骨後大筋下小筋上。按之應手。
屬膝取之。治婦人漏血不止。腹脹滿不得息。小便
黃如蠱。膝如錐不得屈伸。小腹引痛。灸三壯。

關元一穴。在臍下三寸。主婦人帶下瘕聚。因產惡露
不止。斷產下經冷。可灸百壯。

○安胎之劑

金匱方當歸散。姪娘宜常服之。

當歸

黃芩

白芍藥

川芎各一兩

白术

半兩

右五味爲末。酒飲調服。方寸七日二次。

按此方養血清熱之劑也。瘦人血少有熱。胎動不安。數曾半產者。難產者皆宜服之。以清其源而無後患也。

子金茯苓半夏湯。治姪娘惡阻。心悶吐逆。頭眩。四肢怠惰。煩渴痰逆。嘔吐惡寒。自汗。黃瘦。

半夏泡七次

生薑五兩

茯苓

熟地黃各三兩

橘紅

細辛

人參

白芍藥

紫蘇

川芎各二兩

苦梗

甘草炙各半兩

右咬咀。每四錢水煎空心服。

局方參橘散。治妊娠三月。惡阻吐逆不食。或心虛煩

悶

橘皮

茯苓各一錢

麥門冬

白术

厚朴

製

甘草炙各半兩

右咬咀。每四錢入姜竹茹煎。一方加入參名竹茹湯。良方名人參橘皮湯。

良方膠艾湯。治妊娠或因頓仆胎動不安。腰腹疼痛。
或胎上搶心。或去血腹痛。

阿膠

一斤
粉炒蛤

艾葉

數
莖

指迷方加秦艽

右二味以水五升煮取二升分三服

阿膠散

嚴氏方作膠艾湯

不問妊娠月數深淺。或頓作。或因

毒藥胎動不安。腰痛腹滿。捨心短氣。

熟地黃

艾葉

白芍藥

川芎

黃芪

阿膠

當歸

甘草

炙各一兩

右㕮咀。每四錢入薑裹煎。金匱方無黃芪。

佛手散。治妊娠傷胎下血。

當歸

三錢

川芎

二錢

右㕮咀。水煎食前服。

安胎散。治姪娘自高墜下。或爲重物所壓。觸動胎氣。

腹痛下血。胃虛嘔逆。並宜服之。

縮砂

少以多
過

右爲末。每二錢。用酒調服。艾薑湯亦可。

簡易方。知母飲。治妊娠心脾壅熱。咽喉渴苦。煩悶多

驚。

赤茯苓

黃芩

黃芪

各三兩

知母

麥門冬

甘草

各二兩

右㕮咀。每四錢入桑白皮熟時。再入竹瀝些小服。
竹葉湯。治妊娠心驚膽怯。終日煩悶。名曰子煩。

白茯苓

四兩

防風

麥門冬

黃芩

各三兩

右㕮咀。每四錢入竹葉五片水煎。外臺方有竹瀝。

二合無葉。一方有黃芩知母

拔萃方枳殼湯治胎漏下血。或因事下血。

枳殼炒

黃芩各半兩

白朮一兩

右爲末。每一錢白湯調下。宣明方無枳殼

二黃散治胎漏下血

生地黃

熟地黃

右爲末。煎白朮枳殼湯調下一錢或錢半

按良方論云。婦人有子之後。血畜以養胎矣。豈可復能散動耶。所以然者。有娠而月信每至是亦未必因血盛也。若謂榮經有風則經血喜動。以其風勝則可。此例可見胎漏之因非止一端也。治者宜

擴充焉

地黃當歸湯治胎痛

當歸一兩

熟地黃二

右爲末每半兩水煎良方等分爲末蜜丸名內補丸。許學士云。大率婦人妊娠。唯在抑陽助陰。蓋此等藥甚多。然胎前藥。唯無群隊。若陰陽交錯。別生他病。唯是枳殼散。所以抑陽。四物湯。所以助陰。故爾。然枳殼散。差寒。若單服之。恐有胎寒腹痛之疾。以內補丸佐之。則陽不至強。陰不至弱。陰陽調停。有益胎嗣。此前人未嘗論及也。愚詳陰陽調停。不若不服爲愈。

全生方白术散治妊娠面目虛浮。肢體腫如水氣名。

曰子腫

白术一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

白茯苓皮各半兩

白术

右爲末。每服二錢米飲調下。指迷方有桑白皮無

白术

李氏天仙藤散治妊娠自三月成胎之後兩足自抑
面漸腫腿膝以來行步艱辛。以至喘悶飲食不差
狀似水氣至於脚指間有黃水出者名曰子氣

天仙藤

洗畧

香附子

炒

陳皮

甘草

烏藥各等分

右爲末。每服三錢水煎。入薑三片。木瓜三片。紫蘇三葉同煎。空心食前服。日三次。腫消止藥。

按此二方治證例相類。故併錄之。

嚴氏紫蘇飲。治胎氣不和。湊上心腹。脹滿疼痛。謂之

子懸。

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘇葉

當歸

各兩

一人參

甘草

各半兩

右咬咀。每四錢入姜葱煎。

安榮散。治妊娠小便澀少。遂成淋澀。名曰子淋。

麥門冬

通草

滑石

各三錢

當歸

燈心

甘草

各兩

人參

細辛

各二兩

右爲細末每二錢煎麥門冬湯調下

羚羊角散治姪娠中風頭項強直筋脈攣急言語蹇

躯痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角

錢一

川獨活

酸棗仁

炒

五加皮

錢各半

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

各四分

木香

甘草

各二分半

右咬咀每五錢入姜煎

八味丸治姪娠小便不通名曰轉胞亦治子淋

方見補虛門

丹溪參术飲治姪娠轉胞

四物湯加人參

白朮

半夏
製

陳皮
甘草

右㕮咀入生薑煎空心服

按丹溪曰。轉胞之病。胎婦之稟受弱者。憂悶多者。性急躁者。食味厚者。庸或有之。古方皆用滑利藥。鮮有應効。因思胞不自轉爲胎所壓展在一邊。胞系了戾不通耳。胎若舉起居於其中。胞系自疏水道自利。然胎之墜下必有其由近。吳宅筮人患此。兩脉似滯。重則弦左稍和。予曰。此得之憂患。滯爲血少氣多。則胎氣弱而不能舉。弦爲有飲。血少則胎弱。氣多有飲中焦不清而隘。則胞知所避而就。

下乃以已上藥與服。隨以指探喉中吐出藥汁候少噴氣定又與之。次早亦然至八貼安。此法恐偶中耳後又治數人亦効。未知果何如耶。

仲景云婦人本肌肥盛。頭舉目滿。今反羸瘦頭舉中空。胞系了矣。亦多致此病。但利小便則愈。宜服腎氣丸以中藥。茯苓故也。地黃爲君功在補胞。若頭舉等語。其說未詳。恐有能知之者。

按已上安娠諸法皆氣血本病之藥。故非辛熱苦寒之劑。蓋產前當清熱養血也。然有外感風寒。內傷生冷。以辛熱散之溫之。大積大聚以藥衰其太半而止。經曰婦人重身毒之何如。岐伯曰有故無

殞故無殞也。斯法亦不爲本病之謂也。故姪娘諸
證例藥詳見大全良方茲不備錄

束胎丸於第八箇月服之

黃芩沙夏一兩春秋七錢半冬半兩

白术二兩

茯苓七錢半

陳皮三兩忌火

右爲末。粥爲丸。桐子大。每三四十九空心。白湯下。
連生散臍東

大腹皮三錢

人參
陳皮各一錢半

白术

白芍藥各一錢

甘草炙二錢

紫蘇葉莖半錢

當歸尾一錢

或加枳殼縮砂

右咬咀作一服。入青葱五葉。黃楊腦七箇。煎服。於

八九箇月服十數貼甚得力。或夏加黃芩春加芍
冬依正方。或有別證以意消息

又方於第九箇月服

黃芩怯弱入減半

白朮一兩

滑石

枳殼各七錢半

右爲末粥丸如桐子大。每服三十丸。空心熱湯下。
按世俗婦室姪娘鮮有服東胎藥者。蓋局方良方
諸法未能以盡其妙用者多輒動娠。故率不敢行
然丹溪先生因製已上諸方。以備世俗取擇實好
生君子之一端也。

○滑胎易產藥

枳殼散治妊娠胎肥壅隘難產臨月服之

粉草炙一兩

商州枳殼炒二兩

右爲細末。百沸湯點二錢。空心日三服。

一方枳殼六兩甘草一兩

一方有糯米半升淘洗乾同炒爲末。溫隱居加當歸木香各等分。

易產治氣寬膈。又法張氏方。治妊娠胎肥動止難。至臨月服之縮胎。

枳殼五兩

甘草一兩半

香附子二兩炒

右爲細末。姜湯點服。

神寢丸。滑胎易產入月服之。

通明乳香半兩

枳殼一兩

右爲末。煉蜜丸梧子大。空心酒下三十九

陸氏名寤生丸。乳香只一分。

保氣散。安胎易產。或居處失宜。偶然頓仆。胎動胎痛。

漏胎下血。兼服佛手散。

香附子

四兩

山藥

二兩

縮砂

一兩

木香

四錢

粉草

一兩

益智仁

紫蘇

各半兩

右爲細末。白湯點二錢。入月服之。

益元散。入月服之。滑胎易產

方見前

○產間藥

施氏催生如意散。臨產腰疼方可服之。

人參

乳香

各一錢末

辰砂

半錢

右三味一處研。臨產急用雞清一箇調藥末。再用生姜汁調公服。如橫生倒產。即時端順而生。

催生佛手散

方見前

嚴氏無憂散。治胎肥氣逆。或人瘦血少胎弱。臨蓐難產者。便產須知名保生無憂散。

當歸

川芎

白芍藥

各一兩

枳殼

五錢

乳香

三錢

木香

一錢半

血餘灰

二錢

甘草

一錢

右爲末。每二錢水煎服。

簡易集効黑散子。催生兼治橫生逆產。

百草霜

白芷末

各等分

右和勻。每二錢童便并好醋調稀。更以沸湯調下。

局方催生丹。治產婦生理不順。產育艱難。或橫或逆。
並宜治之。

十二月兔腦髓

去皮膜研如泥

乳香

別研細五分

母丁香

二錢半

麝香

另研五分半

右三味拌勻以兔腦和丸如雞頭大陰乾油紙裹
每一丸溫水下即產兒手中握出

良方催生乳香膏

名如神開骨膏
又名乳珠丹

一法滴乳爲末用猪心血爲丸五月五日午時

合

右如桐子大硃砂爲衣每一粒面東酒吞下未下
再服如胎乾者先與四物湯

秘方益母丸。專治橫生逆產難產。并安胎順氣。神効。
益母草五月採陰乾。石臼搗爲末。煉蜜丸如彈
子大。每一丸或二丸。臨產以童便和溫酒送下。
氣不順。木香參湯送下。或作小丸吞服亦可。

獨勝散

黃葵子炒七十粒

研爛酒服。濟窘急

若也臨危難產時

免得全家俱哭泣

小品療橫生倒產。手足先出方

用粗針刺兒手足入二分許。兒得痛驚轉即縮。

自當回順而生

一法益塗兒足底。又可急搔爪之。并以益摩產

婦腹上即產

機要半夏湯治胎衣不下。或子死腹中。或子衝上而
皆悶或血暴下。及胎乾不能產者。

半夏麵

一兩半

桂

七錢半

桃仁

三十箇炒

大黃

兩半

右爲細末。先服四物湯三兩次服。此生姜同煎良方。治死胎不下。其證產母舌青黑。及胎上冷者。子已死。或指甲青舌青。脹悶甚者。口中作屎臭。先以平胃散一貼作兩服。每服酒水各一盞。同煎至一盞。却投朴硝半兩研細。再煎數沸溫服。胎化血水而下。

而下

鹿角散治因熱病胎死腹中

鹿角屑一
兩

右水煎入葱白五莖豉半合丹溪云燒過治產後
血暈

當歸湯治子死不下

川當歸三
兩

川芎二
兩

右爲末水酒各半調下四錢未下再服

一方只用川芎末酒煎服

香桂散下死胎

麝香半
錢

桂心三
錢爲末

右和勻只作一服溫酒調下

一方朴硝。末二錢溫童便調下。
必效方牛膝湯。治胎衣不出。腹脹堅脹急痛。即殺人
服此胞即爛下死胎。

牛膝

瞿麥各四兩

當歸三兩

通草六兩

滑石八兩

葵子五兩

右切細以水九升煮取三升分三服。
宣明硝砂散。治胎死腹中不下。

硝砂細研

當歸各一兩

右二味研極細。只分作二服。溫酒調下。如重車行
五里。不下再服。

局方至寶丹

方見中風門

花藥石散治胎死腹中及胎衣不下

花藥石斤一

上色硫黃四兩

右二味相拌勻煉製見損傷門

黑龍丹治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾
垂死者但灌得下無不全活

當歸 五靈脂 川芎 良薑

熟地黃

各一兩剉以砂合盛赤石脂泥封綵筋。鹽泥固濟。

炭火十斤煅令通赤去火候冷取開看成黑糟色

取細研却入後藥

百草霜五兩

硫黃

乳香各一

錢半

右五味並細研。與前藥再研如法修製。和勺以米醋煮用麵糊丸如彈子大。每服一丸。炭火燒令通赤。投於生姜自然汁。與童便入酒瀝出。控乾研細。只此酒下。

一方取死胎。用烏雞一隻去毛細切。水煎三升。湯通手用衣帛蘸摩脣下。胎自出。

○產後雜方

局方芎歸湯。治產後去血過多。暯煩不省。

當歸

芎藶各等分

右咬咀。每半兩水煎服。腹疼加桂名桂香散。一名

琥珀散治腹中痛急自汗頭眩少氣加羊肉名羊

肉湯

黑神散治產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心及腹
痛不止

黑豆炒半升

熟地黃

當歸

肉桂

乾姜

甘草

白芍藥

蒲黃各四兩

生地黃

局方良方俱無此味便產須知有之

右爲末每二錢酒童便各半調服一名烏金散

按此手少陰足厥陰太陰陽明表裏血藥也立方
大意見前丹溪之論矣今人以爲治產後百病率
用之故收入然用者自宜通變

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛則
內熱心煩短氣自汗頭痛

熟地黃 人參

當歸

桂

麥門冬

各一兩

白芍藥二兩

右㕮咀每五錢入竹葉生薑煎

當歸黃芪湯治產後失血多腰疼身熱自汗

當歸三兩

黃芪二兩

白芍藥一兩半炒

右㕮咀每五錢入姜煎

失笑散治產後心腹絞痛欲死及見枕痛

蒲黃炒

五靈脂各等分

右爲末醋調二錢熬成膏湯化服之

一法治兒枕痛各單服

經驗方三聖散治兒枕痛

當歸

桂心

玄胡索

右等分爲細末每服二錢熟酒或童便調下

嚴氏清魂散治產後血暈昏不知人更宜取漆器於
床前燒薰之頻置醋炭更服此藥

澤蘭葉

人參各一

荆芥穗四兩

甘草

炙八錢

川芎二兩

右爲末每二錢熟湯溫酒各半盞調下

抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

陳皮

人參各二錢

甘草炙一錢

右咬咀作一服。入生姜煎。

當歸羊內湯。治產後發熱。自汗肢體疼痛。名曰產勞。

當歸

人參

各七錢

黃芪

兩

生薑

半兩

右咬咀用羊肉一斤煮清汁五大盞。去肉入前藥。

煎四盞去粗。作六服。

良方。茯苓散。治產後心虛怔忡不定。言語錯亂。

人參

甘草

山藥

當歸

各一錢

生薑

遠志

茯苓

桂心

麥門冬

各半錢

大棗

五枚

右咬咀水煎。

機要增損柴胡湯治產後經水適斷感於異證手足

搘搐咬牙昏冒

柴胡

八錢

黃芩

四錢半

人參

三錢

甘草

炒五錢

石膏

各四錢

知母

三錢

黃芪

五錢

半夏

三錢

右爲粗末每半兩入姜棗煎
血風湯治產諸風癥無力

秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

白芍藥

白术

當歸

地黃

茯苓

半夏

黃芪

各分等

右爲末一半爲丸。煉蜜桐子大。一半爲散。溫酒送。

下五七十九

愈風散。治產後中風口噤。牙關緊急。手足痺瘓。如角

弓狀。

荆芥穗

各炒
爲末

右每三錢。豆淋酒調下。童便亦可。一方加當歸。
謹按產後多有血病。身強癩癰而似中風者。宜用
此藥通血脉而清神。或加當歸者爲然。非外因例
藥。也是以始錄此一法。義見後丹溪論。

獨行散。治產後血暈昏迷。

五靈脂

炒

右爲末。水酒童便調下一二錢。

當歸散治產後氣血俱虛無大補恐增客熱宜服此

去惡露

當歸

白芍藥

川芎

黃芩各一兩

白朮半兩

右爲細末溫童便調下二錢

黃芪湯治產後汗不止因陰虛而得

黃芪二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蠣煅

白茯苓

麥門冬

甘草炙各半錢

右㕮咀每半兩入棗煎

加減四物湯治產後陰虛發熱或日間明了暮則發

熱增寒

當歸

川芎

生地黃

柴胡

右等分。每四五錢水煎

瑞竹堂方。治產後血塊腹痛

京芎

炒

當歸

炒

熟地黃

白芍藥

炒各半兩

蒲黃

炒二錢半

右同爲細末。每服三錢。空心溫酒調下。

丹溪參术膏。治產後胞損成淋瀦證

人參

二錢半

白术

二錢

桃仁

陳皮

各一錢

黃芪

一錢半

茯苓

一錢

甘草

炙半錢

右㕮咀水煎猪羊胞後入藥作一服

丹溪曰。嘗見尿胞因收生者不謹。以致破損而得淋瀝證。有徐氏婦。於壯年得此。因思肌肉破傷在外者。且可補完。胞雖在腹。恐亦可治。診其脉虛甚。因悟曰。難產之人。多是氣虛。難產之後。血氣尤虛。因用峻補。以參朮膏煎。以猪羊胞極飢時與之。每劑用一兩。至一月而安。恐是氣血驟長。其胞可完。若稍遲緩。恐難成功。

嚴氏。赴痛散。治產後血滯。筋脈拘攣。腰背強直。遍身疼痛。

當歸

桂

白朮

牛膝

甘草

各三錢

黃芪

獨活

生姜

各半兩

確白二錢
半

右㕮咀。每半兩水煎。

按此手足三陰藥出太陽例。治表之劑也。然惡露不盡。絞痛不止。宜良方。芎歸湯散。治裏之劑。以大黃桃仁等藥下之。血畜經絡成血塊。宜沒藥丸。以禹蟲水蛭等藥逐之。皆變法也。茲不詳錄。故已上諸方。皆調理之劑。餘有異證。詳見大全良方。

謹按產後血滯於經。多成癰腫。或有致不救者。蓋氣血虛損逆之甚也。大抵此兼陰虛火動。凡辛溫之劑。宜慎之。矧產後用藥有三禁。我丹溪先生謂。產後如無惡阻。當大補氣血。雖有雜證。以末治之。

如中風。切不可作風治。與小續命湯必先補氣血。
然後治痰。當以左右手之脉。分其氣血多少而治。
如發熱惡寒。皆是氣血。左手脉不足。用補血藥。多
於補氣藥。右手脉不足。用補氣藥。多於補血藥。惡
寒發熱腹痛者。當去惡血。以求通變之意也。