

醫方類聚卷之二百二十三

婦人門 十八

妊娠 三

聖惠方 二

治妊娠時氣諸方



夫四時之間忽有非節之氣如春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其節而有其氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多挾於

表毒也言其時普行此氣故云時氣也妊身  
遇之重者傷胎也

治妊娠時氣至五六日不得汗口乾多喫冷  
水狂語逆食秦苧散方

秦苧 青兩 柴胡 壹兩 石膏 貳兩 赤茯苓 人

參 去蘆頭 〇婦人大全良方 前胡 去蘆 甘

草 炙微 犀角屑 葛根 〇良方 川升麻

黃芩 已上各半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分 拔粹方胎產方四片 淡竹茹壹分 拔粹方胎

產方煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠五月至十月足患時氣五六日不得  
汗口乾多喫冷水熱氣止衝喘急悶亂麥門  
冬散方

麥門冬 壹兩 石膏 兩 知母 兩 茅根 壹兩 葛

根 剉 玄參 川升麻 甘草 炙微 赤芍藥

麻黃 去根 川大黃 剉碎 子芩 人參 去蘆

赤茯苓 遠志 去心已上各半兩

右件藥搗龔羅為散每服四錢以水壹中  
盪入淡竹茹壹分生薑半分煎至六分去  
滓不計時候溫服

治姪娠五月或七八月卒患時氣煩熱口乾  
心躁頭痛四體煩疼不得安卧麻黃散方

麻黃二兩去節根 赤芍藥一兩 甘草一兩炙 葛根微赤剉

壹兩 柴胡半兩去苗 黃芩兩 石膏貳兩 麥門冬壹兩

去心

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服

治姪娠時氣五六日未得汗口乾狂語亂見  
鬼神喫食不得遠志散方

遠志半兩去心 麥門冬壹兩去心 薯蕷壹兩 葛根一兩剉

甘草半兩炙 石膏貳兩 麻黃半兩去根節 川升麻兩

壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盪  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠時氣煩熱口乾頭痛葛根飲子方

葛根半兩到○婦人大石膏壹兩梔子人七

根全良方家乾葛白米半合麻黃半兩去根節豉壹合葱白貳莖并髮

右件藥細剉以水二大盞煎至青盞三分

去滓不計時候分溫為三服以汗出為效

治妊娠時氣六七日熱盛大小便不利宜服

此方婦人大全良方

川芒消壹兩細研葵子貳兩搗碎○方三兩

右件藥以水二大盞煎取一盞三分去滓不計時候分溫三服以利為效

治妊娠時氣未能服藥且單用竹瀝方右取

淡竹瀝壹大盞不計時候分為三服汗出

當解

治妊娠得時氣令胎不傷方右取鷄子以絹

袋盛投井中浸令極冷敵破吞之服六七

枚至佳

治妊娠熱病諸方

夫冬時嚴寒觸冒傷之藏於肌骨夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊娠遇之多致墮胎也

治妊娠熱病百骨節皆痠疼頭痛壯熱若不

急療熱勢不止多致損落柴胡散方

柴胡半兩去蘆頭 大青三分 葛根半兩 石膏壹兩 知母半兩 梔子人兩 川升麻三分 黃芩三分 甘草半兩

赤剉 右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入葱白三莖煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不下食心煩悶人參飲子方

人參

青兩去蘆頭○婦人 竹茹壹兩 葛根壹兩

剉○良方 蘆根二兩 麥門冬壹兩半 知母壹兩

分

右件藥細剉拌令勻每服壹分以水壹中

盞入葱白三莖煎至六分去滓不計時候

溫服○良方右咬咀每服四錢水壹瓊連  
根葱白三寸煎至七分去滓溫服

治妊娠熱病六七日熱入腹大小便秘澀煩  
熱

右以牛糞水調塗腹上勿令乾

又方右取葛根以水煮汁不計時候每服壹

小盞

婦人大全  
良方同

○胎產救急方葛根飲治

妊娠熱病煩悶護胎令安家葛濃煎汁服  
渴者研生葛取汁勿用野葛妨胎

治妊娠熱病胎死腹中諸方

夫妊娠因染溫疫傷寒邪毒之氣入於胞藏  
致令胎死候其當胎處若冷爲胎已死可下  
之也

治妊娠熱病胎死腹中欲出方右取烏雞壹

枚去毛細剉以水三升煮取二升去雞稍

稍摩臍下

婦人大全良方去雞通  
手用衣帛蘸摩臍下

胎當自

出

又方右以醋濃煎黑豆汁溫服壹中盞死胎

立下○肘後方妊娠未足月而胎卒死又  
不下母欲死方以苦酒煮大豆令濃取汁  
服三升死胎卽下不能頓服者分二服姚  
同

又方右取雞子壹枚去殼以三指撮揅置雞  
子中攪勻服之立出肘後方同○婦人大全良  
方文仲療妊娠得病欲去胎方取雞子壹  
枚以三指撮揅放雞子中服子立出永贇方  
同與阮河南療產難同千金經心錄同

治妊娠熱病胎夭腹中下之方

婦人大全良方名鹿角散

鹿角屑壹兩

右以水壹大盞入葱白五莖豉半合煎至  
六分去滓溫服神效

又方右以益母草搗絞取汁服壹中盞立效  
又方右以葵子三兩以水二大盞煎至壹中  
盞去滓溫服

治妊娠瘧疾諸方

夫妊娠瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因

勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更虛更盛故發寒熱陰陽相離寒熱俱歇若邪動氣至交爭則發故瘧休作有時其發寒時節漸晏者此由風邪客於風府循膂而下衛氣壹日壹夜常大會於風府巢氏病源此日下壹節故發日晏其發日早者衛氣之行風府巢氏病源此日下壹節二十一日至尾髓二十二日入脊內上注於伏衝之脉其行九日出於缺盆

之內其氣既上故發更早其間日發者由風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日稽積乃發也妊娠而發即寒熱之氣相迫傷於胎多故損動也治妊娠瘧疾增寒頭疼壯熱腹痛及胎不安穩腰膂下重阿膠散方

阿膠一兩半搗碎 赤芍藥壹兩 當歸壹兩剉

柴胡壹兩 麥門冬壹兩半 黃芩壹兩 白茯苓壹兩

白朮壹兩 甘草半兩炙



右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入薤白二莖煎至六分去滓不計時候溫  
服

治妊娠瘧疾頭疼增寒壯熱面黃不思飲食  
人參散方

人參去蘆頭 知母 麥門冬去心 柴胡去苗 桑寄

生 白茯苓 厚朴去麤皮塗生薑汁炙 令杏熟已上各壹兩

甘草半兩炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠瘧疾寒熱體痛煩渴烏梅散方

烏梅肉微炒 黃連去鬚 桑寄生 人參去蘆頭 甘

草炙微赤剉已 上各壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠瘧憎寒體顛當歸散方

當歸剉微 白芍藥 茯神 枳殼麩炒 微

白朮 鼈甲壹兩半塗醋炙 甘草炙微赤 剉已上

各壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠瘧疾憎寒壯熱口乾煩悶知母散方

知母壹兩白茯苓壹兩烏梅肉叁分大青兩半麥

門冬壹兩柴胡壹兩甘草半兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服○王嶽產

書治妊娠瘧疾憎寒壯熱口乾煩躁頭痛

體顛知母二分白茯苓貳分烏梅肉八大青

壹分柴胡去頭取麥門冬去心取甘草壹分

右件剉熬搗羅為散每服四錢以水壹盞

煎取六分去滓不勒時候服

治妊娠瘧疾寒熱腹痛黃連散方

黃連壹兩當歸壹兩剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠患瘧發時憎寒壯熱口乾多喫冷水

腹內圻刺疼痛不止松蘿散方

松蘿半兩鼈甲半兩塗醋炙恒山半兩烏梅肉

七枚朱砂壹分研漢防已壹分澤瀉半兩麥門冬

壹兩去焙知母半兩連翹兩黃丹一分石韋壹分

虎杖壹分生乾地黄兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

治妊娠瘧疾寒熱腹痛鼈甲散方

鼈甲壹兩塗醋炙乾薑半兩當歸壹兩

令黃去裙襴乾薑炮裂當歸微炒

桃人叁分浸湯去皮尖

右件藥搗細羅為散每於發時用煎水調

下膏錢

治妊娠霍亂吐瀉諸方

夫陰陽清濁相干謂之氣亂於腸胃之間則

為霍亂也但飲食過度冒觸風冷使陰陽不

和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也熱

亂者先吐或心腹俱痛則吐利並發有頭痛

體疼發熱而吐利者亦為霍亂所以然者挾

風而有實故也風折於氣皮膚緻密故血氣不得宣通故令壯熱風邪乘其經脈氣上衝於頭則頭痛風氣入於腸胃腸虛則洩利冒逆則嘔吐故為吐利也吐利甚者則多煩臍藏虛故也又手足逆冷陽氣暴竭謂之四逆也妊娠之病吐利甚者則傷損胎也

霍亂吐利不止腹痛轉筋悶絕

藿香散方

藿香葉

半兩

白朮

半兩

當歸

壹兩

木瓜

壹兩

人參

半兩

參

半兩

赤茯苓

半兩

五味子

半兩

黃耆

半兩

煎

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠霍亂吐瀉脚轉筋宜服此方

生薑

壹分

吳茱萸

壹分

木瓜

壹分

切碎

右件藥以水二大盞煎取壹盞二分去滓不計時候稍熱分為三服

治妊娠霍亂吐瀉心煩蘆根飲子方

蘆根

二兩

人參

一兩

藿香

壹分

枇杷葉

十片

拭去

毛炙甘草半兩炙  
微黃

右件藥細剉和勻每服壹分以水壹中盞  
入薤白七寸生薑半分煎至六分去滓不  
計時候稍熱服

治妊娠霍亂吐瀉心煩多渴香菝粥方

香菝塊

青搯切

生薑

半兩切

人參

半兩去蘆頭剉

右件藥以水二大盞煎取壹盞三分去滓  
入白米壹合煮稀粥食之

治妊娠霍亂吐瀉煩悶丁香散方

丁香

半兩

人參

半兩去蘆頭

陳橘皮

參分湯浸去白瓢焙

右件藥擣瓮羅爲散以水二大盞入生薑  
半分棗五枚煎至壹盞二分去滓分溫三  
服

治妊娠霍亂吐瀉轉筋不止方  
右用揅三合以水三大盞煮取二盞以青布浸拭轉筋  
上效

又方右用木瓜二枚切以水五大盞煮取三  
盞以青布浸搦於轉筋上卽定如無木瓜

煎桂枝五兩亦佳

治妊娠痰逆不思食諸方

夫水飲停積結聚為痰人皆有之少者不能為害若多則成病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也婦人大全良方此胃氣不調成風冷乘之冷搏於胃故成斯病也亦惡阻之一時

治妊娠心胃支滿痰逆不思飲食聖濟總錄治妊娠痰

飲不除胃脇支滿嘔逆不思飲食赤茯苓散方

赤茯苓壹兩○總錄去黑皮前胡壹兩去蘆頭半夏半兩湯洗

七漏去滑白朮壹兩麥門冬半兩去心○總錄焙紫蘇葉壹兩

大腹皮半兩人參半兩去蘆頭

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

總錄水壹盞半入生薑半分煎至六分總錄去滓

不計時候溫服○婦人大全良方右為粗

末每服四錢水一盞姜五片煎至七分去

滓溫服一方無大腹皮人參有大腹子櫛

榔

治妊娠氣壅心胃不利痰逆不思飲食枳實

散方

枳實叁分 炒微黃 人參叁分 去蘆頭 陳橘皮叁分 湯洗去白

炙麥門冬叁分 去心 赤茯苓叁分 半夏半兩 湯洗七遍去滑

甘草半兩 炙微赤 藿香兩 枇杷葉半兩 拭去毛 炙微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠心中煩悶惡聞食氣頭眩重四肢百  
骨節疼痛多臥少起胷中痰逆不欲飲食半

夏散方

半夏叁分 湯洗七遍去滑 陳橘皮壹兩 湯浸去白 臠焙 人參三分

去蘆 芎藭叁分 赤茯苓叁分 總錄去黑皮 赤芍藥

分 甘草半兩 炙微赤 剉 桑根白皮二分 剉 生乾

地黃三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分總錄七分去滓不計時

候溫服

治妊娠痰逆不思飲食人參飲子方

卷之三

七

人參半兩去生薑半兩切陳橘皮壹兩湯浸去白瓢焙

右件藥以小守大盞煎取八分去滓不計

時候分煖三服

治妊娠心胃痰逆煩悶頭重目眩憎寒惡聞

食氣四肢無力白朮散方

白朮壹兩去人參壹兩去葛根壹兩赤茯苓壹兩陳

橘皮壹兩湯浸去白瓢焙枇杷葉拭去毛枳殼麩炒

黃耆生柴胡去麥門冬去甘草炙微半

夏湯洗七遍去滑巳上各半兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候温

服

### 治妊娠咳嗽諸方

夫肺感於微寒寒傷於肺則成於欬嗽也所

以然者肺主氣而合皮毛寒之傷人則先客

於皮毛故肺受之也婦人大全良方肺主氣而外合皮毛毛竅不密

則寒邪乘虛而入故肺受之也五藏六腑俱受氣於肺以其

時感於寒而為嗽也秋則肺受之冬則腎受



之春則肝受之夏則心受之其諸藏嗽不已則各傳於腑妊娠而病者若久不已傷於胎也

治妊娠心胃妨悶兩脇微疼煩渴欬嗽鹿角膠散方

鹿角膠壹兩杵碎麥門冬叁分陳橘皮一兩  
湯浸夫貝母叁分煨細辛叁分前胡壹兩去  
白穰焙令微黃甘草兩芎藭兩  
右件藥搗篩為散每服四錢以水壹小盞

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠煩渴欬嗽口苦麥門冬散方

麥門冬壹兩半赤茯苓兩知母壹兩黃耆壹兩  
剉白茅根壹兩人參兩甘草兩  
百合壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠心胃氣壅喘促欬嗽百合散方

百合兩桑根白皮壹兩 菰蘆根壹兩 甜葶

麤半兩 甘草半兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞入葱白五寸煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠心胃妨悶兩脇微疼煩渴欬嗽阿膠散方

阿膠粹炒 麥門冬去心 欬冬花 貝母微  
黃秦芎去苗已上 甘草半兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠欬嗽心胃不利煩悶不欲飲食百合散方

百合 紫苑去苗 麥門冬去心 桔梗去蘆 桑

根白皮剉已上 甘草半兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞入竹茹一分煎至六分去滓入蜜半匙更煎三兩沸不計時候溫服婦人大全良方

治妊娠欬嗽氣急心煩不食紫苑散方

紫苑去苗桑根白皮剉貝母煨令陳橘皮

湯浸去白瓢焙燈心黍小甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

又方桑根白皮三分欬冬花三分赤茯苓三分青

橘皮半兩湯浸枇杷葉半兩拭去木通一分

剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順欬嗽頭疼

欬冬花散方

欬冬花去根麻黃節貝母煨微前胡去蘆

桑根白皮剉紫苑去苗旋復花壹分

膏壹分白前壹分婦人丸全良甘草壹分

剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑良方半分方三片煎至六分良方七分去滓

不計時候溫服良方食後

治妊娠肺壅徐氏胎產方及外傷風寒欬嗽喘急不

食桔梗散方

桔梗去蘆頭桑根白皮剉貝母微紫蘇葉

人參去蘆頭甘草炙微赤剉已天門冬壹兩

赤茯苓壹兩麻黃三分去根節○拔粹方

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑婦人大全良方半分拔粹方煎至

六分良方七分去滓不計時候溫服胎產方云

魚鯉

治妊娠胎氣壅滯欬嗽喘急馬兜零散方

馬兜零半兩紫蘇葉壹兩桔梗半兩去去蘆頭人參半兩

去蘆頭壹兩桑根白皮剉甘草半兩大腹皮

壹兩剉○拔粹方貝母陳橘皮壹兩湯

煎方大腹子○參分婦人大全良方○抽珍

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入牛薑半分 良方拔粹方參片 煎至六分 良方七分 去滓不計時候溫服 ○袖珍方右咬咀每服八錢生姜三片水壹瓊半煎至八分去滓溫服食後

治妊娠外傷風冷痰逆欬嗽不思飲食麻黃散方

麻黃 去根節 陳橘皮 湯浸去白皴焙 前胡 去蘆頭已上各一兩 半夏 湯洗七遍去滑 ○人參 去蘆頭 白朮 枳殼 麸炒微黃 貝母 煨微黃 甘草 炙微赤判已上各半兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盪入葱白五寸生薑半分 拔粹方三片 棗三枚 婦人 大全良方二个 煎至六分去滓不計時候溫服 永類鈞方同 ○袖珍方右咬咀每服八錢水壹盞半葱白五寸姜三片棗三个煎至八分去滓通口服不拘時候

治妊娠肺損欬嗽促不食貝母散方

貝母 煨微黃 鹿角膠 煎碎炒 生乾地黄 麥門冬 去心 人參 去蘆頭 黃耆 判 五味子 已上各一兩

甘草 半兩炙  
散赤判

右件藥搗細羅為散每服不計時候以糯米粥飲調下二錢

治姪娘氣壅欬嗽脅膈不利喫食減少紫蘇散方

紫蘇葉 赤茯苓 陳橘皮 湯浸去白 前胡

法薑 貝母 煨微黃已 甘草 半兩炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以糯米粥飲調下二錢

治姪娘欬嗽羸瘦不能下食鼈甲散方

鼈甲 塗醋炙令黃去裙襴 貝母 煨微 人參 去蘆頭 木香

柴胡 去枯梗頭 五味子 已上各壹兩 甘草 半兩

炙微赤判

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵凡如梧桐子大每服不計時候以糯米粥飲下三十丸

治姪娘心煩熱諸方

夫肺藏虛而熱氣乘於心則令心煩也停痰

積飲在於心胃之間若衝於心者亦令煩也  
若熱而煩者但煩熱而已若有痰飲而煩者  
嘔吐涎沫妊娠之人既飲食停積或虛熱相  
搏亦為煩也妊娠而煩故謂之子煩也  
治妊娠心煩憤悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩  
四肢沉重百節疼痛多臥婦人大全良方多臥少起麥門  
冬散方

麥門冬

壹兩  
去心

柴胡

去  
苗人參

去  
蘆赤芍藥

陳橘皮

湯浸去  
白瓢焙

桑寄生

桔梗

去  
蘆頭

甘草

炙微  
赤剉旋復花

已上各  
半兩

赤茯苓

壹  
兩

子芩一作

乾地黄

二  
兩

在件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服永類  
方同鈞 ○袖珍方右咬阻每服八錢水  
一盞半生姜半兩煎至八分去滓溫服食

前

治妊娠心煩頭昏躁悶不思飲食或時嘔吐  
柴胡散方

柴胡壹兩半 赤茯苓壹兩 麥門冬壹兩 人參壹兩

半兩去 枇杷葉半兩拭去 陳橘皮半兩湯

壹頭 甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半兩 煎類鈔方 煎至六分婦人大

姜叁片煎 去滓溫服○袖珍方右咬咀每

服八錢水壹盞半生姜三片煎至八分去

滓溫服無時

治妊娠心煩頭項疼痛不思飲食手足多熱

赤茯苓散方

赤茯苓 桑寄生 知母 百合 麥門

冬去心 川升麻 人參去蘆 柴胡去苗已上

甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入甜竹茹壹分生薑半兩薤白七寸煎至

六分去滓不計時候溫服

治妊娠心煩熱悶犀角散方

犀角屑 地骨皮 黃芩 麥門冬去心 赤



茯苓

已上各壹兩

甘草

半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓入竹瀝壹合更煎壹兩沸不計時候溫服

治妊娠胎動心煩熱悶當歸飲子方

當歸

剉微炒

芍藥

阿膠

杵碎炒

豉

桑寄

生

已上各半兩

葱白

一七

右件藥細剉和勻以水二大盞煎至一盞二分去滓不計時候分溫三服

又方麥門冬

二兩去心

苧麻根

壹兩剉

○婦人黃

苓

壹兩

茯神

兩壹

犀角屑

半兩

甘草

壹分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生地黃壹分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠煩躁口乾諸方

夫足太陰脾之經也其氣通於口手少陰心之經也其氣通於舌若妊娠之人腑藏氣虛榮衛不理陰陽隔絕熱氣乘於心脾津液枯

少故令心煩而口乾也婦人大全良方云余考此證與子煩大同小異其方亦可就子煩中通用一母圓亦可

治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆麥門冬散方

麥門冬去心 川升麻 黃芩 人參去蘆頭 梔

子人 柴胡去苗 犀角屑 茯苓已上各半兩 菡

蘆根半兩 知母 甘草炙微赤剉已上各四分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠煩躁壅熱口乾多渴婦人大全良方治妊娠熱氣乘

於心脾津液枯少煩躁壅熱口舌乾渴 人參散方

人參去蘆頭 麥門冬去心 赤茯苓 地骨皮

葛根剉○良方 黃芩 犀角屑已上各三分 甘

草半兩炙 散赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢良方以水一

中盞煎至六分去滓不計時候溫服永類

與良方同

治妊娠煩躁體熱口乾肢節疼痛少思飲食

類聚 卷之三 婦人 三

羚羊角散方

羚羊角屑 黃芩 麥門冬去心 人參去蘆頭

赤芍藥 木通判已上各三分 柴胡去苗 黃耆半兩

甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠心熱煩躁口乾舌澀多渴黃連散方

黃連壹兩去鬚 菰蘆根判 地骨皮 葳蕤 犀

角屑 黃芩 川升麻 甘草炙微赤判已上各半

兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方梔子人 麥門冬去心 黃耆判 生乾地黄

已上各三分 秦艽壹分去苗 甘草壹分炙微赤判

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方清竹茹兩 麥門冬半兩去心 甘草壹分炙微赤判

右件藥以水壹大盞煎至七分去滓不計

時候分溫二服

治妊娠恒苦煩躁悶亂口乾及胎藏熱知母散方

知母半兩赤茯苓三分○徐氏黃耆三分判

方七兩麥門冬半兩子芩三分○胎產方七錢甘草兩

赤判

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至五分婦人大全去滓入竹瀝一合更

煎壹兩沸不計時候溫服永鑿鈴方同按

咬咀每服四錢竹茹如一水○簡易方知煎四肢壯熱加葛根柴胡

母飲治妊娠心脾壅熱口乾渴苦煩悶醫方

集成南北經驗方油珍方赤茯苓黃芩黃

耆各參知母麥門冬去甘草各二右麓末

桑白皮壹錢半桑白皮七寸煎湯成入竹

瀝壹合服不拘時胎藏受熱最宜服之

一方去黃耆知母加地骨皮犀角屑嫩葛

各參咬咀煎如前法治療一同集成經驗

微義右咬咀每服四錢水一盞入桑白皮煎熟再入竹瀝同服

治妊娠心煩躁熱口乾頭目不利  
方

蘇轆子壹枚黃耆壹兩枳殼壹兩炒

參半兩甘草半兩石膏二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入竹葉二七片同煎至六分去滓不計時

候溫服

治妊娠煩渴躁熱口乾四肢疼痛喫食減少  
升麻散方

川升麻壹兩柴胡壹兩知母壹兩梔子壹兩黃

耆壹兩甘草壹兩黃芩壹兩麥門冬壹兩枳殼壹兩炒

上各半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
入竹茹壹分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠煩躁口乾四肢熱食少葛根散方

葛根黃芩人參壹兩麥門冬壹兩葳蕤

黃耆壹兩甘草壹兩上各半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入竹茹壹分煎至六分去滓不計時候溫  
服

治妊娠心膈氣壅滯煩躁口乾食少赤茯苓  
散方

赤茯苓一兩 紫蘇葉半兩 黃耆貳兩 人參半兩

頭陳橘皮半兩湯浸 柴胡壹兩 大腹皮半兩

到甘草半兩炙 前胡叁分去

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠體熱煩躁口乾喫食減少宜服此方

拔粹方名人  
參黃耆散

人參去蘆 葛根剉 黃耆剉 秦艽去苗 麥門冬

心赤茯苓已上各壹兩 知母叁分 甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分拔粹方 淡竹葉二七片煎至

六分去滓不計時候溫服

治妊娠煩躁體熱疼痛口乾食少地骨皮散

方

地骨皮 黃芩 人參去蘆 黃耆剉 葳蕤

麥門冬去心 甘草炙微 赤芍藥已上各 柴胡

去苗

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠煩躁口乾及胎不安方婦人大全良方

竹茹湯

淡竹茹壹兩

右以水壹大盞煎至六分去滓不計時候

徐徐溫服○良方右以水壹大升煮取四

合徐徐服盡為度神珍方同

治妊娠煩躁口乾小便赤澀或胎不安方

葱白七莖并根

右以水壹大盞煎取六分去滓不計時候

徐徐溫服

治妊娠煩躁口乾睡臥不安方

黃連二兩去鬚

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調

下壹錢婦人大全良方此下云酒蒸黃連圓亦妙

治妊娠下痢諸方

夫妊娠下痢者皆因快食生冷肥膩冷即色白熱即黃赤色氣不和即赤白相兼疔刺疼痛脾胃不調之所致也

治妊娠下痢赤白腹中疔痛腰疼或如欲產黃蘗散方

黃蘗微炙 桑寄生 當歸炒 赤芍藥

阿膠杵碎炒 艾葉炒 芎藭已上各壹兩 乾薑

三分炮 甘草壹分炙 裂割 微赤割

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中煮煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠水穀痢厚朴散方

厚朴壹兩去麤皮塗生 白茯苓壹兩 黃連半兩

去乾薑半兩炮 木香半兩 訶梨勒壹兩煨

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中煮



入棗三枚煎至六分去滓不計時候□服

治姪娠下痢赤白腹痛薤白飲子方

薤白切壹合甘草半兩炙當歸壹兩剉地榆壹兩剉糯米壹兩合

右件藥以水三大盞半煎取二盞去滓不計時候分溫五服

治姪娠熱痢腹痛煩悶黃連散方

黃連半兩梔子半兩當歸半兩剉右件藥細剉分為三服每服以水壹大盞

煎至六分去滓不計時候分溫二服

治姪娠下痢赤白心腹疴痛小便澀方

糯米壹合黃耆壹兩當歸壹兩半剉微炒○  
降方徐氏胎產方一兩

右件藥和勻以水二大盞半諸方煎至壹

盞半諸方煎至壹盞貳分去滓不計時候分溫四服

方 治姪娠腹痛下痢赤白日夜不止赤石脂散

赤石脂壹兩 乾薑半兩 炮阿膠壹兩 擣碎艾  
 葉壹兩 炒白木一兩 龍骨半兩 陳橘皮一兩 湯  
 瓜壹兩 梨勒壹兩 煨甘草一分 炙  
 焙用皮 右件藥擣篩為細散每服不計時候以粥  
 飲調下二錢

治姪娠下痢赤白腹痛日夜不止白朮散方

白朮壹兩 黃芩壹兩 赤石脂貳兩 乾薑半兩 炮芎  
 藭參分 艾葉壹兩 炒人參一兩 去蘆頭阿膠壹兩  
 炒令當歸壹兩 微炒黃燥

右件藥擣細羅為散每服不計時候以粥  
 飲調下二錢 聖濟總錄叁錢

治姪娠下痢赤白疴刺腹痛不可忍石榴皮  
 散方

醋石榴皮叁分 微炒阿膠壹兩 擣碎地榆根壹兩  
 黃蘗壹兩 微炒當歸一兩 到芎藭叁分  
 右件藥擣細羅為散每服不計時候以薤  
 白粥飲調下壹錢 聖濟總錄叁錢

治姪娠下痢腹痛方

常歸

壹兩剉炒令焦

蒜五瓣

蒸紙裏燒令熟

右件藥先擣羅常歸為末次以蒜和丸如小豆大每服不計時候煎赤芍藥湯下二十丸

### 治姪娠大小便不通諸方

夫姪娠大小便不通者山藏腑氣實而生於熱熱者隨停積之處成於病也若熱結於大腸則大便不通熱結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱之所結故煩滿口大小便不

通也

巢氏病源此下云凡大小便不通則內熱腸胃氣逆令變乾嘔也

治姪娠大小便不通心腹妨悶不欲飲食

### 椰散方

檳榔

壹兩

赤茯苓

兩

桔梗

半兩去蘆頭

大腹皮

壹兩

剉木通

壹兩

甘草

半兩炙微赤剉

桑寄生

半兩

人

壹兩湯浸去皮尖微炒

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

又方枳殼

三分炒麩令黃去瓢

川大黃

壹兩剉微炒○聖濟總錄半兩

木通一兩大腹皮三枚柯梨勒三枚

二枚櫻用皮青兩檳榔青兩

右件藥搗細羅為散每服用童子小便壹

中蓋入葱白二寸同煎至六分總錄去滓七分

不計時候調下二錢

又方葵子壹兩合川朴消貳兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服婦人大

同

治妊娠大小便不利方右用甘遂煨令黃搗  
細羅為散每服不計時候以溫水調下壹  
字

治妊娠小便不通諸方

夫妊娠小便不通者由小腸有熱熱入於胞

內也熱結其者故小便不通若不通則心脇

小腹巢氏病源氣澀喘急也心

治妊娠小便不通躋下妨悶心神煩亂方

葵子壹兩榆白皮貳兩葱白貳兩

七

右件藥以水二大盞煎至壹大盞三分去

滓不計時候分溫三服赤類鈐方  
空心服

又方滑石一兩寒水石兩葵子兩

右件藥擣羅羅為散每服三錢以水壹中

盞入葱白七寸煎至六分去滓不計時候

溫服

治姪娠小便不通臍下妨悶方婦人大全良方  
治虛羸大

便秘

車前子一兩川大黃半兩剉碎微炒

右件藥擣羅羅為細散每於食前以蜜水調

下二錢良方  
參錄

又方葵子 赤茯苓 蘧麥已上各一兩

右件藥擣細羅羅為散每服不計時候以溫

水調下一錢

治姪娠卒小便不通方

杏仁一兩湯浸去皮尖雙入滑石一兩搗末

右件藥先擣熟杏仁後入滑石末以軟飯

和丸如小豆大每服不計時候煎葱白湯  
婦人大全良方下二十九  
永類鈐方白湯

又方右用滑石末水和泥臍下二寸即差人

大全良方肘後方○聖濟總錄治妊娠小  
衛生易簡方同

便澀滑石傳方滑石二兩右壹味細研每次

用半兩以新汲水調稀稠得所塗於臍下

二寸小便即利未利更塗之

又方婦人大全良方治妊娠小便  
不通臍下妨悶心神煩亂 右川紫苑

去苗搗末以井花水調下三錢立通良方  
又云

膏方用  
紫草

### 治妊娠小便淋澀諸方

夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則  
小便數也膀胱熱則水行澀澀而且數淋澀  
不宜妊娠之人胞繫於腎腎閒虛熱而成淋  
故謂之子淋也

治妊娠數月小便淋澀疼痛心煩悶亂蘧麥  
散方

蘧麥 赤茯苓 桑根白皮剉 木通剉 冬

葵子已上各一兩 黃芩 赤芍藥 枳殼麩炒

大車前子已上各半兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠胎不安小便淋澀小腹疼痛冬葵子散方

冬葵子炒 柴胡去苗 桑根白皮剉 赤茯苓已

各一分 赤芍藥三分剉 當歸三分剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠小便淋澀臍腹妨悶大黃散方

川大黃剉碎 地膚草 知母 黃芩 猪

苓去黑皮 赤芍藥 木通剉 川升麻 枳實

麩炒微黃已 甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服○婦人大

全良方地膚大黃湯療妊娠患子淋永類

患子淋者由腎虛膀胱熱則小宜下川大  
便行澀而數不宜心中煩悶

黃地膚草各三兩知母黃芩猪苓赤芍藥通

草川升麻枳實甘草各二兩右咬咀每服四

錢水壹錢煎至七分去滓溫服

又方猪苓壹兩去黑皮蘧麥一兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候煎葱

白湯調下二錢

治妊娠小便淋澀胎不安方

鯉魚一枚重壹斤者理如食法葵菜壹斤葱白四兩切

右以水五升煮熟著少許鹽和魚菜并汁  
同食之效

治妊娠淋小便數而少澀痛手足煩疼方

地膚草 茅根剉大麻子已上各壹兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠患子淋小便澀痛宜服此方

冬葵子 滑石 木通剉各壹兩



右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入葱白七寸煎至六分去滓不計時候温

服婦人大全  
良方同

治妊娠尿血諸方

夫妊娠尿血者由勞傷經絡而有熱熱乘於  
血血得熱則沉溢滲入於胞故尿血也

治妊娠卒尿血方

婦人大全良方續斷湯  
治妊娠下血及尿血

當歸壹兩到  
微炒

續斷半兩

赤芍藥壹分

生乾地黄

兩

右件藥搗細羅為散每於食前以葱湯調

下壹錢良方  
二錢

治妊娠尿血方

阿膠二兩搗碎  
炒令黃燥熟乾地黄貳兩

右件藥搗細羅為散不計時候以葱湯入

大全良方空心粥飲調下二錢

又方豆醬壹大盞  
熬令乾生乾地黄二兩

右搗羅為末每於食前以粥飲調壹錢服

天之

又方

衛生易簡方治胎漏下血及因事下血

阿膠

壹兩搗碎炒令黃燥

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

時後方同

治妊娠卒尿血不止方

又方生地黄

切三兩

右以水壹大盞半煎至八分去滓食前分

為二服

又方生艾葉

三兩

右以水壹大盞半煎至一盞去滓食前分

為二服冬用乾者○婦人大全良方療妊

娠卒下血及子淋方生艾葉

壹斤研冬用乾者亦可

右以酒五升煮取二升分三服

治妊娠阻病諸方

夫惡阻病者心中憤悶頭重眼眩四肢沉重

懈墮不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸多睡少

起世云惡食是也乃至三月四月日已上大

劇者不能自勝舉也此由婦人本虛羸血氣

不足腎氣又弱兼當風取冷太過心下有痰

水挾之而有娠血既已閉水漬於藏氣不宣  
故心煩憤氣逆則嘔吐血既不通經絡否滯  
則四肢沉重挾風則頭眩故有胎而病惡阻  
所謂欲有胎者其人月水尚來而顏色肌肉  
如常但如沉重憤悶不欲食飲不知患所在  
脉理順緒四時平和卽是欲有胎也如此已  
經二月日也

治妊娠阻病心中憤悶吐逆惡聞食氣頭眩  
四肢百骨節煩疼沉重多臥少起半百散方

半夏

壹兩湯洗  
七遍去滑

赤茯苓

壹兩

旋復花

半兩陳橘

皮

壹兩湯浸  
去白氣焙

細辛

三分

芎藭

三分

人參

三分去  
蘆頭

赤芍藥

一分

桔梗

三分

甘草

一分

熟乾

一分

地黃

兩

右作藥搗篩爲散每服三錢以水壹斗盪  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服

治妊娠阻病胎不安寒熱嘔逆氣滿不思飲  
食麥門冬散方

麥門冬壹兩去心人參叁分去蘆頭陳橘皮壹兩湯浸去白

焙赤茯苓叁分阿膠叁分搗碎甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候服温

治妊娠阻病頭疼四肢少力不思飲食多睡少起柴胡散方

柴胡一兩半去苗赤芍藥壹兩麥門冬壹兩去心人參

壹兩去蘆頭黃耆壹兩剉甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治妊娠阻病氣攻肩背兩脇肋腰臍下痛胎動不安桑寄生散方

桑寄生壹兩阿膠壹兩搗碎麥門冬壹兩去心

一兩去蘆頭刺蒺藜壹兩郁李人半兩湯浸去皮尖微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温

服

治妊娠壹兩月惡聞食氣手足煩悶人參散方

人參

叁分去蘆頭

陳橘皮

一兩易浸去白瓢焙

知母

叁分

穀

叁分麩炒微黃去瓢

甘草

半兩炙微赤剉

麥門冬

半兩去心黃

芩

半兩大腹皮剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

服

治妊娠二三月惡阻病吐嘔不能食陳橘皮散方

陳橘皮

一兩湯浸去白瓢焙

白茯苓

壹兩半夏

壹兩湯洗七遍

去滑麥門冬

壹兩去心

甘草

半兩炙微赤剉

人參

三分去蘆頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分淡竹茹壹分煎至六分去滓

不計時候溫服

治妊娠阻病心中憤憤頭悶目眩四肢沉重惡聞食氣好喫酸醎菓實多附少起三月四

月皆多嘔逆百節痠疼不得自舉白朮散方

白朮一兩厚朴一兩薑汁炙令香熟白茯苓一兩

半兩葛根一兩麥門冬去心人參壹兩去蘆頭甘草

半兩炙陳橘皮一兩湯浸微赤到去白蘇焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠阻病心中煩悶頭眩聞食氣即嘔逆

四肢無力不自勝舉枳殼丸方

枳殼壹兩麩炒人參壹兩去蘆頭肉桂壹兩去皮

乾薑半兩炮麥門冬壹兩半去心焙半夏壹兩湯洗七遍

去陳橘皮一兩湯浸白朮兩葛根壹兩白白

茯苓一兩甘草半兩炙微赤到

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑粥飲

下三十丸

治妊娠阻病頭重不思飲食四肢羸弱多卧

少起麥門冬丸方

麥門冬

一兩半 去心焙

柴胡

壹兩 去苗 枳殼 微黃 去穢

桑寄生

一兩 剉 兩 壹 甘草 半兩 炙 微赤 剉

右件藥

搗羅為末 鍊蜜和 搗三二百杵 凡

如梧桐子大 每服不計時候 煎淡竹茹湯

下二十九

治妊娠阻病

頭疼肩背煩悶 往往氣脹不思

飲食 厚朴 方

厚朴

壹兩 去麁皮 塗生 薑汁炙令香熟

白朮

壹兩 麥門冬 三分

去陳橘皮

一兩 湯浸 去白 甄焙

赤茯苓

壹兩 半夏 三分

湯洗七遍 去滑

人參

三分 去 蘆頭

前胡

壹兩 去 蘆頭

右件藥 搗羅為末 鍊蜜和 搗三二百杵 凡

如梧桐子大 每服不計時候 以生薑粥飲

下二十九

治妊娠阻病 心胷氣滿 腹脇疴痛 腰重 陳橘

皮丸方

陳橘皮

一兩 湯浸 去白 甄焙

赤芍藥

半兩 當歸 壹兩 剉 微炒

吳茱萸

壹分 湯浸 七 剉 乾 微炒

芍藥

三分 甘草 壹分 炙 微赤 剉

乾薑

半兩 炮 剉

艾葉

半兩 炒 微過

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下二十九

治妊娠惡阻病醋心胃中冷腹痛不能飲食

輒吐青黃汁半夏丸方嚴氏濟生方醫方集成南北經驗方袖珍

方名人參

半夏半兩湯洗七遍去滑人參半兩去蘆頭乾薑半兩炮裂剉

右件藥擣羅為末以地黃汁浸蒸餅和丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十

丸濟生方集成經驗方袖珍方每服四十圓用米飲送下不拘時候

治妊娠嘔逆不下食諸方

夫妊娠嘔逆者由胃氣逆胃為水穀之海其

氣不調而有風冷乘之冷搏於胃氣胃氣逆

則令嘔逆也

治妊娠嘔逆不下飲食四肢少力頭疼憎寒

人參散方

人參三分去蘆頭前胡一兩去蘆頭白朮三分甘草半兩

或微炒麥門冬壹兩去心陳橘皮壹兩湯浸去白穢焙白朮

苓一兩葛根半兩半夏七分湯洗去滑



右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候溫服

治娠娠嘔逆不下食陳橘皮散方

陳橘皮二兩湯浸去白 人參壹兩去蘆頭 白朮半兩 麥門冬壹兩去心 厚朴壹兩去薑汁炙令香熟 白茯苓

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去

滓不計時候溫服

治娠娠嘔逆不食心煩微渴茅根散方

茅根叁分 人參壹兩去蘆頭 半夏半兩湯洗七遍去滑 陳橘皮叁分湯浸去白 葛根 赤茯苓兩 藿香兩

口草

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候

治娠娠嘔逆食物不住藿香散方

藿香壹兩芎藭兩半半夏半兩湯洗當歸三分

炒茅香壹握○聖濟麥門冬叁分去心

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分總錄加入生薑自然汁半分同煎至六分

去滓不計時候溫服

治妊娠胃氣虛冷嘔逆不下食腹脹脇滿四

肢不和白芫薹散方

白芫薹壹兩陳橘皮叁分湯浸人參叁分

頭白朮叁分厚朴叁分去麩皮塗生芎藭叁分

半夏壹分湯洗甘草壹分炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠嘔逆頭痛不納飲食寒熱心膈壅悶

人參散方

人參壹兩去蘆頭前胡壹兩去細辛兩赤茯苓

一兩厚朴壹兩去麩皮塗生芎藭兩甘草兩

炙微半夏三分湯洗赤判七分去滑

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服

治妊娠心膈氣滯嘔逆不下飲食心神虛煩

四肢少力枇杷葉散方

枇杷葉半兩拭去毛炙微黃 藿香一兩 陳橘皮三分湯浸去白  
甄半兩湯洗 麥門冬半兩去心 訶梨勒一兩  
煨用枳實三分麩炒微黃 赤茯苓三分 甘草半兩炙  
皮人參半兩去蘆頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候溫服

治妊娠嘔逆煩悶不下食蘆根散方

蘆根一兩 甘草半兩炙 人參一兩去蘆頭 麥門

冬壹兩半 陳橘皮壹兩湯浸去白穢焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分淡青竹葉二七片小麥壹百

粒煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠腹脇脹滿心胃痰逆見食即吐漸加  
羸瘦赤茯苓散方

赤茯苓 壹兩 前胡 壹兩去蘆頭 半夏 壹兩湯洗

白朮 壹兩 麥門冬 壹兩去心 大腹皮 壹兩剉 檳榔

兩 紫蘇葉 壹兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞  
入生薑半分煎取六分去滓不計時候溫

服

治妊娠心煩頭目眩悶聞食氣即嘔逆訶梨

勒方方

訶梨勒皮 壹兩 人參 半兩去蘆頭 赤茯苓 半兩 半夏

半兩湯洗 白朮 一兩 葛根 半兩剉 甘草 半兩炙

散 三分剉炒

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑粥飲

下二十九

治妊娠胎動不安諸方

夫妊娠胎動不安者多因勞役氣力或觸胃

冷熱或飲食不適或居處失宜輕者轉動不安重者便致傷墮若其母有疾致胎動治以則胎安若其胎有不牢固致動母有病者治胎則母差傷動甚者候其母唇舌青者兒死母活口中青沫出者母子俱死唇赤舌青者母死兒活也

治妊娠胎動不安心神虛煩腹內疼痛阿膠散方

阿膠 壹兩搗碎炒令黃燥 白茯苓 三分 麥門

冬 叁分 柴胡 叁分 甘草 半兩炙 黃芩 半兩 歸 半兩 芎藭 一兩 又有 人參二兩 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠胎動腹內疼痛心神煩熱飲食少生苧根散方

生苧根 壹兩 阿膠 壹兩半 黃芩 叁分 芍藥 壹兩 當歸 壹兩 炒令黃燥

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
入棗三枚同煎至六分去滓不計時候稍  
熱服

治妊娠胎動心神煩悶腹痛不止乾地黄散  
方

熟乾地黄壹兩 乾薑半兩炮 當歸壹兩剉  
人參三分去蘆頭 阿膠三分搗碎炒令黃燥 甘草壹分炙  
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

服

治妊娠胎動腹中疝痛坐卧煩悶麥門冬散  
方

麥門冬壹兩去心 芎藭兩 陳橘皮壹兩湯浸白  
茯苓兩壹當歸壹兩剉 微炒  
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候稍熱服

治妊娠胎動不安手足煩疼竹茹散方

甜竹茹壹兩當歸壹兩芎藭壹兩黃芩壹兩甘

草半兩炙微赤判

右件藥細判和勻每服半兩以水壹大盞

煎至七分去滓食前分溫二服

治妊娠腹中冷胎動不安白朮散方

白朮三分草薢壹兩當歸壹兩甘草半兩

炙微赤判乾薑半兩芎藭半兩厚朴壹兩去麤

汁炙令香熟

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服

治胎動不安心神虛煩芎藭飲子方

芎藭三分艾葉半兩阿膠三分糯米半兩

熟乾地黄壹兩棗五枚青淡竹茹半兩生薑半兩

右件藥細判和勻以水二大盞煎至一盞

三分去滓不計時候分溫三服

治妊娠胎動令安穩方

鼓二合阿膠一兩蔥白一握

右件藥以水壹大盞半煎至壹盞去滓食

前分溫三服

治妊娠胎動不安心神煩悶方

葱白

一握阿膠一兩鴉碎銀五兩

右以水一大盞半先煎銀取壹盞後入藥

煎至七分去滓不計時候分溫二服

治妊娠胎動煩熱不安秦芩散方

秦芩

半兩甘草半兩鹿角膠半兩鴉碎半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹大盞

入糯米五十粒煎米熟為度去滓不計時

候溫服

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方

婦人大全良方名錄

芎藭聖濟總錄名芎根欬

芎根

貳兩剉○總錄芎銀五兩

右以清酒壹中盞水壹大盞煎至壹大盞

去滓不計時候分溫二服

總錄分溫五服

或單用水○胎產救急方銀煎散治胎動

欲墮腰痛不可忍芎根貳兩水酒各大盞

銀五兩煎分二服經驗良方芎根湯治胎



無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如

小豆汁者野苧根貳兩剉炒貳兩金銀首飾之類洗淨

壹兩右水酒各壹盞煎至壹盞去滓分二

服不以時

治妊娠胎動不安心腹刺痛鯉魚臛方

鯉魚壹斤修壹兩阿膠壹兩搗碎糯米貳

右件藥以水二升入魚膠米煮令熟入葱

白生薑橘皮搗各少多更煮五七沸食前

喫如有所傷且喫五七日神巧萬全方同

又方桑寄生壹兩艾葉半兩阿膠壹兩搗碎

右件藥剉以水壹大盞半煎至壹盞去滓

食前分溫三服○朱氏集驗方阿膠散安

胎孕治腹痛或下血水桑寄生七錢阿膠

半兩艾葉二錢右咬咀每服四錢水壹盞

半煎熱服不拘時

治胎動不安心神煩熱宜服此方右以甘竹

根五兩剉以水二大盞煎至壹盞去滓不

計時候分溫三服

又方右取茅根五兩以水二大盞煎至壹盞  
去滓不計時候分溫三服

治妊娠胎動煩悶不安甚者方右取生地黃  
搗絞取汁每服壹小盞煎令沸人雞子白

壹枚攪令勻頓服之神巧萬全方同

治妊娠胎動下血諸方

夫妊娠因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸  
冒風寒遂致胎動若母有宿疾子藏為風冷  
所乘氣血失度使胎不安故令下血也

治妊娠胎動時有所下腹脇疼痛宜服阿膠  
散方

阿膠叁分搗碎艾葉半兩微炒當歸叁分判赤

石脂半兩竜骨半兩芎藭叁分黃耆壹兩熟乾地

黃壹兩乾薑壹分聖濟總錄裂判甘草一分炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入生薑半分總錄五片棗三枚煎至六分去滓  
不計時候稍熱服

治妊娠勞熱胎動不安下血腹痛不止手足

煩悶當歸散方

當歸壹兩剉芎藭兩黃芩兩熟乾地黄兩

壹兩剉半伏龍肝兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入淡竹茹壹分煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠損動腹內結痛血下運悶桑寄生散方

桑寄生兩當歸壹兩剉阿膠壹兩搗碎續

斷壹兩艾葉半兩芎藭兩

右件藥搗篩為散每服用藥五錢先以水一大盞半入銀三兩煎至壹盞次入藥并竹茹壹分糯米壹百粒煎至六分去滓食前分溫二服

治妊娠胎動腹痛或下黃赤汁方

糯米壹兩黃耆兩芎藭壹兩

右件藥以水二大盞煎至壹盞三分去滓不計時候分煖三服

治妊娠忽胎動下惡血腹痛不可忍心神煩

悶芎藭散方

芎藭壹兩當歸壹兩半鹿角膠壹兩半搗碎炒令黃燥

桑寄生兩熟乾地黃壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治妊娠胎動下血心煩悶亂艾葉散方

艾葉壹兩赤石脂壹兩白茯苓壹兩

艾葉微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠因損動下血腹痛不止當歸散方

當歸叁分白龍骨兩半熟乾地黃兩地榆

三分阿膠叁分白芍藥兩乾薑兩

熟艾兩半牛角鯁壹兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治妊娠傷動腹痛下血阿膠散方

阿膠半兩搗碎艾葉半兩微炒芎藭兩當歸兩

剉微炒熟乾地黄兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温

酒調下二錢

治妊娠傷動腹痛下血心煩卷栢散方

卷栢兩阿膠半兩搗碎龍骨兩當歸兩

剉微炒熟艾兩熟乾地黄兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎黑

豆湯調下二錢神巧萬全方此下又云一

酒調服

治妊娠胎動腹痛下血不止伏龍肝散方

伏龍肝兩當歸兩龍骨兩阿膠兩

剉微炒黃燥蒲黃三艾葉兩熟乾地黄兩牛角

兩芎藭兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治妊娠胎動下血不住腹痛不止宜服此方

當歸壹兩到 桑木耳半兩 乾薑一分 續斷壹分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

又方阿膠壹兩搗碎 熟乾地黄一兩 丹參一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠漏胎諸方

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也

此由任衝脉虛不能約制太陽少陰之經血

故也衝任之脉為經絡之海起於胞內手太

陽小腸脉也手少陰心脉也是二經為表裏

上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷

者壅之以養胎而稽之以為乳汁衝任氣虛

則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名

胞漏血盡則斃人也婦人大全良方此下云

不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有

宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安

治姪娠胎動不安及漏胎腹中痛宜服阿膠

散方

阿膠壹兩搗碎熟乾地黃壹兩半○聖當

歸壹兩桑寄生一兩半○龍骨三分○

甘草壹兩白朮壹兩白茯苓壹兩○總

芍藥壹兩乾薑半兩○白朮壹兩白茯苓壹兩○總

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入棗三枚煎至六分總錄

去滓不計時候稍熱服總錄

治姪娠五月六月血不止名曰漏胎黃耆散

方

黃耆一兩桑寄生壹兩地榆壹兩艾葉叁分

龍骨叁分熟乾地黃壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於

食前溫服

治姪娠胎漏下血不止腹痛薑黃散方

薑黃壹兩當歸壹兩熟乾地黃壹兩艾葉壹兩

微炒鹿角膠一兩搗碎

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於

食前溫服

又方熟乾地黃半兩乾薑半兩炮

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下二錢

又方阿膠壹兩搗碎艾葉灰兩半

右件藥搗細羅為散每於食前以糯米粥

飲調下二錢

治妊娠漏胎心腹疔痛桑寄生散方

桑寄生壹兩阿膠壹兩搗碎艾葉壹兩白芍壹兩

藥壹兩白朮兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入淡竹茹壹分煎至六分去滓每於食前

溫服

治妊娠胎不安漏下腹痛人參散方

人參壹兩去蘆頭當歸壹兩剉阿膠壹兩搗碎



芎藭兩 艾葉半兩 微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壺中盪入棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服治妊娠胎漏腹痛不止心神虛煩熟乾地黄散方

熟乾地黄兩 人參貳兩 去蘆頭 芎藭兩 阿膠參

搗碎炒 龜骨兩 當歸參分 微炒 麥門冬參分 去心

右件藥搗篩為散每服四錢以水壺中盪入棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服

又方熟乾地黄貳兩 半 鹿茸壹兩 半 去毛 塗酥炙 鹿角

膠貳兩 搗碎 微炒 艾葉壹兩 微炒 苧麻根一兩 半 剉

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二

又方蠟如鷄子大碎切

右以酒壺中盪煖令熟投蠟在內候消便服○聖濟總錄治妊娠胎動腹痛下血蠟酒方蠟壹錢 右壹味以清酒二盞煎三五沸

投蠟令銷頓服衛生易簡方治胎動痛下  
血不止用蠟如雞子大煎消三五沸酒半  
升投和服之即安

### 治妊娠胎不長養胎諸方

夫妊娠之人有宿挾痲瘵而後而娠或有娠  
時節適乘理致生疾病並令臟藏衰損氣力  
虛羸令胎不長故須服藥去其疾病益其氣  
血以扶養胎者也

治妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢

### 黃耆散方

黃耆叁分 白朮叁分 人參叁分 去叁分 麥門冬叁分

去陳橘皮叁分 湯浸叁分 芎藭半兩 白茯苓叁分

濟總錄去 前胡叁分 去叁分 甘草半兩 炙微赤

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分 婦人大人 良方叁片 棗三枚 煎至

六分良方 棗一枚 去滓每於食前溫服神

方同萬全

治妊娠氣血虛弱令胎不長宜服和氣安養

胎藏乾地黃丸方

熟乾地黃

壹兩

芎藭

叁分

白茯苓

叁分

人參

叁分

頭當歸

叁分

柴胡

半兩

剉薊

半兩

厚朴

壹兩

去

麩

生薑汁炙

桑寄生

兩

龍骨

叁分

阿膠

碎炒

令

香熟

黃白石脂

叁分

貴者

半兩

甘草

壹分

炙

改

赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以清粥飲下

三十六

治妊娠胎動腹痛下血宜服保胎安定神思

陟釐丸方

陟釐

叁分

熟乾地黃

壹兩

人參

叁分

去

當歸

叁分

剉微

白竜骨

叁分

赤石脂

叁分

禹餘糧

叁分

燒

醋

滓

參

厚朴

壹兩

去

麩皮

塗

生

赤芍藥

兩

吳茱

萸

黃

半兩

湯浸

七漏

微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下至

十九○聖濟總錄治妊娠驚胎定神丸方

陟釐生乾地黃

焙

人參

當歸

碎

香

竜骨

赤石脂厚朴

去麤皮塗生薑汁炙判

禹餘糧

醋淬去五遍

赤芍藥

判吳茱萸壹兩

炒各

右一十味搗羅為

末鍊蜜和丸梧桐子大每服空心熱水下

二十九

治妊娠胎不良宜服養胎人參丸方

人參

壹兩去蘆頭

白茯苓

壹兩當歸

柴胡

壹兩

厚朴

壹兩去麤皮塗生薑汁炙判

枳殼

參分麩炒去微黃去瓢桑

寄生

壹兩刺薊

阿膠

壹兩搗碎炒令黃燥

甘草

半兩炙微

赤判

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以溫水下二十丸

聖濟總錄  
卷十九

治妊娠胎動腹痛諸方

夫妊娠腹痛者皆由風邪入於腑藏與血氣

相擊搏所為也妊娠之人或宿夾冷疥或觸

風邪疔結而痛其腹痛不已則邪正相干血

氣相亂致傷損於胞絡則令胎動腹痛出

治妊娠胎動時時腹痛頻頻下利漸覺羸瘦

面色萎黃不欲飲食厚朴散方

厚朴一兩半去麤皮塗生薑汁炙令香熟白朮一兩芍藥兩芎藭兩

芍藥兩乾薑兩當歸兩人參兩

去蘆頭甘草兩熟乾地黄兩訶梨勒分

皮用

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中

入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

服

治妊娠胎動不安腹內疝痛艾葉散方

艾葉壹兩阿膠壹兩芍藥兩芎藭兩乾薑兩

炮裂當歸甘草兩桑寄生兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治妊娠胎動腹中疝痛不思飲食宜服阿膠

散方

阿膠壹兩白茯苓兩白朮兩當歸兩

剉陳橘皮去白芎藭甘草兩

赤

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分婦人大全良方薑叁

煎至七分片棗壹个去滓不計時候稍熱服

治妊娠胎動不安腹內疼痛當歸散方

當歸叁兩剉阿膠二兩搗碎熟乾地黃貳兩

艾葉貳兩甘草半兩炙白芍藥壹兩芎藭兩

乾薑半兩炮右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞入

棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠胎動腹痛悶絕鹿角膠散方

鹿角膠半兩搗碎人參半兩去芎藭壹兩

歸叁分剉甘草半兩炙右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫

服

治妊娠胎動腹痛悶亂桑寄生散方

桑寄生壹兩當歸壹兩剉芎藭三分阿膠叁分

剉微炒右件藥搗篩為散每服三錢水壹中盞入

炒令  
黃燥

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞  
入豉五十粒葱白七寸煎至六分去滓不  
計時候稍熱服○聖濟總錄治妊娠胎動  
煩熱滿悶安胎常歸飲方當歸切桑寄生  
各半芎藭一分阿膠炒燥右四味各搗篩  
每服五錢匕水壹盞半入葱白三寸切豉  
三十粒同煎至八分去滓食前溫服  
治妊娠胎動腹痛及腰疼不止白朮散方

白朮

三分

熟乾地黄

兩

白茯苓

一分

阿膠

一兩  
搗碎

炒令  
黃燥

甘草

半兩  
炙

當歸

一兩  
剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候稍熱服

治妊娠胎動不安腹痛不止當歸散方

當歸

兩  
剉

續斷

兩

芎藭

兩

陳橘皮

湯  
浸

去白  
剉焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治妊娠胎動腹痛心煩宜服此方

芎藭半兩當歸半兩剉阿膠半兩搗碎大麥

葉壹兩曲頭棘針半兩

右件藥細剉和勻以水壹大盞半煎至壹

盞去滓食前分溫三服

治妊娠胎動腹痛連腰方右取大麥麴壹兩

以水壹大盞煎五七沸食前分溫三服○

肘後方妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎

轉搶心或下血不止方生麴半餅碎末水

和絞取汁服三升衛生易簡方同

又方右用好鼓壹合以水壹大盞煎至六分

去滓食前分溫二服

治妊娠月未足似欲產腹中痛知母丸方婦

大全良方兼治難產及子煩

知母二兩

右搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計



時候以粥飲下二十九丸徐氏胎產方衛生易簡方同胎產救

急方下廿卅丸效 ○簡易方右為末煉蜜元如鷄

頭子每服一元溫酒嚼下再三服得效方袖珍方

日三服良方又云千金崔氏同壹方圓如梧桐子大粥飲下二十九瓊碎錄

娠身煩悶胎熱臥睡不得以智母二兩新

好白者焙乾為末蜜元小彈子大每服壹

真溫酒調下

治娠娠月數未至而似欲墜腹痛者宜服槐

子丸方

槐子壹兩蒲黃壹合○婦人夫全良方袖珍方等分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

不計時候以溫酒下二十九丸以痛止為度

治娠娠心腹脹滿諸方

夫娠娠心腹脹滿者由腹內夙有寒氣巢氏病源

致令停飲娠娠重因觸冷飲發動與氣相

干故令心腹脹滿也

治娠娠心腹脹滿兩肋妨悶不下飲食四肢

少力檳榔散方

檳榔一人參半兩去陳橘皮參分湯浸前

胡蘆頭兩去枳殼三分炒赤茯苓壹兩白木

半芎藭兩甘草一分炙

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盪

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於

食前溫服

治妊娠心腹脹滿氣攻胃膈咽喉不利飲食

減少白芫薹散方

白芫薹半兩去人參參分去前胡壹兩去陳

橘皮壹兩湯浸赤茯苓壹兩訶梨勒壹兩煨

甘草半兩炙白木參分枳殼半兩炒大腹

皮參分

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盪

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠心腹脹滿氣衝胃膈煩悶四肢少力

不思飲食訶梨勒散方

訶梨勒皮兩陳橘皮參分湯浸赤茯苓壹兩

桑根白皮一分前胡壹兩去蘆頭芫薺半兩白木

枳殼半兩麩炒大腹皮三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠心腹脹滿不欲飲食白朮散方中

白朮壹兩黃芩壹兩陳橘皮二兩湯浸去白穰焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠心腹脹滿兩肋妨悶不思飲食宜服

人參散方

人參壹兩去蘆頭厚朴壹兩去麩皮塗生訶梨

勒壹兩煨阿膠壹兩搗碎陳橘皮叁分湯

穰壹兩赤茯苓壹兩白朮叁分甘草微赤判

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治妊娠心腹脹滿脾胃氣虛不下食飲草薏  
薏散方

草薏薏壹兩去皮人參壹兩去蘆頭柴胡一兩半去苗陳

橘皮壹兩半湯浸去穢燥白朮壹兩甘草半兩炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中煎  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候稍熱服

治妊娠心腹痛諸方

夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疹或新觸風

寒皆因藏虛而致發動也邪正相擊而并於

氣隨氣下上上衝於心則心痛下攻於腹則

腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者正邪二氣

交擊於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致

動胎甚則傷墮也婦人大全良方此下云妊娠心腹疼痛多是風寒濕

冷痰飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎動也

治妊娠心腹多痛與食減少四肢不和婦人大全

良方下云草薏薏散方

草薏薏壹兩去皮○良方永類鈴當歸半

劉微陳橘皮一兩湯浸桂心半兩乾薑半兩

劉白木一兩熟乾地黃一兩木香半兩芎藭分

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中盞

入棗三枚良方鈐方煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治妊娠冷氣攻心腹痛或不納飲食厚朴散

方

厚朴二兩去麁皮塗生陳橘皮壹兩湯浸

草荳蔻一兩去皮人參壹分去芎藭分白木分

阿膠叁分擣碎當歸叁分劉乾薑半兩炮

訶梨勒壹兩煨吳茱萸壹分湯浸甘草

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

服

治妊娠心腹痛胎不安穩四肢皆不和阿膠

散方

阿膠一兩擣碎芎藭壹兩桑寄生半兩艾葉半兩

阿膠壹兩芎藭壹兩桑寄生半兩艾葉半兩

微枳實半兩 炒令黃 當歸叁分 判高良薑 二分

陳橘皮壹兩 湯浸甘草 一分炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

服

治妊娠傷冷心腹痛或痰逆不納飲食半夏

散方

半夏半兩 湯洗芎藭 三分人參 半兩去 阿膠

壹兩碎 厚朴壹兩 去麩皮 塗生草 壹兩薑 壹兩黃燥 厚朴薑汁 炙令香 熟

半兩白朮 半兩陳橘皮 壹兩湯浸 高良薑半兩

剉艾葉 半兩甘草 壹分炙 微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治妊娠心腹疝刺疼痛氣脹胎不安穩雞蘇

散方

雞蘇葉壹兩 人參叁分 去陳橘皮 壹分湯

蘇蘇葉兩 大腹皮叁分 芎藭叁分 苧麻根

半兩 當歸一兩到 微炒

右件藥擣篩為散 每服四錢 以水壹中

入生薑半分 煎至六分 去滓 不計時候 稍

熱服 心腹刺痛 芎藭散方

治妊娠先患冷氣 忽衝心腹刺痛 芎藭散方

芎藭壹兩 人參壹兩 白茯苓壹兩 桔梗壹兩

厚朴壹兩 薑汁去麤皮 炙生 吳茱萸半兩

焙乾 微炒 當歸一兩到 白芍藥壹兩

煎至六分 去滓 不計時候 稍熱服

右件藥擣篩為散 每服三錢 以水壹中 蓋

煎至六分 去滓 不計時候 稍熱服

治妊娠心痛諸方

夫妊娠心痛者 多是風邪痰飲 乘於心之經

絡 邪氣搏於正氣 交結而痛也 若傷心正經

而痛者 為真心痛 心為神統領 諸藏不可受

邪 邪若傷之 朝發夕死 夕發朝死 若傷心支

別絡而痛者 則乍安乍甚 休作有時也 妊娠

之人 或其病若痛不已者 氣乘胞絡 傷損子

藏也則令胎動凡胎轉移則多不安不安而動於血者則血下也

治妊娠心痛煩悶不食方

淡竹茹壹兩 生地黃壹兩 桂心半兩

右件藥以水一大盞半煎至壹盞去滓不

計時候稍熱分為三服

治妊娠卒心痛不可忍方

白朮壹兩 黃芩壹兩 赤芍藥壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候稍熱服○聖

濟總錄治妊娠心腹痛不能食白朮湯方

白朮黃芩去黑心芍藥各壹兩右三味麤搗篩

以水八盞煎至五盞去滓分溫五服

治妊娠心痛煩悶宜服此方

羊脂半兩 青竹茹壹兩 白蜜半兩

右件藥以水一大盞半煎至一盞去滓不

計時候分溫三服

又方牛糞炒令



右擣細羅爲散每服不計時候以冷水調下二錢

治妊娠腰痛諸方

夫腎主腰脚因勞傷損動其經虛則風冷乘之故腰痛也婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者皆胎墮也

治妊娠氣壅攻腰疼痛不可忍夫腹散方

大腹皮剉一兩 郁李人壹兩湯浸法澤瀉壹兩

右件藥擣篩爲散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠腰痛當歸散方

當歸壹兩剉 阿膠壹兩擣碎 甘草壹兩炙

右件藥擣篩爲散每服四錢以水壹中盞

入葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠腰痛不止方

鹿角屑二兩 生乾地黄壹兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下二錢

治胎動腰痛搶心或有血下方

檳榔兩

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以木

煮葱白濃汁調下壹錢

治姪娠腰痛方

鹿角兩二

右件藥搗細羅爲散每於食前以溫酒調

下二錢

治姪娠胎間水氣子滿體腫諸方

夫姪娠虛腫者凡姪娠無使氣極若心靜氣和則胎安若中風寒邪氣有所觸犯身體受病乍寒乍熱頭眩腰痛胎中有水寒氣所傷脾胃虛弱所致也姪娠之人經血壅閉以養於胎若胎中挾水氣則水血相搏則胎傷腑藏脾胃主身之肌肉故氣虛弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也水漬於胎則令胎壞

然妊娠臨產之月而脚微腫者其產則易若胞藏木少血多亦令產易而水垂於外故微腫也若初妊而腫者是水氣過多兒未成具故令壞胎也

治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘息促大便難小便澀澤瀉散方

澤瀉壹兩桑根白皮壹兩木通壹兩枳殼兩  
蘇炒微赤茯苓壹兩檳榔兩  
黃去麩  
右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蓋聖濟總錄入生薑半分  
婦人大全良方

方四煎至六分總錄煎去滓每於食前溫

服以稍利為效神巧萬全方同總錄  
此下云日再

治妊娠通身浮腫喘促小便澀宜服漢防己散方

漢防己叁分桑根白皮一兩木香壹分紫蘇莖

葉兩大腹皮叁分赤茯苓兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中蓋入生薑半分煎至六分去滓每於食前

濕服

治姪娠身體浮腫心腹脹滿小便不通木通散方

木通壹兩木香叁分訶梨勒皮貳分香葉壹兩枳

殼半兩麩炒微黃去穢檳榔半兩桑根白皮壹兩子芩

貳分鷄蘇莖葉壹兩

右件藥持籠羅為散每服四錢以水壹中

盞入牛薑半分煎至六分去滓每於食前

濕服

治姪娠四肢腫滿小便不利時時喘促桑白

皮散方

桑根白皮壹兩枳殼半兩麩炒微黃去穢商陸半兩澤

瀉叁分冬葵根兩赤茯苓壹兩木通一兩

右件藥持籠羅為散每服四錢以水壹中

盞聖濟總錄入生薑半分煎至六分總錄八分

去滓付於食前濕服以利為効聖濟

治姪娠四肢浮腫皮肉拘急小便不利方聖濟

總錄名商陸湯

商陸兩半桑根白皮壹兩羌活兩半

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹

盞總錄水入赤小豆一百粒煎至六分總錄

八分去滓每於食前溫服日再

治妊娠身體浮腫心腹急滿小便澁滯赤茯苓散方

赤茯苓壹兩白朮兩半黃芩叁分旋復花兩半杏仁兩

叁分湯浸去皮尖木通叁分

右件藥搗麤羅為散每服四錢聖濟總錄叁錢以

水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓每

於食前溫服

治妊娠身體浮腫腹脹小便不利微渴引飲

氣急猪苓散方

猪苓貳兩去紫蘇莖葉壹兩木通壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫水調

下二錢

治妊娠身體浮腫小便不利洒淅惡寒葵子

散方

葵子二兩赤茯苓二兩漢防已二兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下壹錢

治妊娠身體浮腫心腹脹滿小便澁喘息促

檳榔丸方

檳榔半兩赤茯苓壹兩白朮叁分郁李人壹兩湯

尖微炒桑根白皮壹兩枳殼叁分麩炒甜葶

塵壹兩兩隔紙炒令紫色

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下二十丸

神巧萬全方同

治妊娠手脚皆腫攣急方

赤小豆壹合商陸壹兩澤漆壹兩

右件藥搗碎都以水二大盞煎至壹盞三

分去滓食前分溫三服以利為度

治妊娠僵仆胎動腹痛下血諸方

妊娠僵仆或從高墮下傷損胞絡致血下動胎而血傷氣逆者胎墮氣上搶心其死生之

候其母舌青者兒死母活唇口無沫兒生唇青沫出者母子俱死唇口赤舌青者母死兒活若下血不住胞絡燥胎枯則令胎死者也治妊娠從高墮下腹痛下血面色青黃阿膠

散方

阿膠

壹兩搗碎炒令黃燥

木香

半兩

芍藥

半兩

熟乾地黄

半兩 乾薑

壹分炮裂

當歸

半兩

微炒

桑寄生

半兩

桂

心 兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盪

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠從高墮下腹痛下血煩悶乾地黄散

方

生乾地黄

壹兩

益母草

兩

當歸

半兩

剉 黃耆

半兩 芎藭

兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盪

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

神效萬

方同

兩

二兩

艾葉

一兩

治妊娠卒驚奔走或從高墮下腹痛下血不

止當歸散方  
 當歸壹兩半剉 阿膠二兩搗碎 艾葉一兩 芎芎  
芎  
 右件藥搗篩為散每服四錢以水盪中

煎至六分次入生薑汁壹匙地黃汁半合  
 馬通汁半合更煎三兩沸去滓不計時候  
 溫服

治妊娠五六箇月從高墜下胎腹內不安兼  
 癢下疔刺疼痛不住下血芎藭散方

芎窮參分 阿膠壹兩搗碎 當歸壹兩剉 艾葉  
壹兩

半兩 熟乾地黃壹兩 桑寄生參分 赤石脂參分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温  
 酒調下二錢

治妊娠因擎舉重物胎動疼痛兼有所下方

當歸一兩剉 黃連一兩 阿膠壹兩搗碎

右件藥搗細羅為散不計時候以温酒調  
 下二錢

治妊娠從高墜損胎不轉腹痛腰重方



芎藭

貳合

右搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

妊娠逐月養胎主療諸方

治妊娠一兩箇月惡食手足煩悶麥門冬散

方

麥門冬

壹兩

知母

三分

枳殼

三分 麩炒

人參

叁分 去蘆頭

黃芩

叁分

大腹皮

壹兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

入葱白兩莖煎至五分去滓食前溫服

治妊娠二三月胎動宜服芎藭飲子方

生芎藭

二兩

甘草

壹兩

黃芩

壹兩

白芍藥

壹兩

阿膠

貳兩

擣碎

當歸

壹兩

剉

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞

入棗三枚煎至五分去滓食前溫服

治妊娠二三月腰痛當歸飲子方

當歸

壹兩

阿膠

壹兩

擣碎

甘草

半兩

炙

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞

入葱白二莖煎至五分去滓食前溫服

治妊娠三四月氣壅惡食嘔噦肢節煩疼或

膝虛腫柴胡散方

柴胡壹兩人參一兩去盧頭甘草半兩陳橘微赤剉

皮半兩湯浸去白穢木通三分紫蘇莖葉兩大

腹皮兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹大盞

煎至六分去滓食前溫服

治妊娠三四月胎動不安手足煩熱面色萎

### 黃竹茹散方

竹茹兩麥門冬壹兩白茯苓兩梔子兩人壹兩

黃芩兩甘草半兩石膏兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治妊娠四月有寒心中欲嘔胃膈滿不食有

熱即小便難數如淋狀臍下苦急卒風寒頸

項強痛或熱或驚腰背及腹痛往來有時胎

上迫心煩悶不安卒有所下並宜服此麻黃

雌鷄湯方

麻黃壹兩去根節 阿膠貳兩燻碎 甘草壹兩炙微赤  
 當歸壹兩剉微炒 人參貳兩去蘆頭 生薑壹兩半夏兩  
 湯洗七 甘菊花兩半 麥門冬壹兩心 大棗七枚  
 右件藥細剉先取肥烏雌鷄一隻理如食法以水一斗煮雞取汁五升去雞入藥煎至三升入酒二升又煎至四升去滓空腹溫服一小盞卧當汗出以粉傅之避風日晚再壹服

治妊娠四五月頭重耳鳴時時腹痛赤茯苓

散方

赤茯苓兩 桑寄生兩 人參半兩去蘆頭 蔓荊子兩  
 一兩 防風蘆頭 刺薊分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓食前溫服

治妊娠四五月胎不安或有所下人參散方

人參壹兩去蘆頭 當歸壹兩剉微炒 阿膠貳兩燻碎  
 甘草壹兩炙微赤 芎藭兩 黃芩兩 艾葉壹兩微炒

茱萸半兩湯浸七桑寄生兩壹熟乾地黄兩貳

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓食前溫服不人參附子

治妊娠五月有熱頭眩心亂欲吐有寒腹滿

小便數卒恐悸四肢疼痛寒熱胎動無常腹

痛頓仆有所不安旋復花湯方

旋復花兩壹當歸兩壹赤芍藥兩壹甘草兩半

炙微黃芩兩壹人參兩壹麥門冬兩壹

舊兩壹阿膠兩壹吳茱萸兩壹編兩壹焙兩壹乾兩壹微兩壹炒兩壹

右件藥細剉先取肥烏雌雞壹隻理如食

法以水壹斗煮雞取汁五升去雞內藥煎

取三升入酒二升又煎取四升每於食前

溫服壹小盞

治曾傷五月胎預服乾地黄散方

熟乾地黄兩壹甘草兩壹麥門冬兩壹去心兩壹

味子兩壹黃芩兩壹桑寄生兩壹

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓每於

食前温服  
治妊娠五箇月胎不安腹內疴刺痛日夜不止不欲言語四肢昏沉宜服安胎桑寄生散

桑寄生 壹兩 乾地黄 貳兩 木通 一兩 赤茯苓

一廿草 半兩 當歸 壹兩 陳橘皮 湯浸

夫白 白芷 兩 知母 兩 遠志 半兩 陳橘皮 湯浸

右件藥搗篩為散每服四錢以水一大盞煎至六分去滓不計時候温服

治妊娠五六月忽患腹內疴刺痛兼有惡血下日夜不止敗蒲散方

敗蒲 壹兩 白朮 壹兩 訶梨勒 壹兩 煨阿膠 貳兩

炒令 白芷 兩 赤芍藥 兩 枳殼 壹兩 麩炒當

歸 壹兩 艾葉 半兩 厚朴 壹兩 生薑汁炙令香

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

治妊娠五六月患心腹脹滿口乾腹中疝刺  
疼痛不止桑寄生飲子方

桑寄生三分木通三分生乾地黃三分訶梨勒皮

三分白朮三分赤茯苓三分當歸三分芎藭三分

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞  
入葱白七寸豉五十粒煎至五分去滓不

計時候溫服

治妊娠六月胎卒動不安寒熱往來腹滿驚  
怖忽有所下腹痛如似欲產手足煩悶人參

雌鷄湯方

人參壹兩去蘆頭甘草壹兩炙黃芩壹兩熟乾地

黃貳兩阿膠貳兩炒令黃燥生薑貳兩麥門冬壹兩去心

大棗十五枚

右件藥細剉先取肥烏雌鷄壹隻理如食  
法以水壹斗煮取汁五升去雞內藥又煮  
取三升入酒二升又煎取四升每於食前

溫服壹小盞中間食粥

治曾傷六月胎預服柴胡散方

柴胡

一兩

紫葳

壹兩

白朮

兩

甘草

半兩

炙

菴蓰

壹兩

酒浸壹宿

刮

芎藭

兩

麥門冬

兩

去熟乾地黃

壹兩

兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹大盞

入棗三枚煎至五分去滓每於食前溫服

治姪娠六七月忽覺四肢煩疼心悶口乾頭

痛茯神散方

茯神

壹兩

黃芩

兩

麥門冬

壹兩

梔子

兩

膏

壹兩

甘草

半兩

秦芫

半兩

去

苗

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓入竹瀝半合更煎三兩沸

不計時候放溫服之

治姪娠六七月傷寒咳嗽氣急紫苑飲子方

紫苑

半兩

洗

桑根白皮

半兩

乾棗

七枚

陳橘皮

壹兩

湯浸

燈心

壹兩

生薑

壹兩

右件藥細剉和勻以水三大盞煎至壹盞

半去滓食後分為四服日三服夜壹服

治姪娠七月忽驚恐動搖腹痛卒有所下手

足厥冷若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及  
腰背強悉主之葱白雌雞湯方

葱白十四半夏青兩湯浸七遍去滑生薑貳兩甘草半兩

炙微黃耆一兩黃芩兩旋復花半兩阿膠兩

炒令人參一兩去黃兩燥盧頭

右件藥細剉先取黃雌雞壹隻理如食法

先以水壹斗煮雞取汁五升去雞內藥煎

至三升入酒二升煎至四升去滓每於食

前溫服壹小盞

治姪娠曾傷七月胎預服杏仁雌雞湯方

杏仁壹兩湯浸去皮尖鍾乳粉 甘草兩

炙微乾薑一兩炮麥門冬兩紫苑壹兩

赤五味子兩粳米 吳茱萸一兩湯浸七

右件藥剉剉先取黃雌雞壹隻理如食法

先以水壹斗煮雞取汁五升去雞內藥煎

取三升次入酒二升煎至四升每於食前

溫服壹小盞

治姪娠七八月或因驚恐或是傷寒煩熱腹



肚滿脹氣促腰重半夏飲子方

半夏壹兩湯洗七遍去滑黃耆壹兩人參壹兩去蘆頭麥門

冬壹兩去心黃芩兩半甘草兩半炙

右件藥細剉和勻每服半兩以水壹大盞

入生薑半分葱白七寸煎至五分去滓不

計時候溫服

治妊娠六七月已後胎動困篤欲死方

葱白貳七莖切

右以水二大盞煮取壹盞去滓分溫二服

卽安若胎已死者須臾卽出如未安更煮服不過三服效

治妊娠八九月因悞損胎或胎不安腹內疝

痛下血不止胎死活未知但妊娠腹內疝痛

或漏胞當歸散方

當歸壹兩剉微炒芎藭兩壹兩桑寄生兩壹兩艾葉壹兩微炒

阿膠二兩搗碎炒令黃燥

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一大盞

煎至五分去滓入酒一合更煎三兩沸不

計時候放溫服之一合或煎三兩煎不

治妊娠八九月胎動時有所下腹內病刺疼

痛頭面壯熱口乾手足逆冷兼氣上衝妨悶

赤石脂散方

赤石脂兩白朮半兩當歸半兩地龍壹分

乾薑半兩炮裂判鍾乳粉壹兩蘆根半兩艾葉壹分

微炒芎藭壹兩桑寄生半兩鹿茸壹兩去毛壹兩熟

乾地黄兩厚朴壹兩去蘆皮壹兩香熟壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水酒各半

中煮煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠八九月因落牀或倒地胎有所傷宜

服

此方右取青竹輕刮取皮二兩以好酒一

大盞煎取七分去滓分溫二服服未可更

作服之○胎產救急方治妊娠八九月攔

撲傷損胎死不出青竹茹五兩酒煎服未

差再作

治曾傷九月胎預服茯苓猪腎湯方

白茯苓一兩桑寄生壹兩乾薑半兩熟乾地黃壹兩  
白朮壹兩芎藭壹兩人參壹兩去蘆頭壹兩麥門冬壹兩  
去心壹兩

右件藥細剉和勻每服用獐猪腎一對切去脂膜先以水壹大盞半入黑豆半合煎至壹盞去腎及豆入藥壹兩煎至七分去滓食前分溫二服

治妊娠十月滿足八月預服甘草散方

甘草壹兩炙壹兩黑豆壹兩炒壹兩乾薑半兩炮壹兩糯米壹兩

壹兩吳茱萸半兩湯浸七炒壹兩大麻子壹兩白茯苓壹兩

右件藥搗細羅爲散每於食前以煖酒調下二錢若未入月不得輒服神巧萬全方同

治妊娠驚胎諸方

夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿或將產其胎神識已具外有勞傷損動而胎在內驚動也治妊娠因用力執作覺胎動心腹急痛面青汗出頭仰氣喘欲絕服諸藥安胎無效又名

驚胎宜服茯苓散方

白茯苓

桔梗

去蘆頭

生乾地黄

人參

去蘆

頭桂心

當歸

剉微炒

釣藤

獨活

桑寄

生

赤芍藥

剉微炒

石膏

已上一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠端然有所見驚胎流下不安若跳動

心中痛安胎桑寄生散方

桑寄生

芎藭

白朮

當歸

剉微炒已

上各壹兩

白茯苓

三分

甘草

半兩炙

微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治妊娠數月已來舉重驚胎小腹疴痛不可

忍熟乾地黄散方

熟乾地黄

阿膠

搗碎炒

艾葉

微炒

芎藭

杜仲

去皺皮炙

當歸

剉微炒已

上各一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

蓋入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

治妊娠被驚胎動向下不安小腹連腰痛當歸散方

當歸剉微 芎藭 阿膠搗碎炒 人參去蘆

白茯苓已上各壹兩 艾葉半兩微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治胎上逼心諸方

夫妊娠將養得所則氣血調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦難而子上逼於心者山產難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心也凡胎上逼心則悶絕胎下乃蘇甚者至死也治妊娠胎上逼心下血不止阿膠散方

阿膠搗碎炒 芎藭 當歸剉微 熟乾地黄

已上各壹斤以水壹 青兩 銀剉煎至五升

右件藥搗篩為散每服四錢以銀汁壹中

蒸煎至六分去滓不計時候溫服

治胎動逼心煩悶欲絕安胎止痛桑寄生散

方

桑寄生

當歸

剉微炒

芎藭

人參

去蘆頭

甘

草炙微赤剉已

上各一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫

服

治胎上逼心煩悶委頓當歸散方

當歸

壹兩剉微炒

甘草

壹兩炙

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

人參

壹兩去蘆頭

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入葱白七寸煎至六分去滓不計時候溫

服

治胎上逼心痛熱下血方右取麴半斤搗碎

和熱水絞取汁三中盞不計時候分溫五

服婦人大全良方同

○良方云一方治胎動腹痛

連腰川麥麴新汲水調下一方用神麴大

同小異

治胎上逼心煩悶方右取葱白不限多少濃煮汁飲之神巧萬全方同

治胎不順胎上逼心方右取烏犬血少少飲之當下良方同

治妊娠墮胎後血下不止諸方

夫墮胎後復損於經脉經脉既虛故下血不止也下血多者使致煩悶乃至死矣

治妊娠損胎下血不止腹內疼痛地榆散方

地榆三分乾薑一分炮當歸二分龍骨一分

芎藭三分艾葉半兩阿膠三分熟乾

地黃兩蒲黃兩黃牛角腮壹兩白朮兩烏

賊魚骨三分

右竹藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下二錢

治妊娠損胎後下血不止當歸散方

當歸三分龍骨一分地榆半兩艾葉兩阿

膠三分牛角腮壹兩熟乾地黃分芎

芎參白芍藥兩乾薑半兩黃耆半兩  
微炙 三分  
 右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調  
 下二錢

治妊娠損動血下不止腹痛宜服此方

阿膠壹兩艾葉半兩  
炒令黃燥

右件藥以水壹大盞煎至六分去滓食前

分溫三服婦人大全聖濟總錄治妊娠漏

胎下血過多膠艾湯方阿膠半兩艾葉半兩

膏右二味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞

煎至七分去滓溫服早晨午時晚間各一

治妊娠損動血下不止方

甘草壹兩阿膠壹兩  
微赤剉 搗碎炒令黃燥

良方雞子  
壹  
二兩

右件藥以水二大盞煮甘草取壹盞三分

去滓次下雞子及膠候膠銷熟攪不計時

候分溫三服

治墮胎後惡物下四體虛困悶不能自勝艾



葉散方

艾葉叁分地榆壹兩乾薑叁分炮常歸壹兩

微炙赤石脂叁分

右件藥搗細羅為散每於食前以淡竹瀝調下二錢

治妊娠三兩月後或時傷損下血不止遠臍

疼痛吐逆悶絕白膠散方

白膠二兩搗碎人參去蘆半夏易浸七遍去滑秦

芎去苗紫葳各一兩甘草炙微赤判已

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

盞入葱白二莖煎至六分去滓不計時候

溫服

治妊娠損胎後下血不止當歸散方

當歸叁分判熟乾地黃壹兩鹿茸叁分去毛

白膠壹兩搗碎艾葉半兩甜葶藶根叁分附

子半兩炮裂黃芩半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治因損娠下惡血不止龍骨散方

龍骨

三分

當歸

三分

地榆

三分

艾葉

阿膠

三分

黃燂

熟乾地黃

壹兩

蒲黃

半兩

屑

三分

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時時寒

熱狂悶方

鹿角

二兩

燒為

灰細研

為散每於食前以粥飲調

右以小壺大盞煎豉一合取汁六分分爲

三服每服調下散二錢日三四服

治妊娠下血疼痛不止方

婦人大全良方亦治小便不禁

以家鷄毛燒灰細研以溫酒調下二錢如

人行五里再服以效為度

治妊娠數墮胎諸方

夫陰施陽化

巢氏病源婦人大全良方陽施陰化

故得有胎榮

衛和調則經養周足故胎得安則能成長若

血氣虛損者子藏為風冷所居則血氣不足

故不能養胎所以墮胎數也其妊娠而腰疼者喜墮胎也

治妊娠數墮胎皆因氣血虛指子藏風冷致令胎不堅固頻有所傷宜服卷栢丸方

卷栢 鍾乳粉 鹿角膠燒碎炒 紫石英令黃燥

細研水 陽起石細研水 桑螵蛸微炒 熟乾地飛過

黃 禹餘糧燒醋淬七遍 杜仲去麤皮炙

芎藭 當歸剉微炒 桂心 牛膝去苗 桑寄生

五味子 蛇床人 壯丹已上各參分

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下

三十九婦人大全良方三四十元

治婦人風冷在子宮致有子恒落宜服補益

紫石英丸方

紫石英細研水 天門冬去心 五味子 禹

餘糧燒醋淬 川椒去目及閉口 卷栢 烏

賊魚骨 桑寄生 石南 杜仲去鱗皮

剉當歸剉微炒 澤瀉 肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙乾

桂心 不斛去根 栝子人參去蘆 辛

蕘 雲母粉已上各 川烏頭半兩炮裂 遠

志半兩 甘草微赤

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以

溫酒下三十九○婦人大全良方主風冷

在子宮有子常落或始為婦便患心痛乃

成心疾月水都未曾來服之肥悅令人有

子紫石英天門冬去心 五味子各三 烏頭炮

卷栢烏賊魚骨雲母燒 禹餘糧當歸川椒

如常 桑寄生石楠葉各 乙澤瀉杜仲遠志

去 菴蓉桂心甘草石斛人參辛夷栢子仁

各二 右為末煉蜜為圓如梧桐子大溫酒

下二十圓至三四十圓

治懷胎數落而不結實者此是子宮虛冷所

致熟乾地黃散方

熟乾地黃壹兩 吳茱萸半兩湯浸七乾 薑半

炮裂甘草半兩炙 芎藭壹兩 人參壹兩去 白

類聚 卷五

百九

木一兩當歸壹兩黃耆壹兩

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢神巧萬全方同

治妊娠胎動安不得却須下諸方

夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭

既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者

則可下之免害妊婦也

治胎動安不得尚在腹母欲死須以牛膝湯

下之方

牛膝半斤去苗○婦人去苗水銀貳兩朱砂貳兩

研良方

右件藥以水五大盞煮牛膝可餘壹半去

滓即以小蜜和朱砂及水銀併如膏每服

以牛膝汁壹小盞調下半匙頻服

治妊娠母因疾病胎不能安可下之桂心散

方承前鈔方此下云一方加鱗爪為末酒調

桂心貳兩牛膝貳兩去苗○蘧麥壹兩○婦

方貳當歸方乙兩良

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞煎至六分良方七分去滓每於食前溫服治母因篤恐不濟去胎方

蚩蟲十枚微炒令黃

右擣細羅為散以煖酒調服即下

又方右擣菖蒲根絞取汁飲半中盞效

治臨月損動不可安方

斷弓弦貳寸箬箬一枚燒灰

右件藥合研令細以清水調頓服

治婦人腹內有鬼胎諸方

夫人腑臟調和則血氣充實風邪鬼魅不能于之若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於藏狀如懷胎故曰鬼胎也

治婦人經脉不通一月至三箇月復內有氣塊發來從脇下起衝心此是鬼胎宜服穿山甲散方

甲散方

穿山甲三分炙牡丹半兩去鬼白

壹兩驢護干一兩蒲黃壹兩當歸叁分蓮子兩川

大黃

半兩剉碎微炒

桃膠

二分

檳榔

一分

右件藥持篩為散每服三錢以水酒各半

中盞煎至六分去滓每於食前溫服

治姪娠是鬼胎致腹中黑血數下腹痛雄黃

丸方

雄黃

細研

鬼臼

去毛

莽草

丹砂

細研

巴豆

去皮心研

紙裏壓

獺肝

炙令黃已

蜈蚣

壹枚炙黃

蜴蜥

一枚

黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大空腹溫酒下二九日再服後

當下利如不利加至三九初下清水次下

蟲如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蠟

鷄子或如白膏或如豆汁其病悉愈

治婦人鬼胎及血氣不可忍方

班猫

五枚

麩

炒令黃色去頭足

延胡索

叁枚

微炒

右件藥研如麩以溫酒調下半錢以胎下

為度

治婦人經脉不通癥塊脹滿腹有鬼胎方右  
 取葛上亭長五枚以糙米相和炒令熟去  
 翅足碾為末分三服空心煎甘草湯調服  
 須臾覺臍腹急痛煎黑豆湯服之當通  
 治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通方右以  
 芫花根三兩剉炒令黃色搗細羅為散每  
 服以桃人湯調下壹錢當下惡物婦人胎  
 何一服不除再服三服不除再服六不  
 或治妊娠中惡諸方斷不二三服再服

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之  
 中惡言惡邪之氣中胎傷於人也所以然者  
 血氣自養而為精神之主若血氣不和則精  
 神衰弱故厲毒之氣得中之妊娠之病亦致  
 損胎也

治妊娠中惡腹痛心悶犀角散方

犀角屑一兩 川升麻參分 木香參分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞  
 煎至六分去滓不計時候溫服



治妊娠中惡心腹疔痛當歸散方

當歸參分剉微炒 芎藭參分 青橘皮半兩湯浸去白瓢焙 雞

舌香參分 吳茱萸半分湯浸參遍炒令微黑色

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下一錢

又方生乾地黄壹兩 木香參分 枳殼參分麩炒令黃去穰

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

又方朱氏集驗方 良薑湯治 高良薑壹兩 蓬莪

朱氏集驗方良薑湯治

治高良薑壹兩蓬莪

茂兩壹

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

又方赤芍藥壹兩 檳榔兩壹

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下一錢

又方吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒 當歸一兩剉微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以醋湯調

下一錢

又方右以桔梗壹兩細剉以水壹斗煮入生薑半分肘後方煎至六分去滓不計時候又溫服

醫方類聚卷之二百二十三