

新刊仁齋直指小兒方論


虹橋涉川足以為福田乎漆浦濟人不足
為惠然成者有時而壞也紅粟振勵不足
為陰德乎醫桑待哺不能家給然利者有
時而病也人生天地間溥万物為一體參
大造為全仁盍思所以廣其濟余每見人
以疾痛為憂財匱者無力召鑿力到者無
鑿能療雜藥偏嘗付性命於一擲未嘗不
為之扼腕焉於是竊暇燈幽研精脉法上
稽靈素之書下及湯液之論張長沙鳴於

漢孫地仙鳴於唐与夫晉宋而下諸賢之

所撰次者搜覽迨盡將以推廣不憚人之
仁就是而得三昧竊謂大科傷寒法度為
甚嚴小科驚風方論為難盡傷寒治法表
裏陰陽出入傳變若網在綱固不容紊若
夫嬰兒驚風急轉而慢實俄而虛形似實
非尤難臆度自非審脉驗證違變知幾鮮
有不以嬰兒為戲此驚風証治指要之所由
作也證以言驚風之狀治以言驚風之方
指者直訣以曉人要者精義以致用王氏
非無家傳然方粹而證不詳錢氏非無誤

法然義深而方難用是編所作本之前聖
大賢之方論叅之聞人高士之見聞得之
先疇已試之効虛實補鴻之辨其訖參苓
桂术之隨其方覽者歷々可曉惠之方來
傳之同志使據病可以識證因證可以得
方為天下挾提固生立命起憇扶衰倘執
此以登盧扁之門或可為消埃萬分之助
周流人間衛生救物獨不得如封君達之
用心乎經刺諸梓嘉與四方共之庶幾廣
濟於無窮也或曰子胡不私諸已為家傳

計余應之曰喜捨方便釋氏書第一義也
政使學者復之熟之推是以及人之幼有
善南陽一書余嘗紬繹其說目曰悟人總
括嗣此以求其傳堂上呼盧喝六作五小
子則不敢知景定庚申開朔三山郡北后
曹楊圭瀛燈父自序



新刊仁齋直指小兒方論目錄

環溪書院刊行

○卷之一

初生

○初生噤風撮口脣風方論

風噤方

控痰散

益脾散

辰砂膏

僵蚕方

甘草湯

撮風散

蜈蚣方

蜘蛛方

牛沫方

立聖散

安脣散

俾脣方

脣風鐸口方

千金龍膽湯

朱銀圓

天麻圓

定命丹

○初生不乳證治

伏苓圓

治胎寒腹痛方

治惡穢入腹令兒嘔吐不止方

○變蒸

○變蒸方論

○變蒸證治

柴胡湯

紫陽黑散

紫圓子

當歸散

調氣散

○驚馬

○急風慢風慢脾風總論

虎口三閘紋訣法

○驚風方論

○驚風證治

全蝎散

羌活膏

來復丹方見暑門

星香散

本事人參散

至寶圓

驅癇散又方

雌黃散

消驚圓

壓驚圓

安驚圓

參砂膏

定心圓

○驚熱方論

驚熱證治

犀角湯

銀棗湯

清心圓

伏神圓

膽星圓

羚羊角湯

胎驚

○胎驚方論

胎驚證治

太一散

參蝎散

猪乳膏

全蝎散

朱麝散

獨活湯

朱銀圓

千金龍膽湯

○通關定驚方論

通關定驚證治

開闔散

開牙散

嘯驚散

開闔聖散

○截風定搐治法

人參羌活散見瘡門

一字散

陽癇散

擒風湯

定搐散

瀉青圓

木通散

清寧散

阿膠散

定命丹

利驚圓

防風湯

宣風散

枳殼散

小柴胡湯

方見發瘡門

朱砂膏

○治驚稍重下法
疎風散

揭風湯
小柴胡湯

朱砂膏

○治驚董下法

青金圓

天麻圓

蘆薈散

牛黃涼膈圓

青金丹

王監京墨圓

○和胃助氣治法

生氣散

銀白散

伏苓二陳湯

異功散

天麻蘇合香圓

天麻防風圓

蘇合香圓

方見血氣門

參苓白朮散

和中散

醒脾散

方見驚門

定志圓

溫膽湯

定心圓

百枝膏

○卷之二

慢驚證

○方傳慢驚證治法 太一保生丹 聚寶丹

蠅蝎散

神保既濟丹

聚寶丹

王氏惺惺散

醒脾散

來復丹方見血氣類

溫白圓

大醒脾散

○已傳慢驚證治法

星香全蝎散

定命飲

四聖散

烏蝎四君子湯

南星散

烏沉湯

沉香散

○慢驚下痰證治法

天南星圓

蘇合香圓方見血氣門

白圓子方見血氣門

神保既濟丹方見血氣門

礞石散

靈脂圓

七珍圓

○慢脾風生胃回陽治法

金液丹方見血氣門

黑附湯

川烏散

生附四君子湯

生附四君子湯

蝎附散

陰癪散

靈砂

震靈丹

方見血氣類

急慢脾風

○慢脾風下來證

神保旣濟丹

見慢驚門

白僵蚕圓

辰砂膏

七寶妙砂丹

○急慢脾風證治

星蘇散

木通湯

神聖圓

虎蝎圓

南星醒神散

鎮心圓

木香湯

乳麝圓

太一萬金丹

香餅子

至聖保命丹

蟾蝎散

快脾湯

助胃膏

沉附湯

鎮痰圓

利痰圓

客忤

○客忤方論

客忤證治

雄麝散

蘇合香圓

麝香飲

犀角散

安神圓

伏龍肝方

千金龍膽湯

馬尾方

驚風雜治

○驚積方論

驚積證治

辰砂膏方見風
禁門

青龍圓

朱銀圓

○天癆方論

天癆證治

釣藤飲

保命丹

○驚風內癆方論

附盤腸氣虫痛

驚風內癆證治

乳香圓

木香圓

驚風內癆證治

蘿蔔子散

化虫圓

驚風內癆證治

茴香散

芎歸散

驚風內癆證治

養臟湯

驚風內癆證治

驚風內癆證治

中風方論

五臟俞穴

中風證治

桃風湯

小續命湯

交濟湯

攝生飲

星香飲

附子散

阿膠散

追風毒剉散

肥兒圓

星蘇散方見前

木通湯

通關散方見前

癰疽

癰疽方論

癰疽證治

小續命湯方見中
風門

防風溫膳湯

敗毒散

小柴胡湯

大承氣湯

麻黃葛根湯

桂枝葛根湯

理中湯

三生飲

發癟

○發癟方論

諸癰不治證候

風癰證治

散風丹

保安圓

獨活湯

細辛大黃湯

牛黃圓

○驚癇證治

比金膏

鎮驚圓

燒脂圓

七寶鎮心圓

清神湯

密陀僧飲

紫霜圓

妙聖丹

天麻圓

方見急驚
重下附

○定癇治法

錢氏五癇圓

南星散

猪心湯

本事雌黃圓

蛇黃圓

斷箭圓

當歸大黃湯

蝎虎散

代赭石散

日應丹

地龍散

定癇圓

全蝎五癇圓

金朱丹

千金龍膽湯

方見胎驚門中

星朱散

猪膽南星散

肥兒圓

方見風門中

論髮際穴

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

論蜈蚣有毒

痺

諸痺方論

諸痺證治

集聖園

嘔痺散

黃連肥兒圓

大蘆薈圓

脂連圓

五痺良方

胡黃連圓

至聖圓

通神圓

伏神圓

天麻圓

生熟地黃湯

地黃圓

靈脂圓

清肺飲

化蠱圓

黃連圓

下虫圓

龍膽圓

褐圓子

黃耆湯

木香圓

蚘坡圓又方

十全丹

五珍圓方見
積類

挨癬圓方見
積類

小黃連阿膠圓

龍膽湯

○痺瘡方論

痺瘡證治

豬肚黃連圓

火 積

○積滯方論

木香圓

大異杏散方見脹
滿門

○和劑異香散

和劑流氣飲並脹
滿門

下積圓

五珍圓

挨積圓方見
脹類

辰砂膏方見
風寒門

青龍圓方見驚
滿門

朱銀圓方見
驚門

○痞結證治

聖惠甘遂散

取癖圓

○癖氣證治

木香圓方見
滿類

代赭圓

○挨癖圓

熱

諸熱方論

諸熱證治

加味清涼飲

人參芎歸散

猪膽圓

龍膽草圓

○卷之四

傷寒

○傷寒方論

傷寒證治

桂枝麻黃湯

香蘇散

升麻葛根湯

小柴胡湯方見暑門

理中湯瀉類方見水門

甘露飲

四順飲並見熱門

五苓散方見水門

參蘇飲方見瘡門

人參差活散方見眼科門

人參潤肺湯方見水門

紫霜圓方見食門

人參敗毒散

寒瘈

寒瘈證治

常山散

風寒

虛寒證治

地黃圓方見腎門

風寒

虛汗證治

園參湯

撲汗方

○ 痰嗽

○ 痰涎證治

○ 風痰證治

朱砂圓

奪命散

青州謝家白圓子

○ 咳嗽喘嗽證治 杏仁膏

紫苑湯

○ 肝胃

○ 胃氣虛實證治 和脾胃進飲食證治

止瀉

消乳丹

益胃散

○ 嘔吐證治

半夏散

○ 吐瀉證治

雞舌香散

交泰散

又咸方

不換金正氣散方見寒類

○泄瀉證治

鍾乳靈丹鴻觀木香益黃散

肉瘤散

和安散

○瀉痢證治

沒石子圓

赤痢肚熱方

腹痛

○腹痛證治

四順清涼飲見攝門

指迷七氣湯氣門

蘇合香圓方見

桔梗枳殼湯氣門

腹脹

○腫脹證治

草庵散

分氣飲

○陰腫證治

桃仁圓

傅藥

母蠅散又名

○遺尿證治

雞腸散又名

○尿白證治

伏苓散又名

○諸淋證治

葵子散

導赤散

尿血方

○大小便不通證

沒藥散

○脫肛證治

龍骨散

丹毒

丹毒證治

敗毒散方見集類

又方

吐血衄血證治

蒲黃散

地黃汁方

衄血方

雜證

○顛陷證治

顛填證治

解癲證治

錢氏地黃圓又方

口舌證治

口角瘡爛方

重舌證治

木舌證治

滯順證治

喉痺證治

喉痺腫痛方

語遲證治

菖蒲圓

夜啼證治

鈎藤散

眼病證治

眼睛白膜方

耳病證治

龍骨散

月蝕耳方

龜胷證治

龜背證治

臍病證治

安臍散

臍瘡方

鶴節證治

行遲證治

地黃圓

虎骨圓

五加皮散

當歸散

癩疝證治

五苓散

方見水門

川練散

鯽魚子

方見火門

瘡癩證治

漏蘆方

卷之五

瘡疹

諸瘡久不癒方

癰瘡方

魚臍瘡方

蠟蠻瘡方

癬方

前甲散

瘡疹方論

瘡疹備論

瘡疹證候

壞瘡治法

論升麻葛根湯

瘡疹惡證

瘡疹證治

參蘇飲

惺惺散

升麻葛根湯方見目錄類人參敗毒散

方見人參敗毒散

化毒湯

消風散方見頭門

方見頭門

加味四聖湯

紫草木香湯

紫草木通湯

快班散

終瓜湯

犀角地黃湯

大連翹湯

人參羌活散

方見眼門

天麻防風圓

方見積熱門

五苓散

方見水飲門

小柴胡湯

方見寒類

四順清涼飲

方見積熱門

大如聖湯

鼠粘子湯

麻黃葛參湯

桔梗枳殼湯

即方二陳湯

見痰之類

甘草散

烏梅湯

木香理中湯

甘草乾薑湯

獨聖散

宣風散

五福化毒丹

加味宣風散

調解散

不換金正氣散

黃柏膏

豆皮飲

螺蛸散

治諸眼翳翳

斑翳方

扁鵲油劑方

灌藥服藥法

察小兒眼中神法

新刊仁齋直指小兒方論目錄

新刊仁齋直指小兒方論卷之一

三山名醫仁齋楊

登

登又撰次

建安儒醫羣峯詹

宏中

洪道校定

初生

小兒病證惟驚疳瀉痢四者難治古語有之急慢脾風與夫諸風種類余於驚風證治指要言之詳矣諸疳方論於此又詳備焉所闕者惟瀉痢兩件而已然小兒病狀亦不止乎瀉痢如直指方論前後編集諸病證治小兒類有之但病各有原治各隨證由博而約不過大人方法推之也雖然小兒多熱用藥不可過溫惟小小分劑調而平之毋至以藥勝病則得之矣其他嬰幼證類大人所無者併與名方駢集于後

初生噤風撮口脣風方論

津小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆不通蓋由胎中感受執氣流毒於心脾故形見於喉舌間也抑亦生下復爲風邪擊搏致之自滿月至百二十日見此名曰犯風禁依法將護防於未然則無此患○撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救藥其或肚脹青筋吊腸疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利撮口最爲惡候一臍內見之尤急○臍風者斷臍之後爲水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身躰重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發爲風搐若臍邊青黑撮口不問是爲內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胷堂伸引努氣亦令臍腫可與子金龍膏湯如前三者受病之源非一朝夕大抵裏氣鬱結壅閉不通並用取下胎毒

盛若有微患即須下之若不時下則成大疾疾成則難療矣

紫圓子可量用之

方見燮蒸門

噤風撮口脣風證治

鳳螺方先用四錢散吐風涎次與益脾散和胃又用辰砂膏利驚即愈或手捉拳噤口不開者不治

蝎尾

銅青各半錢朱砂壹錢

膩粉壹字

麝少許

右爲末每服壹字臘茶清調下先吐風涎然後和胃或後段
吐痰隨輕重用

白伏苓

人參

草果

木香

濕紙裹熱灰內煨

甘草炒

陳皮

厚朴製

蘇子炒

右等分爲末每壹錢薑棗煎服

辰砂

參錢

鵬砂

馬牙硝

各壹錢半
玄明粉貳錢

全蝎

珍珠

壹錢
末各

麝

壹字

右爲末和畢用好單包起自然成膏每服壹豆粒許治諸驚

金銀

酒湯下潮熱

風寒湯下月內用

乳汁調傅妙上令丸下

僵蚕方

治撮口

直僵蚕貳枚去筋略炒爲末蜜調傅啞口中

甘草湯

治撮口取吐

甘草

生壹錢

右剉煎服令吐出痰延却以猪乳點入口中即瘥

撮口散

治撮口

赤脚蜈蚣

半條炙

釣藤

壹分一朱砂

直僵蚕

半錢

血竭

梢各壹錢

麝

壹字

右爲末每服壹字取

酒

調下

丸解熱

治口噤不開不能收乳

赤足蜈蚣半枚去足炙令焦
右爲末入麝少許以酒一合和之分參服

小兒口
噤不開最良

治口噤不開不能吮乳

蜘蛛壹枚去足及口炙令焦細研

右用蜜一含調和爲參服徐徐灌之神妙至矣亦用蜘蛛

并

取東行手口塗覓口及額上即效

聖散治小兒口噤

蝎梢七箇

乾蜘蛛

一箇去口足先以新竹片火上炙取竹油
蛤殼許乃竹油也浸蜘蛛一宿炙令焦

右同末研極細入蜜少許每壹字用

蜜汁調時時滴入口中

小兒斷脣後便傳之

赤蜈蚣一枚炒

鈴羊角一錢

亂髮一團燒令烟出

不斷各存性

麝少許

雀糞三枚

右爲末斷臍後便傳之

傳臍方

瓜蒂

南星

白斂

赤小豆等分

右爲末每參錢用芭蕉自然汁調傳臍四邊

臍風藥

金頭蛆

蛇蝎梢五箇

直僵蚕七箇

瞿麥半錢

右爲末每壹字吹入臍內啼則可醫仍用

臍風藥調壹字服

子金龍膽湯

方見胎驚門

朱銀圓

方見胎驚門

大麻圓金龜急驚下劑

初生不乳證治

嬰兒初出胞胎其聲未發急以手拭掠其口令惡血淨盡不得下咽則無他病若拭口不順氣入腹則腹滿氣短不能飲乳

或產婦取冷過度胎中受寒則令兒腹痛不肯飲乳熙穢入暖

宜用

伏苓

赤伏苓

川黃連

去鬚枳殼炒

右等分爲末陳蜜圓桐子大每壹圓乳汁調灌下

治胎寒腹痛方

木香

陳橘皮

檳榔各一分

辣桂

川白薑生

甘草炙各半分

右末取壹捻水煎以綿蘸與之

治寒氣入腹令兒嘔吐不止方

木香

乾薑生各半分

伏苓

甘草各一分

酸木瓜

丁香各半分

右籠末壹捻水煎以綿與之

變蒸

變蒸方論

變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形神成就是五臟之變氣而七情之所由生也三十二日一變其後三大蒸總五百七十有六日變者上氣蒸者神熱每經一變情態即異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相若亦有變蒸之餘續感寒邪者但變蒸則耳冷腮冷上唇發泡狀如濁珠若寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝則目昏微赤蒸於肺則嘔噦毛聳凡五臟六腑筋脉骨節皆循環一匝各有證應其陰陽水火之變數治法和平之劑微表熱實者微利之或不治亦自愈

變蒸證治

柴胡湯治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

甘草

微各

麥門冬

柴胡各二錢

龍膽草

防風

名壹錢

右判散每服參字煎服

紫陽黑散解利執氣

麻黃

壹兩不去節

大黃

半兩

杏仁

去皮三分

右件同一處擣和並略燒存性再以少許研膏和之密器盛每用壹豆許乳汁和咽之

朱圓子疏利積氣實熱

代赭

壹兩塊醋淬

赤石脂

柒錢

巴豆

貳拾枚去心去油

杏仁

伍拾箇炒過板

右朱圓子疏利積氣實熱先擣末和巴豆擣三千杵若硬加蜜少許更擣圓如粟米大用密器收每服貳圓以乳汁送下如更有熱不出明日再與二圓此藥兼治驚積痰癥食癪溫症諸疾

當歸治變蒸有寒無熱

當歸

貳錢

木香

官桂

辣者

變蒸

甘草

人參 各壹錢

右剉散每服壹錢薑棗煎食前服

調氣散治變蒸吐瀉不乳多啼

木香

香附

厚朴 製

人參

橘皮

霍香

甘草 各壹錢

右爲末每服參字薑棗煎服

驚

急風慢風慢脾風總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽癇是爾急者屬陽陽盛而陰虧慢者屬陰陽虧而陰盛陽動而燥疾陰靜而遲緩其始也皆因臟腑虛而得之虛能發熱熱則生風是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺而心亦主熱天官疾醫注云肺氣熱心氣寒火之驚風痰熱合爲四證四證已具八候生焉搖搖掣體反引肩

側口八候凡搭眼搖頭張口出舌唇紅臉赤面青眼青唇青
青太陽髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風狀也
大抵熱論虛實證別逆順治有後先蓋實熱爲急驚虛熱爲慢
驚慢驚本無熱所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢
驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也
男搖左視左女搖右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出外
女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此
皆順反之則逆亦有先搖左而後雙搖者但搖順則無聲搖逆
則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難
痊目属肝肝受風熱則目直視或上竄或兩目頻搖若無臉赤
五心煩熱之證却不發搖必挾心熱則肝風心火二者交爭而
發搖也但竇視直視者與渴青圓更加發搖者以導赤散兼之
大抵肝風心火乃急驚受病之要渴青圓去肝風導赤散降心
火幼勿新書以爲要藥故曰證別逆順者此也陽病陰勝陰陷病

陽脉亦反熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先於

截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也綱領如此若析急慢脾風而言之則暴烈者爲急驚沉重者爲慢驚而慢脾則重而深矣急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動弱者十指開合唇口眉眼引頻併口中熱

氣頰赤唇紅大小便黃赤其脉浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭血亂氣并痰涎壅塞所以百脉凝滯關竅不通風氣蓄盛而無所泄故暴烈也治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐痰熱尚作迺下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚雖當下切不可過用寒涼及銀花銀花甘草湯太驟人氣急者忌用

清半夏等劑醫家不得已而用之僅去痰即止或不當用

而用或當用而過焉往往由此成慢驚矣

下痰熱之不正之用銀粉巴硝但能斟酌大黃可也

欲下之法須當審問前人已下未

下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱

而已大約痰熱十分且泄其二之二下劑中須以

枳殼

高通寬

氣通心之類佐之蓋急驚急在一時治之不可寬緩稍緩則證

候轉深若一時體認未明又不可妄施藥餌○截風定搐先與

通風驚鞶次則入參麦桔散

截風圓

以意擇用

○下劑有三清圓木通散清寧散阿膠散

以意擇用

下劑

輕下則用定俞丸

和圓通風散

以意擇用

○稍重下則用鴻風湯

和圓通風散

以意擇用

下則用青金圓

和圓通風散

以意擇用

圓鞶○下後和胃助氣如白朮散銀白散大黃之陳湯黑散

天麻蘇合香圓

以意擇用

之類皆可選用

定志寧神則以安神圓

以意擇用

與之他如六方

不冷不熱祛風鎮驚之劑又當繼此以防其再發也下之後諸證猶存者未易痊愈更勿再下當作慢

驚理之○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者未可

直指以爲驚風恐是傷風傷寒傷食成三等證或夾驚而成如

錢氏假搐之說

傷風夾驚神困昏悸頭疼氣亂先用人參羌活散惺惺散消風散輩微取其表次與天麻防風圓傷食夾驚身

熱溫壯或吐不思食大便酸臭先用人參羌活散加青皮紫蘇

取表消積次用驅風鎮驚之劑凡搐搦者不可把握但扶持之

否則風癇逆入經絡遂使手足拘攣以成廢疾此治急驚之大

要然也

慢驚之候或吐或瀉涎鳴微喘眼閉神緩睡則露睛驚

跳搖搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色
淡白淡青首間脣間或青或紫其脉沉遲散緩蓋由急驚過用
寒涼或轉下太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴
吐瀉而成者

錢云夏月脾胃伏熱大吐瀉者當解暑熱不可導

固陽有臟腑虛洞泄成者

風邪入於腸胃故大便不堅而泄

有久痢氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成者有感風不解誤藥成者有傷寒傳變陰證成者有得之久敷作癧者有得之發癧不已者有得之虫積衝心者有得之知腫疝氣腹痛者其或日夜汙出脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便閉丹瘤腫毒龍帶驟腰走馬急瘡並傳慢候惟吐瀉積痢成虛致之則證變甚速

經經吐瀉便是慢驚須用溫中扶裏或搐來緊急

乃慢驚初傳尚有陽證不可誤作急驚用藥出言搐慢爲慢驚非也若泥此往往指慢脾爲慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重治法大要須當審問源流不可槩曰慢證如吐瀉得之則

理中湯加芍藥

以溫其中

五苓散

以導其水

臟寒洞泄得之則先與之

附子理中湯

下積取轉得之則先與

附子理中湯

助導輩其他可以類推矣然

慢驚雖屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深如何不可純用溫藥及

燥烈太熱之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如金匱要略

百合湯

天門冬

黃芩

葛根

白芍

甘草

八味湯

尚

不必回陽但與截風調胃可冷可熱均平陰陽而已

在人體內之陽氣皆爲良○方傳慢候而尚有陽證者

八候尚

驚無搐掣反引竄視之證而但昏沉者與天門冬全類以爲合之屬○若手

四聖散

烏鵲四君

天門星散

葛根散

白芍散

甘草散

足冰冷者方可回陽用

金匱要略

附子散

附子散

附子散

附子散

圓散

金匱要略

附子散

附子散

附子散

附子散

痰者

七珍丸

如腦麝銀粉巴霜寒涼通閔利腸輩一切

但見引搐誤用腦麝銀粉及寒涼輩必爲慢脾陰逆若慢驚之

候其眼半閉半合則當預作慢脾風調理之於斯時也陰氣易

盛陽氣易微時刻少延則熱力不及頻併投藥則勢又不可總

惟一二瀨須審有無搏數稍定則和平爲愈勢篤則以剛劑投之此治慢驚之大要然也慢脾風之症面青額汗舌短頭低脣合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭禁口咬牙手足微搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛風凡小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此必得慢脾風纔見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗其體沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又當識之治法大要生胃回陽黑附湯白烏敵金液丹白圓子各半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則裏火散輩溫平而調理之如竭附散、陰附散、靈砂靈丹等亦可參用。若其眼半開

半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽○或已入慢脾而
陽氣未甚脫者亦不可用補黃附子凡服回陽湯刺手足漸緩
者仍以驅脾散等繼其後以調之○慢脾下痰輕者礞石丸
丹白僵蚕圓重者辰砂膏其則小寶丹矣慢驚慢脾逆惡證
候諸藥不效者如有太衝脉則取百會穴灸之此治慢脾風之
大要然也灸百會穴詳具于後雖然小兒有病問之則幼不能
言望之則易驚易喜診之則或惕或動自六歲以下黃帝不載
其說者以其難也又况驚風一科古無全書則尤爲難如前所
云固足以知二證之詳矣至於辨析體認通變之際有言而不
能盡其蘊者可不深加之意乎驚風一也痙痙發癇卒中天癱
撮口亦風之種類焉○痓者手足冰冷瘛者舉身僵仆瘲者未
病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗肢體強直腰身
張甚於風癇大抵不治○瘲者目瞪涎流神氣鬱勃四肢不
沉默昏潰似死似生其聲應叫身動時醒有聲者爲癇身強

不醒無聲者爲瘧症凡治瘧遇咬不啼叫者須去通心行小便

利癥亦多種錢氏有牛羊雞犬豬之說大抵以風驚食三證別而治之○中風者五臟各有脉證隨五臟俞以施灸法與大科則同特小小分劑耳○大過者身體壯熱翻眼擡精手足搐掣其狀如魚之上釣又內弱腹痛多啼唇黑陰腫脹悽反張眼有紅筋血乃寒氣壅結兼驚得之○

○撮

一臍內之驚疾臍

風胎風鎖肚吊腸卽疝俱至撮口蓋風入心脾故令小兒氣促口撮如囊而不乳也○其有初生百日頻頻吐喎呵來噴去睡裏多驚眼翻肚脹手足緩急煩燥多啼者當作胎驚風理之○又有變蒸亦發微驚不治自愈○又瘡豆欲發亦或搖掣如風右臈冷脚冷尻冷耳後有紅脉赤縷者必是瘡豆之證戒不可以○開腠及○轉下而水壓之是辨析之不可不審也至若眼陷無光白睛灌人爪甲青黑四體垂蟬一臍氣絕不可勉強下藥面赤如絳面青背冷頭目仰後足冷目青腹脹脅

可勉強下藥

。

高手掣曾膈唇舌顙黑魚口氣龜頸腫竊坑啼哭無淚冷汗不止汗出如珠如油眼青濁黑血闌涎入心肺噦舌出口咬人五硬五軟五冷五乾皆惡證也。急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺跳腹肚搖動或神緩而摸體尋衣或證罷而神昏氣促噴濁不下通閨不嘵心中痛絕忽大叫者難愈。暴驚四肢厥冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛鴟聲兩脇動氣口生白瘡胃閉損也髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊。慢脾身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背母口噤頭搖者最難爲力。或者慢驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸龐大脉來浮數是謂陰盛陽錯認以爲陽氣已復直與峻藥下痰隨藥下氣隨痰絕人以醫殺咎之此則不識覆燶將絕之證雖不下藥亦無生意矣。又有喉中痰涎聲如拽鋸一兩日間但閉目不開者此爲虛候之極虛痰飽養其氣然化痰還下痰亦未可保姑以爲急證。

之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其後淹延以至
沉重若急驚證候徒知定搐不去驚熱纔見搐定遂指爲安未
幾復搐是爲過街候○若慢驚之候藥服已瘥尚虛之數日未
省者或妄攻之則前功俱廢是體認之不可不精也其或傷風
傷寒傷暑傷濕傷食停積疳勞煩渴盤腸肚痛諸瘡疽皆因

之而發風須當體認隨其證療某病正病去則風自去矣按錢

氏方小兒發搐身熱喘急目斜露睛四肢逆冷李醫既以定驚
搐一劑與之殊無主對錢遂別之曰發搐爲肝實身熱喘急爲
肺虛目斜露睛爲肝肺相勝四肢冷爲脾虛治法先用益脾補
肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安○一證直視而不能食或謂
神祟使然錢知其爲肝旺勝脾與之瀉肺而愈○一證吐瀉或
利小便過多以致脾虛不食錢用瀉脾散作效已經數日忽爾
不語衆醫類以大黃湯劑主之竟無寸效錢氏用大黃圓散劑
補腎於是能言所以然者前平清利小便太過遂使脾胃俱虛

雖已補脾而腎尚虛故爾○至論肺虛痰實治法當下故下之必先益脾然後瀉肺經云欲瀉其子先補其母此錢氏要訣錢氏方

圓潤清潤散利肺氣兼養陰氣乃瀉五臟藥

白虎散利陽散利陰皆補五臟藥

心驚熱清心而熱

不退則與之助胃胃不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便難則不爲之疏利蓋利之則胃愈虛而身必冷○其有傷風寒而吐瀉者欲止吐瀉不特溫脾須以發散之劑先之風寒散而吐瀉自止矣不特此爾小兒平常服藥過多頑玩臟腑調和之劑不愈則易之以攻擊固守之劑太過則時平而疏利主治在此不可不問源流不可偏徇病家所欲圓機達變消息輕重而應之是通變之不可無法也大槩小兒臟腑柔嫩易寶易虛易冷易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎目視指功力度心惟醫權藥篤斟酌對治用之得中爲上矣

虎口三閨紋訣法

虎口者义手處是也三關者第一指之三節是也

除拇指為弟

一指近虎口第一節爲初關亦名風關第二節爲中關亦名氣

關近指端第三節爲末關亦名命關男以左手女以右手側看之驚風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而紫看病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑

青而紋亂者病

深重若見純黑危惡不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫伸縮來去主慢驚風紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾風丸手紋在初關者易治過中關者難治透末關者不治三關直透大抵不治然紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可用力若紋勢弓反出外駁駁靠於指甲者斷不可回其有三關紋如流珠流米三五點相連或形於面或形於身尤甚○陽爲男陰爲女三關虎口紋男以左手女以右手驗之蓋取左手屬陽男以陽爲主右手屬陰女以陰爲主耳然男女一身均

具此陰陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋病應肺脾於此消息又得變而通之之意

驚風方論

驚者虛惕怔忪氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生風而未至風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青眼睛竄視驚邪入腎則面黑惡叫齒咬咬牙驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據脉觀之虛則散而濡實則數而駁治法鎮驚化痰安神定志亦須究竟某臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼之是爲活法睡中驚啼聲浮者易治聲沉不響者難治

驚風證治

全蝎散

治小兒驚風不語通

豁痰大人通用

全蝎染枚各用紫蘇葉

塗蜜灸重包又塗蜜灸

右細末每服壹字薑汁入蜜搜和含化

卷之三

治小兒驚風痰涎

天麻

赤伏苓各半

羌活

防風各二分半

人參

全蝎

朱砂研

明硫黃

水銀各一分

右

水銀同研如泥次以染味末夾和煉蜜圓皂子大布

壹粒薄荷湯調下

方見暑門

治小兒驚風昏塞以貳參圓薄荷泡湯研灌

不得泄即愈凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與

圓數酌量用

星香散

治小兒急慢風搐搦竄視涎潮

南星

白芷各半分

木香

橘紅各半分

全蝎一枚

右剉細入薑錢肆片慢煎熟灌下大便出涎即愈

本草人參散

治慢脾風神昏痰盛

人參半兩

圓白大南星

一兩切片以生薑汁并藥水各半陰蒲黃帶性

右末每壹錢水壹盞薑參三片冬瓜仁播細少許同煎取半盞作兩參次灌下

至寶圓

治小兒驚風痰熱

螺青半兩

京墨四分

巴豆去油一分

北五靈脂二分半

輕粉

腦各半分

史君子十四箇連殼取肉

麝一字

飛白麵三分

右末并水搜圓桐子大每壹圓水研下

驗澗散

治諸澗口眼相引上視涎流手足抽掣頭項反張腰背

朱砂研

雄黃研

蛇皮炙黃

石膏板通紅出火毒一宿各一分

蜂房炒

遠志取肉蜜

細辛去苗土

麻黃去節

直僵蚕炒

川大黃生

川芎

獨活各一分半

右末每壹錢釣藤入少蜜煎湯溫

調灌大兒增用

文方

雄黃

朱砂等分

右末每壹錢猪心血夾蠶水調下

雌黃

治顛癇方發癓癥嚼舌眼睛暗聲惡

雌黃

黃丹微炒各一兩麝一分研

右細末用牛乳半升發熬成膏即入上項藥築和杵參伍
伯下圓如麻子大每參肆圓溫熟水下日三服

消驚圓治諸驚

人參

天麻

伏苓

朱砂

全蝎

焙

僵蚕

炒

羚羊角

星角各一分

牛膽

釀南星

四分

麝少許

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓菖蒲煎湯調下

驚驚圓

治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫石英

代赭石

蛇黃粉

燒紅醋淬

鐵粉

師過淨者各一分

朱砂

龍齒

白附

遠志肉

薑汁浸炒各一分

右爲末研極細稀麪糊圓桐子大每服壹圓金銀煎湯調下
凡煅石藥以裂爲度不拘遍次研十分細

安驚圓

治諸驚風癇或犬聲異物驚忤打墜不省人事並主之

遠志肉

薑汁浸培各半兩

淨鐵粉

朱砂

人參

伏神

浸培各半兩

全蝎

二十枚箇

南星

中者一宿切細焙

薑

汁

細焙

白附子

各炮二分半

花蛇頭

酒浸

麝

半分

劉恭議方
右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓日浦燈心煎湯調下

建陽

參砂膏

通心氣除膈熱去痰壅

朱砂

人參

南星

炮

伏神

遠志肉

薑汁浸培各半兩

天麻

白附子

炮

僵蚕

炒等分

鵬砂

半倍

麝少許

右爲末煉蜜爲膏桐子大金箔衣每壹圓麥門冬湯調下

驚驚用此

伏神

白附子炮

南星各三分泡

人參

遠志肉靈芝炒

蝎梢各半分

僵蚕十四個炒

乳香二分

右爲末牛膽汁圓桐子大每壹圓金銀煎湯調下

○驚驚

驚驚方論

驚驚者內蘊實熱鬱勃發驚甚則搐掣變而癇耳治法疏導熱氣利驚定心亦有變蒸微驚以其熱盛得之但與輕藥或不治亦自愈

驚驚證治

隼角湯治心驚驚盛

犀角

防風

木通

赤伏苓

桑白皮炒

甘草炙等分

右剉細每參字水煎服

銀朱湯治驚熱潮熱

麥門冬 地骨皮 遠志肉

蜜製人參

伏苓 防風 甘草

各一分培
大黃溫紙煨

右爲末每半錢煎服

清圓治驚熱煩燥

人參 伏神 防風

朱砂

柴胡各一分金箔三十片

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓竹瀝調下
伏神圓治壯熱發驚痰壅直視

南星 胡黃連 天麻

伏神各三分

青黛 牙硝 朱砂

各一分麝一字

右爲末粟米糊圓桐子大每服壹圓石菖蒲荆芥煎湯調下

龍星圓鎮心厭驚利痰解熱

牛膽南星半兩
朱砂

防風各二分

麝一字

右用臘月黃牛膽汁和南星末作餅子掛當風處四十九日
和下項藥末研細浸牛膽皮湯為圓如桐子大每服壹圓并

花水調下

羚羊角湯治諸驚壯熱

羚羊角

蟬殼半分

伏神去心

麥門冬

柴胡

地骨皮各一分

薰芩

甘草炒半分

右剉散每壹錢薑棗煎服

胎驚

胎驚方論

胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必
感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月
內溫壯齷眼搘拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚啼腮

縮顛開或頰赤或面青眼合 胎風眼合不可誤作慢脾妄用溫藥

其有著樂撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋反出外者不治治法解散風邪利驚化涎調氣貼顛甚則以

朱銀圓利之

胎驚證治

太一散治胎驚

天漿子去微火微炒

南星

白附子各微

天麻

防風

伏苓各一分

全蝎

朱砂各一分

麝少許

右爲末每服半錢乳汁化下

參鷄散治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蝎

天麻

蟬殼等分

麝少許

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀湯下

琥珀治胎驚最妙

琥珀

防風

朱砂一分半分

右爲末猪乳調壹字拭入口中

全蝎散治諸驚胎癇

全蝎

箇焙琥珀

朱砂各少許

右爲末每服壹字麥門冬煎湯調下

朱麝散治胎風心熱痰壅

人參

朱砂各一分

牛膽南星

天竺黃

牙硝

鐵粉各半分

麝少許

右爲末每服壹字生薑薄荷湯調下

獨活湯治胎驚發散風邪

羌活

獨活各一分

檳榔

天麻

麻黃

去節

甘草

炙半分

右剉散每服半錢水煎服於內加南星蜜調可貼額用
朱銀圓治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治
驚癇但量用之

水銀一錢蒸棗肉研如泥

白附子半分蝎一分

南星

朱砂一分

天漿子

牛黃

蘆薈各半分

鉛霜半分和腦一字

麝半分

真恙蚕炒七箇

右爲末粟米糊圓芥子大每壹圓薄荷湯下如未通利加至
貳圓

十全龍膽湯治胎驚月內氣盛發熱凡臍風撮口壯熱皆可用

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

北梗

赤芍藥

茯苓

甘草各半兩

蟻娘一枝去足炙大黃紙裹

右爲末每服壹錢煎服或加防風桑白皮以導心熱

卷之三
冷減半用

定驚散

通關定驚方論

諸風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百脉所致痰之所爲潮塞者氣實使之治風痰雖不出而氣不得宣數輩亦須先用礞石散圓入朱砂少許以薑汁侵薄荷湯調和與之盡使氣下則痰下痰下則關竅自通

通關定驚證治

開關散

赤蜈蚣一條

直僵蚕一錢

南星各一分

麝香一字

猪牙皂二錢

各半分

右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥內三點涎出自開

開牙散

華陰細辛 南星

朴消口一方

麝半分 蝎梢伍條

右爲末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用
細辛 僵角 刺芥末
吹入鼻中

嚏驚散

半夏生一分

皂角半分

右爲末用壹豆許用管子吹入鼻立惺

開鼻散

赤蜈蚣

一條沖分為兩片各用熟汁浸一宿焙乾全蝎一箇亦冲分為兩片各記左

右各爲末左眼翻左手搐以左藥末搐入左鼻孔右眼翻右手搐以右藥末搐入右鼻孔雙眼翻雙手搐兼用之

截風定搐治法

人參酒散

方目卷一百一十五

散風邪除風熱初作急風每服三厚

輕者紫蘇薄荷湯調下。搐掣緊急者，黃前湯調下或服

加用少少風亦可常用免得遂施

驚風圓治驚風痰搐

天麻

直僵蚕炒

南星炮

各二錢

麝少許

赤蜈蚣

大者一條酒浸多

白附子炮

防風

朱砂

全蝎焙各一分

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯下

截風定搐

全蝎一個

謂色青是赤蜈蚣一條並新瓦焙

朱砂半分

腦少許

右爲末每服壹字薄荷湯調下先以些少用管子吹入鼻中

自然通竅

陽潤丸治驚風搐痰熱

朱砂

薑薈

白附子生各一分

麝少許

輕粉一字

胡黃連二分 蝎尾十四個 直僵蚕拾个

赤蜈蚣一條

金硝十片

右爲末每服壹字薄荷荆芥泡湯調下如口不開先吹入鼻中
冷風湯治急風定搐

白附

僵蚕

全蝎各一
分

川蠶黃

赤蜈蚣一个

生薄荷浸足酒研生葱宿培嘉

南星炮

麻黃去節

羌活各一分

牙消半分

右爲末每服壹字薄荷湯調下

定喘散治急風定搐

赤蜈蚣大者一个

酒浸灸去足

麻黃去節

南星炮

白附子

僵蚕炒

羌活

代赭石七次
研末用

蝎梢

川蠶黃各一
分

朱砂一分

右爲末每服壹字荆芥茶蘇煎湯調下如搐不止加烏蛇肉

鴻臚治瘧視發搐痰熱

龍膽草

脂

梔子仁

大黃

濕紙煨
姜活

防風各一分

川芎一分半

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹錢煎首葉泡薄荷湯調下

失神能瀉肝風降心火最利驚熱

山梔

二分

大黃

濕紙煨
姜活

木通

赤伏苓

甘草各一分

爲末每服壹錢紫蘇煎湯調下

清寧散

凡驚熱出於心肺須從小便利之

桑白皮

炒

葶苈

炒

赤伏苓

車前子

梔子仁

等分

甘草

炙研半

右爲末每服半錢薑棗煎服

阿膠

治風熱涎潮喘促擣梨竈視

透明阿膠

炒二分半

紫蘇

一分

右爲末每服壹錢入烏梅肉少許同煎灌下神效熱出於肺

熱則生風自驚清肺行小便故也肺風用之尤妙

治驚輕下法

定命丹

治急驚天吊撮口通利痰熱

全蝎

柴箇

天麻

南星炮

白附

各二分半

朱砂

青黛粉一分

南星炮

白附

各半分

腦一字

右爲末粟米糊圓彙豆大每服壹圓荆芥薄荷湯調下先研半圓吹入鼻中

利驚

下痰消熱

龍膽草

防風

青黛

蘆薈

南星炮

鈎藤各二分牙硝

鐵粉各一分

腦

麝少許

右爲末麪糊圓麻子大每服貳圓煎金銀湯下

利風熱痰壅天便不通

羌活

防風

枳實

各半兩
川芎

甘草炒

大黃

濕紙搘各一分半

右剉末每服二字薑棗煎服

宣風散

鍼導風熱

雞心擯榔

甘草

橘紅

各半兩牽牛二兩半生
用半炒熟

右爲末每服半錢蜜湯調下

枳殼散

小兒虛中壅實以此導之

小柴胡湯

加枳殼

最能利風熱解血熱免得用銀粉巴硝輩

治驚稍重下法

鴟風湯

利下痰熱

青黛

蘆薈

全蝎

各一分

南星

半兩為末水調
作餅包裹前項

全蝎

赤色

朱砂

一分半

牙硝

輕粉

各二三字

右爲末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

朱砂膏

治驚風痰盛

朱砂

馬牙硝

川靈脂

蘆薈各一分半

麝半分

腦一字

右研細用豆大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下
踈風散治驚風痰熱俱盛

擯榔

陳皮各一分

牽牛

大黃各三分

右爲末每服半錢生蜜調下
小柴胡湯最利熱實方見發經門加大黃少許

治驚重下法

青金圓治風痰壅盛

巴霜

巴霜者一字油淨盡

青黛

南星各一分

輕粉

半分

滑石一分

全蝎一分

右爲末稀麪糊圓麻子大每服壹圓薄荷湯點茶清送下

天麻圓利驚下痰丸釣腸鎖肚撮口可通用

南星

炮一分

白附子炮

牙硝

天麻

川蠶脂

全蝎

各一錢

輕粉

巴霜

一字

巴霜

右爲末稀麪糊圓麻子大每服壹圓邊荷錢泡湯送下

蘆薈

治驚風痰盛發搐

全蝎

五個培

巴霜

一字

輕粉

半分

蘆薈

南星炮

朱砂

各一分

川芎

金水黃酒

乾

腦

麝

各一字

右爲末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

牛黃涼膈圓

治熱盛涎潮

馬牙硝

寒水石

煅

硬石膏

甘草

各半兩

牛膽南星

二分半

紫石英

牛黃

腦

麝

各半分

右爲末甘草膏爲圓蜜豆大每服壹圓橘皮湯調下

青金丹

陳風利痰

蘆薈

牙硝

青黛

各一分

史君子

三錢

南鵬砂

輕粉半分

燭梢十四個

右爲末用香墨水圓摩子大每服壹圓薄荷泡湯下

王監家風圓治痰熱驚積

青黛

史君子

蘆薈

牛膽南星

川墨各一分

膩粉

麝半分

腦一字

右爲末飛白麪糊圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下楚州王監賣此藥著名大利痰熱驚積疳積

和胃助氣治法

生氣散諸風疏利後以此調氣

丁香三字

白术

青皮各一分

甘草微炙

木香

人參一分

右爲末每服半錢沸湯點服或用銀白散方調氣散亦得

銀白散助胃祛風嘔吐作慢驚者通用

石蓮肉

白扁豆

伏苓各一分人參

天麻

白附

全蝎

水香

甘草

炒

藿香

半分

陳米

炒香三分

右爲末每服壹錢薑錢壹片入冬瓜仁仁染粒同煎或用陳米飲調下

伏苓

健陽

和胃助氣加連翹白芍用薑棗煎

製以散

溫中正氣吐瀉不食用此

人參

伏苓

白术

甘草

炒

橘紅

木香

各等分

右爲末每服參芩薑棗前服

伏苓

和胃氣止吐瀉

伏苓

白芍散用葛根火石菖蒲煎湯調下

和胃氣止吐瀉

伏苓

和胃氣止吐瀉

天麻

白扁豆

製

木香

人參

白术

甘草 炒各半分

右剉散每服參半煎服

醒脾散二方并王氏惺惺散見初傳慢驚門皆和胃助氣

定志寧神治法

定志圓驚風已退神志未定以此調之

琥珀

伏神

遠志
薑漿焙人參

白附子 炮

天麻

天門冬

酸棗仁

甘草
炙等分

右爲末煉蜜圓皂子大如小指爲衣每服壹圓燈心薄荷湯調下

溫膽湯治驚悸煩躁

半夏
製

枳實
各一
分半

伏苓
半兩

橘紅

甘草
各一
分半

酸棗仁
溫湯浸去
殼一分半

右剉散每服壹錢入

蜜丸

少許用薑漿煎服

定志圓治驚悸煩躁

北參

遠志

蜜裹炮伏神

天麻

犀角

各一分防風

朱砂

一字麝

右爲末煉蜜圓皂子大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下

安兒寧神

人參

防風

天麻

伏神各秤一
分半

白附子

酸棗仁

琥珀

石菖蒲各一
分半

右爲末煉蜜圓皂子大麥門冬湯調下壹圓

新刊仁齋小兒直指方論卷之一



慢驚

方傳慢驚證治

全蝎肆筒青者拾治慢驚尚有陽證

蟬殼肆筒白附子生直僵蚕

半膽南星

琥珀各貳錢麝半錢防風朱砂

右爲末粟米糊圓如桐子金薄衣每服壹圓薄荷湯調下

方傳慢驚可用

人參伏神琥珀

天麻

直僵蚕炒防風

南星炮

白附生

蝎灸烏蛇肉

酒浸燙火候朱砂半錢

麝少許

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓菖蒲湯調下

全蝎

朱筒去尾尖

蟬殼

貞拾壹筒

甘草

貞錢半冬

大天南星

壹筒肥香

右爲末每服半錢薑棗煎服

神保丹酒分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃

磁硝

炒等分

五靈脂

青皮

陳皮

半夏麴

炒等分

右硫硝夾研用磁器鎔汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌和粟米糊圓麻子大每服參圓食前米飲下

升丹升降陰陽疎風利痰

方見血氣類

人參

伏苓

木香

炮

天麻

白扁豆

製

陳米

炒

全蝎

焙

右等分爲末每服半錢薑棗湯煎服

醒脾散治吐瀉脾困不食

全蝎

焙半錢

白附子

炮

天麻

焙

甘草

炙

人參

白伏苓

石菖蒲

木香

石蓮肉

白朮

各壹錢

右爲末每服參字薑棗煎服有熱者去人參

大盤脾散

南星

白伏苓

橘紅

各壹分

全蝎

甘草

炒

白附子

炮

石蓮子

人參

木香

各半分

陳倉米

貳升粒

右爲末每服參字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用亦可釀乳
小兒脾胃虛不消乳食尤須節約

白圓驅風豁痰

人參

防風

白附子

生

直僵蚕

全蝎

各壹錢

南星

湯藥茶次
燙乾

天麻

各貳錢

右爲末飛白麪糊圓桐子大每服壹圓薑湯調下

已傳慢驚證治

星寶全馬散 治慢驚風昏迷痰搐

南星

濕紙煨
錢

木香

人參

橘紅

各壹錢

全蝎

炙參箇
錢

甘草

炙半錢

右剉細每服壹錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下有熱加

定金散治慢驚吐瀉困重必傳慢脾通用

圓白半夏

生伏苓

木香

老生薑

切
各壹分

白朮

甘草

炙各半分

右爲末每服半錢薑棗煎湯調下

四聖散 治慢驚痰滯虛熱若有竄視搗搗證狀以少許用管吹

入鼻中

全蝎

茱萸

直僵蚕

拾四

大南星

朱砂

真川烏

參鐵參字

並生用

右將南星爲末水調作餅裹蜜酒外用濕紙重包慢火
灰中煨令赤色頓地上一伏時爲末每服壹字前金銀湯點

好茶清少許調下

四君子湯加全鷄倍爲末各少許每服半錢薑棗煎服如再服即去小鳥

葛根驅風豁痰

南星

重八九錢以上者用壹箇就地上作小坑深七八寸用火炭伍斤燒通紅以芒硝米醋半盞酒入坑中脚綿

盃蓋其上一伏時取出洗淨切碎

右爲末入

全鷄

末各壹錢每服半錢煎生薑防風湯調下

烏沉湯慢驚驅風助胃

天麻貳錢

人參

真川烏生

全鷄倍

南星炮

木香

沉香各壹錢

甘草炒半錢

右剉散每服叁字薑棗片慢火煎取其半與之

沉香散生胃氣止吐瀉

伏苓貳錢

沉香

丁香

霍香

川厚朴製

甘草炙壹錢

右爲末每服壹字米飲調下

漫驚下痰證治

天南星圓治慢驚痰壅惟身熱者可服

南星

壹斤每重壹兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮并佳軟處令淨用法酒浸壹宿用麝柴煮不住添熱湯令金滿瓶內氣猛更不住酒常分藥潤茶伏時瀉取出用銅刀子切開壹箇大者箇少許不麻舌爲孰末即再以候熟用銅刀切細焙乾

麝香

研

丁香

各壹兩

龍腦

研

壹兩半

辰砂

別研水飛

兩

爲衣

右爲細末入研藥勻煉蜜并酒圓朱砂爲衣每服壹豆許生薑煎湯調下

蘇合香圓

一倍方見血氣類

白圓子

二倍方見痰飲類

夾和每

服半錢薑湯調下

神犀既濟丹

治慢驚痰盛

見方傳慢驚馬門

礞石散

最能利痰急慢脾風通用

青礞石

搗碎煅消半兩同礞石入甘窯內用炭火燜令通紅研末

右爲末雪糕薄糊圓綠豆大每服貳圓急風等病用米酒泡湯

調下慢風慢脾風用南木香前湯調下鐵石硝古文錢葷
雖能利痰然其性非胃家所好須以大茴佐之

靈脂圓治慢驚痰盛搐搦

五靈脂香潤者白附子炙炮木香

直僵蚕炒各壹錢半分

全蝎焙半分朱砂壹錢

大南星濕紙包半兩

右爲末米醋煮生半夏糊爲圓麻子大每服叁圓薑湯送下

七珍圓治諸風頑痰壅盛大小通用

細辛

川靈脂

直僵蚕

炒各壹錢半分

白附子

壹錢朱砂半錢

全蝎

肆箇焙

右爲末用大南星生爲末煮糊圓麻子大每服伍圓薑湯送下

慢脾風生胃回陽治法

黑附湯治慢脾風盛四肢厥冷

附子

炮去皮參錢

木香

壹錢半

白附子

壹錢甘草炙半錢

右剉散每服叁字薑伍片前取其半以匙送下若手足煖而

蘇省即止後劑

川烏散驅風回陽

真川烏生

壹分

全蝎

木香各半分

右爲末每服參字薑肆片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加

丁香

金液丹

方見血氣類

白圓子

等分祛風回陽二藥爲末每服半

錢陳米飲調下

金液丹

湯助胃回陽

四君子湯

加全蝎子末

四分之一錢

逆者對加每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

全蝎子

炮

附子

炮各半錢

南星

炮

全蝎子

炮

附子

炮各半錢

南星

炮

白附子

炮

木香

各半錢

南星

炮

右爲末每服半錢薑肆片慢火熟煎旋服

陰濶散祛風豁痰回陽正胃

白附子

黑附子

南星

半夏

並生各壹分半

右爲末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎瓦錢每服壹字生薑湯調下

靈砂正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者勿用爲細末以少許米飲調下或用糕糊圓如粟米大兒兩參圓米飲灌下

靈砂方見血氣類治慢脾風吐瀉不止每服壹圓研細南杏前湯乘熱調下已上諸藥溫熱並乳食前服

急慢脾風

慢脾風下痰證治

神保丸見方傳慢驚門

白疕散方傳慢脾陽氣未甚弱者可用亦能截風

牛膽釀南星

貳錢

五靈脂

全蝎燬名壹錢

右爲末水煮生半夏糊圓麻子大每服伍圓薑湯下

辰砂膏治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子

壹枚重者去皮臍頭上刻壹孔入辰砂末壹
錢重用酒炮半兩塞之以炭火二七燒存性爲度

南星

炮半兩

白附子

炮

川五靈脂

蝎梢各壹分

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓生薑汁泡湯調下

利痰奇效慢驚慢脾通用須以大茴佐之開通
背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以一箇放鐵
匙頭於炭火內燒少頃凹圓上下各出黃白珠子將出候冷傾
入盞中只作壹服煎湯送下入參前湯亦得

急慢脾風證治

星蘇散

治諸風口噤不語

天南星略炮剉散每服叁字薑肆片紫蘇伍葉煎取其半却
入~~通氣散~~汁少許溫和服凡不語者大小便須要調導治慢
風不語只用~~通氣散~~更以人參~~白鳥丸~~爲佐

朱浦湯治諸風失音

木通 石昌蒲 防風 北梗

桑螵蛸 全蝎 培 直僵蚕

南星 嵩施半兩

右剉散每服參字紫蘇參華薑三片煎熟與之大便不通更

加全蝎半兩

補聖圓治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉

米醋浸多

直僵蚕

炒

防風

天麻

南星

牛膽各半兩

五靈脂

炒

代赭石

煅醋淬各貳錢半

全蝎

炮

朱砂

各壹錢

右爲末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚丸水湯調下慢驚

用生薑湯

虎鷄圓治急驚上視搐搦胎風涎潮

虎睛

酒炒

全蝎

炒

天麻

防風

南星

煨

直僵蚕

炒

烏蛇肉

酒浸焙

麝香

壹錢

右爲末麪糊圓搯子大每服壹圓薄荷湯調下

治驚風痰熱

天南星

不去皮切片

生薑

切片

右用竹筆壹條以

并

薑

相間

挿定

次用

些子

摻入

片間

風乾

爲末

每服

壹

字

薄荷

紫蘇

泡湯

調下

大

人

服

半

錢

或

吐

或

汗

或

下

即

病

氣

出

也

急驚化痰鎮心

朱砂

朱箇倍

龍齒

牛黃

各壹錢

鐵粉

琥珀

朱箇倍

人參

伏神

各貳錢

防風

各貳錢

全蝎

朱箇倍

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下如無牛黃以

半膽

代之

朱砂湯

治慢風慢脾等效

南星濕紙煨白附子煨

天麻

木香

橘皮

白伏苓

石蓮肉

各半分

黃耆

白木

石昌浦

甘草

炙各半分

右爲龜末每服半錢薑聚煎服

乳

圓治驚風掣痰反折

赤蜈蚣

全者壹條去
背足酒浸焙

花蛇肉

酒浸直僵蚕

生各貳錢

直僵蚕

各貳錢

南星炮參三錢

朱砂

蝎梢

各壹錢

乳香

半錢

麝壹字

右爲末飛白麪糊圓桐子大每壹圓金銀煎湯泡薄荷調下
○蒲陽趙公施此多所全活

乳

圓治驚風痰熱

代赭石

煅醋

全蝎

燒

朱砂

各壹錢

琥珀

各壹錢

南星濕紙煨

濟

白附子

生

防風

各壹錢

烏蛇肉

酒浸炙

天麻

各壹錢

麝壹字

右爲末乘米糊圓桐子大每服壹圓急驚薄荷湯調下初傳
慢驚尚有陽證用湯

青色全蝎治慢驚初傳涎潮昏搐

全蝎

拾四箇薑汁浸纏而慢火炙乾又蘸薑汁又灸凡參次並酒浸焙

花蛇肉

烏蛇肉

各一錢炒各分

白僵蚕

壹字

天麻

防風

各壹錢

乳香

半錢

人參

右爲末用南星末乘米糊圓桐子大捏作餅日乾每服壹餅薄
薑湯調下

青色全蝎治驚風搐掣胎驚夜啼

青色全蝎

拾肆箇

防風

天麻

白附子

蟬殼

直僵蚕

炒各貳錢

南星

炮參三錢麝半錢

右爲末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下

青色全蝎治慢驚身熱痰滯

青色全蝎

拾肆箇

防風

天麻

白附子

蟬殼

直僵蚕

炒各貳錢

南星

炮參三錢麝半錢

右爲末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下

大乾蟾

壹箇酥塗朱黃

直僵蚕

蟬殼

蝎尾

各焙

白附子

微炮

五靈脂

蘆薈

琥珀

各壹分

朱砂

青錢

麝半錢

右爲末每服半錢

以水煎湯調下

快門湯

治慢驚脾困不食和胃祛風

大南星

壹兩

剉如碁子狀用蜜

壹兩切

同黃芩

南星一錢去

菖蒲一錢

只用菖蒲

胡麻

一錢

切

白伏苓

半兩

木香

人參

天麻

各貳錢

半

全蝎

茶筒焙

右爲末每服半錢甘草生薑煎湯調下

助胃散

治慢風吐瀉不進乳食

人參

白朮

石蓮肉

各貳錢

半

檀香

船上茴香

炒

白豆蔻

半

木香

甘草

炙各壹錢

右爲末粟米糊圓桐子大每壹箇陳米飲調下脾困不醒用

卷之三

前湯

沉香治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

丁香

木香

黑附子炮

白附子

全蝎

霍香

天麻各等分

右爲末每半錢灸甘草生薑煎湯調下身溫則去

鎮驚治諸風頑痰喉風癓痺

北藥

水飛過

直僵蚕

米醋浸焙

大南星

切片濃皂角

右爲末稀糊圓麻子大每服伍圓姜湯送下喉風用

水研開灌下

圓白半夏治諸風諸癇痰熱

圓白半夏

生

右爲末旋入薑汁略拌鬆次以香潤研細入蜜焙爲
末又壹錢加蜜丸如梧桐子大每服肆伍圓薄荷生薑泡湯送下隨大小增減用

慢驚慢脾危惡證候藥力不到者但看兩脚面中間有處有
太衝脉即灸同會穴具穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖
折中在頭之中心端正旋毛處是也如有雙旋及旋毛不正
者非所捏文柱約如小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾
之劑

客忤

客忤方論

客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候
口吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛反側瘞癰狀似
驚癇但眼不上竄耳脈來弦急而數視其口中懸癰左右若有
小小腫核即以竹針刺潰之或以爪摘之治法辟邪正氣散驚
定心延久則難爲力也大丸客忤中惡急作醋炭仍以

客忤證治

雄黃 壹錢 治客忤腹痛危急

雄黃 壹錢

乳香 半錢

麝 壹字

右爲細末每壹字刺雞冠血調灌之

方見咳嗽門

用薑湯調灌次用

參合水濕搗爲圓

如雞子大以摩兒頭上及足心各五六遍次摩臍心及上下良
久擘開自有毛即擲之

麝香

麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈

麝角

治客忤驚啼壯熱

天麻

犀角

麥門冬

釣藤

朱砂

各壹錢

鐵粉

雄黃 半錢

麝 少許

右爲末每服半錢以金銀煎湯調下

麝香

生犀末

人參

茯苓

菖蒲

朱砂

雄黃等分

右爲末研挑仁膏爲圓如麻子大每參圓紫蘇湯下

伏龍肝方

龜中黃土和醋搗圓裹子大摩兒頭及五心

方見胎驚馬風門

金匱方

治中馬汗氣臭忤或馬鳴驚忤

馬尾燒煙熏兒面頰熏以瘥爲度

驚風雜治

驚積方論

驚積者受驚日久而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往往來肚皮有熱睡中覺腹內有物跳動渴下如白脂豆沙是也治法量輕重而疎導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹肚或熱

或脹或硬皆爲內實法當疏利

驚積證治

辰砂膏 跛利驚積方見風噤門

青龍圓治驚積有熱

青黛

伏神

蘆薈

南星

鹿角少許

輕粉

巴霜膏

全蝎參硝固精

右先將巴豆研如泥次入諸藥研令極細圓如粟米大朱砂衣每服壹圓薄荷湯送下

銀圓

治驚積方見胎驚風門

天癟方論

天癟壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者爪甲皆青如紫之狀蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳遂復乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法解利風熱取愈

天瘡證治

釣藤

白伏苓

各半
大黃
僵蠶
煨貳錢半

防風

朱砂

蟬殼

羌活

獨活

青皮

甘草

炙
各半
貳錢半

右爲鹿末每服壹錢盦裏煎服

全蝎

蟬殼

直僵蚕

微炒
天麻

犀角

天駒子

蒴子
白附子

南星

炮

青黛

朱砂

川薑黃

各等分
麝少許

右爲末雄猪膽汗爲圓皂豆大先將井水調開壹圓入皂零

噴次以

前湯調服

驚風內藥方論

附盤腸氣虫痛

驚風內癲癇多啼哭黑囊腫僵僵反張眼內有紅筋班血者

是蓋寒氣壅結兼驚風而得之又盤腸氣與虫證亦令腰痛多
啼僵僵相若但盤腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腸爲全
氣所搏然爾虫痛則嘔吐清沫痛有去來是痰化爲蛔臘腑皆
滯然爾內药用調氣疎風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之劑
虫證用殺虫之劑條列于後請詳審之

驚風內药證治

乳香治驚風內癥腰痛驚帶

乳香半錢 没藥

蝎梢拾肆箇 雜心檳榔壹錢半

右爲末東蜜圓桐子大每服貳圓前湯調下

木香治驚風內癥壯痛驚帶

木香一錢炒鈞藤等分

全蝎一錢

右先將藥物各研細別研次入諸藥末和界取大匙少許研細

和圓桐子大日乾每貳圓銀器湯下

白豆蔻治盤腸氣痛

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

陳皮

甘草炙

香附子

蓬莪术

各等分

右爲末每服壹錢紫蘇煎湯調下

羅蔔子炒黃不拘多少

右爲末每服半錢前湯調下或只入紫蘇合香圓則用薑湯調下

化虫圓治虫痛

蕪荑

川鶴虱

雞心檳榔

乾蝦蟆多焦各壹分

薑薈半分

右爲末進消膳丸爲圓麻子大每服伍圓陳米飲下或皮膏子煎湯送下丸虫月首則頭向上薑薈可服藥

安息香治內藥盤腸氣藥虫痛通用

安息香

桃仁

去皮尖脚

蓬莪术

炮史君子肉各半兩

阿魏

壹錢

茴香

炒

全蝎

各壹分

右向加并安息香以酒少許就湯瓶口上以盞盛蒸溶去沙
旋入挑出同研次入諸藥末煉蜜圓桐子大每壹圓生薑湯
調下

宣風散治小兒臍下氣塊癰痛

芸臺子

炒

蓬莪术

茴香

炒

青皮

甘草

各壹分

桂枝

木香

各半分

右爲末每服半錢搗湯調下

芎歸散治內藥胎寒腹痛腰帶

官桂

當歸

川芎

香附

各半壹分

川白薑

木香

甘草

炒各半分

右爲末每半錢白水煎氣食前服

發風 治內癥。腫而挾冷作痛。內癥。一名癰脹。

當歸

沉香

木香

桂

右爲末。每壹錢用薑煎食。煎服。

中風

中風方論

小兒中風者。以其血氣未定。寒溫失調。內則盛熱。蘊蓄外則腠理虛開。故風邪乘其外虛而暴中之。其狀皆不知人。壯熱狂躁。搐掣氣急。口噤涎潮是也。心中風則僵卧不能傾側。發熱失音。其舌焦赤。若汗流唇赤者可治炎。或唇間白黑青黃乃心臟爲水。或面目亭亭。時時悚動者並不治。肝中風則踞坐不得低頭。左脇疼痛。諸筋掣急。頭目瞤動。上視多怒。其目青若達兩目連額。微青唇青面黃者可治灸。肝俞或大迎青黑其目一黃。

一白者不治腎中風則踞坐而浮腰脊痛引小腹其耳黑若兩
脇左右未有黃色起者可治灸肺俞或胸間如黃土疊疊互而
齒黃赤者不治肺中風則僵卧冒滿喘息咳嗽燥悶汗出其單
白若目下至臍四圍及口間白色者可治灸肺俞或色帶黃乃
肺壞爲血併手尋表縫者不治脾中風則踞坐腹滿皮肉瞤動
四肢不收其唇黃若一身通黃口吐鹹汁者可治灸脾俞或手
足青而厥冷者不治凡人爲風邪所中皆從背上五臟俞入之
風入於頸頰之筋則口喝而牙噤風塞於咽喉聲音之閉則語
不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間如鼾蛤之嚮是風也
始入於腠膚次達於經絡而搏於筋脉筋得寒則拘急攣痛得
熱則緩弛不適風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也挾寒
而拘攣脉必浮緊挾熱而緩弛脉必浮洪寒者與之而拘攣脉
者與之而緩弛脉者與之而緩弛脉者與之而拘攣脉者與之
促者病在上在表則發散之在裏則疏導之促於上而拘攣脉

汗者湧吐之若虛寒證候則

又不可觸古人治法雖

以灼艾爲本亦須消息權度而投劑焉此法自大人方論演觸而得之若遇大人中風則以此推也雖然風寒暑濕皆能中人況又有因氣而中者人之驟病莫若中風一時倉卒若未能精審且先與下氣豁痰蓋諸中皆因痰鬱氣滯而作通閑以還急以

南星治卒中下氣豁痰

前湯和

灌

下牙緊者

末之入

灌

點擦自開進藥之後痰

灌

消氣下病勢稍蘇即子細體認五臟外證而調理之至若口開手散噓氣羸大喉間軒輊瞪眼合眼瀉血遺尿或面色如銣或面色黯淡或汗出如珠如油皆惡候也又一證小兒多因傷風咳嗽不能發散遂成肺風其候喘促涎潮面色青黃目能認人口不能言如此者當以

主之仍灸

灌

潤其身如洗皆不可救

五臟俞穴

心俞二穴在背上第五椎骨下兩傍各一寸半。肝俞二穴在背上第玖椎骨下兩傍各一寸半。腎俞二穴在背上第拾肆椎骨下兩傍各一寸半。

小兒艾柱如小麥許。但三五壯而止。取分寸法。大人小兒男左手女取右手。比量中指第壹節爲壹寸。見千金翼方第壹節者指根是也。

中風證治

麻黃治中風昏濁或狂語或失音。

白鮮皮

白朮

芍藥

官桂

去分龜皮

川芎

當歸

杏仁

炒微炒防風

甘草
炙兩

麻黃
去節

川獨活

白伏苓

各一錢半

右細剉布服。壹錢。貳片煎。

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃

去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草

杏仁

防已

官桂

去皮各半兩

防風

柴錢半附子

炮去皮臍

右除桂外並搗爲末次入貳味夾和每壹錢量參
片煎食前服

治中風

二藥夾和

入

煎服次以

加

續之

治中風

南星

大者燬紙畧炮用真鐵

半夏

燬米炒

南木香

各壹錢炒各半錢

細辛

石菖蒲

蒼朮

畧炒

右剉散每服壹錢薑參一片慢火煎取其半調蜜酒一盞灌下痰盛者又加

南星

畏苦物
貞鐵

木香

橘皮各壹錢

全蝎

貞鐵
甘草

炒半錢

右剉細每服壹錢薑三片慢火煎熟與之虛冷者加

少許添

治中風厥冷

生附子

壹分

木香半分

右剉細每服半錢薑肆片煎服

專治小兒肺風喘促涎潮竄眼斜視

透明阿膠剉細炒如珠

右用紫蘇烏梅肉焙乾末之爲衣煎入參湯送下或以同蜜炒為末和入參湯同煎亦得利通育神凡驚風後眼中瞳人不正可以此湯壹倍入參半倍煎與之

治中風內外皆熱

大黃

壹分

檳榔

一錢

桑白皮

半錢

羌活

壹兩

防風半兩

郁李仁一錢分炒

右剉散每服壹錢黑豆參拾粒同煎乳食後服

治風後瘡不能言

蕪荑

神麴

麥孽

黃連等分

右爲末圓麻子大每服伍圓用

前湯送下蓋能去心竅惡血故爾

治中風不語方見急驚脾周諸方門

方見急驚門

痙痙

痙痙方論

音景

音翹

字異義同

發瘡證候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發瘡濕家發汗稍多亦發瘡婦人新產血虛汗出傷風發瘡無疑矣項背強直

廢身反張搖頭掣舌噤口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏
病在足太陽經剛痙無汗柔痙有汗其面紅眼赤牙緊手張痰
涎壅盛昏潰煩渴小便赤澁先譏語而發者此剛痙也其大便
滑泄不渴不語先手足冷而發者此柔痙也剛柔二痙亦如陰
陽陽陽陽之類剛痙爲之發汗柔痙爲之解肌並以潤劑
加減剛痙去水用桂圓柔痙去水用生地大便利而
厥逆者則以附子佐之其間一證身體壯熱譏語口乾手足反
微寒大便反滑泄此爲剛柔不分之痙可用生地桂圓各半
要之得病以來無汗則用桂圓方有汗則用生地桂圓各半
以消其痰以順其氣以順其氣塞氣盛則痰壅而氣逆以順其
氣痰消則風止氣順則神醒治療之法先與消痰而氣爲上嗣
是病勢稍止然後審其熱之輕重而解利之熱輕者與生地桂
圓散熱盛者與附子桂圓散壯熱胃滿口噤咬齒而大便秘結者是爲

瘡最難痊十救其一過三日不治請草圖之餘見傷寒類書

活人總括

瘡瘻證治

小兒瘡

方見中風門

消炎順氣疎風

半夏

製

枳殼

炒

伏苓

各半兩

橘皮

防風

各半錢半錢

甘草

炒

壹錢半

右剉散每服壹錢入生薑紫蘇煎服

人參

伏苓

甘草

炒

苦蔴

前胡

羌活

獨活

柴胡

北梗

枳殼

右加

等分爲末每服壹錢薄荷少許煎服

小兒瘡

治癰瘍有熱

柴胡 壱兩 黃芩

人參

半夏

生薑 鑠參半

甘草 炒壹錢半

右剉散每服參字入棗煎服
大黃 治剛瘡胃滿內實口噤咬齒

大黃

芒硝 各半兩 厚朴 壱兩

枳殼 貳枚

右剉散每服參字薑參片煎服

麻黃

去節

赤芍藥 各壹兩半
乾葛 半兩

葱白

參三莖

豉 半合

右剉散每服參字前服

桂枝

芍藥

甘草

炒各一錢

葛根

參二錢

生薑 壱兩

大棗

肆枚

右剉散每服參字煎服

治柔痓厥冷自汗

人參

川白薑

炮

甘草

炒

白朮

等分

右剉散每服參芩前服

治柔痓自汗肢體嚴冷

天南星

生
性
一
兩

川烏

生

附子

各半
兩

木香

壹分

右剉散每服壹錢生薑伍片慢火煎取其半通口與之

發癟

發癟方論

癟者小兒之惡病也小兒血脉不斂氣骨不聚爲風邪所傷爲驚怪所觸爲乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣佛欝瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚澎緊手足搐掣似死似生聲聲或嘿或項背反張或腰脊強直但四體柔軟發而時醒者名癟若一身強硬終日不醒則爲痓痓矣癟曰五臟病關五臟而赤

目瞪吐舌齒齦心下煩燥氣短息數著曰心癪面青唇青廿六
上竄手足拳攣抽掣反折者曰肝癪面黑而晦振目視人其吐
清沫不動如尸者曰腎癪面白如枯骨目白反視驚跳搖動亦吐
涎沫者曰肺癆面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰
脾癆此五臟之證然也調理之法惟以三陰三陽二證
別而治之。因者汗出解脫風邪乘虛其初屈指如計數有熱
生痰是也。因者震駭懷怖打隊積驚其初驚叫大啼恍惚神
魂是也。因者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭
或結成乳癆先寒後熱是也。別之以陰陽則始者身體有熱抽
掣啼叫是爲陽病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易
愈始者身體無熱手足清冷不抽掣不啼叫是爲陰病脉
沉面色黯晦病在五臟骨骼此最難痊或以仰卧屬陽覆卧屬
陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒。因者先爲之
散風寒。因者先爲之利驚。因者先爲之消積續以之

主之若臟若腑一陰一陽是固不可無別大脈血滯心竅邪氣
在心竊營成癆通行心經調平心血順氣順變又其要也幾人之
小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癆之漸
即以_火_水導之時間量更_火_水減其盛氣則無驚風癆渴
之患癆證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急爲爪
破須令血出啼叫尤得氣逼幹溼兒衣不可露天恐爲純堆落
羽所污染觸其間未有不爲癆也挾邪吸者而色變易不常見

人蓋怕諸癆瘡不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩
聲音道路之門抑亦血滯於心竅不通所致耳同上炮爲末
通身調和少許啖之輒効若夫_火_水圓并_火_水以
菖蒲煎湯調下其性清冷者以和氣令_火_水腎治癆之要藥也
故表而出之

諸癆不治證候
目直無聲 目睛不轉 眼生白膜 眼慢唇黑 瞳人瞬動

眉間色青黑

面青指黑

口中涎沫如白膿

口噤肚脹不

乳

喉如鋸聲多睡不乳

身熱下血不食

身體痠軟不醒

腹滿虛鳴

厥逆而痛

吐利不止

汗出壯熱不止

久不寐

癇瘲身體反張

大人脊下容側手小兒脊下容三指

並不治

諸癪僵硬不得掣但扶持之謹勿把捉

風癇證治

散風丹

治風癇先用此

黃牛膽

貳錢

羌活

防風

天麻

人參

荆芥穗

川芎

細辛

各一錢

右爲朱煉蜜圓桐子大每服貳圓薄荷紫蘇泡湯調下

保元圓治諸癪久遠亦驗

川烏

生去皮尖頭錢半

五靈指半兩

右爲朱猪心血圓如桐子大每壹圓童子泡湯調下

獨活 治風癇解表通裏

獨活

麻黃

川芎 各壹錢去節

大黃

培

甘草

炒各半錢

右剉散每服參字薑貳片煎服

獨活 治風癇內熱

天麻

防風

各半兩細辛

大黃

培

川芎

各壹分

甘草

炙壹錢半

右剉散每服參字入蜜角少許煎服

獨活 治風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽汁

和南星末

風乾

全蝎

培

蟬殼

各貳錢半

防風

白附子

生

天麻

直僵蚕

各壹錢半

麝

半錢

右爲末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末
和圓如棗豆大每服壹圓荆芥生薑湯下

聖濟證治

比金瘡藥先用此

人參

琥珀

白伏苓

遠志肉菖蒲根皮

朱砂

大麻

石菖蒲細節

川芎

南星

菖蒲汁浸蜜
各取錢一錢
研末

青黛壹錢

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀煎湯泡薄荷調下

鎮驚丸治一切驚癇

紫石英燒過研末

遠志肉菖蒲製伏神

人參

曉珀

滑石

南星炮

蛇黃眼晴細研

熊膽半分

輕粉各二字

右爲細末煉蜜圓朱砂衣桐子大每壹圓金銀湯調下或用

調拭入口中

驅風治驚癇邪氣入心

虎睛細研

遠志菖蒲製

犀角

大黃邊紙煨

石菖蒲

麥門冬

各一錢
分煎
蜜蠟去足胡
炒去衣

右爲末粟米糊圓桐子大每服壹錢竹葉煎湯調下或金銀

前湯下

遠志肉

僵蠶製

雄黃

織粉

琥珀

朱砂

青白分

金銀箔

瓦當片

少許

右爲末棗肉圓相子大每服五錢去心

寒水石煎湯下

犀角

遠志肉

僵蠶製

白鮮皮

石菖蒲

半夏

各一錢分

伏神

半兩

大黃

焙

人參

甘草

沙各半

右爲末每服參芩去心

寒水石煎湯調下

蜜陀僧爲細末

右每服壹字米醋湯調下大人用貳錢熟酒調下

食癪證治

蜜酒治食癪先用此取積

代赭石服醋研半兩赤石脂末各一兩巴豆研末去皮研出油杏仁研末炒別研

右件合研細湯浸蒸飯賣麻子大每服半賣米飲下

蜜酒治食癪通利

代赭石

服醋研半兩

雄黃

蝎梢

朱砂各壹分

輕粉

麝各壹字

巴豆

參鬚研末取油

杏仁去皮尖殼炒研

右爲末蒸棗肉圓桐子大每服壹圓水煎湯調下

蜜酒治食癪方見急驚重下門

定癪治法

蜜酒治食癪

朱砂

半兩

水銀

壹分

鉑共兩研末水銀結冰

雄黃

半兩

真珠

壹兩

右爲末煉蜜圓麻子大每服貳圓金銀鉑湯下

舊文

方見已傳慢驚門

如大便取下惡物急與和胃之劑

薏湯 治五癎頭癎及心風血迷神狂

甘遂末壹錢

右用帶性豬心壹箇取參鬚頭血參條和
隨藥未得中和之將_所_和批作兩片將所和藥入在內再合
用線縛定外以濕紙包慢火內煨熟不可過度取出去紙取
細研次入_所_和半錢和之分作肆圓每服壹圓以所
研_所_和猪心煎湯調下後別用豬心煎湯重者只守本方輕者加
白芍_所_和壹粒准過半日不動又進壹服如大便已下惡物
即止後劑急與_所_和以助胃氣

雌黃

黃舟

微妙半兩

右爲末拌和用牛乳汁參苓熬成膏入藥末杵卷首下圓如
麻子大每服貳圓溫熟水下

聖濟圖治諸癪

蛇黃青鹽燒醋淬

柴桑揚次研細

鬚金

雄黃名貴分

鐵粉篩淨研細參分

青礞石

朱砂名貴分

右末粳米飯圓桐子大每壹圓

煎湯調下

斷續膏治諸癰瘍盛

皂角

密尺者參三鉢去皮胎水參升浸取汁濃過濃品內然成膏

白礬

假枯研細壹兩半

南星

濕熱生熟各一兩

蝎梢

僵蚕

炒僵蚕研細

朱砂

白附子各半兩

麝香

壹分別研

赤蜈蚣

青鹽去頭足酒浸久

烏蛇

酒浸取肉炒

圓生薑湯調下

右爲末用米水煮圓生薑糊和前藥圓膏爲圓桐子大每服壹

管詒人治諸癥壯熱利下心中惡血

大黃

濕紙裹

甘草

炙

當歸

炒

赤芍藥各參分

半夏

剉

川芎

各參分

右爲末每服參字薑棗煎服

鴉膽子治驚癇屢效

褐色生蝎黃固血細研

右入朱砂末并少許同研薄荷湯調作壹服數年頭癩亦
作效蓋癥疾皆心血虛滯可以管守其血繼是即以
之與之若無當取帶性雄猪心血代用入于
亦作效

右治陰陽癩通用

代赭石收歸附研末

右每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下連進武服良久小
兒脚脰上自有赤班即邪氣發出甚病隨瘥若無赤班則難
治也

自服治頭癩連年不瘥

黑錫

硫黃

水銀研

鐵粉研各半兩

右水銀金銀箔夾和壹兩先將黑漆於鉢內鎔開次入
不住手就鉢內研盪候火候煙氣欲息投入餘藥就火
上同燒少頃時傾出在地壹剗出火毒再研細粳米飯圓麻
子大如豆衣每服參圓食後入參煎湯下

治諸癇發歇無時

乾地龍半兩虎睛一錢人參壹分金銀箔參拾片

天竺黃

朱砂

代赭石一錢醋鐵粉各壹分

雄黃壹錢半

輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調下

定目同治小兒五癇

赤蜈蚣

清真去頭足

蝎子

白附子生

烏蛇肉

消炎去寒大南星末

圓白半夏末用薑汁和

熊膽

白礬新瓦上煅熟各半錢

右爲末稀糊圓桐子大茶卷每服壹圓薄荷泡湯調下

全蝎五兩

赤蜈蚣

壹條去頭足酒浸炙火

南星

泡動半

麝香

全蝎

防風

朱砂

研細

遠志肉

蜜汁浸炒各一錢片

白附子

生薑

蘆薈

延胡索

各壹錢

金銀箔

各一錢片

全蝎四兩一切細

赤蜈蚣

大者壹隻頭足兩兩浸炙火

烏蛇頭

兩隻肉各取肉半

延胡索

生各壹錢

白附子

遠志蜜汁浸炙火各一錢

鐵粉

透明

全蝎

半兩

天麻

各壹錢

金銀箔

各一錢片

右爲末以

同白附子

爲稠糊入

黃芩膏半升

并

少許和圓

桐子大茶卷

衣每服貳圓

全銀器煎湯泡薄荷調下

全蝎五兩

治諸癇壯熱

方見治驚風門

全蝎五兩

定癇利痰

方見治驚風門

南星
紙糊香熟壹兩

朱砂壹錢

右爲末用帶性猪心血爲圓桐子大每服壹圓煎防風湯調
麝膽南星散治癇後瘡不能言

大天南星濕紙濕香

右爲末每服壹字
雄精膽汁調下

肥尾圓治小兒心竅有惡血瘡不能言
杏陳皮同煎湯吞

肥尾圓

方見中風門

蓋肥兒圓內有黃連能去惡血瘡者是

麝香油髮燒灰存性每服壹字米湯調下

論髮際穴

小兒初誕收生者多灸頭額前髮際半間之蓋取其可以截
風路也諸風篤證藥力不及督迷沉竈嘿然無聲於此灼艾每
有扶危之功然亦顧其善後之劑何如耳前集所載百會一穴
在頂心端正旋毛間亦濟危困者以是哉

論腦麝銀粉巴硝等不可輕用

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用
以通其閑。銀粉巴豆以小其痰熱蓋不得已而用之。
其實爲風熱盛實者設也。世俗無見不權輕重每見發熱發搐
輒用腦麝蟾酥鈦霜水銀輕粉巴豆芒硝等劑視之以爲常惟
其不當用而輕用或當用而過用之是以急驚轉爲慢驚吐瀉
胃虛在舟時月驚風之所爲難療者正坐此也。萬一發熱驚搐
本爲傷風傷寒傷食瘡豆而作誤藥至此其爲害豈淺淺哉以
理觀之能曰。所謂之類以爲發散勝如腦
麝能用。所謂之類以爲通利勝如銀粉膏
硝設或當用而不可無之亦須酌量勿過可劑此幼幼書所謂
清涼散乃醫用之上藥者良以是故故論此以爲輕用

藥者勸

論蜈蚣有毒

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之。以其風氣暴烈非蜈蚣能

鸞能愈亦不
止但用之
翠葉病相當弗容固執或半字或
壹字或桐子半圓或桐子壹圓尤在酌量而作劑也設或過焉
當以退熱藥之爲解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右
盼伸手握拳悶鬱怒氣情態不若尋常如此者有驚即散驚
有熱即退熱壅實即去壅實熱退則不生痰驚散則不生風
壅滯通則氣得其平病無由作是固當以小劑治之若夫患
在麥熱全未有風癇搐搦顫引之狀則只與退熱化痰如參
蘇飲之可類也謹勿妄投通閑利膝等劑惡或透其熱流入經
絡反成風痰此又小兒無病不可服藥之戒

世俗玩習以爲小兒體熱或遇溼浴即與火坐湯水之中風
冷外傷水濕內滲頃刻間遽成風搐或惡叫頓吐或昏迷失
音或泄泄不已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒

增修仁齋直指小兒方論卷之三

疳

附 積 毀

諸疳方論

兒童二十歲以下其病爲疳二十歲以上其病爲勞疳與勞皆氣血虛損腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺歟食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼闊乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根源或三兩時後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷酸酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暉失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之後要施吐下津液虛竭得之者有因渴熱天下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷缺太過渴引水漿變而生熱熱

氣未散復干他邪得之者又有病癬寒熱脇下痛硬或者不能
漸與消磨遂以硝巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞
病之過乎痱之爲候頭皮光急毛髮焦稀顫縮單乾口喰啞白
兩眼昏爛孫星擗眉脊聳體黃闊牙咬甲焦渴自汙尿白渴酸
肚脹腸鳴癟結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥上而飲水占飲者
皆其候也痱曰五痱病關五臟以臟別之心即驚痱由乳食
不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳餌有傷易生壅滯內
有滯熱未得疏通故心神驚嚇而作驚痱之候外證身體壯熱
臉赤唇紅口舌生瘡胃膈煩悶小便赤澁五心皆熱盜汗發渴
齷齪虛驚夫是之謂心痱心即風痱由乳食不調肝臟受熱
所致也若乳母寒暄不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒邪
氣未撤遽爾乳兒多成風痱肝者眼之候上膈火熱痰涎壅滯
以致肝風入服赤睛翳生時夜眠時痛癢搔擦腫脹能盲甚至
經月眼合亦名翳眼外證目白膜度睛眼青淚多頭暍

髮立筋青腦熱甲癢筋掣躁渴汗多下痢瘡是之謂肝疽
即急疳由乳食不調肥膚伏熱所致也凡甘味入於脾而
動虫虫動則侵蝕臟腑遂使孩提心下擾悶若上蝕齒斷則口
瘻出血齒色紫黑下熱腸胃則下痢肛爛濕瘻生瘻療治不蚤
精髓消耗難以有瘳虫者瘻也目為濕瘻多因疳傷久痢腸胃
受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎
腎主虛縫受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名
曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齒爛名曰潰槽熱血并出名
曰宣露其者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復
生外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒
斷生瘻爪黑面黧身多瘻疥夫是之謂腎疳肺疳即氣疳由乳
食不調壅熱傷肺所致也肺主平氣鼻乃肺氣所通其氣不和
則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癰瘻濕是爲
單疳其瘻不痛汁所流處隨即成瘻亦名痴瘻外證欬嗽喘逆

壯熱惡寒皮膚粟生臘癰流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛焦
泄利頻併夫是之謂肺疳即食疳由乳食不節脾胃受傷
所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使
吐乳多眠久則變爲乳癖腹脇結塊亦名痃癖外證面黃身黃
肚大脚細吐逆中滿之力酷嗜水穀不消泄下酸臭合面困倦
減食喫泥夫是之謂脾疳五臟疳傷大抵然爾折而論之曰五
疳出虫曰蛔疳曰脊疳曰膶疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢
曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚曰疳露證狀非一可不舉
安撮要而條析之乎五疳出虫者疳傷之源雖起於乳餉不謂
然臟腑停積已久莫不化而爲虫其虫或如絛髮或如馬尾多
出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔疳者
失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化爲蛔虫皺眉多啼惱
吐沫腹中乍痛肚脣青筋脣口紫黑腸頭齒癢是也蛔雖食
虫不可盡殺口裏有蟲者卷疳者虫蝕脊督身熱羸黃積

口生熱煩溫下痢拍背如鼓鳴脊骨如錦齒或十指皆瘡頻喫
爪甲是也。腦疳者胎中素挾風熱生下乳餉越常頭皮光急滿
頭餅癧。頭熱如火髮結如穗遍身多汗頭暉頭高是也。臨產多
然亦然易損兒眼乾疳者瘦悴少血舌乾多苔其病在心目不
轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦
皮燥大便乾結其病在肺搭口癰眠胃脘乾渴其病在脾總爲
五乾疳是也。疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五辛酒麪
炙博使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是
爾疳渴者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是爾勿用
制黑止之疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水
穀不聚頓下惡物是爾疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故
今腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面腳手虛浮是爾法當留磨
補調氣疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胷前熱而發瘡
盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾或渴而復渴飲水惡食肚硬如石面

色如銀斷不可活無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫蝕臟腑以致形體羸瘠便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾針刺破

膏藥或溌濯兒衣露於簷下爲雌鳥落羽所汚兒着此衣虫

入皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足極細項小骨高戾削體瘦緩大臍突號哭脣陷或生穀癟是爲丁奚虛熱來往頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦是爲哺露丁奚哺露皆因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復爲風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患腎疳內虛不食其者天柱骨倒治法當用葛氏此書加驅疳等劑仍與貼項強筋若不識證謂之不較非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發養成者是皆風邪入肺以致肺絡舒弛吐瀉者當調胃

氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療故併及之雖然疳之爲說亦畧盡矣調治之法將何擇焉錢氏曰治疳當辨冷熱肥瘦初病爲肥孰疳久病爲瘦冷疳熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱疳病多在外單下赤爛頭瘡口濕齧五心煩熱掀衣氣竊渴引冷水以燎卧地肚熱腳冷潮熱往來皆熱疳也冷疳病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面黧又壹譜煙燭卧地似有熱狀惟飲食不進滑泄無已亦冷疳也其有渴多膿血日加瘦弱此則謂之冷疳症大抵疳之受病皆虛使然孰者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故錢氏又曰小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之細領平上醫處此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者疳之母由積

而虛謂之疳。諸有積者無不肚熱脚冷須酌量虛實而取之。
若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後爲之微利若積勝
平虛則先與利導纔得一泄急以和胃之劑爲之扶虛然取積
雖當躁利如

白虎湯

或

大承

中湯

或

大柴胡

湯

或

小柴胡

消積等輩亦不可無脇
間癖痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘
嗽錢氏有癖爲潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而觀
發作不同療治不一又可無權度於此哉若夫諸癖惡證心癖
飲水不已食則驚啼耳邊紅多舌上黯黑者不治肝癖左脇結
硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎癖飲水好鹹小便
如乳耳焦肩聳牙寒骨枯者不治肺癖努氣促頻瀉白沫身
上粟生其色斑黑者不治脾癖喫泥洲痢水穀不消厚白腹高
人中平滿者不治其或滑泄不休脫肛吃逆抱起昏沉手足重
軟繩及脚心全不知覺項筋舒展身體變冷且則爲五絕證候
甚者曾

端吸乳食百無應滿腹脹脹皮破髮瘡倉廩內

光榮與夫非勞渴渴而槁色天骨露盤張肚硬不食者皆危篤矣抑有聞焉石韞玉而山輝水懷珠而川媚人受父母之氣生精血不榮胞胎有損如草木萌芽之受傷望其華實之不猥編者難矣丁奚哺露胎辨瘡非胎中已受之病乎不特此爾兒方過晬母復有孕乳汁成毒飲齧小兒神氣亦致骨立尪羸是謂之敗病育奇丸此等類虛症復生難施其巧余於終篇所以爲之抽關啓鑰云

諸疳證治

諸疳通用

薑蒼

北五靈脂

好夜明砂
縮砂

橘皮

青皮
去白

蓬莪木
煨

史君子

名貢肉

鴨爪黃連
煅

蝦蟆名參焦

右末雄猪膽貳枚取汁和藥入糕糊圓麻子大每拾伍圓米飲下疳勞瘦弱本方加蜜蠻壹錢半川弓參錢

薑薑

黃連名壹錢瓜蒂

猪牙皂角

蝦蟆灰錢半麝少許

右末吹入鼻竇則可療

諸症圓治一切疳及疳眼赤腫痛發昏暗雀盲或經月合眼

鷓鴣爪黃連

各壹兩

蕪荑

培

麥芽炒

神麌各半兩青皮去白

史君子肉

糖各貳錢半

右末裹猪膽汁浸糕圓研子大每朵圓米湯下疳熱眼山楂仁煎湯下

大瘡膏圓治諸疳

薑薑

蕪荑

木香

青黛萬

楨榔

川黃連

甘草根

胡黃連半兩

麝少許

右末猪膽取清液研子大每朵圓米飲下

治五疳潮熱壯脹

胡黃連

半兩

香潤五靈脂

右末獮猪膽汁圓麻子大每服拾伍圓米飲下五疳潮熱謹

勿用

川黃連

去黑無葉取仁

神曲

麥蘖

橘紅

木香

蝦蟆

燒存性各置鐵

史君子

參附筒去殼研

肉豆蔻

生

雞心檳榔

鹽麝酒

右細末獮猪膽貳枚取汁入好酒打清麪爲圓芥子大每服拾伍圓米飲下

胡黃連圓治熱疳

胡黃連

川黃連

各半兩

朱砂

蟾酥

研

右貳連爲末和蜜沙入猪膽內繫定虛懸於銚中煮壹炊父取出研濃膏每服各貳錢半去足底火貳錢鹽少許粳

米飯圓麻子大每每拾圓食後米飲下

至聖圓治冷疳瘧

丁香

丁皮

各壹錢

木香

各壹錢

紫厚朴

半錢

史君子肉

膳肉

豆蔻

膳果

紅各一錢

蜜炙

各一錢

右末神麌糊圓麻子大每柒圓食前米飲下

通經圓治冷熱痛

胡黃連

川黃連

木香

各一錢

燕羹

各一錢

丁香

肉豆蔻

生

史君子

膳肉

各一錢

大蝦蟆乾

蟬頭

桑螵蛸

各一錢

右末膏和圓麻子大每拾圓米飲下

心圓治心痛驚癲

伏神

薑

舊

琥珀

川黃連

各一錢

赤伏苓

鈎藤皮

遠志肉

菖蒲

各一錢

細節石菖蒲

蜜炙

各一錢

桑米糊圓麻子大每拾圓酒湯下

大麻圓治肝疳風疳眼

青黛熟川黃連

天麻

北五靈脂

夜明珠砂微炒川芎

蘆薈

吉武錢

龍膽草

防風

蟬殼去足各全蝎頭拔

麝

少許

乾蟾頭炙焦參

右末宿膽汁浸糕圓麻子大每拾圓薄荷湯下

生乾地黃熟地黃各半兩淨川芎

半赤伏苓

枳殼裂杏仁水浸去皮川黃連角半夏曲

麥芽

天麻地骨皮

甘草各一錢半

右剉每服貳錢薑參一片黑豆拾伍粒水煎臨卧服

大熟地黃半兩肉桂半錢甘草

赤伏苓

山茱萸肉桂取

當歸

川芎

川練子肉 牡丹皮

山藥

史君子

累根取肉
各減錢

右末煉蜜圓桐子大每參圓空心溫湯化下
走馬牙治口齒出血臭氣

銅綠

半錢

生蜘蛛

壹枚

右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即用殼貳箇
清肺散治肺熱瘡瘍飲爲穿孔汁臭或生魚肉

桑白皮

炒半兩

紫蘇

北前胡

黃芩

當歸

天門冬

去心連翹

防風

赤伏苓

北梗

生乾地黃

甘草

各一錢分

右剉每服貳錢井水煎食後服次用

化蠻丸

蕪荑

蘆薈

青黛

川芎

白芷梢

胡黃連

川黃連

蛤蟆灰

等分

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓食後臨臥煎湯下其量常用米酒泡湯小筆蘸洗俟前藥各進數服却用
青鹽蜜歸元砂子白芷細黃連黃芩等分雄黃少許細末入臘妙藥

靈潤圓治脾疳食疳

北五靈脂 縮砂仁 白豆蔻仁 麥芽炒
蓬木根 青皮去白 橘紅 史君子肉炒
各貳錢

蝦蟆炙焦

右末米糊圓麻子大每拾圓米湯下

圓治疳止諸虫

新白苦練根皮酒浸一宿 綠色貫衆

木香

桃仁去皮尖

蕪荑炒

雞心

檳榔

各貳錢

鶴虱炒

輕粉半錢

乾蝦蟆炙焦

史君子

五拾商

右末飛麪糊圓麻子大每貳拾圓天明清肉汁下內加蜜歸

黃連 各貳錢半治脊背兼疳勞方可擇用

龍膽草 治腦疳

治腦熱餅瘡

龍膽草

川升麻

苦練根皮

治防風

赤伏神

蘆薈

油髮灰

各貳錢

青黛

黃連

合參錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓薄荷紫蘇泡湯下食後仍以糞入鼻八韋

黃連

治疳渴

黃連

半兩淨猪膽汁浸壹夜曬乾

瓜蔓根

烏梅肉

半兩乾皮去核

石蓮肉

各貳錢

右末牛膽汁浸糕爲糊圓麻子大每拾伍圓煎烏梅蜜湯下又擦虫後附方治內外藥可治疳渴及五乾病

黃連

半兩

治疳渴

黃連

參錢

治疳渴

肉豆蔻

半兩

木香

诃子

半兩

縮砂七
伏苓

右末粳飯圓麻子大半拾伍圓食前水飲下

大齊圓治痔瘡

黃連

木香

紫草

縮砂仁

夜明砂

開鐵炒各五錢

詞子肉

炒宣錢

右末粳飯圓麻子大半拾伍圓乾艾葉生薑煎湯食前溫下

大齊圓治痔脹

蘿蔔子

陳皮

青皮

去白

好櫟榔

黑牽牛

取竹牽牛半

北五靈脂

赤伏苓

蓬莪术

根名木香半

木香

頭風錢半

右末飛麪糊圓豆大半拾伍圓紫蘇子茴香煎湯下又

大齊圓

方是腸加門加

末煎紫蘇湯調下少吞

紫蘇

圓治痔脹肚皮緊

黃耆

當歸

川芎

白芍藥

生乾地黃

蛤蠣

甘草

柴胡

白伏苓

橘皮

半夏曲

史君子

葛根

甘草

各等分

右鹿末每貳錢薑棗煎食前服之

人參

各等分

川芎

蕪荑

柴胡

史君子

葛根

胡黃連

川黃連

各等分

右用葛根壹錢
川芎壹錢
史君子壹錢
蕪荑壹錢
胡黃連壹錢
滻瀉壹宿次早炒乾
透去寒井血只用貳錢夾絲藥杵末粟米粉糊圓麻子六
每貳拾圓食前熟水下

治無汗時諸症壹服虛熱退貳服煩渴止參服瀉利住
營除痘散夏月滿身中取腋下
不制筋肉多癰腫

右取葛根壹錢置桶中以水浸之桶上要乾不與虫走却病

打殺頓在虫中搗碎虫食壹日夜次以新布作袋盛包繫定置之急流瀆宿取出瓦上焙爲末入鼎壹字粳飯揉圓麻子大每貳拾圓米飲下

久方治無溼痢

夜明砂炒爲末入諸飲食中與之

金匱治丁瘞嘔露

青皮

陳皮

名去白蓬木

川芎

北五靈脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

蘆薈

各半兩

木香

史君子肉

名去白蝦蟆灰

各三錢

右末猪膽汁浸糊圓麻子大每貳拾圓米飲下有熱則薄荷湯下

五珍圓治癰傷肚大

並見積類

治癰積方

和劑方小黃連阿膠圓最治小兒諸疳症熱疳渴每服貳拾圓

米飲下

疳蛭不能發聲方 前黃連肥兒圓 每服拾五圓用蜜食香圓壹粒入朱砂五靈脂末各少許以菖蒲煎湯乘熱調開送下

龍膽湯治腹病

龍膽草微炒 鈎藤皮

柴胡

北梗

甘草

人參蜜炙 大黃煎水半湯匙

川芎

伏苓

葛根

芍藥

右剝散每貳錢井水煎服仍以紅絲袋包明沙頭兒帶

疳瘡方論

凡人自孩提以至弱冠潮熱發瘡只是疳氣使然蓋疳虫耗其精髓蝕其肌膚體虛膚寒疳熱流注遂致遍身熱瘡發歇無已須用清壯藥主之治以大腹皮茶水煎湯浴之當前湯浴之

圓肥兒圓二味夾和佐之可也

疳瘡論治

雄豬肚

壹月剖淨

鵝瓜黃連

去皮頭淨水研

右剉作小截少水和濕納豬肚中用線縫密頸在伍升粳米
上蒸十分爛取放臼中入些蒸飯搗千餘粒黏得所衆手
捏圓如小桐子每服貳拾遺米飲下童子倍之冠者又倍之
仍以川芎生地白芍各一錢爲末與之調血清心熱多者間服和
利逐風寒以上潮熱發瘡是爲虛勞皆一種病也用
藥同前凡兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生瘻常須識
此矣

積

積滯方論

小兒有積面目黃腫肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸閉
澁小便如油或便利無禁糞白而酸此等皆積證也然有陰虛
有陰虛有氣虛要當明辨吐乳渴乳其氣酸臭此由啼叫未已

積

以乳與兒停滯不化得之是爲乳積肚硬帶熱渴瀉或嘔此由飲食無度多餐過飽飽後即睡得之是爲食積腹痛啼叫利如翻瀉此由觸忤其氣榮衛不和淹涎日久得之是爲氣積合用大查固主之雖然積有虛有實虛積渾身微熱不思飲食昏昧神緩抱起如睡實積肚熱糞閉顯腫喉塞壅盛涎鳴熱毒發瘡推此可見之全虛者少與之實者倍用之亦有傷乳傷食而身體孰者惟腹肚之熱爲甚人知傷積肚熱糞酸極臭而夜間有熱傷積之明驗人所未識也其或變諸面黑渴黑又瀉不止腹肚脹滿氣出漉大手心生瘡瘦弱柔軟皆不可療○小兒消積多用清涼散然同上最能發汗有汗者勿與之

積瀉證治

木香圓治乳積食積氣積

木香

蓬莪术

縮砂仁

青皮去白

朱砂

蘇子

大蔴石

研末

大丁香

川巴豆肉桂

右細末和勻飛白麪糊圓麻子大風乾每服或參圓乳傷乳
汁下食傷米飲下後與大異香散方見脹滿門或

散亦得氣積橘皮煎湯下下後與小異香散方見脹滿門或

小異香

治乳食傷

心腹脹滿氣壅壯熱

或渴或嘔

丁香

縮砂仁

各一錢

史君子

各半錢

不去油

烏梅肉

川巴豆肉

各三分

不油

積圓

治酒食積通用

右末研細和勻爛飯圓麻子大每參圓橘皮煎湯下

積圓

治酒食積通用

青皮

白芍

乾薑

北五靈脂

蓬莪术

各二錢

兩

右為末來和秤藥末壹兩用肥己同內以石壓准去半油秤
壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每服參伍圓米湯下不飢
飽時服

圓治疳積

方見癰毒門

治驚積有熱

方見癰毒門

良妙膏

踝利驚積

方見癰毒門

朱銀圓

治驚積

方見癰毒門

痞結證治

痞者塞也。結者實也。熱氣蘊於胃膈之間。留飲聚於腹脇之內。於是榮衛不得流行。腑臟不得宣通。由脹滿而至痞結勢使然耳。此熱實之證也。時或發爲壯熱。

甘遂散

王文

甘遂

清分服
微黃

青皮

浸去
白芷

黃芩

川大黃

剉碎微炒
各半兩

右鹿末每服壹錢水一小盞煎去滓溫和服量大小增減用得通利則止後服利後以糜粥放冷補之

癰氣證治

癰者血膜包水僻側於脇傍時時而作痛也。惟癰爲能發潮熱。惟癰爲能生寒熱。故癰家中脫多喜黃水。日夕而後結癰寒熱之不已者。以此小兒臟腑和平。榮衛調暢。則津液自然流通。縱使多飲水漿。不能爲病。惟夫乳哺失調。三焦關隔。以致水漿停滯。腸胃不能宣行。冷氣搏之。於是結聚而成癰。輕者用積滯藥。

本草圖重者用取膏

取膏圖

甘遂微炒

芫花炒

牽牛

半炒半生
銀器取肉

辣桂

蓬木

青皮

木香

桃仁

浸去皮油

五靈脂

各一錢
蜜煎

右細末入去油巴豆壹錢研和十分細飛麪糊圓麻子大風乾每服壹錢蜜煎湯灌下油後冷粥補仍和胃

藥圓治乳癬殺癰腹中塊痛

代赭石

少許
研細
水研
分吞

青皮

去白

木香

蓬木

五靈脂

北

大黃

各一錢
參

巴豆

壓去油
蜜煎

右末醋麪糊圓麻子大風服貳圓食後擦薑泡湯下

藥圓

治小兒腹中結癖塊痛

代赭石

研細

川大黃

各半

木香

五靈脂

朱砂

研細

桃仁

浸去皮

辣桂

各壹分

巴豆

壓去油
蜜煎

各半

右細末糕糊鳳麻子大風乾每服伍圓薑湯下

執

諸熱方論

小兒有病惟熱居多夫熱有虛者實實則面赤濃黃氣麗口熱燥渴唇腫大小便難撤揭露衣煩啼暴叫虛則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣軟弱泄多尿夜出虛汗其或乍清乍溫佛慄悸惕上盛下泄水穀不分此則冷熱不調之證虛熱實熱見瘧家明實熱見瘧家明加減四物湯加減四物湯見瘧家明冷熱不調則取之見瘧家明天兒寒續加減四物湯加減四物湯見瘧家明當歸苦升降陰陽則參圓薄荷湯研下○小兒表裏俱熱而黃賴赤苔燥口乾小便赤澁大便焦黃先以四物湯加減四物湯疏利其熱即大既去而復熱者裏已消而表未解也當用四物湯加減四物湯以取

微汗則表熱盡除其或表裏已解而熱又時來此則表裏俱虛

氣不歸元而陽浮於外不可再用涼藥再與解表當爲和其胃氣更陽歛而歸內身體自涼

方見虛勞門
萬葉略

前服

諸熱證治

明積寒熱加味最妙

人參身熱口渴治兒童虛勞熱潮熱或遍身瘡

比參

當歸

遠志

肉桂

比前胡

柴胡

地骨皮

防風

北梗

枳殼

半夏

各一錢半

川芎

伏苓

赤芍藥

麥門冬

去心各二錢半

甘草

各一錢半

右剉細每服貳錢水小盞薑參三片紫蘇冬青葉煎服發瘡者兼服

熱

潮熱而肚脹者米飲常服貳拾圓

龍膽草治小兒每日早餚後發熱夜則身涼此血熱也

胡黃連半錢宣黃連

赤芍藥各半錢

右末瀝豬膽汁和成劑入膽皮中虛掛以漿水煮熟取藥研圓麻子大每貳拾圓米飲常服

龍膽草治疳熱

龍膽草黃連史君子肉青皮等分

右末瀝豬膽汁圓麻子大每拾圓食後熟水下

清解散治感風發熱頭疼鼻塞涕流及溫壯悉主之

北參

防風

天麻

北前胡

伏苓

北梗

枳殼

甘草名貳錢

細辛

柴胡名貳錢

川芎名貳錢

右末每壹錢水一小盞薄荷乾參葉略煎溫和服

新刊仁齋直指小兒一論卷之三

卷之四

○傷寒

傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分劑少異用藥少冷已略陳於前矣然而驚風瘡豆亦嘗發布此尤不可闕請發明瘡證而條析之惡風惡寒者必限人藏身引衣密隱是爲表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥冀掀衣氣粗是爲裏證可略與疎利也至若頭額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便濁青此則陰病裏虛當以溫藥救其裏也舉是二者汗下溫之法可以類推矣發汗用桂枝湯東合湯加黃芩解肌用香蘇散加葛根通利四順清涼飲微利人參敗毒散溫裏理中湯散冷甘草乾姜湯尋常感冒惺惺散或參附散傷風發熱人參羌活散或天麻防風固壯

熟者升麻葛根湯 潮熱者桂枝湯加人參小便不通者加人參散白芍散表裏俱熱如表裏俱見之證加人參散白芍散加柴胡夾食則要簡散參附圓輩然亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺則以一指按其三關據左手人迎之緊盛者斷之所謂七十二證其證其方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略舉巢源一二而終篇以活人書爲法東何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云

傷寒證治

桂枝湯半湯

桂枝

桂枝去皮分量

生薑

半兩

甘草

半兩

麻黃

半兩去根節

杏仁

七粒

甘草

半兩

大棗

數枚

右剉如麻豆大每服伍錢水壹盞半煮至八分去滓溫服

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子炒去毛

紫蘇葉

各一兩

青橘皮去白

甘草

一錢

甘草一錢

右爲篋末每服參錢水壹盞煎去滓分去滓熱服不拘時日參

服解肌加葛根葛根前若作細末只服貳錢入鹽點服

升麻葛根湯 治小兒時氣

瘟疫頭痛

發熱肢體煩疼

方見鴟類

米胡湯 方見暑門

理中湯

方見鴟類

甘露飲

四順飲

方見積

麥冬散 方見水飲門

參蘇飲

方見寒門

人參姜桔散

方見服

人參散 方見寒門

紫霜圓

方見食癪類

寒、瘡

寒瘡證治

當山散 治小兒發瘡痰壅煩悶

川常山

川大黃

甘草

桂心

烏梅肉

各半兩

右剉細每服壹錢并水一小盞煎半候冷未發前與之



虛寒

虛寒證治

惟腎主虛亦惟腎受寒小兒骨氣未就雖虛而不容補但以地黃圓頭之方見腎經門厥冷者以生乾薑各一錢煎湯調下洞泄者却專用木香白朮生乾薑各壹分熟桂多分量各半分剉細量大小作劑入陳米煎服

虛汗

虛汗證治

圖書易治小兒虛汗盜汗或心血液盛交發為汗此藥收斂心氣

新羅人參

川當歸各等量

右剉細用雄豬心壹箇切參片每服貳錢豬心壹片并水壹
盞半前空壹盞食前兩次服

又擗汗方

黃連

母蠅粉

貝母各半兩米粉壹升末傳

痰火涎

痰涎證治

痰涎方論直指講之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥白圓子
方見身疼類加朱砂同研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰蘇合香圓并大沫以風
圓方見喉門加朱砂末薑汁泡湯調下餘方見直指方痰飲類

釋焉

風痰證治

朱砂圓 鎮心壓驚驅風墜痰

朱砂研十分直僵蚕洗大南星

白附子

濕紙糊紙乾取各半兩

全蝎半分 蟹殼一錢

麝香一錢

右末飛白麪糊圓麻子大每服伍圓薄荷湯溫服

雙命散 控下風痰全活危急

青礞石

青礞碎

淡消

青礞碎

和入蜜

窩內

硬炭火

焰氣硝

燒冷如

金色取出

碾細

右末每服壹錢匕急風薄荷汁入蜜調下延藥自大便出狀
如稠涕次服退熱截驚等劑慢風入少蜜煎湯調下涎
即墜入腹中次服

清涼詩家三圖

圓白大半夏

湯後柴灰

真川烏

皮去

附子

洗黑炮

白附子

洗黑炮

圓白天南星

洗黑炮

天麻各半

兩

全蝎壹分

右細末生薑汁煮飛麪糊圓麻子大每拾圓熟水下諸癇

研入

少許薄荷湯入薑汁調下傷風頭

嗽白圓子末

紫蘇烏梅煎湯入薑汁調下

嗽白圓子

金酒

舟等分爲末米飲調下

大抵小兒諸病非熱則痰治痰惟半

夏爲上上藥

喘而咳

咳嗽喘嗽證治

杏仁治小兒久患咳嗽

杏仁去皮焙伏苓一兩

紫苑茸

皇角去皮取肉各半兩

右末每半錢生蜜調入薄荷湯泡開服

蘇北陽治小兒喘嗽

紫苑茸

貝母

真蘇子

杏仁水浸去皮搗黃

北梗

陳皮

麻黃去節

半夏麵

赤伏苓

桑白皮

甘草微炙等分

右剉細每服壹錢畫墨片紫蘇參葉并嫩梗准水煎服

人參 治感冒咳嗽喘冒滿痰滯

人參 言分

枳實 製

桑白皮 炒

半夏 裏

赤伏苓

五味子

細辛 淨

北梗

麻黃 去節

阿膠 炒黑

甘草 炙各半兩

右剗散每壹錢薑叁片柴蘇叁葉水煎服凡治喘嗽不論肺實肺虛可汗可溫可下藥中須用阿膠便得安肺潤肺其性和平肺經要藥

脾田胃

胃氣虛實證治

凡人以胃氣爲本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食之證實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣胃虛用參苓白朮湯等劑胃實用大黃附子湯等劑若夫胃中停寒則用桂枝加芍藥湯又不可謂

貴在酌量但以小卜

與之夫是之爲平胃

驚惕不食

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾
有藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智仁

石菖蒲

白茯苓

蓮子肉

陳皮

縮砂仁

半夏麴

木香

厚朴根各熟錢

甘草炙去毒質

姜

大黃

吐瀉

嘔吐證治

消乳治乳哺不化停滯中脘或作嘔惡

丁香

木香

青皮

生肉蔻

三稜

蓬木等分

右細末稀糊圓丸子大每服伍圓米飲下日貳服
益胃散快膈益脾止嘔進食

木香

丁香

藿香

陳皮

縮砂

白豆蔻仁

各壹分

甘草

右細末每服參季煎薑棗湯乘熱調下或加

治小兒胃虛嘔吐水穀不能入

圓白半夏

湯浸柒次
培乾壹兩

陳粳米

參錢

右剉細每服壹錢水大盞量伍片北棗壹枚煎半溫服

吐瀉證治

龍骨香散治小兒吐瀉

良薑

香附

天竺烏藥

辣桂

各貳錢

甘草

幾錢

加陳皮

藿香

各壹錢

右細剉每服壹錢水煎灌下仍別煎與乳母服

治霍亂吐瀉

參錢

藿香葉 陳皮

肉豆蔻生

半夏製

青皮 酸木瓜

甘草

葛根各半兩石菖蒲

右細剉每壹錢藿香葉一片紫蘇參草水煎服暑月加香薷

又方桂心甘草生等分藿末水煎入法醋些少服

藿香

肉寇

生壹分

甘草生半分

右爲末每服壹錢新水煎服

不寐金匱風眩

方見寒類

加木香大枣治嘔渴

泄瀉證治

霍亂腹痛治小兒腎泄面黧黑齒消脫骨力弱小腹痛泄多
白膜腹瀉丹（乞見瀉類）參圓爲末入蜜乳酒半錢以炒米炒熟

壹錢半主內豆蔻壹錢大棗貳枚煎取清汁乘熱調空心灌下

小便不通黃散治胃虛腹痛泄利

陳皮

葛根

青皮

芍子肉

葛根各半兩

丁香

木香

甘草

各貳錢半

右細末每服壹錢陳米少許水煎服

肉豆蔻治小兒腹痛大瀉

肉豆蔻一錢半白蜜一錢半納滿爲末米飲調下

治小兒冷熱不調上盛下泄

木香

當歸

川芎

北前胡

柴胡

青皮

北梗

甘草

右剉散每服壹錢薑棗煎不飢飽服

鴻臚證治

設石子圓治瘡瘍或大便瀉

白沒石子

一錢半

白豆蔻仁

一錢半

訛子肉

一錢半

木香

各一錢半

右末粳米糊圓麻子大每服拾伍圓米飲下

藍青擣汁每服半盞煎之

腹痛

腹痛證治

腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也。挾熱作痛者以面赤或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷作痛者以面色或白或青見之冷甚而證變則面色黯黑唇口爪甲皆青矣。熱證四濱清加葛根湯。方見葛根

加葛根湯

方見葛根

冷證消渴七味湯

方見七味

加葛根湯

方見葛根

加葛根湯

調氣散

方見氣門

若乃邪正交爭冷熱不調則痞硬

方見痞硬

加青皮陳皮木香等爲妙

腫脹

腫脹證治

葛根散治小兒水氣腫滿

甘草薑

開胃

紫牽牛

畧炒

桑白皮

炒

雞心檳榔 川大黃

割去黑分

右爲末每半錢水半盞蜜片蜜半匙煎湯調下或煎大碗

茶飲研末一錢灌下

分量少治小兒腫脹作喘氣短而急

甘草梗

赤伏苓

陳皮

桑白皮

大腹皮

枳殼

半夏麵

真蘇子

紫蘇

甘草

炙各

貳錢草果仁

蜜炒

右剉每錢半水一小盞蜜參片棗壹枚煎半服

陰腫證治

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕氣傷之不爲陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉擊於下結聚不散加以水寶不行亦能發爲此疾治法用

桃仁一錢

桃仁

長去皮炒熟研末

辣桂

牽牛

微炒研末

白蒺藜

炒杏樹去刺

牡丹皮

大黃

各減半

右末煉蜜圓麻子大每服伍圓或柒圓
小許煎湯灌下或煎大流蜜飲研杏子圓灌下

水飲門

母蠣灰

貳分乾地龍

壹分

右細末津唾調傳外腎熱者雞子清調傳

母蠣灰

治小兒外腎腫大壅物涌明

母蠣灰

外腫研末唾調傳

大小便諸證

遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱爲津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出

謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用雞腸散

雞腸散

雞腸

牡礪灰

白伏苓

真桑螵蛸

微炒各半兩

辣桂

龍骨

各貳錢半

右罷末每服壹錢薑棗煎服

又方

雞肫脭

壹具雞腸

燒存性

右爲末每壹錢酒調下男用雞女用雞

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分而色白也久則成疳亦心膈伏熱兼而得之用伏苓散

伏苓散

京三棱

蓬莪木

搗

縮砂仁

赤伏苓

各半兩

青皮

陳皮

滑石

甘草

微炙各貳錢半

右末每服壹錢

煎湯調下

又方 大甘草頭煎湯服

諸淋證治

葵子散治小兒諸淋

葵子

車前子

木通

蘧麥

桑白皮

赤伏苓

山梔仁

甘草散多等分

右剉每壹錢井水小盞葱白貳寸煎染分食前溫服

葵子散治小兒血淋

生乾地黃

木通

黃芩

甘草

生各壹錢

右爲末每服壹錢井水入燈心煎服仍以米飲調油鹽空心灌下

家常方

生蒲黃

生地黃

赤伏苓

甘草

散多等分

右剉每壹錢水小盞煎染分調敷火食前服

大便不通證治

治小兒風與滯血留蓄上焦胃膈高起大便不通

沒藥

大黃

枳殼炒

北梗各兩錢

木香

甘草

炙各一錢

右剉每壹錢薑貳片水煎服

脫肛證治

龍骨治小兒大腸虛肛門出

龍骨

訶子肉

炒各半錢半

沒石子

大者數粒

墨粟殼去殼
醋炙各一錢

右末每服壹錢米飲調下

丹毒母

丹毒證治

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而偏體也此由乳母酒麴煎爻過度與夫烘衣與鬼不候冷而即著多成此疾或發

於手足或發於頭面腎督令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可言
總有入腹入腎之證便不可救藥通用方見寒類
加蜜酒

真言外用
青黛散并水入蜜研傅

又方

北梗

天花粉

乾葛

川升麻

川芎

赤芍藥

獨活

柴胡

甘草等分

右剉散每壹錢薑貳片并水煎服餘見丹珍門

吐血

吐衄證治

蒲黃治小兒吐血咯血

主蒲黃

油髮灰

等分

右研細每壹錢水調下或采飲亦得

蒲黃水治小兒吐血衄血

生地黃汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下
生蘿蔔搗汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

仁王火症

顛填證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充
腦髓故顛陷如坑不得平滿頭骨灸黃爲末雞子清調傅之

顛填證治

顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱
乘於脾家致使腑臟不調其氣上衝爲之填脹顛突而高如物
堆垛毛髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢勤熱氣上衝則柔
軟寒者溫之熱者涼之劑量量輕兼與調氣小兒肝盛風熱交
攻亦然未易退癢

解顛證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎上髓腦爲髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顱開而不能合丸腦髓少如木無根不過年日終成廢人姑與

大熟地黃

洗滌屏錢

山茱萸

乾山藥各貳錢

澤鴻

言錢

牡丹皮

白伏苓

各言錢半

右末煉蜜圓桐子大每壹貳圓溫熟水空心調服仍用

蜜微炮爲末米醋調傳於紺帛烘熱貼之

又分

華陰細辛去苗土

辣桂去桂皮乾薑生

右等分爲末乳汁調傳

口舌證治

髮灰細末猪脂和傳

亦好

重舌證治

重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之絡脉出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生壹物形如舌而短小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒斷者曰重齒皆當刺去其血也用言誦傳之或懸火傳之或馬口酒傳之或

浸酒

點之

亦好

木舌證治

舌者心之候脾之脉絡於舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是爲木舌若不急療必至害人
蜜糖壹字研細山楂調下○又方黃芩葛花研細蜜酒半之同研點染次○又方川芎酒貳分蜜糖壹分白蜜半分同研每半錢酒并水調傳

滯頰證治

小兒滯頰涎流出而瀆於頰間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏

木香

丁香

川白薑生

白朮

青皮

陳皮

名貳錢半

右細末糕糊圓麻子大壹錢拾圓貳錢貳拾圓米湯灌下

喉痺證治

蛇退

性爲末

右每半錢乳汁調下或用燒存性爲末每半錢乳汁調下

語遲證治

言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣
心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也

鳴通圓

人參

石菖蒲

麥門冬

去心

遠志取肉

薑製熟

川芎

當歸

名貳錢

滴乳膏

朱砂

名壹錢別研

右末煉蜜圓丸子大每服拾圓綬米飲下

夜啼證治

夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則爲陰極發燥寒盛作夜所以夜啼而不欲也主之

釣藤

伏神

伏苓

川芎

當歸

木香

甘草

大黃

右末每服壹錢鹽棗略煎服其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之證去當歸加朱砂末壹錢研和每服壹錢白連煎湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者醋炭熏服急以方術驅之

焰心燒灰有性塗傅乳上與之

眼病證治

眼睛

明白藥鑑錄內前取半分并水東瓜子

右入蜜酒大匙以炮浸過點芥子許

耳病證治

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱上衝於耳遂使津液壅滯爲
稠膿爲清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停留博於血氣
溫熱成熱亦令耳膿久不瘥變成聾耳

明礬散

龍骨

名參蠶黃丹

胭脂

蜜少許

右細末先以綿杖撫去水以以鵝毛管吹藥入耳本方加酒

亦好

胡粉和東方壁土爲末傅

又方

蝦蟆燒灰存性擣爲末和猪膏傅

龜胷證治

胷高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏
月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候

川大黃分天門冬

去心杏仁去皮

百合

木通

桑白皮炒

甘草蜜炙

爛石膏各半兩

右末煉蜜圓绿豆大每伍圓食後臨卧熟水化下

龜背證治

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致僵硬背高如龜背矣然此多成痼疾間有灼艾收功而久之第三椎骨下兩傍各壹寸半膈俞穴第六椎骨下兩傍各壹寸半以小兒中指中節爲壹寸爻柱如小麥大但參伍壯而止

臍病證治

治臍中汁出或赤腫

白石脂末焙出火氣傳之日參度或油墨灰傳或蠶糞傳

腳氣當歸末傳亦好

鶴膝證治

小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝抑亦腎虛得之腎虛則精髓內耗屬革不榮易爲邪氣所襲日就

拈擗其殆鶴脚之節乎前項本方加蜜酒酥炙川
藥各貳錢修合服餌量同參歲以下與拾圓參歲以上與拾
伍圓

行遲證治

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行
抑亦肝腎俱虛得之肝主筋筋弱而不能束也

方見腎門加

酒浸去皮炒香

又方

虎腰骨酒炙

生乾地黃

酒浸去皮炒香

白茯苓

辣桂

防風

當歸

川芎

牛膝等分

右末煉蜜圓麻子大每伍圓酒調下或煎木瓜湯下

小兒年滿一歲不能行

真五加皮

酒牛膝

酸木瓜乾各半分

右為末每服壹錢半以粥飲調次入好酒貳點再調食前服
日貳劑

癩疝證治

癩疝者陰核氣結腫大而吊痛也多因小兒啼怒不止傷動陰氣故陰氣不擊結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如季者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有木硬者腰下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

方見水飲門

未通入少鹽煎湯調下以利小便

當歸

牽牛

各半兩

當歸

全蝎

半錢

白芍

桃仁

各一錢去皮薑

全蝎

半錢

右細剉每壹錢水入蜜煎服以利大便利後

和胃惡諧脣青不治

川練散治小兒疝氣小腹痛引腰脊鑊出一身不能直

木香

擯榔

三棱

蓬木炮

青皮去白

陳皮

川練肉

芫花米醋浸炒各半兩

辣桂

牽牛生取仁

川巴豆肉

大黃油

右細末飛麪糊圓丸子大每參國空心壹服午前壹服蓋湯送下

瘡解證治

鰣魚治小兒白疕

鰣魚清尾重參身兩者去腸肚以細裏燒存性

雄黃蜜鐵

右同末生麻油調傅先以蜜水洗拭後用藥

桑榆白皮爲末醋調傅

練模枝皮燒猪膏調傅

蛇皮燒存性爲末猪膏調傅

鍊成松脂末并髮灰生號丹填傳

諸方 白膠香半兩研末貯小盒貳錢研和豬脂調傳或
猪筒骨髓調白油亦治大風即是此脂鎔煉投冷水中為末

水調空心常服

德清方 治卒得癰瘡 赤爛牛糞燒灰研細傳

嘉慶方 瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

蛇退皮燒存性細研雞子清調傳

慈惠方 燕窠土研細豬脂調傳

勝方 水銀壹分 胡粉貳分水研入雞冠血傳

開胃散 治小兒眉叢中生瘡名曰鍊銀散

穿山甲前脾鱗炙焦為細末麻油輕粉調傳

新刊仁齋直指小兒方譜卷之四

瘡疹

瘡疹方論

小兒瘡疹大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或爲窠眼禁牙驚搐如風之證或爲口舌咽喉脹肚疼痛之狀瘡從口腹中生故篇或爲煩躁狂悶昏睡譏語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨方論所載以耳冷骯冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與骯足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之間或中或否不若視其耳後有紅脉赤縷為真於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汙但溫涼之劑兼而濟之解毒和中

安表而已。如欲解肌，葛根、紫蘇可也。其或小兒氣實煩燥熱熾，大便秘結，則與犀角地黃湯入參敗毒散，草或紫草飲多服亦能利之。小便赤少者，分利小便，則熱氣有所滲而出。凡熱不可驟渴，但輕解之。若無熱，則瘡又不能發也。已發未發，並與參葛根爲當虛者益之，實者損之。冷者溫之，熱者平之。是爲權度。借喻而言，亦如庖人籠蒸之法。但欲其鬆耳。如苟妄汗，則榮衛既開轉增瘡爛。如苟妄下，則正氣內脫，變而歸腎，身體振寒，耳聾反熱，眼合肚脹，其瘡黑壞十無一生。舌黑者尤難癒。何者？瘡隨五臟有證。未發則五臟之證悉具。已發則歸於一臟。受毒多者見之。故肝臟水瘤，淡出如水，小而色青。肺臟腺瘤，其涕稠濁，白而大。心臟發斑，紅褐色赤而小。脾臟發瘍，色黃褐赤，又小而白。惟鬲腎則變而黑焉。青者，更病瘍也。瘡疹屬陽，本無胎證。胃在胸之而不受攝，毒攻無制。陽取火也，腎取水也。以火用事，爲水所制，不勝哉。然則欲致黑瘡，將何如？曰：先爲膀胱而後急溫脾。

翻

案

是爾錢氏云黑陷青紫者同脾圓下之不黑者謹勿下余知其
所下者瀉膀胱之邪也

小兒脾胃主虛不可過也瀉膀胱以益其
脾則腎邪去矣

又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消

或寒戰者爲逆余知其脾強者十二可以制水也

同脾圓太峻當

以爲陽氣代之瀉後溫脾則

參脾圓等分白朮白芍同

各半爲妙蓋發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不

可消勝已泄之腎水平此錢氏不刊之秘旨也雖然發黑本爲

惡證治之有方猶有幸而生者至於調衛之際乳母不能謹口

流毒於小兒或粥乳不時使之飢虛或衣被不適致傷風冷以

至閨宮有觸外邪有忤則亦冰硬變壞而歸於腎自我致寇又

誰咎耶能調衛者以溫散湯劑暖乳蔭之謹護風寒使之氣體

和適其於粥餉則勿令飽而氣實飢而內虛斯得矣此尤在發

家垂意焉

瘡疹之論秦漢以來其詳可得聞也。自扁鵲倉公作古以爲
嬰孩湯散當先和節陰陽。調治榮衛方利臟腑即熱氣漸解而
董汲張渙初虞世栖真子諸醫認贊爲嫡。每曰瘡疹證候初覺
即鍼利之以宣其毒。又曰已出者不可鍼利。瘡出已定却用利
之余竊惑焉。蓋嘗深索古書之意見其諱謾持重不直曰利臟
腑而必以和陰陽調榮衛先之則知古人所謂利者暢達流行
之謂而非勇決峻下者比也。如曰已患之後俗多禁餌大小便
不通不能調湯藥以和臟腑遂停敗熱於其間是古人之利大
小便不過調劑以和之而已。如曰已出者可服平和湯藥察其
肝臟解其敗熱以防熱毒攻眼是其解熱又曷嘗不用和平之
劑乎然則破諸家似是之非開後世未明之惑惟錢氏直訣朱
氏活人書其說爲甚正錢氏療瘡疹證候惟用溫涼藥治之不
可妄下攻發。朱氏曰瘡疹已發未發但不可鍼轉此爲大
戒又曰瘡疹首尾皆不可下。鍼用利藥即毒藥入裏殺人以此

觀之瘡疹證狀雖與傷寒相似而瘡疹治法實與傷寒不同。傷寒所博從表入裏。瘡疹所發從裏出表。蓋毒根於裏。括下之。則內氣一虛。毒不能出。而返入裏。由是土不勝水。黑陷者有之。毒發於表。若汗之。則禁。傷一虛。重令開泄。轉增瘡爛。由是風邪乘間。變證者布之。汗之二說。古人抑深戒也。調解之法。將何如。曰。

治而謁氣安和。和中輕清消毒溫涼之劑。二者得兼而已。溫如

當歸

東陽大青

輩。涼如

葛根

輩。佐之以

川芎

附子

設。當通。秦氏之通。當歸。川芎之屬。則可以調適矣。繼自今小兒凡覺身熱。證似傷寒。但未經瘡豆。疑似未明。且先與當歸。川

蘇散。或

人參。吳茱萸湯。或

人參。附子。瘡

豆已出。則少與化毒湯。出不快者。加味四物散。或

人參。附子。瘡

豆。不

管。湯。紫草。不

通。湯。或

人參。附子。瘡

豆。或

人參。附子。瘡

豆。或

金角。或

黃連。小便赤澀者。大連翹散。白蘞散。或

人參。附子。瘡

豆。或

人參。附子。瘡

豆。或

人參。附子。瘡

豆。或

人參。附子。瘡

豆。或

人參。附子。瘡

豆。或

人參。附子。瘡

豆。或

喉痛者大如指頭者加喉瘻湯喘滿氣壅者宜重苓湯胃脹脹

滿者

加喉瘻湯

煩渴者甘草散烏梅湯下利

嘔逆者

小陷胸湯

桂枝湯

如兒泄利初發者少用葛根湯

下利可

入者少味少聖散

更以薄荷散

薄傅其身厚傅

其足噴其衣服併以厚綿蓋之

若猶未也獨聖散

入體散

酒

調劑或不用酒則

小陷胸湯若其瘡已黑乃可用錢氏宣風散

加

青皮主之然而瘡疹用藥固有權度大便小便不可不通其

有大便自調所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用

錢氏宣風散

靈丹可也大小二時一或間焉則腸胃壅塞脉絡凝滯毒氣無

從而發泄眼閉聲啞肌肉黧然不旋踵而告變矣

凡小兒先發

搐而後發瘡者生瘡已瘥而後發風或吐或渴者死先發熱自

利而後瘡出者存瘡已發而後泄不止者亡瘡黑而忽渴腮血

痂皮者順

臟中有熱也渴血而水穀不消者逆脾胃虛也或渴

血而瘡癰無膿者亦不可殺

胃寒也裏之陽明主肌肉胃氣不

可一日而不強也。世俗無知，每見瘡瘍，不論男女，稟受虛實，槩

用酒以潤之，以傳其身。酒麴毒物，以充其腹。猥曰：使瘡出快其間。

兒氣素怯，或遇天時陰寒，猶可扶之而無恙。設若春夏之間，陽氣發越，或兒氣素強，酒麴助虐，則以火濟火，骨中熱熾毒，蓄血聚瘡，出愈難。亦或爲之黑陷，當此之時，能用蜜蠶前湯，入

星血和營，少許以解之，猶可措手。或者更與熟毒之物，遂使

咽喉結閉，耳目口鼻腫滿，悉平大便祕堅，小便出血而死矣。又

或妄施巴豆，取積之劑，則臟氣暴脫，熱又不除，邪氣愈甚，變爲

喘滿，便血，癰爛破裂而死矣。吁！自詔伊阻，如是其可畏哉？雖然

瘡亦有再發者，特間有之。瘡皮厚而色頑濁者，發於臟，其候重

瘡皮薄而色精明者，發於腑。其候輕，臟熱則爲豆瘡，腑熱則爲

細疹。孰重者，瘡亦重；孰輕者，瘡亦輕。平復以還，消解餘毒，宜

蜜蠶散。常須與之否，則敗熱留滯，肌肉之間，亦令凹者再發，或瘢黑而不變，猶更飼之以毒，必致發癥，患利

家。卷之二十一

腮腫單劙眼翳之患瘡爛成片者。或生蠶乾傳膿多痛甚者。乾淨
浸漬。取汁啖之爲愈。丸瘡欲成痂。頻以面油乳膏潤之可揭。即揭血出無害。若乾硬已久。必成瘢痕。如茶如醋如猪肝。猪血之屬。妄與食之。則已脫之迹。必爲之黯慘。然而瘡痂已脫。肌肉猶嫩。不可盥洗太早。亦不可以手加之也。須臾。能辟惡氣。左右所不可無。或蒼术降真用之。亦可。瘡曰聖瘡。七日熱而發。七日泡而乾。又七日則平復如舊矣。大抵調順血氣溫和。脾胃均平。冷熱則瘡出爲甚易。若實實虛虛。損不足而益有餘。則瘡出爲甚難。調解之法。無以逾此。故備論之。以解世俗之惑。云脉證于後。

瘡疹證候

瘡疹證候。面色燥。腋脣赤。眼睛黃。目胞赤。四肢亦赤。手足冷。耳鼻冷。頭痛。腰脊痛。咳嗽。噴嚏。呵欠。

煩悶。擣跳驚悸。昏多睡。小便赤少。大便不通。不惡寒。惟惡熱。方其身熱未即發瘡。治其身涼。然後發出。三部脈洪數。往來大小不應。指而疾。

壞瘡治法

一曰內虛泄瀉。二曰外傷風冷。三曰變黑歸腎。蓋內虛泄瀉者。或因臟腑虛怯。其證已逆。初發以來。自然作瀉。或未發之前。誤服涼藥。以致泄下。凡此者。其瘡不發。每形見小點淡紅而白。或白而微黃。如水泡之狀。治之當用。參木白朮散。煎湯調下。先與止瀉。然後以溫和之劑。發之外傷風冷者。或因煩燥惡熱。出頭露面。點點方萌。遽爲風冷所折。或瘡出如珠。妄與解脫。以取涼快。而風冷襲之。凡此者。輕則其狀如赦。色紅而不發。重則陷如石巨。腳色白而冰籠。治之當溫血散寒邪。用。附子散。然後與發瘡之劑。或。加味附子散。若惡寒畏人。更加。官桂散。然後與發瘡之劑。或。內虛泄瀉。或外傷風冷。皆經日胃氣虧損。由是而變壞焉。故

令耳聰反熱其瘡青紫變黑此則腎證曉然矣蓋腎屬北方水
是以其色黑其證逆治法先瀉膀胱之府而後急與溫脾若其
瘡不黑則斷非腎證謹不可下請詳審之。瀉膀胱法先用通
利大便等分爲末每服一錢棗湯調下次用宣風散一錢
加蜜煎服若瀉下惡物急以溫脾湯剷繼之。瘡且爲陰邪
穢氣所傷亦令變壞可用醋炭蘇合香圓解之

論升麻葛根湯

升麻葛根湯按和劑方瘡豆已發未發者皆可服此俗習爲常
談不問小兒虛實冷熱自直至毛率多用之甚者方發而不快
既發而復陷亦以升麻葛根湯爲常用之劑其爲害可勝嘆哉何者
嘗解表升麻蓋寒小兒氣盛熱多服之猶可以消毒萬一內
虛胃弱則以水濟水寧不虧損胃氣水凝血脉而瘡疹轉爲之
逆陷乎夫古人所謂未發者身熱尚疑似之時也所謂已發
者既透徹欲成痂之候也烏當以發而不快與發而復陷爲可

用之或誤。若不辨明殆恐狃俗相傳枉死者半矣。又况人之齒牙大熱大毒。或者相習變陷不透者。不問虛實一槩用之。其害又有甚於是。用之不審也。蓋瘡疽變陷有因外感風寒而壓之者。治法則當解散寒邪。有內氣大痰。榮衛不得調暢而出不快者。治法則當流行氣脉。安可既曰水冷直用。今遂使小兒服之。鬱悶聲啞。迨其發出。稠疊曩常往復。此而不救矣。曷不用之。是瘡疽則宜。而嘔吐者為愈哉。

瘡疽惡證

瘡瘍屬陽。春夏為順。秋冬為逆。冬月寒盛。腎水得時。多歸於腎。或先如瘡後發渴。其瘡色如黯血。此腎證也。不治。○春體弱為金。夏木。夏黑陷為水。秋斑子為火。冬疹子為土。寃水並逆。○舌黑。或鼻有黑氣。並不治。○瘡色出而譖詬。有為惡證。○躁渴小便澁泄。不入食。不治。○瘡成餅搭。黯樘不發其聲。焦亞不治。○兩眼閉而黑睛濛昧。無光不治。○面腫。鼻脣目閉。

頸嚙齒者不治。頭面腫大瘡盡爪破或臭不可近或脚冷至
膝並不治。瘡小黑而焦風攻頤額脣項腫硬或齶高而突並
不治

小兒諸病但見兩眼無精光黑睛無運轉自睫無鋒毫如魚眼
猫眼之狀箇箇不治或神藏於內但外若骨困者無妨其有病
篤而眼中神氣不脫者猶可以活眼者五臟六腑神氣之所萃
神氣已脫脉雖僅存亦未能保

瘡疹證治

附眼藥

前胡去苦

人參去苦

紫蘇葉

乾葛洗

半夏

湯洗水次薑汁製炒

茯苓去皮

名分枳殼去皮炒

陳皮去白

甘草炙

桔梗去芦

右㕮咀每服肆錢水盞半盞另片裹膏鹽壓一分去滓微熱
服不拘時

治小兒風熱及傷寒時氣癰疹發熱

白茯苓

去皮細辛去葉

桔梗

瓜萎根

人參去芦

甘草炙

白朮

川芎各等分

右爲末每服壹錢水小盞薄荷參葉同煎詳分溫服如要和氣入生薑煎服不拘時

之方見癰類

方見癰類

瘡豆已發以此消毒

紫草耳半兩

川升麻

甘草炙

半

右剉散每服貳錢糯米伍拾粒同煎旋服

方見頭風門加

末

治小兒疹豆或發透或未透忽

面青暴乳是爲風邪所傷用此主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷驗之然須見心腎間細點如粟起則爲真

加吳茱萸散治瘡豆出不快及久留者

紫草首

木通

商木香

黃耆
微炒

川芎

甘草
等分

右蘿蔔末煎壹錢不時服大便秘加少許大便如常加百粒糯米解毒能釀而發之

紫草

壹兩

右剉細百沸湯大碗沃之蓋定勿令氣出逐旋溫服紫草能導大便發出亦輕

又方

紫草首

壹分

陳皮

半分

右蘿蔔末新汲水煎服

紫草首

治瘡

出不快大便泄利

紫草

木香

伏苓

白术

等分

甘草

炒少許

右入糯米於蓋內能利大便所以佐之也

糲米通腸治瘡疹出不快

紫草

人參

木通

伏苓

糯米等分

甘草減半

右剉散煎貳錢溫服內虛大便利者可入南木香去紫草

治瘡豆出不快

紫草

蟬殼

人參

白芍藥各壹分

木通

甘草炙半錢

右剉散煎貳錢溫服

絲瓜湯

發瘡疹最妙

絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下

星角地黃湯治瘡出得大盛以此解之方見養生門
此活人書

大連翹湯治瘡疹壯熱小便不通

連翹

瞿麥

荆芥

木通

車前子

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

渭石

蠅殼

甘草

山梔仁

黃芩

各半錢

右剉散每服壹錢加蜜煎溫服

方見眼目門

治小兒疹痘因服熱藥多發而不透

身體頭面兩目皆腫連日風搐奮身硬直

圓煎

調服

耳聾方見積熱門

耳聾散

方見水飲門

小柴胡湯方見寒類

四順膏

方見積熱門

大如聖湯葛子湯參耆養茶湯治瘧疾散湯即活人書方

二陳湯

方見痰飲

蜜散瘡豆略出煩渴不止

粉草

微炙

枯棗根等分

右爲末煎服壹錢蜜掌通血脉發瘡丘

烏梅湯 疰目熱渴

小黑豆

荳豆

各一合

烏梅

五箇

右㕮咀新汲水壹椀煎

取清汁旋服

朱香理中湯

即和劑理中加朱香

各半兩

蜜丸

方見前人書

加味四聖散

方在前胡之酒或用酒煎或用熟酒澆亦得

獨聖散

穿山甲

湯洗淨炒令焦黃

右末每服半錢入麝少許

南木香煎湯調下或蜜煎湯入紅酒少許調下

宣風散

檳榔一箇

陳皮

甘草

淡

一分

黑牽牛

半兩生

右細末幼者半錢壯者壹錢

蜜湯調食前服

甘露散

五福化毒丹

方見和剗方

加味宣風散

治腎證瘡目赤黑

即宣風散加青皮壹分氣怯者

外加南木香一錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐糞然後以和胃藥加酒米與之良久糞黃瘡自微出又以竹園足草煎酒傳其身即得發起

調解散治瘡豆已發或爲風冷所折榮衛不和或爲宿食所傷內氣壅遏以致水硬並主之

青皮

陳皮

桔梗

枳殼製

半夏製

川芎

木通

乾葛

甘草炒

紫蘇等分

人參城半

右剉散每粒裹煎服

不換金正氣散

方見寒類

黃柏瘻瘍初萌急以此防眼

黃柏去皮、新糞豆

紅花各一分

甘草生

右爲末麻油調爲膏薄塗眼眶四圍頻用爲妙或臘脂傅之

亦可若用

頭膏

尤先護目

人參白芍各一錢治瘡豆執毒攻眼赤腫用桑白皮煎湯調下

桑白皮沿斑瘡入眼生翳

白菊花 新桑豆皮

真穀精草 各壹分

右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔壹盞同煎候米泔盡只喫
柿乾日兩枚

白菊花 珊瘡翳眼

真桑螵蛸壹分入焦研

右細末入麝少許每服壹錢米泔溫調臨睡服
治諸眼昏翳風痒方

真杏仁叁伍粒水浸去皮尖

右細嚼和津液吞五更端坐常服杏仁潤肝去塵滓也

又麻翳方

生鱠魚以針刺其血磁器盛之點入翳上自愈

烏鵲油劑方

小兒方一二歲發熱恐成瘡豆以此止之

生麻油

童子小便各半盞

右逐旋夾和以柳枝頽攬令如蜜每服貳錢殼許服畢令卧少時但參肆服大小便利身體熱退即不成瘡豆之證若形跡已露則不可服也

以手蘸麻油摩其背脊中間亦驗

灌藥服藥法

小兒煎藥以銀盞熱水半盞藥多又加多焉其或不能灌藥則以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼乳食後少頃服和平之劑隨意無拘

察小兒眼中神法

凡小兒病證雖可畏而太衝有脉神氣未脫顙門未陷顏色指甲未至黯黑者猶可着力雖然五臟六腑之精氣皆上注於目望而知之當先以目中神氣爲驗

新刊仁齋直指小兒方論卷之五

