

古今醫鑑 十

卷十

| | | | |
|----|----|----|----|
| 心痛 | 脇痛 | 脚氣 | 消渴 |
| 腹痛 | 臂痛 | 痿癈 | |
| 腰痛 | 癩疔 | 痺痛 | |


漢書門

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 類 | 號 | 函 | 架 | 冊 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |

內閣文庫

| | | |
|----|-----|--------|
| 番號 | 漢 | 12610 |
| 冊數 | 16 | (10) |
| 函號 | 301 | 107 |





王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之十

金谿 龔 信 纂輯

子廷賢 續編

金壇 王肯堂 訂補

心痛

脉 沉弦細動皆是痛證心痛在寸腹痛在關下部在

尺脉象顯然○堅實不木便者下之痛甚者脉必

伏○陽微陰弦短而濇者皆心痛也○脉沉細而

遲者易治○浮大弦長皆難治

病 夫心痛者即胃脘痛也其種有九曰飲曰食曰風

日冷曰熱曰悸曰蟲曰疰曰去來痛名雖不同未
有不由清痰食積鬱於中七情九氣觸於內之所
致也治法須分新久若明知身受寒氣口得寒物
而病於初傳之時當以溫散或溫利之藥若得稍
久則成鬱矣鬱則成熱又當以溫散藥內加苦寒
之藥溫治其標寒治其本也由是古方多用山梔
為君熱藥為之嚮導則邪易伏而病易安若縱恣
口腹不謹調食則病復作必難治也此病日久不
食亦不死若痛方止便吃還痛必須三五服藥後
漸而少食庶獲全愈其有真心痛者因大陰觸犯

心君或汚血冲心而痛極手足青過節者且發而
夕死夕發而旦死非藥所能治也
治諸痛不可用補氣氣旺不通而痛愈甚故云通則
不痛痛則不通也
一凡痛在心連兩脇至兩乳下牽引背飯匙骨下而
痛者實熱也
一凡痛在小腹連臍左右上下疝痛手足厥冷者虛
寒也
一凡心痛以物挂按則痛止者挾虛也以二陳湯加
炒乾薑和之

一凡心痛因平日喜食熱物所以致流於胃口作疼
痛用桃仁承氣湯下之若輕者用韭汁桔梗能提
氣血藥中兼用之

一凡心膈大痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不効者就
吐中以鷲翎探之出痰積碗許而痛即止

一蟲痛者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作時
止是也用一陳湯加苦練根皮煎服上半月蟲頭
向上易治下半月蟲頭向下難治或曰痛而久臥
不安自按心腹時大叫或青或黃唇緩目無精光
者蟲痛也又曰腹痛肚大青筋者取蟲丸主之

一心痛卒急無藥以鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱

飲之吐痰而愈此法治攪腸沙大痛已死者立効
謹按痛則不通通則不痛夫胃脘心脾痛者或因身

受寒邪口食冷物內有鬱熱素有頑痰死血或因
惱怒氣滯蟲動作痛種種不同若不分而治之何

能愈乎余曰是寒則溫之是熱則清之是痰則化
之是血則散之是氣則順之是蟲則殺之庶乎臨

證不眩惑矣

方清熱解鬱湯西園公製治心痛即胃脘痛下服即止

山梔仁炒黑一錢半 枳殼麩炒一錢 西芎一錢

黃連炒七分 陳皮 五分 蒼朮浸 七分

香附 一錢 乾薑炒黑五分 甘草 五分

右剉一劑生薑三片水煎熱服服後戒飲食木
半日渣再煎服

○倉卒散 秘方

山梔仁炒黑五錢

右剉一劑生薑三片煎服下方加川芎一錢尤

妙

下方單用梔子炒為末每服二三匙心痛腹痛薑

一湯調下○痢作肚痛黃酒調下○四肢浮腫米

飲調下小便淋瀝白湯調下

○平氣散 劉孟門傳 治心痛

蒼朮 一錢 梔子 五分 當歸 一錢 青皮 一錢

陳皮 一錢 枳殼 一錢 木香 一錢臨熟時入木香再煎

○宜京甘草 三分

右剉一劑生薑三片水一大碗煎至七分通口
服

○清鬱散 治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛

及惡心嘔吐清水或作酸水醋心煩悶

陳皮 一錢 半夏 一錢油炒 香 一錢 白茯苓 一錢

按此方治
心胃火
作痛調和
之劑

蒼木 一錢米 煎炒 川芎 六分 乾薑 五分 炒黑

香附 一錢 童便炒 神麴 一錢 炒 黃連 一錢 薑汁炒

梔子 一錢 薑汁炒 甘草 三分

右剉一劑生薑三片煎服○嘔吐甚加藿香四分

砂仁 四分 此方為丸服亦妙

○宜氣散 嚴發治心胃刺痛牽引胸脇疼痛內有實

熱脈數有力者

梔子仁 炒 鹽酒 滑石 一錢 大黃 一錢

○平康木香 右先將梔子以生薑煎湯餘藥入湯內濃磨温

服在上必吐痰在下必瀉其痛立止外以蘿蔔

子炒絹包頻熨痛處

○利氣丸 方見諸氣門 治心胃氣滯食積鬱熱作痛

○加減柴胡湯 西園公製 治實熱乘上心腹作痛發熱不

正 柴胡 一兩 黃芩 七錢 半夏 七錢 枳殼 一兩

赤芍 一兩 山梔子 去殼四兩 半生半炒

○右剉一劑生薑三片煎服

○利氣保安湯 西園公製 治氣痛已服通利之藥下後餘

熱作痛或痛在小腹者

按此方治心胃實熱作痛清鮮之劑

柴胡 青皮 枳殼

香附

○四聖散 治心痛肚腹痛陰證絞腸沙神効

五靈脂 炒出 桃仁 麩炒黃色

草烏 水泡一日一換浸七日去皮尖切

青黛 二錢入藥 八錢為衣

○賦右為末酒糊為丸如梧桐子大每服十五丸或

○賦十七丸用葉七片炒出烟陳酒一鍾入鍋去艾

温艾湯送下

○三因倉卒散 治氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中

水冷自汗如洗手足攣急厥冷

山梔子 大者四十九個 大附子 一枚泡

右為末每服二錢酒煎八分温服

○丁胡三建湯 治冷心疼面青唇黑手足厥冷

丁香 良薑 官桂 各一錢

右剉一劑水一碗煎七分用胡椒五十粒炒黃

色為末調入湯藥內頓服

○救急奇方 治男婦心疼禁了牙關欲死者

隔年老葱白三五根去皮鬚葉搗成膏將病人

幹開口用銅匙將膏送入喉中用香油四兩灌

按此方治
心胃冷氣
作痛辛溫
之劑

按此方治
心胃虫攻
作痛追逐
之劑

送但得葱膏下喉少時將腹中所停蟲病等物
化為黃水微利為佳永不復發

○追蟲丸 治蟲咬心痛

乾漆五錢炒 雄黃二錢五分 巴豆霜一錢

右為末麩糊為丸如黍米大每服十二三丸有

子苦練根皮煎湯送下

○小金丹 秘方 治蟲之作痛時痛時止痛則攻心口

吐清水人中鼻唇一時青黑者是

雄黃 一錢 薑黃 一錢 巴豆去油 三柰 一錢

丁香 二十人言 三分

右為末用紅棗煮熟去核為丸如粟米大每服
四五丸五六歲兒用六七丸或八九丸艾葉煎
湯入醋少許不拘時送下

○心紅散 徐鯉川傳 治心痛氣痛及治孕婦心疼

銀硃 雞糞炒焦乾

右二味各等分和一處每服一錢熟黃酒調服

即出冷汗立止

○治一切心腹胸腰背疼痛如錐刺秘方

花椒為細末醋和為餅貼痛處上用艾搗爛鋪

上發火燒艾痛即止

○加味枳朮丸 治清痰酒積食積茶積肉積在胃

脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸嘔吐

脾痰等證其効如神

白朮 三兩 枳實 麩炒 蒼朮 米泔浸 三宿焙

猪苓 去黑皮 川芎 麥蘗麩 炒黃

神麩 炒微黃 半夏 湯泡透 澤瀉 去毛

赤茯苓 去皮 黃連 陳壁土炒 白螺蛸殼 炮各七錢

硝砂仁 草豆蔻 黃芩 陳壁土炒 青皮 去白

萊菔子 炒 乾生薑 各五錢 陳皮 文葉煎

瓜蒌子 香附米 童便 厚朴 薑汁製炒

檳榔 各三錢 木香 二錢 甘草 二錢

吞酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二錢五分

久病挾虛加人參白扁豆石肉各五錢○時常

口吐清水加炒滑石一兩牡蠣五錢

右爲細末用青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作糊

爲丸如梧桐子大每服七十九多至一百丸清

米飲送下

腹痛

脈 心腹痛不得息脈細小遲者生脈大而疾者死○

腹痛脈反浮大而長者死○臍下忽大痛人中黑

者皆死○尺脉弦則腹痛

病凡腹痛有寒有熱有死血有食積有濕痰有虛有實若綿綿痛而無增減者是寒也時痛時止者熱也每痛有處不行移者死血也痛甚欲大便利後痛減者食積也痛而小便不利者濕痰也經云腹滿按之不痛為虛按之痛者為實凡腹中痛甚飲凉水一盞其痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之清之不巳而或遶臍硬痛大便閉實煩渴用涼藥下之利氣丸之類若飲水愈加作痛屬寒痛用溫藥和之和之不巳而或四肢厥冷腹痛

痛嘔吐瀉利急服熱藥救之附子理中湯之類須詳脉力有無

腹痛氣用氣藥如木香檳榔香附枳殼之類血用藥加當歸川芎桃仁紅花之類

如腹中常覺有熱而暴痛暴止者此為積熱宜調胃承氣湯下之

如腹痛全不思飲食其人本體素弱而腹冷痛者以人參養胃湯加肉桂木香吳茱萸或理中湯加

良薑吳茱萸如飲食過傷而腹痛者宜利氣丸下之并食鬱氣

按此方治
腹痛有熱
者併一切
腹痛之總
司也

滯作痛，
凡人腹痛至於腹中有塊起急以手按之便不見
五更心嘈牙關矯硬惡心而清水出及夢中齧齒
者此謂之蟲痛宜服化蟲丸加史君子
方 開鬱導氣湯 西園製 治諸般肚腹疼痛下服立止
陳皮 五分 香附 童便浸炒一錢
蒼朮 米泔浸製一錢
白芷 一錢 川芎 一錢 茯苓 一錢 乾薑 炒五分
滑石 一錢 山梔子 炒一錢 神麩 炒一錢
甘草 少許
右剉一劑水煎溫服

按此方治
腹痛有寒
者

按此方治
痰積而氣
滯而腹痛
者

按此方治
瘀血而腹
痛者

○行氣香蘇飲 治因氣惱或感寒或傷食下切肚
腹疼痛 ○方見傷食
○四合飲 雲林製

陳皮 半夏 茯苓 紫蘇
厚朴 香附 枳殼 鬱金

甘草 各等分

○消瘀飲 秘方 治瘀血腹痛

當歸 芍藥 生地黃 桃仁
紅花 蘇木 大黃 三錢 芒硝 三錢

甘草

積木

六黃

右剉一劑水一鍾半煎至八分入大黃煎再入芒硝溫服
肚腹疼痛如錐刺不可忍者用白芍黃連甘草各三錢金華酒一鍾水一鍾煎服

腰痛

脉 腰痛之脉皆沉弦沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為風沉弦而濡細者為濕沉弦而澹者為閃挫澹者惡血大者腎虛滑者伏者是痰也

病 夫腰痛者腎之外候一身所恃以轉移闔闢者也蓋

諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛腰必痛矣腰痛有五所感不同一曰陽氣不足少陰腎衰是以腰痛二曰風痺風寒濕著腰而痛三曰腎虛勞役傷腎而痛四曰墜墮險地傷腰而痛五曰寢臥濕地而痛又有三因而分之蓋太陽少陰多中寒少陽厥陰多中風陽明太陰多中濕此六經腰痛者為外因也若失志傷腎鬱怒傷肝憂思傷脾若此腰痛為內因也墜墮險地傷腰而痛為不內不外當以五腫三因而推之不過從其所由汗下補瀉之法以療之風則散之寒則溫之濕則燥之熱

則清之氣則順之血則和之此治之法也
治因寒而痛見熱則減遇寒愈增宜五積散每服加

茱萸五分

一因風傷腎而痛者或左或右痛無常處引兩足五積散加防風全蝎

一因濕而痛者遇天陰或久坐而發蓋腎屬水久坐濕地或為雨露所着濕流入腎以致腰痛宜滲濕湯或腎着湯

一因濕熱宜燥濕行氣用蒼朮黃柏杜仲川芎之類或當歸拈痛湯

一因挫閃勞役而痛者五積散加黑牽牛一錢桃仁炒九枚陳酒煎服神效

炒九枚陳酒煎服神效

一因瘀血而痛者日輕夜重宜行血順氣丹溪補陰丸加桃仁紅花外用三稜針於委中穴出血以其

血滯於下也

一瘀血在足太陽足太陰足少陽三經腰痛宜川芎

肉桂湯

一瘀血腰痛以四物湯加桃仁紅花酒蘇木

一因痰而痛者宜南星半夏加快氣之藥佐之使痰隨氣運

一因腎虛者痛之不巳用安腎主之
一腎着為病體重腰冷如水飲食如故小便自利腰
已下冷痛如帶五千錢治宜流濕兼温散腎著湯
主之

一腰軟者腎肝伏熱治用黃柏防已
一因氣滯而痛或俛仰挫閃宜烏藥順氣散加炒桃
仁酒煎服
一因腎氣虛弱為濕所乘流注腰膝或攣拳掣痛不
可屈伸或緩弱冷痺行步無力以獨活寄生湯
補腎湯西園公製治一切腰痛

破故紙酒炒 小茴鹽酒炒 玄胡索 牛膝去蘆酒洗
當歸 杜仲酒炒 黃柏酒炒 知母酒炒

右剉下劑生薑煎服

○屠尚書方 治腰痛

破故紙五錢 杜仲酒炒一兩 巴戟五錢 胡巴戟五錢
當歸五錢 桃仁四十個

○右剉下劑酒煎入乳香沒藥各三錢調熱服

○壯本丹秘方 治腎虛腰痛久則寒冷此藥壯筋骨

補元陽利小大養丹田治腰痛之妙劑

杜仲酒炒一兩 肉苁蓉酒洗五錢 巴戟酒浸去骨五錢

按此方治
腎虛腰痛
之劑

破故紙鹽水炒 一兩 茴香 一兩 青鹽 五錢
右為末將猪腰子分開入藥在內縫住紙包煨
○熟每一個一服用黃酒送下
○加味青莪丸 治腎虛腰痛或風寒乘之血氣相
搏為痛

杜仲薑汁浸炒 十二個 破故紙水淘十二兩去
蘇同炒變色去
蘇瓦上焙 沉香 六兩 胡桃去皮腸另
乾為末 沒藥另研 乳香另研各 六兩

右為末用肉蓯蓉十二兩酒浸成膏和劑搗千
餘杵丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒或

按此方治
閃挫腰痛
之劑

鹽湯任下

○立安散 治氣滯腰痛併閃挫腰痛腎虛腰痛

當歸 一兩 官桂 一兩 玄胡索炒 一兩

杜仲薑炒 一兩 小茴炒 一兩 木香 五錢 牽牛一錢半
生半熟

右為末每服二匙空心陳酒調下方去牽牛
以酒煎服

○川芎肉桂湯 治露宿寒濕之地腰痛不能轉側

當尾 一錢 川芎 一錢 桃仁五個去
皮尖研
肉桂 一錢 防已三分 蒼木 一錢 羌活一錢
半

按此方治
寒濕腰痛
之劑

獨活 五分 柴胡 一錢 防風 三分 神麴 五分

甘草 錢一

右剉一劑陳酒煎食遠稍熱服

○追風通氣散 方見 治經年腰痛以本方加川草薺

玄胡索陳酒煎服

脇痛

脉 脉雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

病 夫脇痛者厥陰肝經為病也其病自兩脇下痛引

小腹亦當視內外所感之邪而治之若因暴怒傷

觸悲哀氣結飲食過度冷熱失調顛仆傷形或痰

積流注於血與血相搏皆能為痛此內因也若傷

寒少陽耳聾脇痛風寒所襲而為脇痛此外因也

治之當以散結順氣化痰和血為主平其肝而導

其氣則無有不愈矣

治 脇痛者肝火盛木氣實也有死血有痰流注有肝

急者

一木氣實用蒼朮川芎青皮柴胡芍藥甘草水煎服

一痛甚者肝火盛以當歸龍薈丸薑湯下瀉肝火之

要藥也

一死血作痛用桃仁去皮留尖紅花酒拌焙乾川芎

一香附童便浸青皮水煎服
 一肝苦急食辛以散之川芎蒼朮血病入血藥中苦者惡也嫌也或小柴胡湯亦効
 一凡脇痛皆是肝木不餘也用小柴胡湯加青皮川芎芍藥龍膽草

一凡脇痛用青皮必須用醋炒過
 一凡瘀血作痛用小柴胡湯合四物湯加桃仁紅花乳香沒藥煎服痛甚而元氣實者桃仁承氣湯下之

方 枳殼散 治脇間痛如物刺是氣實也

枳殼 麩炒黃 兩五錢
 甘草 炙七錢 五分

右為末每二錢濃煎葱白湯下不拘時服

○當歸龍薈丸 瀉肝火盛之要藥因內有濕熱

兩脇痛甚伐肝木之氣

當歸 龍膽草 山梔子 黃連

大黃 酒濕 蘆薈 青黛 各五錢 木香 二錢 五分

○小柴胡 藜香 五分 加柴胡 五錢 青皮 一錢

石為細末神麩為丸如梧桐子大每服二十九

薑湯下

○治婦人脇痛

○香附子四兩醋一碗 白芍藥二兩 肉桂二兩

玄胡索炒二兩

右為末每服三錢空心滾湯調下

○治諸痛熨法

韭菜根搗爛醋拌炒絹包熨痛處

臂痛

病臂為風寒濕所搏或睡後手在被外為寒邪所襲

遂冷臂痛及乳婦以臂枕兒傷於風寒而致臂痛

者悉依後三方內選用

一有血虛作臂痛者蓋血不榮於筋故也

一因濕臂痛蠲痺湯加蒼朮酒防已

一因痰飲流入四肢令人肩背酸痛兩手軟痺導痰

湯加木香薑黃

方五積散方見中寒治臂痛因於寒者

○烏藥順氣散方見中風治臂痛因於氣者

○蠲痺湯方見痺痛治臂痛因於濕者

○加減茯苓丸治濕痰壅滯經絡不通兩臂作痛

不能梳洗及治手足疼痛麻痺行步艱難服之神效

陳皮鹽水炒二兩 半夏二兩用白礬牙皂生薑各一兩煎湯

按此方臂痛因於痰者

白茯苓 去皮一兩 五錢 風化硝 一兩 二錢

海桐皮 酒洗 一兩 片子薑黃 一兩

木瓜 一兩 薄桂 去皮 五錢 甘草 炙 四錢 白芍 酒炒 二兩

○木瓜黃芪 鹽水炒 二兩

○右為細末薑汁竹瀝為丸如梧桐子大每服百

○丸空心白湯下

○三合散 治背心一點痛

○用烏藥順氣散合二陳湯香薷散加蒼朮羌活

○禦寒膏 治體虛人背上惡寒或夏月怕脫衣及

○一因婦人產後被冷風吹入經絡故常冷痛或手足

○冷痛至骨又治腰痛及一切冷痺痛又治濕氣

○火用生薑半斤取自然汁入牛膠二兩乳香末沒

○藥末各一錢五分銅杓內煎化就移在滾湯內

○煎頭以柳條攪至成膏又入花椒末少許再攪勻

○末用皮紙將紙作殼子看痛處潤狹貼患處用鞋

○大履烘熱熨之候五七日脫下或起小瘡不妨

癩疔

○疔疔脉弦急積聚在裏牢急者生弱息者死沉遲浮

○瀦疔痕寒痛痛甚則伏或細或動

○疔夫疔者小腹引卵腫急絞痛也有痛在單丸者有

痛在五極穴者皆是厥陰肝之經也或無形無聲或形如瓜有聲如蛙自素問而下皆以為寒蓋寒主收引經絡得寒則收而不行所以作痛理固然也亦有踢水涉水終身不病此者無熱在內故也大抵此症始於濕熱在經鬱遏至久又得寒氣外來不得疎散而作痛若只作寒論恐為未備或曰厥陰一經鬱積濕熱何由而致予曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒則火起於肝本經火積之久母能令子虛濕氣便盛濁液凝聚併入血隊流於厥陰厥陰屬木係於肝

為將軍之官其性急速火性又暴為寒所束宜其痛之太暴也有以烏頭梔子作湯飲之其効亦敏後因此方隨病加減與之無有不驗但濕熱又須分多少而治濕則多腫瘰癧病是也又有狹虛而發者當以參朮為君而以疎導藥佐之脉甚沉緊而豁大無力者也其痛亦輕惟覺重墜牽引耳

木經有七疝寒水筋血氣狐癩

治一寒疝者囊冷結硬如石陰莖不舉或控引辜丸而痛得於寒濕也使內過勞也宜以溫劑下之禹功散加味五苓散下清木香丸或五積蟠葱之類

一水疝者腎囊腫痛陰汗時出囊或腫如水晶或痒而搔出黃水或小腹按之作水聲得於飲食醉飽使內過勞也汗出而遇風寒濕氣聚於囊中故多水也宜禹功散三花神祐丸瀉水丸逐水之劑下之大黃代赤芍其氣亦通非徒逐水也

一筋疝者陰莖腫痛或膿或痛裏急筋縮或莖中痛痛極則痒或挺縱不收或白物如精隨洩而下得於房室勞倦及邪術所使以降心火之劑下之瀉心湯主之此水以瓜蒂煎之其效亦速

一血疝者狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨兩端紋中俗

云便癰也得於春夏重感太燥勞於內氣流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多又或強制情欲當泄不泄亦成此疾宜玉燭散和血之劑下之

一氣疝者上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱而脹以針出氣而愈然針有得失宜散氣藥下之宜蕩疝丸或蟠葱散主之或小兒亦有此疾俗云偏墜氣得於其父陰痿精怯強力入房因而有子胎中病也此疝不治惟宜灸築賓下穴在內上五寸膈分肉中灸五壯八小兒疝宜出小便人

古今醫金 卷十 六

一狐疝者狀如仰瓦臥則入小腹行立則出小腹入
 囊中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝與
 狐相類亦與氣疝大同小異令人帶鉤鈴是也宜
 以逐氣流經之劑下之
 一癰疽者陰囊腫墜如升斗不痒不痛得之地氣卑
 濕故江淮人多有之宜去濕之劑下之三花神祐
 丸之類如女子陰戶突出雖亦此類乃熱不禁故
 也不可便認爲虛寒而溫之補之名曰瘕
 一元氣虛弱受寒作小腸疝氣滾痛以蟠葱散加故
 紙小茴川練子木香之類

一體壯實小腸氣痛或小便不通以八正散加破故
 紙小茴香川練子
 一小腹下毛際邊或左或右生氣核如桃狀按之則
 散時伏時見以五苓散加川練子小茴香葱白燈
 心煎湯下青木香丸五十七粒
 一治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際
 結核悶痛不可忍者以梔子炒枳殼炒桃仁炒山
 查各等分生薑三片水煎服

方 禹功散 治寒疝

黑牽牛 頭末 一錢

小茴香 二分 五分

加木香一錢

右共為末每服三錢薑汁調下

○五積散 治醉飽後色慾過度觸傷小腹致成疝

氣其症自小腹痛連兩脇下心頭胃痛額上汗

出依本方加玄胡索

○蟠葱散 治脾胃虛寒氣滯不行攻刺心腹痛連

脇胸及膀胱小腸疝氣又治婦人血氣痛

一兩 丁皮 一兩 砂仁 一兩 莪朮 一兩 三稜 一兩

一兩 檳榔 一兩 玄胡索 七錢 蒼朮 二兩

青皮 一兩 乾薑 五錢 肉桂 五錢 茯苓 一兩

甘草 一兩

右判一劑生薑棗子葱白水煎熱服○臍下極

冷痛加吳茱萸木香小茴香

○加味五苓散 依本方加木香小茴香川練子檳榔黑牽牛故

紙木通青皮三稜莪朮

右判一劑水煎服

○橘核丸 治四積癰疝卵核腫脹偏有大小或堅

硬如石或引臍腹絞痛腎囊腫脹或成瘡毒輕

則時出黃水甚則成癰潰爛

橘核 炒 海藻 鹽酒 昆布 鹽酒 桃仁 麩炒去

桂心 五錢 川練肉 炒 海帶 鹽水洗 玄胡索 炒 水香 五錢

枳實 麩炒 厚朴 薑汁 破故紙 炒 小茴香 炒

木通 五錢 右為末 酒糊為丸 如梧桐子 大 每服六七十丸

空心 陳酒鹽湯下 ○如虛寒甚 脉沉細 手足冷

者 加川烏 下兩 ○如堅 脹久 不消 加礶砂 二錢

醋煮 旋久 米與木香 小茴香

○蕩疝丸 一兩 鹽酒 昆布 鹽酒 桃仁 麩炒去

黑牽牛 取頭 破故紙 炒 小茴香 炒

○文 川練子 去核炒 各一兩 青皮 三錢 陳皮 三錢

莪朮 四錢 木香 四錢 右為末 酒糊為丸 如梧桐子 大 每服五十九丸

心温酒送下

○青木香丸

黑牽牛 炒取頭 末二兩 檳榔 二兩 粟米飯

青木香 一兩 破故紙 二兩

○瓜 葦澄茄 二兩 右為末 水煮 稀糊為丸 如梧桐子 大 每服三十

○丹 丸滾湯送下

○丹 丸滾湯送下

○丹 丸滾湯送下

○行氣香蘇散 治偏墜氣初起疼痛增寒壯熱

依本方加小茴香木香三稜莪朮木通

○加減香苓散 治偏墜氣初起增寒壯熱發表分

利藥輕者下服而愈

枳殼 陳皮 香附 蒼朮

○青木麻黃 香薷 猪苓 澤瀉

水通 滑石 車前子 三稜

莪朮 川練子 玄胡索 甘草

右剉下劑生薑葱白水煎熱服

○文蛤散 治偏墜氣神効

五倍子 五六個 燒存性

右為末陳酒調服以醉為度

○神消散 秘方 治諸般疝氣外腎腫脹疼痛

山梔子 鹽水炒黑 益智仁 炒七

橘核 炒一兩 青皮 香油炒 檳榔 一錢

荔枝核 八錢 小茴香 鹽水炒

右為細末每服二錢燒酒調服如不用酒以燈

草煎湯加鹽少許調服立効

○茴香安腎湯 太醫 治左邊偏墜丸如雞鴨子

人參 一錢 白朮 一錢 白茯苓 去皮 一錢

澤瀉 七分 茴香 一錢 破故紙 一錢 黃栢 八分

木香 五分 檳榔 一錢 烏藥 一錢 香附 一錢 便浸

砂仁 一錢 玄胡索 五分 升麻 三分 甘草 五分 灸

荔枝核 一錢 右到一劑 饑時服

○三香酒 秘方 治偏墜氣

南木香 三錢 小茴香 三錢 八角茴香 三錢

川練肉 三錢 右合 下服 鍋內炒 四味 入葱白連鬚 五根 水一

碗 滓入鍋 將碗罩住 候煎至半碗 取出 渣加

陳酒半碗 合和 入炒鹽一茶匙 空心熱服 神效

○四聖散 秘方 治疝氣外腎腫脹

小茴香 炒 穿山甲 炒 全蝎 炒 南木香 各等

右為末 每服二錢 陳酒調下 服痛止

○木香金鈴丸 嚴憲 治外腎腫痛 諸般疝氣 下服立

效 木香 乳香 沒藥 大附子 麩裹 火煨

小茴香 鹽炒 川練肉 玄胡索 全蝎

人參 各等分 右為末 陳酒打糊為丸 如梧桐子大 每服一百丸

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十

古今醫鑑 卷十
空心陳酒送下

○大小茴香丸

長葛李
大尹傳

治疝氣如神

大茴香一兩

小茴香一兩 吳茱萸一兩 川練子一兩

川椒一兩

右共為末連鬚葱頭八兩同藥搗成餅子晒乾

○木用粘米五合同藥餅研碎微火炒黃為末酒糊

為丸如梧子大每服八九十九空心鹽湯或酒

下忌發氣物

○茴香丸

治疝氣神效

茯苓二兩

白朮二兩

山查二兩

枳實八錢

炒

八角茴香一兩

吳茱萸一兩

橘核三兩 荔枝核一兩

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢五分大空心

細嚼薑湯送下

○灸法 治一偏墜氣痛

用草麻子一歲一粒去皮研爛貼頭頂顛上却

令患人仰臥將兩脚掌相對以帶子綁住二中

指於兩指合縫處艾麥粒大灸七壯即時上去

脚氣

脉脚氣之脉其狀有四浮弦為風宜汗濡弱濕氣宜

古今醫鑑

卷十

三

滲遲澀因寒宜溫洪數為熱宜下○微滑者虛牢
堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲
病夫脚氣者古謂之緩風又謂之厥者是古今之異
名也有乾濕之分其脚腫者名濕脚氣其不腫者
名乾脚氣由脾胃兩經虛弱行動坐臥之間為風
寒暑濕之氣所侵或內因飲食厚味所傷致濕熱
下注而成始得之不便覺乃因他病發動而知先
從脚起或先緩弱痺或行起忽倒或兩脛腫滿或
足膝枯細或心下忪悸或小腹不仁大小便澀或
舉體轉筋骨節酸痛或惡聞食氣見食吐逆或胸

滿氣急蠶寒壯熱狀似傷寒是其候也或經一旬
或半月復作漸而至於足筋腫大如瓜瓠者

治治之之法用蒼朮白朮以治其濕黃芩黃柏知母
以治其熱當歸芍藥生地黃以調其血木瓜檳榔
以調其氣羌活獨活以利關節而散風濕兼用木
通防己牛膝引諸藥下行及消腫去濕以為此證
之太法矣兼用針烙導引其濕熱之氣外出也東
垣曰濕淫所勝治以苦溫以苦辛發之透關節勝
濕為佐以苦寒泄之流濕清熱為臣故立當歸拈
痛湯治之其効捷於影響學者更宜詳究焉

一凡脚腫名濕脚氣用五積散加檳榔木瓜青藤穿山甲

一凡足疼痛皮不腫赤筋不拘急遇夜則痛甚此是氣虛而血不榮也宜十全大補湯加牛膝木瓜檳榔石南藤五加皮沒藥川烏之類或四斤丸若兩膝赤腫強急作熱而掣痛兩總筋拘急此血熱也宜人參敗毒散加赤芍藥大黃利氣丸下之

一凡脚氣上攻胸膈悶滿大便不通宜三和散

一凡脚氣攻注大小便不通用水中太螺螄三箇以鹽下小撮和殼生搗爛置兩臍下一寸三分用帛

緊繫之立通神效

一凡兩膝腫痛脚脛枯細名曰鶴膝風以四物湯黃芪人參白朮附子牛膝杜仲防風羌活甘草又宜五積散加松節叔節

○羌活瀉滯湯 治脚氣初發一身俱痛或肢節腫痛便溺阻隔先用此藥導之後用當歸拈痛散以徹其邪

羌活 二錢 獨活 二錢 當歸 二錢 防已 一錢五分
大黃 四錢 枳實 一錢 炒

右判一劑水煎空心服

○當歸拈痛散 治濕熱脚氣為病四肢骨節煩痛
肩背沉重胸脇不利兼遍身疼痛下注足脛腫
痛脚膝生瘡赤腫及內外生瘡膿水不絕或癢
或痛並宜服之

羌活 一錢 人參 苦參 升麻

葛根 防風 蒼朮 米泔浸炒 各四分

甘草 炙 黃芩 酒炒 茵陳 酒洗 各一錢

當歸 酒洗 猪苓 澤瀉 知母 去毛 酒浸

白朮 各五分

右剉下劑水煎空心服

按此方治脚氣因濕熱者

○神仙飛步丸 製 雲林 治脚膝疼痛

當歸 一兩 川芎 八錢 白芍 一兩 生地黃 兩

黃柏 二兩 酒炒 知母 一兩 蒼朮 一兩 牛膝 一兩

木瓜 一兩 杜仲 一兩 薏苡仁 一兩 防風 七錢

防己 七錢 威靈仙 七錢 羌活 七錢 桃仁 七錢

紅花 七錢 黃連 一兩 肉桂 三錢 黃芩 一兩 酒炒

陳皮 一兩 半夏 一兩 薑汁炒 白茯苓 一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服六七十丸空

心鹽湯下

○五積交加酒 製 雲林 治諸濕足膝麻木冷痺緩弱及

○五腰痛脚氣下虛之疾

白芷 陳皮 厚朴 枳殼

桔梗 川芎 白芍 蒼朮

當歸 茯苓 半夏 官桂

乾薑 麻黃 甘草 小茴

牛膝 杜仲 大附子 川烏

吳茱萸 檳榔 木瓜 草果

砂仁 破故紙 羌活 胡蘆巴

威靈仙 各等分 白朮 土硫黃

○麻右共合一斤用陳酒十壺薑十片棗十格瓦礫

炊熟每日空心温服

○趁痛散 秘方治濕氣攻注腰脚痛行步少力

當歸 酒洗 肉桂 二兩 玄胡索 二兩 草解 二兩

沒藥 二兩 杜仲 酒炒 一兩 五錢

右爲末每服三錢空心温酒下

○芙蓉丸 魏憲副傳治脚腿疼痛一服即愈

啞芙蓉 乳香 沒藥 孩兒茶

鹿茸 去毛 官桂 玄胡索 酒浸 微炒

烏藥 灸 陳皮 五加皮 粉草 灸各等分

右爲末麪糊爲丸每服二錢酒煎葛根湯臨臥

出微汗

○換腿丸 秘方治腎虛下注脚膝或當風取涼冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚

○笑發作無時呻吟難忍氣滿喘急舉步艱難面色

黧黑傳送秘溼並治

當歸

天麻

防風

羌活

石南藤

草薢

石斛去根

黃芪

○滋補肉桂

大附子炮

南星

續斷

蒼朮

各一兩

米泔浸一

兩五錢

按此方治脚氣因寒濕者

川牛膝

一兩酒洗

木瓜

四兩

檳榔

五錢

右爲末麩糊丸如梧桐子大每服五十九空心酒下或木瓜湯下日二服

○二仙丹

劉夷門傳

治脚疾腫痛拘攣

川牛膝

威靈仙

各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十九空心酒下白滾湯亦可忌茶

○追風通氣散

治脚氣加檳榔木瓜穿山甲水煎服

○治婦人脚氣丁月一次足下浮腫手肢拘攣不伸

○谷頭疼心痛吐痰脹滿下元濕熱帶下行步艱辛

當歸 川芎 白朮 茯苓

○或風陳皮對香附 木瓜 檳榔

白芷 白朮 天麻 牛膝 甘草

右剉下劑生薑煎服

痿躄

脉

尺脉虛弱緩而緊病為足痛或是痿病○張子和云痿因肺熱相傳四臟其脉多浮而大不可作寒濕脚氣治

病

夫痿者謂手足痿弱無力以運動也內經謂諸痿

起於肺熱又曰治痿獨取陽明蓋肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性濕居中而主四肢畏木也火性上炎若無節則水失所養火寡於畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡於畏而侮所勝脾得水邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿必須戒厚味節嗜慾庶可保其全安也

陳無擇云痿躄之疾狀類柔風脚氣但柔風脚氣皆外所因痿則內臟不足所致也治之不可混作外因立治

治丹溪曰有挾濕熱有痰有血虛亦有死血者有食積妨碍升降者上文論火起於肺熱實痿之本論此云然者蓋以其發而為所因所挾或有不同而主治亦當各著其所重也

濕熱用東垣健步丸如燥濕降火之劑黃柏黃芩蒼朮之類○濕痰用二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏之類入竹瀝薑汁○血虛用四物湯加黃柏蒼

朮下用補陰丸○氣虛用四君子湯加蒼朮黃柏黃芪之類○食積用小調中湯加神麩麥芽山查枳實之類○色勞用補陰丸虎潛丸之類補之

方清燥湯 六七月間濕令大行子能令毋實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰下痿軟癱瘓不能動履

- 黃芪 一錢
- 蒼朮 一錢
- 白朮 一錢
- 陳皮
- 澤瀉 各五分
- 人參
- 白茯苓
- 升麻 各二分
- 麥門冬
- 當歸身
- 生地黃
- 神麩末

猪苓各二分 黃栢酒炒 柴胡黃 黃連各一分

五味子九個 甘草炙二分 白芍藥一分 代赭石一分

右判一劑水煎空心服白芍藥一分 刺史

○滋筋養血湯雲林製 專治血氣兩虛雙足痿軟不能

行動久臥床褥

川歸一錢 熟地黃一錢五分 白芍藥一錢五分

川芎七分 人參八分 五味子九分 麥門冬去心一分

黃栢一錢 知母五分 牛膝酒浸一錢 杜仲酒炒一錢

蒼朮一錢 薏苡仁一錢 防風六分 羌活三分

木甘草三分

按此方補
更除濕熱
之劑

筋骨痿軟加桂枝三分陳皮八分如覺心煩加黃連六分酸棗仁炒六分白茯苓去木一錢右判一劑薑棗煎服

○養血壯筋健步丸雲林製 治證同前

黃芪鹽水炒一兩 山藥一兩 五味子一兩

破故紙鹽水炒一兩 人參一兩 白芍酒炒一兩

熟地黃四兩 枸杞子一兩 牛膝酒浸二兩 兔絲子酒炒一兩

川歸酒洗一兩 白朮炒一兩 杜仲薑汁炒二兩

虎脛骨酥炙一兩 龜板酥炙一兩 蒼朮米泔浸一兩

黃栢鹽水炒二兩 防風酒洗六錢 羌活酒洗五錢

古今醫鑑

卷十

三

按此方補
虛除濕熱
之劑

漢防已 五錢
酒洗

右為末用猪脊髓七條煉蜜為丸如梧子大每
服百丸空心鹽湯下

○鹿角霜丸 方見中風 治血氣虛弱兩足痿軟不能行動
久臥床褥之症

○蒸法 治腎氣虛弱肝脾三經風寒濕停於腿膝

○使經絡滯而不行變成脚痺故發疼痛和榮衛
通經絡

○黃川椒 一把 葱 三大 鹽 一把 小麥 麩約四
酒 一盞

右用醋和濕潤得所炒令極熱攤臥褥下將所
患腿脚就臥薰蒸薄衣被蓋得汗出勻遍約半
個時辰撤去炒麩上就鋪褥中臥待一兩個時
辰覺汗稍解勿令見風立効

一婦人血氣兩虛虛中受孕新血供養胎元無血健
用厥陰少陰二經以致兩腿足軟弱戰慄不能步
履必待生產後太補氣血壯筋骨則行步輕健矣

人參 一錢
白朮 一錢
茯苓 一錢
甘草 五分
川芎 七分
當歸 一錢
白芍 二錢
熟地黃 一錢
肉桂 一錢
黃芪 一錢
鹽 一錢

古今醫鑑 卷十

牛膝一錢二分 杜仲薑汁炒一錢二分

木瓜酒洗一錢 防風去蘆八分 獨活酒洗一錢 薏苡仁一錢

大附子製一錢 沉香二分 研入藥

右剉一劑 薑三片 棗一枚 水煎 空心服

痺痛

脉

脉澀而緊者痺○少陰脉浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏則疼痛如掣○風寒濕氣合而

為痺浮濇而緊三脉乃備

病

夫痺者手足痛而不仁也蓋由元精內虛而為風寒濕三氣所襲不能隨時祛散流注經絡久而為

痺其為病也寒多則掣痛風多則引注濕多則重

着其病在筋者屈而不能伸應乎肝其證夜臥多

驚飲食少小便數其病在脉者則血凝而不流應

乎心其症令人痿黃心下鼓暴上氣逆喘不通益

乾善噫其病在骨者則重而不能舉應乎腎其症

手足不遂而多痛心腹脹滿其病在皮者多寒遇

寒則急遇熱則縱應乎肺其證皮膚無所知覺氣

奔喘滿其病在肌者多不仁應乎脾其症四肢懈

怠發嗽嘔吐是名五痺至如白虎歷節風以其走

痛四肢骨節如虎咬之狀而以其名之耳無非風

寒濕二氣乘之也若飲酒當風汗出入水亦成斯疾久而不已令人骨節蹉跌丹溪云大率因血虛受熱其血已自沸騰或加之涉水受濕血得寒活濁凝滯不得運行所以作痛夜則痛甚行於陰也治以辛熱之劑流散寒濕開通鬱結使血行氣和而愈更宜忌口節慾不宜食肉肉屬陽大能助火如此調治無有不妥者

治 太法用蒼朮南星川芎白芷當歸黃芩酒在上者屬風加羌活桂枝桔梗威靈仙在下者屬濕加木通牛膝防己黃柏

方 解表升麻湯 治遍身壯熱骨節疼痛

升麻 一錢 羌活 一錢 蒼朮 一錢 防風 八分
柴胡 七分 甘草 七分 當歸 五分 藁本 五分
陳皮 三分 麻黃 三分

右剉一劑生薑葱白水煎熱服出微汗

○靈仙除痛飲 肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於肢節之間而無已也

麻黃 赤芍 各一錢 防風 荆芥
羌活 獨活 白芷 蒼朮

按此方止痛發散之劑

威靈仙 片黃芩 枳實 桔梗

葛根 川芎各五分 歸尾 升麻

甘草各等分

右剉一劑水煎服在下焦加酒炒黃柏一劑○婦人

加紅花一劑○腫多加檳榔大腹皮澤瀉更加沒藥

一錢住痛一劑○一云脉澀數者有瘀血宜桃仁紅

花芎歸及大黃微利之

○疎筋活血湯雲林製患遍身走痛如刺左足痛尤甚

左屬血多因酒色所傷筋脉空虛被風寒濕熱

感於內熱包於寒則痛傷經絡則夜重宜以疎

筋活血行濕此非白虎歷節風

川芎六分 當歸一分 白芍二錢半

生地黄一錢半 羌活六分 白茯苓七分

蒼朮一錢 桃仁一錢 牛膝二錢

漢防已六分 陳皮一分 白芷六分 龍膽草八分

威靈仙一錢 防風六分 甘草四分

有痰加南星半夏各一錢用薑汁白礬皂角煎

湯浸一劑○如上體及臂疼加薄桂三分○如

下身并足疼受風寒濕熱所感加木瓜木通鹽

炒黃柏薏苡仁炒各一錢○如氣虛加人參白

木龜板各七分

○通經妙靈丸雲林製治同前兼治上下中疼痛

黃連酒炒一兩 蒼朮米泔浸炒二兩 黃柏鹽酒炒二兩

肉桂去皮四錢 南芎五分 當歸酒洗一兩 白芍鹽酒炒一兩

錢 漢防已酒洗三錢 威靈仙一兩酒浸 白芷二錢

桃仁去皮尖三錢 龍膽草酒洗一錢 紅花酒洗五錢

羌活酒洗三錢 防風酒洗五錢 龜板酥炙五錢 杜仲薑汁炒八錢

右為細末酒糊為丸如梧子大每服百丸空心

陳酒下鹽湯亦可

按此方止痛養血除濕熱之劑

○加味二妙丸治兩足濕痺疼痛或如火燎從足

胛熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕熱為病

此藥神効

蒼朮四兩米泔浸 黃柏二兩酒浸晒乾

川牛膝去蘆一兩 當歸尾酒洗一兩

防已一兩 川草薢一兩 龜板酥炙一兩龜板難得敗者市貨者多

不効不若以熟地黃代之庶幾可也

右為末酒煮麩糊為丸如梧子大每服百丸空心

心鹽湯下

○舒筋立安散治四肢百節疼痛名曰白虎歷節

甘草 各等分

右剉下劑生薑煎服

○治兩足疼痛麻木雲林製

○代兩當歸 白芍

白朮

蒼朮

陳皮

半夏

茯苓

黃柏 酒炒

川牛膝 酒洗

威靈仙 桃仁 紅花

甘草 各等分

右剉生薑五片水煎入竹瀝同服

○治四肢百節流注走痛皆是濕痰或死血所致其

痛處或腫或紅

○入當歸 川芎 白芷 防已

黃柏

南星

羌活

蒼朮

威靈仙 紅花

桂枝 各等分

右剉生薑水煎服

○行濕滋筋養血湯雲林製 治遍身行痛乃氣血兩虛

有火有濕

當歸

川芎

白芍

生地黃 一錢 薑汁

炒

人參 六分

白朮

白茯苓

威靈仙

防已

紅花 七分

牛膝

黃連

黃柏

知母

甘草 四分

按此方治諸痛宜對症用之

古今醫鑑 卷十

蒼朮各等分 黃連 甘草四分

右剉一劑薑棗煎服

○乳香定痛丸秘方治諸風遍身骨節疼痛或腿膝痛

及筋骨風 川芎 白朮 羌活 獨活 防風 蒼朮

木蒼朮米泔浸 川烏炮去皮

○行氣當歸丸兩川芎一兩乳香一分沒藥各一分

木丁香五錢煎服

右為末棗肉為丸如梧子大每服五六十丸陳

酒送下

○婦人濕痰流注有背臂腰脇疼痛日夜不止行步

不得轉動

陳皮 半夏薑製 茯苓 當歸

川芎 白芷 烏藥 官桂

枳殼 防已 蒼朮 防風

獨活 木香 香附 貝母

甘草各等分

右剉一劑同薑煎服

一婦人患四肢骨節疼痛嘔吐心痛脇脹遍身浮腫

經年不愈

五積散全料加羌活獨活柴胡前胡

消渴

脉

心脉多浮腎脉多弱經云陰不足陽有餘則為熱中又云脉軟散當消渴氣實血虛也又云脉數大者生沉小者死實而堅大者生細而浮短者死

病

內經曰二陽結為之消又曰瘰成爲消中東垣曰二陽者陽明也手陽明大腸主津液病消則目黃口乾乃津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀善饑血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治當以養血滋陰生津降火蘭

除陳氣也不可服膏梁芳草石藥其氣慄悍能助

燥熱也岐伯曰實脉病久可治脉弦小病久不可

治當分三消而治之高消者舌上赤裂大渴引飲

心移熱於肺傳為膈消者是也以白虎加人參湯

治之中消者善食而瘦自汗大便硬小便數叔和

云口乾飲水多食肌虛羸成爲消中是也以調胃

承氣湯三黃丸治之下消者煩渴引飲耳輪焦乾

小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也以六味

地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必發腦疽背

癰不能食者必傳中滿鼓脹皆不治之症也潔古

老人分而治之能食而渴者白虎人參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍加乾葛治之上中既立不復傳下消矣先哲用藥厥有旨哉然臟腑有遠近亦宜斟酌如心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制大其劑皆適其至所為故如過與不及皆誅罰無過之地也如高消中消制之太急速過病所久而成中滿之病正謂上熱未除中寒復生者也非藥之罪失其緩急之故也治斯疾者宜加意焉

治張潔古曰上消者肺也多飲水少食大小便如常此心火刑干肺金而渴生焉法當降火清金宜白

虎湯加減治之

軟石膏 二錢
 人參 七分
 升麻 一錢
 知母 一錢
 黃柏 一錢
 甘草 五分

右剉一劑粳米一撮水煎食後溫服

中消者胃也多飲食而小便黃赤蓋足陽明胃主血熱則消穀善饑血中伏火則津液消燦而渴矣治以調胃承氣湯三黃丸主之

黃連 黃芩 大黃 石膏 各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸米湯下
 下消者腎也小便淋濁如膏煩渴引飲耳輪焦黑

小便頻數能食者必發癰疽背瘡不能食者必

傳中滿腹脹須分而治之

若能食而消者宜加減白虎湯主之

石膏二錢 知母一錢 甘草三分 人參七分

五味子十粒 黃栢七分 玄參五分

右剉一劑粳米一撮水煎食後服

若不食而消者宜加減白朮散主之

人參 白朮 茯苓 木香

甘草 知母 乾葛 各五分 一錢

五味子十粒

右剉一劑水煎温服

丹溪曰三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯

為主治

上消者加入參五味麥門冬天花粉煎入生藕

汁生地黃汁人乳飲酒人加生葛根汁

中消者加知母石膏寒水石以降胃火

下消者加黃栢知母熟地黃五味子以滋腎水

又當間飲縑絲湯為上策

一人被燒酒醉傷成消渴之疾飲水無度余以棗

豆湯頻頻少飲用生冬瓜去皮細細嚼嚙渴則

按此方治
上消之劑

方

生津養血湯

治上消火盛制金煩渴引飲

又飲豆湯不_レ一日而止渴也

當歸 一錢 川芎 八分 白芍 煨 一錢 生地黃 酒洗 一錢

知母 五分 黃栢 五分 蜜水炙 黃連 八分 麥門冬 一錢

中石蓮肉 五分 天花粉 七分 黃連 八分 烏梅 五分

薄荷 五分 甘草 炙 五分

○清涼飲子

治消中能食而瘦口舌乾自汗大便

結燥小便頻數 黃芪 一錢 當歸身 六分 生地黃 六分 龍膽草 酒洗 錢半

按此方治
中消之劑

按此方治
下消之劑

○人參茯苓散

治腎消善飲而食小便頻數白濁

如膏

右剉一劑水煎加酒一匙稍熱服

人參 一分 白朮 二分 茯苓 五分 澤瀉 二分

滑石 半錢 寒水石 半錢 乾葛 五分

連翹 三分 黃芩 五分 桔梗 二分 梔子仁 二分

薄荷 五分 大黃 五分 天花粉 二分 甘草 七分

古今醫鑑 卷十 聖

硝砂二分

右判一劑水煎入蜜服腎消食前上消食後服

○繅絲湯 治三消渴如神

如無繅絲湯却以原蠶繭殼絲綿煎湯皆可代之無時飲之大效蓋此物屬火有陰之用大能

○人瀉膀胱中伏火引陰水上潮於口而不渴也

○玉泉散 治消渴之神藥也

白粉葛 天花粉 麥門冬 生地黃

五味子 甘草 糯米

右判一劑水煎服

○神仙減水法 治三焦虛熱二消渴疾日夜飲水

無度

黃芪 人參 麥門冬 黃連

天花粉 知母 苦參 白扁豆

浮萍 照水晒乾 各一兩 黃丹 二錢

右為末每服二錢新汲水調下

○神白散 即益元散 治真陰素被虛損多服金石等

藥或嗜炙煖鹹物遂成消渴用溫水調服或太渴而飲冷者新汲水尤妙

○秘方 治三消

發此方總 治三消之劑

○特用退雄雞湯澄清飲之

○清神補氣湯 消渴症纔愈止有口乾腹不能擊

或者又添舌白滑微腫咽喉嚙津覺痛噎痛時

○時有渴喜冷飲口中白沫如膏

當歸身錢一 生地黃分一 黃連酒五分 黃柏酒五分

知母五分 石膏四分 柴胡七分 升麻一錢

防風一錢 荆芥穗錢一 桃仁一錢 杏仁五個

紅花少許 川椒二個 細辛一分 生甘草一分

○腎氣八味丸 治心腎不交消渴引飲

王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之十終

按此方治消渴收功之劑

