




始



14.5
695

樺太廳博物館報告

第一卷 第一號

Reprinted from the Transactions of the
Saghalien Locality Museum

Vol. I No. I

Saghalien Locality Museum

Toyohara, Saghalien, Japan

September, 1937

樺太廳博物館

樺太・豊原

昭和十二年九月



A List of the Birds from Saghalien, depended
 on the Descriptions to arrangement of
 Birds on the Specimens in the
 Saghalien Locality Museum

By

Tazō Takahashi

樺太産鳥類目錄

高橋多藏

發行所寄贈本



14.5
695

本書は當館員高橋多藏の調査研究した
る報告にして、樺太自然研究上裨益する處
尠なからざるものと認め、印刷に附したる
ものなり。

昭和十二年七月

樺太廳博物館長 武藤公平



縦書きの文字列（おそらく「樺太廳博物館」）

541
200

序

殖産興業を隆ならしめ、國利民福を圖るには學術の振興と其の普及を促すことが、最も肝要である。「學術の振興は國運の消長に關す」との御聖意を承け、時の齋藤首相が學術振興會を創設以來、文運日に日に隆昌に趣き、北僻の本島に至るまで其の惠澤に浴し、北方文化の進展に影響する所甚大なるものありと、恐察する次第である。

當館は樺太自然研究上重要な位置に在り、従つて學術の振興に就て其の資料を蒐集すべき責務を有してゐる。不肖淺學微力なりと雖其の衝に當り、從業すること多年未だ完了の域に達せず、前途遼遠の憾あるは甚だ慚愧に堪えざる極みである。

當館に於て蒐集したる資料の整理・研究に當り、特に苦辛を感ずるは本島産の鳥類と昆虫であつて、何れも産業と密接の關係があり、自然物中最も重要なものである。鳥類は蒐集も殆ど完了に近づき、昆虫は其の半に達してゐる。此の機に際し、熱のある努力家高橋多藏氏を館員に得たことは、當館の最も幸福な事で、爾來生物の一部を分担せられ勤勉・精勵茲に陳列鳥類を整理研究せられ其の發表を觀るに至りたるは樺太自然研究のみならず、北方文化の建設上洵に慶賀の至りに堪えざる次第である。

樺太廳博物館囑託

菅原繁藏

目次

	頁
1. 緒言	1
2. 凡例	2
3. 参考文献	3
4. 目錄	5

圖版
新島寫眞
學名索引
和名索引



樺太廳博物館の陳列品を整理する事は、我等が郷土
 樺太の自然と文化等を整理する所以であつて、是れが
 廳立博物館の使命である。不肖、淺學短才なりと雖も
 當館生物に關する一部分の擔任を命せられ、先づ鳥類
 の陳列品を整理し、延いて樺太産鳥類に及ぼし、茲に簡
 單なる目録として其の研究を發表せり。樺太自然科
 學研究上幾分の參考ともなれば、望外の光榮とする所
 である。

高 橋 多 藏

凡 例

- 本目録は當博物館陳列標本及び從來發表せられたる、全島に産する既知鳥類の凡てを掲載せり。
- 本研究に於て本島に産する種、及亞種計 282 種に就いて、出來得る限り採集場所及期日、採集者名を明記せり。
- 特記すべき本島未記録種十數種に就いては、形態の測定をなし且つ寫眞を附したり。
- 本目録の分類は Hartert, Die Vögel der paläarktischen Fauna に據り、燕雀目より始まり鶉鷓目に終る。
- 學名は出來得る限り出典を明らかにし、Synonymium は特に樺太に關係あるもの及び重要と認めたるものだけを掲載し、後尾の括弧内には基産地及年號を示した。
- 最後に地圖を附し東亞分布系統の概略、及び渡りの行程を示し、及び蕃殖(B) 稀なる渡來(R.V.) 冬鳥(W.V.) 迷鳥(St) の略號を附して留鳥、候鳥を明らかにせり。
- 樺太に於ける新鳥には符號*を附せり。
- 「てうせんこのはづく」樺、禁の如く、種毎に樺太廳禁獵とあるは、「ふくろう」屬其他も各屬を通じて樺、禁、樺、獵となるべきものとす。

参 考 文 獻

- 1845~1850 Temminck & Schlegel, Siebold's Fauna Japonica Aves.
- 1878 Blakiston & Pryer, A Catalogue of the Birds of Japan.
- 1882 Blakiston & Pryer, Birds of Japan. Trans. As. Soc. Japan.
- 1884 Blakiston, Amended List of the Birds of Japan.
- 1889 Nikolski, Sapiski Imperatorskoi Akademii Nauk Sankt-peterburg.
- 1890 H. Seebohm, The Birds of the Japanese Empire.
- 1891 I. Ijima, Nippon no Torimokuroku (List of the Birds of Japan) "Dōbutsugaku Zasshi" (Tokyo Zool. Mag.) Vol. III.
- 1891 S. Okada, Catalogue of Vertebrated Animals of Japan. Aves.
- 1905 八田三郎. 村庄次郎. 北海道産鳥類目録
- 1905 飯島魁. 保護鳥圖譜
- 1908 E. Lönnberg, The Journal of the College of science Imperial University of Tōkyō Japan Vol. XXIII. 14
- 1908 M. Ogawa, A Hand-List of the Birds of Japan Annot. Zool. Japan Vol. VI. PP. 337~420
- 1910~續く 日本鳥學會. 鳥
- 1912 S. Uchida, Chisima san chōrui Mokuroku (List of the Birds of kuriles) "Dobutsugaku Zasshi" (Tokyo Zool. Mag.) Vol. 24. V.
- 1914 村庄次郎. 樺太動物調査報告
- 1914 S. Uchida, Nihon san Chōrui Mokuroku (List of the Birds of Japan) in Nihon Chōrui Zusetsu (The Birds of Japan) Vol. II. Suppl. PP. 1~36
- 1918 黒田長禮. 鶉千鳥類圖説
- 1926 内田清之助. 日本鳥類圖説
- 1927~1928 T. Momiyama, Annotationes Ornithologiae Orientalis Vol. I. No.1~5
- 1929 Marquis Y. Yamashina, The Avifaunal Distribution of The North Japan.
- 1930 瓜田友衛. 樺太産新鳥目録 樺太廳博物館教育第一卷

- 1931 Marquis Y. Yamashina, Die Vögel der kurilen "Sonderdruck aus: Journal für Ornithologie LXXIX.
- 1932 内田清之助. 下村兼二. 原色鳥類圖譜
- 1932 M. Hachisuka, N. Kuroda, Prince N. Taka-Tsukasa, S. Uchida, Marquis Y. Yamashina, A Hand-List of the Japanese Birds. Published by the Ornithological Society of Japan. (Revised)
- 1932 Marquis Y. Yamashina, T. Inukai & Bukô Natori, A List of Birds' Skins Presented by captain Blakiston in the University Museum of Natural History of Sapporo with a Brief Account of His Life in Hokkaido.
- 1932~1936 Prince N. Taka-Tsukasa, The Birds of Nippon I~V.
- 1933 黒田長禮. 鳥類原色大圖説 I~III
- 1933 Prince N. Taka-Tsukasa, Marquis M. Hachisuka, N. Kuroda, Marquis Y. Yamashina, S. Uchida, Birds of Jehol. Report of the first Scientific Expedition to Manchoukuo under the Leadership of Shigeyasu Tokunaga, V. II. 3
- 1934 Marquis Y. Yamashina and K. Mukasa, A List of Birds' Skin belonging to the Order of accipitres kept in the University Museum of natural History in Sapporo.

Order 1. PASSERES 燕雀目

Family 1. CORVIDÆ 鴉科

Genus *Corvus Linnaeus* (1758) わたりがらす属

1. *Corvus corax behringianus* Dybowski

ワタリガラス

渡 鴉 (棒、鵞) 第一圖 1.

Corvus corax behringianus Dybowski Bull. Soc. Zool. France P. 363 (1883—Bering I.)

Corvus grebnitskii Stejneger proc. Biol. Soc. Washington II P. 97. (1884)

Corvus corax kamtschaticus (nec Dybowski). Hand-List Japanese Birds

採集地: 海馬島

分布: 樺太・千島・北海道

国外: カムチヤフカ・コンマンダー諸島

2. *Corvus coronoides japonensis* Bonaparte

エゾハシブトガラス

蝦夷嘴太鴉 (棒、鵞) 第一圖 2.

Corvus japonensis Bonaparte Consp. Av. 1. P. 386 (1850—japan: yeso (stresemann))

Corvus coronoides borealis Momiyama Journ. Chosen Nat. Hist. Soc. no 5. P. 3. (1927—Sisuka S. Sakhalin)

C. macrorhynchus japonensis (nec Bp.) Murata karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 P. 20. (1912—Kitanayoshi)

採集地: 歌友 Ⅷ. 1910. (村田)・知取・豊原・大泊・小沼・落合・小田井(立花)・内淵(立花)・内川(立花)・馬群潭(立花)・池邊 Ⅷ. 1906 (E. Linnberg)

分布: 樺太・千島・北海道

3. *Corvus corone orientalis* Eversmann

カラフトハシボリガラス

樺太嘴細鴉 (樺、蝦) 第一圖 3.

Corvus orientalis Eversmann Add. pall. Zoogr. fasc. II. P. 7 (1841—"circa fluvium Narym, ultra oppidum Buchtarma")

Corvus corone ssp. saghalense Kumagai "Tori" V. no. 22. P. 127 (1926—Randomari S. Sakhalin) (in Japanese.)

採集地： 敷香・真岡・知取(立花)・内路(立花)・榮濱・池邊沢 Ⅴ. 1906 (E. Lönningberg)
鈴谷河口 Ⅴ. 1906 (E. Lönningberg) 三ノ澤 Ⅴ. 1906 (E. Lönningberg)
分布： 樺太

Genus *Nucifraga* Vieillot (1816) ほしがらす屬

4. *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm

ハシナガホシガラス

嘴長星鴉 (樺、禁) 第一圖 4.

Nucifraga macrorhynchos Brehm Lehrb. Naturg. europ. vögel. I. P. 103 (1823—"Gebirgswälder mittl nördl Eur. u. Asien")

採集地： 榮濱 Ⅴ. 1935. 崎澤 Ⅴ. 1936. 内路(立花)
分布： 樺太・朝鮮・九州
國外： 西比利亞

5. *Nucifraga caryocatactes japonicus* Hartert

ホシガラス タケガラス

星 鴉 (樺、禁) 第二圖 5.

Nucifraga caryocatactes japonicus Hartert, Nov. Zool. P. 134 (1897—Japan)

Nucifraga caryocatactes (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914 P. p. 20—21 (1910—Shikka)

採集地： 敷香 Ⅴ. 1912. (村田) 榮濱・知取・本斗
分布： 樺太・南・中・千島・北海道・本洲・伊豆七島

Genus *Garrulus* Vieillot (1816) かけす屬

6. *Garrulus glandarius taczanowskii* Lönningberg

カラフトミヤマカケス

樺太深山鴉 樺太深山掛子 (樺、蝦) 第二圖 6.

Garrulus glandarius taczanowskii Lönningberg Journ. Coll. Sci. Tokyo. XXIII. Art. 14. P. 7. (1908—Sakhalin)

Garrulus brandti (nec Eversm.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914 P. 21

Garrulus brandti ussriensis Buturlin Mess. Orn. 1. P. 287 (1910—Ussri-land.)

Garrulus brandtii okai Momiyama Journ. Chosen Nat. Hist. Soc. no 4. P. 5. (1927—Koryo, C. Korea.) (in Japanese)

Garrulus glandarius brandtii (nec Eversmann) Hand-List Japanese Birbs.

Garrulus glandarius kurilensis Bergman Arkiv für Zoology Band 23 B. no 3. P. 1. (in reprint) (1931—Chinomizi, Kunashiri, kuriles Is.)

採集地： 大泊・豊原 Ⅴ. 1912. (村田)・知取・敷香 Ⅴ. 1912. (村田)・小田塞 Ⅴ. 1934.
北名好 Ⅴ. 1912. (村田)・内路(立花)・知取(立花)・内川(立花)・保惠(立花)
内路(立花)・鈴谷河口 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)・富内 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)
池邊沢 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)・荒栗 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)

分布： 樺太・千島・朝鮮
國外： 滿洲

Genus *Perisoreus* Bonaparte (1838) あかまかけす屬

7. *Perisoreus infaustus sakhalinensis* Buturlin

アカマカケス カラフトアカマカケス

赤 尾 鴉 (樺、蝦) 第二圖 7.

Perisoreus infaustus sakhalinensis Buturlin Mess. Orn. Moscow PP 40. 43. (1916—Sakhalin)

Perisoreus infaustus (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914 P. 22.

採集地： 豊原・並川 Ⅴ. 1910. (村田)・元泊 Ⅴ. 1912. (村田)・樺丹 Ⅴ. 1912. (村田)・
小田井(立花)・内路(立花)・敷香(立花)・保惠(立花)・鈴谷河口 Ⅴ. 1906.
(E. Lönningberg)・大泊 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)・池邊沢 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)
三ノ澤 Ⅴ. 1906. (E. Lönningberg)

分布： 樺太特産

Family 2. STURNIDÆ 椋鳥科

Genus *Spodiopsar* Sharpe (1889) むくどり属

8. *Spodiopsar cineraceus* (Temminck)

ムクドリ

椋鳥 (椋、鶯) 第二圖 8.

Sturnus cineraceus Temminck pl. Col. II. pl. P. 556 (1832—Japan)

Temenuchus cineraceus (Temminck) Swinhoe Ibis P. 60. (1860)

Poliopsar cineraceus (Temminck) Sharpe Cat. Bds. Brit. Mus. XIII. P. 41 & add. P. 665. (1890)

Spodiopsar cineraceus (Temminck) Hartert Vög. Paläarkt. Fauna. I. P. 49. (1903)

採集地：川上・西美保

分布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡島・伊豆七島・小笠原列島・硫黄島・四國・九州・朝鮮・奄美大島・琉球・臺灣

Genus *Sturnia* Lesson (1837) こむくどり属

9. *Sturnia philippensis* (Forster)

コムクドリ

小椋鳥 (椋、鶯) 第三圖 9.

Motacilla philippensis Forster Ind. Zool. P. 41 (1781—Philippines)

Motacilla violacea Boddaert Tab. pl. Enl. P. 11. (1783—Philippines)

Lamprotornis pyrrhogenys Temm. & Schleg. in Siebold's Fauna Japon. Aves P. 86 (1850—Japan)

採集地：小田井(立花)・三ノ深 VI. 1906. (E. Lönberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・種子ヶ島・屋久島・南大東島・琉球・臺灣
国外：支那・比律賓・ホルネオ

Family 3. FRINGILLIDÆ 雀科

Genus *Coccothraustes* Pallas (1811) しめ属

10. *Coccothraustes coccothraustes verticalis* Tugarinow & Buturlin

カラフトシメ

樺太鶉 (椋、鶯) 第三圖 10.

Coccothraustes coccothraustes verticalis Tugarinow & Buturlin Matel. Vog. Jeness. Gouv. in Mitt. Krasnojarsker Sektion Russ. Geogr. Ges. 1911. (Baikal & Sakhalin)

採集地：駒門(立花)・海豹島 VI. 1935. (中島) 小田井 VI. 1932. 小沼・豊原(立花)

分布：樺太・朝鮮

国外：中部西比利亞(エニセイ地方)・バイカル地方

Genus *Chloris* Cuvier (1800) かはらひは属

11. *Chloris sinica kawarahiba* (Temminck)

オホカハラヒワ

大河原鶉 (椋、鶯) 第三圖 11.

Fringilla kawarahiba Temminck Pl. Col. 588. fig. 1. (1835—Japan)

Fringilla kawarahiba major Temminck & Schlegel in Siebold's Fauna Japon. Aves P. 88. pl. 48 (1850—Japan); Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914 P. 31

採集地：歌友 VI. 1910. (村田)・豊原 VI. 1937.

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・屋久島・琉球

国外：カムツチヤツカ

12. *Chloris sinica sitchitoensis* Momiyama

カラフトカハラヒワ

樺太河原鶉 (椋、鶯) 第三圖 12.

Chloris sinica sitchitoensis Momiyama "Dôbutsu Zasshi" XXXV. P. 413 (1923—Hachijô) (in Japanese)

Chloris sinica lönbergi Momiyama Annot. Orn. Orient. I. 2. P. 179 (1928—Toyohara. S. Sakhalin)

採集地：豊原・歌友 VI. 1910. (村田)・眞山(立花)・榮濱(立花)・小田井(立花)

E. Lönberg; 1908—The Journal of the College of Science imperial University of Tokyo Japan Vol. XXIII. Ar. 14. *Chloris sinica minor* Temminck &

Schlegel ハ此ノ種ナラン。

分 布： 樺太・北海道・本州・伊豆七島

Genus *Carduelis* Brisson (1760) ひわ属

13. *Carduelis spinus* (Linnaeus)

マ ヒ ワ

眞 鶉 (樺、蕨) 第四圖 13.

Fringilla spinus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. P. 181 (1758—Sweden)

Chrysomitris Dybowskii Taczanowski Journ. f. Orn. P. 199 (1876—Askold, ♂ without black patch on throat)

採集地： 軍川 Ⅵ. 1910. (村田)・豊原・小沼・知取・榮濱・小谷(立花)・大谷(立花)・小田井(立花)・内淵(立花)

分 布： 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・屋久島・琉球
國外： 歐洲・北亞佛利加・西比利亞

14. *Carduelis flammea exilipes* (Coues)

コベニヒワ

小 紅 鶉 (樺、蕨) 第四圖 14.

Aegidhus exilipes Coues Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. P. 385 (1861—Fort Simpson, Arctic America)

採集地： 豊原・並川

分 布： 樺太・北海道

國外： 北米合衆國・西比利亞

15. *Carduelis flammea flammea* (Linnaeus)

ベニヒワ

紅 鶉 (樺、蕨) 第四圖 15.

Fringilla flammea Linnaeus Syst. Nat. X. ed. P. 182 (1758—Norland, Sweden)

Fringilla Linaria Linnaeus Syst. Nat. X. ed. P. 182 (1758—Sweden)

Acanthis linaria holbaellii (nec Brehm) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地： 蕨 Ⅴ. 1912. (村田)・大泊

分 布： 樺太・北海道・本州・九州・朝鮮

國外： 亞細亞・北米

Genus *Uragus* Keyserling & Blasius (1840) べにましこ属

16. *Uragus sibiricus sanguinolentus* (Temminck & Schlegel)

ベニマシコ

紅 猿 子 (樺、蕨) 第四圖 16.

Pyrrhula sanguinolenta Temminck & Schlegel in Siebod's Fauna Jap. Aves. P. 92. Pl. 54 (1850—Japan)

Carpodacus sanguinolentus (nec T. & S.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914 P. 32.

採集地： 豊原・道分 Ⅴ. 1910. (村田)・榮濱 Ⅵ. 1910. (村田)・近幌 Ⅶ. 1910. (村田)・北名好 Ⅷ. 1912. (村田)・小田井(立花)・圓山(立花)・大谷(立花)・小沼(立花)・黒川(立花)・榮濱(立花)・鈴谷河口 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)・貝塚 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)・三ノ澤 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)・池邊 Ⅶ. Ⅷ. 1906. (E. Ljnnberg)

分 布： 樺太・千島・北海道・本州・四國・九州

Genus *Pyrrhula* Pallas (1811) うそ属

17. *Pyrrhula Pyrrhula kamtschatica* Taczanowski

ベニバラウリ

紅 腹 鶯 (樺、蕨) 第五圖 17.

Pyrrhula kamtschatica Taczanowski Bull. Soc. Zool. France P. 395 (1882—Kamtschatka)

採集地： 豊原(玉川畔林) Ⅷ. 1925. 知取 Ⅷ. 1930. (吉倉)・小沼 Ⅷ. 1935. (玉貫)

分 布： 樺太・北千島・本州・朝鮮

國外： カムチャツカ・ウスリ地方・滿洲

18. *Pyrrhula Pyrrhula griseiventris* Lafresnaye

ウ ソ

鶯 (樟、猿) 第五圖 18.

Pyrrhula griseiventris Lafresnaye Rev. Zool. P. 241 (1814—Japan)

Pyrrhula orientalis Temminck & Schlegel in Siebold's Fauna Japon Aves P. 91. Pl. 53 (1850—Japan)

Pyrrhula roseacea Seebohm Ibis P. 371 (1882—Yokohama)

採集地：豊原・小沼 I. 1935. 並川 V. 1910. (村田)・榮濱(立花)・小沼(立花)・小田井(立花)・内路(立花)・富内 VI. 1910. (村田)・愛郎 VII. 1912. (村田)・敷香 IX. 1930. (立花)・知取 VII. 1933. (山本)・北名好 VIII. 1912. (村田)

分布：樟太・北海道・本州・伊豆七島・四國・對馬・朝鮮
國外：アムール・滿洲・北支那

Genus *Erythrina* Brehm (1828) ましこ屬

19. *Erythrina erythrina grebnitskii* (Stejneger)

アカマシコ

赤猿子 (樟、猿) 第五圖 19.

Carpodacus erythrina grebnitskii Stejneger Orn. Expl. Command. Is. and Kamtschatka P. 265 (1885—Kamtschatka and ? Siberia)

採集地：南樟太

分布：樟太

國外：東部西比利亞・カムツチャツカ・滿洲

20. *Erythrina rosea* (Pallas)

オホマシコ

大猿子 (樟、猿) 第五圖 20.

Fringilla rosea Pallas Reise d. versch. Prov. d Russ. Reichs III. P. 699 (1776—
".....in salicetis ad Udum et Selengam occurrit")

Carpodacus roseus (Pallas), Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：駒間(立花)

分布：樟太・北海道・本州・九州・朝鮮
國外：東部西比利亞・蒙古・中部支那

Genus *Pinicola* Vieillot (1807) きんざんましこ屬

21. *Pinicola enucleator sakhalinensis* Buturlin

カラフトギンザンマシコ

樟太銀山猿子 (樟、猿) 第六圖 21.

Pinicola enucleator sakhalinensis Buturlin Mess. Orn. PP. 129. 130 (1915—Sakhalin)

Pinicola enucleator (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku P. 29 Pl. V.

fig. ♀ 4 ♀ 5

採集地：海約島 IX. 1935. (中島)・本斗(立花)・敷香(立花)・泊岸(立花)・内路(立花)・新間(立花)・東知取(立花)

分布：樟太特産

Genus *Loxia* Linnaeus (1758) いすか屬

22. *Loxia curvirostra japonica* Ridgway

イスカ

交喙 (樟、猿) 第六圖 22.

Loxia albiventris Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 437 (1870) (Peking) (nec Hermann, 1804)

Loxia curvirostra japonica Ridgway Proc. Biol. Soc. Washington II. P. 101. (1885—Japan)

Loxia curvirostra (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914 P. 28

Loxia curvirostra caucasica (nec Buturlin) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：知取(吉倉)・有部 VII. 1910. (村田)・北名好 IX. 1910. (村田)・大泊・落合

分布：樟太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・朝鮮

國外：東部西比利亞・支那・土耳其

Genus *Fringilla* Linnaeus (1758) あとり属

23. *Fringilla montifringilla* Linnaeus

ア ト リ

花 鶏、鶯 (棒、蚕) 第六圖 23.

Fringilla Montifringilla Linnaeus Syst. Nat. X. ed. P. 179. (1758—Sweden)

Fringilla montifringilla subcuneolata Kleinschmidt Falco V. P. 14. (1909—Japan)

採集地：榮濱Ⅷ. 1924. (立花)・内路Ⅷ. 1912. (村田)・新間Ⅷ. 1934.・海豹島Ⅷ. 1935. (中島)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黄列島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・露陵島・種子ヶ島・屋久島・琉球・臺灣
國外：歐州・北部亞細亞

Genus *Passer* Brisson (1760) すずめ属

24. *Passer montanus kaibatoi* Munsterhjelm

カラフトスズメ

樺 太 雀 (棒、蚕) 第六圖 24.

Passer montanus orientalis Clark Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVIII. P. 69. (1910—Hakodate and Korea)

Passer montanus (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 33.

Passer montanus kaibatoi Munsterhjelm Nyt. Mag. Natur V. Kristiania P. 170 (1916—Sakhalin)

採集地：豊原・小沼・落合・大泊・榮濱・知取・真岡・本斗・海馬島・豊原(立花)・蘭泊(正田)・荒栗Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)・池邊Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)

分 布：樺太・千島・北海道

25. *Passer rutilans rutilans* (Temminck)

ニウナイスズメ

入 内 雀、黄 雀 (棒、蚕) 第七圖 25.

Fringilla rutilans Temminck Pl. Col. V. Pl. 588 fig. 2. (1838—Japan)

Passer rufatus Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 90. Pl.

50 (1850—Japan)

Passer rutilans parvirostris Momiyama Annot. Orn. Orient. 1. I. PP. 121. 140 (1927—Quelpart I.)

採集地：豊原・小沼・保呂・小田寒Ⅷ. 1910. (村田)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・露陵島・朝鮮・濟州島・奄美大島・國外：支那

Genus *Emberiza* Linnaeus (1758) ほほじろ属

26. *Emberiza leucocephalos leucocephalos* S. G. Gmelin.

シラガホホジロ

白 髪 頬 白 (棒、蚕) 第七圖 26.

Emberiza leucocephalos S. G. Gmelin Nov. Comm. Acad. Sci Imp. Petrop. XV. P. 480. Pl. 23. fig. 3. (1771—Astrachan); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 PP. 34. 35. Pl. II. fig. ♂ 2. ♀ 3.

採集地：豊原Ⅷ. 1912. (村田)・知取(立花)・内川

分 布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮

國外：西比利亞・支那北部・歐洲

27. *Emberiza aureola aureola* Pallas

シマアラジ

島 青 鷄 (棒、蚕) 第七圖 27.

Emberiza aureola pallas Reise d. Versch. Prov. d. Russ. Reichs II. Append. 711 (1773—River Irtysh in W. Sibiria)

Emberiza aureola kamtschatka Stancianskij Ann. Mus. Zool. l' Acad. Sci. l' URSS. XXIX "1928" 1929. P. 256 (1929—Kamtschatka).

採集地：貝塚Ⅷ. 1910. (村田)・富内Ⅷ. 1910. (村田)・榮濱Ⅷ. 1910. (村田)・歌友Ⅷ. 1910.・知取・黒川(立花)・豊原(立花)・歌春・小田寒Ⅷ. 1929. (立花)・鈴谷河口Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)・豊原Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)・三ノ澤Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)・池邊Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・臺灣

國外：北部露國・西比利亞・カムチヤツカ・南支那・シヤム

28. **Emberiza elegans elegans* Temminck

ミヤマホホジロ

深山頬白 (棒、鵲) 第七圖 28. Pl. I. Fig. 1.

Emberiza elegans Temminck Pl. Col. Pl. 583. fig. 1. 1835 (Japan)[*Emberiza elegans*] *sibirica* Sushkin Proc. Boston Soc. Nat. Hist. vol. 38. no. 1. P.

29. 1925. (Sidemi)

Emberiza elegans ticehursti Sushkin Bull. B. O. Club XLVII P. 35. 1926 (nom. emend.)

採集地：海馬島 16/IV 1937 (森本忠夫)

Measurements:—

Sex ♂

Exposed Culumen 10mm.

Bill from skull 12.5

Bill from nostril 7.5

Height of bill at nostril 4.5

Wing 75

Tail 67

Tarsus 18

分布：千島・樺太・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣
國外：東部西比利亞・支那29. *Emberiza spodocephala personata* Temminck

アヲジ

青鷓、蒿雀 (棒、鵲) 第八圖 29.

Emberiza personata Temminck Pl. Col. Pl. 580 (1835—N. Japan)*Emberiza spodocephala* subsp. ? Hartert Vög. Pal. Faun. 1. P. 178 (1904—Sachalin)[*Emberiza spodocephala*] *sachalinensis* Sushkin Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 38. no. 1. P. 29 (1925—Alexandrovka, Sagalin)

採集地：喜美内山道 Ⅳ. 1910. (村田)・北名好 Ⅴ. 1912. (村田)・小谷(立花)・小田井(立花)・圓山(立花)・榮濱(立花)・大谷(立花)・内瀨(立花)・知取(立花)・内路(立花)・内川(立花)・具塚 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)・鈴谷河口 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)・三ノ澤 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)・池邊講 Ⅴ. 1906. (E. Ljnnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・對馬・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球

30. *Emberiza rustica* Pallas

カシラダカ

頭高、田鷓 (棒、鵲) 第八圖 30.

Emberiza rustica Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs III. P. 698 (1776—“In Salicetis Davuriae”)*Emberiza rustica latifascia* Portenko Auk, P. 206 (1930—Kamtschatka)

採集地：北名好 Ⅴ. 1912. (村田)・敷香(立花)・内路(立花)・内川(立花)・小谷(立花)・梶内川畔(立花)・大泊

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・鬱陵島
國外：東部西比利亞・カムチャツカ・支那31. *Emberiza pusilla* Pallas

コホホアカ

小頬赤、小鷓 (棒、鵲) 第八圖 31.

Emberiza pusilla Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. P. 697 (1776—Daurian Region)

採集地：樺太 (nec Hand List Japanese Birds : The Ornithological Society of Japan.)

分布：樺太・本州・四國・五島列島・朝鮮・琉球列島

國外：北部露國・西比利亞・蒙古・土耳其・支那・印度・緬甸・比律賓・歐洲諸國

32. *Emberiza variabilis* Temminck

クロジ

黒鷓 (棒、鵲) 第八圖 32.

Emberiza variabilis Temminck Pl. Col. pl. 583 (1835—N. Japan)*Zonotrichia musica* Kittlitz Denkwürd. Reise, II. P. 201 (1858—Kamtschatka)*Tisa variabilis kurodai* Momiyama Annot Orn. Orient. I. I. P. 10 (1927—Prov. Ya-

mashiro, Hondo in Japanese)

採集地：豊原 V. 1937.

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四国・九州・對馬・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球

國外：カムチャツカ

33. *Emberiza schoeniclus pyrrhulinus* Swinhoe

オホジュリン

大 壽 林 (樺、禁) 第九圖 33.

Emberiza pyrrhulinus Swinhoe Ibis P. 333. Pl. VIII, fig. 2. (1876—Hakodate, Japan)

Emberiza schoeniclus pallidior (nec Hartert) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：樺太

分布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮

國外：支那

Genus *Calcarius* Bechstein (1803) つめながほほじろ屬

34. *Calcarius lapponicus coloratus* Ridgway

ツメナガホホジロ ユキヒバリ(村田)

爪 長 頬 白 (樺、禁) 第九圖 34.

Calcarius lapponicus coloratus Ridgway Auk XV. P. 320 (1898—Copper Island Kamschatka)

Calcarius lapponicus (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 PP. 27—28. Pl. IV, fig. ♂ 4. ♀ 5.

採集地：北名好 Ⅷ. 1912. (村田)・大谷(立花)・知取(立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮

國外：コンマンダー諸島・カムチャツカ

Genus *Plectrophenax* Stejneger (1882) ゆきほほじろ屬

35. *Plectrophenax nivalis nivalis* (Linnaeus)

ユキホホジロ

雪 頬 白 (樺、禁) 第九圖 35.

Emberiza nivalis Linnaeus Syst. Nat. X. ed. P. 176 (1758—Lapland); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 P. 34 Pl. II, fig. 8.

Plectrophenax nivalis townsendi Ridgway Bds. North & Midd. Amer. 1. P. 147 (1901—Commander Pribilof and Shumogin Island)

Plectrophenax nivalis townsendi (nec. Ridgway) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：軍川 Ⅱ. 1913. (村田)・海豹島 Ⅲ. 1935. (中島)・榮濱 Ⅳ. 1934.・知取 Ⅴ. 1937. (山本)・小沼・内路(立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州

國外：北亞弗利加・北支那・北米合衆國

Family 4. ALAUDIDÆ 雲雀科

Genus *Calandrella* Kaup (1829) こひばり屬

36. *Calandrella brachydactyla dukhunensis* (Sykes)

カラフトコヒバリ

樺太小雲雀 (樺、禁) 第九圖 36.

Alauda dukhunensis Sykes Proc. Zool. Soc. London P. 93 (1832—Dukhun India).

採集地：豊原・並川

分布：樺太・朝鮮・硫黄列島

Genus *Alauda* Linnaeus (1758) ひばり屬

37. *Alauda arvensis pekinensis* Swinhoe

オホヒバリ

大 雲 雀 (樺、禁) 第十圖 37.

Alauda pekinensis Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 69. (1863—Peking)

Alauda blakistoni Stejneger Proc. Biol. Soc. Washington II. P. 98. (1884—Kamschatka)

採集地：豊原・知取・内瀨(立花)・榮濱・鈴谷河口 V. 1906. (E. Linnberg)・貝塚 V. 1906. (E. Linnberg)・三ノ澤 Ⅵ. 1906. (E. Linnberg)・池邊 Ⅶ. Ⅷ. Ⅸ. X. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・四国・朝鮮

國外：カムチャツカ・東部シベリア・北支那

38. *Alauda arvensis lönnerbergi* Hachisuka

カラフトチウヒバリ

樺太中雲雀 (標、禁) 第十圖 38.

Alauda arvensis lönnerbergi Hachisuka Bull. B. O. Club. XLVII. P. 23. (1926—Chippisani Saghalien)採集地：豊原(立花)・内淵(立花)・大泊
分布：樺太・本州・九州・朝鮮39. *Alauda arvensis japonica* Temminck & Schlegel

ヒバリ

雲雀 (標、禁) 第十圖 39.

Alauda japonica Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 87. Pl. 47 (1848—Japan); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 27.*Alauda arvensis queipartae* Momiyama Annot. Orn. Orient 1. I. P. 14 (1927—Queipart I. in Japanese)採集地：榮濱 VII. 1910. (村田)・豊原・鈴谷河口 V. 1906. (E. Lönnerberg)
分布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡島・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・マケノシマGenus *Chionophilos* Brehm (1822) はまひばり屬40. *Chionophilos alpestris flavus* (Gmelin)

ハマヒバリ

濱雲雀 (標、禁) 第十圖 40.

Alauda flava Gmelin Syst. Nat. 1. P. 800 (1788—Siberia)*Otocorys alpestris euroa* Thayer & Bangs Proc. N. Engl. Zool. Club V. P. 43 (1914—Kolyma. E. Siberia)採集地：樺太
分布：樺太・千島・北海道・本州・對馬
國外：歐洲北部・南歐・支那・北米

Family 5. MOTACILLIDÆ 鶺鴒科

Genus *Anthus* Bechstein (1807) たひばり屬41. *Anthus hodgsoni berezowskii* Sarudny

ビンズイ、キヒバリ

便追、木鷓 (標、禁) 第十一圖 41.

Anthus hodgsoni berezowskii Sarudny Orn. Monatsb. XVII. P. 43. (1909—S. W. Kansu)*Anthus trivialis hodgsoni* (nec Richmond) Hand-List Japanese Birds. (1922)*Anthus maculatus* (nec Vieillot) Nikolski Sapiski Imper. Akad. Nauk Sankt-Peterburg (1889—Sakhalin)*Anthus maculatus* (nec Hodgson) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. P. 26—27.*Anthus maculatus berezowskii* Sarudny. Orn. Monatsb. XVII. P. 43. (1909—S. W. Kansu)

採集地：並川 V. 1910. (村田)・留多加 VI. 1910. (村田)・大泊・知取・榮濱 VII. 1930. (立花)・北名好 IX. 1912. (村田)・大谷(立花)・小田井(立花)・豊原(立花)・知取(立花)・敷香(立花)・内路(立花)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Lönnerberg)・三ノ澤 VI. 1906. (E. Lönnerberg)・池邊 VII. VII. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・對馬・朝鮮・琉球島
國外：西比利亞・蒙古・滿洲・支那42. *Anthus rufogularis* Brehm

ムネアカタヒバリ

胸赤田鷓 (標、禁) 第十一圖 42.

Anthus rufogularis Brehm Lehrb. Nat. eur. Vog. II. P. 963. (1824—Nubia and Germany)*Motacilla Cervina* Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. I. P. 511. (1827—Siberia)*Anthus cervinus* (Pallas) Hand-List Japanese Birds. (1922)*Leimoniptila cervina* (Pallas) Kuroda Avifauna Riu-Kiu Is. P. 24. (1925)採集地：内路(立花)
分布：樺太・千島・伊豆七島・硫黄列島・朝鮮・濟州島・奄美大島・琉球

臺灣・紅頭嶼

國外：北歐州・北亞細亞・南歐州・北阿弗利加・南支那

43. *Anthus spinoletta japonicus* Temminck & Schlegel

タヒバリ

田 鶯 (棒、禁) 第十一圖 43.

Anthus pratensis japonicus Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon, Aves P. 59. Pl. 24. (1847—Japan)

Anthus borealis Hesse Journ. f. Orn. P. 386. (1915—Sakhalin)

Anthus spinoletta reuteri Munsterhjelm Nyt. Mag. Naturw. Kristiania P. 165. (1916—Sakalin)

Anthus spinoletta japonicus (nec T. & S.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 26.

採集地：北名好 Ⅸ. 1912. (村田)・榮濱 (立花)・大谷 (立花)・内瀧 (立花)・内路 (立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・奄美大島・琉球
國外：西比利亞・カムチャツカ・支那・印度

Genus *Motacilla* Linnaeus (1758) せきれい屬

44. *Motacilla alba lugens* Kittlitz

ハクセキレイ

白 鶺鴒 (棒、禁) 第十一圖 44.

Motacilla lugens kittlitz Kupfertafeln zur Naturg. d. Vög. 2. P. 16. Pl. XXI. fig. 1. (1833—Kamtschatka); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 23—24.

Motacilla lugens Gloger Isis P. 771. (1829—Kamtschatka)

採集地：留多加 V. 1910. (村田)・馬酔潭 Ⅷ. Ⅸ. 1912. (村田)・知取・古丹 Ⅷ. Ⅸ. 1912. (村田)・泊居 Ⅷ. 1910. (村田)・豊原・大泊・小沼・落合・榮濱 (立花)・内瀧 (立花)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Ljnnberg)・大泊 Ⅷ. 1906. (E. Ljnnberg)・三ノ澤 Ⅷ. Ⅷ. 1906. (E. Ljnnberg)・池邊津 Ⅷ. Ⅷ. 1906. (E. Ljnnberg)

分 布：樺太・北海道・千島・本州・佐渡・伊豆七島・四國・九州・壹岐・

對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣

國外：カムチャツカ・コンマダ諸島・南支那

45. *Motacilla cinerea caspica* (S. G. Gmelin)

キセキレイ

黄 鶺鴒 (棒、禁) 第十二圖 45.

Parus caspius S. G. Gmelin d. Russland III. P. 104. Pl. 20. fig. 2. (1774—Enzeli or Enseli on Southern Coast of Caspian Sea)

Motacilla Melanope Pallas Reise d. Versch. Prov. Russ. Reichs. III. P. 696. (1776—Dauria)

Motacilla boarula melanope (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 24—25.

Pallenura robusta Brehm Journ. f. Orn P. 32. (1857—Japan)

Calobates cinereus melanope (Pallas) Hand-List. Japanese Birds. (1922)

採集地：豊原 Ⅷ. 1934. 小里 V. 1910. (村田)・中野 Ⅸ. 1912. (村田)・近幌 V. 1910. (村田)・泊居 Ⅷ. 1910. (村田)・北名好 Ⅸ. 1912. (村田)・知取・小沼・黒川 (立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・喜界ヶ島・南大東島・琉球・臺灣・澎湖列島・紅頭嶼

國外：ウラル・西比利亞・カムチャツカ・南支那・印度・スダ諸島・ニウギニア

46. *Motacilla flava taiwana* (Swinhoe)

ツメナガセキレイ

爪 長 鶺鴒 (棒、禁) 第十二圖 46.

Eudytes taiwanus Swinhoe Proc. Zool. Soc. London. P. 334. (1863—Formosa)

Motacilla flava leucostriata (nec Hom.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 25. Pl. 4. fig. 8.

採集地：留多加 V. 1910. (村田)・貝塚 Ⅷ. 1910. (村田)・榮濱 Ⅷ. 1910. (村田)・久春内 Ⅷ. 1910. (村田)・小田原・榮濱 (立花)・大谷 (立花)・豊原 (立花)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Ljnnberg)・貝塚 V. 1906. (E. Ljnnberg)

三ノ澤 V. 1906. (E. Lönnerberg)・豊原 V. 1906. (E. Lönnerberg)・

池邊謙 V. 1906. (E. Lönnerberg)

分 布： 樺太・千島・朝鮮・奄美大島・琉球・臺灣

國外： バイカル・アムール・南支那・馬來半島

47. *Motacilla flava similima* Hartert

マミジロツメナガセキレイ

眉白爪長鶺鴒 (樺、禁) 第十二圖 47.

Motacilla flava similima Hartert Vög, Pal. Faun, I. P. 289. (1905—Kamtschatka, Korea, China, etc.)

採集地： 豊原 V. 1937.

分 布： 樺太・千島・本州・伊豆七島・硫黄列島・朝鮮・琉球・臺灣

國外： カムチャツカ・南支那・馬來群島

Genus *Dendronanthus* Blyth. (1814) いはみせきれい屬

48. *Dendronanthus indicus* (Gmelin)

イワミセキレイ ヨコフリセキレイ

岩見鶺鴒、横振鶺鴒 (樺、禁) 第十二圖 48.

Motacilla indicus Gmelin Syst. Nat. I. P. 962. (1788—India)

採集地： 樺太

分 布： 樺太・本州・伊豆七島・朝鮮・小笠原列島・琉球・硫黄列島

國外： 東部西比利亞・南支那・馬來地方・スンダ諸島

Family 6. CERTHIIDÆ 木走科

Genus *Certhia* Linnaeus (1758) きばしり屬

49. *Certhia familiaris familiaris* Linnaeus

キタキバシリ

北木走 旋木雀 (樺、禁) 第十三圖 49.

Certhia familiaris Linnaeus Syst. Nat. I. P. 184. (1766—Sweden); Murata Karafuto

Dōbutu Hōkoku 1914. P. 19. (1910—Kaizuka)

Certhia familiaris crusti Kuroda Bull. B. O. Club. XLV. P. 17. (1924—Uenai, Prov Iburi, Hokkaido)

Certhia familiaris kurilensis Momiyama Annot. Orn. Orient. I. I. P. 21. (1927—Kunashiri, S. Kuriles) (in Japanese)

Certhia familiaris kawamurai Momiyama Annot. Orn. Orient. I. I. P. 22. (1927—Seoul, C. Korea) P. 84. (in English)

採集地： 貝塚 V. 1910. (村田)・大泊

分 布： 樺太・千島・北海道・朝鮮

Family 7. SITTIDÆ 五十雀科

Genus *Sitta* Linnaeus (1758) ごじうがら屬

50. *Sitta europaea clara* Stejneger

シロハラゴジウガラ

白腹五十雀 (樺、禁) 第十三圖 50.

Sitta amurensis clara Stejneger Proc. U. S. Nat. Mus. IX. PP. 390, 392. (1886—“Yesso,” Japan)

Sitta caesia amurensis (nec Sw.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 19—20.

Sitta europaea sakhalinensis Buturlin Trav. Soc. Nat. Petrograd. XLIV. P. 170. (1916—Sakhalin)

Sitta europaea takatsukasai Momiyama “Kaidori,” II. no. 8. PP. 4, 20. Fig. A & B. (1931—Urup & Etorup)

Sitta europaea bergmani Momiyama t. c. Fig. C. (1931—Kunashir.)

Sitta europaea albifrons (nec Taczanowski) Hand-List Japanese Birds. (1922)

採集地： 北名好 V. 1912. (村田)・知取・小沼・小谷(立花)・大谷(立花)・圓山(立花)・小沼(立花)・内淵(立花)・知取(立花)・小田井(立花)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Lönnerberg)・三ノ澤 V. 1906. (E. Lönnerberg)・池邊謙 V. X. (E. Lönnerberg)

分 布： 樺太・千島・北海道

Family 8. PARIDÆ 四十雀科

Genus *Parus* Linnaeus (1758) シジウガラ属51. *Parus major wladivostokensis* Kleinschmidt

ヲナガシジウガラ

尾長四十雀 (標、禁) 第十三圖 51.

Parus wladivostokensis Kleinschmidt Falco, IX, P. 33 (1913—Vladivostok)

採集地: 樺太 (once obtained) Hand-List Japanese Birds.

分布: 樺太

52. *Parus major minor* Temminck & Schlegel

シジウガラ

四十雀、荏雀 (標、禁) 第十三圖 52.

Parus major minor Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves, P. 70, Pl. 33 (1848—Japan)*Parus major quelpartensis* Kuroda "Tori" I, no 5, P. 3, Pl. VI. (1917—Quelpart Island)*Parus major ogawai* Momiyama "Tori" III, no. 14, P. 207 (1923—Motmura, Ōshima, Seven Is. of Izu). (in Japanese)*Parus major chinai* Momiyama "Dōbutsu, Zasshi" XXXV, P. 410 (1923—Hachijo, Seven Is. of Izu) (in Japanese)*Parus major tabibana* Momiyama Bull. B. O. Club XLVIII, P. 20 (1927, 3, Nov—Konuma, S. Sakhalin)*Parus atriceps minor* (nec T. & S.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 P. 17*Parus major sidsukara* Momiyama Annot. Orn. Orient. I, I, P. 25 (1927—Tokyo in Japan)*Parus major kurilensis* Bergman Arkiv för. Zoologi, Band 23 B, no. 3, P. 3. (1931—Yutorofu)

採集地: 野田家 蒐. 1910. (村田)・小沼

分布: 樺太・千島 (Uruppu, Yutorofu, Kunahiri)・北海道・本州・伊豆七島・四國
佐渡・隠岐・北九州・壱岐・對馬・濟州島53. *Parus atricapillus sachalinensis* Lönnerberg

カラフトコガラ、エゾコガラ

樺太小雀、樺太十二雀 (標、禁) 第十四圖 53.

Parus atricapillus sachalinensis Lönnerberg Journ. Col. Sci. Imp. Univ. Tokyo XXIII, P. 20 (1908—Saghalin.)*Parus palustris japonicus* (nec Seeb.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 P. 16.*Poecile atricapilla sachalinensis* (Lönnerberg) Hand-List Birds Japanese (1922)

採集地: 元泊・小田家・知取・川上・喜美内山道 M. 1910. (村田)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Lönnerberg)・三ノ澤 M. 1906. (E. Lönnerberg)

分布: 樺太・千島・朝鮮・北海道・本州

54. *Parus palustris orii* (Yamashina)

ヲリキコガラ

折居小雀 (標、禁) 第十四圖 54.

Poecile palustris orii Yamashina "Dōbutsugaku Zasshi" XXXIX, P. 281 (1927—Nayoro, Sakhalin). (in Japan)

採集地: 内路・泊岸・小沼 23/V 1926. (立花氏採集, 櫻山鳥學研究標本 No. 112 No. 5 89 No. 590)

分布: 樺太特産

55. *Parus ater amurensis* Buturlin

キタヒガラ

北日雀 (標、禁) 第十四圖 55.

Parus ater amurensis Buturlin Ornith. Monatsber. P. 80 (1907—Amur. & Ussuri)*Periparus ater tyosenensis* Momiyama Annot. Orn. Orient. I, I, P. 31. (1927—C. Korea in Japan)*Parus ater pekinensis* (nec Seeb.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914, PP. 16—17*Periparus ater amurensis* (Buturlin) Hand-List Birds Japanese (1922)

採集地: 川上・留多加 M. 1910. (村田)・知取・榮濱 (立花)・小田井 (立花)・小沼

(立花)・黒川(立花)・内路(立花)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Linnberg)・三ノ澤 VI. 1906. (E. Linnberg)

分 布 : 樺太・朝鮮

Genus *Aegithalos* Hermann (1801) えなが属

56. *Aegithalos caudatus japonicus* Pražák

シマエナガ

島 柄 長 (樺、禁) 第十四圖 56.

Aegithalos caudatus japonica Pražák Journ. f. Ornith. P. 291. (1897—innördlichen Japan)

Aegithalos caudata (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 P. 18.

Pl. II fig 1.

採 集 地 : 北名好 V. 1912. (村田)・黒川(立花)・駒間(立花)・真岡・富内 V. 1906. (E. Linnberg)

分 布 : 樺太・南千島・北海道・本州

Genus *Regulus* Vieillot (1807) きくいだき属

57. *Regulus regulus japonensis* Blkiston

キクイタダキ

菊 戴、戴菊鳥 (樺、禁) 第十五圖 57.

Regulus japonicus Bonaparte Compt. Rend. Acad. Sci. 42. P. 767. (1856—nom nud.)

Regulus japonensis Blkiston Ibis P. 320 (Hakodate, Yezo.)

Regulus cristatus orientalis (nec Seeb.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 PP.

15—16

Regulus regulus kuritensis Bergman Arkiv för Zoologi. Band 23. B. no. 3. P. 4.

(1931—Kunashiri, Kuriles)

採 集 地 : 喜美内 VI—VII. 1910. (村田)・小田原 VI—VII. 1910. (村田)・久春内 1910. (村田)・知取(立花)・榮濱・用上・大泊・鈴谷河口 V. 1906. (E. Linnberg) 池邊詰 V. 1906. (E. Linnberg)

分 布 : 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・濟州島・朝鮮・種子ヶ島・琉球・臺灣

國外 : 東部西比利亞・北支那・滿洲

Family 9. LANIIDÆ 鷓 科

Genus *Lanius* Linnaeus (1758) も ず 属

58. *Lanius excubitor bianchii* Hartert

オホモズ、カラフトオホモズ

大 鷓 (樺、禁) 第十五圖 58.

Lanius excubitor bianchii Hartert Vög. Pal. Faun. 1. P. 424 (1907—Sakhalin)

Lanius major (nec pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 PP. 22—23.

採 集 地 : 豊原・軍川 X. 1912. (村田)・豊香 VII. 1912. (村田)・池邊詰 X. 1906. (E. Linnberg)・女蘭 X. 1906. (E. Linnberg)

分 布 : 樺太・千島・北海道・本州

59. *Lanius cristatus cristatus* Linnaeus

カラアカモズ

唐 赤 鷓 (樺、禁) 第十五圖 59.

Lanius cristatus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. P. 93. (1758—Bengal)

採 集 地 : 榮濱(立花)

分 布 : 樺太・朝鮮

國外 : 北部西比利亞・カムチャツカ・支那・印度

60. *Lanius cristatus superciliosus* Latham

アカモズ

赤 鷓 (樺、禁) 第十五圖 60.

Lanius superciliosus Latham Ind. Orn Suppl. P. XX (1801—Batavia, Java); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914 P. 23 (1910—Shikka)

採 集 地 : 大谷 VII. 1910. (村田)・豊香 VII. 1912. (村田)

分 布 : 樺太・北海道・本州・九州・對馬

國外 : 南支那・馬來半島・馬來群島

61. *Lanius bucephalus* Temminck & Schlegel

モズ
鶇、伯勞 (棒、禁) 第十六圖 61.

Lanius bucephalus Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon Aves P. 39. Pl. 14. (1844—Japan)

採集地：榮濱 VII. 1910. (村田)

分布：樺太・北海道・本州・佐渡・伊豆七島・四國・九州・壱岐・對馬・濟州島・朝鮮・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球
國外：東部西比利亞・北支那・南支那

Family 10. BOMBYCILLIDÆ 連雀科

Genus *Bombycilla* Vieillot (1807) れんじやく屬

62. *Bombycilla garrula centralasiae* Poljakov

キレンジャク
黃連雀、十二黃 (棒、禁) 第十六圖 62.

Bombycilla garrula centralasiae Poljakov Mess. Orn. 1915. PP. 137. 138 (1915—Altai, Turkestan)

Bombycilla garrula ussuriensis Buturilin t. c. P. 223 (1915—S. Ussuri)

採集地：豊原・榮濱

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黄列島・九州・朝鮮
國外：アルタイ・ウズリ

63. *Bombycilla japonica* (Siebold)

ヒレンジャク
緋連雀、朱連雀、十二紅 (棒、禁) 第十六圖 63.

Bombycilla japonica Siebold De hist. nat. in Japon. statu etc. P. 13 (1824—Tokyo & Chikuzen)

Bombycilla phoenicoptera Temminck Pl. Col. II. Pl. 450 (1827—Japan)

採集地：豊原・小沼・知取

分布：樺太・北海道・本州・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・琉球・臺灣

國外：東南西比利亞

Family 11. MUSCICAPIDÆ 鶇科

Genus *Alseonax* Cabanis (1850) こさめびたき屬

64. *Alseonax latirostris latirostris* (Raffles)

コサメビタキ
小鶇鶇、小斑鶇 (棒、禁) 第十六圖 64.

Alseonax latirostris Raffles Trans. Linn. Soc. London XIII. 2. P. 312. (1821—Sumatra)

Muscicapa latirostris (nec Raffles) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 9—10.

採集地：清水 VII. 1910. (村田)・宇遠泊 VII. 1710. (村田)・知取・櫻保 VII. 1912. (村田)・黒川 (立花)・小田井 (立花)・豊原 VI. 1906. (E. Linnberg)・三ノ澤 VI. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・壱岐・對馬・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣
國外：東部西比利亞・南支那・比律賓・ニューギニア

Genus *Hemichelidon* Hodgson (1845) さめびたき屬

65. *Hemichelidon griseisticta* Swinhoe

エゾビタキ
蝦夷鶇 (棒、禁) 第十七圖 65.

Hemichelidon griseisticta Swinhoe Ibis P. 330. (1861—Amoy and Taku)

Muscicapa griseisticta habereri Parrot Orn. Monatsber. XV. PP. 168—170. (1907—Etorop, Kuriles)

採集地：知取

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島・南大東島・琉球・臺灣
國外：南支那・比律賓・ニューギニア

66. *Hemichelidon sibirica incerta* La Touche

ウスサメビタキ

淡 鮫 鵜 (棒、禁) 第十七圖 66.

Hemichelidon sibirica incerta La Touche Handb. B. E. China I. P. 159. (1925—N. E. China)*Muscicapa sibirica* (nec Gm.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 9.*Hemichelidono sibirica opaca* Shulipin Ann. Mus. Zool. 1. Acad. Sci. URSS, XX VIII. no. 3. P. 403 (1927—S. Ussuriland)

採集地：清水 Ⅵ. 1910. (村田)・宇遠泊 Ⅵ. 1910. (村田)・樺保 Ⅶ. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・朝鮮

Genus *Siphia* Hodgson (1837) まじろびたき属67. *Siphia mugimaki* (Temminck)

ムギマキ、コツバメ

麥 蒨、麥 鵜 (棒、禁) 第十七圖 67.

Muscicapa Mugimaki Temminck Pl. Col. Pl. 577. Fig. 2. (1835—Japan)*Siphia luteola* (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 7—8. Pl.

3. Fig. 5.

Siphia mugimaki La Touche, Ibis P. 381.

採集地：並川 V. 1910. (村田)・道分 V. 1910. (村田)・鈴谷河口 V. 1906. (E. Linnberg)・三ノ澤 V. Ⅵ. 1906. (E. Linnberg) 眞岡 V. 1937. (小笠原)

分布：樺太・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・琉球・臺灣

國外：東部西比利亞・南支那・馬來半島・馬來群島

Genus *Zanthopygia* Blyth (1847) きびたき属68. *Zanthopygia narcissina zanthopygia* (Hay)

マミジロキビタキ

眉 白 黄 鵜 (棒、禁) 第十七圖 68.

Muscicapa Zanthopygia Hay Madras Journ. XIII. 2. P. 162. (1845—Malacca)

採集地：樺太

分布：樺太・本州・朝鮮・濟州島

國外：東部西比利亞・支那・馬來半島

69. *Zanthopygia narcissina narcissina* (Temminck)

キビタキ

黄 鵜 (棒、禁) 第十八圖 69.

Muscicapa narcissina Temminck Pl. Col. Pl. 577. Fig. 1. (1835—Japan)*Zanthopygia narcissina* (nec T.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 8—

9.

採集地：東西海岸各地 Ⅳ. 1910. Ⅴ. Ⅵ. 1912. (村田)・黒川 (立花)・三ノ澤 V. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・奄美大島・大東列島・臺灣

國外：南支那・海南島・比律賓

Familg 12. SYLVIIDÆ 鶯 科

Genus *Acanthopneuste* Blasius (1858) むしくひ属70. *Acanthopneuste tenellipes* (Swinhoe)

エゾムシクビ

蝦 夷 虫 喰 (棒、禁) 第十八圖 70.

Phylloscopus tenellipes Swinhoe Ibis. P. 53. (1868—Near Amoy); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 10—11. (1910—Otsan)

採集地：並川 V. 1910. (村田)・小田原 Ⅵ. 1910. (村田)・知取

分布：樺太・北海道・本州・九州・朝鮮・琉球

國外：アムール地方・南支那・緬甸・馬來半島北部

71. *Acanthopneuste borealis examinandus* (Stresemann)

オホムシクビ

大 虫 喰 (棒、禁) 第十八圖 71.

phylloscopus borealis examinandus Stresemann Nov. Zool. XX. P. 353. (1913—Bali)

採集地：知取
分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島

72. *Acanthopneuste borealis borealis* (Blasius)

コムシクヒ

小虫喰 (樺、禁) 第十八圖 72.

Phyllopneuste borealis Blasius Naumannia. P. 313. (1858—Near Ochotsk Sea)

採集地：知取
分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・琉球・大東列島・臺灣
國外：歐洲北部・東部西比利亞・南支那・馬來群島

73. *Acanthopneuste borealis xanthodryas* (Swinhoe)

メボリ

目細 (樺、禁) 第十九圖 73.

Phylloscopus xanthodryas Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 296. (1863—Amoy);

Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 10.

採集地：皆岸 VI. 1910. (村田)・知取・内路・三ノ澤 VI. 1906. (E. Linnberg)
分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・四國・對馬・朝鮮・濟州島・琉球・大東列島・臺灣
國外：カムチャツカ・蒙古・南支那・爪哇・ボルネオ

Genus *Phylloscopus* Boie (1826) からふとむしくひ屬

74. *Phylloscopus proregulus proregulus* (Pallas)

カラフトムシクヒ コシジロムシクヒ (村田)

樺太虫喰 (樺、禁) 第十九圖 74.

Molacilla Proregulus Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. I. P. 499. (1827—Dauria)

Phylloscopus proregulus (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 11—12. Pl. 4. Fig. 3.

Reguloides proregulus proregulus (Pallas) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：豊原・北名好 VI. 1912. (村田)
分布：樺太・朝鮮
國外：亞細亞北部・ヒマラヤ・歐洲・南支那・印度

75. *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Blyth)

ムチセツカ

無地雪加 (樺、禁) 第十九圖 75.

Phyllopneuste fuscata Blyth Journ. As. Soc. Bengal XI. P. 113. (1842—Near Calcutta)

採集地：瀧ノ澤 (大久保)
分布：樺太・朝鮮・臺灣
國外：中部西比利亞・南支那・緬甸・印度

Genus *Herbivocula* Swinhoe (1871) からふとむちせつか屬

76. *Herbivocula schwarzi* (Radde)

カラフトムチセツカ

樺太無地雪加 (樺、禁) 第十九圖 76.

Sylvia (Phyllopneuste) Schwarzi Radde Reise Süden V. Ost-Sib. II. P. 260. Pl. IX. (1863—Tarei-Nor and Bureja Mountains)

採集地：瀧ノ澤・大泊・三ノ澤 VI. VII. 1906. (E. Linnberg)
分布：樺太・朝鮮
國外：東南部西比利亞・南支那・テネセリム・イギリス

Genus *Horeites* Hodgson (1845) うくひす屬

77. *Horeites cantans sakhalinensis* (Yamashina)

カラフトウグヒス

樺太鶯 (樺、禁) 第二十圖 77.

Cettia flavolivacea (nec Hodgson) Uchida "Dōbutsu Zasshi" XX. P. 264. (1910—Sakhalin)

Horornis cantans sakhalinensis Yamashina "Dôbutsu Zasshi" XXXIX. P. 281. (1927—Nayoro, Sakhalin)

Cettia cantans (nec T. & S.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. PP. 14—15.

Horornis flavolivacea (nec Blyth) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地： 瀬ノ澤・追手・瀧岡 Ⅴ. 1910. (村田)・瀧岡山道清水・Ⅴ. 1912. (村田)・泊居 Ⅴ. 1910. (村田)・川上・落谷・黒川 (立花)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・九州・伊豆七島・済州島・琉球

Genus *Locustella* Kaup (1829) せんじう属

78. *Locustella fasciolata* (Gray)

エゾセンニウ

蝦夷仙入 (樺、禁) 第二十圖 78.

Acrocephalus fasciolatus Gary Proc. Zool. Soc. London P. 349. (1860—Batjan); Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. PP. 12—13. Pl. III. Fig. 4.

採集地： 喜美内 Ⅴ. 1910. (村田)・小田寒 Ⅴ. 1910. (村田)・久春内 Ⅴ. 1610. (村田)・泊居 Ⅴ. 1910. (村田)・三ノ澤 Ⅴ. Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・朝鮮・屋久島・琉球

国外： 東部西比利亞・比律賓・セレベス

79. *Locustella ochotensis ochotensis* (Middendorff)

シマセンニウ

島仙入 (樺、禁) 第二十圖 79.

Sylvia (Locustella) ochotensis Middendorffi Sibir. Reise. II. 2. P. 185. Pl. XVI. Fig. 7. (1853—Udskoj Ostrog)

Locustella ochotensis (nec Midd.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. PP. 13—14. Pl. III. Fig. 3.

採集地： 留多加 Ⅴ. 1910. (村田)・貝塚 (村田)・相濱 (村田)・小田寒 (村田)・鶴城 Ⅴ. 1912. (村田)・北名好 (村田)・豊原 (立花)・池邊譜 Ⅴ. Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・琉球・臺灣

国外： カムチャツカ・西比利亞沿岸・南支那・比律賓・ボルネオ・セレベス

80. *Locustella lanceolata* (Temminck)

マキノセンニウ マダラセンニウ (村田)

牧野仙入 (樺、禁) 第二十圖 80.

Sylvia lanceolata Temminck Man. d' Ornith. ed. II. IV. P. 614. (1840—Russia); Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 14. Pl. III. Fig. 2.

採集地： 留多加 Ⅴ. 1910. (村田)・貝塚 Ⅴ. 1910. (村田)・北名好 Ⅴ. 1912. (村田)・豊原 (立花)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・朝鮮

国外： 西東部西比利亞・南支那・馬來半島・印度・ボルネオ

Genus *Acrocephalus* Naumann (1811) よしきり属

81. *Acrocephalus bistrigiceps* Swinhoe

コヨシキリ

小葦切 (樺、禁) 第二十一圖 81.

Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe Ibis. P. 51. (1860—Amoy); Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 12.

採集地： 留多加 Ⅴ. 1910. (村田)・貝塚 Ⅴ. 1910. (村田)・相濱 (村田)・追手 (村田)・野田寒 (村田)・豊原 (立花)・蘭泊・三ノ澤 Ⅴ. 1906. (E. Linnberg) 池邊譜 Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)

分布： 樺太・北海道・本州・九州・對馬・朝鮮

Family 13. TURDIDÆ 鶇科

Genus *Turdus* Linnaeus (1758) つぐみ属

82. **Turdus aureus aureus* Holandre

トラツグミ

虎鶇 (樺、禁) 第二十一圖 82.

Turdus aureus Holandre Faune dép. Moselle, in Annuaire de la Moselle P. 60. (1825—Metz)

Oreocincla hancii Swinhoe Ibis P. 275. (1863—Formosa)

採集地：小沼 Y. 1936. (伊藤) (中央試験所林業部所蔵)
 分布：樺太・北海道・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣・澎湖島
 國外：西東部西比利亞・支那・比律賓・アッサム・獨逸・英國・伊太利

83. *Turdus sibiricus davisoni* Hume

マミジロ

肩 白 (樺、禁) 第二十一圖 83.

Turdus davisoni Hume Stray Feathers, V. P. 63. (1877—Muleyit)*Cichloselys sibirica davisoni* (nec Hume); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 3.

採集地：喜美内山道 M. 1910. (村田)・蘆山道 M. 1910. (村田)・樫保 M. 1912. (村田)・三ノ澤 M. 1906. (E. Ljnnberg)・池邊津 M. 1906. (E. Ljnnberg)
 分布：樺太・北海道・本州・四國・九州・朝鮮
 國外：緬甸・テネセリム

84. *Turdus sibiricus sibiricus* Pallas

シベリアマミジロ

西比利亞肩白 (樺、禁) 第二十一圖 84.

Turdus sibiricus Pallas Reise, d. Versch. Prov. Russ. Reichs III. P. 634. (1776—Dauria)

採集地：樫保
 分布：樺太・朝鮮
 國外：西比利亞・支那

85. *Turdus cardis cardis* Temminck

クロツグミ

黒 鶉 (樺、獵) 第二十二圖 85.

Turdus cardis Temminck Pl. Col. Pl. 518. (1830—Japan)*Merula cardis* (Temminck) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：海馬島 M. 1924.

分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・濟州島・屋久島
 國外：南支那・海南島

86. *Turdus pallidus* Gmelin

シロハラ

白腹 白腹鶉 (樺、禁) 第二十二圖 86.

Turdus pallidus Gmelin Syst. Nat. I. P. 815. (1789—Lake Baikal)*Turdus daulias* Temminck Pl. Col. Pl. 515. (1830—Japan)*Turdus advena* Swinhoe Ibis, PP. 56—358. (1860)*Turdus obsoletus* Brehm Journ. f. Ornith. P. 391. (1862—Japan)

採集地：樺太

分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・雷陵島・濟州島
 種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣
 國外：ウスリー・アムール・アスコルド・滿洲・南支那・アッサム

87. *Turdus obscurus obscurus* Gmelin

マミチヤジナイ

白 肩 鶉 (樺、禁) 第二十二圖 87.

Turdus obscurus Gmelin Syst. Nat. I. 2. P. 816. (1789—Lake Baikal)

採集地：海豹島 X. 1935. (中島)・小田井 (立花)・敷香 (立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・琉球・臺灣
 國外：西比利亞・ニコセイ・カムチャツカ・バイカル・ウスリ地方

89. *Turdus chrysolais chrysolais* Temminck

アカハラ

赤腹 赤腹鶉 (樺、禁) 第二十二圖 89.

Turdus chrysolais Temminck Pl. Col. Pl. 537. (1831—Japan)*Turdus joutyi* Stejneger Proc. U. S. Nat. Mus. X. P. 4. (1887—Hond, Japan)*Geocichla chrysolais* (nec T.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 1—2.

採集地：泊居 Ⅴ. 1910. (村田)・内路 Ⅴ. 1912. (村田)・圓山 (立花)・榮濱 (立花)
小田井 (立花)・黒川 (立花)・三ノ澤 Ⅴ. Ⅵ. 1906. (E. Linnberg)・豊原
Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)・池邊 Ⅴ. Ⅵ. 1906. (E. Linnberg)
分 布：樺太・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島
奄美大島・琉球・臺灣・澎湖島
國外：南支那・比律賓

89. *Turdus eunomus* Temminck

ツグミ

鶉 (樺、嶺) 第二十三圖 89.

Turdus eunomus Temminck Pl. Col. Pl. 514. (1830—Japan)

Turdus fuscatus Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. I. P. 451. Pl. XII (1827—Dauria)

Turdus eunomus ni Momiyama Annot. Orn. Orient. I. PP. 116—125—141. (1927—
Shimosa, Japan)

Merula fuscata (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 2.

採集地：軍川 Ⅴ. 1910. (村田)・海馬島 Ⅴ. 1924.・海豹島 Ⅴ. 1935. (中島)・豊原・小沼・落合
分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・佐渡・四國・九州・臺北・對馬・朝
鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・琉球・臺灣
國外：西比利亞・歐洲・印度

Genus *Saxicola* Bechstein (1802) のびたき屬90. *Saxicola torquata stejnegeri* (Parrot)

ノビタキ

野 鶉 (樺、禁) 第二十三圖 90.

Pratincola rubicola stejnegeri Parrot Verh. Orn. Ges. Bayern VIII. P. 124. (1908—
Yutorofu and Hokkaido)

Pratincola maura (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 6.

採集地：貝塚・相濱 Ⅴ. 1910. (村田)・小田塞 Ⅴ. 1910. (村田)・近幌 Ⅴ. 1910. (村
田)・北名好 Ⅴ. 1912. (村田)・知取・小田井 (立花)・榮濱 (立花)・豊原
(立花)・内路 (立花)・鈴谷河口 Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)・三ノ澤 Ⅴ. 190
6. (E. Linnberg)・池邊 Ⅴ. Ⅵ. 1906. (E. Linnberg)・眞岡・蘭泊 (E田)
分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島・屋久
島・琉球・臺灣
國外：東部西比利亞・滿洲・北支那・海南島・緬甸・印度

Genus *Ianthia* Blyth (1847) るりびたき屬91. *Ianthia cyanura cyanura* (Pallas)

ルリビタキ

瑠璃鶉 青鶉 (樺、禁) 第二十三圖 91.

Motacilla Cyanurus Pallas Reise d' Versch. Prov. Russ. Reichs II. P. 709. (1773—
Yenesei)

Tarsiger cyanurus (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 7.

採集地：喜美内 Ⅴ. 1910. (村田)・小田塞 (村田)・久春内 Ⅴ. 1910. (村田)・樺保
Ⅴ. 1912. (村田)・内路 (村田)・元泊 (村田)・北名好 (村田)・知取・川上・
知取 (立花)・大泊・豊原 Ⅴ. 1937.・鈴谷河口 Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)・
三ノ澤 Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)・池邊 Ⅴ. Ⅵ. 1906. (E. Linnberg)
分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・臺北・對馬・朝鮮・濟
州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣
國外：西比利亞全部・カムチャツカ・北支那・南支那・印度

Genus *Phoenicurus* Forster (1817) じゃうびたき屬92. *Phoenicurus aureus aureus* (Pallas)

ジャウビタキ

常 鶉 上 鶉 (樺、禁) 第二十三圖 92.

Motacilla aurea Pallas Reise d' Versch. Prov. d' Russ. Reichs. III. P. 695. (177
6—Selenka, Lake Baikal)

採集地：大泊・喜美内山道

分 布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡・小笠原列島・伊豆七島・硫黄列島・四國・
九州・臺北・對馬・朝鮮・營陵島・濟州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・
琉球・臺灣
國外：東部西比利亞・東蒙古・南支那・海南島

Genus *Luscinia* Forster (1817) こまどり屬93. *Luscinia calliope camtschatkensis* (Gmelin)

オホノゴマ

大 野 鶉 (樺、禁) 第二十四圖 93.

Turdus camtschatkensis Gmelin Syst. Nat. 1.2. P. 817. (1789—Kamtschatka)

採集地：川上・落合・瀧ノ澤・清水
分布：樺太・千島・本州・朝鮮・臺灣

94. *Luscinia calliope calliope* (Pallas)

ノゴマ

野 駒 (樺、禁) 第二十四圖 94.

Motacilla calliope Pallas Reise. d' Versch. Prov. Russ. Reichs III. P. 697. (1776—Yenesei)

Erithacus calliope (nec Pallas) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 4.

採集地：大泊・豊原 V. 1910. (村田)・喜美内 VI. 1910. (村田)・遠泊 VII. 1910. (村田)・散江 VIII. 1912. (村田)・北名好 IX. 1912. (村田)・樺丹 X. 1912. (村田)・知取・小沼 (立花)・榮濱 (立花)・黒川 (立花)・小田井 (立花)・内瀧 (立花)・川上・落合・眞縫・瀧ノ澤・逢坂
分布：樺太・北海道・本州・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ケ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣・澎湖島・バラオ諸島
國外：西比利亞・北支那・南支那・比律賓・馬來半島・印度

Genus *Larviva* Hodgson こるり屬

95. *Larviva sibilans* Swinhoe

シマゴマ

島 駒 (樺、禁) 第二十四圖 95.

Larviva sibilans Swinhoe Proc. Zool. Soc. London. P. 292. (1863—Near Macao in China)

Erithacus sibilans (nec Sw.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 3—4.

採集地：豊原 VI. 1910. (村田)・喜美内 VI. 1910. (村田)・近幌 VI. 1910. (村田)・北名好 IX. 1912. (村田)・樺丹 (村田)・川上・瀧ノ澤・逢坂・富澤・豊原 VII. 1906. (E. Lönberg)・三ノ澤 VI. 1906. (E. Lönberg)
分布：樺太・本州・四國・朝鮮・濟州島
國外：東南西比利亞・南支那・海南島

96. *Larviva cyane* (Pallas)

コルリ

小 瑠 璃 (樺、禁) 第二十四圖 96.

Motacilla Cyane Pallas Reise d' Versch. Prov. Russ. Reichs III. P. 697. (1776—Dauria)

Erithacus cyaneus (nec Pallas) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 5.

Larviva cyane bohaiensis Shulpin Ann. Mus. Zool. l' Acad. Sci. l' URSS. XXVIII. n. 3. P. 404. (1927—S. Ussuri)

採集地：黒川 (立花)・川上・並川. VI. 1906. (E. Lönberg)
分布：樺太・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・濟州島

Family 14. TROGLODYTIDÆ 鷓鴣科

Genus *Troglodytes* Vieillot (1807) みそさざい屬

97. *Troglodytes troglodytes dauricus* Dybowski & Taczanowski

カラフトミソサザイ

樺太鷓鴣 (樺、禁) 第二十五圖 97.

Troglodytes dauricus Dybowski & Taczanowski Bull. Soc. Zool. France P. 155. (1884—Dauria)

Troglodytes troglodytes lönnergi Momiyama Annot. Orn. Orient. I. I. P. 45. (1927—Sisuka, S. Sakhalin)

Troglodytes fumigatus (nec Taczanowski) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. PP. 18—19.

採集地：豊原 V. 1937.・小沼・深草・美保・眞縫・小田原・眞崎・本斗・知取 (立花)・泊居・内路 (立花)
分布：樺太特産

Genus *Cinclus* Borkhausen (1797) かはがらす屬

98. *Cinclus pallasii pallasii* Temminck

キタカハガラス

北 河 鳥 (樺、禁) 第二十五圖 98.

Cinclus Pallasii Temminck Man. d' Orn. 2. ed. L. P. 177. (1820—"Krim ?"; *errone*: E. Siberia); Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 5—6. Pl. 6. Fig. 7.

採集地：豊原「玉川」・小沼・追手 Ⅵ. 1910. (村田)・棚丹 Ⅷ. 1912. (村田)・知取・小田井(立花)・古丹岸(立花)・泊岸(立花)・兼香(立花)・内路(立花)
分布：樺太・千島・北海道・朝鮮
国外：西比利亞

Family 15. HIRUNDINIDÆ 燕科

Genus *Hirundo* Linnaeus (1758) つばめ屬

99. *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli

ツバメ

燕 (樺、禁) 第二十五圖 99.

Hirund gutturalis Scopoli Del. Flor. & Faun. Insubr. II. P. 96. (1786—Panay, Philippines)

採集地：平野 Ⅵ. 1910. (村田)
村田氏の採集せられしより捕獲せるを聞かず、樺太に分布せるは疑はしきものなり。
分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・濟州島・四國・九州・對馬・朝鮮・硫黃列島・屋久島・喜界ヶ島・南大東島・琉球・臺灣・紅頭嶼

Genus *Delichon* Moore (1855) いはつばめ屬

100. *Delichon urbica whiteleyi* (Swinhoe)

シベリアイハツバメ

西比利亞岩燕 (樺、禁) 第二十五圖 100.

Chelidon whiteleyi Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 320. (1862—Peking)

採集地：大泊・豊原・眞岡・蘭泊・落合・眞壁
分布：樺太
国外：東部西比利亞・カムチャツカ・蒙古・滿洲・北支那・南支那・緬甸

101. *Delichon urbica dasypus* (Bonaparte)

イハツバメ

岩 燕 (樺、禁) 第二十六圖 101.

Chelidon dasypus Bonaparte Consp. Av. L. P. 343. (1850—Borneo)

Chelidon blakistoni Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 320. (1862—Hakodate, Japan)

採集地：輪麓 Ⅵ. 1910. (村田)・近幌 (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮
国外：南支那・マラツカ・ボルネオ・暹羅

Genus *Riparia* Forster (1817) せうどうつばめ屬

102. *Riparia riparia ijimae* (Lönnerberg)

セウドウツバメ スナムグリツバメ

小洞燕 砂潜燕 (樺、禁) 第二十六圖 102.

Clivicola riparia ijimae Lönnerberg Journ. College. Sci. Tokyo. XXIII. Art. 14. P.

38. (1908—Sakhalin)

Cotile riparia (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 38—

39.

採集地：内瀨河畔・榮濱・三ノ澤 Ⅳ. 1960. (E. Lönnerberg) 並川・知取(山本)・樺保(山本)

分布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮
国外：東部西比利亞・カムチャツカ・南支那

Order 2. CYPSELI 雨燕目

Family 16. MICROPODIDÆ 雨燕科

Genus *Micropus* Meyer & Wolf (1810) あまつばめ屬

103. *Micropus pacificus pacificus* (Latham)

アマツバメ

雨 燕 (樺、禁) 第二十六圖 103.

Hirundo pacifica Latham Ind. Orn. Suppl. P. LVIII. (1801—New South Wales)

Cypselus pacificus (nec Latham) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 45.

Apus pacifica (Latham) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：榮濱 V. 1929.・知取・近幌(村田)・内路 K. 1936. (山本) 三ノ澤 IV. 1906 (E. Lönnberg)・池邊巖 VII. K. 1906. (E. Lönnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・徳之島・琉球・臺灣・紅頭嶼

國外：東部西比利亞・蒙古・滿洲・北支那・南支那・印度

Genus *Chaetura* Stephens (1826) はりをあまつばめ屬

104. *Chaetura caudacuta caudacuta* (Latham)

ハリヲアマツバメ

針尾雨燕 (樺、禁) 第二十六圖 104.

Hirund caudacuta Latham Ind. Orn. Suppl. P. LVII. (1801—New South Wales)

Chaetura caudacuta (nec Latham) E. Lönnberg Jour. Col. Sci Tōkyō VOL XXIII. Art 14. P 45.

Hirundapus caudacutus Var. *uchidai* Ishizawa Annot. Orn. Orient. I. 2. PP. 145—146. 25, Jan. 1928. Pl. V. (1928—Nikko, Hondo-colour variety)

採集地：深草 V. 1923. (菅原)・近幌 VII. 1910. (村田)・大谷(立花)・敷香(立花)・内路(立花)・東知取(山本)・樺保(山本)・三ノ澤 IV. 1906. (E. Lönnberg)・池邊巖 VII. K. (E. Lönnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・對馬・朝鮮

國外：東部西比利亞・蒙古・滿洲・支那・濠洲

Order 3. UPUPÆ 戴勝目

Family 17. UPUPIDÆ 戴勝科

Genus *Upupa* Linnaeus (1758) やつがしら屬

105. *Upupa epops saturata* Lönnberg

ヤツガシラ

戴勝 (樺、禁) 第二十七圖 105.

Upupa epops saturata Lönnberg Arkiv. f. Zool. V. P. 20. (1909—Kjachta, Mong-

olia)

採集地：知取 IV. 1933. (山本)・小田窓 V. 1934.

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島・琉球・臺灣

國外：東部西比利亞・北部蒙古・滿洲・西藏・支那

Order 4. CORACIÆ 佛法僧目

Family 18. CORACIDÆ 佛法僧科

Genus *Eurystomus* Vieillot (1816) ぶつぼうそう屬

106. *Eurystomus orientalis calonyx* Sharpe

ブツボウソウ

佛法僧 (樺、禁) 第二十七圖 106.

Eurystomus calonyx Gray Cat. B. Nepal. P. 53. (1846—Nom Nud)

Eurystomus orientalis calonyx Sharpe Proc. Zool. Soc. London P. 551. (1890—Nepal)

採集地：川南(川村)・名寄「古丹岸」(大泊中學校所藏)・新間 1930. (眞岡中學校所藏)

分布：樺太・本州・濟州島・四國・九州・對馬・朝鮮・硫黃列島・琉球・臺灣

國外：東部西比利亞・滿洲・北・中部支那・ヒマラヤ地方・馬來半島・ボルネオ

Order 5. HALCYONES 翡翠目

Family 19. ALCEDINIDÆ 翡翠科

Genus *Alcedo* Linnaeus (1758) かはせみ屬

107. *Alcedo atthis japonica* Bonaparte

カハセミ

魚狗、川翡翠 (樺、禁) 第二十七圖 107.

Alcedo japonica Bonaparte Consp. Volucr. Anis. P. 10. (1857—Japan)

Alcedo atthis atthis formosana Laubmann Arch. Naturges. Berlin. 48. Pt. A. PP. 73—77. (1920—"Nantu-Distrikt, Formosa")

Alcedo (Alcedo) atthis jōzi Laubmann Verh. Ornith. Ges. Bayern. XV. Heft. 4. P.

390. (1923—"Amami-Oshima, Liukiu-Inseln")

採集地：豊原「鈴谷山麓」、小田窪 Ⅷ. 1929.・美保・落合
 分布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡・隠岐・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・硫黄列島・朝鮮・種子ヶ島・奄美大島・喜界ヶ島・徳之島・沖ノ長良部島・琉球・南大東島・臺灣・紅頭嶼
 國外：東部西比利亞・支那

Genus *Halcyon* Swainson (1820) せうびん屬

108. *Halcyon coromanda major* (Temminck & Schlegel)

アカセウビン、ミヤマセウビン

赤翡翠、深山翡翠 (樺、禁) 第二十七圖 108.

Alcedo (Halcyon) coromanda major Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 75. Pl. 39. (1842—Japan)

Entomothera coromanda major (Temminck & Schlegel) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：樺太
 分布：樺太・北海道・本州・四國・九州・對馬・濟州島・朝鮮・臺灣
 國外：支那・比律賓群島・セレベス

Order 6. PICI 啄木鳥目

Family 20. PICIDÆ 啄木鳥科

Genus *Dryobates* Boie (1826) あかけら屬

109. *Dryobates major brevirostris* (Reichenbach)

ハシブトアカゲラ

嘴太赤啄木鳥 (樺、禁) 第二十八圖 109.

Picus brevirostris Reichenbach Handb. d. Spec. Orn. Scansores. P. 365. Pl. dc XXXIII. Fig. 4212. (1854—Irtisch in Siberia)

Dendrocopus major mongolus Lönnerberg Arkiv. f. Zool. V. No. 9. P. 24. (1909—Kjachta Northern Mongolia)

Dendrocopus major sibiricus Buturlin Orn. Beob. No. 3. P. 201. (1910—E. Siberia)

採集地：海馬島
 分布：樺太・朝鮮
 國外：東部西比利亞・カムチャツカ・蒙古・滿洲

110. *Dryobates major tscherskii* (Buturlin)

キタアカゲラ

北赤啄木鳥、北赤髯 (樺、禁) 第二十八圖 110.

Dendrocopus japonicus tscherskii Buturlin Nascha Okhota July. 1910. St. Petersburg P. 53. (1910—Lake Khanka) (in Russian)

Picus major japonicus (nec Seeb.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 40.

採集地：豊原・小沼・小田窪・知取・樺保 Ⅷ. 1912. (村田)・真岡山道 Ⅷ. 1912. (村田)・内淵 (立花)・小田井 (立花)・知取 (立花)・内川 (立花)・敷香 (立花)・保意 (立花)・古丹岸 (立花)・内路 (立花)・觀内川 (立花)・豊原 Ⅵ. 1906. (E. Lönnerberg)・三ノ澤 Ⅶ. 1906. (E. Lönnerberg)・池邊 Ⅹ. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太
 國外：ウスリー・アムール・トランスバイカリア・滿洲・東北部支那

111. *Dryobates leucotos saghalinensis* Yamashina

カラフトオホアカゲラ

樺太大赤啄木鳥、樺太大赤髯 (樺、禁) 第二十八圖 111.

Dryobates leucotos saghalinensis Yamashina "Tori" VII. No. 31. P. 1. (1931—Ōtomari, S. Saghalin)

Dendrodromas leucotos clarki Buturlin Annuaire Mus. Zool. Acad. Petersburg XIII. P. 234. (1908—Northern Ussuri); Momiyam Annotationes Orn. Ori. Vol. 1. No. 3. P. 202.

Dendrocopus leucotos (nec Bechstein) Lönnerberg Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo. XXIII. Art. 14. P. 43. (1908—S. Sakhalin)

Picus leucotos (nec Bechstein) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 39—40. Pl. VI. Fig. 5.

採集地：豊原・並川（村田）
分布：樺太特産

112. *Dryobates minor kamtschatkensis* (Malherbe)

シロハラコアカゲラ

白腹小赤啄木鳥（樺、禁） 第二十八圖 112.

Trichopicus kamtschatkensis Bonaparte Consp. Vol. Zygodactyl in Ateneo Italiano, No. 8. P. 8. No. 49. (1854—Nom Nud)

Picus Kamtschatkensis Malherbe Monogr. Picidae, I. P. 115. Pl. XXVI. Fig. I. (1861—“Okhotsk”=Kamtschatka)

採集地：樺太
分布：樺太
国外：歐洲露國・西比利亞・カムチャツカ・蒙古

113. *Dryobates minor amurensis* (Buturlin)

コアカゲラ

小赤啄木鳥（樺、禁） 第二十九圖 113.

Xylocopus minor amurensis Buturlin Annuaire Mus. Zool. St. Petersburg XIII. P. 243. (1908—“Terras Prope Partem inferiorem Fluminis Amur inhabitans”)

Xylocopus minor minutillus Buturlin *l. c.* P. 246. (1908—“Partem meridionalem terrae Ussuriensis inhabitans” Sibemi)

Picus minor (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku P. 40. (1914—Kitanayosi, S. Saghalin)

Xylocopus minor yamashinai Momiyama Annot. Orn. Orient. I. 3. P. 205. (1928—Saghalin)

採集地：川上 Ⅷ. 1934.・北名好 Ⅷ. 1912. (村田)・古丹 Ⅷ. 1912. (村田)・風川 (立花)
分布：樺太・北海道
国外：トランスバイカリヤ・アムール・ウスリー

114. *Dryobates kizuki seebohmi* (Hargitt)

エゾコゲラ

蝦夷小啄木鳥（樺、禁） 第二十九圖 114.

Iyngipicus seebohmi Hargitt Ibis. P. 100. (1884—Yezo)

Iyngipicus kiziki ijinae Taka-Tsukasa “Dōbutsu Zasshi” XXXIV. P. 292. (1922—Saghalin)

Iyngipicus kiziki seebohmi (nec Harg.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 41.

採集地：豊原・小田家 Ⅷ. 1912. (村田)・樺保 Ⅷ. 1912. (村田)・知取・小沼
分布：樺太・北海道

Genus *Picoides* Lacépède (1799) みゆびげら属

115. *Picoides tridactylus sakhalinensis* Buturlin

ミユビゲラ

三趾啄木鳥（樺、禁） 第二十九圖 115.

Picoides sakhalinensis Buturlin Orn. Monatsber. PP. 10—11. (1907—Saghalin and Amur)

Picoides (tridactylus) sakhalinensis Lönnerberg Journ. Coll. Sci. Tōkyō. XXIII. Art. 14. P. 41. (1908—Saghalin)

Picoides tridactylus (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 42. Pl. VI. Fig. 4.

採集地：真岡山道 Ⅷ. 1910. (村田)・北名好 Ⅷ. 1912. (村田)・樺丹 Ⅷ. 1912. (村田)・知取・内川 (立花)・敷香 (立花)・保意 (立花)・古丹岸 (立花)・泊岸 (立花)・内路 (立花)・新間 (立花)・貝塚 Ⅷ. 1906. (E. Lönnerberg)・池邊 Ⅷ. 1906. (E. Lönnerberg)
分布：樺太

Genus *Dryocopus* Boie (1826) くまげら属

116. *Dryocopus martius martius* (Linnaeus)

クマゲラ

熊啄木鳥、熊翼（樺、禁） 第二十九圖 116.

Picus martius Linnaeus Syst. Nat. X. ed. 1. P. 112. (1758—Sweden)

Dryocopus martius reichenowi Kothe Orn. Monatsb. P. 95. (1906—Ussuri)

Dryocopus martius silvifragus Riley Proc. Biol. Soc. Washington XXVIII. P. 162. (1915—Hokkaido)

Dryocopus (error for *Dryocopus*) *martius morii* Kuroda Auk. XXXVIII. P. 575. (1921—C. Karea)

Dryocopus martius sakhalinensis Momiyama Annot. Orn. Orient. 1. 3. P. 211. (1928—Sakhalin)

Dryocopus martius (nec Linnaeus) Nikolski Sapiski Imp. Acad. Nauk. Sankt Peterb. P. 211. (1889—Sakhalin)

Dryocopus martius silvifragus (nec Riley) Taka-Tsukasa Handl. Japanese Bds. P. 110. (1922—Sakhalin, Hokkaido)

採集地：小沼・知取・樺保・新間・宇遠泊 VII. 1910. (村田)・北名好 IX. 1912. (村田)・西樺丹 IX. 1912. (村田)・知取(立花)・小田井(立花)・内川(立花)・保意(立花)・泊岸(立花)・敷香(立花)・内路(立花)・新間(立花)

分布：樺太・千島・北海道・朝鮮

国外：歐洲北部ピレニース・北部スペイン・ギリシヤ・コーカサス・北部亞細亞・アムール・ウスリー・滿洲・北支那・カムチャツカ

Genus *Jynx* Linnaeus (1758) **ありすひ屬**

117. *Jynx torquilla intermedia* Stegmann

シベリアアリスヒ

西比利亞蟻吸 (樺、禁) 第三十圖 117.

Jynx torquilla intermedia Stegmann Bull. B. O. Club. XLVII. P. 73. (1927—Near Tchita, S. E. Siberia)

Jynx torquilla (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 42—43. Pl. VI. Fig. 6. ; E Lönnberg Jour. Coll. Sci. Imp. Univ. Tōkyō VOL XXIII Art. 14 P. 40

採集地：海豹島 IX. 1935. (中島)・榮濱 VI. 1910. (村田)・大泊・豊原・並川・三ノ澤 VI. 1906. (E. Lönnberg)

分布：樺太・朝鮮・臺灣

国外：東部西比利亞

Order 7. CUCULI 杜鵑目

Family 21. CUCULIDÆ 杜鵑科

Genus *Cuculus* Linnaeus (1766) **くわくこう屬**

118. *Cuculus canorus telephonus* Heine

クワクコウ

郭公 (樺、禁) 第三十圖 118.

Cuculus telephonus Heine Journ. f. Orn. P. 352. (1863—Japan)

Cuculus canorus (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 44.

採集地：豊原(立花)・小沼・眞岡・本斗・久春内・知取・眞鏡 V. 1930.・落合 IX. 1934.・貝塚 V. 1910. (村田)・三ノ澤 VI. 1906. (E. Lönnberg)・豊原 VII. 1906. (E. Lönnberg)・Khomatofka VI. 1906. (E. Lönnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・琉球・臺灣・濟州島

国外：西比利亞西部・カムチャツカ・滿洲・中央亞細亞・ヒマラヤ・南支那・馬來群島・印度・南歐洲

119. *Cuculus optatus optatus* Gould

ツツドリ、ボンポントリ

筒鳥 (樺、禁) 第三十圖 119.

Cuculus optatus Gould Proc. Zool. Soc. London P. 18. (1845—Port Essington, Australia)

Cuculus satusatus (nec Hodgson) E. Lönnberg Journ. Coll. Sci. Tōkyō Vol. XXIII Art. 14 P. 47. (1908—Sakhalin)

Cuculus intermedius (nec Shelley) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku PP. 44—43.

採集地：川上 VIII. 1929.・貝塚 VI. 1910. (村田)・喜美内山道 VI. 1910. (村田)・久春内 VII. 1910. (村田)・北名好 IX. 1912. (村田)・新間・美保・落合・小田・榮濱・大泊・眞鏡・眞岡・本斗・留多加・長濱・豊原(立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・大東列島・臺灣・紅頭嶼

国外：東部西比利亞・西部西比利亞・中央亞細亞・印度・北支那・滿洲・ニウジーランド

Order 8. STRIGES 梟 鴞 目

Family 22. STRIGIDÆ 梟 鴞 科

Genus *Nyctea* Stephens (1826) しろふくろふ屬120. *Nyctea scandiaca* (Linnaeus)

シロフクロフ

白 鴞 (樺、禁) 第三十圖 120.

Strix scandiaca Linnaeus Syst. Nat. X. 1. P. 92. (1758—Lapland)*Strix Nyctea* Linnaeus Syst. Nat. X. 1. P. 93. (1758—Sweden)

採集地：落合・知取・北知床半島・敷香 X. 1934.・多來加(立花)・内路(立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮

國外：北極圏を廻る範圍内に蕃殖し、南歐・印度西北部・支那・カリフォルニア・テキサス

Genus *Bubo* Duméril (1806) わしみみづく屬121. *Bubo bubo borissowi* Hesse

カラフトワシミミツク

樺太鷲木兔、樺太鴞 (樺、禁) 第三十一圖 121.

Bubo bubo borissowi Hesse Journ. f. Orn. P. 366. (1915—Sachalin)

採集地：知取・眞鏡・樺保・新間・多來加(立花)・輪荒・近視・馬群潭

分 布：樺太特産

122. *Bubo blakistoni karafutonis* Kuroda

カラフトシマフクロフ

樺太鳥 鴞 (樺、禁) 第三十一圖 122.

Bubo blakistoni karafutonis Kuroda "Tori" VII. No. 31. P. 41. (1931—Sakhalin)*Bubo blakistoni* (nec Seeb.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 46. Pl. V.

Fig. 1.

採集地：知取・樺保(村田、山本)

分 布：樺太特産

Genus *Otus* Pennant (1769) このはづく屬123. *Otus bakkamoena ussuriensis* (Buturlin)

サメイロオホコノハツク

絞色大木葉兔 (樺、禁) 第三十一圖 123.

Scops semitorques ussuriensis Buturlin Orn. Mitteilungen P. 119. (1910—Lake Khanka, Ussuri)

採集地：眞鏡 VI. 1927. (立花)

分 布：樺太・本州・朝鮮

國外：ウスリ地方・南滿洲

*124. *Otus scops stictonotus* (Sharpe)

テウセンコノハツク

朝鮮木葉兔 (樺、禁) 第三十一圖 124.

Scops stictonotus Sharpe Cat. B. Brit. Mus. II. P. 54. Pl. III. Fig. 2. (1875—China)

採集地：元泊

Measurements:—♂ad(眞岡中學校所蔵)

Sex	♂ad
Exposed culmen	15mm
Height of bill at nostril	8
Wing	140
Tail	60
Tarsus	20
Claw from middle toe third toe	20

分 布：樺太・朝鮮

國外：東南西北利亞・滿洲・北支那

Genus *Asio* Schaeffer (1779) とらふづく屬125. *Asio flammeus flammeus* (Pontoppidan)

コミミツク

小耳木兎 (棒、禁) 第三十二圖 125.

Strix flammea Pontoppidan Danske Atlas, I. P. 617. Pl. XXV. (1763—Denmrk)*Otus leucopsis* Brehm Vogelfang, P. 413. (1855—"In Osteuropa bei Sarepta"-Pale phase)*Asio accipitrinus pallidus* Sarudny & Loudon Orn. Monatsber. P. 151. (1906—W. Siberia)

採集地：用上Ⅷ. 1927. (立花)・貝塚(立花)・知取町・北遠古丹Ⅰ. 1937. (山本)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・臺灣

國外：歐洲・西比利亞・北阿弗利加

Genus *Aegolius* Kaup (1829) きんめふくろう屬126. *Aegolius funereus sibiricus* (Buturlin)

キンメフクロフ

金 眼 鳥 (棒、禁) 第三十二圖 126.

Cryptoglaux sibirica Buturlin Nasha Okhota Juni-Nummer, 1910. P. 78. (1910—L. ake Khanka)*Nyctale funerea* (nec Bp.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 47. 48. Pl. V. Fig. 2. (1910—Ikusagawa, S. Saghalin)

採集地：豊原Ⅷ. 1928. (立花)・知取・富澤(加藤)・新間(立花)・軍川 1910. (村田)・小田寒(立花)・犬主山(立花)

分 布：樺太・千島・北海道

國外：中部及東部西比利亞・西藏・土耳其Ⅱ

Genus *Glaucidium* Boie (1826) すずめふくろう屬127. *Glaucidium passerinum orientale* Taczanowski

スズメフクロフ

雀 鳥 (棒、禁) 第三十二圖 127.

Glaucidium passerinum orientale Taczanowski Faune Orn. Sib. Orientl. I. P. 128. (1891—E. Siberia)*Glaucidium passerinum* (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 49. 50. Pl. V. Fig. 3. (Motodomari, E. Cost of S. Saghalin)

採集地：元泊Ⅷ. 1912. (村田)・知取・樺保・北貝塚・豊原(立花)・内路(立花)・落合・深草

分 布：樺太

國外：東部西比利亞

Genus *Surnia* Duméril (1806) をながふくろう屬128. *Surnia ulula pallasi* Buturlin

ヲナガフクロフ

尾 長 鳥 (棒、禁) 第三十二圖 128.

Surnia ulula pallasi Buturlin Orn. Monatsber. P. 100. (1907—Siberia)*Surnia ulula* (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 48. Pl. VII. Fig. 3. (Saghalin)

採集地：豊原・内瀧(立花)・内川(立花)

分 布：樺太・千島

Genus *Strix* Linnaeus (1758) ふくろふ屬129. *Strix nebulosa sakhalinensis* (Buturlin)

カラフトフクロフ、ラブランドフクロフ

樺 太 鳥 (棒、禁) 第三十三圖 129.

Syrnium cinereum sakhalinensis Buturlin Journ. f. Orn. PP. 332. 334. (1907—Sakhalin)*Syrnium lapponicum* (nec Sparmann) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku P. 49. Pl. VII. Fig. 2.

採集地：落合・諸津(村田)

分 布：樺太特産

130. *Strix uralensis tatibanai* Momiyama

キタフクロフ

北 鳥 (棒、禁) 第三十三圖 130.

Strix ualensis tatibanae Momiyama Bull. B. O. Club. XLVIII. P. 21. (1927—Sisuka, S. Sakhalin)

Strix ualensis (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. PP. 45. 46.

Strix ualensis nikolskii (nec Buturlin) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：軍川 1910. 冬 (村田)・知取・保意 (立花)・氣屯 (立花)・靱内川流域 (立花)・内川 (立花)・新間 (立花)・豊真山道・富澤

分 布：棒太特産

Order 9. ACCIPITRES 鷲鷹目

Family 23. FALCONIDÆ 鷲鷹科

Genus *Falco* Linnaeus (1758) はやぶさ屬

*131. *Falco peregrinus pealei* Ridgway

オホハヤブサ

大 隼 (棒、禁) 第三十三圖 131.

Falco communis Var. *Pealei* Ridgway Bull. Essex Inst. V. P. 201. (1873—Oregon)

Falco rudolfi Kleinschmidt Falco. V. P. 19. (1909—Hokkaido)

採集地：貝塚

分 布：棒太・千島・北海道

國外：北米西北部の大平洋沿岸・コンマンダー諸島

*132. *Falco cherrug milvipes* Jerdon

ワキスチハヤブサ

脇 筋 隼 (棒、禁) 第三十三圖 132.

Falco milvipes Hodgson Gray's. Zool. Misc. P. 81. (1844—*nom und*)

Falco milvipes Jerdon Ibis. P. 240. (1871—Umballa in India)

Falco hendersoni Hume Ibis. P. 407. (1807—E. Turkestan)

採集地：海豹島 Ⅴ. 1935. (中島)

Measurements :—

Totally length	450mm
Height of bill at nostril	18
Wing	371
Tail	182
Tarsus	45

分 布：棒太・朝鮮

國外：ウズリー・沿海洲

133. *Falco rusticolus candicans* Gmelin

シロハヤブサ

白 隼 (棒、禁) 第三十四圖 133.

Falco candicans Gmelin Syst. Nat. 1. L. P. 275. (1788—Greenland)

Hierofalco ualensis Sewertzoff & Menzbier in Menzbier Orn. Geogr. Europ. Russl. P. 288. Pl. III. (1882—Ural Mountains, in Russian)

Hierofalco Grebnitzkii Sewertzoff Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou. XV. Livr. 3. P. 69. & Pl. (1885—Bering Is.)

採集地：敷香 Ⅴ. 1930.・真岡

分 布：棒太・千島・北海道

國外：北極圏内に産す、グリーンランド・ラブランド・北極亞米利加・北極
歐洲・亞細亞北部・カムチャツカ・ベーリング島・英國・歐洲北西
部・加奈陀・合衆國

134. *Falco subbuteo subbuteo* Linnaeus

チゴハヤブサ

兒 隼 (棒、禁) 第三十四圖 134.

Falco Subbuteo Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 89. (1758—Sweden)

Falco saturatus Buturlin Journ. f. Orn. PP. 283. 287. 289. (1908—N. E. Siberia, nec Blyth)

Hypotriorchis subbuteo jakutensis Buturlin Nascha Ochota 4. 6. P. 71 (1910—N. E. Siberia)

採集地：海豹島 (中島)・榮濱 Ⅴ. 1930. (立花)・輪苺 Ⅴ. 1937.

分 布：棒太・千島・北海道・本州・四國・朝鮮

國外：歐洲・西比利亞・カムチャツカ・阿弗利加・印度西北部・支那

135. *Falco columbarius insignis* (Clark)

コチャウゲンボウ

小長元坊 (棒、禁) 第三十四圖 135.

Aesalon regulus insignis Clark Proc. U. S. Nat. Mus. XXXII. P. 470. (1907—Fusan, Korea)

Falco aesalon (nec Tunstall.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 50.

採集地：軍川 M. 1910. (村田)・海豹島 K. 1935. (中島)・知取 (吉倉)・蘭泊 V. 1937. (正田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡・四國・朝鮮
國外：亞細亞・土耳其・支那・ウズリー

Genus *Aquila* Brisson (1760) いぬわし屬136. *Aquila clanga fulvescens* Gray

カラフトワシ

樺太鷲 (棒、禁) 第三十四圖 136.

Aquila fulvescens Gray in Hardwicke's Ill. Ind. Zool. II. Pl. 29. (1833—34—Cawnpore)

採集地：樺太

分布：樺太・朝鮮

國外：中央亞細亞・北印度・滿洲・支那

Genus *Buteo* Lacépède (1799) のすり屬137. *Buteo buteo burmanicus* Hume

ノスリ

鷲 (棒、禁) 第三十五圖 137.

Circus plumipes Hodgson in Gray's Zool. Misc. P. 81. (1844—*nom nud*)

Falco buteo japonicus Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 16. (1844—Japan)

Buteo burmanicus Hume Strey Feath. III. P. 30. (1875—Thayetmyo, Upper Burma)

Buteo vulgaris (nec Leach) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 52.

Buteo japonicus toyoshimai Momiyama Annot. Orn. Orient. I. I. P. 73. (1927—Hashima, Bonin Is. in Japan)

採集地：軍川 X. 1910. (村田)・眞庭 V. 1928. (立花)・知取

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・大東列島・濟州島・奄美大島・臺灣
國外：東部西比利亞・滿洲・支那・緬甸・印度・セイロン島

Genus *Circus* Lacépède (1806) ちうひ屬*138. *Circus cyaneus cyaneus* (Linnaeus)

ハイロチウヒ

灰色澤鷲 (棒、禁) 第三十五圖 138. Pl. II. Fig. 4.

Falco cyaneus Linnaeus Syst. Nat. XII. ed. I. P. 126. (1766—Region of London)

Circus taissiae Buturlin Journ. f. Orn. P. 283. (1908—Yakutsk)

Circus cyaneus cernuus Thayer & Bangs. Proc. New Engl. Zool. Club. V. P. 32. (1914—Kolyma Rioer)

採集地：海豹島 X. 1935. (中島)

Measurements:—

sex	♀ad
Total length	490mm
Exposed culmen	25
Bill from nostril	15
Height of bill at nostril	13
Wing	392
Tail	254
Tarsus	72

分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・臺灣

國外：歐洲・西比利亞・北東阿弗利加・印度・支那

Genus *Accipiter* Brisson (1760) はいたか屬139. *Accipiter gentilis schvedowi* (Menzbier)

オホタカ

蒼鷹 (棒、禁) 第三十五圖 139.

Astur palumbarius schvedowi Menzbier Orn. Geogr. Eur. Russi in Mem. Sc. Univ-

ers. Imp. Moscou. Hist. Nat. P. 439. (1882—Transbaikalia)

Astur gentilia fujiyamae Swann & Hartert Bull. B. O. Club. XLIII. P. 170. (1923
—“Sagami-no-Kuni,” Japan-Ad. ♀)

採集地： 眞鍮 Ⅶ. 1928. (立花)・知取・落合

分布： 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・對馬・朝鮮・臺灣

國外： ウラル・オホツク海岸・滿洲・北支那・ヒマラヤ・印度・緬甸

140. *Accipiter virgatus gularis* (Temminck & Schlegel)

ツミ (♀)、エツサイ (♂)

雀鷂 (雌)、雀鷂 (雄) (標、禁) 第三十五圖 140.

Astur (Nisus) gularis Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon Aves. P. 5.
(1844) Pl. 2. (1845) (1844—Japan)

採集地： 小田原 IV. 1929. ♀. ♂. (立花)・眞鍮 Ⅶ. 1930.・大泊

分布： 樺太・千島・北海道・本州・硫黄列島・四國・九州・朝鮮・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣

國外： 東部西比利亞・滿洲・支那・海南島・馬來半島・スマトラ・ボルネオ・ジャバ・セレベス・印度

141. *Accipiter nisus nisosimilis* (Tickell)

ハイタカ (♀)、コノリ (♂)

鷯 (雌)、兄鷹 (雄) (標、禁) 第三十六圖 141.

Falco Nisosimilis Tickell Journ. As. Soc. Bengal. II. P. 571. (1833—Borabhum, India)

Accipiter nisus (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1910. P. 53.

採集地： 知取・西樺丹 Ⅷ. 1912. (村田)・貝塚・大泊・鈴谷河口 Ⅴ. 1906. (E. Linnberg)・池邊 Ⅹ. 1906. (E. Linnberg)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島

國外： 北部亞細亞・南支那・緬甸・印度・埃及

Genus *Haliaeetus* Savigny (1809) おじろわし屬

142. *Haliaeetus albicilla albicilla* (Linnaeus)

ヲジロワシ

尾白鷲 (標、獵) 第三十六圖 142.

Falco Albicilla Linnaeus Syst. Nat. X. ed. 1. P. 89. (1758—Sweden)

Haliaeetus brooksi Hume Ibis. P. 438. (1870—Upper India)

Haliaeetus hypoleucus Ridgway Proc. U. S. Nat. Mus. VI. P. 90. (1884—Bering Is.)

採集地： 豊原 1931. (新田)・貝塚 Ⅶ. 1910. (村田)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・臺灣

國外： アイスランド・歐洲・小亞細亞・亞細亞東北部・冬季 (南歐・地中海)・北阿弗利加

143. *Haliaeetus pelagicus pelagicus* (Pallas)

オホワシ

羌鷲 (標、獵) 第三十六圖 143.

Aquila pelagica Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. I. P. 343. and Pl. (1827—Islands between KAMTSCHATKA and AMERICA; Bering I.)

Falco leucopterus Temminck Pl. Col. Pl. 489. (1830—Japan)

採集地： 東白浦 Ⅶ. 1910. (村田)・有部 Ⅷ. 1912. (村田)・能登呂岬・知取・愛宕岬

分布： 樺太・千島・北海道・本州・四國・濟州島・朝鮮・奄美大島・琉球

國外： カムチャツカ・ベーリング・アムール・ウスリー・アラスカ

Family 24. PANDIONIDÆ 鷲科

Genus *Pandion* Savigny (1809) みさご屬

144. *Pandion haliaetus haliaetus* (Linnaeus)

ミサゴ

鷲 (標、獵) 第三十六圖 144.

Falco Haliaetus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. 1. P. 91. (1758—Sweden)

Pandion Haliaetus (nec (L.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 50.

採集地： 小龍登呂川 Ⅶ. 1910. (村田)・知取・海豹島 (中島)・新開 Ⅶ. 1929. 池邊

譜Ⅱ. 1906. (E. Ljunberg)

分 布 : 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・
對馬・朝鮮・種子ヶ島・奄美大島・琉球・臺灣
國外 : 歐洲・北阿弗利加・紅海・アラビヤ・カムチャツカ・支那・海南島・
印度・緬甸・比律賓・スンダ諸島・セレベス

Order 10. GRESSORES 鶴鷺目

Family 25. CICONIIDÆ 鶴科

Genus *Ciconia* Brisson (1760) こふのとりに屬

145. *Ciconia nigra* (Linnaeus)

ナベカフ

鍋 鶴 (樺、禁) 第三十七圖 145.

Ardea nigra Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 142. (1758—N. Europe)

Melanopelargus niger (L.) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地 : 榮濱 (山本)

分 布 : 樺太・本州・朝鮮・種子ヶ島・琉球・臺灣

國外 : 歐洲・亞細亞・南阿弗利加

146. *Ciconia boyciana* Swinhoe

カフノトリ

鶴 (樺、禁) 第三十七圖 146. Pl. III. Fig. 5.

Ciconia boyciana Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 513. (1873—Yokohama)

Ciconia ciconia boyciana Swinhoe Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地 : 蘭泊村羽母舞川口 20/Ⅱ. 1936. (正田愛州)

Measurements :—

Sex	♂
Exposed culmen	190mm
Bill from nostril	162
Height of bill at nostril	37
Wing	620
Tail	236

Tarsus 224

Claw from middle toe third toe 100

黒田博士の測定に據る。

十串附近に旬春渡來す。

分 布 : 樺太・北海道・本州・四國・對馬・朝鮮・臺灣

國外 : ウスリヤ・アムール・蒙古・滿洲・支那

Family 26. ARDEIDÆ 鷺科

Genus *Ardea* Linnaeus あそさぎ屬

147. *Ardea cinerea rectirostris* Gould

アヲサギ

蒼 鷺 (樺、禁) 第三十七圖 147.

Ardea rectirostris Gould Proc. Zool. Soc. London P. 22. (1843—"New South Wales"
error for. India)

Ardea cinerea jousi Clark Proc. U. S. Nat. Mus. XXXII. P. 468. (1907—Seoul K-
orea)

採集地 : 榮濱 (山本)

分 布 : 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・濟州島・四國・九州・

對馬・朝鮮・大東列島・硫黄列島・奄美大島・琉球・臺灣

國外 : 東部西比利亞・滿洲・支那・海南島・ニウギニア

*148. *Ardea purpurea ussuriana* (Shulpin)

(樺、禁) 第三十七圖 148. Pl. III. Fig. 6.

Phox purpurea ussuriana Shulpin Annuaire Muz, Zool. l' Acad. Sci. l' URSS. P. 399.
(Chanka-See Sud-Ussuri Land)

採集地 : 知取町宇北遠古丹小沼 V. 1936. (山本繁作)

Measurements :—

Exposed culmen	115mm
Entire culmen	130
Bill from nostril	90
Height of bill at nostril	22
Tail	116
Tarsus	140

Claw from middle toe third toe 127

分 布： 樺太
 国外： ウツスリー

Genus *Egretta* Forster (1817) こさき属*149. *Egretta intermedia intermedia* (Wagler)

チウサギ

中 鷺 (樺、禁) 第三十八圖 149. Pl. IV. Fig. 7.

Ardea intermedia Wagler Isis. VI. Col. 659. ex Hasselt MS. (1829—Java)

採集地： 眞岡・泊居・内幌・多來加・野田・蘭泊・床丹沼 M. 1937. (正田)

Measurements:—

Sex	♂ ad. a.	♂ ad. b.
Exposed culmen	76mm	76.5mm
Bill from nostril	63	64
Height of bill at nostril	17	17
Wing	303	313
Tail	125	126
Tarsus	117	118
Chest of straw Coat feathers (greatest long) (Reproductin feathers)	222	192
♯ (number)	31	28
Straw coat feathers (greatest long) (Reproductin feathers)	381	408
♯ (number)	18	21
Tail of point from straw coat of long	176	181
Claw from middle toe third toe	96	95

分 布： 樺太・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・九州・朝鮮・臺灣
 国外： 印度・セイロン・支那・馬來半島・スンダ諸島・比律賓

Genus *Nycticorax* Forster (1817) ごおさき属*150. *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Linnaeus)

コキサギ

五位鷺 (樺、禁) 第三十八圖 150. Pl. IV. Fig. 8.

Ardea Nycticorax Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 142. (1758—Habitat in Europa australi)

採集地： 龍泊村・富内岸 7/Ⅷ. 1937. (正田愛州)

Measurements:—

Sex	♂ ad.
Total length	314mm
Exposed culmen	75
Bill from nostril	62
Height of bill at nostril	21
Crown feathers of greatest long	145.5
♯ number	3
Wing	280
Tail	111
Tarsus	71
Claw from middle toe third toe	73

分 布： 樺太・北海道・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・濟州島・朝鮮・蔚陵島・奄美大島・琉球・臺灣
 国外： 歐洲・阿弗利加・亞細亞・比律賓・スンダ諸島

Genus *Gorsakius* Gray (1855) みぞごみ属*151. *Gorsakius goisagi* (Temminck)

ミソゴキ

溝五位 (樺、禁) 第三十八圖 151. Pl. V. Fig. 9.

Nycticorax Goisagi Temminck Pl. Col. Pl. 582. (1835—Japan)*Gorsakius goisagi* (Temminck) Hand-List Birds (1922)

採集地： 海馬島 1935. (森本)・桑小舞 15/Ⅷ. 1937. (正田)

Measurements:—

Totally length	347mm
Exposed culmen	39
Bill from nostril	28
Height of bill at nostril	14
Wing	266
Tail	120
Tarsus	52

分 布： 樺太・本州・伊豆七島・硫黄列島・四國・九州・對馬・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・喜界ヶ島・琉球・臺灣
 国外： 東部支那・比律賓

Genus *Ixobrychus* Billberg (1828) おほよしごみ属

*152. *Ixobrychus eurhythmus* (Swinhoe)

オホヨシゴキ

大葭五位 (樟、禁) 第三十八圖 152. Pl. V. Fig. 10.

Ardeia eurhythma Swinhoe Ibis. P. 74. Pl. 2. (1873—Aomiyō and Shanghai)*Nannocnus eurhythmus* (Swinhoe) Hand List Japanese Birds (1922)採集地：落合町黒川 Ⅷ. 1926. 早. (鹽俊吉)・多來加・蘭泊末丹沼 早. Ⅷ. 1936. 早.
Ⅷ. 1936. (正田)・海馬島(森本)

Measurements:—

Sex	♀ad	♂ad
Totally length	257mm	256mm
Exposed culmen	47	49
Bill from at nostril	39	40
Wing	139	138
Tail	46	43
Tarsus	43	40

分 布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・對馬・朝鮮・琉球・大東列島・臺灣
國外：東南西比利亞・支那・比律賓・馬來半島・スンダ諸島・セレベス153. *Ixobrychus sinensis sinensis* (Gmelin)

ヨシゴキ

葭 五 位 (樟、禁) 第三十九圖 153.

Ardea Sinensis Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 642. (1789—"Habitat in Sina")*Ardea luteola* Stejneger Proc. U. S. Nat. Mus. X. PP. 289. 290. (1837—Yezo. and
Hond)

採集地：多來加

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・奄
美大島・沖ノ長良部島・屋久島・琉球・臺灣・紅頭嶼Genus *Botaurus* Stephens (1819) さんかのごみ屬*154. *Botaurus stellaris stellaris* (Linnaeus)

サンカノゴキ

山 家 五 位 (樟、禁) 第三十九圖 154. Pl. VI. Fig. 11.

Ardea stellaris Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 144. (1754—Sweden)*Botaurus stellaris orientalis* Buturlin Nascha Okhota Heft. 9. 11. (1908—Inkou in
Manchuria, Olekminsk in Lenatal in Russian)採集地：貝塚 Ⅷ. 1933. (井上通靜)・新場・(中ノ川) X. 1935.・蘭泊・床丹沼 K. 193
3. (正田)

Measurements:—

Exposed culmen	63mm
Bill from of nostril	47
Wing	353
Tail	70
Tarsus	97

分 布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・臺灣・琉球
國外：歐洲・亞細亞・阿弗利加・印度・緬甸

Order 11. ANSERES 雁鴨目

Family 27. ANATIDÆ 雁鴨科

Genus *Cygnus* Bechstein (1803) はくてう屬155. *Cygnus cygnus* (Linnaeus)

オホハクテウ

大 鵞 (樟、禁) 第三十九圖 155.

Anas Cygnus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 122. (1758—Sweden)*Cygnus cygnus latouchei* Courtois China. J. Sci. Art. Shanghai. III. P. 23. (1925—
China)

採集地：鈴谷河口・白鳥湖・來知志湖

分 布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡・小笠原列島・四國・九州・朝鮮
國外：アイスランド・グーンランド・歐洲北部・亞細亞北部・北部阿弗利
加・中央亞細亞・印度156. *Cygnus bewickii jankowskii* Alphéraky

ハクテウ

鵞 (樟、禁) 第三十九圖 156.

Cygnus bewickii jankowskii Alphéraky Prirodai Okhota (Nature and Sport) P. 10.
(1904—Ussuri)

採集地：鈴谷河口・白鳥湖・來知志湖
分布：樺太・千島・北海道・本州・硫黄列島・朝鮮・濟州島・臺灣

Genus *Cygnopsis* Brandt (1836) さかづうがん屬

157. *Cygnopsis cygnoid* (Linnaeus)

サカツラガン

酒面雁 (樺、羆) 第四十圖 157.

Anas Cygnoid Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 122. (1758—Habitat in Asia)

採集地：眞岡
分布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮・臺灣
國外：カムチャツカ・コンマンダー諸島・コブド・アルタイ・蒙古・滿洲・支那

Genus *Anser* Brisson (1760) まがん屬

*158. *Anser albifrons* (Scopoli)

マガン

眞雁 (樺、羆) 第四十圖 158. Pl. VI. Fig. 12.

Branta albifrons Scopoli Annus L. Histor. Nat. P. 69. (1769—no localpart "Vermüthlich aus Norditalien")

採集地：留多加 (東谷)

Measurements:—

Sex	♂ad
Total length	534mm
Exposed culmen	37
Bill from nostril	20
Width of bill at nostril	18
Wing	397
Tail	107
Tarsus	56

分布：樺太・千島・北海道・本州・硫黄列島・四國・九州・濟州島・臺灣
國外：歐洲・亞細亞・北米の北部・阿弗利加・

*159. *Anser erythropus* (Linnaeus)

カリガネ

雁 (樺、禁) 第四十圖 159. Pl. VII. Fig. 13.

Anas erythropus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 123. (1758—N. Europe)

採集地：鈴谷河口 (境)

Measurements:—

Sex	♂ad
Total length	492mm
Exposed culmen	36
Bill from nostril	21
Width of bill at nostril	15
Wing	360
Tail	103
Tarsus	54

分布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮・臺灣
國外：北部歐洲・亞細亞北部・南歐・北阿弗利加・中央亞細亞・西北印度・支那

160. *Anser fabalis serratirostris* Swinhoe

ヒシクヒ

菱喰 (樺、禁) 第四十圖 160.

Anser segetum var. *serratirostris* Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 417. (1871—Amoy, China)

Anser mentalis Oates Man. Game-B. India II. P. 77. (1899—Yokohama-athick-billed variety)

? *Melanonyx segetum anadyrensis* Buturlin Nascha Ochota Heft XI. Nov. P. 21.—28. (1908—Anadyr in Russian)

Melanonyx segetum crassirostris Kuroda "Science" (Published by Shimadzu Factory, Japan) III. no. 5. P. 219. (May. 10. 1913)

Melanonyx fabalis mentalis (Oates) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：榮蕨

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・朝鮮・九州・臺灣
國外：東部西比利亞・滿洲・支那

161. *Anser fabalis sibiricus* (Alphéraky)

オホヒシクヒ

大菱喰 (棒、禁) 第四十一圖 161.

Anser grandis Authors; nec *Anas grandis* Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 504. (1774)*Anser middendorffii* Sewertzow Turkest. Jevotn PP. 70. 149. (1873—Partim ? in Russian)*Melanonyx arvensis sibiricus* Alphéraky Geese Europe and Asia P. 140. Pl. 10. & 23. (1905—Taimyr Peninsula, Siberia)

採集地：榮濱 VI. 1928. (立花)・知取

分 布：樺太・北海道・朝鮮・本州

國外：東部西比利亞・滿洲・支那

Genus *Branta* Scopoli (1769) こくがん屬162. *Branta bernicla nigricans* (Lawrence)

コクガン

黒雁 (棒、獵) 第四十一圖 162.

Anser nigricans Lawrence Ann. Lyc. Nat. Hist. New York IV. P. 171. Pl. XII. (1846—New Jersey)

採集地：榮濱 VII. 1929. (立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮

國外：北極亞米利加西部・ベーリング海峡・レナ・カリフォルニア・太平洋沿岸・亞細亞

Genus *Anas* Linnaeus (1758) まかも屬163. *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Linnaeus)

マガモ

鳧、縁頭鴨(雄)、大麻鴨(雌) (棒、獵) 第四十一圖 163.

Anas platyrhynchos Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 125. (1758—Sweden-♀)*Anas boschas* Linnaeus t. c. P. 127. (1758—Sweden-♂)

採集地：鈴谷河口・榮濱 VII. 1928. (立花)・富内湖 VI. 1910. (村田)・知取・多來加・

小田井(立花)・豊原

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・馬毛島・大東列島・奄美大島・琉球
國外：アゾレス・北阿弗利加・カシミア・北米・印度・パナマ164. *Anas poecilorhynchos zonorhynchos* Swinhoe

カルガモ

輕鴨 (棒、獵) 第四十一圖 164.

Anas zonorhynchos Swinhoe Ibis P. 394. (1866—Ningpo)*Polionetta poecilorhynchos zonorhynchos* (Swinhoe) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：榮濱 VI. 1910. (村田)・VI. 1928. (立花)・鈴谷河口 17/V. 1906 (Nikolski)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・佐渡・隱岐・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・喜界ヶ島・琉球・臺灣

國外：東部西比利亞・蒙古・滿洲・北支那・廣東地方

165. *Anas strepera* Linnaeus

ヲカヨシガモ

漆鳧 (棒、獵) 第四十二圖 165.

Anas strepera Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 125. (1758—Sweden)*Chaulelasmus streperus* (L.) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：鈴谷河畔 1934. (山田)・敷香郡西多來加 K. 1936. (山本)

Measurements:—

Sex	♂ ad
Total length	500mm
Exposed culmen	42
Bill from nostril	35
Width of bill at nostril	16
Wing	264
Tail	93
Tarsus	40

分 布：樺太・北海道・本州・四國・朝鮮

國外：新舊兩世界中北部の廣範圍に亘る。

Genus *Querquedula* Stephens (1824) しまあじ屬

166. *Querquedula crecca crecca* (Linnaeus)

コガモ

小 鳧 (棒、禁) 第四十二圖 166.

Anas Crecca Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 125. (Sweden)

採集地：古丹 K. 1912. (村田)・知取・鈴谷河口・榮濱・富内湖・内淵(立花)・豊香(立花)・鈴谷川口 V. 1906. (E. Linnberg)・池邊沢 X. 1906. (E. Linnberg)・海馬島(森本)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・奄美大島・琉球・大東列島・臺灣
國外：歐洲・亞細亞中北部・東阿弗利加・セイロン島・北米167. *Querquedula formosa* (Georgi)

トモエガモ

巴 鴨 (棒、獵) 第四十二圖 167

Anas formosa Georgi Reise Russ. Reichs P. 168. (1775—Lake Baikal)*Nettion formosum* (Georgi) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：貝塚・多來加

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・臺灣
國外：東部西比利亞・支那・印度168. *Querquedula querquedula* (Linnaeus)

シマアチ

縞 鴨 (棒、禁) 第四十二圖 168.

Anas Querquedula Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 126. (1758—Sweden)*Anas Cereia* Linnaeus op. cit. XII. ed. I. P. 204. (1766—Europa)

採集地：海豹島 K. 1935. (中島)・西多來加 K. 1936. (山本)

分布：樺太・本州・四國・九州・朝鮮・琉球・臺灣
國外：歐洲・亞細亞・北阿弗利加・呱哇・セレベス島169. *Querquedula falcata* (Georgi)

ヨシガモ

葎 鳧 (棒、獵) 第四十三圖 169.

Anas falcata Georgi Reise Russ. Reichs I. P. 167. (1775—Asiatic Russia)

採集地：富内湖 V. 1910. (村田)・知取・榮濱・海馬島(森本)・大泊

分布：樺太・北海道・千島・本州・四國・九州・朝鮮・濟州島・臺灣

國外：中・東部西比利亞・支那・緬甸・印度

Genus *Mareca* Stephens (1824) ひどりがも屬170. *Mareca penelope* (Linnaeus)

ヒドリガモ

緋 鳥 鴨 (棒、獵) 第四十三圖 180.

Anas Penelope Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 126. (1758—Sweden)

採集地：新間 M. 1929. (立花)・知取

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黃列島・四國・九州・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・琉球・臺灣

國外：歐洲・亞細亞中北部・北阿弗利加・印度・緬甸・南支那・北米

Genus *Dafila* Stephens (1824) をながかも屬171. *Dafila acuta acuta* (Linnaeus)

ヲナガガモ

尾 長 鴨 (棒、獵) 第四十三圖 171.

Anas acuta Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 126. (1758—Sweden)

採集地：眞鏡 M. 1930. (立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・琉球・臺灣

國外：歐洲・中北部亞細亞・北阿弗利加・印度・セイロン島・支那・比律賓

Genus *Spatula* Boie (1822) はしひろかも屬172. *Spatula clypeata* (Linnaeus)

ハシビロガモ

嘴 廣 鴨 (棒、獵) 第四十三圖 172.



Anas clypeata Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 124. (1758—South Sweden)

Spatula clypeata indiana Mathews Austral. Av. Rec. I. P. 194. (1913—India)

採集地：新開 K. 1935. (鹽谷)・大泊・知取町字北遠古丹・小沼 V. 1935. (山本)
 分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・南大東島・琉球・臺灣
 國外：新舊兩世界に廣く亘る (阿弗利加・印度・支那・ホルネツ島・メキシコ)

Genus *Aix* Boix (1828) をしどり屬

173. *Aix galericulata* (Linnaeus)

ヲシドリ

鴛 鴦 (樺、禁) 第四十四圖 173.

Anas galericulata Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 128. (1758—China)

Anas Asitori Gray List. B. Brit. Mus. IV. P. 133. (1844—ex Temminck's Ms. ?)

Aix galericulata brunescens Clark Proc. Biol. Soc. Washington XXVII. P. 87. (1914—Kyushu, Japan and Shanghai)

採集地：本斗 X. 1934.・貝塚 X. 1930. (岡田)・清水 (加藤)
 分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・奄美大島・琉球・臺灣
 國外：東部西比利亞・滿洲・支那・アサム

Genus *Nyroca* Fleming (1822) はじろ屬

*174. *Nyroca ferina ferina* (Linnaeus)

ホシハジロ

星 羽 白 (樺、禁) 第四十四圖 174. Pl. VII. Fig. 14.

Anas ferina Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 126. (1758—Sweden)

Nyroca ferina ferinoides Kuroda "Dôbutsu, Zasshi" XXXII. PP. 243. 245. (1920—Haneda near Tokyo)

採集地：貝塚 IV. 1935.
 Measurements:—
 Sex ♂ ad
 Totaly length 346mm

Exposed culmen	48
Bill from nostril	31
Width of bill at nostril	29
Wing	209
Tail	52
Tarsus	29

分布：樺太・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・臺灣
 國外：歐洲・亞細亞中部・阿弗利加・印度・支那

175. *Nyroca fuligula* (Linnaeus)

キンクロハジロ

金 黒 羽 白 (樺、禁) 第四十四圖 175.

Anas fuligula Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 128. (1766—Sweden)

採集地：榮濱・貝塚 K. 1935.・知取
 分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・九州・朝鮮・屋久島・琉球・臺灣・マリアナ諸島・カロリン諸島・バラウ諸島
 國外：歐洲・亞細亞中北部・北阿弗利加・印度・比律賓

176. *Nyroca marila mariloides* (Vigors)

スズガモ

鈴 鴨 (樺、禁) 第四十四圖 176.

Fuligula mariloides Vigors Zool. Beechey's. Voy. Blossom P. 31. (1839—Northern Pacific Ocean)

Marila marila mariloides (Vigors) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：貝塚 K. 1935.・榮濱 (立花)
 分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・琉球・臺灣
 國外：東部西比利亞・支那

Genus *Bucephala* Baird (1860) ほほじろがも屬

177. *Bucephala clangula clangula* (Linnaeus)

ホホジロガモ

頬 白 鴨 (樺、獵) 第四十五圖 177.

Anas Clangula Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 125. (1758—Sweden)

Anas Glaucion Linnaeus t. e. P. 126. (1758—Sweden ♀)

採集地：貝塚 X. 1934.

分 布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・臺灣
國外：歐洲・亞細亞中北部・北阿弗利加・北印度・支那・北米

Genus *Clangula* Leach (1819) こほりがも屬

178. *Clangula hyemalis* (Linnaeus)

コホリガモ

氷 鴨 (樺、鴈) 第四十五圖 178.

Anas hyemalis Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 126. (1758—North Sweden)

Anas glacialis Linnaeus op. cit. XII. ed. I. P. 203. (1766—"Habitat in insula terrae novae")

採集地：榮濱・貝塚 X. 1934.・知取・敷香(立花)・大泊

分 布：樺太・千島・北海道・朝鮮

Genus *Melanitta* Boie (1822) びろうどきんくろ屬

179. *Melanitta fusca stejnegeri* (Ridgway)

ビロウドキンクロ

天鵝絨金黒 (樺、鴈) 第四十五圖 179.

Oidemia stejnegeri Ridgway Man. N. Amer. B. P. 112. (1887—"Kamtschatka to Japan")

採集地：知取・海馬島・新間・榮濱(立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮

國外：東部西比利亞・蒙古・滿洲・支那

180. *Melanitta nigra americana* (Swainson)

クロガモ

黒 鴨 (樺、鴈) 第四十五圖 180.

Oidemia Americana Swainson in Swainson & Richardson Fauna Bor. Amer. II. P.

450. (1832—Hudson Bay)

採集地：眞鏡 X. 1928. (立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・岐陸・四國・朝鮮

國外：アラスカ西部・東西北比利亞・北米太西太平洋沿岸・亞細亞

Genus *Histrionicus* Lesson (1828) しのりがも屬

181. *Histrionicus histrionicus pacificus* Brooks

シノリガモ、オキノケンチャウ

曇 鳧 (樺、鴈) 第四十六圖 181.

Histrionicus histrionicus pacificus Brooks Bull. Mus. Comp. Zoöl. Harvard College LIX. P. 393. (1915—Kamtschatka)

Anas histrioniceus (nec Linnaeus) Murata Karafuta Dōbutu Hōkoku 1914. P. 54.

採集地：眞鏡 X. 1934.・知取・近視 VII. 1912. (村田)・北名好 K. 1912. 村田・北知

床半島兩海岸・池邊設 K. 1906. (E. Linnberg)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・九州・朝鮮・濟州島

國外：北米兩岸・東部西比利亞・滿洲・北支那

Genus *Somateria* Leach (1819) けわたがも屬

182. *Somateria spectabilis* (Linnaeus)

ケワタガモ

毛 綿 鴨 (樺、鴈) 第四十六圖 182.

Anas spectabilis Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 123. (1758—"Habitat in Canada, Svecia")

Erionetta spectabilis (L.) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：羽母舞 1933. (小笠原)

分 布：樺太・千島

國外：新舊兩世界北極地方

Genus *Mergellus* Selby (1840) みこあいさ屬

183. *Mergellus albellus* (Linnaeus)

ミコアイサ

美子秋沙 (樟、蠟) 第四十六圖 183.

Mergus Albellus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 129. (1758—near Smyrna, Mediterranean Sea)

採集地: 貝塚 IV. 1935. (岡田)・貝塚 X. 1928. (立花)

分布: 樺太・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・濟州島

國外: 歐洲・亞細亞中北部・北阿弗利加

Genus *Mergus* Linnaeus (1758) あいさ屬184. *Mergus Serrator* Linnaeus

ウミアイサ

海秋沙 (樟、蠟) 第四十六圖 184.

Mergus Serrator Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 129. (1758—Sweden)

採集地: 眞岡・宗仁 III. 1937. (舟木)・大泊 (立花)・本斗

分布: 樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・四國・對馬・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣

國外: 歐洲・米國・亞細亞中北部・北阿弗利加

185. *Mergus merganser merganser* Linnaeus

カハアイサ

川秋沙 (樟、蠟) 第四十七圖 185.

Mergus Merganser Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 129. (1758—Sweden)*Mergus merganser orientalis* (nec Gould) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地: 榮濱 K. 1930.・知取・北名好 K. 1912. (村田)

分布: 樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・濟州島

國外: 西歐・カムチャツカ・南支那

Order 12. STEGANOPODES 全蹠目

Family 28. PHALACROCORACIDÆ 鷗鷺科

Genus *Phalacrocorax* Brisson (1760) うみう屬186. *Phalacrocorax carbo hanedae* Kuroda

カハウ

河鵜 (樟、蠟) 第四十七圖 186.

Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda "Tori" IV. No. 20, PP. 340, 348, Pl. Pl. VII. (1925—Haneda between Tokyo and Yokohama)*Phalacrocorax carbo* (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 53.*Phalacrocorax carbo* [(?) *Sinensis*] (nec Shaw & Nodder) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地: 留多加 1935.・近幌 1910. (村田)・小田寒 VII. 1935.

分布: 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・濟州島・臺灣

187. *Phalacrocorax pelagicus pelagicus* Pallas

ヒメウ、ウガラス

姫鵜、鵜鳥 (樟、蠟) 第四十七圖 187.

Phalacrocorax pelagicus Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 303. (1827—Eastern Kamtschatka and Aleutian Is.)

採集地: 知取 (吉倉)・近幌 VII. 1910. (村田)・海豹島・海馬島

分布: 樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮・濟州島・北部臺灣

國外: カムチャツカ・コンマンダー諸島・アリューシャン諸島・アラスカ

Order 13. TUBINARES 管鼻目

Family 29. PROCELLARIIDÆ 海燕科

Genus *Oceanodroma* Reichenbach (1852) うみつばめ屬*188. *Oceanodroma furcata* (Gmelin)

ハイロウミツバメ

灰色海燕 (樟、蠟) 第四十七圖 188. Pl. VIII. Fig. 15.

Procellaria furcata Gmelin Syst. Nat. I. 2. P. 561. (1788—"Habitat in glacie maris

American et Asian interfluentis")

Procellaria orientalis Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 315. (1827—Kuriles and near Unalaska)

採集地：眞岡(小笠原)

Measurements:—

Sex	
Totally length	203mm
Exposed culmen	15
Bill from nostril	10
Height of bill at nostril	5.5
Wing	156
Tail	100
Tarsus	25

分 布：樺太・千島・北海道・本州・硫黄列島・南鳥島

國 外：コンマンダー諸島・アリューシャン諸島・南アラスカ沿岸・北米合衆国沿岸

Family 30. PUFFINIDÆ 水風鳥科

Genus *Puffinus* Brisson (1760) みづなきどり属

189. *Puffinus leucomelas* (Temminck)

オホミツナキドリ

大水風鳥 (標、禁) 第四十八圖 189.

Procellaria leucomelas Temminck Pl. Col. Pl. 587. Livr. 99c (1835—"Les mers du Japon")

採集地：樺太?

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・鬱陵島・硫黄列島・馬毛ノ島・種子ヶ島・沖之長良部島・琉球・臺灣・澎湖列島

190. *Puffinus tenuirostris* (Temminck)

ハシボロミツナキドリ

嘴細水風鳥 (標、禁) 第四十八圖 190.

Procellaria tenuirostris Temminck Pl. Col. text to Pl. 587. (1835—Japanese Seas)

採集地：池邊巖 V. 1906. (E. Lönnberg)

分 布：樺太・千島・津輕海峡・本州・小笠原列島・九州・朝鮮
國 外：マスマニア・東南濠洲・東部西比利亞沿岸・ベーリング海峡

Genus *Fulmarus* Stephens (1826) ふるまかもめ属

191. *Fulmarus glacialis rogersii* Cassin

フルマカモメ

管 鼻 鰻 (標、禁) 第四十八圖 191.

Fulmarus Rogersii Cassin Proc. Acad. Philadelphia P. 326. (1862—"South India Ocean" in error. Type from North Pycific Ocean Or Ice Sea)

Fulmarus glacialis glapishca Stejneger Auk. I P. 234. (1884—Commander Is.)

Fulmarus glacialis (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. Pl. VIII.

Fig. 1.

採集地：海馬島 X. 1910. (村田)・海豹島・蘭泊 (正田)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島

國 外：ベーリング海諸島・コンマンダー諸島・カムチャツカ・北米

Order 14. PYGODES 阿比目

Family 31. PODICIPIDÆ 鷺鷥科

Genus *Podiceps* Latham (1787) かいつぶり属

192. *Podiceps griseigena holboellii* Reinhardt

アカエリカイツブリ

冠 鷺 鷥 (標、禁) 第四十八圖 192.

Podiceps rubricollis major Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon Aves P. 122. Pl. 78. B. (1849—Japan) (nec *Colymbus major* Boddaert 1783)

Podiceps Holboellii Reinhardt Videnskab. Meddelelser P. 76. (1853—Greenland)

採集地：眞徒 V. 1934.・敷香 VI. 1928.・馬群潭川 K. 1935. (山本)・多來加 VII. 1912. (村田)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮

國 外：東部西比利亞・北米・支那

193. *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm

ハジロカイツブリ

羽白鷺鷥 (樟、禁) 第四十九圖 193.

Podiceps nigricollis Brehm Handb. Naturg. Vög. Deutschl. P. 963. (1831—Eastern Germany)*Otodytes nigricollis nigricollis* (Brehm) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：樟太

分布：樟太・北海道・本州・九州・朝鮮・濟州島・琉球

國外：歐洲・亞細亞

Family 32. COLYMBIDÆ 阿比科

Genus *Colymbus* Linnaeus (1758) あび屬194. *Colymbus arcticus veridigularis* (Dwight)

オホハム

大波武 (樟、禁) 第四十九圖 194.

Gavia viridigularis Dwight Auk P. 189. (1819—North-east Siberia)

採集地：貝塚・大泊・海馬島・北知床半島沿岸

分布：樟太・千島・北海道・本州・四國・九州

國外：西部アラスカ・カスリ河・滿洲・支那沿岸

195. *Colymbus arcticus pacificus* Lawrence

シロエリオホハム

白襟大波武 (樟、禁) 第四十九圖 195.

Colymbus pacificus Lawrence in Baird's B. N. Amer. P. 889. (1860—California)

採集地：大泊 Ⅷ. 1935.

分布：樟太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮

國外：北米・カスリ

196. *Colymbus stellatus* Pontoppidan

アビ

阿比 (樟、禁) 第四十九圖 196.

Colymbus stellatus Pontoppidan Danske Atlas I. P. 621. (1763—Denmark)

採集地：貝塚 X. 1934. 知取

分布：樟太・千島・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・臺灣

國外：歐洲・亞細亞・北米・地中海・黑海・カスピア海

Order 15. COLUMBÆ 鳩目

Family 33. COLUMBIDÆ 鳩科

Genus *Streptopelia* Bonaparte (1854) きじばと屬197. *Streptopelia orientalis orientalis* (Latham)

キジバト

雉鳩 (樟、獵) 第五十圖 197.

Columba orientalis Latham Ind. Orn. II. P. 606. (1790—China) (ex Sonnerat. 1782)*Columba gelastis* Temminck Pl. Col. Pl. 550. (1835—Japan)*Columba* (*Peristera*) *Turtur* L. Var. *gelastis* (nec Temminck) Scbreneck Reis. Forsch. Amurl. 1860. PP. 389. 392. (Eastern Siberia including Sakhalin) Part.*Turtur orientalis* (nec Latham) Nikolski Sapiski Sapiski Imp. Acad. Nauk. Sankt Peterb. 1889. P. 244. (Sakhalin)*Streptopelia orientalis orientalis* (nec Latham) Uchida Bds. Jap. ed. III. 1. 1922. PP. 363. 364. Pl. XVIII. fig. 6. (Sakhalin to Formosa and Korea excluding Loo-Choo Isis) Part.

採集地：川上 Ⅷ. 1935. 内淵・小田実・眞經・留多加・知取 (立花)・馬群潭・久春内・逢坂・池邊 Ⅵ. Ⅶ. Ⅷ. (E. Linnberg)・貝塚

分布：樟太・千島・北海道・本州・佐渡・伊豆七島・小笠原列島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣・紅頭嶼

國外：中南部西比利亞・支那・蒙古・緬甸・アサム北部・歐洲

Order 16. LIMICOLÆ 鷓目

Family 34. SCOLOPACIDÆ 鷓科

Genus *Lobipes* Cuvier (1817) あかえりひれあししぎ属

198. *Lobipes lobatus* (Linnaeus)

アカエリヒレアシシギ

赤襟鱧足鷗 (樟、蠟) 第五十圖 198.

Tringa tobata (Misprint for *lobata*) Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 148. (1758—Hudson Bay)

Tringa hyperboreus id. op. cit. XII. ed. I. P. 249. (1766—Hudson Bay—summer Plumage)

Phalaropus hyperboreus (nec (L.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 68.

採集地：榮濱(立花)・敷香 Ⅷ. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・朝鮮・琉球・臺灣

国外：歐洲・東部西比利亞・北米・地中海・アゾレス・印度・支那・セレベス・モラツカス・ニウギア・ペリヌー・パタゴニア・ハワイ

Genus *Tringa* Linnaeus (1758) くさしぎ属

199. *Tring ochropus* Linnaeus

クサシギ

草鷗 (樟、蠟) 第五十圖 199.

Tringa Ochropus (sic) Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 149. (1758—Sweden)

Tringa ochropus Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 676. (1789—Correct spelling)

Tringa ochropus assami Mathews Austr. Av. Rec. I. P. 188. (1913—Assam)

採集地：知取

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・硫黄列島・朝鮮・種子ヶ島・琉球・臺灣

国外：北歐・北部亞細亞・地中海・アフリカ・セイロン・アンダマン群島・海南島・比律賓

200. *Tringa glareola* Linnaeus

タカブシギ

鷹斑鷗 (樟、蠟) 第五十圖 200.

Tringa Glareola Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 149. (1758—Sweden)

Totanus affinis Horsfield Trans. Linn. Soc. London XIII. P. 191. (1821—Java)

採集地：貝塚 Ⅷ. 1928.・知取・大泊

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・奄美大島・喜界ヶ島・徳之島・琉球・臺灣・メラウ

国外：歐洲・アフリカ・印度・セイロン・南支那・モラツカス・ハワイ群島・濠洲

201. *Tringa incana brevipes* (Vieillot)

キアシシギ

黄足鷗 (樟、蠟) 第五十一圖 201.

Totanus brevipes Vieillot Nouv. Dict. d' Hist. Nat. (nouv. ed) VI. P. 410. (1816—1851) no locality=Timor (Pucheran)

Totanus incanus (nec (Gm.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 70.

採集地：貝塚 Ⅷ. 1928.・榮濱・知取・内淵(立村)・知取(立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・對馬・朝鮮・奄美大島・喜界ヶ島・徳之島・琉球・臺灣

国外：東部西比利亞・支那・馬來群島・比律賓・セレベス・ニウギア・濠洲

202. *Tringa hypoleucos* Linnaeus

イロシギ

磯鷗 (樟、蠟) 第五十一圖 202.

Tringa Hypoleucos Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 149. (1758—Sweden)

採集地：追手 Ⅷ. 1910. (村田)・榮濱 Ⅷ. 1912. (村田)・西樺丹 K. 1912. (村田)・知取・野頃 K. 1912. (村田)・内淵(立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・愛媛・對馬・濟州島・朝鮮・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・喜界ヶ島・琉球・臺灣・紅頭嶼

国外：歐洲・北アフリカ・亞細亞(南支那・印度・セイロン) 埃及・比律賓・馬來半島・濠洲

203. *Tringa erythropus* (Pallas)

ツルシギ

鶴 鷗 (棒、獵) 第五十一圖 203.

Scelopax erythropus Pallas in Vroeg's Cat. Adumbratiuncula P. 6. (1764--Hollaod)*Scelopax fusca* Linnaeus Syst. Nat. XII. ed. I. P. 243. (1766) (nec *Scelopax fusca* Linnaeus. 1758)*Totanus fusca* (nec (L.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 69.

採集地：貝塚 Ⅷ. 1928. K. 1935. (立花)・馬群潭 Ⅷ. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・對馬・朝鮮・ラサ島
國外：北歐・西部・東部西比利亞・中央亞細亞・阿弗利加・セイロン204. *Tringa totanus eurhinus* (Oberholser)

アカアシシギ

赤 足 鷗 (棒、獵) 第五十一圖 204.

Totanus totanus eurhinus Oberholser Proc. U. S. Nat. Mus. XXII. P. 207. (1900—Ladak, Central Asia)*Tringa totanus terrignotae* Col. & Mrs. Meinertzhagen Bull. B. O. Club XLVI. P. 85. (1926—♀ Kuku Nor (April))

採集地：榮濱・知取

分布：樺太・本州・朝鮮・臺灣

國外：西比利亞・中央亞細亞・セイロン・アンダマン・馬來半島・南支那・比律賓・スンダ諸島・セレベス

Genus *Glottis* Koch (1816) あをあししぎ屬205. *Glottis stagnatilis* (Bechstein)

コアラアシシギ

小 春 足 鷗 (棒、獵) 第五十二圖 205. Pl. II. Fig. 3.

Totanus stagnatilis Bechstein Ornith. Taschenb. Deutschl. Pl. II. P. 292. (1803—Germany)*Illiornis stagnatilis* (Bechstein) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：樺太

分布：樺太・本州・朝鮮・臺灣

國外：南歐・阿弗利加・印度・セイロン・スンダ諸島・臺灣

206. *Glottis nebularius* (Gunnerus)

アラアシシギ

青 足 鷗 (棒、獵) 第五十二圖 206.

Scelopax nebularia Gunnerus in Knud Leem Beskrivelse Over Finmarken's Lapper P. 251. (note) (1767—Norway)*Totanus glottoides* Gould Century of Birds Pl. 76. Vigors P. Z. S. "1831" 1832. (1831—Himalaya)*Totanus glottis* (nec (L.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 69.

採集地：知取・樺保 Ⅷ. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・屋久島・琉球・臺灣

國外：カムチャツカ・歐洲・印度・スンダ諸島・臺灣・タスマニア・ニウジーランド・フロリダ

Genus *Pseudoglottis* Stejneger (1884) からふとあまあししぎ屬207. *Pseudoglottis guttifer* (Nordmann)

カラフトアラアシシギ

樺太青足鷗 (棒、獵) 第五十二圖 207.

Totanus guttifer Nordmann in Erman's Reise Erde Naturh. Atlas P. 17. (1835—Ochotsk)

採集地：榮濱・貝塚・眞縫・知取

分布：樺太・北海道・本州・九州・朝鮮・臺灣

國外：西藏・カムチャツカ・オコツク・ベーリング島・アムール・ウスリ・海南島・サイアム・印度

Genus *Terekia* Bonaparte (1838) そりはししぎ屬208. *Terekia cinerea* (Güldenstädt)

ソリハシシギ

反 嘴 鷗 (樟、環) 第五十二圖 208.

Scelopax cinerea Gùldenstàdt Nov. Comm. Acad. Sci. Imp. Petrop. XIX. P. 473. Pl. 19. (1774—Shore of Caspian Sea)

Totanus javanicus Horsfield Trans. Linn. Soc. London XIII. P. 193. (1821—Java)

Totanus terekus (nec Lath.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 70.

採集地：多來加 Ⅷ. 1912. (村田)・榮濱 Ⅶ. 1928. (立花)・知取

分 布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・喜界ヶ島・臺灣
國外：北露・東部歐洲・東部阿弗利加・マダガスカー・南支那・スンダ諸島・濠洲・タスマニア

Genus *Limosa* Brisson (1760) めくろしき屬

209. *Limosa limosa melanuroides* Gould

ヲグロシギ

尾 黒 鷗 (樟、環) 第五十三圖 209.

Limosa melanuroides Gould Birds Austr. Pt. XXXIV. Vol. Pl. 28. (Port Essington Australia); id P. Z. S. 1846. P. 84.

Limosa melanura melanuroides (nec Gould.) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 71.

採集地：貝塚 Ⅶ. 1928. (立花)・海豹島 K. 1935. (中島)・來知志 K. 1912. (村田)・池邊嶽 K. 1906. (E. Linnberg)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮・琉球・臺灣
國外：東部シベリヤ・カムチャツカ・蒙古・印度・比律賓・スンダ諸島・濠洲

210. *Limosa lapponica baueri* Naumann

オホソリハシシギ

大 反 嘴 鷗 (樟、環) 第五十三圖 210.

Limosa baueri Naumann Naturg. Vög. Deutschl. VIII. P. 429. (1836—"Neuholland" = Victoria)

採集地：榮濱 Ⅶ. 1928. (立花)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・琉球・臺灣
國外：カムチャツカ・アラスカ・馬來半島・馬來群島・ニウギニア・濠洲

ニウジーランド

Genus *Numenius* Brisson (1760) だいしやくしき屬

211. *Numenius arquata orientalis* Brehm

ダイシャクシギ

大 杓 鷗 (樟、環) 第五十三圖 201.

Numenius lineatus Cuvier Règne Anim. 2 nd. ed. I. P. 521. (1829—India)

Numenius orientalis Brehm Handb. Naturg. Vög Deutschl. P. 610. (1831—East Indies)

採集地：東海岸數香地方「ツンドラ」, 多來加湖畔, 西海岸にては來知志湖畔に於て目撃したりと村田氏の報告に據るも樺太に分布するは疑はしきものなり。

分 布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮・琉球・臺灣
國外：西部西比利亞・バイカル・支那・印度・馬來群島・比律賓・アラビヤ・小亞細亞・マダガスカー・西部阿弗利加

212. *Numenius cyanopus* Vieillot

ホウロクシギ

焙 烙 鷗 (樟、環) 第五十三圖 212.

Numenius cyanopus Vieillot Nouv. Dict. d' Hist. Nat. VIII. P. 306. (1817—"Houvenelle Hollande" = New South Wales)

Numenius major Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon Aves P. 110. Pl. 66. (1849—Japan) (nec Stephens)

Numenius rufescens Gould Proc. Zool. Soc. London P. 286. (1862—Formosa)

採集地：榮濱 Ⅶ. 1912. (村田)・貝塚・内淵 (立花)・大泊 X. 1906. (E. Linnberg)

分 布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・四國・九州・對馬・濟州島・朝鮮・臺灣・マリアナ
國外：カムチャツカ・支那・比律賓・セレベス・馬來群島・ニウギニア・濠洲・ニウジーランド・グアム

213. *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli)

チウシヤクシギ

中杓鷗 (樟、獵) 第五十四圖 213.

Tantalus variegatus Scopoli Del. Flor. Faun. Insubr. Fasc. II. P. 92. (1786—Luzon)*Phaeopus phaeopus variegatus* (Scopoli) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：貝塚 VII. 1928. (立花)・富内 VI. 1910. (村田)・多来加湖沿岸 VIII. 1912. (村田)・恵比須 K. 1912. (村田)・知取・池邊 VII. 1906. (E. Lönnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・濟州島・朝鮮・徳之島・大東列島・ラサ島・琉球・臺灣・カロリン・パラウ・マーシャル

国外：東部西比利亞・支那・スンダ諸島・比律賓・セレベス・ニューギニア・漆洲・タスマニア

214. *Numenius minutus* Gould

コシヤクシギ

小杓鷗 (樟、獵) 第五十四圖 214.

Numenius minutus Gould Proc. Zool. Soc. London "1840" P. 176. (1840—New South Wales)

採集地：恵比須 K. 1912. (村田)

村田氏の報告に據るも、其の後採集されたることなし。樺太は迷鳥ならん。

分布：樺太・本州・九州・朝鮮・臺灣

国外：東部北部西比利亞・支那・セレベス・アル・キ・漆洲

Genus *Calidris* Anonymous (1804) せぼしき屬215. *Calidris canutus rogersi* (Mathews)

コヲバシギ

小尾羽鷗 (樟、獵) 第五十四圖 215.

Canutus canutus rogersi Mathews B. Austr. III. P. 270. (1913—Japan)

採集地：樺太

分布：樺太・千島・北海道・本州・朝鮮・臺灣

国外：東部西比利亞・支那・漆洲・ニューギニア

216. *Calidris tenuirostris* (Horsfield)

ヲバシギ

尾羽鷗 (樟、獵) 第五十四圖 216.

Totanus tenuirostris Horsfield Trans. Linn. Soc. London XIII. P. 192. (1821—Java)

a)

Tringa crassirostris Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japan. Aves. P. 107.

Pl. 64. (1849—Japan)

Anteliotringa tenuirostris (Horsfield) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：知取・多来加 VIII. 1912. (村田)・古丹 VIII. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣・紅頭嶼

国外：東部西比利亞・支那・馬來群島・アダンマン・モラツカス・漆洲・アラスカ

Genus *Erolia* Vieillot (1816) はましき屬217. *Erolia alpina sakhalina* (Vieillot)

ハマシギ

濱鷗 (樟、獵) 第五十五圖 217.

Scelopax sakhalina Vieillot Nouv. Dict. d'Hist. Nat. III. P. 359. (1816—Sakalin)*Tringa alpina pacifica* (nec (Coes.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P.

73.

Pelidna alpina sakhalina (Vieillot) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：貝塚・榮濱・眞鏡・多来加 VIII. 1912. (村田)・敷香 VIII. 1912. (村田)・古丹 K. 1912. (村田)・西樺丹 (村田)・内淵 (立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣・澎湖列島

国外：東部西比利亞・支那・海南島

Genus *Pisobia* Billberg (1828) とうねん屬218. *Pisobia minuta ruficollis* (Pallas)

トウネン

當年 (樟、獵) 第五十五圖 218.

Tringa ruficollis Pallas Reise d' versch. Prov. Russ Reichs III. P. 700. (1776—
"Circa Lacus salsos Davuriae campestris" = Siberia)

Tringa ruficollis (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 74.

採集地：江ノ浦 VI. 1910. (村田)・敷香 Ⅷ. 1912. (村田)・鶴城 K. 1912. (村田)・
内淵 (立花)・榮濱・貝塚・知取・大泊

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・大
東列島・琉球・臺灣・マリアナ・カロリン群島

国外：支那・緬甸・アンダマン・ニコバー諸島・印度・アラスカ

219. *Pisobia minutilla subminuta* (Middendorffi)

ヒバリシギ

雲雀鷗 (樺、蝦) 第五十五圖 219.

Tringa subminuta Middendorffi Reise. N. O & O. Sibirien II. 2. P. 222. Pl. XIX.

Fig. 6. (leg) (1851—Stanovoi Range and Mouth of R. Uda)

採集地：榮濱 Ⅷ. 1912. (村田)・内路 (村田)・諸津 K. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・九州・朝鮮・大東列島・琉球・マ
リアナ群島

国外：東部西比利亞・支那・緬甸・印度・馬來半島・スンダ諸島・比律賓・
濠洲

220. *Pisobia acuminata* (Horsfield)

ウツラシギ

鷗 (樺、蝦) 第五十五圖 220.

Totanus acuminatus Horsfield Trans Linn. Soc. London XIII. P. 192. (1821—Java)

採集地：貝塚 K. 1934. (岡田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・奄美大島・徳之
島・大東列島・琉球・臺灣・マリアナ・カロリン・パラウ・マーシャル各群
島

国外：北部西比利亞東部・支那・比律賓・暹羅・濠洲・ニュージーランド・
アラスカ地方・ハワイ・英國

Genus *Limicola* Koch (1816) きりあい屬

221. *Limicola falcinellus sibirica* Dresser

キリアイ

鷗 (樺、蝦) 第五十六圖 221.

Limicola sibirica Dresser Proc. Zool. Soc. London P. 674. (1876—China)

採集地：内淵 (立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮・臺灣

国外：西比利亞北部・支那・海南島・比律賓・サイアム・東印度・モラッ
カス・濠洲

Genus *Eurynorhynchus* Nilsson (1821) へらしぎ屬

222. *Eurynorhynchus pygmeus* (Linnaeus)

へらしぎ

鷗 (樺、蝦) 第五十六圖 222.

Platalea pygmea (sic!) Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 140. (1758—Surinam-erro-
re!)

採集地：貝塚・内淵 (立花)・敷香 (立花)

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮

国外：西比利亞東部沿岸諸地・ケイプサウス・アラスカ・南支那・海南
島・テナセリム・印度

Genus *Crocethia* Billberg (1828) みゆびしぎ屬

223. *Crocethia alba* (Pallas)

ミユビシギ

三趾鷗 (樺、蝦) 第五十六圖 223.

Tring alba Pallas in Vroeg's Cat. d' Ois. Adumbrat. P. 7. (1764—Coast of North
Sea; Holland)

Tring arenaria (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 74.

採集地：榮濱 Ⅷ. 1912. (村田)・敷香 (村田)・東郷丹 (村田)・内淵 (立花)・貝塚

分布：樺太・千島・北海道・本州・九州・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣・マリアナ群
島

国外：西比利亞北部・北亞米利加北部・地中海・大西洋諸島・南亞米利加・

亞細亞・濠洲

Genus *Scolopax* Linnaeus (1758) やましぎ屬

224. *Scolopax rusticola* Linnaeus (1758)

ヤマシギ

山 鶺鴒 (棒、獵) 第五十六圖 224.

Scolopax Rusticola Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 146. (1758—Sweden)

Scolopax rusticola iamasigi Momiyama Annot. Orn. Orient. I. I. P. 76. (1927—Echigo, Hondo in Japanese)

採集地：小沼・貝塚

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・濟州島・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・フカ島・臺灣
國外：歐洲・亞細亞・地中海・埃及・北亞米利加東部

Genus *Capella* Frenzel (1801) たしぎ屬

225. *Capella solitaria* (Hodgson)

アヲシギ

青 鶺鴒 (棒、獵) 第五十七圖 225.

Gallinago solitaria Hodgson Gleanings in Science III. No. 32. ex. Ms. No. 7. P. 2 38. (1831—Nepal)

Spilura solitaria a japonica Bonaparte Compt Rend. Acad. Sci. Paris XLIII. P. 57 9. (new name for *S. solitaria* Schlegel from Japan) (1856—nom nud)

採集地：清水・小沼・貝塚・池邊讀 X. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・琉球
國外：土耳其斯坦・アルタイ・蒙古・スタノボイ山脈・カムチャツカ・支那・ヒマラヤ山脈・ブラマプトラ・アサム・東ベルシヤ・コンマンダー諸島

226. *Capella gallinago gallinago* (Linnaeus)

タシギ

田 鶺鴒 (棒、獵) 第五十七圖 226.

Scolopax Gallinago Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 147. (1758—Sweden)

Scolopax (Gallinago) gallinago raddei Buturlin "Kuliki Rossieskoi Imperie-Premiyu-k-journal" (Waders of the Russian Empire) in Psoveia i Ruzheinaia Okhoto Pt. I. P. 54. (56 ?) (1912—East Siberia) (in Russian)

Gallinago gallinago raddei (Buturlin) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：榮濱 VII. 1928. (立花)・大谷 (立花)・小谷 (立花)・大泊

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・濟州島・朝鮮・種子ヶ島・奄美大島・琉球・臺灣・マリアナ群島
國外：歐洲中北部・亞細亞中北部・阿弗利加・印度・馬來半島・スンダ諸島・比律賓

227. *Capella megala* (Swinhoe)

チウチシギ

中 地 鶺鴒 (棒、獵) 第五十七圖 227.

Gallinago megala Swinboe Ibis. P. 343. (1861—Peking)

Subspilura megala (Swinboe) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：眞縫 VII. 1928. (立花)

分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・對馬・朝鮮・奄美大島・大東列島・琉球・臺灣・パラウ群島
國外：東部西比利亞・緬甸・比律賓・セレベス・スンダ諸島・ニューギニア・濠洲

228. *Capella stenura* (Bonaparte)

ハリヲシギ

針 尾 鶺鴒 (棒、獵) 第五十七圖 228.

Scolopax stenura Bonaparte Ann. Stor. Nat. Bologna IV. fasc. 14. P. 335. (1830—Sunda Islands)

採集地：池邊讀 K. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・朝鮮・奄美大島・琉球・臺灣
國外：東部西比利亞・南支那・比律賓・セレベス・スンダ諸島・馬來半島・印度・セイロン島

Family 35. CHARADRIIDÆ 千鳥科

Genus *Squatarola* Cuvier (1816) だいぜん屬229. *Squatarola squatarola hypomelaena* (Pallas)

ダイゼン

大 膳 (棒、獵) 第五十八圖 299.

Charadrius hypomelus Pallas Reise d. versch. Prov. Russ. Reichs III. P. 699. (1776—Siberia)*Charadrius helueticus* (nec (L.)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 64.

採集地：白鳥湖 Ⅷ. 1928. (立花)・榮濱・貝塚・來知志 K. 1912. (村田)・古丹 K. 1912. (村田)・西欄丹 (村田)・内路 X. 1928. (立花)・内淵 X. 1928. (立花)・池邊講 X. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・濟州島・奄美大島・徳之島・琉球・臺灣
國外：北西比利亞東部・馬來半島・印度・澳洲Genus *Pluvialis* Brisson (1760) むなぐろ屬230. *Pluvialis apiricarius fulvus* (Gmelin)

ムナグロ

胸 黒 (棒、獵) 第五十八圖 230.

Charadrius fulvus Gmelin Syst. Nat. I. I. P. 687. (1789—Tahiti)

採集地：榮濱 Ⅶ. 1928. (立花)・多來加 Ⅷ. 1912. (村田)・北名好 K. 1912. (村田)・知取・小田寒 (立花)・池邊講 K. X. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黃列島・四國・朝鮮・喜界ヶ島・沖ノ長部島・琉球・大東列島・ラサ島・臺灣・紅頭嶼
國外：西比利亞・アラスカ・支那・印度・馬來群島・澳洲・ニュージーランド・米國・智利・歐洲・阿弗利加Genus *Eudromias* Brehm (1831) こばしちどり屬231. *Eudromias morinellus* (Linnaeus)

コバシチドリ

小 嘴 千 鳥 (棒、獵) 第五十八圖 231.

Charadrius Morinellus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 150. (1758—Sweden)

採集地：樺太

分布：樺太・北海道・本州

國外：歐洲・地中海・アラビヤ・ベルシヤ・カナリヤ群島・アラスカ

Genus *Charadrius* Linnaeus (1758) ちどり屬232. *Charadrius leschenaultii leschenaultii* Lesson

オホメダイチドリ

大 目 大 千 鳥 (棒、獵) 第五十八圖 132.

Charadrius Leschenaultii Lesson Dict. Sci. Nat. XLII. (Levrault) P. 36. (1826—Pondicherry, India)*Charadrius Geoffroyi* Wagler Syst. Av. *Charadrius* Sp. 19. P. 61. (1827—Pondicherry India)

採集地：多來加 Ⅷ. 1912. (村田)・古丹 Ⅷ. 1912. (村田)

村田氏採集報告の外未だ採集されず、迷鳥ならん。

分布：樺太・本州・伊豆七島・九州・朝鮮・琉球・臺灣

國外：ベルシヤ・スンダ諸島・モラツカス・澳洲・埃及・ヌビヤ・アラビヤ・マダガスカー

233. *Charadrius mongolus mongolus* Pallas

メダイチドリ

目 大 千 鳥 (棒、獵) 第五十九圖 233.

Charadrius mongolus Pallas Reise d. versch. Prov. Russ. Reichs III. P. 700. (1776—Mongolia)

採集地：貝塚・榮濱・眞鏡・元泊 Ⅷ. 1912. (村田)・知取・馬群潭 Ⅷ. 1912. (村田)・古丹 Ⅷ. 1912. (村田)・内淵 (立花)・内路 (立花)・榮濱 Ⅵ. 1937.

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・硫黃列島・四國・九州・朝鮮・沖之長良部島・大東列島・琉球・臺灣

國外：東部西比利亞・蒙古・コンマンダー諸島・支那・比律賓・セレベス・印度・ニュージーランド・澳洲・アラスカ

234. *Charadrius alexandrinus dealbatus* (Swinhoe)

シロチドリ

白千鳥 (樟、獵) 第五十九圖 234.

Aegialites dealatus Swinhoe Proc. Zool. Soc. London P. 138. (1870—S. China Formosa and Hainan, restricted type locality: Hainan)

Charadrius cantinus (nec Lath.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 65.

採集地: 古丹 K. 1912. (村田)

分布: 樺太・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・濟州島・朝鮮・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・喜界ヶ島・徳之島・沖之永良部島・琉球・臺灣

國外: 中央亞細亞 (ザイタム)

235. *Charadrius hiaticula tundrae* (Lowe)

ハジロコチドリ

羽白小千鳥 (樟、獵) 第五十九圖 235.

Aegialitis hiaticola tundrae Lewe Bull. B. O. Club XXXVI P. (19157)

採集地: 大泊・貝塚

分布: 樺太・本州・硫黄列島

國外: 西比利亞・印度・小亞細亞・埃及・南阿弗利加・英國・ノールウェイ・智利・濠洲

236. *Charadrius dubius curonicus* Gmelin

コチドリ

小千鳥 (樟、獵) 第五十九圖 236.

Charadrius curonicus Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 692. (1789—"Habitat" in Curonia-Courland, Baltic Prov. of Russia)

採集地: 知取 (山本)

分布: 樺太・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・四國・九州・朝鮮・濟州島・琉球・臺灣

國外: 歐洲・亞細亞・阿弗利加・アラビヤ・ニュギニア・北亞米利加・アラスカ

Genus *Vanellus* Brisson (1760) たげり屬* 237. *Vanellus vanellus* (Linnaeus)

タゲリ

田鳧 (樟、禁) 第六十圖 237. Pl. VIII. Fig. 16.

Tringa Vanellus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 148. (1758—Sweden)

採集地: 遼瀋湖 Ⅷ. 1935. (丹治)

Measurements:—

Sex	♂ ad
Totally length	260mm
Exposed culmen	23
Bill from nostril	9
Height of bill at nostril	6
Wing	117.5
Tail	10.3
Tarsus	43

分布: 樺太・北海道・千島・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・濟州島・琉球・尖閣列島

國外: 歐洲・北部亞細亞・北阿弗利加・印度・グリーンランド・アイスランド・カナリー群島・アラスカ・北米・バハマ諸島

Genus *Haematopus* Linnaeus (1758) みやこどり屬238. *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe

ミヤコドリ

都鳥 (樟、禁) 第六十圖 238.

Haematopus osculans Swinhoe Proc. Zool. London P. 405. (1871—Ceina)

採集地: 富内 (因)・濱路 (若林)

分布: 樺太・千島・北海道・本州・四國・對馬・朝鮮・臺灣

國外: 東部西比利亞・カムチヤツカ・支那・アラカン

Genus *Arenaria* Brisson (1760) きやうじょうしぎ屬239. *Arenaria interpres interpres* (Linnaeus)

キヤウジヨウシギ

京女鷗 (標、禁) 第六十圖 239.

Tringa Interpres Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 148. (1758—Swden)*Streptilas interpres* (nec (L.)) Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 72.

採集地：貝塚・榮濱・知取・多来加 Ⅷ. 1912. (村田)・敷香 Ⅷ. 1912. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島・硫黄列島・四國・九州・朝鮮・種子ヶ島・喜界ヶ島・徳之島・沖之永良部島・大東列島・琉球・臺灣・マリアナ・パラウ・カロリン・マーシャル各群島

国外：アイスランド・歐洲・北部西比利亞・アラスカ・南アフリカ・印度・ハワイ・ニュージーランド・濠洲

Order 17. LARI 鷗 目

Family 36. LARIDÆ 鷗 科

Genus *Chlidonias* Rafinesque (1822) くろはらあじさし屬240. *Chlidonias leucoptera* (Temminck)

ハジロクロハラアヂサシ

羽白黒腹鰭刺 (標、禁) 第六十圖 240.

Sterna leucoptera Temminck Man. d' Orn. P. 483. (1815—Mediterranean Sea)*Sterna grisea* Horsfield Trans. Linn. Soc. London XIII. P. 199. (1821—Java)

採集地：樺太

分布：樺太・伊豆七島・小笠原列島・大東列島・臺灣・朝鮮・紅頭嶼

国外：歐洲・亞細亞・アフリカ・馬來群島・濠洲・グアム島

Genus *Sterna* Linnaeus (1758) あじさし屬241. *Sterna hirundo longipennis* Nordmann

アヂサシ

鰭 刺 (標、禁) 第六十一圖 241.

Sterna longipennis Nordmann in Erman's Verz. Thieren u. Pflanzen P. 17. (1835)

—Mouth of Kuchtui near Ochotsk, Siberia)

採集地：新開 Ⅷ. 1936.・多来加湖 Ⅷ. 1912. (村田)・榮濱 (立花)・鈴谷川口 V. Ⅷ. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・南島島・四國・朝鮮・セイロン・パラウ群島
国外：東部西比利亞北部・支那・馬來半島・ニューギニア・ソロモン242. *Sterna aleutica* Baird

コシジロアヂサシ

腰白鰭刺 (標、禁) 第六十一圖 242.

Sterna aleutica Baird Trans. Chicago Acad. Sci. I. P. 321. Pl. 31. Fig. 1. (1869—Kadiak I. near Alaska)

採集地：敷香 Ⅷ. 1928. (立花)・新開 K. 1935.・眞鍮 Ⅷ. 1936.・留多加 VI. 1910. (村田)・多来加 Ⅷ. 1912. (村田)・鈴谷川口 V. 1906. (E. Linnberg)

分布：樺太・本州

国外：アラスカ・西比利亞沿岸・コマンダー諸島

Genus *Larus* Linnaeus (1758) かもめ屬223. *Larus argentatus vegae* Palmén

セグロカモメ

脊 黒 鷗 (標、禁) 第六十一圖 243.

Larus argentatus Brünn var. *Vegae* Palmén Vega-Exped. Vetensk. Arb. v. P. 370. (1887—Pidlin, Coast of N. E. Siberia)

採集地：大泊・榮濱 (立花)

分布：樺太・北海道・本州・小笠原列島・硫黄列島・濟州島・臺灣・四國・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島・琉球・マリアナ群島

国外：西比利亞・ベーリング海・カムチャツカ・オコツク海・支那

242. *Larus schistisagus* Stejneger

オホセグロカモメ

大 脊 黒 鷗 (標、禁) 第六十一圖 244.

Larus schistisagus Stejneger Auk. P. 201. (1884—Bering I. Kamtschatka)

Larus marinus schistisagus (nec (Stejneger)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 191

4. P. 61.

採集地：貝塚・知取・敷香

分布：樺太・千島・北海道・本州・硫黄列島・濟州島・臺灣

國外：東部西比利亞・アラスカ・北米

245. *Larus canus major* Middendorffi

カモメ

鷗 (樺、禁) 第六十二圖 245.

Larus canus L. var. *major* Middendorffi Sibirische Reise Zool. II. 2. P. 243. Pl. XXIV. Fig. 4. (1853—Stanovoi Range to Ochotsk Sea)

Larus canus brachyrhynchus (nec Richardson) Hand-List Japanese Birds (1922—Smaller examples of *major*)

採集地：貝塚・大泊・鈴谷川口 V. VI. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・小笠原列島・硫黄列島・四國・對馬・濟州島・朝鮮・臺灣

國外：東部西比利亞・カムチャツカ

226. *Larus crassirostris* Vieillot

ウミネコ

海猫 (樺、禁) 第六十二圖 246.

Larus crassirostris Vieillot Nouv. Dict d' Hist. Nat. XXI. P. 508. (1828—Nagasaki)

Larus melanurus Temminck Pl. Col. Pl. 459. livr. 77. (1828—Japan)

採集地：小田原 VI. 1910. (村田)・敷香 VII. 1912. (村田)・大泊・貝塚・海馬島・鈴谷川口 V. 1906. (E. Lönnerberg)・池邊津 VII. K. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・濟州島・朝鮮・臺灣

國外：支那

247. *Larus hyperboreus* Gunnerus

シロカモメ

白鷗 (樺、禁) 第六十二圖 247.

Larus hyperboreus Gunnerus in Leem's Beskr. Finm Lapper PP. 226. 283. (1767)

Larus leucopterus (nec Faber) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：貝塚・大泊・榮濱・本斗・眞岡

分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・小笠原列島

國外：歐洲・地中海・黑海・カスピア海・ハワイ・北米・マタイラ

248. *Larus ridibundus sibiricus* Buturlin

ユリカモメ

百合鷗 (樺、禁) 第六十二圖 248.

Larus ridibundus var. *major* (nec *L. canus* var. *major* Midd. P. 243) Middendorffi Sibirische Reise Zool. II. 2. P. 244. (1853—Kamtschatka)

Larus ridibundus sibiricus Buturlin Mess. Orn. II. P. 66. (1911—Kolyma Delta & Ussuri (also W. Siberia in error))

Larus ridibundus ridibundus (nec L.) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：榮濱・鈴谷川口 V. 1906. (E. Lönnerberg)

分布：樺太・千島・北海道・九州・本州・臺灣

國外：カムチャツカ・支那

249. *Larus saundersi* (Swinhoe)

ツグロカモメ

頭黒鷗 (樺、禁) 第六十三圖 249.

Chrocephalus saundersi Swinhoe Proc. Zool. Soc. London PP. 273. 421. Pl. XXII. (1871—near Amoy, China)

採集地：樺太

分布：樺太・北海道・千島・濟州島・朝鮮・臺灣

國外：支那・蒙古

Genus *Rissa* Stephens (1826) みつゆびかもめ属

250. *Rissa tridactyla pollicaris* Stejneger

ミツユビカモメ

三趾鷗 (標、禁) 第六十三圖 250.

(*Rissa tridactyla*) b. *pollicaris* Stejneger in Baird Brewer & Ridgway Water B. N. Amer. II. P. 202. (New Name for *R. brachyrhynchus* Bruch, 1853—nec Richardson)

採集地: 海豹島 K. 1935. (中島)

分布: 樺太・千島・北海道・本州・四國

国外: ベーリング海「アリニシヤン」・アラスカ・カリフォルニア

Family 37. STERCORARIIDÆ 盜賊鷗科

Genus *Stercorarius* Brisson (1760) とうぞくかもめ属

251. *Stercorarius pomarinus nutcheri* (Mathews)

トウゾクカモメ

盜賊鷗 (標、禁) 第六十三圖 251.

(*Stercorarius*) *parasita* var. *camtschatica* "Pall" Gray Handl. Gen. Sp. Brds. Pt. III. P. 110. (nom. imp-ex Pallas Zoogr. Rosso-Asiat II. P. 312. 1827) (1871)

Coprotheres pomarinus nutcheri Mathews Austr. Av. Rec. III. P. 72. (1917—Broken Bay, New South Wales) Bieeds in Siberia.

Stercorarius nigricapillus Bergman Fauna och Flora XVIII. No. 5. P. 232. (1923—Kamtschatka)

Coprotheres pomarinus (nec Temminck) Hand-List Japanese Bairds (1922)

採集地: 大泊 VII. 1935. (大泊中學校)・保呂 VII. 1936. (中央試験所)

分布: 樺太・千島・本州

国外: 西比利亞・カムチャツカ・漆洲

252. *Stercorarius parasiticus parasiticus* (Linnaeus)

クロトウゾクカモメ

黒盜賊鷗 (標、禁) 第六十三圖 252.

Larus parasiticus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. I. P. 136. (1758—Coast of Sweden)

採集地: 真岡

分布: 樺太・千島・北海道

国外: 北歐州・北亞細亞・北亞米利加・地中海・阿弗利加・漆洲・ニウジ
ーランド・南亞米利加

253. *Stercorarius longicaudus* Vieillot

シロハラトウゾクカモメ

白腹盜賊鷗 (標、禁) 第六十四圖 253.

Stercorarius longicaudus Vieillot Nouv. Dict. d' Hist. Nat. XXXII. P. 157. (1819)

採集地: 真岡 (正田)

分布: 樺太・千島・本州 (s. t.)

国外: 北歐州・西比利亞北部・グリーンランド・地中海・フロリダ半島

Order 18. ALCÆ 海雀目

Family 38. ALCIDÆ 海雀科

Genus *Uria* Brisson (1760) うみがらす属

254. *Uria aalge inornata* Salomonsen

ウミガラス

海鳥 (標、禁) 第六十四圖 254.

Uria aalge inornata Salomonsen Ibis P. 128. (1932—St. Mathew's Island, Berng Sea—♀ ad)

Alea troile (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 58. Pl. IX. fig. 2.

Uria troile californica (nec Bryant) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地: 貝塚・大泊・榮濱・近視 VI. 1910. (村田)・多来加 VII. 1912. (村田)・知取

Ⅷ, 1935. 榮濱 (立花)・海豹島 (立花)・海馬島 20/V, 1935. (森本)
 分布: 樺太・千島・北海道・本州・朝鮮
 国外: ベーリング海のセントマツシウス・ワルラス各島・アラスカ (セントミカエルス・ヌシヤグク)・ウツスリー・アムール

255. *Uria lomvia arra* (Pallas)

ハシブトウミガラス

嘴太海鳥 (樺、禁) 第六十四圖 255.

Cephus Arra Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 347. (1827—Kamtschatka)

採集地: 貝塚 K. 1935.

分布: 樺太・千島・北海道・本州

国外: ベーリング海・カムチャツカ・アリウシヤン・コンマンダー諸島・アムール沿岸・ウツスリー

256. *Uria columba columba* (Pallas)

ウミバト

海 鳩 (樺、禁) 第六十四圖 256.

Cephus columba Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 348. (1827—Kamtschatka, Bering Strait)

採集地: 榮濱

分布: 樺太・千島・北海道

国外: ベーリング海・アラスカ・カムチャツカ・コンマンダー諸島・北亞米利加

257. *Uria carbo* (Pallas)

ケイマフリ

海 鷗 (樺、禁) 第六十五圖 227.

Cephus carbo Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 350. (1827—Kuriles)

Alca carbo (nec (Pallas)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 59. Pl. IX.

fig. 3.

採集地: 有部 Ⅷ, 1910. (村田)・海馬島 (森本)

分布: 樺太・千島・北海道・本州・對馬・朝鮮

国外: カムチャツカ沿岸・オコック海・滿洲東岸

Genus *Brachyramphus* Brandt (1837) まだらうみすずめ屬

258. *Brachyramphus marmoratus perdix* (Pallas)

マダラウミスズメ

斑 海 雀 (樺、禁) 第六十五圖 258.

Cephus Perdix Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 351. Pl. LXXX. (1827—Bering and ochotsk Seas)

採集地: 知取・真經 Ⅷ, 1927. (立花)・池邊巖 Ⅷ, 1906. (E. Linnberg)

分布: 樺太・千島・北海道・本州・九州・奄美大島

国外: カムチャツカ・滿洲・支那 (山東省・青島)

Genus *Synthliboramphus* Brandt (1837) うみすずめ屬

259. *Synthliboramphus antiqua* (Gmelin)

ウミスズメ

海 雀 (樺、禁) 第六十五圖 259.

Alca antiqua Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 554. (1789—ex Pennant: "Inhabits from the west of North America to Kamtschatka and Kurile Island")

Uria senicula Pallas Zoogr. Rosso-Asiat. II. P. 367. (1827—Kuriles, Aleutian Kamtschatka and Peshina Bay)

採集地: 榮濱・大泊・池邊巖 Ⅷ, 1906. (E. Linnberg)

分布: 樺太・千島・北海道・本州・硫黄列島・四國・九州・對馬・濟州島・朝鮮・臺灣

国外: アラスカ・アンガ島・アリウシヤン・コンマンダー諸島・カムチャツカ・アムール沿岸・支那沿岸・米國 (コロル島)

260. *Synthliboramphus wumizusume* (Temminck)

カンムリウミスズメ

冠 海 雀 (樺、禁) 第六十五圖 260.

Uria lomizusume Temminck Pl. Col. Pl. 579. (1835—seas of Japan and Korea)

Synthliboramphus Temmincki Brandt Bull. Acad. Petersbourg II. P. 347. (1837—
new name only)

採集地： 榮濱

分布： 樺太・北海道・本州・伊豆七島・九州・對馬・朝鮮

國外： 本邦特種なり。

Genus *Aethia* Merrem (1788) えとろふうみすずめ屬

261. *Aethia cristatella* (Pallas)

エトロフウミスズメ

擇捉海雀 (樺、禁) 第六十六圖 261.

Alca cristatella Pallas Spicil. Zool. fasc. V. P. 18, Pl. III. (1769—Kuriles)

採集地： 眞岡・榮濱・貝塚 1935.

分布： 樺太・千島・北海道・本州

國外： ベーリング海・アラスカ・コンマンダー諸島・アリウシヤン・アム
ール沿岸・カディアク島

262. *Aethia pygmaea* (Gmelin)

シラヒゲウミスズメ

白髭海雀 (樺、禁) 第六十六圖 262.

Alca pygmaea Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 555. (1889—N. Asia and America)

Uria mystacea Pallas Zoogr. Rosso-Asiat II. P. 373. (1827—Kuriles)

Alcella pygmaea (Gmelin) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地： 樺太

分布： 樺太・千島・本州・四國

國外： カムチャツカ・コンマンダー・アリウシヤン諸島・アラスカ

Genus *Ciceronia* Reichenbach (1852) こうみすずめ屬

263. *Ciceronia pusilla* (Pallas)

コウミスズメ

小海雀 (樺、禁) 第六十六圖 263.

Uria pusilla Pallas Zoogr. Rosso-Asiat II. P. 373. (1827—Kamtschatka)

採集地： 貝塚・大泊・海馬島 (森本)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・種子ヶ島

國外： アラスカ沿岸・ベーリング海峡・アリウシヤン

Genus *Phaleris* Temminck (1820) うみあうむ屬

264. *Phaleris psittacula* (Pallas)

ウミアウム

海鷗 (樺、禁) 第六十六圖 264.

Alca psittacula Pallas Spicil. Zool. fasc. V. P. 13, Pls. II. V. figs 4—6. (1769—Be-
ring Sea)

採集地： 樺太

分布： 樺太・千島・本州

國外： アラスカ北岸・コンマンダー諸島・アリウシヤン諸島・カリフォー
ルニア

Genus *Cerorhinca* Bonaparte (1828) うとう屬

265. *Cerorhinca monocerata* (Pallas)

ウトウ

鵜頭 (樺、禁) 第六十七圖 265.

Alca monocerata Pallas Zoogr. Rosso-Asiat II. P. 362. (1827—Cape St. Elias, Alas-
ka and Kadiak I.)

Fratereula monocerata (nec (Pallas)) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 60.
Pl. VIII. fig. ♂ 2. ♀ 3.

採集地： 海馬島・白主 (森本)・菱苦 X. 1918. (森本)

分布： 樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・九州・對馬

國外： アラスカ・ワシントン州・カリフォルニア

Genus *Lunda* Pallas (1827) えとびりか屬

266. *Lunda cirrhata* (Pallas)

エトビリカ オイランテウ

花魁鳥 (標、禁) 第六十七圖 266.

Alca cirrhata Pallas Spicil. Zool. fasc. V. P. 7. Pls. I. V. figs. 1—3. (1769—Between Kamtschatka and America)

Fratercula cirrhata (nec Pallas) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 59. Pl. IX. fig. 1.

採集地：登幌 VI. 1925. (山田)・海馬島 VII. 1934. (森本) (立花)・北知床半島・海豹島 VII. 1930.・近幌 VI. 1910. (村田)

分布：樺太・千島・北海道・本州

国外：ベーリング海・アラスカ・カリフォルニア・メイン沿岸

Genus *Fratercula* Brisson (1760) つのめどり属

267. *Fratercula corniculata* (Naumann)

ツノメドリ

角目鳥 (標、禁) 第六十七圖 267.

Mormon corniculata Naumann Isis P. 782. Pl. 7. figs. 3—4. (1821—Kamtschatka)

採集地：海豹島 VII. 1935. (中島)

分布：樺太・千島・本州

国外：カムチャツカ・コンマンダー諸島・アラスカ・アリウシヤン諸島・カリフォルニア

Order 19. ALECTORIDES 鶴目

Family 39. BALEARICIDÆ 鶴科

Genus *Grus* Pallas (1767) つる属

268. *Grus japonensis* (P. L. S. Müller)

タンチャウ

丹頂 (標、禁) 第六十七圖 268. Pl. IX. fig. 17.

Arde (Grus) Japonensis P. L. S. Müller Natursystem Suppl. P. 110. (1776—Japan)

Megalornis Japonensis (P. L. S. Müller) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：海馬島・蘭泊村床丹沼 四—五回渡来

Measurements:—

Sex	♂ed
Exposed culmen	162mm
Bill from nostril	155
Height of bill at nostril	24
Wing	745
Tail	255
Tarsus	263
Claw from middle toe third toe	122

分布：樺太・本州 (Momiyama, Annotationes ornithologiae orientalis Vol. 1. No. 3. (1928) P. 315. に據る)・北海道・九州・朝鮮
国外：滿洲・ウツスリー・支那

269. *Grus monachus* Temminck

ナベツル

鍋鶴 (標、禁) 第六十八圖 269.

Grus monacha Temminck Pl. Col. Pl. 555. (1835—Hokkaido and Korea)

Megalornis monachus (Temminck) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：樺太

分布：樺太・北海道・本州・九州・朝鮮

国外：東部西比利亚 (バイカル湖)・ウツスリー・中部アムール・西北蒙古・滿洲

270. *Grus leucogeranus* Pallas

ソデグロツル

袖黒鶴 (標、禁) 第六十八圖 270.

Grus Leucogeranus Pallas Reise d' Versch Prov. Russ Reichs II. P. 714. (1773—Irtim and Ob Rivers)

Sarcogeranus leucogeranus (Pallas) Hand-List Japanese Birds (1922)

採集地：樺太

分布：樺太 (Nikolski 氏に依る)・日本 (春、秋一回渡來 Seeborn 氏に依る)
 国外：ウツスリヤ・アムール・ドウリヤ・北土耳斯坦・西比利亞 (トムスク・トボルスク)・ウラル流域下部・滿洲・小亞細亞・支那

Family 40. RALLIDÆ 秧鷄科

Genus *Rallus* Linnaeus (1758) くひな屬

271. *Rallus aquaticus indicus* Blyth

クヒナ

秧鷄 (樺、獵) 第六十八圖 271.

Rallus indicus Blyth Journ. As. Soc. Bengal XVIII. Pt. 2. P. 820. (1849—Bengal)

Rallus japonicus "Schl." Gray. Hand-List Gen. Sp. Birds Pt. III. P. 59. (1871—Japan) (nom und)

採集地：貝塚・豊原 (鈴谷川畔) VI. 1935. 軍川 Ⅷ. 1910. (村田)・清水・榮濱 (立花)・鈴谷川口 V. 1906. (E. Ljnnberg)・三ノ澤 VI. 1906. (E. Ljnnberg)・池邊沢 K. X. 1906. (E. Ljnnberg)

分布：樺太・千島・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・琉球

Genus *Porzana* Vieillot (1816) ひめくひな屬

272. *Porzana pusilla pusilla* (Pallas)

ヒメクヒナ

姫秧鷄 (樺、獵) 第六十八圖 272.

Rallus pusillus Pallas Reise d. Versch. Prov. Russ. Reichs III. P. 700. (1776—Dauria)

採集地：池邊沢 K. 1906. (E. Ljnnberg)

分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・硫黃列島・四國・九州・朝鮮・奄美大島・琉球・臺灣

国外：東部西比利亞・蒙古・滿洲・支那・土耳斯坦・印度・比律賓

273. *Porzana fusca erythrothorax* (Temminck & Shlegel)

ヒクヒナ

緋秧鷄 (樺、獵) 第六十九圖 273.

Gallinula erythrothorax Temminck & Shlegel in Siebold's Faun. Japon Aves P. 1 21. Pl. 78. (1849—Japan)

採集地：樺太

分布：樺太・北海道・本州・四國・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島・屋久島

国外：滿洲・支那・サイアム

Genus *Gallinula* Brisson (1760) ばん屬

274. *Gallinula chloropus indicus* Blyth

バン、コバン

鷄 (樺、獵) 第六十九圖 274.

Gallinula chloropus var. *indicus* Blyth Journ. As. Soc. Bengal XI. P. 887. (1842—Calcutta)

Gallinula parvifrons Blyth Op. Cit. XII. P. 180. (1843—Calcutta—new name for *indicus*)

? *Gallinula chloropus lozanoi* Lletget Boletin R. Soc. Esp. Hist. Nat. XVIII. P. 76. (1918—Luzon, Philippines)

採集地：樺保 (山本)・蘭泊 (正田)

分布：樺太・北海道・本州・小笠原列島・琉球・對馬・朝鮮・大東列島・種子ヶ島・奄美大島・屋久島・霧陵島・臺灣

国外：滿洲・支那・印度・セイロン・ペラウ群島

Genus *Gallix* Blyth (1849) つるくひな屬

275. *Gallix cinerea* (Gmelin)

ツルクヒナ

鶴秧鷄 (樺、獵) 第六十九圖 275.

Fulica cinerea Gmelin Syst. Nat. 1. 2. P. 702. (1789—China)

採集地：眞岡郡廣地村海岸 i/M. 1930. (大泉通)

Measurements:—

Exposed culmen 35mm

Height of bill at nostril 10

Wing	170
Tail	65
Tarsus	60
Claw from middle toe third toe	60

分 布： 樺太・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・琉球
 國外： 印度・セイロン・アンダマン・支那・海南島・馬來半島・スンダ諸島・比律賓

Genus *Fulica* Linnaeus (1758) おぼはん屬

276. *Fulica atra atra* Linnaeus

オホバン

大 鷄 (樺、蝦) 第六十九圖 276.

Fulica atra Linnaeus Syst. Nat. X. ed. 1. P. 152. (1758—Sweden)

Fulica atra japonica Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 120. Pl. 77. (1849—Japan)

採集地： 敷香郡西多來加 K. 1936. (山本)・蘭泊 (正田)・眞庭 (東谷)

分 布： 樺太・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・朝鮮・琉球・臺灣
 國外： 北歐州・北西阿弗利加・亞細亞・ハワイ・セレベス・グリーンランド

Order 20. GALLI 鷄 鷄 目

Family 41. TETRAONIDÆ 松鷄科

Genus *Lagopus* Brisson (1760) らいてう屬

277. *Lagopus lagopus lagopus* (Linnaeus)

カラフトライテウ

樺太雷鳥 (樺、禁) 第七十圖 277.

Tetrao Lagopus Linnaeus Syst. Nat. X. ed. 1. P. 159. (1758—Swedish, Lapland)

Lagopus lagopus Okadai Momiyama Annot. Orn. Orient. 1. 3. P. 236. (1928—Sisuka, S. Sakhalin)

Lagopus albus (nec Gemlin) Schrenck Reis. Forsch. Amurl. PP. 395. 396. (1860—Eastern Siberia including Sakhalin)

Lagopus lagopus (nec Linné) Hesse Journ. f. Orn. Lxiii PP. 361. 362. (1915—North, Sakhalin)

Lagopus lagopus kamschatkensis Momiyama t. c. P. 283. (1928—Kamtschatka)

採集地： 知取・新門・敷香

分 布： 樺太

國外： 北歐歐洲・北亞細亞・滿洲

Genus *Tetrao* Linnaeus (1758) おほらいてう屬

278. *Tetrao parvirostris parvirostris* Bonaparte

オホライテウ

大 雷 鳥 (樺、禁) 第七十圖 278.

Tetrao urogalloides Middendorff Sibir. Reise. II. 2. P. 195. Pl. XVIII. (1851—Stanovoi Range and Coast of Ochotsk Sea); Murata Karafuto Dôbutu Hôkoku 1914. P. 176. Pl. X. fig. ♀ 1. ♀ 2.

Tetrao parvirostris Bonaparte Compt. Rend. Acad. Paris. XLII. P. 880. (new name for *urogalloides* Midd.) (1856)

Tetrao urogalloides var. β . *sachalinensis* Bogdanow Consp. Av. Impr. Ross. fasc. 1. P. 122. (1884—Sachalin)

採集地： 氣屯 K. 1929.・新門・半田澤

分 布： 樺太

國外： トランスバイカル・リオコック海間・アムール・北滿洲

Genus *Falciennis* Elliot (1864) かまばねらいてう屬

279. *Falciennis falciennis* (Hartlaub)

カマバネライテウ、クロライテウ (村田)

鎌羽雷鳥 (樺、禁) 第七十圖 279.

Tetrao falciennis Hartlaub Journ. f. Orn. P. 39. (1855—Stanovoi Range)

Tetrao emadensis L. var. *Franklini* (nec Douglas) Schrenck Reis. Forsch. Amurl.

PP. 399, 400. (1860—Coast of Amur, Gulf of Tartary and Sakhalin)

Canace falcipectus (nec Hartlaub) Nikolski Sapiski Imp. Acad. Nauk. Sankt Peterb. P. 248. (1889—Sakhalin)

Tetrao falcipectus (nec Hartlaub) Sharpe Cat. Bds. Brit. Mus. XXII. P. 72. (1893—North-eastern Siberia including Sakhalin)

Falcipectus falcipectus (nec Hartlaub) Hartert Vög. Paläarkt. Fauna III. P. 1886. (1921—Sakhalin Island)

Falcipectus falcipectus muratai Momiyama Annot. Orn. Orient 1. 3. P. 243. (1928—Sisuka)

採集地：敷香 Ⅷ. 1928.・多来加 1910. (村田)

分布：樺太

国外：滿洲北部・アムール・オコツク海南沿岸・スタノボイ連山・トランスバイカル

Genus *Tetrastes* Keyserling & Blasius (1840) えぞらいてう屬

280. *Tetrastes bonasia vicinitas* Riley

エゾライテウ、エゾヤマドリ

松 鷄 (標、獲) 第七十圖 280.

Tetrastes bonasia vicinitas Riley Proc. Biol. Soc. Washington XXVIII. (1915—Hakodate Yezo, Japan)

Tetrao (Tetrastes) Bonasia (nec Linnaeus) Schrenck. Reis. Forsch. Amurl. PP. 400, 402. (1860—Siberia, N. Manchuria and Sakhalin)

Tetrastes bonasia (nec Linnaeus) Nikolski Sapiski Imp. Acad. Nauk. Sankt Peterb. P. 247. (1889—Sakhalin)

Tetrao bonasia (nec Linnaeus) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 78. Pl. VII. fig. ♂ 5. ♀ 6.

Tetrastes bonasia vicinitas (nec Riley) Uchida Bds. Jap. ed. III. 1. June P. 228. Pl. IX. fig. 3. (1922—Hokkaido)

? *Tetrastes bonasia kolymensis* (nec Buturlin) Hand-List Japanese Birds (1922)

Tetrastes bonasia yamashinai Momiyama Annot. Orn. Orient 1. 3. P. 231. (1928—

Sisuka, S. Sakhalin)

採集地：並川 Ⅴ. 1910. (村田)・愛郎 Ⅷ. 1912. (村田)・知取・敷香 Ⅷ. 1928.・野頃・散頃・淺瀬

分布：樺太・北海道

国外：歐洲・西比利亞

Family 42. PHASIANIDÆ 雉 科

Genus *Coturnix* Bonnaterra (1791) うづら屬

281. *Coturnix coturnix japonica* Temminck & Schlegel

ウ ツ ラ

鷄 (標、獲) 第七十一圖 281.

Coturnix vulgaris japonica Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 103. Pl. 61. (1849—Japan)

Coturnix mada Dybowski Journ. f. Orn. P. 337. (1868—Darasun in Dauria)

Coturnix ussuriensis Bogdanow Consp. Av. Imp. Rossicae P. 45. (1884—Ussuriland to Lake Baikal)

Coturnix commutis (nec Bonn.) Murata Karafuto Dōbutu Hōkoku 1914. P. 78.

採集地：鈴谷岳山麓 Ⅷ. 1928. (立花)・大谷 Ⅵ. 1910. (村田)・海馬島 (森本)

分布：樺太・千島・北海道・本州・伊豆七島・四國・九州・對馬・朝鮮・種子ヶ島・屋久島・奄美大島・琉球・臺灣

国外：東部西比利亞・支那・緬甸

追 補

*282. *Otus bakkamoena senutorqus* Temminck & Schlegel

オホコノハヅク

大木葉木兔 Pl. I. fig. 2.

Otus semitorques Temminck & Schlegel in Siebold's Faun. Japon. Aves. P. 25. Pl. 8. (1850—Japan)

Otus bakkamoena linae Floericke Mitt Vogelwelt P. 103. (1921—Nord-Japan)

採集地：真岡郡真岡 21/V. 1936. (小笠原島)

Measurements:—

Exposed culmen	18mm
Height of bill at nostril	11
Wing	180
Tail	78
Tarsus	38
Claw from middle toe third toe	25

分布：樺太・北海道・本州・伊豆七島・四國・對馬・九州・濟州島・朝鮮

樺太産鳥類總計

科	項 目	屬 (Genus)	種及び亞種 (Species and subspecies)
Corvidae	鴉 科	4	7
Sturnidae	椋 鳥 科	2	2
Fringillidae	雀 科	13	26
Alaudidae	雲 雀 科	3	5
Motacillidae	鶺鴒 科	3	8
Certhiidae	木 走 科	1	1
Sittidae	五 十 雀 科	1	1
Paridae	四 十 雀 科	3	6
Laniidae	鵟 科	1	4
Bombycillidae	連 雀 科	1	2
Muscicapidae	鶺鴒 科	4	6
Sylviidae	鶺鴒 科	6	12
Turdidae	鶺鴒 科	6	15
Troglodytidae	鸚 鵡 科	2	2
Hirundinidae	燕 科	3	4
Micropodidae	雨 燕 科	2	2
Upupidae	戴 勝 科	1	1
Coraciidae	佛 法 僧 科	1	1
Alcedinidae	翡翠 科	2	2
Picidae	啄 木 鳥 科	4	9
Cuculidae	杜 鵑 科	1	2
Strigidae	梟 鴞 科	8	12
Falconidae	鷹 鴞 科	6	13
Panidionidae	鸚 科	1	1

科別	項目	属 (Genus)	種及び亞種 (Species and subspecies)
Ciconiidae	鶴科	1	2
Ardeidae	鷺科	6	9
Anatidae	雁鴨科	8	32
Phalacrocoracidae	鸕鷀科	1	2
Procellariidae	海燕科	1	1
Puffinidae	水風鳥科	2	3
Podicipidae	鸕鷀科	1	2
Colymbidae	阿比科	1	3
Columbidae	鳩鴿科	1	1
Scolopacidae	鶺鴒科	15	31
Charadriidae	千鳥科	7	11
Laridae	鷗科	4	11
Stercorariidae	盜賊鷗科	1	3
Alcidae	海雀科	9	14
Balearidae	鶴科	1	3
Rallidae	秧雞科	5	6
Fetraonidae	松雞科	4	4
Phasianidae	雉科	1	1
計	42	148	283

第一圖



1. *Coreus corax behringianus* Dybowski
ワタリガラス (B)



2. *Coreus coronoides japonensis* Bonaparte
エゾハシブトガラス (B)



3. *Coreus corone orientalis* Eversmann
カラフトハシボソガラス (B)



4. *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*
ハシナガホシガラス (B)

第二圖



5. *Nucifraga caryocatactes japonicus*
Hartert (B)
ホシガラス



6. *Garrulus glandarius taeanensis*
Lönnerberg (B)
カラフトミヤマカケス



7. *Perisoreus infaustus sakhalinensis*
Buturlin (B)
アカカケス



8. *Spodiopsar cinereus* (Temminck)
ムクドリ (B)

第三圖



9. *Sturnia philippensis* (Forster) (B)
コムクドリ



10. *Coccythraustes coccythraustes verticalis*
Tugarinow & Buturlin (B)
カラフトシメ



11. *Chloris sinica kawrahiba* (Temminck)
オホカハラヒワ (R.V.)



12. *Chloris sinica sitchitensis* Momiyama
カラフトカハラヒワ (B)

第四圖



13. *Carduelis spinus* (Linnaeus) (B)
マヒワ



14. *Carduelis flammea exilipes* (Coues)
コベニヒワ (W.V.)



15. *Carduelis flammea flammea* (Linnaeus)
ベニヒワ (St.)



16. *Uragus sibiricus sanguinolentus* (Temm. & Schl.) (B)
ベニマシコ

第五圖



17. *Pyrrhula pyrrhula kantschatica*
Taczanowski (St.)
ベニバラウソ



18. *Pyrrhula pyrrhula griseiventris*
Lafresnaye (B)
ウソ



19. *Erythrura erythrura grebnitskii*
(Stejneger) (W.V.)
アカマシコ



20. *Erythrura rosea* (Pallas) (B)
オホマシコ

第六圖



21. *Pivicola enucleator sakhalinesis*
Buturlin (B)
カラフトギンザンマシコ



22. *Loxia curvirostra japonica* Ridgway
イ ス カ



23. *Fringilla montifringilla* Linnaeus
ア ト リ



24. *Passer montanus kaibatoi* Munsterhjelm
カラフトスバメ (B)

第七圖



25. *Passer rutilans rutilans* (Temminck)
ニウナイスバメ (B)



26. *Emberiza leucocephalos leucocephalos*
S. G. Gmelin (R.V.)
シラガホホジロ



27. *Emberiza aureola aureola* Pallas (B)
シマアラジ



28. *Emberiza elegans elegans* Temminck
ミヤマオホジロ

第八圖



29. *Emberiza spodocephala personata*
Temminck (B)
アラジ



30. *Emberiza rustica* Pallas (B)
カシラダカ



31. *Emberiza pusilla* Pallas
コホホアカ



32. *Emberiza variabilis* Temminck
クロジ

第九圖



33. *Emberiza schoeniclus pyrrhulinus*
Swinhoe (B)
オホジュリン



34. *Calcearius lapponicus coloratus*
Ridgway
ツメナガホホジロ



35. *Plectrophenax nivalis nivalis*
(Linnæus)
ユキホホジロ



36. *Calandrella brachydactyla dukhunensis*
(Sykes)
カラフトヒバリ

第十圖



37. *Alauda arvensis pekinensis* Swinhoe
オホヒバリ



38. *Alauda arvensis lönbergi* Hachisuka
カラフトチウヒバリ (B)



39. *Alauda arvensis japonica*
Temminck & Schlegel (B)
ヒバリ



40. *Chionophilus alpestris flavus* (Gmelin)
ハマヒバリ

第十一圖



41. *Anthus hodgsoni berezonskii* Sarudny
ヒンズイ (B)



42. *Anthus rufogularis* Brehm
ムネアカタヒバリ



43. *Anthus spinoletta japonicus*
Temminck & Schlegel (B)
タヒバリ



44. *Maticilla alba lugens* Kittlitz (B)
ハクセキレイ

第十二圖



45. *Motacilla cinerea caspica* (S.G.Gmelin)
キセキレイ (B)



46. *Motacilla flava taiwana* (Swinhoe)
ツメナガセキレイ (B)



47. *Motacilla flava similina* Hartert
マミジロツメナガセキレイ



48. *Dendronanthus indicus* (Gmelin) (B)
イワミセキレイ

第十三圖



49. *Certhia familiaris familiaris*
Linnaeus (B)
キタキバシリ



50. *Sitta europaea clara* Stejneger (B)
シロハラコジフガラ



51. *Parus major uladiwostokensis*
Kleinschmidt (B)
ラナガシジフカラ



52. *Parus major minor*
Temminck & Schlegel
シジフカラ

第十四圖



53. *Parus atricapillus sachalinensis*
Lönnerberg (B)
カラフトコガラ



54. *Parus palustris orii* (Yanashina) (B)
ナリキコガラ



55. *Parus ater amurensis* Buturlin (B)
キタヒガラ



56. *Aegithalos caudatus japonicus* Pražák
シマエナガ (B)

第十五圖



57. *Regulus regulus japonensis* Blkiston
キクイタダキ (B)



58. *Lanius excubitor bianchii* Hartert
オホモズ (B)



59. *Lanius cristatus cristatus* Linnaeus
カラアカモズ



60. *Lanius cristatus superciliosus*
Latham
アカモズ

第十六圖



61. *Lamius borealis*
Temminck & Schlegel
モズ



62. *Bombycilla garrula centralis*
Poljakov
キレンジャク



63. *Bombycilla japonica* (Siebold)
ヒレンジャク



64. *Alcedo latirostris latirostris*
(Raffles) (B)
コサメヒタキ

第十七圖



65. *Hemichlidon griseisticta* Swinhoe
エゾビタキ



66. *Hemichlidon sibirica incerta*
La. Touche (B)
ウスサメビタキ



67. *Siphia mugimaki* (Temminck) (B)
ムギマキ



68. *Zanthopygia narcissina zanthopygia*
(Hay) (St.)
マミジロキビタキ

第十八圖



69. *Zanthopygia narcissina narcissina*
(Temminck) (B)
キビタキ



70. *Acanthopneuste tenellipes* (Swinhoe)
エゾムシクヒ (B)



71. *Acanthopneuste borealis examinandus*
(Stresemann)
オホムシクヒ



72. *Acanthopneuste borealis borealis*
(Blasius) (B)
コムシクヒ

第十九圖



73. *Acanthopneuste borealis xanthodryas*
(Swinhoe) (B)
メボツ



74. *Phylloscopus proregulus proregulus*
(Pallas) (B)
カラフトムシクヒ



75. *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Blyth)
ムヂセツカ (B)



76. *Herbivocula schwarzi* (Radde) (B)
カラフトムヂセツカ

第二十圖



77. *Horeites cantans sakhalinensis*
(Yamashina) (B)
カラフトウグヒス



78. *Locustella fasciolata* (Gray) (B)
エゾセンニウ



79. *Locustella ochotensis ochotensis*
(Middendorffi) (B)
シマセンニウ



80. *Locustella lancolata* (Temminck)
マキノセンニウ (B)

第二十一圖



81. *Aerocephalus histriciceps* Swinhoe (B)
コヨシキリ



82. *Turdus aureus aureus* Holandre (B)
トラツグミ



83. *Turdus sibiricus davisoni* Hume (B)
マミジロ



84. *Turdus sibiricus sibiricus* Pallas
シベリアマミジロ

第二十二圖



85. *Turdus cardis cardis* Temminck
クロツグミ



86. *Turdus pallidus* Gmelin
シロハラ



87. *Turdus obscurus obscurus* Gmelin
マミチャジナイ



88. *Turdus chrysolaus chrysolaus*
Tmeminck (B)
アカハラ

第二十三圖



89. *Turdus cinomus* Temminck (B)
フグミ



90. *Saxicola torquata stejnegeri* (Parrot)
ノビタキ (B)



91. *Ianthia cyanura cyanura* (Pallas)
ルリビタキ (B)



92. *Phoenicurus auroreus auroreus* (Pallas)
ジャウビタキ (B)

第二十四圖



93. *Luscinia calliope cantschatkensis* (Gmelin)
オホノゴマ



94. *Luscinia calliope calliope* (Pallas)
ノゴマ (B)



85. *Larvivora sibilans* Swinhoe (B)
シマゴマ



96. *Larvivora cyane* (Pallas)
コルリ

第二十五圖



97. *Troglodytes troglodytes dauvicius* Dybowski & Taczanowski (B)
カラフトミンサバイ



98. *Cinclus pallasii pallasii* Temminck
キタカハガラス (B)



99. *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli
ツバメ



100. *Delichon urbica schlegii* (Swinhoe)
シベリアイハツバメ

第二十六圖



101. *Delichon urbica dasypus* (Bonaparte)
イハツバメ (B)



102. *Riparia riparia ijimae* (Lönnerberg)
セウドウツバメ (B)



103. *Micropus pacificus pacificus* (Latham)
アマツバメ (B)



104. *Chondestes caudacuta caudacuta*
(Latham) (B)
ハリラアマツバメ

第二十七圖



105. *Upupa epops saturata* Lönnerberg (Bt.)
ヤツガツラ



106. *Eurystomus orientalis calonyx* Sharpe
ブツボウソウ (St.)



107. *Alcedo atthis japonica* Bonaparte (B)
カハセミ



108. *Halcyon coromanda major*
(Temminck & Schlegel)
アカセウビン

第二十八圖



109. *Dryobates major brevisrostris*
(Reichenbach) (St.)
ハシブトアカゲラ



110. *Dryobates major tscherskii* (Buturlin)
キタアカゲラ (B)



111. *Dryobates leucotos saghalinensis*
Yamashina (B)
カラフトオホアカゲラ



112. *Dryobates minor kamschatkensis*
(Molherbe) (St.)
シロハラアカゲラ

第二十九圖



113. *Dryobates minor amurensis* (Buturlin)
コアカゲラ (B)



114. *Dryobates kiziki seebohmi* (Hargitt)
エゾコゲラ (B)



115. *Picoides tridaetylus sakhalinensis*
Buturlin (B)
ミユビゲラ



116. *Dryocopus martius martius*
(Linnaeus) (B)
クマゲラ

第三十圖



117. *Jynx torquilla intermedia* Stegmann
シベリアアリスヒ (B)



118. *Cuculus canorus telephonus* Heine (B)
クワクコウ



119. *Cuculus optatus optatus* Gould (B)
ツツドリ



120. *Nyctea scandiaca* (Linnæus) (B)
シロフクロフ

第三十一圖



121. *Bubo lubo borissowi* Hesse (B)
カラフトワシミミヅク



122. *Bubo blakistoni karajutonis* Koroda
カラフトシマフクロウ (B)



123. *Otus bakkamoena ussuriensis* (Buturlin)
サメイロオホコノハヅク (B)



124. *Otus scops stictonotus* (Sharpe) (B)
テウセンコノハヅク

第三十二圖



125. *Asio flammeus flammeus* (Pontoppidan)
コミミヅク (B)



126. *Aegolius funereus sibiricus* (Buturlin)
キンメフクロフ (B)



127. *Glaucidium passerinum orientale*
Taczanowski (B)
スズメフクロフ



128. *Surnia ulula pallasii* Buturlin (B)
ヲナガフクロフ

第三十三圖



129. *Strix nebulosa sakhalinensis* (Buturlin)
カラフトフクロフ (B)



130. *Strix uralensis tatarica* Momiya
キタフクロフ (B)



131. *Falco peregrinus pectoralis* Ridgway
オホハヤブサ



132. *Falco cherrug mileipes* Jerdon
ワキスチハヤブサ

第三十四圖



133. *Falco rusticolus emulianus* Gmelin
シロハヤブサ



134. *Falco subluteo subluteo* Linnaeus
チゴハヤブサ



135. *Falco columbarius insignis* Clark
コチャウゲンボウ



136. *Aquila clanga fulvescens* Gray
カラフトワシ

第三十五圖



137. *Buteo buteo burmanicus* Hume
ノスリ



138. *Circus cyaneus cyaneus* (Linnaeus)
ハイイロチウヒ



139. *Accipiter gentilis schvedowi*
(Menzbier)
オホタカ



140. *Accipiter virgatus gularis*
(Temminck & Schlegel)
ツミ (♀) エツサイ (♂)

第三十六圖



141. *Accipiter nisus nisosimilis* (Tickell)
ハイタカ



142. *Haliaeetus albicilla albicilla*
(Linnaeus) (B)
ラジロワシ



143. *Haliaeetus pelagicus pelagicus* (Pallas)
オホワシ (B)



144. *Haliaeetus pelagicus pelagicus*
(Pallas)
オホワシ (B)

第三十七圖



145. *Ciconia nigra* (Linnaeus) (St.)
ナベカフ



146. *Ciconia boyciana* Swinhoe (St.)
カフノトリ



147. *Ardea cinerea rectirostris* Gould
アラサギ



148. *Ardea purpurea ussuriensis* (Shulpin)



149. *Egretta intermedia intermedia*
(Wagler) (Rv.)
チウサギ



150. *Nycticorax nycticorax nycticorax*
(Linnaeus) (St.)
ゴキサギ



151. *Gorsakius gaisagi* (Temminck) (St.)
ミゾゴキ



152. *Izobrychus eurhythmus* (Swinhoe)
オホヨシゴキ (St.)



153. *Izobrychus sinensis sinensis* (Gmelin)
ヨシゴキ



154. *Botaurus stellaris stellaris* (Linnaeus)
サンカノゴキ (Rv.)



155. *Cygnus cygnus* (Linnaeus) (B)
オホハクテウ



156. *Cygnus bewickii jankowskii*
Alpheraky (B)
ハクテウ



157. *Cygopsis cygnoid* (Linnaeus)
サカヅラガン



158. *Anser albifrons* (Scopoli)
マガン



159. *Anser erythropus* (Linnaeus)
カリガネ



160. *Anser fabalis serrirostris* Swinhoe
ヒシクヒ



161. *Anser fabalis sibiricus* (Alphéraky)
オホヒシクヒ



162. *Branta bernicla nigricans* (Lawrence)
コクガン



163. *Anas platyrhynchos platyrhynchos*
(Linnaeus)
マガモ



164. *Anas poecilorhynchos zonorhynchos*
Swinhoe (B)
カルガモ

第四十二圖



165. *Anas strepera* Linnaeus (Rv.)
ヲカヨシガモ



166. *Querquedula ereca ereca*
(Linnaeus) (B)
コガモ



167. *Querquedula formosa* (Georgi)
トモエガモ



168. *Querquedula querquedula* (Linnaeus)
シマアヂ

第四十三圖



169. *Querquedula falcata* (Georgi)
ヨシガモ



170. *Mareca penelope* (Linnaeus)
ヒドリガモ



171. *Dafila acuta acuta* (Linnaeus)
ヲナガガモ



172. *Spatula dypeata* (Linnaeus)
ハシビロガモ

第四十四圖



173. *Aiz galericulata* (Linnaeus)
ラシドリ



174. *Nyroca ferina ferina* (Linnaeus) (Rv.)
ホシハジロ



175. *Nyroca fulviflata* (Linnaeus) (B)
キンクロバジロ



176. *Nyroca marila mariloides* (Vigors)
スズガモ

第四十五圖



177. *Bucephala clangula clangula* (Linnaeus)
ボネジロガモ



178. *Clangula hyemalis* (Linnaeus)
コネリガモ



179. *Melanitta fusca stejnegeri* (Ridgway) (B)
ピロウトキンクロ



180. *Melanitta nigra americana* (Swainson)
クロガモ

第四十六圖



181. *Histrionicus histrionicus pacificus*
Brooks
シノリガモ



182. *Somateria spectabilis* Linnaeus
ケワタガモ



183. *Mergellus albellus* (Linnaeus)
ミコアイサ



184. *Mergus serrator* Linnaeus
ウミアイサ

第四十七圖



185. *Mergus merganser merganser* Linnaeus
カハアイサ



186. *Phalacrocorax carbo hanedae* Kuroda
カハウ



187. *Phalacrocorax pelagicus pelagicus*
Pallas
ヒメウ



188. *Oceanodroma furcata* (Gmelin) (Rv.)
ハイイロウミツバメ

第四十八圖



189. *Puffinus leucomelas* (Temminck)
オホミヅナギドリ



190. *Puffinus tenuirostris* (Temminck)
ハシボリミヅナギドリ



191. *Fulmarus glacialis rogersii* Cassin
フルマカモノ



192. *Podiceps griseigena holboellii* Reinhardt
アカエリカツブリ

第四十九圖



193. *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm
ハジロカツブリ



194. *Colymbus arcticus veridigularis* (Dwight)
オホハム



195. *Colymbus arcticus pacificus* Lawrence
シロエリオホハム



196. *Colymbus stellatus* Pontoppidan
アビ



197. *Streptopelia orientalis orientalis*
(Latham) (B)
キジバト



198. *Lobipes lobatus* (Linnaeus)
アカエリヒレアシシギ



199. *Tringa ochropus* Linnaeus
クサシギ



200. *Tringa glareola* Linnaeus
タカブシギ



201. *Tringa incana brevipes* (Vieillot)
キアシシギ



202. *Tringa hypoleucos* Linnaeus (B)
イソシギ



203. *Tringa erythropus* (Pallas)
フルシギ



204. *Tringa totanus eurhinus* (Oberholser)
アカアシシギ (Rv.)

第五十二圖



205. *Glottis stagnatilis* (Bechstein)
コアアアシギ



206. *Glottis nebularius* (Gunnerus)
アアアシギ



207. *Pseudoglottis guttifer* (Nordmann)
カラフトアアシギ



208. *Terekia cinerea* (Güldenstädt)
ソリハシギ

第五十三圖



209. *Limosa limosa melanuroides* (Gould)
ラグロシギ



210. *Limosa lapponica baueri* Naumann
オホソリハシギ (B)



211. *Numenius arquata orientalis*
Brehm (R.v)
ダイシャクシギ



212. *Numenius cyanopus* Vieillot
ホウロクシギ

第五十四圖



213. *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli)
チウシヤクシギ



214. *Numenius minutus* Gould (Rv.)
コシヤクシギ



215. *Calidris canutus rogersi* (Mathews)
コヲバシギ



216. *Calidris tenuirostris* (Horsfield)
ヲバシギ

第五十五圖



217. *Erolia alpina sakhalina* (Vieillot)
ハマシギ



218. *Pisobia minuta ruficollis* (Pallas)
トウウネン



219. *Pisobia minutilla acuminata* (Midlendorffi)
ヒバリシギ



220. *Pisobia acuminata* (Horsfield)
ウツラシギ

第五十六圖



221. *Limicola falcinellus sibirica* Dresser
キリアイ



222. *Eurymorhynchus pygmaeus* (Linaeus)
ヘラシギ



223. *Crocethia alba* (Pallas)
ミユビシギ



224. *Scolopax rusticola* Linnaeus (B)
ヤマシギ

第五十七圖



225. *Capella solitaria* (Hodgson)
アラシギ



226. *Capella gallinago gallinago* (Linnaeus)
タシギ



227. *Capella megala* (Swinhog)
チウヂンギ



228. *Capella stenura* (Bonaparte)
ハリヲシギ



229. *Squatarola squatarola hypomelaena* (Pallas)
ダイゼン



230. *Pluvialis apricarius fulvus* (Gmelin)
ムナグロ



231. *Eudromias morinellus* (Linnaeus)
コバシチドリ



232. *Charadrius leschenaultii leschenaultii* Lesson (St.)
オホメダイチドリ



233. *Charadrius mongolus mongolus* Pallas
メダイチドリ



234. *Charadrius alexandrinus dealbatus* (Swinhoe)
シロチドリ



235. *Charadrius hiaticula tundrac* (Love)
ハジロコチドリ



236. *Charadrius dubius euronicus* Gmelin
コチドリ



237. *Vanellus vanellus* (Linnaeus)
タゲリ



238. *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe
ミヤコドリ



239. *Arenaria interpres interpres* (Linnaeus)
キヤウジョシギ



240. *Chlidonias leucoptera* (Temminck)
ハジロクロハラアヂサシ



241. *Sterna hirundo longipennis* Nordmann (B)
アヂサシ



242. *Sterna aleutica* Baird (B)
コシジロアヂサシ



243. *Larus argentatus vegae* Palmén
セグロカモメ



244. *Larus schistisagus* Stejneger (B)
オホセグロカモメ

第六十二圖



245. *Larus casus major* Middendorff
カモメ



246. *Larus crassirostris* Vieillot (B)
ウミネコ



247. *Larus hyperboreus* Gunnerus (B)
シロカモメ



248. *Larus ridibundus sibiricus* Buturlin
ユリカモメ

第六十三圖



249. *Larus sawadersi* (Swinhoe)
ヅクロカモメ



250. *Rissa tridactyla palliaria* Stejneger (B)
ミツユビカモメ



251. *Stercorarius pomarinus nutcheri* (Mathews)
トウゾクカモメ



252. *Stercorarius parasiticus parasiticus* (Linnaeus)
クロトウゾクカモメ