

下





新錄丹溪朱先生醫書管祭要卷之四

○腰痛第廿八 附腎着

有腎虛有痰血有溫熱有挫閃有痰

脉又沉而弦沉為滯弦為虛沉而弦本劉立之所論彼以風寒濕

滑者是痰血緩者是溼滑者或伏者是痰夫者是腎虛

腰者腎之府經曰搖動不能腎將憊矣戴氏曰疼之不宜補腎用

杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之類猪脊髓丸

痰血戴氏曰日輕宜行血順氣用補陰丸加菝仁紅花更宜加順

委中在胸中失出血以其血滯於下也

溫戴氏曰遇天陰或宜燥濕行氣用黃柏杜仲蒼朮川芎之類

痰宜商星半夏加扶氣藥佐之使痰隨氣運





諸腰痛六不宜用補氣藥六不宜峻用寒涼兼氣虛非補不可者

耳痛雖屬火得寒則閉遏而痛甚故各條云順氣行氣快氣生溫散也

腰曲不能轉者鍼人中妙

腎着為病其體重腰冷如水飲食如故小便自利腰已下冷痛如帶五千錢出三方治宜流瀝兼用溫散

附方

●摩腰丹 治寒溼腰痛

附子尖 烏頭尖

南星各二 硃砂各半

乾姜各一

雄黃

樟腦

丁香各半 射香各五

右為末蜜丸圓眼大每一丸姜汁化開如粥厚烘熱置掌中摩腰上令盡粘有肉烘綿衣縛定腰熱如火間三日用一丸

妙或加茱萸桂

●煨腎丸 治腎虛腰痛

杜仲三

為末以猪腰子一枚薄批五七片以鹽椒淹去腥

水搽藥末在內包以荷葉外加溼紙煨熟酒下

●補腎丸 治腎虛腰痛

●腎着湯

乾姜炮

茯苓各四

甘草灸

白木各二

右剉每服四錢水煎空心服

○脇痛第廿九

屬肝木氣實火盛有死血有痰亦有鬱而胃脇痛者其脈沉應當以六鬱法治木氣實用川芎蒼木青皮



肝火盛用芎歸龍會丸瀉火要藥謂治內有濕熱而脇痛甚

左金丸瀉肝火行溼為熱甚之反佐

死血宜破血行氣用雷尖菔仁紅花川芎香附之類

肝急辛以散之用撫芎蒼朮或小柴胡又曰脇痛發寒熱者小柴胡湯

左脇痛以柴胡為君佐使

兩脇走痛或可用控涎丹有痰積者可用痰在脇下非白芥子不能達故也

咳嗽痛者二陳加南星蒼朮青皮青黛汗

氣弱人脇下痛脉細緊或弦多從勞後怒氣得者八物湯加木香

青皮或又加官桂

去滯氣用青皮青皮乃肝膽二經之榮人多怒脇下有鬱積固宜

以解二經之實若一經氣不足者先芎補血少加青皮可也

肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣柴胡黃芩退熱木香

青皮調氣如瘦人寒熱脇痛多怒者又有瘀血宜菔仁紅花柴

胡青皮大黃

發寒熱脇痛似覺脊積塊又是飲食大飽勞力所致又用龍會丸解痛外以琥珀膏貼之又方芥菜子水研汁又方以茱萸醋研汁

又方以韭菜炒熨

附方

●芎歸龍會丸

芎歸 龍胆草 梔子仁 黃芩 黃連各一 大黃

芎歸 青黛各五 木香二分 射香五分

右為末炒神曲糊丸每二十九丸姜湯下一方加柴胡五錢青



皮一兩如熱甚者炒熱服之

●推氣散 治右脇痛疼脹滿不食

片姜黃 枳殼炒 桂心各五 甘草炙三 ○右為末

●枳芎散 治左脇疼痛不可忍

枳實炒 川芎各五 粉草炙一

右為末每服二錢姜枣湯或酒調下

○諸氣第四十

周流一身以為生者氣也苟內無所傷外無所感何病之有今冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而轉成劇病局方類用辛香燥熱之劑以火濟火咎將誰歸

氣無補法世倍之言也以其為病痞悶壅塞似難於補不思正氣虛者不能運行邪滯自而不出所以為病經曰壯者氣行則愈怯者着而成病苟或氣怯不用補法氣何由行

冷生氣者高陽生之謬言也病人自覺冷氣自下而上者非置冷也蓋上升之氣自肝而出中挾相火自下而出其熱為甚火極似水陽穴陰微也

氣有餘便是火

調氣用木香然木香味辛氣能上升如氣鬱而不達固宜用之若陰火衝上而用之則反助火邪矣故又用黃柏知母而少用木香佐之

稟受素壯而氣刺痛當用枳殼烏藥若因氣不舒而刺痛當用木



香調達之若肥白人氣刺痛者當為人參白朮加枳殼木香  
解五藏結氣益少陰經血用梔子火令將黑為末以薑汁入湯同  
煎飲其效甚捷

附方

●清膈丸 治因溼熱氣虛

黃芩

黃連

各五

香附

一兩

蒼朮

三兩

右為末新取熟瓜蒌去皮搗爛和丸菜豆大每服三五十九  
溫湯下

●正氣天香散

香附

八

陳皮

烏藥

紫蘇葉

各一

甘草

乾姜

各一

○右剉水煎服

●木香檳榔丸

木香

檳榔

青皮

陳皮

去

黃柏

莪朮

枳殼

黃連

大黃

牽牛

頭

香附

各一

當歸

當歸

一兩

五

各

○右為末水下

●蘓合香丸

沉香

射香

訶子

丁香

青木香

安息香

香附

萹揆

白朮

白檀

各二

薰陸香

蘓合油

龍腦

各一

硃砂

烏犀角

各制

右為末入研極勻用安息香膏并煉蜜丸梧子大溫湯下四

●蘓子降氣湯

當歸

甘草

炙

全胡

厚朴

去皮

姜制



陳皮 桂去皮各 半夏曲 紫蘓子各

右剉加姜枣水煎服

○疝第四十一

疝氣畢九連小腹急痛也有痛在澤丸者痛在五樞穴邊者皆是厥陰之經也或無形無聲或有形如瓜有聲如蛙自素問而下皆以為寒蓋寒主收引經絡得寒則引而不行所以作痛然亦有陽冰涉水終身不病此者無熱在內故也大抵此證如於溼熱在經鬱而至久又得寒氣外束不得踈散所以作痛若只作寒論恐為未備或曰厥陰經鬱積溫熱何由而致予曰大勞則火起于筋醉飽則火起于胃房勞則火起于腎大怒則火起于肝火積之久母能令子虛溼氣便盛濁液凝聚并入血隧流于

厥陰厥陰屬木係於肝為將軍之官其性息速火性又暴為寒所束宜其痛之大暴也有以烏頭梔子作湯服之其服亦敏後因此方隨形証加減與之無不驗但溫熱又須分多少而治溫則腫多瘡病是也又有挾虛而發者當以參朮為君疏導藥佐之脉甚沉緊而豁大無力者是也其痛亦輕但重絕牽引耳

經有七疝寒水筋血氣孤瘡也寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控澤丸而痛得于寒經使內過勞

也宜以溫劑下之水疝腎囊腫痛陰汗時出囊或腫如水晶或痒而癢出黃水或小便腹按之作水聲得於飲水醉酒使內過多汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多也宜以逐水之劑下之筋疝陰莖腫脹或膿或痛裏急筋縮或莖中痛又極則痒或挺縱不收或白物如精久而得於房勞及邪術所使宜以瀉心火之劑下之血疝其狀如黃瓜在小腹兩旁棟骨兩端約中倍云便難也得於重感春夏大癩勞於使內氣血流溢參入疝囊宜以和血之劑下之氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒氣鬱而脹以針出氣而愈然針有得失宜以散氣藥下之或小兒有此倍曰偏氣得於其久陰衰精虛此疝不治惟藥宿



一穴內踝上五寸端分內灸五壯針三分言之孤疝其狀如疝  
取則入小腹行立則出小腹入囊中孤則登出穴而溺夜則入  
穴而不通此疝與孤相類宜以逐氣流經之藥下之瘕疝陰囊  
腫變如升如斗不痒不痛得之地氣卑經故立推人多有之宜  
以去經之藥下之此論七疝之証至為詳悉  
俱其中法一以攻下之劑徐用誠嘗試之矣

專主肝經與腎經絕無相干

疝不可下 或又曰宜到倉

劫藥神效蓋溼熱因寒鬱而發用梔子以降溼烏頭以破寒鬱况

二藥皆下焦之藥而烏頭為梔子所引其性急速不容胃中停

留下 一方又謂按之不痛者屬虛瀆如桂枝以姜汁丸服

宜灸大敦穴 足大拇指甲后一韭葉聚毛間灸三壯

定疝痛用海石香附為末姜汁調下

一方治諸疝定疼痛速效用枳核山梔糖毬茱萸各炒濕威者加

荔枝核 炒為末丸服一法用長流水調末空心服一二升

食積與瘀血成痛者 一又云小腸痛有瘀血有積熱 梔子 栳仁 山查 枳實 茱萸 為

末順流水入姜汁作湯調服

治陽明受溼熱傳入太腸惡寒發熱小腹連毛際枳核悶痛不可

忍用山梔 栳仁 枳核 並炒 山查 等分入姜汁煎服 一方栳仁十四

炒山梔子九枚去皮茱萸十粒山查子十四個並炒

瘡而不痛者用蒼朮 神曲 白芷 山查 川芎 枳子 半夏

瘡非痛斷房事與厚味不可用藥 食色之慾尤病宜謹以此則丹

附方

●治疝方

蒼朮 香附 各鹽炒 黃柏 酒炒已 青皮 玄胡索



益智 菘仁為臣 茴香為佐 附子燼 甘草為使  
右剉水煎服后一痛過則不再作矣

●五葉湯

枇杷葉 椒葉 蒼耳葉 野紫蘊葉  
水晶葡萄葉 右以水煎洗

●疝氣神方 其病甚至氣上衝如有物築塞心藏欲死手足冷者二三服除根

硫黃火中溶化即投水中去毒研細 荔枝核為末炒 陳皮分

右為末飯丸梧子大每服十四五丸酒下其疼立止自覺已疼甚不能支持略用六丸再不可多也

○脚氣第四十二

脚氣從溼從下須提起其溼在下之藥隨氣血用

治溼治氣紫蘊黃柏炒 芍藥木瓜澤瀉木通防已 檳榔蒼木根  
甘草香附剉 活痛多加木香腫多加大腹皮發熱加黃連大黃  
痛除腫退即罷藥

●防已飲

黃蘗酒炒 蒼木鹽炒 白木 防已 生地黄 黃連  
檳榔 川芎 犀角 甘草節 木通

右剉水煎服有熱加黃芩熱甚及天冷熱加石膏痰加竹瀝  
姜汁或南星便秘加菘仁小便瀝加牛膝

●健步丸

蒼木 歸尾各一 生地黄 陳皮 芍藥各一



牛膝五分 大腹子三 茱萸 條苓各五 桂枝仁

右為末餅丸每服一百丸白木通草煎湯食前下

脚氣衝心宜四物湯加炒黃柏再於湧泉穴用附子津伴貼以艾灸泄引其熱

有食積流注蒼朮防已黃柏南星川芎白芷犀角檳榔血虛加牛膝龜板酒糊丸服

轉筋皆屬血熱四物加酒苓紅花煎服筋動於足大指上至大腿近腰結了奉養厚因風寒而住又加蒼朮南星

一婦足腫用生地黄又柏蒼朮南星紅花牛膝龍膽草川芎治之如常腫專主乎溼熱肥人加痰藥

○痛風第四十二 附風孿強症

痛風屬風熱屬溼屬血氣

痛風四肢骨節走痛也他方謂之白虎歷節風

大率因血受熱已自沸騰或再涉冷受溼取涼熱血得寒汚濁凝

溼一云不所以作痛夜痛甚行於陰也治以辛熱之劑流散寒

溼得運行溼開腠理則血行氣和而愈然亦有數種治法不能無少異

也

因溼痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非烏附氣壯不能行故用為引經若以為主治非惟無益而有殺人之毒此病火行

氣流溼舒風導滯血補新血降陽升陰治有先后須明分腫與不腫可也不可食肉又屬陽大能助火素有火盛者小水不能

制若食肉厚味下有遺溺上有痞悶雖魚麩醬醋酒皆斷之先



以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黃連降心火者任何應而為之區處

大法用蒼朮南星川芎白芷當歸酒黃芩在上者加羌活桂枝桔梗威靈仙在下者加牛膝防己木通黃柏一方四物湯與秦仁

台正尤胆草在上屬風在下屬溼加藥同俱倍之桂等分无括梗氣虛加參朮龜板痰加南星血虛加芎歸佐以菝仁紅花

因痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮

因溼者用蒼白朮之類佐以竹瀝及行氣藥或曰有溼鬱而周身走痛者或關節間痛

遇陰寒即發尚作溼鬱治

因於風者小續命湯極驗

因血虛者用芎歸之類佐以菝仁紅花

肥人多是溫與痰飲流注經絡脉又瘦人多是血虛與熱脉又

因有溼腫痛防己龍膽草黃柏知母固是捷藥若肥人病發宜

蒼白朮南星滑石茯苓之類瘦人宜當歸紅花菝仁牛膝枳殼

等同用

薄桂味淡能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處威靈仙治上體

痛風虛弱勿用

治上中下痛風黃柏酒炒蒼朮酒炒南星各二兩神曲炒台芎各一

兩防己白芷菝仁各五錢威靈仙酒洗桂枝橫行手臂羌活各三

錢龍膽草五分酒紅花一錢五分為末曲糊丸食前下一百丸

氣血兩虛有痰濁陰火痛風人參山藥海石南星各一两白朮熟

地黃又柏黑龜板各二兩乾姜燒鎖陽各五錢為末酒糊丸

肢節腫痛又屬火腫屬溼兼受風寒而發動于經絡之中溼熱流



注肢節之間而無已也。用麻黃去根、羌活、獨活、白芷、蒼朮、威靈仙、片苓、枳實、桔梗、葛根、川芎各五分。甘草、歸頭、升麻各三分。下焦加酒炒黃柏、煩人加酒炒紅花、腫多加換柳、大腹皮、澤瀉、更加沒藥一錢。定痛尤妙。一云脈溼數者有麻血宜

●二妙散 治筋骨疼痛因溼者

黃蘗炒 蒼朮米泔浸炒

右為末，沸湯入姜汁調服。二味皆雄壯之氣，表實氣實者加酒少許佐之。有氣加氣藥，血虛加補血藥，痛甚者加生姜汁熱服之。

●替行散

黃柏酒浸為末，入湯藥調服。

醫痛是上焦溼橫行經絡，用半夏、酒芍、白朮、南星、香附各一錢，陳皮、茯苓各五分，蒼朮一錢半，威靈仙二錢，甘草少許煎服。一方

湯加酒 今卷法

治痛風用黃躑躅即羊躑躅取根一把，糯米一盞，黑豆半盞，酒水各一

椀煎徐服之。大吐大瀉一服，能行動。甘草末。

倍人用草藥取速效者，如用兔絲為君，過山朮等佐之，皆性熱而燥，不能養陰，却能燥溼病之淺者。溼痰得燥而開，熱血得熱而行，故亦取效。若病深而血少者，則愈却愈虛，而病愈深矣。草醫不識

藥性病情多因遇中遂秘術 其能設人多矣知者戒之

一老人性急，作勞兩腿痛甚，此兼虛証，宜溫補。與四物湯加菟仁。



陳皮牛膝生甘草入生姜研潛行散熱飲三四十貼而安

一婦性急味厚痛風攣數月以挾痰與氣尚和血味氣導痰以潛

行散入生甘草牛膝炒枳殼通草陳皮菴仁姜汁煎服半年愈

一少年患痢用潤藥取效致痛風叫號此惡血入經絡也血受濕

熱凝濁所下未盡番滯隧道久則又成痛枯與四物湯加菴仁

紅花牛膝黃芩陳皮生甘草煎入生姜研潛行散入酒飲之數

十貼又刺委中出黑血三合而安

已上三人正所謂病有數種而治法少異也

一人貧勞秋深渾身發熱手足皆疼如蝦日輕夜重服風藥愈痛

氣藥不効脉濇而數右甚於左飲食如常形瘦益大痛而瘦非

病也用蒼朮酒黃柏各一錢半生附一片生甘草三分麻黃五

分研菴仁九个煎入薑汁令辣熱服四貼去附加牛膝一錢八

貼後氣喘痛略減意其血虛因多服麻黃陽虛被發動而上升

當補血積唾以酸收之以四物倍川芎芍藥加人參二錢五味

十二粒與二貼喘定三日後脉減大半瀦如舊仍痛以四物加

牛膝參朮菴仁陳皮甘草枳榔生姜五十貼而安后因負重復

痛食少前藥加黃芪三分二十貼愈

一人患背脾縫一線痛起上膂骨至胃前側脇而止晝夜不住脉

數重取左豁大於右意其背脾小腸經胃脇胆經也又思慮傷

心又藏未病而小腸府先病故痛從背脾起及慮不能決乃婦

之胆故痛至胃脇乃小腸火乘膽木子來乘母是為實邪果因

謀事不遂用人參四分木通二分煎湯為使吞龍膽丸數服而

愈



一壯年味厚多怒秋間於髀樞左右發痛一點延及膝髀痛處惡寒晝靜夜劇口或渴膈或痞醫用補血及風藥至春痛甚食減形瘦膝腫如枕脉弦大頗實數寸濇甚大作飲食痰積在太陰陽明治之以炒藥一兩生甘草稍生犀角青鹽炒蒼朮各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥五錢遇暄熱加黃芩二錢為末每三錢與姜汁同研細煎令帶熱食前服之日夜四次半月后脉減病輕去犀角加牛膝春夏用葉秋冬用根葉汁尤妙龜板歸身尾各五錢如前服又半月腫減食增不惡寒于脚痿軟去蒼朮黃芩夏加炒藥一兩半中年人加生地黃五錢冬加桂茱萸病愈

一村夫皆偃倭足攣成廢疾脉沉弦而濇以煨腎散并逐末一食與之上吐下瀉過一月又使吐瀉交作凡三四貼而愈

一人項強動則微痛脉弦而數實右為甚子任痰熱客太陽聖治之用二陳湯加酒浴黃芩羌活維花愈

○痿第四十四

內經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明蓋肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性溼居中而主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此雖然天產任陽厚味發熱丸



病痿者若不淡薄食味又不能保其全安也

內經論風論痿各有篇目源流不同風為外感痿為內傷或云痺

丹溪痺入痛風中治法迥異局方以治風之藥通治

諸痿何其謬哉

溼熱有痰有血虛有氣弱亦有死血者有食積妨碍不降者上文

起于肺熱實痿之本論治法之大要也而此云然者

東垣取黃柏為君黃芪等補藥輔佐以治諸痿無一定之方有兼

痰積者有溼多熱多者有溼熱相伴者有挾氣者臨病製方其

善于治痿者乎

溼熱東垣健步丸加燥煙降火之劑黃蘗黃蒼朮

溼痰二陳湯加蒼白朮黃芩黃柏之類入竹瀝姜汁

血虛四物加蒼朮黃柏下補陰丸

氣虛四君子加蒼朮黃芩黃柏已上方治雖所主有不同而降火

黃蘗蒼朮治痿要藥也

虎潛丸補腎丸治痿

一人形肥味厚憂怒脉常沉濇春病痰氣醫用燥熱香竄之藥至

憂足弱氣上衝食減此熱鬱而脾虛痿厥雖形肥脉沉未嘗死

但藥邪并火旺難治且與竹瀝下白朮膏盡二斤氣降食進至

一月后仍大汗而死

一人脚常覺熱后患痿詳見三

附方

●東垣健步丸 專治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步



艱難

羌活

芫胡

滑石

炒

甘草

瓜蒌根

酒洗

肉桂

各五分

防風

澤瀉

各三分

防已

酒洗

川烏

若參

酒浸各二分

右為末酒糊為丸梧子大每用七十九空心服原方用愈

○手麻木第四十五

手麻是氣虛木是溼痰死血

十指麻木胃中有溼痰死血

○耳病第四十六

耳聾屬熱少陽厥陰熱多

一云亦有氣閉者亦有熱氣閉者耳不鳴

治聾用草麻子四十九粒束肉十枚入人乳搗膏石上晒乾丸如

梧子大綿裹塞耳中又方用雄鼠膽汁滴入耳中尤妙仍開痰

散風熱

大病后耳聾與陰虛火動而聾者宜降火以四物主之

耳鳴宜芎歸龍會丸多飲酒人宜木香檳榔丸

耳痛以茱黃烏尖大黃為末窞湧泉穴在足心又方枯白礬吹入耳

中青箬燒灰吹入尤妙

聾耳膿出用葉蝶蛸一个灸射二分為末摻之又加染坯枯礬吹

之良

附方

治蟲入耳中香油灌入即出或駱牛乳或雞冠血皆妙

蔓京子散 專治上熱耳出膿汁



甘草炙 升麻 木通 赤芍藥 甘菊 赤茯苓

桑白皮炒 麥門冬去心 生地黄 前胡 蔓京子

右剉各等分每服三錢加姜棗水煎服

一方治耳熱出汗

石膏 硝 天花粉 防風

右為末摻入耳中

○目病第四十七

目病屬風熱血少目得血而能視神勞目者神之主腎虛目者腎之竅

劉河間曰在府則為表當除風散熱在藏則為裏當養血安神如

暴失明昏瀝翳膜眵淚班入眼皆表也風熱也一云班入服此

表宜表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花瞳散皆裏也

血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

墮子散大皆辛熱之為也標辛主散熱乘之當除風熱涼血益血

以收耗散之氣芩連苦寒除邪氣之盛為君歸身地黃養血涼

血為臣五味酸寒體浮收瞳散地骨皮天門冬瀉熱補氣或用

滋陰地黃丸妙

久病昏暗以熟地黃歸根為君羌活防風甘菊之類佐之

暴發赤腫以防風黃芩為君以瀉火黃連當歸為佐以養血羌活

芎胡升麻白芷甘草為使白睛紅加白豆蔻少許又方治血熱

壅痛四物加龍膽草防已防風羌活一云實熱上冲眼痛用黃連瀉火當歸補血

勞役飲食不節內障昏暗用蔓京子湯蔓京子黃芪人參甘草黃

柏白芍藥酒炒又用四物加酒炒芩連柏等藥



眼痛用生地黄酒浸搗爛罨眼上用草烏南星桂枝乾姜為末醋調貼兩足心時用牛膝膏洗眼

肥人風熱上壅目痛宜防風羌活京芥酒芥以散其溫熱瘦人眼痛乃是血少兼熱須用養血藥少加風藥當歸酒生地黄玄參川芎防風京芥菊花

一壯年人早起忽視物不見就睡片時畧見而不明食減倦甚脈緩大重則散而無力意其受溼所致詢之果卧溼地半月遂以白朮為君黃芪茯苓陳皮為臣附子為使十餘貼而愈

一老人忽盲他無所苦予以太虛治之急煎人參膏二斤服二日一醫與青磁石藥予曰今夜死矣果然

一人形實好熱酒忽目盲脉潛此熱酒所傷胃氣汗濁血死其中而愈

附方

●滋陰地黄丸 即熟地黃丸

芎胡八 天門冬 炙甘草 枳殼 地骨皮 黃連

五味各三 人參二 歸身酒洗 焙乾 黃芩各五

熟地黄一 生地黄五

右為細末煉蜜為丸菜豆大每服百丸茶清下

●秘方撥雲退翳丸 又名神仙退雲丸治一切翳障昏無時累効

瓜蒌根 枳實 甘草炙 蔓京子炒 薄荷五 川芎



木賊童便浸一宿 蜜蒙花 荆芥穗 地骨皮 甘菊花

白蒺藜 羌活各一 蛇蛻 蟬蛻 黃連各二

川椒七升半 炒去核 尚歸一升 酒浸培乾

右為細末煉蜜丸每兩作十九丸每服一九食後臨卧自進三

服翳者米飲下晴暗尚歸湯下內障木香湯下退雲丸有犀

黃一升無蔓京于甘草川椒婦人尚歸湯下有氣木香湯下

●羊肝丸 治一切目疾不問障膏

白乳羊肝一具以竹刀去膜 黃連一升 甘菊花 防風 京芥

薄荷去梗 羌活 尚歸 川芎各三

右為末羊肝搗丸漿水下

●春雪膏 點赤眼

朴硝置豆腐上蒸化待流下為器盛之

爛翳驗方

茜根燒灰燈草點之須臾大痛以百節草刮去之方治痘瘡

後目上翳

穀精草 蛇蛻 菜豆殼 天花粉

右為末粟米泔浸煮待水乾為度食之

●地芝丸 治不能遠視能近視此除大風熱

生地黃 天門冬各四 枳殼炒 甘菊各三

右為末煉蜜丸茶酒任下

●定志丸 治不能近視又能遠視

●眼睫方 即刺睫



木鼈子一个去殼為末裹塞鼻中左眼塞右又眼塞左一二夜其睫自分上下

●點眼藥 治赤眼風熱壅痛風眩諸翳障

芩甘石

一刀煨如鴨頭色以好醋少滴之 入下藥并研珍珠研

辰砂

乳香過麈頭和研 沒藥各一 硃砂二

熊膽無則 膽礬

輕粉各二片腦 麝香各一

右為末篩過再研極細磁器密收

○口病第四十八

脾熱口甘三黃丸治之

膽熱口苦謀慮不決口苦芫胡湯加麥門冬酸東仁地骨皮遠志

口瘡用西瓜水徐飲之無時以瓜皮燒灰噙之又方細辛黃柏

炒等分為末搽舌上吐涎又方好酒煮黃連呷下立愈又方焰

硝硼砂含口不開以南星醋調付湧泉心腎神效又方五倍子一

兩黃檗蜜炙滑石各五錢銅綠末糝

口瘡服涼藥不愈者乃中焦氣不足虛大汎上無制用理中湯甚

加附子或用官桂噙之亦妙

去口瘡白礬

枯 沒藥乳香銅綠為末糝之白口瘡雄黃沒藥乳香

各一錢輕粉五分巴豆霜為末糝

實熱生瘡涼膈散甘桔湯

一小兒口瘡不下食眾以狐惑治之又死後以礬湯於脚上浸半

日頓寬以黃栢蜜姜蚕炒為末付立下乳而安

唇緊燥烈生瘡用青皮燒灰楮脂調付夜卧頭垢付亦可



口糜野薔薇根煎湯一云白薔薇根汁嗽之良

○喉病第四十九

喉瘟多屬痰重者宜用吐法或只以桐油或燈油脚鵝翎探吐之  
輕者用新取園中李實根禽之更以研水付項上按本草蠶實即馬簡子能  
療疾瘴以花葉根煮沖含細心燕之以云園中李實根誤也或  
徐氏又疑蠶實非馬簡今只以效驗試之則知其是否也  
用射干逆流水吐之

纏喉風屬痰熱亦宜探吐之又方用遠志去心為末調付項上又  
方用燈心草燒灰吹入喉中

咽喉痛京芥當歸桔梗甘草煎湯溫嗽服之有熱加黃芩枳殼宜

刺少商

在手大指端內側去爪甲角如韭葉出血

喉乾燥痛四物湯加桔梗荆芥黃蘗知母立已

喉瘡并痛多屬虛火遊行無制用人參黃蘗蜜炙荆芥虛火用人參

竹瀝血虛用四物竹瀝又方用倒刺根入少許好酒研滴入喉

中又方以燈籠草炒為末酒調付喉間

無實熱火黃連荆芥薄荷滑石為末蜜姜汁調嚥化

喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也  
微而輕者可以緩治甚而急者惟用針砭刺血最為上策

○牙病第五十

牙疼或出血屬熱胃口有熱有風寒有虫有溼熱

實熱腫痛調胃承氣加黃連東垣用去砒硝又用升麻白芷防風京芥菠

蘭甘草桔梗之類又用梧桐淚射香擦之

上片牙疼灸三里

在膝下三寸外下片牙疼灸三間一名少商在手大指次指本節



之水內  
側陷中

牙大痛胡椒華撲升麻寒水石薄荷

虫蛀用蟾酥又方用巴豆燒煙薰之

治走馬牙疳用乾姜東燒存性白礬枯為末付之神效

附方

●治虫牙疼

瑞竹堂方

天仙子燒烟以竹筒抵牙引烟燻之其虫即死

●小兒走馬牙疳一時死即死此方神效

煩人溺桶中白垢火煨一錢許入銅綠三分射香一分半付

之立愈

○鼻病第五十一

鼻為肺之竅因心肺上病而不利也有寒有熱寒邪傷於皮毛氣

不利而壅寒熱清道寒則表之熱則芩連

面鼻紫黑面為陽中之陽鼻居面中一身之血運到面鼻皆為至

清至精之血多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血為極熱又血得

冷汚濁疑結而不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物加片

芩酒炒紅花酒拌茯苓陳皮甘草生姜煎調五靈脂末服氣弱加黃

芪酒浸

酒齋鼻乃血熱入肺治同前方用桐油入黃連以天吊藤燒油熱付之

又方硫黃入蘿蔔內煨乳香輕粉烏頭尖酥調付或鴨雄膽礬付又

方用山梔為末蜜蠟丸彈子大空心嚼一丸白湯下

鼻息肉乃肺氣盛用枯礬研為面脂綿裹塞鼻數日自消爪蒂



木綿裹之可木通細辛附子炮蜜和綿裹塞鼻中亦可防風通  
聖散加好三稜山茱萸肉海藻並用酒浸炒末每服一錢半  
鼻淵膽移執守腦則辛頗鼻淵通聖散一兩加薄荷黃連各二京半

附方

●寓澤通氣散 治鼻不聞香臭

羌活 獨活 蒼朮 防風 升麻

葛根各三 甘草炙 麻黃留節 川椒 白芷各一

右剉每服五錢生姜三片束二枚葱白三寸煎服食遠忌冷  
物風寒

●一方治鼻淵并臭名控腦沙

沉香少許 宿香去白 雄黃 皂角各少許 白牛毛 橙葉焙乾

右為末吹入鼻中倘有少血出不妨血出加梔子

○衄血第五十二 諸血証篇參用之

大抵與吐血同

涼血行血為主犀角地黄湯入鬱金

一方用荊芥穗研服或用蘿蔔上半段搗汁服又以滴鼻孔中或

灸大推在項后第一推上 啞門在項后入髮際五分針三分 二穴俱能止

內經謂身熱則死寒則生之是大槩言之豈無熱生而寒死者乎

又兼詳之可也

脉沉小留連或微者易治浮大洪數者難治宜滑不宜弦以論諸

之大槩也與諸書論吐血脉大意相合

本草衍義以豈草去根洗淨研汁一盞入生姜汁半盞細呷之治



大熱衄血

一婦貧而性急忽衄作如注倦甚脉浮数重取大且芤此陽滯於陰病雖重可治急以荳草根汁入姜汁各半飲之就以四物湯加香附側柏子四服覺渴仍飲以四物湯十餘貼而安

附方

●犀角地黄湯

犀角 赤芍藥 牡丹皮 生地黄分等

右剉每服四五錢水煎服

○吐血第五十三 咳血 唾血 咯血

血從上出皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

吐血戴氏曰嘔吐是全是血者又脉經曰吐血垂血脉滑小弱者生實大者死宜參看之內經曰諸見血身熱脉大者難治脉訣曰衄吐血脉沉細忽然浮大是六載血上錯經妄行脉又大而芤大又發熱

大法四物湯加炒梔子童便姜汁一本有

嘔血用韭汁一云凡經血逆行或吐血最妙童便姜汁鬱金飲之其血

自清如無鬱金以山茶花代之一本用鬱金末姜汁童便好酒調服

吐血用大全良方四生丸甚妙治又方童便調香附末服之又

方童便多酒少搗側柏葉温飲之

吐血亦有因怒而得者經曰怒則氣逆甚則嘔血怒氣暴甚故也

吐血不止用乾姜炮為末童便調服以此從治

山梔子最清胃脘之



有先吐血後見痰者是陰虛火甚四物為主加痰火藥有先吐痰後血多者是積熱降痰火為急

有暴吐紫血成塊者是熱傷血結于中吐出為好用四物湯加清熱等藥調之

少年貧勞患惡寒証吐血 詳見第二篇

咳血 戴氏曰咳出痰盛血也 身熱多是血虛用青黛或萎仁訶

子海石山梔為末姜汁蜜丸噉化嗽盛者加杏仁後以八物湯

加減調理 痰盛宜耳

唾血 鮮血隨出於腎亦有痰血內積肺氣壅遏不能下降用天門

冬麥門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠志或加乾姜

咯血 戴氏曰咯出血屑也 用姜汁青黛童便入血藥中用如四物湯地黃

牛膝膏之類 有咯山痰帶血絲者同治但宜加痰藥

舌上無故出血如線用槐花炒為末糝之

一壯年因勞倦不得睡患嗽痰如膿聲不出時春寒醫與小青龍

湯喉中有血絲腥氣逆上漸多有血線自口右邊出晝夜十餘

次脉弦大散弱左大為甚以勞倦感寒強以卒甘燥熱之劑動

其血不治恐成肺痿以參朮歸身白朮芍藥陳皮生甘草帶節

麻黃煎入藕汁服之二日而嗽止乃去麻黃與四日而血徐但

脉散未收食少倦甚前藥除藕汁加黃芩砂仁半夏半月而愈

一壯年患嗽而咯血痰熱肌瘦醫用補藥數年而病甚脉滑此因

好色而多怒精神耗少又補塞藥多榮衛不行痰血內積肺氣

壅遏不能下降治肺壅非吐不可精血耗非補不可唯倒倉法



二者兼備但使吐多於瀉耳兼灸肺愈二穴在三椎骨下橫過各一寸半

附方

●四生丸 治凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉 生艾葉 生地黄 生柏葉

右研細為丸如雞子黃大每服一九水煎或溫湯化下

●聖餅子 治咯血

青黛一 杏仁四十粒去皮尖以黃蠟煎黃色

右研杏仁細入青黛捏作餅子用時以稗子一枚破開以餅

置其中合定溫紙煨研飲

○便血第五十四下血 瀉血

下血有熱有虛熱用四物湯加炒山梔升麻秦苑膠珠虛用四物

湯加乾姜炮升麻

下血用白芷五倍子為丸

有風邪下陷者蓋風傷肝又主血故也宜升提之

有濕傷者血直行濕消熱

因積熱下血用蒼朮陳皮各一两五錢連翹五錢黃連黃芩黃柏

各七錢半炒為末生地膏丸服

又方用生地黄蒼朮等分為丸服

凡用血藥不可單行單止不可純用寒涼藥又加辛溫兩藥如酒

煮酒炒涼藥之類乃寒因熱用也

脉經謂下血先見血後見尿是近血先見尿後見血是遠血

一人嗜酒因逃難下血而痔痛脉沉瀼似數此陽滯于陰也以鬱



金芎芷蒼朮香附白芍藥乾葛炒曲以生姜半夏湯調服愈  
一老婦性沉怒大便下血十餘年食減形囚心搖動或如烟燻早  
起面微浮血或暫止則神思清忤意則復作百法不治脉左浮  
大虛甚久取帶瀝而不勻右沉瀝細弱寸沉絕此氣鬱生涎涎  
鬱胸中氣清不升經脉壅遏不降心血絕少不能自養故也非  
開泄不足以行氣非氣升則血不歸遂道以牡脾藥為君諸藥  
佐之二陳湯加酒紅花升麻歸身酒黃連青皮貝母澤瀉黃芪  
參朮酒芍藥每貼加附一片煎服四貼后血止去附加乾葛牡  
丹皮梔子而烟燻除乃去所加藥再加炒仁炒曲熟地黄木香  
倍參芪朮服半月全愈

血淋

又方用生地黃四兩小薊滑石通草炒蒲黃炒淡竹葉藕節皆婦  
酒浸山梔炒甘草炙各五錢

溺血因血虛者四物湯加牛膝膏

小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散

新刻丹溪先生纂要心法四卷終



新錄丹溪朱先生醫書目錄要卷之五

○汗第五十五

東垣有法有方

自汗屬氣虛屬濕與熱

治自汗宜人參黃芪少佐以桂枝陽虛者附子亦可

撲法用牡蠣麩皮麻黃根桑本糯米防風白芷為末撲之

痰病亦有汗

大氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之

盜汗屬血虛氣虛

治盜汗用當歸大黃湯甚妙

●四制白朮散 治盜汗





白木四兩一兩以黃芪炒一兩以石斛炒一兩以牡蠣炒一兩以麩炒止取白木為末每服三錢粟米煎湯調服

小兒盜汗不須治小兒陰血本未足故云不須治然汗固非小兒之為良

附方

●調衛湯 治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒

麻黃根 黃芪各一 羌活分七 生甘草 當歸稍 黃芩

半夏各五 蘊木 紅花分各 五味分七 麥門冬

生地黃分各三 猪苓分二 右剉水煎服

●當歸六黃湯

當歸 黃連 黃柏 黃芩 生地黄

熟地黄分黃芪加倍 右剉每服五錢水煎小兒減半

●正氣湯 治盜汗

黃柏 知母各一分 甘草分五 右剉水煎服

●一忌法 汗家禁半夏以其用姜氣也

○瘧第五十六 傷寒論注云瘧當作瘧強也蓋傳寫之誤也

大率與癩相似北癩為瘧瘧病身軟時醒瘧病身強直石宜補有

火有痰宜人參竹瀝之類不用兼風藥仲景云太陽病發熱無汗而反惡寒日剛瘧汗

出而不惡寒日柔病瘧身熱足寒頭項強急惡寒時頭熱面赤

獨頭動搖卒口禁背反張者瘧也又云太陽病瘧汗太多致瘧

以風散氣故有汗而不惡寒以寒滯血故無汗而惡寒原其所

夫病瘧人瘡口未合風入之為破傷風濕入之為破傷濕與濕

証有外感者有內虛者有因虛而受外和與虛而挾痰火濕熱



丹溪醫要卷之五  
及怒氣者所因不同治法亦異諸書只為外感者立又方然人之病此者多是虛証其可以風藥通治之乎

一少年痘瘡壓謝後忽口禁不開四肢強直時逸臍痛一陣則冷汗如雨痛定汗止脉極強緊如真弦知其極動苦因勞倦傷血瘡後血愈虛感風寒尚用溫藥養血辛涼散風芍藥當歸為君川芎青皮鈞鈞藤為臣白木甘草為佐桂枝木香黃連為使加紅花煎服十一貼而安

○厥第五十七

有陽厥有陰厥原病式詳矣陽衰于下則寒陰衰于下則熱厥者逆冷也原病式曰陰厥者原病脉候皆為陰証身涼不腸脉遲細而微也陽厥者原病脉候皆為陽証煩渴澹妄身熱而脉數也若陽厥極深或失下而至為身冷反見陰証脉微欲絕而死者上為熱極而然也俗昏妄謂成陰病急用熱藥助其陽氣以致十無一生王安道曰熱極而成厥逆者獨陰無陽也陽極以陰用寒藥陰極以陽用熱藥而成厥逆者獨陰無陽也陽極以陰用寒藥陰極以陽用熱藥

此謂原病式詳矣故考其名義之大畧而并採王安道所著以明之使學者知所指向云

因氣虛血虛者多  
氣虛脉細血虛脉大如葱管熱脉數外感脉浮實痰脉弦熱用承氣湯痰用白木竹瀝外感解散藥中加姜汁酒

附方

●四逆湯 治寒厥表裏寒下利清穀食入即吐脉沉伏手足冷

●白虎湯 治熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫語迂溺手足厥

冷自汗脉沉滑氣血等證而加減用之

●蘓合香丸 治卒暴厥不知人來辨風痰氣厥宜與此化濃湯

灌之醒後諫脉証用藥

●瓜蒂散 吐之口噤者或先用搐鼻藥



○癇第五十八 附顛狂

內經言癲而不及癇諸書言癲癇或言顛狂風癲風癇命名不一夫癲病時作時止其與癲狂之失心安作注久不愈者本非二類故今以癲為篇而癲狂附矣

癇証大卒屬痰與驚不火分五等

諸書有以病因風驚食為三癇者有以病象馬羊雞猪牛人為

五癇者斯三癇專主小兒言故有未說及者五癇雖有分配五藏之說於後既無所擬而治法從未見其有五者之分此所以不火分 治法行痰為主黃連南星半夏瓜蒌

尋火尋痰分多少而治無有不愈有熱者以涼藥清其心有痰者

又用吐法吐后用東垣安神丸及平肝之藥青黛此胡川芎之

類也

一方取八蟄大蝙蝠一箇用大粒硃砂三錢藏入腹內以新瓦盛

火炙令皮焦酥為度候冷為細末每一箇分作四服氣弱及幼

小者作五服空心調下

一婦有孕六個月發癇手揚直面紫黑合眼流涎昏睛每甞醫與

震靈丹五十貼時作時止至產自愈其夫疑母毒未發脉舉弦

按瀆至骨則沉帶數予意其癇又於五月復發至則果作皆已

午時乃制通聖散其甘草生用加菴仁紅花或服或吐四五劑

漸輕發疥而愈

一婦久積怒與酒病癇目上視揚手擲足筋牽喉嚨流涎定則昏

味腹脹痛衝心頭至胃大汗癇與痛間作以肝有怒邪因少血

而氣獨行脾受刑肺胃間凡有酒痰為肝氣所侮而為痛酒性

喜動出入升降入內則痛出外則癇用竹瀝姜汁參木膏等藥

甚多癇痛間作無度乘痛時灸大敦 在足大指甲后行間大指



次指說縫中腕在腕上四寸間以陳皮芍藥甘草川芎湯調膏與竹

瀝服之無數又灸太冲在足大指本節后三寸或云二寸半動脈陷中然谷在足內踝

陷巨闕在臍上六寸及大指半甲肉且言鬼恠怒罵巫者子曰和乘

虛而入理或有之與前藥佐以荆瀝防痰又用秦承祖灸鬼法

即鬼哭穴以兩手大指相並縛定用艾炷騎縫灸之哀告我自

去險證調理而安

一少年夏間因羞怒發昏手搐如狂面黑臯丸能動左右相過醫

與金箔鎮心丸抱龍丸妙香散定志丸不效脉微弦大至以素

有涇熱因激起厥陰相火與令火不宜射香之藥况肝病先當

救脾諸藥多燥血壞脾者遂以黃連為君人參為臣酒浸芍藥

和白陳皮為佐甘草為使生姜一片服八貼而安

一女八歲患癩遇陰雨及驚則作芋鳴吐涎知其胎受驚也但病

深難愈乃以豨丹丸繼以四物湯入黃連隨時令加減且令淡

味以助藥功半年而愈

一產婦左脚右手發搐詳見七十八篇

一少婦氣實多怒事不如意忽大叫而欲厥蓋痰閉于上火起於

下而上衝用香附五錢生甘草三錢川芎七錢童便姜汁炒煎

服又用青黛人中白香附丸服稍愈后用吐法乃安再用導痰

湯加姜炒黃連香附生薑下龍會丸

癩狂脉虛者可治脉實者難治

原病式所論甚精蓋為世以重陰為癩重陽為狂也大槩皆是熱

耳重陰重陽之介難經之言也河間謂素問註云多喜為癩怒



木則肝實而多怒也又發熱于中則多于陽明經謂陽明之厥則瘕疾又謂服膏梁芳草石藥則熱氣標悍發為癩狂以原病式本素問之論以明癩狂俱是熱病而重陰之說非也

大率多因痰結于心胃間宜開痰鎮心神六有中邪者則以治邪法治之

神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱尚清心除熱如痰迷心竅當去痰寧心

宜大吐下則愈

○邪崇第五十九

血氣者身之神也神既衰之邪因而入理或有之若夫血氣兩虛痰客半焦妨礙升降不得運用以致十二宮各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死

外臺秘要有禁呪一科乃移精變氣之小術耳可治小病而大者有虛邪外有實邪率能治之乎

一少年暑月內大勞而渴恣飲梅漿又連大驚病似邪鬼脉虛而帶沉數為有熱虛弦是驚又梅漿鬱中腕補虛清熱導去痰滯乃可遂與參朮陳皮茯苓連並入竹瀝姜汁旬日未効以前藥入荆瀝又旬日而安

一人醉飽後病妄語妄見家人知其痰所為也灌鹽湯一大碗吐痰一二升大汗而愈

一婦暑月赴筵坐次失序自愧而成病言語失倫脉弦數法當導痰清熱補脾其家不信用巫治之旬餘而死以煩痰熱太甚乃以清畫驚其神使血不寧法水密其膚使汗不得泄不死何俟



○怔忡第六十 附驚悸

戴氏曰怔忡者心中不安  
揚又然如人將捕者是也

屬血虛有痰有慮便動屬虛時住時止者痰因火動  
瘦人多是血少肥人多是痰時覺心跳者亦是血少

大法用四物湯安神丸之類痰用痰藥

治勞役大虛心跳者用硃砂白芍藥歸身側柏葉各三錢川芎甘  
草陳皮各一錢炒黃連一錢半為末猪心血丸

一人形質俱實因大怒患心不自安如人將捕之夜卧亦不安耳  
后火光炎上食雖進而不知味口乾而不欲飲以人參白朮歸

身為君陳皮少加鹽炒為佐芡黃藥玄參煎服半月而安

驚悸屬血虛用硃砂安神丸有痰迷心竅用治炎孫

附方

●溫膽湯 治心膽怯易驚

半夏

竹茹

枳實各二

生薑四

陳皮三

甘草一

右剉每服一兩水煎

●安神丸

黃連一分

酒五分

硃砂一分酒生地黃一酒當歸身

炙甘草各五分

右為細末湯浸蒸餅丸如黍米大每服十五

丸津唾嚥下食后服

硃砂安神丸熟地  
黃當歸用生甘草

○健忘第六十一

精神短少者多忘有痰

附方



婦脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白木 茯神 黃芪 圓眼肉 酸枣仁炒各

人參 木香各五 甘草炙二

右剉每服四錢姜三片枣一枚水煎服

●定志丸 治心氣不足恍惚多忘

人參 白茯苓各三 遠志去 菖蒲各二

右為末煉蜜丸硃砂為衣

○消渴第六十二

東垣有法以東垣消渴篇所論

上消者肺也多飲水而少飡大小便如常一曰上焦渴是心火形

火清金宜蘭香茱白葵花白豆蔻萹樓茄升麻黃柏引清氣升而渴止東垣曰高消者舌上赤裂大渴引飲調達論云心移熱

于肺傳為膈消者是也

中消者胃也多飲食而小便赤黃一又曰中焦渴飲食入胃傳送

有熱直用黃芩石羔東垣曰中消者善食而瘦自汗大便更小便數叔和所謂口乾飲水多食飢虛瘵成消中是也以調胃承

氣湯三黃

下消者腎也小便濁淋如膏之狀一又曰下焦渴者肝腎二經有

母黃芩玄參以養陰東垣曰下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和所謂焦煩水易顧以腎消也以六味地黃丸治之

錄所謂未傳能食者又發瘕疽背瘡不能食而渴者又傳中滿鼓脹皆謂不治之証繫古老人分而治之能食而渴者白虎加人參

湯不能食而渴者戴氏曰大散倍加乾葛治之上中既平不復傳下也

養肺降火生血為主

大法黃連天花粉二味為末藕汁人乳汁生地黃汁佐以蜜姜汁

為膏和二末徐又留舌上以白湯少許送下能食者加石羔



●猪肚丸

黃連五 麥門冬 知母 瓜蒌各四

右為末入雄猪肚內縫之蒸熟乘熱於石臼中杵爛如乾加煉蜜丸如梧子大每服百丸食後米飲下可以清心止渴或治消中

一方綠絲湯飲之吐之一日此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引

氣上潮于口如無綠湯以繭殼絲絲煮湯代之

天花粉治消渴之聖藥也

附方

●一息法 二渴禁半夏渴不宜汗

○便濁第六十二

屬濕熱有痰有虛志屬血由小腸屬火故也白屬氣由大腸屬金

故也戴氏曰俱是濕熱雖有赤白之異終無寒熱之分河間云天氣熱則水渾濁寒則澄徹由此觀之濕熱明矣

大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者濕傷血

胃中濁氣下流滲入膀胱

肥白人又多痰

治宜燥溼降火又有升提之法甚妙

大法二陳湯加二木燥升麻升芫胡提赤者加白芍藥煎服丸藥用

樗皮黃柏青黛乾姜炒滑石蛤粉炒神曲糊丸戴氏曰黃藥治濕熱膏黛解熱

蛤粉鹹寒入腎滑白利竅妙乾姜味苦斂肺氣下降便陰血生且能監制

二陳湯治濁加升提之藥能使大便潤而小便長

●珍珠粉丸



黃蘗新瓦上炒真蛤粉各一一瓊珠三

右為末水和丸每服一百丸空心溫酒下或加樗皮滑石青黛

等一方無

半苓丸治白濁神曲半夏燥溼猪苓分水

虛勞者用補陰藥

胃弱者兼用人參及升麻此胡升胃中清氣

燥濕痰南星半夏蛤粉如無以海石代之神曲糊丸青黛為衣

肝脉弦者用青黛以瀉肝

大槩不可用涼藥病生濕熱人用熱藥設矣然不可純用涼藥故唯用炒柏之類又用乾姜之溫以佐之也

一婦人氣血兩虛有痰痛風時作陰火間起小便白濁或赤帶下

用青黛蛤粉椿大滑石乾姜黃柏炒為末神曲糊丸仍用燥藥

一人便濁半年或時夢遺形瘦怔忡虛治瓊珠粉丸合定志丸

一婦年近六十形肥味厚中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁

氣即是濕痰用二陳湯加升麻柴胡蒼白木四貼濁減大半覺

胃滿因升動胃氣痰阻滿悶用二陳湯加炒曲白木素無痰者

升動不悶

一人便濁而精不禁用倒倉法有效

○遺精第六十四

夢遺主熱精滑主濕熱因夢交者為夢遺自遺者為精滑皆陽火所動

熱則流通

內傷氣血不能固守當補以八物湯加減吞樗根丸即椿根皮

思想而得其病在心當治心安神帶補一云宜溫胆湯去竹茹加人參遠志蓮藥酸棗仁茯



黃蘗新瓦上炒真蛤粉各一 珍珠三

右為末水和丸每服一百丸空心溫酒下或加檮皮滑石青黛

等一方無

半苓丸治白濁神曲半夏燥溼猪苓分水

虛勞者用補陰藥

胃弱者兼用人參及升麻此胡升胃中清氣

燥濕痰南星半夏蛤粉如無以海石代之 神曲糊丸青黛為衣

肝脉弦者用青黛以瀉肝

大槩不可用涼藥病生濕熱人用熱藥設矣然不可純用涼藥故唯用炒柏之類又用乾姜之溫以佐之也

一婦人氣血兩虛有痰痛風時作陰火間起小便白濁或赤帶下

用青黛蛤粉搗大滑石乾姜黃柏炒為末神曲糊丸仍用燥藥

一人便濁半年或時夢遺形瘦怔忡虛治珍珠粉丸合定志丸

一婦年近六十形肥味厚中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁

氣即是濕痰用二陳湯加升麻柴胡蒼白木四貼濁減大半覺

胃滿因升動胃氣痰阻滿悶用二陳湯加炒曲白木素無痰者

升動不悶

一人便濁而精不禁用倒倉法有效

○遺精第六十四

夢遺主熱精滑主濕熱因夢交者為夢遺自遺者為精滑皆陽火所動

熱則流通

內傷氣血不能固守當補以八物湯加減吞檮根丸即檮根皮

思想而得其病在心當治心安神帶補一云宜溫胆湯去竹茹加人參遠志蓮藥酸棗仁茯



神各五分

精滑用知母黃柏降火屬粉蛤粉燥濕一方用良姜三錢芍藥黃

柏燒存性各一錢栲根白皮一兩五錢為末粥丸每服三十九

附方

●妙香散

射香一各五分人參五分

木香二分茯苓

茯神

黃芪

遠志一各五分桔梗

甘草各五分

辰砂二分

山藥姜汁炙

右為末每服二錢不拘時溫酒調服

○淋閉第六十五 附不禁

淋有五皆屬於熱解熱利小便山梔之類不可發汗又便血

老人氣虛而淋參朮中帶木通山梔

有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利藥

必有死血作淋者用牛膝膏

一云牛膝膏能清胃令不食宜量用之

淋用益元散加山梔木通或用梔子一合炒白湯吞之一月以茴

香煎湯調益元散服之

痰熱膈滯中焦淋濕不通二陳湯煎大椀頓服調其直氣而吐之

淋濕有血因火燥下焦無氣血不得降而滲泄之令不行也

陰莖痛是厥陰經氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳

小便因熱鬱不通用赤茯苓黃芩澤瀉車前子麥門冬桂滑石木

通甘草稍氣虛者加木香黃芪淋痛加黃柏生地黃夏月調益

元散

傷寒后脫陽小便不通茴香調生姜自然汁敷小腹土服益智茴



香丸調益元散

老人氣短而小便不通四物湯加黃芪人參吞滋腎丸下焦血氣乾者死

小便黃用黃柏如澁數加澤瀉若濕熱流注下焦而小便黃赤澁數用山梔澤瀉切當溫多者宜滑石利之

下焦無血小便澁數而黃者用四物湯加黃柏知母牛膝甘草稍一老人因疝疼多服烏附患淋十餘年又服硝黃諸淋藥不効項痰一大疽淋痛愈甚叫號困憊脉短澁在微似弦皆藥毒所致疑積滯血滿膀胱脉澁為敗血短為血耗忍痛傷血叫號傷氣知其溺后有如敗膿者詢驗果然多取土牛膝膿煎湯并四物湯大劑與三日后痛與敗膿漸減淋上瘡勢亦定蓋四物能生

血也

一少年自生七箇月患淋五七日一痰大痛下如漆如粟者一盞乃定淋輕澁重弦形瘦長色瘡意其父又多服下部藥遺熱在胎留於子之命門而然以紫雪和黃柏末九晒極乾與二百丸佐一服熱湯下經二日久與二百丸作一服以食物壓之又半日大痛連腰腹下黍粟者一大碗病減八分一人以陳皮一兩桔槁木通各五錢作一貼與之又下池粟煮一合愈

有病婦因收生者不謹損破尿管而致淋瀝因思肌肉破傷尚可補完診其脉虛甚蓋難產是氣血虛產後又虛試與峻補以參朮為君芎歸為臣苑仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以猪羊膈中湯極飢飲之一月而安蓋是氣血驟長其脬自完恐稍遲亦難成



功

小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升有隔一隔三之治如因肺燥不能生水則清金此隔二如不因肺燥但膀胱有熱則宜瀉膀胱此正治如因脾濕不運而精不升故肺不能生水則當燥胃健脾此隔三清肺用車前子茯苓之類瀉膀胱用黃柏知母之類健脾胃燥脾用蒼白朮之類

小便不通屬氣虛血虛有實熱痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣又升則水自降蓋氣承載其水也氣虛參朮升麻等先服後吐或就參芪藥中調理探吐之血虛四物湯先服後吐或芎歸湯探吐痰多二陳湯先服後吐探痰氣閉塞二陳加木通香附探吐實熱芎利之或八正散大便動則小便自通

轉脬小便閉胎婦稟受弱憂悶多性急操食味厚皆能致之古方用滑利疎導藥鮮効因思脬為胎所墮展在一邊脬系了戾不通胎若舉起脬系得疎水道自行然胎墜又有其由一婦患此脉似瀆重取則弦左微和此得之憂患瀆為血少氣多弦為有飲血少則脬弱不舉氣多有飲中焦不清而溢則脬之所避而就下故墜而以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生姜空心飲探吐出藥俟氣定又與至八貼而安此恐隅中後厯用數人皆效

一人小便不通醫用利藥益甚脉右寸滋滑此積痰在肺又為上焦膀胱為下焦上焦閉則下焦塞如滴水之器又上竅通而後下竅之水出焉以藥大出之病如此



一煩孕九月轉脬小便閉脚腫形瘁脉左稍和而右溢必又飽食  
氣傷胎系弱不能自舉而壓膀胱偏一邊氣急為其所閉當補  
血養氣以參朮歸芍藥陳皮炙甘草半夏服四貼次早以查佐  
一服頻飲探吐之小便大通皆胎水

一孕煩小便不通脉細弱乃氣血虛弱胎墮膀胱下口用補藥升  
起恐遲反加急滿令温婆以香油抹手入產户托起其胎溺出

如注却以參芪升麻大劑服之或有少急滿再托如前予聞一  
煩倒豎起胎自墜轉其  
溺濺出勝于手托遠矣

一煩脾疼後大小便不通此痰隔中焦氣聚下焦二陳加木通煎  
服再一服探吐之

便不禁屬熱屬虛

○有脾約證見六十  
七篇

附方

●滋腎丸 治不渴而小便閉邪熱在血分也

黃柏三升酒  
拌陰乾

知母二升酒  
浸陰乾

肉桂一分

右上一味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火也桂  
與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熱水  
為丸百沸湯送下

●牛膝膏

牛膝一合剉用水五鍾煎耗其四入射香少許空心服其單  
以酒煮亦可

●八正散

大黃 蘆麥 木通 滑石 扁竹 車前子



山梔

甘草分

右剉每服五錢入灯心水煎服

●小蘗湯

治下焦結熱血淋

生地黄

小蘗根

淡竹葉

通草

滑石

梔子仁

蒲黃炒

當歸

藕節

甘草各等分

右剉每服五錢水煎空心服

○關格第六十六

尚與嘔吐淋閉篇相參處治

此證多死寒在上熱在下

寒在胃中過絕不入無入之理故曰格熱在下焦鎮塞不通無吐之由故曰關

格則吐逆關則不得小便

脉兩寸俱盛四倍以上

經曰人迎大四倍於氣口名曰格氣口大四倍於人迎名曰關此永俱盛四倍蓋以其病甚而至于上則過絕下

則閉塞關格俱病者言也

法當吐以提其氣之橫格戴氏曰膈中竟有所竭欲升不升欲降不降飲食不食此為氣之橫格也不

又在出痰也有痰二陳湯探吐之吐中便有降有氣虛不運者

補氣藥中升降

○秘結第六十七

多而黃可候

有虛者有風者有濕者有火者有津液不足者有寒者有氣結皆

切不可一例用芒硝大黃利藥巴豆牽牛元不可用

人病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻利藥

古方有脾約證制脾約丸謂胃強脾弱束津液不得四布但輸勝

腕故小便數而大便難曰脾約與坎丸以下脾之結燥腸潤結

化津流入腎而愈然既曰脾約又陰血枯槁內火燔灼熱傷元

氣故肺金受火而津竭又竊母氣以自救金耗則土受木傷脾



山梔 甘草分 右剉每服五錢入灯心水煎服

●小蘗湯 治下焦結熱血淋

生地黄 小蘗根 淡竹葉 通草 滑石

梔子仁 蒲黃炒 當歸 藕節 甘草各等分

右剉每服五錢水煎空心服

○関格第六十六 尚與嘔吐淋閉 篇相參處治

此證多死寒在上熱在下 寒在胃中過絕不入無入之理故曰格 熱在下焦鎮塞不通無吐之由故曰関

格則吐逆関 則不得小便

脉兩寸俱盛四倍以上 經曰人迎大四倍於氣口名曰格氣口大 四倍於人迎名曰関此永俱盛四倍益以

其病甚而至于上則過絕下 則閉塞関格俱病者言也

渣宿吐以提其氣之橫格 戴氏曰膈中竟有所竭欲升不升欲不 降不降欲食不食此為氣之橫格也

又在出痰也有痰二陳湯探吐之吐中便有降有氣虛不運者

補氣藥中升降

○秘結第六十七

多而黃可候

有虛者有風者有濕者有火者有津液不足者有寒者有氣結者

切不可一例用芒硝大黃利藥巴豆牽牛元不可用

人病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻利藥

古方有脾約證制脾約丸謂胃強脾弱束津液不得四布但輸膀胱

故小便數而大便難曰脾約與此丸以下脾之結燥腸潤結

化津流入腎而愈然既曰脾約又陰血枯槁內火燔灼熱傷元

氣故肺金受火而津竭又竊母氣以自救金耗則土受木傷脾



失轉輸肺失傳送宜大便秘而難小便數而無藏蓄也理宜溫  
養陰血使陽火不熾金行清化脾土清健津液流胃腸潤而通  
矣今此丸用之熱甚而氣實與西北方人稟壯實者無不安若  
用之東南方人與熱雖盛而氣血不實者雖得漸通將見脾愈  
弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在東南以潤燥為主  
一老人因內傷挾外感自誤汗后以補藥治愈脉尚洪數予謂洪  
當作大論年高誤汗后又有虛証乃與參朮歸芪陳皮甘草等  
自言從病不曾更衣今虛勞迸痛不堪欲用利藥予謂非實秘  
為氣因誤汗而虛不得充腹無力可勞仍用前藥間以肉汗粥  
及瑣陽粥與之丹溪本草謂瑣陽味甘食者粥尤佳補陰氣治  
虛而大便燥結又謂肉苁蓉峻補精血驟用動  
大便濃煎葱椒湯浸下體下軟塊五六枚其汗未斂此血氣未

順後又與前藥一日小便不通小腹滿悶煩苦仰臥則點滴而  
出予曰補藥未至倍參芪服二日小便通至半月而愈

附方

●潤腸湯 治大腸結燥不通

熟地黄 當歸稍 升麻 菴仁 麻仁

大黃各一 紅花三 生地黃 生甘草各二

右剉水煎溫服

●潤腸丸 治脾中伏火大便秘澁不思食及風結血秘

菴仁去皮 麻仁各一 當歸稍 大黃煨 羌活各五

右除二仁另研餘為末煉蜜丸白湯下如風濕加皂角煨去  
菴仁如脉澁覺氣短加郁李仁



●通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門噎塞氣不得下治在  
幽門以辛潤之

炙甘草 紅花各一 生地黃 熟地黃 升麻 薤仁

茵婦身各一 ○右剉水煎調換榔末五分熱服之

●潤淋丸 能潤血燥治大便不通

麻仁 茵婦 生地黃 薤仁 枳殼各一

右為末煉蜜丸

●備急丸 治胃中停滯寒冷之物大便不通心腹作痛

大黃 乾姜 巴豆去油

右為末煉蜜丸搗二十杵丸如小豆大每服三丸

●脾約丸

麻仁七月 枳實炒 厚朴 芍藥各一 大黃剉

杏仁去皮尖炒

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二三十丸溫湯下

●蜜導方 以蜜煉如飴捻成指大長二寸許以紙捲為納穀道

中

○脫症第六十八 症音江下部病也倍作肛非

伐氣血虛與熱

氣虛參芪升麻川芎血虛四物熱加黃柏外以五倍子為末托而

上之一次未收至二七次又收又方以陳壁土泡湯先薰後洗

○痔漏第六十九 附腸風

痔漏因風熱燥歸于大腸也治血為主



大法用條芩涼大腸人參黃連生地黃槐角涼血生血當歸和血  
川芎升麻枳殼寬腸

洗藥用五味子朴硝桑寄生蓮蓬煎湯先薰後洗  
腫者用木別子五味子為末調付

漏瘡先須用補藥以生氣血參芪歸朮為主大劑服之外以附子  
為末津和作餅子如錢厚以艾灸之漏大者艾炷六六漏小炷  
六小灸令微熱下可令痛餅乾則易之再和再灸如困且止次  
日再灸直至肉平為度或仍前用補氣血藥作膏藥貼之

洗藥用蘆葭石服童便淬牡礪煨

一方用馬蘭根付上片時看肉平去藥稍遲

腸風獨在胃與大腸出用黃芩秦艽槐角青黛升麻一方用大黃

飛仁去尖各三錢當歸槐柳皂角仁黃柏炒荆芥穗枳殼各五錢  
蠟皮灸黃連炒秦艽槐角子各一兩為末麪糊丸梧子大每服  
五十丸白湯下如鮮血下者加棕櫚灰蓮蓬灰

附方

●秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂不住其痒

羌活二分秦艽一分黃芪各一分防風七分升麻一分炙甘草一分

麻黃一分芫胡各五分藁本三分細辛一分紅花各少許

右剉作一服水煎忌風寒處大小便此方治痔甚妙

○黃疸第七十

不又分五種同是溼熱與暑翹相似汗疸黃疸穀疸女黃疸酒疸  
為五疸五疸言其致病之異

濕熱言其為病之同



輕者小温中九重者大温中九熱多加黃連濕多加茵陳五苓散

加食積藥

戴氏曰因食積者量其虛實下之其餘但利小便為先

黃疸倦怠脾胃不和食少胃弱湯小便利去加滑石又曰黃疸用

小温中丸

治黃疸與食積又可制肝燥脾

又虛者以白木佐使

炙砂

七刀炒紅醋淬七次再炒另研

苦參

夏加冬減

山查

各二

茱萸

二刀冬加夏減

白木

五

蒼朮

川芎

夏減

神曲

各半

香附

一斤童便浸透

右為末醋糊丸梧子大食前鹽湯下

一方有枝子無白木山查苦參茱萸

大温中丸

針砂

十及同前制

陳皮

蒼朮

青皮

厚朴

三稜

蓬朮

黃連

苦參

白木

各五

甘草

二

香附

右製同前方

一方無黃連苦參白木又方無甘草各温中丸

附方

茯苓滲溼湯

治黃疸寒熱嘔吐而渴飲冷身體面目俱黃

小便不利不安卧不思食

白茯苓

五

澤瀉

三

茵陳

六

猪苓

二

黃芩

黃連

梔子

防己

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳實

各二分

○右剉水煎服

如神丸

治酒毒不散發黃疸多浸漬流入清氣道中宜此藥

鼻中取黃水

苦瓠子

去皮三七個

黃黍米

三百粒

安息香

二皂子大

右為末以一字搐入鼻中滴出黃水一升忌勿吹又或過多



即以黍稷燒灰射香末各少許吹入鼻內立止

●針砭丸

針砭半斤煨醋三次 蒼木四升米泔一宿 香附 神曲炒

茵陳 厚朴姜制 麥芽各 芍藥 當歸 陳皮

川芎 青皮各一升 莪朮 三稜 生地黄姜汁炒

姜黃 山梔炒 升麻 乾膝各伍分

右為末醋調神曲糊丸

●綠礬丸 治黃胖

針砭二升炒 五倍子半斤 神曲半斤 綠礬四升姜汁煮

右為末大棗半斤取肉為丸此方神效但愈後宜忌食為雀

嘗見一人服此藥後二年下因食所犯忽无故而死

○癩第七十一 附丹疹

疾戴氏曰有色點而無頭粒者是也 屬氣熱挾痰而作自裏而發于外一云癩

寒者痰熱之病發于外 通聖散中消息當微汗以散之下之非理有屬裏

者因胃執助手少陰火入于太陰肺也故紅點如癩生於皮毛

間耳白虎瀉心調胃承氣從長用之

內傷發癩者胃氣極虛一身之火遊行於外所致宜補以降之其

傷寒發癩者以玄參升麻湯白虎湯等劑治之

疹戴氏曰浮小有頭粒者是也隨出即沒七而又出 屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散

出汗亦有可下者一云主乎解散汗之則愈通聖散中消息之

丹疹皆惡熱毒血蘊蓄于命門遇相火合起則發也如遇熱時以

通聖辛涼之劑解之寒時以葛根升麻辛溫之



劑解之丸丹從四肢入腹者死

乳孩因胎毒兩腿生癩後腹脹發赤癩如霞片取剪刀草汁調原

蚕砂付愈

冷丹屬血風血熱用通聖散消風散有痰血相傳用蟬蛻姜蚕荆

芥南星治之又用吐法

附方

●消風散

荆芥穗

甘草炙

陳皮白去

厚朴各五

白姜蚕

人參

蟬蛻去土

防風

芎穹

藿香

羌活

右為末每服二錢荆芥茶清調下

○瘦氣第七十二

先酒斷厚味海藻一两黃蘗二兩為末置掌中時又舐之以津嚥

下消三分之二止藥

○結核第七十三

結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰津不散

耳後頂門各有一塊姜蚕炒酒大黃炒青黛胆星為末蜜丸噙化

頸頰下生核屬痰二陳湯加大黃炒連翹桔梗苈胡

臂核作痛二陳加連翹川芎皂角刺防風黃芩酒蒼木

○瘡瘍第七十四

附肺背癰

骨疽

腎癰

肉疽

便毒

瘰癧

雜瘡

腸癰

乳癰

囊癰

癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脉内氣行脉外相

並周流寒與濕搏之則凝滯而行遲為不及熱與火搏之則沸



騰而行速為太過氣得和而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入  
脉中血為之濁此陰滯於陽也而得和而鬱隱道阻滯或溢或  
結積久滲出脉外氣為之亂此陽滯於陰也百精皆由於此又  
不止癰疽而已

癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使根本堅固而以行經活血  
為主佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內治此內  
托之意也

或問內托之法余曰河間治腫掀于外根盤不深形証在表其脉  
多浮病在皮內非氣盛則又侵於心須內托宜煖煎散除温  
散鬱使胃氣和平如盛未已再無生料飲之如大便秘及煩熱  
少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此則榮衛俱

行和氣不能內傷也於不救也予治五人矣其不死者惟一婦  
人因貧甚無物可喫也餘皆三四年後再發孫真人云嘗治四  
五百人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌  
耳其婦於本病外又是百餘貼加減四物湯半年之上月經行  
十分安愈按內經以風成為厲用刺法刺肌肉骨髓出汗以泄  
榮衛之補熱靈樞以銑針刺腫上按出惡氣惡血張  
子傷而出吐汗下之河間曰疎泄火熱之劑至於三因者謂少因  
內傷而受邪淫且亦有傳染者當於所因不可例以風藥治之  
大抵以疾又外受之邪與內積之毒所致古人治法蓋相於用  
而不可偏廢者丹溪為此又分在上在下氣血受病多少而秋  
治用藥治無餘蘊矣

醉仙散須量人大小虛實與之證候重而急者須先以再造散下  
之候補養得完復與此藥須斷鹽醬醋諸魚椒果煨燒灸燻等  
物止可淡粥及淡煮熟時菜雖茄亦不可食惟烏稍蛇菜花蛇



淡酒蒸熟食之可以助藥力

外科精要於諸瘡立法而不及癘風又為百病之長以其殘壞膚體去死為近一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之風起因于八方應其時則生物違其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如待虛受物後又因起居飲食男女游成鬱氣一氣積為厥躬脾先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火氣滋蔓氣濁血汚一云血熱凝結其氣不清化生諸蟲以次傳歷藏府又死之病而有可生之理其始病者胃氣微傷脾主肌將絕其脉又浮數而大且鼓精神又短而昏無以抵當火氣宜其危也按河間灸刺法謂凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少俞穴遠近從背出者當從太陽五穴選用至陰在足小指外側去

通谷

在足小指外側本節前陷中

束骨

在足小指外側本節後陷中

崑崙

在足外踝後跟骨上陷中

中

在腕中動脈

也從髻出者當從少陽五穴選用竅陰在足小指之次指

臨泣

在足小指之次指本節後間陷中

甲

指端去爪

夾谿

在足小指之次指岐甲如韭葉

陽

在足小指之次指

輔

在足外踝上四寸輔骨前陷端如前三分

陽陵泉

在膝下一寸外廉陷中

也從大此出者

當從陽明五穴選用癰兌

在足大指次指去爪甲如韭葉

內庭

在足大指次指指外間陷中

谷

在足大指次指間本節後陷中

衝陽

在足跌上五寸骨間動脈去陷谷三寸

解谿

在冲陽後二寸五分腕上

也從腦出者則以絕骨一穴

在足踝上三寸動脈中

其也

針之法可施於輕小證候吮出惡血若積毒在藏府者徒

竭其血於外無益也一小兒二歲赤疹取七八大蟻吮其血瘰

消子曰非其治也三日大熱而死

外施貼藥之意精要謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得



冷則歛何謂神效經曰發表不遠熱是也貼冷藥性輕小節毒可也

蒲公英化熱毒消惡腫結核有奇功田間路側皆有之三四月開

黃花似菊味甘解食毒散滯氣可以陽明太陰同忍冬藤即金銀花

煎以少酒佐之

癰疽已破未破用皂角刺主鑽引至潰處

腫瘍宜用手按之熱則有膿不熱則無膿

外科用格待膿服神仙迫毒丸此藥能下積取毒無取膿之功若

血氣壯實則膿自出當以和氣活血藥佐參芪補劑服之

膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸者宜和解之風

冷所迫者宜溫養之

疽發深不疼者胃氣大虛則死肉多而不知疼也

腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰后當作陰虛補之若年老道

後發嘔不食又宜參芪白朮膏峻補隨証加佐藥河間謂瘡瘍

嘔者濕氣侵于胃也宜倍白朮

癰疽發渴乃血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血或忍冬

丸黃芪六一湯

加味十全大補湯治癰潰後補氣血進飲食實為功要凡膿出血

多陰陽兩虛此藥有迴生起死之功但不分經絡不載時令醫

者觸類而長之可也或見痛平腫寬遂以為安慢不加省無補

接調養之功愈後虛証乃見因而轉成他病者多矣

取內疽及痔漏中枯骨疽烏骨雞脰骨以砒實之塩泥固濟火煨

紅地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟米大以紙撚送入竅



內更以膏藥貼之

曰蠟膏收斂堅凝之氣外利之要藥生肌止血定痛接骨續筋補

虛嘗與合歡皮同用入長肉膏有神効但未試其可服否若合

歡皮嘗服之驗矣丹溪與戴原礼書簡中屢言二藥之妙草麻子性善收能陰膿

取毒亦要藥也

入質弱憂患右一作膊外側生核脉浮大弦數重似瀝此憂患

傷血宜用補以防交証以人參膏下竹瀝化工以十宣五香聞

與後但大風核高大有膿中起紅線遇肩脊及左一作脇下急

作參膏入芎湯姜汁飲之盡參三斤瘡潰又多與四物加參木

芎歸陳皮甘草半夏生姜服之而愈

一人面白神勞脇下生一紅腫如菽或教用補劑不信乃用流氣

飲食十宣散血氣俱憊而死已上二証乃少陽經

一人形瘦膚厚憂患作勞好色左腿外側廉上一紅腫大如栗

以大府實用承氣湯一貼下之又一医與大黃朱砂甘草麒麟

竭三貼事去矣以証乃厥陰經灸氣少血之部分

一人左絲竹空穴壅出一角如雞距以少陽經氣多血少逼予戒

其断酒肉鮮食毒須針灸以開痰壅滯化工以大黃硝腦等冷

藥貼之一夜裂開如蚶肉血濺出長尺餘而死以冷亦外逼熱

不得發故也

一老頰形實性急嗜酒胸生疽方五日脉緊急且瀋用大黃細切

酒炒為末以人參酒炒入姜煎湯調末一錢服少時再服得睡

上身汗出而愈



一人連年病瘡后生一子三月病熱右腋下陽明以主之分生一癰用平左腋下相對又一癰膿血淋漓幾死醫以四物湯敗毒散數倍人參以香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月而愈踰三月忽腹脹生赤癰如霞片取剪刀草汁調原蚕砂付隨消又半月移脹入囊為腫黃莖裂開兩九頭露水出以紫蘓葉盛麩炭末托之旬餘而合以胎毒證也

一士人於背腎腿節次生疽用五香連翹湯十宣散而愈后脚弱懶語肌起白屑脉洪浮稍鼓子以極虛處治作參芪歸朮膏以二陳湯化下盡藥一斤半白屑沒大半呼吸有力其家媿緩自作風病治之而死

一老人背發疽徑尺已與五香十宣散數十貼嘔逆不睡素有淋病急以參芪歸朮膏以牛膝湯入竹瀝飲之淋止思食盡藥四斤膿自湧出而愈

一人背發疽得內托十宣多矣見膿嘔逆發熱又用嘉禾散加丁香時天熱脉洪數有力此清瘍尤所忌然形氣實只與參膏竹瀝飲之盡藥十五六斤竹百餘竿而安後不戒口味夏月醉坐水池中經年餘左脇旁生軟塊二年後成疽自見脉証嘔逆如前仍服參膏等而安若與十宣其能然乎

一人形實色黑背生紅腫近脾骨下痛甚脉浮數而洪緊心冬月與麻黃桂枝湯加酒柏生附子瓜蒌子甘草節人參羌活青皮黃芪半夏生姜六貼而消

經類因得子遲服神仙聚寶丹背生癰甚危脉大散而溢急以加



減四物湯百餘貼補其陰血幸其質厚易於收效

附骨疽者皆因之得厚味及酒後涉水得寒故熱深入體樞穴左  
右積痰瘀血相傳而成也。

環跳穴痛不已防生附骨疽以蒼木佐黃柏之辛行以青皮冬加  
桂枝夏加條芩躰虛者加土牛膝以生甘草為使大料煎入姜  
汁食前飲之痛甚者恐前藥十數貼發不動少加麻黃一二貼  
又不動者恐疽將成急掘地成坎夕火煨通紅以小便赤體坐  
其中以席圍抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血暢而愈

一後生散骨疼以風藥飲酒一年予以防風通聖散去硝黃加生  
犀角浮萍與百餘貼成一疽近皮革膿出而愈後五六年其處  
耳痛予曰舊病作無能為矣蓋發于新要之後多得香辣肉味

若能茹淡遠房勞尤可生也出膿血四五年沿及腰背背空又  
三年而死此純平病熱者

一女髀樞大生附骨疽在外側廉少陽之分始末悉用五香湯十  
宣散一日惡寒發熱膈漏猶大服五香湯一夕喘死以升散太  
多陰血已絕孤陽發越于上也

一少年大寒極勞散骨痛兩月後生疽深入骨邊臥二年取剩骨  
而安此寒轉熱者也

醫醫癰居小腹之後在下此陰中之陰也道遠位僻雖曰多血然  
氣運不到血赤罕來中年後尤慮患此纔有腫痛叅之脉証一  
見虛弱便與滋補血氣可保終吉

肉疽遠白肉思自之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰疫之也



情者藏府受之宜其發在腔子而向內非干腸胃育膜也

一人性急味厚嘗服熱燥之藥左脇有點痛診之輕弦重芤知其

痛處有膿在內疽治與四物湯加桔梗香附生姜煎十餘貼痛

處微腫如指大令鍼之少時屈身而膿出與四物調理而安

肺癰先須發表千金方曰病咳唾膿血其脉數實或口中咳胸免

隱痛脉彘通類者為肺癰其脉緊數為膿未成緊去但數膿為

已成

肺癰治法要畧無以小青龍湯一貼以解表之風寒邪氣然後以

葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯桑葉湯隨證用之以取膿以治腫瘍

之例也終以韋宙獨行方各附方以補裏之陰氣以治潰瘍

之例也

凡肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之

吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入男子髮髮清未

飲下兩服可除

一少煩胸膈間潰一竅膿血與口中所咳相應而出以參芪當歸

加退熱排膿等藥而愈一云此目肺癰所致

腸癰作濕熱積治入風難治

腸癰千金謂安治必殺人其病小腹重強按則痛小便以淋時又

汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫脉數者微

乳癰

囊癰

便毒足厥陰濕氣因勞倦而發用射干三寸同生姜煎食前飲得



利二三行効射干紫花者是紅花者非一方用破故紙牛蒡子  
微炒 牽牛炒 大黃酒拌 等分末之每服一兩酒調下又方已結  
成膿者用大黃連喬各五錢枳實三錢厚朴甘草節各二錢赤  
仁二十一粒姜三片分三貼煎服

一少年玉莖挺長腫而痿皮榻常潤磨服難行兩脇氣冲上手足  
倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其溼熱少加黃檗降其逆上  
之氣腫漸收莖中有堅塊未消以青皮為君少佐以散風之藥  
未服之以絲瓜子調五倍于未付愈

瘰癧音又起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱  
氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端柘引爰換須分實又者易  
治虛者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣多血少煩人見

此若月經不作寒熱使主稍久轉為潮熱危矣自非斷慾令  
神仙不治也

治瘰癧用立効散與瓜蒌散相間服神效

本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不  
言觀其能退寒熱虛者可伏若實者以行散之藥佐之外以艾  
灸之漸取効

治血少馬刀瘰癧肚泄以四物湯加芍藥炒 牡蠣淫陳皮柴胡甘  
草黃連玄參神曲桑葉膏

天泡瘡用通聖散及蛭蚓泥煨 蜜調付從肚皮上起者裡熱發外  
還日養聖散又方用野菊茶末木根煎湯洗黃柏滑石為末付  
切惡瘡用治魂丹大有神効血竭乳香沒藥銅綠枯礬黃丹川



山甲炒各一錢輕粉蟾酥各五分射少許為末用蝸牛研如泥  
和九葉豆大每服一丸重者二丸用葱白一寸爵爛裹藥熬酒  
送下取汗酒多為炒瘡在上下論食前後

惡瘡用霜凋芭蕉葉為末香油調付油紙掩先用忍冬藤蔥椒金  
絲草煎洗又方松上白蟻泥黃丹各炒黑香油調付外用油紙  
夾上日易後用龍骨沒藥於瘡口收肉又方黃丹入香油煎入  
朴硝抹之

癰瘡用白膠香二兩黃柏石膏各一兩青黛五錢龍骨五分為末  
以香油調付又方以香約入顯髮如梅大煎三五沸去髮入白  
膠香黃蠟各一兩洋化入生龍骨赤石脂血竭炒各一兩攪勻  
候冷磁器成捏作薄片貼瘡口外以竹箬包之三日翻過藥照

貼以活血藥洗之又方用箬子剪去兩頭以黃柏煎汁令稠和  
白膠香麻黃同竭成膏攤箬糙面折縛光面貼之先以清水洗  
乾淨

下府瘡用青黛海蛤粉蜜陀僧黃連為末付又方以雞內金即雞  
肫皮  
燒存性為末付之

頭瘡用猪油二錢一半生  
一半熟雄黃水銀各二錢伍分和勻付

金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭上截  
經刺之以出血後爵萍草根塗之立愈

手痴瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃柏為末付

砂瘡用塌地藤燒灰付

瘡痛不可忍者用苦寒藥可施不資稟厚者若資稟素弱者宜服



補中益氣中加苦寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩  
鼠粘子連喬在下加黃柏若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活荆芥  
白芷蓋取其風能勝濕故也

疥瘡并馬疥瘡用馬鞭草不犯鐵器搗取元汁半盞飲盡十日內  
愈神效

白癩風癬以小麥攤石上以鉄燒紅壓出油漆之立効

風癬疔瘡梓樹葉木綿子羶羊屎鼠屎罽瀝油付之

癬瘡浮萍一兩蒼耳蒼木各二兩苦參一兩半香附二錢半黃芩  
五錢

身上虛痒四物湯加黃芩調浮萍末一錢服又遍身痒凌霄花為  
末酒調下一錢

附方

●內托復煎散 托裏健胃

地骨皮 黃芩 茯苓 芍藥 人參 黃芪

白朮 桂皮 甘草 防已 當歸 防風

右剉先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前十二味再  
煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎蒼朮查如前

再煎飲之

●黃連消毒散 治癰瘻于腦項或背太陽經分腫勢外散執毒

茨麻木不痛者宜先灸之或痛而茨熱並宜服之

黃連制 羌活各一 黃芩 黃柏各五分 生地黃

知母制 獨活 防風 當歸尾 連翹各四分 藁本



防己 桔梗各二分 黃芪 蕪木 陳皮

澤瀉各三人 人參 甘草各分 ○右剉水煎

●內托羌活湯 治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻醫生癱堅硬腫痛大作

羌活 黃柏酒制各二分 茵婦尾 藁本 防風各分

肉桂三分 連翹 甘草炙 蒼朮 陳皮各五分 黃芪半

右剉水酒各半煎食前温服取汗

●白芷升麻湯 治手陽明經分臂上生癱左右寸部脉皆趨中得之俱弦按之洪緩有五共得之入風之交者

白芷半 升麻 桔梗各一分 甘草炙五分 黃芪

黃芩酒制各四分 生黃芩三分 紅花五分

右剉作二服每水酒各半煎食後温服

●內托黃芪芫胡湯 治瘡生腿內近膝股或癱或附骨癱初起腫痛勢大以足太陰厥陰之分脉細而弦按之洪緩有力

黃芪一分 芫胡一分 羌活五分 連翹一分 肉桂三分

土瓜根酒制一分 黃柏一分 婦尾七分 生地黃二分

右剉作二服水二分酒一分煎食前服

●內托黃芪酒煎湯 治瘡生腿外側或因寒濕得附骨癱於足少陽經分微侵足陽明經堅硬漫腫行動作痛或不能行

芫胡一分 連翹 肉桂 大力子炒各一分 黃芪

婦尾各一分 黃柏五分 升麻七分 甘草炙五分

右剉水酒各半煎食前服



已上五分東垣所著各有脉証經部五分  
之別故取以為自臨病处方庶有所也

●方托裏

黃芪

肉蓯

金銀花

無則莖葉

甘草等

右剉酒煎服更詳部位加引經藥為妙

●烏金散

治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若瘡黑陷如

石堅四肢冷脉細或時昏胃謔語循衣煩渴危篤者服以汗之

瘡起

蒼耳頭

五川五日午時收

小草烏頭

火麻頭

火日收採

木賊

去節

蝦蟇頭

槿皮節

蘇灸

麻黃

去根節

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟炭火煨從早至四時

如黑蝶色為度礮為末每服二錢病重者三錢用熱酒調下

未汗再服如汗乾却服解毒利之藥如修合此藥又遇天

晴好日於靜室中勿令雞犬猫畜及陰人見也

●托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪弦實數腫甚

欲作膿者三服消盡

大黃

牡礪

瓜蒌根

皂角刺

朴硝

連翹

各三

金錢花

當歸

各一

赤芍藥

黃芩

右剉每服半兩水酒各半煎服

一方治癰疽若內疽尤妙

川山甲

灰炒

大黃

紅

姜養

鹽

右水酒煎沸溫服

●黃芪益湯

治癰疽而渴



黃芪六分甘草一分

右剉一服酒調下

一方治一切瘡癰癰疽背發殊効亦能下血死

大黃 甘草 辰砂 血竭 右末酒調下

●雲母膏 治一切瘡腫傷折等病

蜀椒開口者去目微炒 白芷 沒藥 赤芍藥 肉桂

當歸 鹽花 麒麟竭 菖蒲 黃芪 白芨

芎芎 龍膽草 木香 白欵 防風 厚朴

射香 桔梗 訖胡 松脂 人參 蒼朮

黃芩 夜合皮 乳香 附子 高良姜 茯苓各二分

硝石 甘草 雲母各四分 桑白皮 柏葉 水銀縮似

另包待膏成以手細彈鋪在上謂之卷藥母 槐枝 柳枝各二分 陳皮一分

清油四十分 黃丹十四分

右除雲母硝石麒麟竭沒藥射香乳香黃丹鹽花八味另研外並剉細入油浸七日又火煎以抑篋不住手撓候再沸乃下火沸定又上火如此三次以藥老黃色為度去查再熬後入丹與八味末仍不住手撓將凝又熬滴水中成珠為度磁器收之候溫將水銀彈上用時先刮去水銀或貼隨宜用之其功甚大也

●太乙膏 治一切癰疽瘡癰貼之神效並可內服真詳証佐使

玄參 白芷 當歸 肉桂

大黃 赤芍藥 生地黄各一分

右判用麻油二斤浸夏三日冬十日去查將油熬得所入黃



丹一斤以滴水中不散為度

●黃昏湯 圖經云韋宙獨行方胃中甲錯是為肺癰黃昏湯合之

合歡樹皮一掌大以水三鍾煮至半分作二服

●葶藶大束瀉肺湯 治肺喘不得卧

葶藶 炒黃研末 九如彈子 大束

右以水三盞入束煎至二盞去束入葶藶煎至一盞服之

●葦葉湯 治欬有微熱煩胃心甲錯

葦葉 切三斤 薏苡仁 瓜蒌仁 各半 菀仁 五十 右剉煎服

●薏苡仁附子敗毒散 治腸癰身甲錯腹皮急如脹本無積聚

無熱脉數者

附子 剉 敗醬 各二 薏苡仁 十 右剉水煎服

●大黃牡丹湯 治腸癰脉遲膿未成膿可下之成則不可下

大黃 四 牡丹皮 三 芒硝 二 瓜子 一 菀仁 五十

右剉水煎服

●二生散 治謾腫光色附骨疽如神

露蜂房 頭髮 燒灰存性 蛇蛻 等分 右末每服三錢酒下

●又効散 治久患瘰癧不愈服此藥取効如神

南礪砂 二分 輕粉 一分 射香 一分 螿螿 四十個

巴豆 五枚去皮心膜 白檳榔 一個 右每服酒調服

●內托散

乳香 明者一及 真葦豆粉 四及一方

右末每服一錢或二錢甘草湯下



一方治疔瘡

蟻娘心腹下肉稍白者貼瘡上半日許未可再上之血盡根出神効

●如聖散 治諸般疥癬或痛或痒或喜湯大烘洗者

吳茱萸三蛇床子炒雄黃研 黑狗脊 寒水石研

白膠香煎慮過石上晒乾 硫黃二各半 白礬

黃連各五 蟹螯十四枚去頭翅足

右為末香油桐油同調付先用蒼耳草或羊不食草藤煎湯洗去痂付之可一次而愈

○癘風第七十五 癘音癘

大風病是得天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴

悍可畏也人得之分在上在下氣受之則在上血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明胃與大腸也無物不受治之者須致意看其疔瘡與瘡上體先見者多在上也下體先見者多在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以再造散取惡物虫積于穀道中出後用通聖散更用三稜針委中在膈中夾約文中動脉 出血夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鉄心畢能免矣或從上或從下以漸而來者皆是可治之證人見其病勢之緩多忽之以法治之雖已全愈若不絕味斷慾皆不免再發而終

精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之於小瘡癰與冬月亦可轉重就輕移深於淺若潰瘍



與夏月用之其桂朴之温散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難  
為倚仗比見世人用此不分輕重時令經絡前後如盲人騎瞎  
馬半夜臨深池危哉

諸經惟少陽厥陰之生癰疽宜預防之以其多氣少血也血少而  
肌肉難長瘡久未合必成死証苟不知此遽用驅逐利藥以伐  
其陰分之血祗不旋踵

腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛狼之  
非潰瘍內外皆虛宜以補按為主如欲用香散者宜戒虛之失

外科精要一書惟務記錄舊方應酬輕小證候耳

恒慮疽論一書最妙予曾見一次後於杭人陳恩復處求而得  
之隨被入所竊矣今精要書盛行於世而以此書不復見惜哉

癰疽如瘻即以艾灸之可使輕淺騎竹馬灸法尤妙

齊中指端後至手脈橫紋當中截段為唯却以竹一根兩頭  
忽令病人騎之兩足不着地挺身正坐將前茂植於竹上以  
頭疽脊骨中各開一寸灸七壯灸單宜服乳香菜豆托裏  
散所以防火氣之入心其方用菜豆粉與乳香為末冷水調下  
蓋火以暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜  
小而少若身上又痛灸至不痛不痛灸至痛有因灸而死者蓋  
虛甚孤陰將肉流行甚緩傳爰以漸或可藉醫藥之功而免謂  
之死非惟醫不知藥恐是不能禁欲禁可哀也



新錄丹溪朱先生醫書纂要卷之六

○婦人證第七十七

經候崩漏帶下胎產

經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者

經不通或因墮胎及多散傷血或因久患潮熱銷血或因久積盜

汗耗血不因腸胃不和飲食少進而不生血血者飲食所化不食則血不生經曰

三陽之病發心脾女子不月宜生血補血除熱調胃之劑隨證用之或因七

情傷心又氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而

自行

經不通用馬鞭草取汁熬膏為丸或燒存性為丸紅花燭婦煎湯

送下



血枯經閉四物加棗仁紅花

軀肢滿經閉者導痰湯加黃連川芎之類不可服地黃以其泥膈

也如用以姜汁炒

肥人痰多怙住血海因而下多者目又漸昏用南星蒼朮川芎香

附作丸服

經水過期者血虛也宜四物加參芪陳皮白朮升麻之類若肥人

是痰多二陳加南星蒼朮滑石及芎歸香附過期作痰及虛中

有熱

經水不及期者血熱也四物加芩連之類肥人急煎痰治

經水紫黑色及有塊者血熱也四物加芩連香附之類

經水將行而作疼者血實也一曰鬱前喘棗仁紅花黃連香附或加四物

湯芪朮玄胡索木香熱加黃芩此胡

經水行後作疼者氣血虛也八物湯

血為氣之配因氣而行成鬼者氣之凝將而行痛者氣之滯行後

作痛者氣血俱虛也色淡者急虛也而有水混之也錯經妄行

者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚今人悉指為風冷而行

溫熱之劑禍不旋踵以經水諸証俱為氣病與上各條置以血病論治不同蓋血為氣配言氣則血在

其中相為用而不相悖也

經水過期而色淡者痰多也二陳加芎歸一云色淡下調是氣血俱虛宜參芪芎歸之類

腹痛加阿膠艾葉

●固經丸 治經過多不止

黃芩

龜板

白芍藥各一

樗根皮七升



黃栢三斤

炒

香附一斤

便浸一宿

右為細末酒糊丸

崩漏有虛有熱

熱則流通虛則下溜

東垣有治法但不言熱而主於寒學者宜再思之經曰陰虛陽搏

調之崩現此可知

急則治其標白芷湯調百草霜服甚者機攔灰或用猪頭骨燒存

性或以五靈脂半生半炒俱酒調服後以四物湯加乾姜調補之

緩則治其本四物加芩連參芪香附乾姜之類

四物加荆芥穗止血神效

崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒歸身一錢白芍藥一錢炒

熟地黃一錢川芎黃芪蒲黃地榆人參各五分白朮一錢升麻

三州煎甚者加松毛灰調服

一頓墮胎后血不止食少中滿倦怠煩燥脉沉大而數重取漸

予任怒氣傷肝感動胃氣以二陳湯加川芎白朮砂仁二十貼

而安

婦人血病宜用芩歸若肥白人與人參同用瘦人宜與生地黃香

附同用

帶下是溼熱為病白屬氣赤屬血治溼為主氣虛人參朮血虛入

芩歸

帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知此二陳湯加蒼

白朮升麻芩胡甚者上用吐法以提其氣下用二陳加二朮仍

用瓦壘子即蚌殼

肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃栢蒼朮川芎香附樗皮



冬加乾姜瘦人少此病有者是熱以滑石樗皮川芎海石青黛丸服

結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下后以補藥調治

白帶用梲白皮山茱萸苦參香附各五錢龜板枳子各二兩黃柏

一兩乾姜貝母各二錢半白芍藥七錢半為末酒糊丸服又方

用白芷四兩以石灰半斤淹三宿漉去灰將白芷炒焦為末服

之又方用黃荊子炒焦酒調服

葵花白者治白帶紅者治赤帶

治帶用藥寒月少加姜附臨機應爰

帶下又須斷厚味

羅大生治帶用十束湯神佑丸玉燭散實者可用坎法虛者不可

### 峻安

一人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮酒芩辛夷川芎黃柏

炒滑石半夏牡蠣粉

無子多由血少不能攝精倍醫率謂子宮虛冷授以熱藥煎熬藏

府血氣沸騰禍不旋踵或服艾者不知艾性至熱入火灸則下

行入藥服則上行多服致毒各將誰歸

瘦癯婦人子宮乾澁宜滋陰養血四物加香附黃芩之類肥成者

乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰南星半夏川芎滑石防風

羌活一本有蒼朮无防風羌活或道痰湯之類

墮胎乃血氣虛損不足榮養而自墮猶枝枯則果落藤痿則花墜

有因勞怒傷情內火便動不能墮胎猶風撼其木人折其枝也



火能消物造化自然病源乃謂風冷傷於子藏未得病情者也  
大抵屬熱二者又當視其輕重而治之

一煩有胎即墮其脉左大無力重取則濇乃血少也以其妙年只  
補中氣使血自榮濃煎白朮湯調黃芩末一錢服之至三四兩  
得保全而生

固胎用熟地黃歸身尾人參白芍藥白朮川芎陳皮甘草桑上羊

兒藤

原証七葉丸者未詳今用桑絡即蒺藜有效

少加黃連黃柏入糯米煎服血虛

不安者加阿膠痛者加宿砂

安胎飲孕成之后覺胎氣不安或腹微痛或腰周作疼或飲食不  
美服之或至五六爾月常服數貼

白朮當歸芍藥熟地黃

各一各一

人參川芎黃芩陳皮

各五分

甘草砂

右剉作一服加生姜一片水煎

大行不息所以生又而不窮堯壽子活血行氣有補陰之妙命名  
益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛黃芩白朮乃  
安胎之聖藥倍以黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知  
知胎孕宜清熱涼血使血循經而不妄行乃能養胎黃芩又取  
細健沉實者用之安胎治痛行氣故也

宿砂非八九箇月內不宜多用

懷妊嗜物乃一藏之虛如愛酸物乃肝藏正能養胎而虛也

胎動因火動胎逆上作喘者急用條芩香附之類

胎漏有胎而血漏下者是也屬氣虛血虛有熱

胎痛乃血少四物加香附為末紫蘇湯下大妙

胎腫乃有孕而手足或頭面通身浮腫者是也屬濕多

或用山枝一合炒為



末米飲下  
丸服亦可

惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用二陳湯之類

又白朮為丸服一曰肥人是痰瘦人是熱

一煩孕兩月嘔吐頭眩醫以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重脉弦

左為甚以惡阻病又怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣

參朮之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十四粒五服稍安

脉畧數口乾苦食則口酸意其膈間滯氣未盡行以川芎陳皮

山梔生姜茯苓煎湯下抑青丸十五粒而愈但口酸易飢此肝

熱未平以熱湯下抑青丸二十粒愈後兩手脉平和而右其弱

其胎又墮此時肝氣既平可用參朮少防之服一日而胎自墮

束胎丸 至七八箇月服之

黃芩炒夏一丹春秋七分半冬五分 白朮二分 茯苓七分半 陳皮三分

右為末粥丸梧子大每服三四十九丸白湯下

辛音達 生產孕至八九月服十數貼甚妙

大腹皮三冬此藥不宜用許多三字恐誤今用只一服足矣孫真人謂鳩鳥多栖此處宜先以酒洗乃以烏豆汁洗

方可用今人多不依此制嘗見一人婦服之即下血而死其可忽諸 人參 紫蘊 姜葉

陳皮各五分 白芍藥 白朮 當歸各 甘草二分

右剉一貼入黃楊腦七箇葱五葉煎服夏加黃芩或黃連五味

子春加川芎防風秋加澤瀉冬加砂仁或痛加枳殼宿砂胎動

加金銀草根氣上加紫蘊地黃胎上逼身急同性急加柴胡多怒加黃

芩食少加宿砂神曲渴加麥門冬黃芩能食多加楊腦有痰加

黃芩半夏



臨月用芎歸川芎黃芩陳皮白朮香附各一錢白芷五分甘草三分煎調益元散一錢服虛加人參又方用益母草即野熬膏白湯調下加油蜜童便和勻治難產古方五月五日採益母草陰乾石臼搗為末煉蜜丸彈子大每一丸或二丸臨產以童便和酒送下或作小丸服多益母丸治橫產難產用安胎順氣其効若神

催生散

白芷

燒存性

百草霜

即鍋

滑石

右為末芎歸煎湯調下

紅莧與馬齒莧下胎甚妙臨產時司煮食易產

難產多是氣血虛或有氣血凝滯而不能轉運者必有因八九箇月內不謹者

難產多見於鬱悶安逸之人富貴美養之家其貧賤辛苦者少有也古方瘦胎飲原為湖陽公主而在蓋以其奉養過而氣實故

為此以托其氣使和平而易產耳非至論也

難產大全方中別有方可選用

胎衣不下以朴硝用童便一二錢熱飲之立下

古方有用以此下死胎

產後當大補氣血為先雖有他証以末治之

產後補虛用參朮黃芩歸身尾陳皮川芎炙甘草如發熱輕則加

茯苓淡滲其熱重則加乾姜或云大熱用乾姜何也曰此非有

餘之和乃陰虛生內熱耳乾姜能於肺分利肺氣入肝分引血

藥生血然又與補陰藥同用以此造化之妙非天下之至神其孰

能與於此

產後發熱惡寒皆是血氣虛甚左手脉不足補血藥多於補氣藥

右手脉不足補氣藥多於補血藥功不可發表



產後惡寒發熱腹痛者多去惡血若腹漏者非惡血也

惡血不盡小腹作疼用五靈脂香附為末醋丸甚者加雷尖桃仁

又方五靈脂為末神曲糊丸陳皮白朮煎湯下

血刺痛用當歸乃是和血之法若因積血而刺痛者宜莖仁紅花

### 當歸頭

產後血運用韭葉細切盛於有嘴瓶中以熟醋沃之急封瓶口以

瓶嘴納產婦鼻中又方以鹿角燒灰出火毒為末酒調灌下即

### 風行血極快

血暈因氣血俱虛痰火汎上作暈二陳道痰隨氣血加減硃砂安

神丸亦可服臨卧以麥門冬湯下

產後中風及口眼喎斜等証不可作風治非真中風也又大補氣血然

### 後治痰

一煩面白形長心鬱半夜生產侵晨暈厥急於氣海膈下一寸五分灸十

五壯而甦後以參朮等藥服兩月而安

產後不可用白芍藥以其酸寒能伐生發之氣也

乳汁不通用通草七分藿麥苈胡天花粉各一錢桔梗二錢青皮

白芷朮通赤芍藥連翹甘草各五分作一貼水煎食後細飲更

摩乳房或無子食乳者要消乳用麥蘖二兩炒為末作四服湯

### 調下

乳母但覺小水短少即是病生便須服藥調理益兒飲母乳母安

則兒安防患未形善之善者也

產婦因收生者不謹損破尿管以致淋瀝一証治見六十五篇



一頰產二口產戶下一物如杞有尖約重一斤餘此胎前勞後而傷氣成肝痿所致却喜血不甚虛急與黃芪白朮升麻各五分參歸各一錢連與三貼即放上得汗其粘席凍乾者落一片約五六兩益脂膜也脉濇左畧弦形實與白朮芍藥當歸各一錢半陳皮一錢姜一片二三貼養之

一頰產后陰戶下一物如合鉢狀有二岐此子宮也氣血弱而下用升麻當歸黃芪大劑服二次後一響而收入但經宿着席破落一片如掌心甚憂惧子曰非腸胃此也肌肉尚可復完以四物加入參數十貼三年後復生子

一產婦左脚左手發搐氣喘面起黑氣脉浮弦而沉濇右為甚子意其受淳詢之產前喜羨湯茶水遂以黃芩木香京芥滑石蒼

白木檳榔陳皮川芎甘草芍藥四服后加棗仁又四服而流有聲大下水晶塊大少如鷄子黃與蝌蚪者數十而愈乃去京芥檳榔滑石加當歸茯苓調理

○小兒證第七十八

附驚風 疳積 吐瀉 腹脹  
腹痛 夜啼 痰熱 發蒸  
解麤 喫泥 脫囊 赤腹  
疥瘡 頭瘡 豆瘡 尾骨痛  
脐汁出

小兒肝與脾病多肝只有餘腎只不足大人亦然  
病因有二曰飽曰暖

十六歲以前陰氣未成一云稟純陽之氣為熱多也 不宜過與溫暖故曰衣不

裘帛襦袴單袴也下體主陰得寒涼則陰消而陽長也又腸胃

尚肥而窄凡魚肉果麪燒炙稠粘等物皆宜禁絕一云脾胃尚肥飲食難化

食傷則生積成痰又云生硬冷物凍米  
瓜果酸毒之類勿令食自無疳癖之証苟無姑息所欲無不與



積成痼疾雖悔何及

乳母飲食下咽乳汁便通情欲動中乳脉便應若不謹節兒病即至又乳母初病其溺又數即須調理母安則兒安防患於未形善之善者也

錢氏方乃小兒科之祖其立劑極好能增損用之無不驗

治小兒藥品與大人同只劑料小耳

驚風有三慢驚屬脾虛所生多死宜溫補

一云尚養脾用珠砂安神丸參朮湯下利痰血

導中

急驚屬痰熱宜涼瀉

一云用灸火下痰丸赤血藥作湯下

世以一藥通治之

甚妄

本錢氏說

頻瀉利將成慢驚用錢氏白朮散加山藥匾豆

炒肉豆蔻煨各一

錢入姜一片煎服若慢驚已作加細辛天麻各一錢全蝎三箇

去稍白附子八分

煨

驚風用母丁香一粒嚼細人中白少許以其母中指取血調擦牙

上即甦又法用白烏骨雞雞血抹唇上即甦

急慢驚風痰熱口瘡手心伏熱痰熱痰喘並用湧法重劑用

瓜蒂輕劑用苦參赤小豆末須用酸齏汁調服之後稍定用通

聖散蜜丸服之間以桑樹上桑牛陰乾為末調服以平其風

原

云桑牛即楊牛則色黃白者是

又方用箔荷葉寒水石一两青黛白姜蚕辰砂

各一錢全蝎二枚

炒

猪牙皂角槐角各五分為末灯心湯和乳

汁灌之

驚而瀉參苓芍藥

酒炒

白朮姜煎夏月加黃連生甘草竹葉服之

小兒無故驚忽然大叫者又死是火大發其氣虛甚故也



角弓反長目直視困驚而致南星半夏竹瀝姜汁灌之更灸印堂  
驚風灸法男左乳女右乳黑肉上周歲者灸三壯二三歲者灸五  
七壯四五歲忽輕用

上竄搖頭咬牙是心熱黃連甘草目連悶肝熱芫胡防風甘草左

腮紅肝風瀉青丸右腮紅肺風瀉白散額上紅心熱黃連鼻上

紅脾熱獨黃散額上紅腎熱知母黃柏制炙甘草

驚風子母俱服

人參 白朮各一 茯苓 陳皮各五 甘草 薄荷各二

半夏 天麻各七 細辛三分 全蝎炒去毒

右作一服加生姜三片水煎服

發熱或停乳或感冒初發驚搐不吐瀉或吐瀉不驚搐可服

人參 羌活各一 獨活 芫胡 前胡 天麻各七

川芎 茯苓各五 甘草二 枳殼 桔梗各四 全蝎三

地骨皮三分

右剉水煎服若久病胃虛不可服

疳積或腹大用胡黃連一云疳積一 阿魏醋浸去積 各五分神曲炒去

積黃連炒去熱積 各二錢射香四粒猪膽丸麻子大每服三十九白

承湯下一方有

一方治疳用黃連白朮山查各伍錢胡黃連芦會各三錢蕪荑一

錢半神曲四錢為末猪膽九粟米大

吐瀉黃疸用三稜莪朮青陳皮神曲麥芽黃連甘草白朮茯苓為

末溫水調服傷食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑石發熱加薄荷



吐瀉用益元散 錢氏五補五瀉之藥俱可用

吐瀉調脾平胃散 一本云加蘓合香丸名萬安膏米飲化下

腹脹用蘿蔔子紫蘓梗乾葛陳皮等分甘草少許煎服食少加白

木一法用大蝦蟇 詳見二十五篇

腹痛多是飲食所傷用白朮陳皮青皮山查神曲麥芽砂仁甘草

寒加藿香吳茱萸有熱加黃芩 有蛇虫傷痛者治方見前十六篇

凡小兒好喫粽成腹痛用黃連白酒藥為末服之而愈

黑龍丸 治小兒腹痛

甘草 乾姜 各二 伏龍肝 人參 茯苓 百草霜

白朮 各五

右為末粥丸梧子大每服五丸陳皮湯下

夜啼用人參黃連 姜汁炒 各一錢半甘草五分竹葉二片作二匙服

加生姜二片煎服 一本無人參○錢氏以花火膏主之

風痰用南星五錢切片以白礬末水泡浸晒乾白附子二兩為末

麩糊丸茨實大每服一九姜蜜薄荷湯下

痰熱骨蒸二陳湯五錢升麻二錢葛根白芍藥各一錢半人參一

錢五味三十粒作三貼姜東煎服又用胡黃連楨即各一錢陳

皮雷丸各一錢半神曲半夏使君子白花蓼各二錢為丸服

變齊是胎毒散也 按諸書所論皆謂八九月長骨脉藏府之神智也

五骨除手足四十五碎有外有三百五十骨自生一藏或一府十日十骨三十二日乃為一交骨氣始全一胎生一藏而散也

交則藏府始全每交發為虛熱諸証亦有胎氣壯實暗發一宮而無發証者此骨脉藏府由交而全胎毒之回交而散也

解顱因母氣虛與熱多也 錢氏論云肖氣不宜四君子四物有熱



加黃連酒炒甘草煎服以帛束緊白欵傳之

喫泥胃氣熱也用軟石膏黃芩陳皮茯苓白朮煎服

脫囊用木通甘草黃連當歸黃芩煎服脫症用東北方陳壁土湯

泡先洗後付上脫囊腫大墜下不收用紫蘇薑葉為末水調付

荷葉包之一人傳以方用野蕪葉為末淫則參之乾則香油調付宜用生地黄木通荆芥一本有芍藥杏仁苦寒帶

赤瘤熱毒鬱結肉間發於皮膚赤如瘤也表之藥外以芒硝濃煎洗之以芭蕉油塗之錢氏用白王散塗之

脐中汁出并痛用白礬火枯付或黃柏抹付

凡小兒二歲滿頭有瘡一白瘡忽自平遂患痰喘知其為胎毒也

詢其母孕時食辛熱物遂以人參黃連及喬甘草陳皮川芎芍

藥木通濃煎入竹瀝與之數日而安

藥木通濃煎入竹瀝與之數日而安

癩頭用通聖散酒拌除大黃另酒炒共為末再酒拌令乾每服一錢

水煎服外用紅炭淬長流水令熱洗之用葫荑子伏龍肝懸龍

尾即梁上懸墜黃連白礬為末油調付之又方用松樹厚皮燒灰二

兩黃丹大一兩白礬枯黃連大黃各五錢白膠香熬飛傾石上一兩

輕粉四盞為末熟香油調付

尾骨痛醫央推盡如太屬陰虛有痰陰虛補血四物加炒礬酒知

母少桂為引或以前胡木香為引痛不止加乳沒痰二陳加知

母黃柏澤瀉又用前胡木香為引陰虛故痰甚也痛不止亦加

乳沒二法又先以玉燭散或通經散痰小胃丹大下後用之或

神祐丸十東湯亦可與治帶同

這瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡分明表裏虛實開陳治法可



為無窮之用也近因局方之教因行喜溫而惡寒得陳氏方論  
類用燥熱補劑懽然從之以錢氏為不及夫陳氏之意蓋婦重  
於太陰一經手太陰肺主皮毛足太陰脾主肌肉肺惡寒脾惡  
濕故用丁香官桂治肺之寒用附子半夏治脾之濕使果有寒  
濕量而與之可也今但見瘡之出遲身熱泄瀉驚悸喘渴者不  
問寒熱虛實率投木香散異功散因有中而獲效者苟誤投之  
棧不旋踵若錢氏固未嘗廢細辛丁香然率有益制輔佐之法  
而未嘗等於濕神池子嘗會諸朱之梓求其意而用之累効侯  
王甲申邑間痘瘡大發率用陳氏方死者無數噫人事未盡為  
數云乎哉

劉張多用涼藥陳氏多用溫藥專門不通者偏用之立見殺人田

氏保嬰度幾近理

按上論謂錢氏為詳以謂田氏而理考之二善多畧而不倫且互有得失唯滄洲翁痘

瘡辨証葆和方乃會錢陳朱龐五張李諸家之說而酌以已條陳彙集論折方辨可謂明且盡矣李者究之

初出或未出以絲瓜近蒂者三寸連皮燒存性為末砂糖調服或  
以真硃砂研水飛量鏡大小或一錢或五分蜜水調服或以絲  
灰末硃砂末合而服之多者可少少者可無

將出時又發熱鼻尖耳尖冷方是便服升麻葛根糖棗甘草節鼠  
粘子之類其出又疎而易愈

發熱之初以鼠粘子為末蜜調貼臍音門上免患眼之慮

須分氣虛血虛補之氣虛用參朮血虛用四物各加酒炒各連等

解毒藥

但見紅點便忌升麻葛根湯恐發表虛



出不快者加味四聖散紫蘇飲子紫草木香湯紫草木通湯或快  
癩散絲瓜湯有氣實痰鬱而發不出者各木白芷防風升麻黃  
芩芍藥連翹當歸頂

初起而自汗不足慮乃溼熱薰蒸而然也

出大甚者人參敗毒散犀角地黃湯初出如胸前多密急須解毒

其藥與色黑條下同而多糖抹無并  
麻葛根防風又有食少者加蒼木下

色白屬氣虛補氣為主初出色白者大虛宜大補氣血人參白木

黃芪當歸川芎升麻葛根甘草木香之類一云大便滑壯  
加訶子豆蔻

色黑屬血熱涼血為主初出色黑者大熱便宜解毒芩連黃蘗俱

酒炒鼠粘子紫草升麻葛根甘草節荆芥防風人參黃芩之類

黑為北方之色屬水火熱甚而又煎水制化之故色黑經所謂  
亢則害氣乃制也且血熱則色黑人所共曉錢氏論中謂冬月

盛寒婦腎爻黑其理安  
在何前人未之辨耶

色黑涼血色白補氣有中黑陷而外白起者則相兼而治

瘡濕者宜去濕乃肌表間熱用風藥白芷防風之類

初起渴而飲水至後屢不齊宜益元散之類

將成就而色淡者宜助血藥芎歸酒洗芍藥之類或加紅花將成

就而色紫者宜涼血解毒芩連升麻連翹葛根之類

解毒用絲瓜升麻酒芍藥甘草山查黑豆犀角六一小豆

吐瀉少食為裏虛不吐瀉能食為裏實又而補則結癰毒陷伏

倒靨灰白為表虛紅活綻凸為表實又而用表藥則致潰爛

不結痂

黑陷倒靨灰白者用人屎燒蜜水調服



為外惡氣所傷而倒靨者人參芍藥連喬黃芪稍甘草稍白芷芎  
歸川芎木香

虛痒以實表之劑加涼血藥實痒如大便不通者以大黃寒涼之  
劑少許下其結糞

從子七歲痒瘡發熱微渴自利醫用木香散加丁香予以出羣固  
因自利氣弱也所下皆臭滯陳積乃腸胃熱蒸而下也以黃連  
解毒湯加白朮與十貼利止瘡從後肌熱手足生癰癩與涼劑  
調補而愈

一少年發熱而昏耳目不聞見脉豁大而畧數知其為勞傷矣以  
人參黃芪芎歸白朮陳皮大料濃煎與十餘貼瘡始出又二十  
餘貼成濃泡無完膚或謂合用陳氏全方予曰虛耳無寒也又

數十貼而安後詢其先數白勞力出汗甚多若用陳氏方寧無  
後悔

附方

●鎮驚丸 小兒鎮驚寧神退熱夜啼化痰止咳

珍珠錢一 琥珀 天竺黃 雄黃各三 金箔十

膽星五 牛黃二 射香五 辰砂三

右為末糊丸梧子大每服六丸薄荷姜蜜湯化下

●抱龍丸 治風痰壅盛驚搐昏睡

雄黃 辰砂 天竺黃各四 射香各

牛膽 南星八 內用如無生者水浸二日焙用

右末煮甘草糊丸如棗子大三歲一丸量大小與服薄荷湯



●奪命丹 治急驚不省人事眼定不動牙關不開唇白并黑者

南星 半夏各四錢錄以生薑瓊珠新白者寸和作餅子貼乾王二錢 巴豆 去油淨一錢

辰砂 錢四 金箔 銀箔 各十片 輕粉 射香 各分

右末麪糊丸如黍米大每一歲兒一丸灯心湯下

●香膽丸 治疴消食積虫積肉積腹脹

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 神曲 麥芽

龍膽草 檳榔 各五 木香 一 川練子 去核 使君子 胡黃連

黃連 各四 白朮 一

右為末醋糊丸麻子大每服十五丸米湯下

●芦會丸 治小兒驕氣腹急骨熱

芦會 木香 檳榔 各分 蝦蟆 酒浸炙黃去骨 黃連 各一

蕪荑 去皮 青皮 陳皮 各五分 巴豆 三十制同上四味炒黃去豆

右為末猪膽丸小豆大三歲三十九丸米湯下

●木香散 治服涼藥損傷脾胃或胃虛吐天時嚴寒瘡出不快

太陰病自利四肢逆冷及瘡發多

木香 大腹皮 洗 人參 桂心 赤茯苓 青皮

前胡 訶子 煨去枝 半夏 姜制 丁香 甘草 各二分

右剉每服二三錢水一盞姜三片煎六分食前溫服

●異功散 治証同前或瘡盛出太陰病四肢逆冷或自利厥陰

病舌卷囊縮時痰厥逆搐搦或當廩不廩身不壯熱或腹脹或

瀉渴

木香 芎歸 洗酒 桂心 白朮 茯苓 陳皮



厚朴姜制 人參 白果煨 丁香 半夏制

附子炮各二各 ○右剉每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分

食前服厥陰病加防風青皮

●百祥丸 治瘡黑陷甚者

紅牙大戟

右以漿水煮極軟去骨日晒乾復納汁中煮汁盡焙乾為末

丸如粟米大每服一二十九丸研赤脂麻湯下吐利同

●四聖散 治瘡疹出不快

紫草 木通 甘草炙 枳壳等分炒

右剉每一錢水煎服

●治血散 治同上

白芍炒 為末每服一錢酒調下腹痛溫熱水下

●化毒湯 治痘瘡已出又不快

紫草茸 升麻 甘草炙各等分

右剉入杭米五十粒水煎服

●避難止小兒啼方

用綿為一小毬隨兒大小為之略使滿口而不致閉其氣量

用甘草煎湯无甘草但甜物皆可 漬之臨時縛置濡口中使兒得其味

兒口有物實之自不能作聲而綿軟不傷兒口凡避寇盜匿山谷中多為

兒啼哭声聞卒不免難由是避者將兒預棄城之哀哉茲大司成立公以女方之故類成群書妙方行于世用其心仁矣

因時取以廣其傳也

小兒証及煩人証瘡瘍腹齒之類皆有專科論方浩翰茲於附方惟篇中所用反問有切要數方而已餘固不能備也



萬曆辛丑歲仲冬月  
閩書林喬山堂刊行

新鐫丹溪朱先生醫書纂要六卷終





