

六



何氏濟生論

京江何鎮培元甫纂集

再姪孫鳳翹紫庭節錄

卷六目次

形骸諸病類

面痛論


面病論

附  
顛頰腫痛論

眼症論

鼻症論

耳症論



口症論

唇病論

齒症論

舌病論

咽喉論

四肢論

附筋病論

附骨病論

附肉病論



南京中醫藥大學圖書館 版權所有

附 皮膚論

附 鬚髮論

附 腋論

項強痛論

臂痛論

脇痛論

附 胸痛論

腰痛論

附 腎着論



附  
膀胱論

疝論

附  
陰痿論

前陰諸疾論

脫肛論



諸方書俱不載  
此症按準繩載  
此證治明若指  
掌特為標出

# 何氏濟生論卷六

## 面痛論

面痛皆屬于火蓋諸陽之會皆在于面火則陽也心  
者生之本神之變其華在面是心為君火也暴痛多  
實久痛多虛高者宜抑之鬱者宜開之血熱者宜涼  
血氣虛者宜補氣不得過用若寒瀉火如清胃散甘  
露飲之類恐見虛症亦不得過用參耆等補藥恐復  
見火症唯以越鞠加山梔連翹貝母橘紅之屬開其  
鬱結而病自安矣



聖物微點出  
其病自即除  
其氣壯平脈  
其氣壯平脈

水火氣血以形體而論其山諸重蹟貝其財以之  
器大之融然其德豈亦不辨微用參替等  
血脈盈者宜靜塗不辨微用若寒熱火收

貫八辨冬溫高者宜時之儲善宜開之血積者宜  
百生之本脈之變其華五面其心氣疎火非春  
回瀛者屬于火益蓄則之會得五十四回火與利廿八

面瀛論

天夜主命卷六



面病論

夫面者統屬諸陽而以五色候五藏焉故面青屬肝  
難經云肝外症面青善潔善怒面赤屬心難經云心  
外症面赤口乾善笑面黃屬脾難經云脾外面黃善  
噫善思善味面白屬肺難經云肺外症面白善噓悲  
愁不樂欲哭面黑屬腎難經云腎外症面黑善恐欠  
是則五藏之病必應乎面之五色矣至若面腫則爲  
風面熱多由火面寒多屬虛而風熱搏于脾肺二經  
則面多生瘡葉氏曰人之面部陽明之所屬也其或



胃中有熱則面熱升麻湯加黃連胃中有寒則面寒升麻湯加附子若風熱內甚而上攻令人面目浮腫或面鼻紫色或風刺癢疹當隨其症而治之

### 顛頰腫痛論

顛頰之腫痛非一端如丹溪治朱奶兩顛熱腫膈壅之病也用蘇葉乾葛桔梗各一錢五分升麻薄荷各一錢甘草炙七分姜三片煎服平江陳氏因驚懼後常用手指甲拄搯兩頰以致破損心中懊懺不安脈數而實諸藥不愈與牛黃清心涼膈丸數服如失東



垣云咽痛頷腫脉洪大面赤者羌活勝濕湯加黃芩  
桔梗甘草各五分治之如耳鳴目黃頰頷腫頸肩肘  
臂及外廉皆痛面赤脉洪大者以羌活防風甘草藁  
本通草經血加黃芩黃連消其腫以人參黃耆益其  
元氣而瀉其邪則腫痛之症自無不愈矣

面病選方

升麻加黃連湯

升麻

葛根

白芷

一錢

七分

甘草

炙五分

白芍

黃連

酒炒四分



何... 三... 藏板

犀角  
川芎  
荆芥穗

薄荷 分三

煎服

升麻加附子湯

升麻  
葛根 錢一  
白芷 分七

炙草 分五  
黃耆  
黑附子 分七

人參  
草薢 分五

益智仁 分三

連鬚葱頭二莖為引



洗面藥方

治面黥粉刺

皂角

三斤去皮  
弦子搗

糯米

一升  
二合

菘豆

八合

楮實子

五錢

三柰

縮砂

砂

五錢

白芨

二兩

甘草

松

七錢

升麻

五錢

白丁香

五錢

俱為極細末洗面時擦

瑩肌如玉散

河天齋主論

卷六

面疾 顯類

四

靜觀堂



何氏濟生詩 卷六 四 藏板

白丁香 兩一

香白芷 錢七

升麻 錢五

白芨 兩一

麻黃 去節 錢二

白牽牛 兩一

當歸尾 錢五

白附子 錢二 五分

白蒺藜 兩一

楮實子 錢四

茯苓 錢三

連翹 錢一 五分

白蘇 兩一

小椒 兩一

每用半錢

### 硫黃膏

治面瘡風刺臉赤鼻赤諸藥不效者臨臥洗面

後塗空近眼處



生硫黃

香白芷

花柳粉

膩粉

半錢

芫青

七个去翅足

全

蝎

一个

蟬蛻

五个

大為細末用麻油黃蠟約度如百油多少鎔化取

杏下離火入藥如法塗

澡豆方

自製

治雀印或面瘡色變赤黑大效

肥黃皂

去弦子搗

蜜陀僧

另研一兩

甘

松

一兩

草麻仁

四十粒

蛇床子

一兩

杏

仁

生用一兩



白蒺藜 去刺 三兩

白牽牛 酒浸 三兩

僵蚕 二兩

白菓肉 四

白芷 一兩

爲細末和肥皂爲圓早晚擦面洗去

肺風查鼻膿腫面赤神方

杏仁 二十枚 去皮

油核桃 二枚連皮俱在 瓦上焙不可焦

大楓子 三粒

水銀 三分唾津在手內研成黑水

共研搽二三次即愈

面黑

殺羊脛骨爲末雞子白和敷過夜旦以白梁米



泔洗三日面白

可氏齊生論

卷六

面疾 頤頰腫痛

六

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有



世表二回面自



南京中醫藥大學圖書館版權所  
南京中醫藥大學  
1964

目論  
眼症論

夫人有兩眸猶天有兩曜也五臟六腑之精華宗筋之所聚洞視萬物肝之外候也然骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑眼屬肝血之精爲絡果屬心氣之精爲白眼屬肺肉之精爲約束屬脾眼通五臟氣貫五輪由此觀之人能善自調攝養氣存神安心惜視則心氣通暢肝氣和平精氣上注于目而目無疾矣倘將養乖違六淫外感七情內傷飲食無度生食五辛熱啖炙燂久視勤書憂哀悲泣皆能病目目之爲病

睛色赤者病在心色白者病在肺色青者病在肝色黃者病在脾色黑者病在腎方論載有五輪八廓內障外障青盲雀盲倒睫拳毛翳肉扳睛風沿爛眼能近視不能遠視能遠視不能近視等症治之之法須洞察形症細究根源自無失悞病眼之人切忌當風看日喜怒房勞五辛炙燂酒食毒物惟寬緩性情慎護調攝自無不痊矣

歌括

目爲五臟之精華五輪八廓總虛誇白人屬肺目網

土黑水神光肝腎家赤目屬心須體認五行生剋勿  
令差大凡赤腫羞明痛隱澁難開淚若麻冒昧本當  
從火治隨經用藥免咨嗟昏蒙黑暗迎風淚內障多  
生五色花視遠不能兼雀目滋陰壯水却爲佳時人  
不究陰陽理謾把辛香浪點搽

眼症選方

明目流氣飲

目流梔菊鼠粘芎

蒼朮元參芥決明

國老將軍防木賊

黃芩白蒺細蔓荆

菊花清心散

清心羌活芍梔芎

甘草荆苓菊芷風

撥雲散

撥雲蟬蒺羌柴防

湯泡散

湯泡赤芍當連防

洗肝散

洗肝散即草歸芎

羌薄將軍及防風

洗心湯



洗心大黃薄荷炒 歸芍麻黃芥朮草

決明湯

決明石決菊羌芎 草賊膏芩赤芍京

清肝撥雲散

草治眼目昏花白睛紅赤障翳視物不明

石決明 草決明 生地黄 錢一

荆芥 蜜蒙花

木賊草 乾菊花 川黃連

防風 羌活 白芷

可氏齊生論 卷六 眼症方 九 靜觀堂



生甘草

當歸身

撫川芎

食後服

涼肝明目散

治肝經有熱兩目紅腫疼痛

草決明

菊花

生地

連翹

山梔

川芎

羚羊角

防風

白芍

當歸

石膏

薄荷

黃連

白芷

等分

藏板



南京中醫藥大學圖書館版權所有

煎服

明目益腎丸

天冬

麥冬

二兩

白芍

生地

二兩

當歸

黃柏

四兩

知母

八兩

山藥

杜仲

牛膝

百部

黃耆

菊花

陳皮

二兩

煉蜜丸

洗眼方

河氏齊生論

卷六

眼症方

十

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有



何氏濟生語 卷六 一 藏板

黃連 防風 當歸 錢一

黃柏 錢一 郁李仁 四十粒 杏仁 七粒

銅青 三分

水一碗入童便一碗入生礬五分同煎煎好入朴

硝少許露一宿滴眼中出熱淚再用半盞入滾

湯洗數次

洗眼棗兒藥

不論年久爛弦風眼俱可洗

皮硝 一斤



滾湯泡澄清取上好紅棗一斤剖去核入硝汁  
內浸一日取起曬乾又浸以汁無爲度將棗一  
枚入黃連三分將棗仍舊合之勿令泄氣用時  
取棗一枚投白滾湯泡之不時洗眼神效

清心明目丸

此藥補心養血清神長知潤肺利竅聰耳明目

枸杞子

二兩

當歸

酒洗

生地

酒洗

麥冬

去心

川連


甘草

甘菊

石菖蒲

遠志肉

甘草湯泡透二兩五錢



爲細末蜜丸臨臥灯心湯下七八十九

明目良方

此方東郊公省亮公合議而成治頭風之藥以  
之治目纔能清上依方服之果獲神效至重者  
不過四十具全好

青箱子

雞冠子 七分

蔓荊子 八分

草決明 七分上四味研碎

白芷 五分

木賊 六分

桔梗 五分

羌活

荆芥 分八

龍胆草 分六

細辛 分五

防風

當歸 分八

甘草 分三

藁本 分四

石石膏 分一錢五分

連翹 分七

食後水煎服

洗眼方 自製屢驗

銅綠 分五

明礬 分二

朴硝 分三

當歸尾 分七

防風

荆芥 分八

可氏齊三命

眼症方

靜觀堂



杏 仁七粒

黃 連五分

滾湯泡透時時溫洗

蘿蔔花眼神方

取極大蘿蔔一个剗空入雞子白一枚種土內待

其花開結子後取起取出雞子白研細加盧甘

石煨者一錢熊胆五分米片一分五厘研極細

蜜和點眼一日一次七日全好

鷺翎丹

治諸種目疾屢試神效以治眼漏亦效



粉盧甘石

三兩用川連二兩龍胆草二兩煎汁甘石煨赤淬內以酥爲度研極細如飛塵仍入煎汁內晒干

官礪砂

二錢

新珠子

一錢

片

腦

五分

琥

珀

五分

熊

胆

五分

研至無聲卽入前汁內搓成如線細條眼乾以  
鶯翎管貯用時以一條夾眼角內自化沁入一  
條可治數人

點眼藥

去翳膜



盧甘石 三錢

新珠子 七分

礪砂 七分

硃砂 五分

麝香 二分

琥珀 五分

真蟾酥 一分

兒茶 三分

冰片 一分

磁石粉 五分人乳黃連汁煨淬七次

各研至無聲和勻點之

去翳簡易方

扁杏仁 一粒

研細滴熱乳二三點浸片刻去粗眼頭上點數

次即愈



鼻症論

經云肺氣通于鼻欲常和和則吸引香臭矣若六淫  
外感七情內傷飲食勞役以致鼻氣不得宣通清道  
壅塞其爲病也爲衄爲癰爲息肉爲瘡瘍爲清涕爲  
窒塞不通爲濁膿或不聞香臭或乾痛無涕此皆肺  
藏不調邪氣蘊積于鼻清道壅塞而然也治之之法  
寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之但時氣鼻  
衄不可遽止蓋衄則解也唯三升以上者可斷丹溪  
云胃中有食積濕痰流注故濁氣凝結而生息肉如



棗塞鼻中用枯礬末加硃砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯加瀉白散一二貼愈鼻淵者始流濁涕或爲清汁此外寒內熱河間謂肺熱則出濁涕是也有鼻塞不聞香臭或遇寒月多塞或畏感風寒便塞不時舉發者非肺寒也乃肺有火鬱喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治當清金降火爲主而佐以通氣之劑若平昔原無鼻塞舊症偶感風寒而鼻塞流清涕者自作傷風治

鼻症選方

辛夷散

治肺虛為四氣所干涕出壅塞不聞香臭

辛夷國老細防芎

白芷麻藁羌耳通

利竅散

利竅辛夷生地黃  
蔓荆芎藭細防羌

支仁草芷升苓石

白水煎之可作湯

鼻衄方

蘇薄荷  
麥門冬

人參

升煎麻  
各五錢

可天齊三論

卷六

鼻症方

左

靜觀堂



煎服立止

治鼻塞流涕噴嚏不已

旱蓮搗汁烹酒服之立愈

鼻淵方

藿香碾為細末雄猪胆丸服

川芎丸

辛治腦瀉臭穢

川芎

生二兩

蒼朮

生一兩

草

生去皮  
尖五錢

麩糊丸食後茶下十丸忌熱物一切



腦漏神效方

自製

當歸頭

錢五

辛夷仁

錢三

羚羊角

研細  
二錢

真川芎

錢二

石青

研細水  
飛二分

為末和勻臨臥酒調下一錢



					<p>為末味已調用醋煎不一</p>	<p>其味苦淡</p>	<p>當調題 <small>正</small></p>	<p>細細脈效式 <small>自</small></p>
--	--	--	--	--	-------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------------------

五十一



人醫百出

八

心

五

其

歐

其

歐

耳症論

腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣克足耳聞必聰

若勞傷氣血風寒暑濕得以外入憂思喜怒得以內

傷使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾

風而聾者有勞傷而聾者氣厥者必時有眩暈之症

挾風者必時有頭痛之症二者皆易治惟勞役傷于

血氣淫欲耗其精元昏昏憤憤是為勞聾將息適宜

血氣和平則其聾漸輕若日就勞傷風邪停滯則為

久聾之症矣外此又有耳觸風邪與氣相擊其聲嘈



翹按腎開竅于  
 耳心亦寄竅于  
 耳胆脈絡附于  
 耳體虛失聰治  
 在心腎邪干竅  
 閉治在胆經然  
 則少陽火動婦  
 人多有者非婦  
 人獨有也

嘈眼或見火謂之虛鳴熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不  
 散濃汁出焉謂之停耳更有耳中津液與風熱相搏  
 結核塞耳亦令暴聾謂之聾耳候其顴頰色黑者知  
 其耳聾也諸症既殊治法亦異  
 有動少陽胆火者則左耳聾在婦人多有之以其多  
 忿怒故也宜順氣降火治之有動太陽膀胱相火者  
 則右耳聾在男子多有之以其多色欲故也宜大補  
 陰丸八味丸加黃柏知母之類或大病之後腎水精  
 涸陰火上升亦當與腎虛同治有動陽明胃火從申



起者故兩耳俱聾膏粱之家多有之以其多肥甘故也但審其平昔縱飲厚味則痰火上升鬱則耳鳴甚則耳閉宜清痰降火治之

耳症選方

犀角飲子

犀角飲子蒲菊通 赤芍赤豆草玄終

清神散

清神蒲菊木通防 芎草羌蠶芥木香

聰耳抑火湯





治痰火上升耳竅閉塞不通者

黃芩 柴胡 當歸

香附 花粉分八 木通

薄荷 貝母分四

菖蒲 甘草分六 防風

桔梗分七 黃連分四

治耳聾法

用鐵稱頭燒紅淬水內數十次呷水口中以磁

石一塊耳門口不時晃之即通



氣虛耳聾方

石菖蒲

人參

甘草

當歸

木通

骨碎補

去毛  
三錢

為末沸湯調下一錢外用牙皂石菖蒲為細末

絲綿裹塞耳中

又方

用鼠膽加真麝香少許和滴耳中

又方

生馱油和石菖蒲絲綿裹塞耳中



大寒中

信味甜耳中

天

綠

為末... 一... 益... 限... 米... 早... 百... 莖... 藜... 木

當

木

骨

走手

百

人

甘

原



口病論

夫口者脾之所主五味之所入也苟節宣微爽五臟之氣少有偏勝則諸疾由是而生焉故脾熱則口甘肝熱則口酸心熱則口苦肺熱則口辛腎熱則口鹹胃熱則口淡口臭一証乃五臟燥腐之不同蘊積于胸膈之間而生熱衝發于口也若口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然也施治之法當各隨其所自

口病選方

胡黃連散

治口糜

胡黃連 五分

藿香 一錢

細辛

黃連 三錢

為末每五分乾摻口內漱吐之

加減甘露飲

治男婦小兒胃有客熱口臭牙宣一切瘡痛皆

可服

熟地

生地

天冬

黃芩

枇杷葉 去毛

山茵陳



枳壳

釵斛一兩

甘草

犀角五錢

為末每服二錢煎服

升麻黃連丸

治多食肉口臭穢氣難聞

升麻

青皮五錢

黃連

黃芩

酒洗二兩

生姜

檀香

甘草

生二錢五分



甘

...

...

...

長和膏

益末

...

...

...

甘草



唇病論

唇者脾之所主胃者脾之所合其經起于鼻環于唇其支脉絡于脾脾胃受邪則唇爲之病燥則乾熱則裂風則皴寒則揭若唇腫起白皮皴裂如蠶繭名曰繭唇有唇腫重出如繭者有本細末大如繭如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳受脾經或因厚味積熱傷脾大要審本症察兼症補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自熄腫自消若患者忽畧治者不察妄用清熱消毒之藥或用藥線結去反爲翻花敗症



矣慎之慎之

唇病選方

濟陰地黃丸

治陰虛火燥唇裂如繭

熟地

五味

麥門冬

當歸

肉蓯蓉

山萸

其山藥

枸杞子

甘菊

巴戟肉

蜜丸桐子大白湯下五七十丸



瀉黃飲子

治風熱在于脾經唇燥裂

白芷

升麻

只

壳

炒楚

黃芩

防風

一錢五分

半

夏

薑湯泡七次一錢

石膏

一錢二分

甘草

七分

姜三片煎服

五福化毒丹

治唇舌腫破生瘡煩渴

元參

桔梗

二兩

人參

五錢



茯苓 一兩 五錢

馬牙硝 風化

青黛 一兩

射 字一

甘草 七錢 五分

為細末蜜丸金銀箔各四十片為衣每服一

丸薄荷湯下

升麻飲

治脾胃有熱風涼相乘唇腫生核

升麻

前胡

犀角 鎊

薏苡 五錢

葛根

龍胆草

青竹皮 二錢 五分



每服五錢煎服

獨活散

治唇上生惡核腫痛由脾胃熱壅

獨活

升麻

桑寄生

犀角

沉香

連翹

防己

大黃

七錢五分

甘草

五錢

每煎服三錢



何止流生謂

卷六

言

藏板

詳煎服三途

大黃五分

甘草五分

或香

或麩

升命器土主惡夢顛贏由輒胃燥壅

升命器土主惡夢顛贏由輒胃燥壅

升命器土主惡夢顛贏由輒胃燥壅

龍昇煎正發煎服



南京中醫藥大學圖書館版權所有

齒症論

夫齒者腎之標骨之餘也上齦乃足陽明胃之貫絡  
下齦乃手陽明大腸之貫絡手陽明惡熱飲而喜寒  
飲足陽明惡寒飲而喜熱飲有搖動齒活落者腎之  
虛也虫蛀出血浮腫者腸胃濕熱之甚也臭穢腐爛  
者胃火之壅也虛者補之實者瀉之胃火壅者清之  
統旨云齒之爲病多因飲酒厚味傷于脾胃以致濕  
熱上攻世人不清瀉腸胃濕熱而認作腎虛治之不  
知腎氣不固乃浮豁不堅痛而搖動者有之非若腸

胃火熱而為腫爛出血生虫等症也當明其標本之  
 異而治之故明醫雜著云牙床或腫或痛皆屬大腸  
 病也治宜分瀉濕熱而已上四齒屬心經下四齒屬  
 腎經上兩邊屬脾經下兩邊上左屬太陽下左盡屬  
 肺上右屬胆下右盡屬太陰

齒症選方

清胃散

治牙齦浮腫疼痛

清胃黃連生地歸

升麻石膏牡丹皮

赴筵散

治風侵寒乘作痛

赴筵散用細辛淨

荆芥良姜草烏并

細辛散

治虫痛

細辛辛芷葶椒砂

草烏鶴虱并猪牙

玉池散 小玉池散

治風熱痛

玉池槐藁芷歸芎

細草升防獨活同





小玉池湯除獨活

增添地骨有殊功

貼牙去毒至老不痛方

山梔子

黃

柏

各五錢濃煎去查

杭

粉

五錢研

射

香

五分

龍

骨

五錢入打如豆大塊子入梔柏汁內煮乾研極細

右四味用明淨黃蠟一兩鎔化入前藥和勻捏

成錠攤絹上剪作細條臥時貼牙明晨取下凡

黑處俱有毒是作痛處

固齒擦牙散

自製方



青鹽

寒水石

白蒺藜

八兩

羊脛骨

地骨皮

四兩

香附

八兩

熟地黃

四兩

生地

四兩

骨碎補

八兩

蘄艾茸

石木燕

升麻

皂角

四兩

槐樹頭

桑樹頭

楊柳頭

清明者各四十九个

咀碎瓶裝鹽泥固濟金粟火煨研細每日擦牙

甚妙

揩牙固齒奇方

河氏齋生論

卷六

齒症方

七

靜觀堂



蒲公英

連根洗搗一斤青  
鹽食鹽各二兩醃

槐落渡

即槐角子  
炒四兩

晒乾為末每日清晨擦牙滾湯嚥下

又方

去火殺虫止牙痛

明礬

爛石羔

等分

為細末擦牙嗽水洗眼治爛之病甚驗

又

製首烏

一兩

生石膏

五錢

五倍子

五錢

杜仲

炒五錢

白茯苓

五錢

白朮

炒五錢



青

鹽

錢五

北細辛

錢五

皂

角

錢五

爲細末清晨冷水漱口將藥末擦上良久吐出

永無齒患

不除商惠

為味末膏最命水煉口洪藥末將土夏入土出

青盤

正

共際辛

正

阜

正



南京中醫藥大學  
1954  
南京中醫藥大學圖書館藏

舌病論

經云心氣通于舌舌和則知五味矣蓋舌主嘗五味以榮養其身資于脾以分布津液故心之本脉係于舌根脾之絡脉係于舌旁肝脉循陰器絡于舌本倘心脾虛而不和風寒中之則舌卷縮而不能言壅熱攻之則舌強裂而瘡生七情鬱之則舌腫滿而不息甚而爲胎爲痛爲重舌爲木舌爲出血皆由心脾虛而諸邪乘之故也至于舌出不收此心經熱甚與傷寒熱毒攻心及傷寒後不能調攝往往有之宜用珍

珠末冰片等分傅之即收或用巴荳一粒去油取霜  
 用紙撚捲之納入鼻中則舌自收矣又自齧舌者何  
 氣使然岐伯曰此厥逆走上脉氣皆至也少陰氣至  
 則齧舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧唇種種壞  
 症莫不由心脾之病然則心脾可不謹養哉言聖賢

舌病選方

碧雪

治積熱口舌生瘡心煩喉閉突蓋舌生苔正刺

芒硝

青黛

寒水石

石 膏

飛煨

朴 硝

硝 石

馬牙硝

等分

黃 芩

黃 芩

右除青黛一味用甘草煎湯二升再入諸藥煎

滾用柳枝不住攪令熔方入青黛和勻傾入砂

盆內冷卽成霜研末每用少許以津含化如喉

閉以竹管吹入喉中

清熱補血湯

治口舌生瘡體倦少食日晡益甚或目澁熱痛

當 歸

川 芎

芍 藥





熟地錢一 元參分七 知母

五味 黃柏 麥冬

柴胡 丹皮分五

煎服不應用補中益氣湯加五味治之

元參散

治口舌生瘡齒齦爛痛

元參 升麻 獨活

麥冬 黃芩 黃柏

大黃炒 梔子 前胡



犀角

炙

草

等分

煎服

綠雲散

治舌上生瘡

銅綠

鉛白霜

等分

研極細末每用少許摻舌上

牛黃散

治木舌腫強

牛黃

漢防己

七錢五分

犀角屑

二錢五分



羚羊角

人參

桂心

牛蒡子

炒

生地

炙甘草

五錢

爲末每服三錢煎服

金沸草散

世醫用此發散傷寒傷風及加杏仁五味治咳

嗽皆效獨未知用之舌腫牙痛昔人有患舌腫

滿塞粥藥不入其勢危急煎此一劑乘熱以紙

籠氣薰之遂愈方見咳嗽



咽喉論

或問咽喉有痺有腫二者之外又有纏喉風乳蛾生瘡諸病何邪致之係何經之病與夫治法大畧願聞其說曰十二經脉皆上循咽喉盡得以病之然統其所屬者乃在君相二火經曰喉主天氣咽主地氣又曰諸逆上衝皆屬於火是也蓋肺主氣天也脾主食地也於是喉納氣咽納食納氣者從金化納食者從土化金性燥土性濕至于病也金化變而爲燥燥則澁澁則閉塞而不仁故在喉爲痺土化變而爲濕濕

則泥泥則腫脹而不通故在咽爲腫痺腫之病雖小異皆一時火鬱于上焦致痰涎氣血聚結于咽喉也自其咽腫形狀分之則有纏喉風乳蛾之名纏喉風者其腫透達于外且麻且痒且痛乳蛾者腫于咽喉之兩邊名雙乳蛾在一邊者名單乳蛾喉痺之暴發暴死者名走馬喉痺其間雖有經氣之寒熱不等其爲火症一也大抵治法視火之微甚而分微則正治甚則反治撩痰出血二者隨宜而施或于手大指之少商穴出血行氣若腫達于外者又必外敷以藥昔

王先生云予嘗治是症每用鵝翎蘸米醋繳喉中摘去其痰蓋醋味酸能收其痰隨翎而出又能消積血若乳蛾甚而不散當以小刀就蛾上刺血用馬牙硝吹點咽喉以退火邪服射干青黛甘桔梔芩礬石惡實大黃之類隨其攸利爲方以散上焦之熱外所傳藥如生地龍韭根伏龍肝之類皆可用若夫生瘡或白或赤其白者多涎赤者多血大率與口瘡同例如薔薇根皮黃柏青黛煎噲細嚙亦佳又喉痺惡寒及寸脉小弱于關尺皆爲表症宜甘桔湯半夏桂枝甘

草湯詳寒熱發散之若水漿不得入口者用解毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入吐出濃痰再以生姜自然汁一蜆殼嚥下之如神婁全善云喉痺惡寒者皆寒閉于外熱鬱于內也姜汁散其外寒則內熱得伸而愈矣若用胆礬等酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不得出也

咽喉選方

甘桔湯

治風痰上壅咽喉腫痛吞吐有碍



苦桔梗

一兩

炙甘草

二兩

每煎服三錢

半夏桂枝甘草湯

治暴寒中人咽喉

半夏

桂枝

甘草

二錢五分

生姜五分煎服

解毒雄黃丸

治纏喉風急喉痺卒然倒臥牙關緊急不省人

事





雄

黃

飛研

鬱

金

一兩

巴

豆

皮油去淨十四枚

醋煮麪丸菜豆大熱茶清下七丸吐出頑痰立

甦未吐再服如已死而心頭猶熱灌藥不下者

用剪刀斡口灌之下咽無有不活 小兒驚熱

痰涎壅塞或二丸三丸量大小加減一法用雄

黃丸三粒醋磨化灌之尤妙

七寶散

治喉閉及纏喉風

殭

蠶

直者十條

甘草

礪

砂

雄黃

蝎 十个頭尾全者去毒

明礬

芽皂 一挺去皮 弦一錢

胆礬 半錢

為細末每用一字吹入喉中即愈

備急如聖散

治時氣纏喉風漸入咽喉水穀不下牙關緊急

不省人事

雄黃 研

藜

蘆 厚者去皮用仁 白礬

牙皂 去皮 弦



等分爲細末用一豆大鼻內噴之立效

小續命湯見中風

羅青散

治單雙乳蛾

蒲黃五錢

羅青

盆

硝研三錢

甘草二錢俱爲細末

每末二錢冷蜜水調嚙嚙不下者雞翎蘸掃

射于散

治懸癰腫痛咽喉不利



射干

天竺黃研

馬牙硝研一兩

犀角屑

元參

升麻

白礬

白藥

黃藥

炙草五錢

蜜丸彈子大不拘時以綿裹一丸含嚥

含化龍腦丸

治喉中有物如彈丸日數深遠津液難嚥作渴

疼痛須深針腫結處以散毒氣

龍腦

射

二錢五分

升麻



牙 硝

鐘乳粉

黃

著

一兩

川大黃

甘

草

五錢

生

地

取汁

五兩

爲末以地黃汁和蜜丸如彈子大服法如上

含少龍瀝水

消瘰疔散干大不許拌以麻是十大含煎

莖 草

正發

白 礬

白 藥

黃 石

射 干

天 參

大 麻

根 治 干 癆 腫 痛 天 竺 黃

溫 平 散



四肢論

四肢論 養氣利於神 滋養而神旺 滋養而神旺

陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又脾主四肢經云四肢皆稟氣于胃而不得至經必因脾乃得稟者是也故脾實則四肢不舉經云脾脉太過爲病在外則令人四肢不舉是也脾虛則四肢不能爲用經云脾藏肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行是也治法當于痿門及中風門求之五藏有邪留于肢節經云肺心有邪其氣留于兩肘肝有邪其氣留于兩股脾有邪其氣留于兩髀腎有邪其氣

留于兩膝是也治法當求之痛痺門

筋病論

經云諸筋皆屬于節又云手屈而不伸者病在筋也  
又云在藏爲肝在體爲筋筋病忌風忌食酸辛忌久  
行經云風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸又云筋病無  
多食酸辛食辛則筋急而爪枯又云久行傷筋是也  
轉筋者非霍亂而筋自轉也皆屬血熱四物加黃芩  
紅花蒼朮南星有筋轉于足大指轉上至大腿近腰  
處者乃因奉養厚味飲酒感寒而作加酒芩蒼朮紅



花南星姜煎服孫尙藥治脚轉筋疼痛攣急松節二  
兩細剉如米粒乳香一錢銀石器內慢火炒令焦只  
留一分性出火毒細研每服一錢或二錢木瓜酒調  
下凡筋病皆治

骨病論

腎主骨在體爲骨在藏爲腎經云腎之合骨也其榮  
髮也骨病忌食甘苦久立經云多食甘則骨痛而髮  
落又云苦走骨骨病無多食苦又云久立傷骨是也  
骨病不屈經云手屈而不伸者病在筋伸而不屈者



病在骨是也

肉病論

經云脾主肉在體爲肉在藏爲脾又云邪在脾胃則  
病肌肉痛是也濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕  
甘傷肉酸勝甘又云甘走肉肉病無多食甘又云多  
食酸則肉胝膈而唇揭也又云久坐傷肉又云形樂  
志樂病生于肉治之以針石是也

皮膚論

皮膚屬肺經云肺之合皮也其榮毛也又云肺主皮

毛在藏爲肺在體爲皮毛是也毛折爪枯爲手太陰  
絕手太陰者行氣以溫乎皮毛者也氣不榮則皮毛  
焦又皮痛者心火也經云夏脉者心也夏脉太過則  
病身熱膚痛又皮膚索澤者卽仲景所謂皮膚甲錯  
也五勞虛極羸瘦腹滿惡食食傷憂傷飲傷色傷飢  
傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血者肌膚甲錯兩目黯  
黑緩中補虛大黃廬虫丸主之咳有微熱煩滿胸中  
甲錯是爲肺癰

鬚髮論

內經云腎者其華在髮多食甘則骨痛而髮落巢氏云足少陽胆經之榮在鬚足少陰腎經之華在髮血氣強則鬚髮美虛則脫落黃赤者多熱多氣白者氣血俱衰黑色者血足氣少美眉者太陽多血通髯及鬚者少陰多血美鬚者陽明多血髮落不生者黃耆建中湯主之髮落及臍下痛者四君子湯加熟地甜瓜葉治人無髮搗汁塗之卽生千金云麻葉桑葉二味以泔煮沐髮七次可長六尺眉毛墮落者用生半夏羊矢燒焦等分爲末姜汁調塗



白腋論

腋謂臂下脇上之際也屬手厥陰心胞絡經又屬足厥陰肝經腋氣又名狐臭有竅者諸藥鮮能除根止堪塞竅用銅青好者不拘多時米醋調成膏先用皂角煎湯洗淨腋下以輕粉摻過却使上件藥塗之立

效

選方

大黃蜜虫丸

治虛勞結在內者手足脉必相失宜此然必兼

補劑如瓊玉膏之類

大黃 二兩 五錢

黃芩 二兩

甘草 三兩

桃仁 一升

杏仁 一升

地黃 十兩

芍藥 四兩

干漆

蜜虫 一升

水蛭 百枚

蟻螬 一升

麝香 半升

蜜丸小豆大每服三五丸日三服

青絲散 東垣

補虛牢牙黑鬚髮

白芷

茯苓

芩

五錢

母丁香



細辛 當歸 川芎

甘草 松 升麻

生地 熟地 旱蓮草

骨皮 青鹽 故紙

寒水石 首烏 附 姜汁浸一宿炒一兩

射 高茶末

為末 庚日為始 背東面 擦牙不見 日夜不見 燈

刷畢 嚙藥餘 津潤 髭一月 頓黑 忌食 蘿蔔

烏鬚易簡方

可氏齊生論

卷六

腋氣

三

靜觀堂



製五倍

錢一

胆 礬

白

礬 七厘

鹽

一分四厘

榆皮麩

二分

細末清茶調重湯頓黃昏刷上待有一更次時

洗去

製五倍法揀大五倍子去蛀屑敲作碎粒分粗細

為二先將粗者于瓦器內用文武火炒成糊次

入細者初時大黑烟起取出不佳手炒將冷又

上火炒昏黃烟起又如前取開將冷又上火炒

青黃烟間出即住火先以真青布一塊浸濕將



倍子傾在布上捏成一團用脚踏成餅上用濕  
泥一石會一夜色如鴉羽為妙磁氣盛之勿令

洩氣

治腋臭神方

蜜陀僧四兩 枯礬二兩 輕粉三錢

為末擦兩腋下半月效半年除根

又方

用熱蒸餅擘作兩片摻蜜僧細末一錢許急挾在  
腋下畧睡少時候冷棄之如一腋有病只用一半





昔有人苦此用之一次遂絕

又方

以甘遂五錢爲末用猪肉兩片薄批開摻藥末于  
上午後貼兩腋下候明旦五更濃煎甘草五錢爲  
湯一碗服之良久瀉出穢物卽愈

烏鬚方

一月兩烏永不見白

五倍子

炒一兩

青

鹽

炒一錢

胆

礬

錢一

明礬

錢一

銅

青

錢二

飛

麩

分五



用六安粗茶調稠重湯炖至起泡刷鬚上乾則  
洗去



明用六安茶陶甌重斟挾至賦席佩鑿土算

五

一

方

一

一

一

一



南京中医药大学图书馆版权所有

項強痛論

經云項痛皆屬于濕則此證多由邪客于三陽經而然也寒搏則筋急風搏則筋弛在左多屬血在右多屬痰當分風寒痰濕與虛而治之無不效矣有挫閃及久坐或失枕而致項強不可轉移者皆由腎虛不能生肝肝虛無以養筋故機關不利宜食後服和氣飲常服六味地黃丸自愈

項痛選方

和氣飲

乾姜五分

乾葛

升麻

蒼朮炒

桔梗一兩

大黃五錢

枳殼炒五錢

芍藥七錢五分

陳皮

甘草一兩五錢

半夏

白朮

茯苓二錢

當歸二錢

每服四錢姜灯心為引煎

木瓜煎

人患筋急項痛不得轉側者皆由肝腎受陰氣

也服此大效



木

瓜

兩個  
去瓢

沒

藥

二兩  
研

乳

香

二錢五  
分研

下二味研細納木灰中將木灰蒂蓋合用竹簽

簽定飯上蒸熟三四次研成膏每服三五匙地

黃汁無灰酒化下

河天齊生論

卷一

項痛方

豐

靜觀堂



木	不	不	黃						
也	二	發	竹						
風	利	寶	鞭						
<small>去海</small>	商	增	風						
<small>兩個</small>	麻	土	醋						
好	木	蒸	外						
藥	丸	燉	不						
<small>刑</small>	中	三	為						
<small>兩</small>	藥	四	對						
降	木	大	藥						
香	丸	兩	丸						
<small>合</small>	落	兩	膏						
<small>兩</small>	蓋	丸	神						
正	合	三	服						
	用	五	三						
	竹	正	五						
	升	根	根						
	升	此	此						



臂痛論

臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之間以行本經藥行其氣血氣血通則愈矣故臂之爲痛不一或爲風寒濕所搏或因痰流氣滯或因提挈重物而致有腫者有不腫者因于風寒宜五積散加羌活因于濕者宜蠲痺湯加蒼朮因于痰者宜導痰湯因于氣者宜烏藥順氣散因于提挈傷筋者宜劫勞湯或和氣湯加薑黃薑黃其性能入臂也更有血不榮筋者四物湯加秦艽羌活有氣血凝滯者宜舒經湯



臂痛選方

舒經湯

治臂痛不能舉

片薑黃

二錢如無以  
莪木代之

赤芍

當歸

海桐皮 去粗皮

白朮

一錢五分

羌活

炙甘草

一錢

薑三片為引煎好磨沉香汁少許入藥內食前

服



劫勞散

人參

甘草

黃芩

當歸

芍藥

熟地

阿膠

紫苑

姜三棗二食前煎服

茯苓丸

主治臂痛如神

赤茯苓

防風

細辛

白朮

澤瀉

官桂

五錢



瓜蒌根

紫苑

附子

黃耆

芍藥

甘草

一錢五分

生地黄

牛膝

山芋

酒浸

獨活

半夏

山萸肉

酒浸

二錢五分

蜜丸桐子大每服十九丸温酒下

又方

白芍

人參

黃耆

當歸

半夏

白茯苓

阿膠炒

五味子

熟地黄



甘

草

各二兩

每五錢水盞半姜三片棗三枚煎好溫服百藥不效者盡此一料除根



甘草  
谷二

五味子

熟地黃

當歸 鹿角 木 蓋 半 姜 三 丸 棗 三 枚 煎 波 盛 照 百 藥

白不效 香 盡 出 一 辨 斜 財

黃 葛

八 兩 子 大 每 服 卅 九 溫 酒 下

山 黃 肉

山 黃 肉



脇痛論

或問脇痛從肝治然乎曰肝位居左痛不獨左也則亦不僅肝也夫左右者陰陽之道路也是故肝生于左肺藏于右肝陽也血陰也肝藏血乃外陽而內陰也肺陰也氣陽也肺主氣乃外陰而內陽也故痛在左脇者多因留血痛在右脇者悉是積痰其致病之由凡外之六淫內之七情勞役飲食皆足以積痰凝血雖痰氣亦有流注于左者然必與血相搏而痛不似右脇之痛無關於血也治右脇者宜推氣散治左

脇者宜枳芎散或柴胡踈肝散怒氣者脉弦實有力  
用香附芎歸之屬痰飲停伏者脉沉弦而滑宜導其  
痰瘀血者脈短澹而芤宜和其血有一條扛起者食  
積也宜保和丸更有房勞過多腎虛羸怯之人胸膈  
間隱隱微痛此腎虛不能約氣氣虛不能生血之故  
氣與血猶水也盛則流暢少則壅滯壅滯則作痛有  
必然者宜用故紙之類補腎芎歸之類和血若作尋  
常脇痛治之卽殆矣由是類推病有不一藥亦未可  
概施也

附胸痛論

肝虛則胸痛引背脇經云春脉如弦其氣不實而微此謂不及令人胸痛引背下兩脇脹滿此肝虛而脉症見于春者如此也宜補肝湯肝實則胸痛不得轉側喜太息舌本燥兩臂不舉食則吐而汗出也肝着則常欲蹈壓其胸先未痛時但欲飲熱旋覆花湯主之此皆痛之由于肝者也經云南風生于夏病在心俞在胸脇又云仲夏善病胸脇此又痛之屬于心者也夫胸乃肺之分野其言心者以心之脉從心系却

翹按此論則發病之源在肝與





心受病之處在肺也發病之源宜清受病之處宜保

上肺也其言肝者以肝之脉貫膈上而注于肺也又

胸痛而連大小腹者為腎虛脇背肩胛及兩臂皆痛

其脉洪數者為火亦有水氣及痰凝者宜各從其治

大凡胸痛久不愈者倒倉法極妙又痛在胸者與胃

腕心脇痛者有辨胃腕在心之下心痛在岐骨陷處

脇痛分左右胸痛在心之上也

脇痛胸痛選方

旋覆花湯

治肝着胸痛



旋覆花

枇杷葉

川芎

細辛

赤苓

錢一

前

胡

錢一分

姜棗為引煎服

推氣散

治右脇疼痛脹滿不食

片姜黃

只

壳

炒

桂

心

不見火  
五錢

甘草

錢二

為末姜棗湯調下二錢

枳芎散



治左脇刺痛

枳實

川芎

錢五

粉

草

錢炙二

引同上酒服亦可

柴胡踈肝散

柴胡

醋炒

陳皮

錢二

川芎

芍藥

只

壳

錢麩炒一分

甘

草

錢五分

香附

錢一分五分

煎服

保和丸



治食積作痛亦治酒積

山查肉

二兩

製半夏

橘紅

神麩

麥芽

白茯苓

一兩

連翹

萊菔子

川黃連

五錢

加白朮二兩名大安丸水泛為丸姜服

補肝散

治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或寒熱往來

山萸肉

當歸

五味

山藥

黃耆

川芎



木 瓜 錢五

熟 地

白 朮

酸 棗 仁

獨 活

為末每服五錢水煎服大棗為引

沉香導氣散

治一切氣不升降脇肋痞寒

沉 香 二錢五分

人 參 五錢

栝 榔 二錢五分

白 朮

烏 藥

麥 芽 炒

神 曲 炒

紫 蘇

大 腹 皮 炒

厚 朴

各一兩

訶 子 皮

五錢

香 附

炒一兩五錢



姜黃

橘皮

甘草

三稜

廣茂

益智仁

紅花

四兩

二兩

四兩

二兩

爲末每服二錢沸湯點食前服



爲末再煎一驗轉懸熱食前煎

一  
四

二  
二

姜黃

黃  
四兩

蘇  
丸

益  
二兩

甘  
四兩



腰痛論

此論其於其同姓

素問云腰者腎之府也轉搖不能腎將敗矣可知腎  
近于腰慾過腎虛則喜怒憂思風寒濕熱皆得傷之  
遂致腰痛又有墜墮閃肭氣凝血凝亦致腰痛其脉  
皆沉弦弦而緊者寒腰痛沉弦而浮者風腰痛沉弦  
而瀉細者濕腰痛沉弦而實者墜閃氣血凝滯痛濕  
熱腰痛遇天陰或久坐卽發瘀血者日輕夜重其脉  
瀉痰積者其脉滑或伏凡此皆標而腎虛其本也標  
甚者必挾外邪則須除其邪而後治其本更有無外



何氏濟生詩 卷六  
言 藏板  
邪者惟補腎而已腰肢痿弱身體倦怠脚膝痠軟其  
脉或細或洪而皆無力其痛亦悠悠隱隱而不過甚  
是其候也而治之亦有陰陽之分焉其陰虛者其脉  
洪而無力小便黃赤虛火時炎東垣所謂久服湯藥  
醉以入房損其真氣則腎氣熱腰瘠痛而不能舉久  
則髓減骨枯發爲骨痿宜六味丸滋腎丸封髓丹之  
類其陽虛者其脉細而無力怯怯氣短小便清利宜  
腎氣丸茴香丸鹿茸羊腎之屬若陰陽俱虛則又宜  
陰陽俱補者也治者其勿混同哉

歌括

腰痛多緣腎氣虛衝風鬱熱總因之天陰痛作知爲  
濕寒濕時疼見熱除閃挫板疼難俛仰日輕夜重血  
多瘀或因腎着并勞役水積仍兼氣不舒

腎着論

夫腎着爲病其腰冷重如帶金石但飲食如故者是  
也治宜流濕兼用溫散之藥以煖性驅之

膀胱論

腰痛者足太陰膀胱經也膀胱者足少陽胆經之所

過也有寒濕流注骨節者宜滲濕有痰積鬱滯經絡者宜導痰芍藥青皮枳榔蒼朮之類可以隨症減加若腰軟一症丹溪以為腎肝伏熱治宜黃蘗防己腰痛選方

四川飲

四川歸續牛膝杜 各用三錢水煎服

二至丸

治老人虛人腎氣虛損腰痛不能屈伸

鹿角 鹿茸 附子

各二兩



桂心

杜仲

補骨脂

一兩

青鹽

五錢

酒糊丸空心胡桃肉細嚼以鹽湯下惡熱藥者

去附子

青蛾丸

破故紙

杜仲

四兩

生薑

二兩五錢炒

胡桃

二十枚

蜜丸空心酒下五十丸

腰痛灸法



腰痛不可俛仰令人正立以竹杖柱地度至臍

用黑點記乃以度背點處隨年壯灸之藏竹杖

勿令人知灸腎俞亦可與臍平在十四椎下各

開寸半灸三壯或七壯

崑崙二穴 在外踝後跟骨上灸三壯治腰尻痛

委中二穴 在兩膝下灣橫紋中刺出血治腰脚腫痛

痼論

或問痼之爲病古有以爲小腸氣者有以爲膀胱氣者惟子和丹溪專主肝經而言其說不同何以辨之曰小腸氣者小腸之病膀胱氣者膀胱之病痼氣者肝經之病三者本非一病昔以小腸膀胱爲痼者誤也足厥陰之經環陰器抵小腹人病此者發則羸丸脹痛連及小腹則痼之係于肝可知矣小腸氣俗謂之橫弦豎弦遶臍走注小腹攻刺而膀胱氣則在毛際之上小腹之分作痛與痼之有形如瓜有聲如哇

或上于腹或下于囊者不同也但小腸膀胱因經絡  
並于厥陰之經所以受病連及于肝則亦下引羣丸  
爲痛然止是二經之病不可以爲疝也巢氏云疝者  
痛也皆由榮衛虛弱飲食寒溫不調奔走勞役不節  
致風冷邪氣乘虛入于腹中遂成諸疝發則小腹疼  
痛痛或繞臍或逆上衝心牽引肩背甚則手足厥冷  
自汗嘔吐大小便秘大抵諸疝之脉當緊弦弦者寒  
也緊者痛也巢氏又謂疝症有七曰厥疝癥疝寒疝  
氣疝盤疝疝疝狼疝是也後人又謂有腸癰氣癰卵



脹水癩之四種至張戴人又非之曰凡疝者非肝木受邪則肝木自甚也因于陰疝之中亦立爲七症曰寒疝水疝筋疝血疝氣疝狐疝癩疝是也寒者其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或連控辜丸而痛得于坐臥石堦及冷濕之地或冬月涉水或風冷處使內過勞宜以溫劑下之水者其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫如水晶或痒搔出水或小腹按之作水聲得之飲水醉酒使內過勞汗出遇風故水多令人爲卒疝宜以逐水之劑下之筋者其狀陰莖腫脹或潰或膿



或痛而裏急筋縮或莖中痛極而痒或挺縱不收或  
白物如精隨溺而下得于房室勞傷及邪術所致宜  
以降心之藥下之血者其狀如黃瓜在小腹兩旁橫  
骨兩端約中俗云便瘡得于夏秋重感大燠而復勞  
役使內血流溢滲入脬囊留而不去結成瘡腫膿少  
血多宜以和血之劑下之氣者其狀上連腎區下及  
陰囊或因號哭忿怒則氣鬱乏而脹宜以散氣之劑  
下之小兒亦有此疾俗曰偏氣胎病也不治狐者其  
狀如瓦臥則入小腹行立則出小腹入囊中若狐之

晝出穴而溺夜入穴而不溺也亦與氣疝大同小異  
令人帶鉤鈴是也宜以逐氣流經之藥下之癩疝者  
其狀陰囊腫墜如升如斗不痒不痛是也得之地氣  
卑濕所生故江淮之間湫塘之處多感此疾宜以去  
濕之藥下之諸疝既下之後可調則調可補則補宜  
各量病勢而施治焉大率心火下降則腎水不患不  
溫真陽下行則腎氣不患不和既溫且和疝何由作  
惟嗜慾內戕腎氣虛憊故陰陽不交水火不濟而沉  
寒錮冷死血濁氣滯凝其間頑痺痛脹而疝作矣治

法不可純用燥藥當溫散以逐其邪使榮衛流轉如  
寒谷回春有不疾而速不行而至者矣

附陰痿論

王節齋云男子陰痿不起古方多云命門火衰精氣  
虛冷固有之矣亦有鬱火甚而致痿者經云壯火食  
氣譬如人在夏暑而倦怠痿弱遇冬寒而堅強也予  
嘗親見一二人腎經鬱火而有此症令服黃柏知母  
清火堅腎之藥而效不可偏認作火衰

歌括



內經七疝

衝疝

巢氏狠疝相似

氣上冲心子和

無

寒水癩血氣狐筋先哲曾傳七疝名總是肝經原有  
熱外邊却被濕寒侵或因死血并痰飲鬱在囊中氣  
不行控引畢丸生腫痛或如瓜瓠或蛙聲要將標本  
分寒熱感受仍分重與輕勿指膀胱心腎氣當知症  
屬厥陰經

附錄

七疝之名諸家與內經互有同異大率寒則多痛  
熱則多縱濕則腫墜虛者亦腫墜在血者不移在  
氣分者多動畢丸有兩左屬水水生肝木木生心



狐疝 子和有巢氏無

癰疝 子和有巢氏無

即木腎

厥疝 巢氏有子和無

氣逆

瘕疝 即巢氏之瘕疝

子和之

筋疝出

白物

癰疝 即巢氏之疝

火三者皆司血而統納左之血者肝也右屬火火

生脾土土生肺金三者皆司氣而統納右之氣者

肺也是故諸寒收引則血泣而歸肝下注于左諸

氣憤鬱則濕聚而歸肺下注于右故患左丸者痛

多腫少患右丸者痛少腫多此較然者也

疝症選方

蟠葱散

蟠葱薑桂胡苓丁 丸因 青蒼砂草板蓬稜囊中屎

鹽煎散



子和之  
血病有  
膿血

癩疔

巢氏  
無子

和無有  
膿血小  
便秘

鹽煎肉豆莢蒼羌

國老栴榔厚朴良

麥蘖畢澄芓橘葷

砂仁苓壳與回香

小鹽煎

小鹽青烏鹽少許

薑草呆苘桂益智

益智仁湯

益智仁湯烏頭好

青苘生姜乾姜草

聚香飲子

聚香檀木丁沉乳

藿草玄黃桔桂同

橘核丸



橘核炒

海藻

昆布

海香帶各洗

川棟肉

桃仁各二兩

元胡索

厚朴

木通

枳實

桂

心各一兩

酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十九虛寒者加

小川烏炮一兩堅硬久不消者加砂仁二錢醋煮旋

小醫入

牡丹散

治小兒癩疔偏墜



防風

丹木皮等分

爲末每服二錢空心鹽湯調服

五子內消丸

橘核

香附子

花椒子

黑者

山梔

山查子

茅木

各一兩七錢

甘草

茴香

黃柏

元胡索

漢防已

防風

一兩

人參

五錢

蜜丸空心鹽下三錢再用茅木煎湯先薰後洗





毛孔內出水珠其疔自消不可間斷單服藥及  
單薰洗者皆不效二者兼行雖疔大如斗者亦  
愈但針過者不治

倉卒散

治寒疔入腹及小腸膀胱氣疔刺腹中冷重如

石自汗

山

梔

四十九  
燒半過

附

子

炮一  
枚

每服二錢水一盞酒半盞入鹽一捻煎服暑症

加香薷散瞿麥木通每服四錢

疔 音鳩又  
音朽

喝起丸

治小腸氣及腰痛

杜仲

酥炙

胡盧巴

芝蔴炒

破故紙

炒

小茴香

鹽水浸一宿

葶

一兩

胡桃肉

去皮研

爲末入胡核肉研勻丸梧子大每服五十九空

心鹽水下

荔核散

治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核

十四枚燒存性

八角茴香

炒

沉香

沉



木香 青鹽

食鹽 各一錢

川楝 小茴 二錢

爲末每服三錢空心熱酒調服

蜘蛛散

治狐疝

蜘蛛

十四枚去頭足研如膏

肉

桂五分取肉厚者

爲散每服一錢蜜丸亦可

雷公云蜘蛛勿用

五色者及身上有毛刺者薄小者用屋西南角

有網身小尻大腹內有蒼黃膿者佳去頭足微



炒研

川棟子丸

治疝氣一切縮小腫痛下部之疾雖年多者服之永去病根

用川棟淨肉一斤分四處一用麩一合班貓四十  
九個同炒黃去麩及班貓不用一用麩一合及  
巴豆四十九粒同炒黃去麩及巴豆不用一用  
麩一合巴戟肉一兩同炒黃去麩及巴戟不用  
一用鹽一兩茴香一合同炒黃去鹽及茴香不



用加木香

一兩不見火

故紙

一兩炒香

為末酒糊丸梧子

大空心鹽水下五十丸甚者食前日進三服

木香棟子散

疝氣久不愈者服此神效

石菖蒲

炒一兩

青木香

一兩

葶草

錢五

荔枝核

二十枚炒

川棟子

三十枚巴豆二十粒同炒黃去巴豆

為末每服二錢入射少許空心炒茴香鹽酒調

服

三層茴香丸



只治一切疝氣如神

第一料

大茴香

鹽五錢拌炒  
同鹽秤一兩

川棟子

炒去核

沙參

木香

各一兩

米飲丸桐子大每服三錢空心鹽湯下日三服

纔完即接第二料

第二料 前方加

薑

一兩

枳

五錢

共前藥重五兩五錢

米飲丸服如前未愈服第三料



第三料 前二方加

白茯苓四兩 附子製二兩 共前八味重五十錢兩

米飲丸服如前雖三十年之久大如栲栳者皆

可除根

通心散

治癩癰疔內有膿血小便不通

瞿麥穗 木通去皮 梔子去壳

黃芩 連翹 甘草

只留壳去穰 川棟子去核 當歸尾



桃仁

山查

等分

爲末每服三錢燈心二十莖車前草十莖煎湯

空心調服

崑崙丸

內消疝氣

橘

核

炒鹽

川棟子

炒鹽

香

附

童便浸  
二兩

小茴香

炒鹽水

元胡索

吳茱萸

鹽酒泡七  
次炒一兩

山查

只實

陳皮

一兩  
五錢

蒼木

炒

砂仁

青皮





栝 榔

一兩

川 椒

去目

木 香

五錢

肉 桂

一錢五分

小腸疝氣神驗方  
醋煮米丸鹽湯下六七十九

小腸疝氣神驗方

白 朮 茯 苓 猪 苓

澤 瀉 官 桂 小 茴

炒

川 棟 木 通 山 查

去核炒

栝 榔 崗 橘 子 昆 布

炒研

枝 核

三枚切碎等分



食前煎服

治穿腸疝氣立刻住疼方

用手搯大墩穴一炷香之久即止如不止須灸三

百五壯

海藻散堅丸

治木腎大如斗硬如石者

海藻洗

昆布洗

川棟鹽炒

吳萸泡七次

木香

荔枝打碎

青皮醋炒

小茴鹽水炒

延胡索



肉桂五錢 海帶七錢 橘核炒

桃仁一兩 木通七錢

酒丸鹽湯下七十九

偏墜不拘左右效方

川棟肉鹽炒 廣木香 蒼木

石菖蒲 大茴香

水泛丸空心鹽湯下三錢安臥片時立止臥時

必得微汗

又方



雄羊角

去朽骨

真橘核

打碎填羊角內泥封煨

為細末温酒下三錢



<p>石菖蒲</p> <p>大茴香</p>	<p>水泛丸空心鹽湯下三錢安臥片時立止臥時</p>	<p>氣味淡平歸脾平三錢</p>	<p>羊角</p> <p>其謝林</p>	<p>內開桂枝</p> <p>作射野羊角</p>
-----------------------	---------------------------	------------------	----------------------	--------------------------



前陰諸疾論

前陰所過之脉有二一曰肝脉經曰足厥陰之脉入  
毛中過陰器抵少腹是也二曰督脉督脉者起于少  
腹以下骨之中央女子入繫廷循陰器男子循莖下  
至篡是督脉所過也有陰縱陰縮者經曰足厥陰之  
筋傷于寒則陰縮傷于熱則陰縱治宜行水清陰氣  
也有陰汗濕痒者用大蒜煨去皮爛研同淡豆豉末  
搜和丸桐子大硃砂爲衣每服三十九棗二枚燈心  
數莖煎湯空心服有陰汗陰冷者面痿黃脚軟弱宜

溫腎湯或補肝湯有溺黃臊臭兩丸如冰汗浸兩股  
陰頭亦冷者宜清震湯有腎囊濕痒者以吳茱萸煎  
湯洗之後用吳茱萸五錢寒水石三錢黃柏二錢五  
分樟腦蛇床子各五錢輕粉一錢白礬三錢硫黃二  
錢栝榔三錢白芷三錢爲末摻之有陰腫痛者風熱  
客于腎經也用沉香五錢栝榔一兩丹參赤芍白蒺  
藜只壳炒赤茯苓各七錢五分每空心煎服四錢腫痛  
不可忍者雄黃白礬各二兩甘草二尺煮水三升洗  
之又雞翅燒灰爲末粥飲調下又伏龍肝以雞子白

和敷或馬齒莧搗汁或桃仁搗泥或蛇床子末調雞  
子黃敷俱可有婦人陰腫痛者枳實半觔切碎炒熱  
布裹熨之冷即易有婦人陰吹者胃氣下泄也膏髮  
煎導之

陰疾選方

正陽散

治腎冷陰痿縮

附子

皂

角

炙去皮  
弦一兩

乾

姜

炒

甘草

炙二錢  
五分

射

一錢  
研





每煎服二錢

陰莖挺長方

小柴胡湯多加黃連少加黃柏外以絲瓜汁調五

倍子末敷

溫腎湯

東垣二月定此方

麻黃

柴胡稍

五錢  
六分

澤瀉

二錢

防風根

蒼朮

一錢  
五分

白朮

猪苓

升麻

茯苓



黃柏酒炒一錢

食前服宜天氣晴明時

補肝湯

黃耆

人參

茯苓

葛根三分

甘草

蒼朮五分

猪苓

升麻四分

知母

柴胡

羌活

陳皮

歸身

黃柏炒

防風

澤瀉

麩末

連翹二分

河天濟三論

卷六

前陰諸疾

三

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

煎服忌酒麪

清震湯

東垣十二月定

羌活 黃柏炒一錢 升麻

柴胡 蒼朮 黃芩五分

防風 猪苓 麻黃根三分

藁本 甘草炙 歸身二分

紅花一分 澤瀉四分

煎臨臥服



蟠葱散

治陰腫又治男婦脾胃虛冷脇痛胸痞不思飲食嘔逆藿亂瀉泄膀胱氣痛及婦人血氣攻刺癥瘕帶下胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切

虛冷

延胡索

三兩

蒼

朮

油浸

甘

草

茯苓

蓬

朮

三

稜

煨

青

皮六兩

丁

皮

砂

仁

栝

榔四兩

肉

桂

乾

姜

炮二兩

每服二錢葱白連鬚煎服

膏髮湯

治陰吹

猪膏八兩

亂髮雞子大一枚

和煎髮消藥成分兩服病從小便出

蚯蚓傷腎囊方

鹽湯洗仍以炒鹽包熨痛處一方用蟬退八兩

煎湯洗仍服五苓散

婦人陰中腫疼及生瘡方



黃連

酒炒二錢

龍胆草

錢一

小柴胡

錢一

青皮

三分

腫甚加大黃

錢一煎服

婦人陰中忽生雞冠肉并生瘰方

龍胆草

酒炒錢一

山梔

五分

澤瀉

瀉

錢一

車前

生地

黃芩

炒

當歸

酒拌

木通

甘草

五分

大黃

錢一

煎服



煎服

膏犬湯黃一發

當歸體一發

木魚

甘草

五發

車前一發

生

泔

黃芩

一發

蒲葶草一發

山分

正病

便煎

一發

大錫中悉坐撰埃肉并坐藥式

煎葶吡大黃

一發

煎服

灸痛處一方用蠟退入下

青煎黃

三發

仍服五苓散

婦黃陰數

一發

煎服

一發

小柴胡

一發



脫肛論 附穀道瘻

難經云虛實出入出者爲虛入者爲實肛門之脫非  
虛而何蓋實則溫溫則內氣充而有所蓄虛則寒寒  
則內氣餒而不能收况大腸與肺氣爲表裡肺熱則  
閉肺虛則脫小兒氣血未壯老人氣血已衰生產久  
痢皆易有此則虛之明驗也本草云補可以去弱澁  
可以去脫若脫甚者既補之必兼澁之設不澁于內  
亦須澁于外古方用五倍子末托而上之一次未收  
至五七次必收而不復脫矣或木賊燒灰不令烟盡



入麝少許大便後貼之亦可更有因酒色過度而脫  
者腎水虛而洩母氣故肺金亦虛而大腸無主也宜  
實元氣去蘊熱之劑外用五倍子朴硝洗之有肛門  
腫痛者用木鱉子五六枚去壳研如泥以沸湯衝和  
洗之另用少許塗患處若穀道痒者多因濕熱生虫  
欲成痔瘻宜以雄黃入艾綿燒烟熏之并納蠅蜋丸  
或痒或痛者用杏仁搗泥敷之

脫肛選方

涼血清腸散



治大腸熱脫及腸風下血

生地

當歸

白芍

二分錢

防風

升麻

荆芥

錢一

黃芩

炒

黃連

香

附

炒

川芎

甘草

煎服

參朮芎歸湯

治生產久痢氣虛肛脫

人參

白朮

川芎



何日... 名... 三... 藏板

當歸 升麻 茯苓

山藥 黃耆炒 白芍炒

甘草炙五分

姜為引

縮砂散

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

砂仁 黃連 木賊等分

為末每服二錢米飲調下

蝟皮散



治大腸虛而挾寒肛腫不紅腫

蝟皮

一張確內  
煨存性

磁石

五錢火煨  
醋淬七次

桂心

三錢

鱉頭

一枚慢  
火炙黃

為末每服三錢米飲下

蜚蠊丸

治穀道痒

蜚蠊

七枚去翅  
足為末

新牛糞

五錢

肥羊肉

一兩  
炒香

共研如膏丸蓮子大炙令熱以新綿薄裹納下



部中半日少吃飯卽大便中虫出三五度永瘥

藏板



南京中医药大学图书馆版权所有