

痘科正宗驗方

下

小無比散

滑石

六兩

石羔

一兩 煨

寒水石

五兩 煨

鬱金

五兩

甘草

五兩

共為細末調服

以上三味水煎透焙乾

頭面頸項諸痘與前各方參看諸痘未出獨於印  
堂先現一顆者名曉星報點此痘能閉諸痘之毒  
急宜以燈火燒之但小兒畏燈則必然躲閃須用銅

錢一個印於痘上令痘從錢眼暴出然後燒之乃不差  
誤一兜出痘稀疏潮熱不退余見天庭有痘二顆其  
異常余曰此宜去之其家不信余言至次晚復來請  
余謂其兜潮熱復大作煩燥驚譫痘皆變色余  
往剔去其痘以藥敷之痘出熱退人安勿謂此為無害也

痘出點稠密其天庭地角雖然明朗而兩顴甚秘  
一亢丹紅不分界地此毒在肝肺若不急治一經咳  
嗽失音則難救用 前胡一不 赤芍一不 紫草茸一不

生地一不

丹皮一不

牛子一不

連翹一不

川芎一不

煎服

黃芩一不

黃連一不

木通一不

甘草一不

煎服

外用水柳草煎水時時洗面其痘立即轉色又  
或以胭脂米搗水攪痘上亦能解毒活血但更  
難於辨色耳嘴角有黑痘一粒而獨大者名單  
鎖口兩嘴角俱有黑痘者名雙鎖口皆惡候也  
此毒凝於胃主不食而死見此須宜剗破用口

吸去惡血以按疔散敷之或可救也鼻孔邊有痘  
名攔門痘此為凶痘承漿即人中處廣頤先有數  
點者亦凶啖竅之痘主煩悶身後竅頸項竅有  
痘皆不吉又或不拘何處有痘獨大異常者非賊  
痘即痘疔能閉通身痘毒俱宜速以燈火燒之

或挑破用口吸盡惡血以拔疔散敷之可救也  
痘出而喉窩及頸窩甚多者名猪頸又名鎖項  
竟至於頤者又名托頤主飲食不進或喉爛或音啞  
而死急用 山豆根 示 元參 示 桔梗 示 甘草 示 生地 示

川芎 示

歸尾 示

木通 示

牛蒡 示

煎服

眼中生痘真新象牙磨水點眼其痘自退可  
免眼瞎又方頂上胭脂取汁點之最妙又方蠅蚰  
虫兜敷眼皮上周圍走動吐出涎水其痘自散屢  
試如神又方照後痘風眼起翳紅赤鯉魚胆  
點之又方細茶口咀敷眼外又方益母草熬水



免痘入眼牛蒡子搗爛敷顙門痘不入眼出痘  
眼目紅腫細茶葉 菜豆 淨銀花口嚼敷之  
或以有膏黃紙塗雞蛋白貼之自退最忌吃  
雞又方人乳汁蒸熟點之或金銀花 胭脂人  
乳汁取燈心蘸點之出痘症眼有膿血兔子糞

清油調擦出痘眼痛翳子草搗爛左眼痛塞  
右鼻右眼痛塞左鼻舌與鼻孔有痘黃丹老上  
磚共為細末吹之又方青扣布燒灰吹之又方礪  
砂檀香燒枯共為末吹入又方先用皂角末吹  
再用黃蠟塞鼻又方柏葉煎水服出痘縮舌

蟬退 雄黃水煎木香磨茶調服舌上有痘人

中白焙 硼砂 免茶共為末糝舌上又方先用茶

洗淨將金墨磨水粉調塗之又方先用鹽茶洗淨

用黃柏不黃連不元參不苦參不共末蜜塗之

又方鴨糞燒研鴨毛蘸糝之

舌上爛痘用油胭脂敷最妙 黃柏不黃連不

元參不共研末蜜糖調擦舌上又方人

中白不焙枯為末擦之又方珊瑚砂水飛冰片點之

出痘口禁不語吳茱萸二水煎服 出痘腎腫

桑樹皮細茶生薑槐樹皮共搗清油拌

炒色之又方若腎紅腫取藍靛腳汁擦之又方  
如風腫者用鹽炒熱熨之或槐花葉炒熱熨之  
陰戶有痘雄黃研末清油攪勻以鴨毛蘸藥擦之  
痘症夾斑夾丹夾疹而出如恐內服涼藥有碍正  
痘即以細蜜有膏的青布塗雄黃麻油貼於

紅處如難遍貼即於太陽太陰胸背貼之亦可以  
出痘中風其症眼目直視牙關緊閉勿用驅  
風峻藥宜急用附子乾薑濃煎灌下令出微  
汗即愈雜痘一齊湧出楊柳葉 柑子葉

老艾葉 蠟樹葉共煎水遍身洗之即退

又方鮮紅花 嫩紫草 金銀花煎水遍身一洗

又方水楊柳 桃枝 槐枝 各三条 紫背浮萍水

煮遍身一洗將燈火遍身一燒即出痘毒而正痘

出現又方清油 一盃 白蠟 生姜汁 硃砂 雄黃

共熬熱從頭至尾遍身一搯雜豆退正痘即見

驗痘出齊法五六日後痘當出齊凡看痘齊與  
否必以細心為驗脚心有痘則出齊矣然痘稀  
少者亦不拘此總以熱退而痘為出齊也若熱未  
退雖四肢有痘終恐未齊不可謂毒輕痘少  
漫不加意也痘症作癢抓成瘡疤欲落不落



用好白蜜調開水時特以鷲翎掃之其痘易落

且無疤痕又方川椒

示

艾葉

示

紅棗

去核示

羌萎

示

茵陳

示

乳香

示

白芷稍

示

陳香圓

示

安息香

示

共為細末作紙燃薰照雖痘癢塌之火到癢  
除無安息香亦可此神燈照法也又方荆芥

穗為末撒紙上捲成筒糊粘紙頭燈上燒燃在  
瘡處畧燒一下甚妙或薰照亦可又痘中生疽  
癢不可忍用財挑去蛆虫自愈或用嫩柳葉  
鋪炕上睡臥其蛆自出或用鹽醋湯服之或用  
醋湯遍身噴之痘症發熱胡言亂語用藍靛

腳汁一盃 燕子泥調敷臍上燒五寸香火取去  
又方小雄雞一隻生剖開用雄黃麻油塗入雞  
臍內將雞敷臍上最穩最妙並用芙蓉敷足  
更為神效又方生蘿葡搗爛和鉛粉作餅敷足心  
又方燕子窩泥雞蛋白調餅敷臍上更妙

狂熱痘毒麻木致死此痘有由脚麻至小腹而  
死或由頭麻至心口而死一日死甦幾次藥宜早  
製以備急用冬月取小男孩糞要乾結者為佳  
稀者不用陰乾用泥裹好燒成炭去泥取糞研  
末每用三錢豆腐調服神效並用苜蓿末熱

醋調敷足心亦神方也又皮肉紅腫而痘不腫用

三豆散

黑豆

菜豆

紅飯豆共研細末再將

醋研為濃汁以鷲毛掃之神效又痘症潰爛膿

水淋漓多耳蓋屋茅草洗淨焙乾為末摻之

又方紫草麻油熬成膏加白蠟再熬數滾取

起敷之神效又方京城油胭脂敷之亦神效應驗

痘症熱泄如神用猪苓五分木通一分澤瀉一分川連一分

赤茯苓五分黃苓五分牛蒡一分車前子五分加灯

炒研

心水煎空心服虛泄者斷不可服

又方參朮散治痘症虛泄並尋常脾虛泄瀉

屢試如神

白木

一兩 土炒

軟党參

五小

白茯苓

五小

砂仁

五小

臭草

五小

薏仁

五小 炒

白蓮肉

五小 去心炒

神曲

五小

查肉

五小

肉豆蔻

面裹煨熟去面切細紙色打去油四小

柯子

四小

廣陳皮

四小 去筋

南木香

三小

共為細末每

用二錢米湯調空心服小兒如不肯服調稀粥服亦可

痘症小便不通細茶嚼融紙色敷臍上又方用

樟樹 薑 葱 老艾共搗爛炒熱敷小肚

上如女孩兜放陰門上即通 又大便不通用葱

一把搗作餅敷臍上用錫壺盛滾水熬葱上

即通痘症耳目口鼻出膿行漿之際有眼耳



出膿鼻竅流膿口吐臭膿者皆其內中有痘不能  
結痂潰而出膿不必施治內痘成膿則毒已化自  
可無虞痘風餘毒入月致生翳筋膜或成珠目  
翳眼蛇蟬全者一條馬屁勃二兩皂角十四粒出注  
者勿用共入瓦礮用泥封固泥內加鹽少許

以免出氣連礮燒紅存性候冷透火氣取出研

末每服三錢滾開水送下神效 又方頂上胭脂

洗水鋪紙以新筆在紙上蘸水一日點三次三日即

愈極效 又方仰卧床上取黃鱉尾上血滴

入閉目少頃拭去一日三五次即愈重者數日全

愈但必須繕尾血每次換一鱗用過即可放去諸藥不效者用此法極驗若痘後兩月難開用

兔糞

二小

密蒙花

一不

蟬壳

一不

穀精草

一不

去是

共為末用猪肝心切開每肝一兩入末一錢色

肝內蒸熟去藥除汁食肝神效 又方服藥用

黃連 一不  
黃柏 小半  
黃芩 一不  
元參 二不

乳汁飯上蒸熟擦之  
又方黃豆口嚼成餅

數之痘後常常鼻流涕臭不可聞此名鼻淵乃熱

毒乘於肺經而熱蒸肺竅也用 綠瓜近蒂 五子

黃芩 三不  
梔仁 二不  
牛蒡 二不  
甘草 一不  
同

煮服外用絲灰騰燒灰為末吹入鼻中並以絲灰  
燒灰調酒服亦可或松花粉聞鼻中治之甚效  
痘後唇不蓋齒此氣血兩虛急宜大加培補斷不  
可服涼藥否則必成慢驚之症難以解救則更  
費力須請名醫加意用心調理斷不可忽畧若

項門下陷尤宜急

痘後唇口生瘡上唇有

瘡虫食其名曰狐下唇有瘡虫食其肚其名曰  
惑皆由裏熱生虫內食臟腑乃有此症形也  
必其人昏昏好睡不思飲食其聲嘶啞而音  
不亮即振惑也此症乃係惡候也必致鼻崩

一落失聲而死宜用除惡丸治之為妙 黃連二分

蘆薈一分二分 使君子肉三分 白蕪荑一分五分

蟬退三分 川練子肉一分 共為末用真烏梅

洗淨去核搗爛和末為丸米湯送下

痘後齒癢或出血此餘毒留於胃經將成走

馬牙疳若不急治其後牙齦腐爛日落一齒滿

口落盡而死當發癢之時急宜用 連翹 示

牛蒡 示  
慈蘇 示  
石羔 示  
生地 示

銀花 示  
紅花 示  
甘草 示

煎水時含口內  
痘後昏迷亂語當時毒氣



已散元氣未復精神疲倦故昏昏喜墜呼之不  
醒亦自無妨若連日不醒口內喃喃自言自  
語形如醉人此乃邪熱乘於心胞也宜用  
導赤解毒湯或以安神丸主之用 木通二小

車前二小 生地三小 門冬三小 甘草二小 茯神二小

石菖蒲 二小

梔子 二小

党参 二小

灯心湯下

安神丸 中黃

五小 黃連

五小 當歸 二小半

炒梔 二小半

共為末入猪心血和勻為丸硃砂為衣灯心湯下  
若無真牛黃則加川貝胆星琥珀代之

痘後膿血去盡脾土已虧氣血俱衰邪易入

而食易傷故或感風濕或傷飲食或滯餘毒皆  
 發為浮腫然感冒風寒者多自面目先腫而身  
 熱口渴宜用 升麻不 柴胡不 雲苓不 木通不  
 車前不 防風不 大腹皮不 甘草不 薑不  
 葱一煎服微汗而腫自消矣 有感濕氣而

腫者多在足下先腫其形光亮以手按之而即有  
窩其起亦緩且其人好飲而小便赤澀以水洗之而  
更腫者此水腫也治當健脾利水為主宜用

蒼朮一不厚朴一不木通一不車前一不滑石一不

瞿麥一不澤瀉一不茯苓一不茯苓皮一不大腹皮一不

使小便清利其腫自退外用蒼朮檀香燒烟薰之  
以被蒙蓋令出濕水其腫必消 又有食積而兼

滯毒者多自腹先腫起必腹中隱隱作痛不思  
飲食且腹有微熱大便黃臭小便赤澀者滯

積而腫者治當消導解毒為主宜用蒼朮水二

厚朴一不 陳皮一不 大腹皮一不 香附一不 川芎一不

山查一不 神曲一不 牛蒡一不 連翹一不 木通一不

車前一不 雲苓一不 半夏一不 甘草一不

又有脾氣不行而浮腫者其皮如鼓按之難下乃氣

腫也治當理氣為主宜用 党參一不 白朮一不 官桂一不

麥冬二不 大腹皮二不 陳皮二不 桑皮二不

薑皮一不 茯苓皮九半 木香一不 澤瀉二不

車前二不 木通二不 又有血不行而腫者其

皮膚之內隱隱若有血路是血腫也治當活血為

主用四物湯加 羌參一不 陳皮九半 香附九半 木通二不

雲苓治之使血行而腫自消矣 又有

面目四肢腫者屬脾因表虛為風寒所侵而  
腫宜發汗而腫自退用加味五皮散主之

羌活二分

防風二分

桂枝一分

防己一分

蒼朮二分

木通二分

五加皮一分

桑皮一分

桑皮一分



大腹皮 小半  
茯苓皮 二不  
薑皮 一不  
甘草 一不

又有腹脹如鼓，眼胞微腫者，屬脾胃素虛，土弱不能制水，以行水蓄而不行，故浮腫也。又

或傷食積，脾滯不能消，以致濕熱內蓄而腫者，俱以厚朴湯治之。  
蒼朮 二不  
厚朴 一不  
陳皮 一不

大腹皮 分半

茯苓皮 分半

猪苓 分半

木香 分半

滑石 分半

車前 分半

水腫者其陰囊亦腫加

澤瀉 分半

滑石 分半

車前 分半

不通 分半

葶藶 分半

葶藶 分半

積滯腫者加

山查 分半

神曲 分半

三稜 分半

莪朮 分半

莪朮 分半

莪朮 分半

莪朮 分半

莪朮 分半

通治一切浮腫

萊菔子 分半

川椒 分半

厚朴 分半

厚朴 分半

厚朴 分半

厚朴 分半

白朮一兩共為末作丸以揀皮二不煎湯送下

又虛弱而氣不行者用肉桂磨酒服外用燒酒擦之

痘風瘡逢春即發用黃丹二不黃芩二不黃柏二不

輕粉二不共為末猪油調敷即愈

孕婦痘症妊娠出痘痘家最忌蓋痘毒

出於五臟痘毒發越則風火相搏必致動胎胎  
動則氣血耗散勢必不能送毒行漿况痘家用  
藥多主溫補如半夏肉桂之類皆妊婦所忌而  
黃芩烏為又非痘家所宜此孕婦出痘所以最  
難調治也如遇此慈以清熱安胎為主有孕之婦

遇出痘時急宜遠出迴避若至出痘當發熱時節  
以保胎為本以托痘為標仍用升麻葛根湯  
加酒炒黃芩土炒白朮以保護其胎元夫黃芩寒  
涼易至冰毒若無孕不散早用方有孕而毒火  
薰蒸不用黃芩以清內熱胎必不能保疾至於

出齊熱或來清黃芩亦不妨再用孕婦出痘始  
終以安胎為主故見熱後多服安胎飲為佳若口  
渴者則用人參白朮散加減滯者則用黃芩湯合  
四君子湯加訶子血動者芩連四物湯腰疼者  
保胎散宜早服總之不問輕重悉以清熱安胎為主

安胎飲

台党一不

白朮一不

條苓一不

當歸一不

白芍二不

川芎一不

砂仁一不

蘇葉

一不

陳皮一不

熟地一不

甘草

五分生薑三片

紅棗三枚

黃芩湯合四君子湯

黃芩一不

白芍一不

人參一不

茯苓一不

白朮一不

訶子一不

甘草一不

本連四物湯

當歸 二斤

白芍 二斤

地黃 一斤

川芎 一斤

黃芩 一斤

黃連 一斤

保胎散

玉竹 四斤  
酒蒸

當歸 三斤  
酒洗

續斷 一斤  
酒炒

杜仲 一斤  
鹽水炒

茯苓 一斤

黃芩 一斤  
酒炒

白朮 一斤  
土炒

川芎 八分

甘草 一斤

灌漿之際痘暈紅紫此血分有熱必用清毒活血



湯內有黃芩外加白朮五六分以固胎元胎必不動若  
痘暈淡紅以及淡白必用千金內托散倍加參芪  
去肉桂外加白朮一錢以固胎元胎必不動此母子兼  
治之法也孕婦出痘以安胎為主若從前未能按法  
調治至熱氣內蒸而墮胎者多矣遇此等症令老

成穩婆撐扶產母以熱水淨沐下身其上床炕不  
要倒睡必須強坐一二刻用滾水兌白酒一鐘入童  
便半盞和服行其瘀血若痘稠密用加味保元湯  
氣血虛甚十全大補湯若小腹急痛瘀血未  
盡也宜黑神散以滌除之寒涼藥味切不可用也

加味保元湯

台党示

黄芪示

當歸示

川芎示

白芷示

桔梗示

厚朴示

紫草示

防風示

牛蒡示

白芍示

肉桂示

生薑示

黑神散

熟地示

當歸示

川芎示

甘草示

肉桂示

炮薑示

蒲黃示

黑豆示

香附示

醋炙

童便酒煎服若產後出痘只以大補氣血為主十全大  
補湯是此時要方內有白芍亦用好酒炒熟不可妄  
用寒涼以傷生發之意也

引牛痘論痘何以曰牛也痘之種自牛來也外洋  
向無此疾後由他處傳染患亦滋多惟畜牛取乳

之家獨不沾染醫人效窮其故見牛乳傍有青藍小泡  
形與痘類因悟牛之患痘必輕以之傳人必然無害  
於是按古針刺法取牛痘之漿種人兩臂消燥清冷  
淵二穴旬日果於所刺之處隨出數顆按日灌水按日  
滿漿按日結痂落靨無一損傷無一復出蓋牛土畜

也人之脾屬土以土引土同氣相感同類相生故能取  
效若此痘種自牛而來故曰牛痘也

其曰引何也曰痘之為毒受於先天感於時氣散  
於經絡男女交感之會先天胎毒既有淺深感時  
行之氣復有善惡而散於經絡分配五臟又有輕重

正痘有發熱即現點者最險之症腎經之毒也由腎  
而肝而心而肺而脾傳經就多其症亦遞減故痘之  
發毒腎最重脾最輕按古痘苗塞鼻法亦必五  
臟傳徧始能發熱緣鼻者肺之外竅也苗塞鼻  
孔中其氣先傳於肺肺主皮毛肺傳於心心主血脈

心傳於脾脾主肌肉脾傳於肝肝主筋肝傳於腎腎  
主骨痘毒藏骨髓之內感苗氣而發其毒自骨髓  
盡達於筋腎藏之毒解矣自筋盡達於肌肉肝藏之  
毒解矣自肌肉盡達於血脉脾藏之毒解矣自血脉  
盡達於皮毛心藏之毒解矣自皮毛盡達於顆粒



肺藏之毒解矣苗氣必歷五臟層遞而入內毒亦必  
歷五臟層遞而出此傳送之次序也今種牛痘法擇  
於兩臂中消鑠清冷淵二穴上下交連之處種之  
似與塞鼻孔法有異殊不知二穴部位乃手少陽三焦  
經也三焦者人身最關要之府如天地之三元總領五

臟六腑營衛經絡通內外左右上下之氣三焦通則內  
外左右上下皆通得其關要之處引之直從皮毛血  
脈肌肉筋絡同時直傳而入使縱有胎毒深藏於  
腎亦自然同時引挈而出如引路然引諸坦途則  
無顛躓之患如引絲然引其端續則無棼亂之憂

金鑑所謂引其毒於未發之先者即此意張遜玉種痘  
新書所謂以佳苗而引胎毒斯毒不橫而症自順  
者亦此意故凡種痘皆用引法而引毒從皮毛血  
脈肌肉筋骨同時而出則牛痘最捷也痘為小兒  
一大病當天行時人人尚思遠避今無故取嬰孩而與

之以病可乎曰非也譬之捕盜乘其羽翼未成就  
而擒之甚易也譬之去莠及其滋蔓未延蔓而除  
之甚易矣人家小兒出痘如遇險症延醫服藥日  
夕守視多少酸辛問卜求神多少驚恐其輕者亦須  
多方調護今中痘則止種四顆或六顆小兒嬉笑飲

食一切如常旬日之外告厥成功無災無害不惟小兒  
省却疾苦即育子者亦省却憂勞法誠善也或  
問種牛痘有死者否曰斷無致死之理予少時未出  
天花之先就有種痘之家因京都人不信者多後牛痘  
局種者頗廣萬無一失勿藥有喜人所共知若非

種者甚多無誤豈能信乎人誰不愛兒女愛兒女誰  
不慮及出痘一事必要過了這個關頭方算得是自  
己兒女今有種洋痘一法不避風不禁口行所無事豈  
不大好奈何猶不能盛行只是人不能堅信怕出了

洋痘遇着天行痘子又會復染夫廣東行此近四十年

所問廣東人多矣皆言從未有復出者廣東四十年  
來所往之人在外省仕宦商賈者不少未聞有再染  
天行時痘者就是湘潭雖未盛行前三四年也有十  
數家出洋痘何曾再染天行痘子來今年有幾家  
種了洋痘信不的確又吹苗試之並不復出此亦實

實信得過了或謂種洋痘者過十年當復出果爾則十  
年一四百年不過十回穩穩當當也不費力况乎並無此  
理也試思他從兩臂點苗畧刺皮膚微見血點到次日  
已無形跡了若不是直達臟腑如何過了三四日方見

紅影又三日長水三日灌漿三日結痂如期不爽與吹苗



一般長得晶圓飽滿比吹苗之痘更好看些蓋先天  
之毒蘊於無形以氣引氣而痘出焉吹苗是以氣引  
氣點苗也是以氣引氣為何獨信吹苗而不信點  
苗乎但點痘之家主人必須留心其結痂之後痂是尖  
頂斜腳則毒氣未出必要點過方能算得即不尖

頂斜脚而當長水灌漿時小兒氣血不足或有泄瀉  
之病不能長到飽滿毒氣瀕出而未盡出必須重服茂  
朮等藥補脾助氣使他長得十分飽滿方好誠恐本  
要再點而主人自以為算得過了痘科者亦照管不到  
則萬中或有一二復出者蓋此法原有引至兩次三次之

說萬不可草率了事也若因本要再點未及再點遇  
天行痘或又復染則人皆藉口益無復有信之者矣豈  
不大可惜哉予考醫書載嬰兒生數日刺出臂上汚血  
終身可免出痘一條後穴道刀法皆失傳之今點痘或其  
遺法也夫以萬全之法失傳已久而今復行者大約前此

數未滿而今洋烟入中國害人不可勝計把那劫數抵  
過了故此法亦從洋來得以保全嬰兜之年壽耳  
若不堅信而遵行之是違天而自外於生生之理矣  
家中若有嬰兜者急速種痘為要予日擊其事  
深察其所以然堅信不言欲以天下人之信因以俚

淺之詞為聖信洋痘說按洋痘之術道光丁亥行之  
至而今全活嬰孩甚衆吳子馱廷其術尤精所點  
不下數千人以為親友所見所聞幾十年來從未有  
重出者誠保赤之妙手也 痘科正宗卷之終

玉怡亭光緒丁酉仲春寫於幽靜山房