





本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經  
難火蘭附

五味子

本經  
蓬蘽

本經

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺  
別錄

蛇莓

使君子

開寶

木鼈子

開寶

番木鼈

馬兜鈴

開寶  
青木香

檻藤子

開寶  
合子草附

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經  
卽鼓子花

太乙金鎖

紫葳

本經  
骨路支

卽凌霄花  
附原落附後諸籜末

營實

蔣蘆  
本經

月季花

綱目

枯樓

本經  
天花粉

王瓜

本經  
土瓜

本草綱目草部

卷十六

葛

本經  
鐵葛附

黃環

本經  
卽狼跋子

天蠻冬

本經

百部

別錄  
白并附

何首烏

開寶

草薢

別錄

菝葜

別錄

土茯苓

綱目

白芨

本經

女萎

李當之  
褚魁

本經

鴛抱

圖經

伏雞子根

拾遺  
仰盆

人肝藤附

千金藤

開寶  
思戾附

九仙子

綱目

山豆根

開寶

黃藥子

開寶

解毒子

唐本卽苦藥子奴  
會子海藥實根附

甘白藥

會州白藥

本草

白藥子

唐本  
衝洞根  
突厥白附

威靈仙

開寶

茜草

本經

翦草

日華

昉已

本經

通草

本經

通脫木

法象天  
壽根附

釣藤

別錄  
倒挂藤附

黃藤

綱目

白菟藿

本經

白花藤

唐本

白英

本經

卽鬼

蘿藦

唐本

赤地利

唐本

紫葛

唐本

烏蔹莓

唐本卽  
五葉藤

葎草

唐本

羊桃

本經

絡石

本經

木蓮

拾遺  
地錦附

扶芳藤

拾遺

常春藤

拾遺

千歲蘡

別錄

忍冬

別錄

卽金銀花

甘藤

嘉祐  
甜藤

甘露藤

藤附

目錄

含水藤

海藥

鼠籠附

天仙藤

圖經

紫金藤

圖經

南藤

開寶

烈節附

清風藤

圖經

百棱藤

圖經

省藤

拾遺

紫藤

開寶

落鴈木

海藥

折傷木

風

千里及

拾遺卽  
千里光

藤黃

拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤

一十九種新增一種

胡石

本草

白蘋

本草

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經  
難火蘭附

五味子

本經  
蓬蘽

本經  
別錄

本經  
蓬蘽

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺  
別錄

別錄

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

開寶

開寶

馬兜鈴

開寶  
青木香

檻藤子

開寶合  
子草附

預知子

開寶  
太乙金鎖

牽牛子

別錄

旋花

本經  
卽鼓子花

本經  
太乙金鎖

紫葳

本經  
骨路支附原落附後諸簾末

營實

本經  
卽凌霄花

蕷蘿

本經  
金鎖

月季花

綱目

栝樓

本經  
天花粉

王瓜

本經  
土瓜

葛本經  
鐵葛附

黃環本經

卽狼跋子

天蠻冬本經

百部別錄

白并附

何首烏開寶

草薢別錄

菝葜別錄

並附

土茯苓綱目

白芨本經

女萎李當之

拾遺

赭魁本經

鴛抱圖經

伏雞子根拾遺

仰盆

千金藤

開寶  
陳思峩附

九仙子

綱目

山豆根

開寶

黃藥子

開寶

草解毒子

唐本卽苦藥子奴  
會子海藥實根附

白藥子

唐本  
衝洞根  
陳甘白藥  
突厥白附

會州白藥

威靈仙

開寶

茜草

本經  
血藤附

翦草

日華

昉已

本經

通草

本經

通脫木

法象天  
壽根附

釣藤

別錄  
倒挂藤附

黃藤

綱目

白菟藿

本經

白花藤

唐本

白英

本經  
目排風子

蘿摩

唐本

赤地利

唐本

紫葛

唐本

烏蔹莓

唐本  
五葉藤

葎草

唐本

羊桃

本經

絡石

本經

木蓮

拾遺  
地錦附

扶芳藤

拾遺  
別錄

常春藤

拾遺

千歲蘡

別錄  
地錦附

忍冬

別錄  
卽金銀花

甘藤

嘉祐  
甜藤

甘露藤

藤附

含水藤

海藥  
鼠籠藤  
附

本草綱目 卷十八  
天仙藤 圖經

紫金藤 圖經

南藤

開寶烈節附

清風藤 圖經

百棱藤 圖經

省藤

拾遺

紫藤

開寶

落鴈木

海藥

折傷木

風

千里及

拾遺卽  
千里光

藤黃

拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八  
附錄諸藤 一十九種新增一種

刺藤

本麻

刺藤

本麻

刺藤

本麻

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附二十九種

菟絲子

本經上品

釋名菟縷

別錄

菟蘡

別錄

菟蘆

本經

菟巨

廣雅

赤綱

別錄

雅爾唐蒙

爾雅

火燄草

綱目

野狐絲

綱目

金線草

禹錫曰

按

呂氏春秋

禹錫曰

玉女

云或謂菟絲無根也其根不屬地

莧

是也抱朴

子云菟絲之草下有伏菟之根無此

菟則絲不得

生于上然實不屬也

伏菟抽則菟絲死又云菟絲

初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服立能

變化則菟絲之名因此也○

宏景曰

舊言下有莧

苔上有菟絲不必爾也

須曰

抱朴所說今未見

豈

別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也

菟絲

也一物四名而本草唐蒙爲一名

詩云蕪與女蘿

菟絲

也一物四名而本草唐蒙爲一名

詩云蕪與女蘿

毛蓑云女蘿莞絲也而本草莞絲無女蘿之名惟  
松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫  
漏乎震亨曰莞絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而  
生不相關涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿  
卽莞絲吳普本草莞絲一名松蘿陸佃言在木爲  
女蘿在草爲莞絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以  
爲一物故也張揖廣雅云莞丘莞絲也女蘿松蘿  
也陸機詩疏言莞絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松  
上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部松蘿下又莞絲茯苓說見茯苓下

## 集解

別錄曰

莞絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木

之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤綢色  
淺而大者爲莞藁功用並同宏景曰田野墟落中  
甚多皆浮生藍紺麻蒿上其實仙經俗方並以爲  
補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似  
黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花  
結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之  
頌曰今近道亦有之以冤句者爲勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時珍曰按宦獻王庚辛玉冊云火燄草卽蕘絲子草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延實如粧豆而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

### 子脩治

數曰凡使勿用天碧草子真相似只是味酸濇并黏也蕘絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入白中燒熱鐵杵一丟三千餘杵成粉用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

### 氣味辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷松脂爲之使惡蘿菌

主治續絕

傷補不足益氣力肥健人

本經

養肌強陰堅筋骨主

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久

服明日輕身延年

別錄

治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黓悅顏色

甄權

補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺

大明

補肝臟風虛

古好

發明

敷曰蕘絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹感枝而成從中春上陽結實故偏補人衛氣

助人筋脈

頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒

一斗浸曝乾

再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服

令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也

附方

舊六新五

消渴不止

蕘絲子煎汁任意飲之

以止爲度

事林廣記

陽氣

**虛損**

梧子大每服五十丸氣虛人參湯下氣逆沈

香湯下○

經驗方用蕘絲子酒浸十日水淘杜仲研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空

心酒下五十丸

白濁遺精茯蕘丸治思慮太過心腎虛損真陽不固漸有遺瀝小便白濁

夢寐頻泄蕘絲子五兩

爲末酒糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽湯下

和劑局方

小便淋瀝蕘絲子煮汁飲范汪方小便赤濁心腎不足精少

血燥口乾煩熱頭運怔忡

等分爲末蜜丸梧子大鹽湯每下七十丸

痛器或頑麻無力

蕘絲子洗一兩牛膝二兩同入銀

子大每空心酒服三十丸

經驗方身面卒腫洪大夫用蕘絲子一升酒浸

酒下二十丸

梧子大空心溫聖惠方

身面卒腫洪大夫用蕘絲子一升酒浸

梧子大空心溫聖惠方

升漬二三宿每飲一升日三服不消再造

肘後方

婦人橫生

茺絲子末酒服二錢一加

車

前子等分聖惠方

眉鍊癬瘡

茺絲子炒研油調傅之

山居四要穀道赤

痛

茺絲子熬黃黑爲末雞子白和塗之

肘後方

痔如蟲咬

方同

苗氣味

甘平無毒

玉冊云汁伏三黃硫汞結草砂

主治研汁塗面

去面黓

本經

接碎煎湯浴小兒療熱癆

宏景

附方

舊二新

一面瘡粉刺

茺絲子苗絞汁塗之不過三上

肘後方

小兒頭

瘡

茺絲子苗煮湯頻洗

目中赤痛

野狐絲草搗汁點之

聖惠方

附錄

難火蘭

拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風

中胡國狀似茺

絲子而微長

五味子

本經上品

釋名

莖蕷

爾雅音

玄及

別錄

會及

恭曰

五味皮肉甘

酸核中辛苦都有

鹹味此則

酸當

以木爲

五行之先也

集解

別錄曰

五味子生齊山

山谷及代郡

八月采

實陰乾

宏景曰今第

一出高麗

多肉而酸甜

次出青州

冀州味過酸

其核並似豬腎

又有建平甜

者少肉核形不相似

味苦亦良此藥多膏潤烈日

暴之乃可搗篩

恭曰蔓生木上其葉似杏

而大子

作房如落葵

大如瓠子出蒲州

及藍田山中今河

中府歲貢之

保昇曰蔓生莖赤色

花黃白子生青

熟紫亦具五色味

甘者佳頌曰今河

東陝西州

於高木

尤多杭越間亦有之

春初生苗引赤蔓

於其郡

長六七尺葉尖圓似杏葉

三四月開黃白花類蓮

言紅花入藥蒸曝不去子今有數種大抵相近雷敷言

花狀七月成實叢生莖

端如豌豆許大生青熟

言紅

小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛  
甘皆全者爲眞也時珍曰五味今有南北之分  
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃  
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃  
架旺須以引之

脩治

數日凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳  
至申卻以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用藥生用

氣味酸溫無毒

好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰  
中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘

入中宮益脾胃之才曰蕤蕤爲之使惡萎蕤勝烏

頭

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

本經

養五臟除熱生陰中肌

別錄

治中下氣止

嘔逆補虛勞令人體悅澤

甄權

明目暖水臟壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痃癖奔豚冷氣消水腫  
心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒

明大

生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大

李治

喘欬

燥嗽壯水鎮陽

好古

發明

成無已曰

肺欲收急食酸

以收之以酸補之

氣補氣不足升也

酸以收逆氣而安肺

果曰收肺

與乾薑同治之

又五味子收逆氣肺寒氣逆則宜此

藥故治嗽以之爲君但有外邪者不可

驟用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏

華州以西至秦多產之

方紅熟時

彼人采得蒸爛

爲佐喘者阿膠爲佐但分兩少不同耳

宗奭曰今

研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中  
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言  
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其  
除熱氣曰華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多  
感今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨  
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非  
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥寇  
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之藥也何惑之  
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五味  
五倍子斂而降之思邈曰五六月宜常服五味子  
湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其  
法以五味子一大合木臼搗細裝瓶中以百沸湯  
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫  
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣  
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥  
冬人參少加黃芪煎湯服之使人精神頓加兩足  
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而  
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也○機曰五味治喘嗽須分南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色如玉女入水不霑入火不灼

### 附方

新一

### 久嗽肺脹

五味二兩粟殼白餳炒過半兩爲末白餳丸彈子大每服

一丸

水煎服○久嗽不止

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風

甘草

一錢半五倍子一兩

化消各

二錢爲末乾噙○攝生方用五味子一兩真茶四錢曬研爲末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸沸湯

下數日卽愈也痰嗽并喘

五味子白礬等分爲末每服三錢以生豬

肺炙熟蘸末細嚼白湯

下漢陽庫兵黃六病此藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

百

普濟

陽事不起

新五味子

忌豬魚蒜醋盡一劑卽得

力百日以上可御十女四時

## 腎虛遺精

北五味子一斤洗淨

勿絕藥功能知千金方

水浸拔去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中

布瀝過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日

出火性每空心服一二茶匙百

## 腎虛白濁

並背脊

穿痛五味子一兩炒赤爲末醋糊丸梧

子大每醋湯下三十丸 經驗良方

## 五更腎泄

凡人每至五更卽溏泄一二次

經年不止者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡溼則濡而困困則不能

治水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水

養五臟吳茱萸以除脾溼則泄自止矣五味去核

三兩茱萸湯泡七次五錢同炒香爲末

許叔微本事方

## 女人陰冷

每日陳米飲服二錢

大頻納陰中取效

## 爛弦風眼

味五

免矢大頻納陰中取效

蔓荆子煎湯頻洗赤遊風丹漸漸腫大五味子

研熱酒頓服一

錢自消神效

保幼大全

# 蓬蘽

音累○本經上品

釋名

覆盆

別錄

陵蘽

別錄

陰蘽

別錄

寒莓

會

編割田藨

音芭時珍

曰蓬

蘽與覆盆同類故別錄謂一

名覆盆此種生

于丘陵之間藤葉繁衍蓬蓬纍纍異於覆盆故曰

蓬蘽陵蘽卽藤也其實八

月始熟俚人名割田藨

其根味甘可食

其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

集解

別錄曰

蓬蘽生荆山平澤及冤句

宏景曰蓬

也覆盆是實名李當之云是人所食苺子以津汁

爲味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

曰覆盆蓬蘽乃一物異名本謂實非根也李云苺

子者近之矣然生處不同沃地則子大而甘瘠地

則子細而酸此乃子有酸味根無酸味陶以根酸

子甘列入果部重出二條殊爲孟浪志曰蓬蘽乃

# 校正

自果部移入此

覆盆之苗莖覆盆乃蓬蘽之子也按切韻莓音茂其子覆盆也蘿者藤也則蓬蘽明是藤蔓矣陶言是蓬蘿是根蘇言是子一物異名皆非矣頌曰蓬蘿如柿蒂小兒多食之五月采實其苗葉采無時江南謂之莓然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月實用則同士良曰今觀采取之家說蓬蘿似蠶莓子紅色而大其味酸甘葉似野薔薇有刺覆盆子小其苗各別諸家本草不識故皆說蓬蘿是覆盆子之根大明日莓子是蓬蘿子也樹莓是覆盆子也宗奭曰蓬蘿非覆盆也別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此藏器曰其類有三種惟四月熟狀如覆盆而味甘美者爲是覆盆子餘不堪入藥機曰蓬蘿徽人謂之寒莓沿塹作叢蔓生莖小葉密多刺其實四五十顆作一朵一朵大如盞面霜後始紅蘇恭圖經以此註覆盆誤矣江南覆盆亦四五月熟何當差晚耶覆盆莖粗

葉疎結實大而疎散不似寒莓莖細葉密結實小而成朵一則夏熟一則秋熟豈得同哉時珍曰此

時珍曰此

時珍曰此

類凡五種子嘗親采以爾雅所列者校之始得其的諸家所說皆未可信也一種蔓藤繁衍莖有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟椹而扁冬月苗葉不凋者俗名割田藨卽本草所謂蓬蘽也一種蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而疎稀生則青黃熟則烏赤冬月苗凋者俗名插田藨卽本草所謂覆盆子爾雅所謂荊缺益也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名薅田藨卽爾雅所謂藨者也故郭璞註云藨卽莓也子似覆盆而大赤色醉甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆

益子一樣但色紅爲異俗亦名藨卽爾雅所謂山  
莓陳藏器木草所謂懸鈎子者也詳見本條一種  
可食者本草所謂蛇莓也見本條如此辨析則蓬  
蘡覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪  
機五說近是而欠明悉陶宏景以蓬蘡爲根覆盆  
爲子馬志蘇頌以蓬蘡爲苗覆盆爲子蘇恭以  
爲一物大明以樹生者爲覆盆皆臆說不可據

氣味酸平無毒

別錄曰甘酸微熱

主治安五臟益精

氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老

本經

療暴中風身熱大驚

別錄

益顏色長髮耐寒溼

恭

發明

見覆盆

書未可謂

嘗勝采以頭戴

頭戴

頭戴

附方

新

長髮不落

蓬蘡子榨油日塗之

聖惠方

苗葉同盆

覆盆子別錄上品

校正自果部移入此

釋名

爾雅音奎

蓴蓋爾雅音苞

西國草圖經

畢楞伽圖經

大麥苺圖經

音澆

插田藨音烏藨子

綱目當之曰子似覆盆之形

故名之宗奭曰益腎臟縮小

便服之當覆其溺器如此取名也時珍曰五月子

熟其色烏赤故俗名烏藨大麥苺插田藨亦曰栽秧藨甄權本草一名馬瘻

瘦一名陸荆殊無意義

集解

別錄曰五月采藏器曰

佛說蘇密那花點燈

正言此花也此花有三種以四月熟狀如覆盆

盆味甘美者爲是餘不堪入藥今人取茅莓當覆

盆誤矣宗奭曰處處有之秦州永興華州尤多長

條四五月紅熟山中人及時采來賣其味酸甘外

如荔枝大如櫻桃軟紅可愛失時則就枝生蛆食

盆味甘美者爲是餘不堪入藥今人取茅莓當覆

盆誤矣宗奭曰處處有之秦州永興華州尤多長

本草綱目直部 卷二十一  
之多熱收時五六分熟便可采烈日曝乾今人取  
汁作煎爲果采時著水則不堪煎時珍曰蓬蘽子  
以八九月熟故謂之割田藨覆盆以四五月熟故  
謂之插田藨正與別錄五月采相合二藨熟時色  
皆烏赤故能補腎其四五月熟而色紅者乃蓀田  
藨也不入藥用陳氏所謂以茅莓當覆盆者蓋指  
此也

## 正誤

說曰覆盆江東名懸鉤子大小形狀氣味功  
力同北土無懸鉤南地無覆盆是土地有前  
後生非兩種物也  
時珍曰南土覆盆極多懸鉤是樹生覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色烏赤懸鉤  
色紅赤功亦不同今正之

## 脩治

說曰覆盆子五月采之烈日曬乾不爾易爛  
雷曰凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子  
以酒拌蒸一宿以東流水淘兩遍又曬乾方用  
時珍曰采得搗作薄餅曬乾密貯臨時以酒拌蒸尤

妙

氣味甘平無毒

權曰辛微熱

主治益氣輕身令髮不白

別錄

補虛續絕強陰健陽

悅澤肌膚安和五臟溫中益力療癆損風虛補肝

明目並宜擣篩每旦水服三錢

馬志

男子腎精虛竭

陰痿能令堅長女子食之有子

權

食之令人好顏

色榨汁塗髮不白

藏器

益腎臟縮小便取汁同少蜜

煎爲稀膏點服治肺氣虛寒

宗奭

發明

時珍曰 覆盆子蓬蘽功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無

本草綱目草部  
妨其補益與桑椹同功若  
樹苺則不可混采者也

附方

新陽事不起

覆盆子酒浸焙研爲末每

日酒服三錢

集簡方

葉氣味微酸鹹平無毒主治

接絞取汁滴目中去

膚赤出蟲如絲線

藏器

明目止淚收溼氣

時人用

發明

頌曰按崔元亮海上集驗方治目暗不見物  
冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等疾取西

國草

一名畢楞伽一名覆盆子日曝乾搗極細以

薄綿裹

之用飲男乳汁浸如人行八九里久用點

日中卽仰臥不過三四日視

物時珍曰按洪邁夷堅志云潭州趙太尉母病爛

弦眼二十年有老嫗云此中有蟲吾當除之入

山取草蔓葉咀嚼留汁入筒中還以阜紗蒙眼滴

弦痕

二十年有老嫗云此中有蟲吾當除之入

山取草蔓葉咀嚼留汁入筒中還以阜紗蒙眼滴

汁漬下弦轉盼間蟲從紗上出數日下弦乾復如

法滴上弦又得蟲數十而愈後以治人多驗乃覆

弦痕二十年有老嫗云此中有蟲吾當除之入

山取草蔓葉咀嚼留汁入筒中還以阜紗蒙眼滴

汁漬下弦轉盼間蟲從紗上出數日下弦乾復如

盆子葉也蓋

治眼妙品

## 附方

新二

## 牙疼點眼

用覆盆子

嫩葉搗汁

點目皆三

次有蟲隨

眵淚出成塊也無

新葉乾者煎濃汁亦可

摘玄方

大麥苺也

覆盆葉爲末用

酸漿水洗後摻

瘻瘍潰爛

之日一次以愈

爲度直指方

## 根主治

痘後目腫取根洗擣澄粉日乾蜜和少許

點於醫丁上日二三次自散百日內治之久卽難

## 療

時珍○活

幼口議

## 懸鉤子

拾遺

## 校正

自果部

移入此

## 釋名沿鉤子

日荊爾雅音箭

山莓爾雅

木莓郭璞

樹莓日華

藏器

曰莖上有刺  
如懸鈎故名

集解

藏器曰生江淮林澤間莖上有刺其子如梅

頗類金櫻

四五五月結實如覆盆子采之擎蒂而中

實味酸覆盆則蒂脫而中虛味甘爲異時珍曰懸

鈎樹生高四五尺其莖白色有倒刺

其葉有細齒似櫻桃葉而狹長又似地

青色無毛背後淡青

頗似櫻桃葉而狹長又似地

棠花葉四月開小白花

結實色紅今人亦通呼爲

藨子爾雅云荊山莓也

郭璞注云今之木莓也實

似藨莓而大可食孟詭大

明並以此爲覆盆誤矣

氣味酸平無毒

主治醒酒止渴除痰去酒毒

藏器搗汁服解射工沙

蟲毒

時珍

**葉**主治燒研水服主喉中塞

藏器

**根皮**氣味苦平無毒主治子死腹中不下破血婦

人赤帶下久患赤白痢膿血腹痛殺蟲毒卒下血

並濃煮汁飲之

藏器

**附方**

新二

**血崩不止**

木

**莓根**

四兩酒一盃煎七分

空心溫服

曜仙

乾坤生意

**崩**

**中痢下**

治婦人崩中及下痢

**日**

**夜數十起**

**欲死者**

**各**

**一斛**

**剉入釜中**

**水淹上四五寸**

**煮減三之一去**

**滓取汁**

**煎至可丸**

**丸梧子大**

**每溫酒服**

**十三丸**

**日三**

**服**

**千**

**金翼**

**蛇莓**

**別錄**

**下品**

本草綱目草部 卷十六  
釋名 蛇藨

音苞地莓 會編 蟲莓

機曰近地而生故曰地  
瑞曰蠶老時熟紅者

地其中空者爲蠶莓中實極紅者  
爲蛇殘莓人不啖之恐有蛇殘也

集解

宏景曰蛇莓園野多有之子赤色極似莓子  
而不堪啖亦無以此爲藥者保昇曰所在有

之生下溼地莖頭三葉花黃子赤儼若覆盆子根  
似敗醬四月五月采子二月八月采根宗奭曰田

野道旁處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而  
小微有皺紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅

子如荔枝色機曰蛇莓莖長不盈尺莖端惟結實  
一顆小而光潔誤食脹人非若覆盆苗長大而結

實數顆微有黑毛也時珍曰此物就地引細蔓節  
節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開小黃花五

出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同也其根  
甚細本草用汁當是取其莖葉并根也仇遠碑史

訛作蛇繆草言有五葉七葉者又言俗傳食之能殺人亦不然止發冷涎耳

**汁氣味**甘酸大寒有毒主治胸腹大熱不止錄傷

寒大熱及溪毒射工毒甚良景通月經燻瘡腫傅

**蛇傷**大明主孩子口噤以汁灌之

孟詭傳湯火傷痛卽

**止時**

**附方**

舊二新一口中生瘡

天行熱甚者蛇莓自然汁半升稍稍嚥之

傷寒類要

**傷寒下蠱**

生瘡以蛇莓汁服二合日三服仍水漬烏梅令濃入崖蜜飲之

肘后方水

**中毒病**

蛇莓根搗末服之并導下部亦可飲汁一升夏月欲入水先以少末投中流更無

所畏又辟射

水浴身亦宜投少許

以器貯肘后

**使君子**

宋開寶

# 釋名留求子

志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物後醫家因號爲使君子也

時珍曰按嵇含南方草木狀謂之留求子療嬰孺之疾則自魏晉已用但名異耳

## 集解

志曰生交廣等州形如卮子棱瓣深而兩頭尖似訶梨勒而輕

頌曰今嶺南州郡皆有之

生山野中及水岸其莖作藤

如手指大其葉如兩指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣

七八月結子如拇指大長一寸許大類卮子而有

五棱其殼青黑色內有仁白色七月采之

宗奭曰

其仁味如椰子

醫家亦兼用殼

時珍曰原出海南

交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽種之

之亦易生其

藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一簇

一二十葩紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合

成有棱先時半黃老則紫黑其中仁長

如榧仁色味如栗久則油黑不可用

**氣味甘溫無毒主治小兒五疳小便白濁殺蟲療**

瀉痢

開寶

健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬

時珍

發明

時珍曰

凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也

大人小兒有蟲病但每月上旬侵晨空腹食使君子仁數枚或以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云七生七熯食亦良益脾胃所以能斂虛熱而止瀉痢爲小兒諸病要藥俗醫乃謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹有蠹屋有蟻國有盜福耶禍耶脩養者先去三戶可推矣

附方

新

小兒脾疳

使君子

蘆薈等分爲末米飲每服一錢

儒門事親

小兒

痞塊

腹大肌瘦而黃漸成疳疾

使君子仁五錢爲末水丸龍眼大每以一丸用

木籠子

大每以一丸用

木籠子一個破頂入藥在內飯上蒸

口流

雞子熟空心服之

楊起簡便單方

小兒蛔痛口流

涎未

本草綱目草部 卷之六  
使君子仁爲末米飲五更 小兒虛腫頭面陰囊俱浮用使君子  
調服一錢 全幼心鑑  
一兩去殼蜜五錢炙盡爲末每食後米湯服一錢 簡便方  
油少許浸三五個臨臥時細嚼香油送下久久自愈 普濟方 蟲牙疼痛使君子以香  
漱集 簡方

## 木鼈子

宋開寶

## 校正

自木部移入此

## 釋名木蟹

志曰其核似鼈蟹狀故以爲名

## 集解

志曰出朗州及南中七八月采實頌曰今湖廣諸州及杭越全岳州皆有之春生苗作藤

生葉有五極狀如山藥青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅黃色肉上有軟刺每一實有核三十枚其狀扁而如鼈八九月采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食宗奭曰木

**鼈子**蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲萄其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻纏定及  
其生也則去雄者方結實時珍曰木鼈核形扁  
礪石大如圓碁子其仁青綠色入藥去油者

### 仁氣味甘溫無毒

時珍曰苦微甘有小毒

主治折傷消結腫

**惡瘡生肌止腰痛除粉刺黑黯婦人乳癰肛門腫**

### 痛

開寶醋磨消腫毒

大治瘡積痞塊利大腸瀉痢痔

### 瘤瘰癧

時珍

### 發明

機曰按劉績霏雪錄云木鼈子有毒不可食

昔薊門有人生二子恣食成瘡其父得一方

### 以木鼈子

煮豬肉食之其幼子當夜長子明日死

友人馬文誠方書亦載此方因著此爲戒時珍曰

### 南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至此

或者與豬肉不相得或犯他物而然不可盡咎木

也

附方

舊一新  
十九

酒疸脾黃

木鼈子磨醋服一二盞見利效果劉長春濟急方

腳氣腫痛

木鼈子仁每個作兩邊炒過切碎再炒去油盡爲度每兩入厚桂半兩爲末

熱酒服二錢令醉得汗愈

夢祕授方也

永類方

溼瘡腳腫

木鼈子四兩去行履難者木

皮甘遂半兩爲末以豬腰子一個去膜切片用藥

四錢在中溼紙包煨熟空心米飲送下服後便伸

兩腳如大便行者只吃白粥二

日爲妙

楊拱醫方摘要

陰疝偏墜

木鼈子痛甚者

傅之卽愈

一個磨醋調黃蘖芙蓉末

壽域神方

久瘧有母

木鼈子穿山甲炮等分爲

末每服三錢空心溫

酒下

醫方摘要

腹中痞塊

木鼈子仁五兩用

餅和丸綠豆大每白湯下三十丸

醫方集成小

開入在內簽定煨熟同搗爛入黃連三錢末蒸

# 兒疳疾

木鼈子仁使君子仁等分搗泥米飲丸芥子大每服五分米飲下一日二服孫天

# 仁集疳病目矇

不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢爲末米糊丸龍眼大入雞子

# 內蒸熟連雞子食倒睫拳毛

因風入脾經致使風之爲妙同上

瘻拳毛入內將木鼈子仁槌爛以絲帛包作條左

# 患塞右鼻右患塞左鼻其毛自分上

下次服蟬蛻

# 藥爲妙出孫天仁集效方

肺虛久嗽未每用三錢焚之吸烟良方用木鼈子一個雄黃一錢聖濟錄

# 久吐涎以茶潤喉如此五六次後服補肺藥

大木鼈子三四個磨水飲以雪糕壓小兒

# 鹹鼻下卽吐出痰重者三服效

摘玄方水瀉不

# 止木鼈子五個母丁香五個麝香一分研末米湯

調作膏納臍中貼之外以膏藥護住吳旻扶

# 壽精

痢疾禁口木鼈仁六個研泥分作三分用麵

方燒餅一個切作兩半只用半餅作

一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熱餅其病卽止遂思飲食邵真人經驗方

## 腸風瀉血

木鼈子

以桑柴燒存性候冷爲末每服一錢煨葱白酒空心服之名烏金散

## 普濟肛門痔痛

孫用祕寶方用木鼈仁三枚砂盆擂如泥入百沸湯一盃乘熱先熏

後洗日用三次仍塗少許○瀕湖集簡方用木鼈仁帶潤者雌雄各五個乳細作七丸盃覆溼處勿

令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛卽止一夜一

丸自消也江夏鐵佛寺蔡和尚病此痛不可忍有

人傳此而愈用

## 瘰癧經年

木鼈仁二個去油研以

雞子白和入瓶內安飴

中蒸熟食後食之

## 小兒丹瘤

木鼈子

仁研如泥醋調傅之一日三五上

每日一服半月效

## 耳卒熱腫

木鼈子仁一兩赤小豆大黃各

科精義外

半兩爲末每以少許生油調塗

之

## 風牙腫痛

木鼈子仁磨醋搽之

聖

## 惠方

普濟方

番木鼈

目綱

釋名馬錢子

目綱

苦實把豆

目綱

火失刻把都

時珍曰  
狀似馬

之連錢故  
名馬錢

集解

時珍曰 番木鼈生回國今西土邛州諸處皆有之蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓

生青熟赤亦如木鼈其核小於木鼈而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆腐制過用之良或云能毒狗至死

仁氣味苦寒無毒主治傷寒熱病咽喉痹痛消痞

塊並含之嚥汁或磨水噙嚥

時珍

附方

新喉痹作痛

爲末吹之

楊洪醫方摘要

纏

番木鼈

馬兜鈴

番木鼈

馬兜鈴

番木鼈

馬兜鈴

番木鼈

馬兜鈴

番木鼈

馬兜鈴

番木鼈

馬兜鈴

# 喉風腫

番木

鼈仁

一個

木香

三分

同磨

水調

熊膽

礬五分

以雞毛

掃患處

取效

唐

瑤經驗方

苦實

把豆兒

卽馬錢子

半箇

輕粉

少許爲末

左目吹

右耳右目吹

水花銀珠各

五分片

腦麝香枯礬

左耳日二次

田日華

飛鴻集

病欲去胎

苦實把

豆兒研

膏納入牝戶

四寸

集簡方

# 馬兜鈴

宋開寶

# 校正

併入唐本草獨行根

釋名都淋藤

肘後

獨行根

唐本

土青木香

唐本

雲南根

綱目

三百兩銀藥

宗奭

曰蔓生附木而上葉脫時其實

尙垂狀

如馬項之鈴故得名也

時珍

曰其根吐利人微有香氣故有獨行木香之名嶺

南人用治蠱隱其名爲三百兩銀藥

肘后方作都

傳也

淋蓋誤

**集解**

志曰獨行根生古堤城旁所在平澤叢林中皆有之山南名爲土青木香一名兜鈴根蔓

生葉似蘿藦而圓且澀花青白色其子大如桃李而長十月以後枯則頭開四系若囊其中實薄扁似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防己

二月八月采根頌曰馬兜鈴今關中河東河北江

淮夔湖州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山蕷葉而厚大面白六月開黃紫花頗類枸杞花

七月結實如大棗狀似鉛作四五瓣其根名雲南

根

微似木香大如小指赤黃色七八月采實暴乾

**實脩治**

敦曰凡采得實去葉及蔓以生絹袋盛於東屋角畔待乾劈開去革膜取淨子焙用

**氣味苦寒無毒**

權曰平時珍曰微苦辛杲曰味厚氣薄陰中微陽入手太陰經主

**治肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡**

開

**息不得欬逆連連不止**

權甄清肺氣補肺去肺中溼

熱素元

發明

時珍曰馬兜鈴體輕而虛熟則懸而四開有肺之象故能入肺氣寒味苦微辛寒能清肺

熱苦辛能降肺氣錢乙補肺阿膠散用之非取其補肺乃取其清熱降氣也邪去則肺安矣其中所用阿膠糲米則正補肺之藥也湯劑中用多亦作吐故崔氏方用以吐蠱其不能補肺又可推矣

附方

舊三

水腫腹大

喘急馬兜鈴煎湯

日服之千金方肺氣喘急

馬兜鈴二兩去殼及膜酥半兩入盃內拌勻慢火

炒乾甘草炙一兩爲末

每服一錢水一盞煎六分

溫呷或噙之一

簡要濟眾

一切心痛

不拘大小男女大馬兜鈴

一個燈上燒存性爲末溫酒服立效

解蛇蠱毒飲食中得之咽中如有物嚥

摘玄方

不下吐不出心下熱悶兜鈴

一兩煎水服卽吐出

痔瘻腫痛

以馬兜鈴於瓶中

崔行功纂要方燒烟熏病處良

獨行根氣味辛苦冷有毒

大明日無毒志曰有毒不可多服吐利不止

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨爲泥封之日

三四次立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒又搗末

水調塗疔腫大效

唐本治血氣大利大腸治頭風瘡

癩禿瘡

時珍○出精義

附方

舊

新一五種蠱毒

肘後方云席辨刺史言嶺南人多於食中毒人漸不能

食胸背漸脹先寒似瘴用都淋藤十兩水一斗酒

二升煮三升分三服毒逐小便出十日慎食毒物

不瘥更服土人呼爲三百兩銀藥○又支太醫云

兜鈴根一兩爲末水煎頓服當吐蠱出未盡再服

馬兜鈴 檉藤子

附錄合子草

拾遺藏器曰子及葉有小毒主蠱毒及蛇咬搗傅瘡上蔓生岸傍葉尖花

白子中有兩片如合子

預知子

宋開寶

釋名聖知子

日華

聖先子

日華

盍合子

日華

仙沼子

日華

相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲

當預知之故有諸名時珍曰仙沼疑是仙棗之訛

集解

志曰預知子有皮殼其實如阜莢子頌曰舊

不著所出州土今惟蜀黔壁諸州皆有之作

蔓生依大木上葉緣有三角面深背淺七月八月

有實作房生青熟深紅色每房有子五七枚如阜

莢子斑褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之云亦

難得采無時其根冬月采之陰乾治蠱其功勝于

子也山民日爲聖無憂

子仁氣味苦寒無毒

大明日溫雙仁者可帶

主治殺蟲療蠱

治諸毒去皮研服有效

開寶

治一切風補五勞七傷

其功不可備述治痃癖氣塊消宿食止煩悶利小

便催生中惡失音髮落天行溫疾塗一切蛇蟲蠶

咬治一切病每日吞二七粒不過三十粒永瘥

大明

附方

新

預知子丸

治心氣不足精神恍惚語言錯妄忪惄煩鬱憂愁慘懾喜怒多

恐健忘少睡夜多異夢寐卽驚魘或發狂眩暴不知人並宜服此預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲

朱砂水飛等分爲末煉蜜丸芡子大每嚼一丸人

參湯下和劑局方耳卒聾閉入米醋滿中蓋定麵裹塘火

中煨熟取出入少仙沼子黑李子末取水滴耳癆  
中腦痛勿驚如此二夜又點一耳 聖惠方

風有蟲眉落聲變預知子膏用預知子雄黃各二  
兩爲末以乳香三兩同水一斗銀鍋煮至五升  
酒調下二末熬成膏瓶盛之每服一匙溫

酒調下有蟲如毛隨大便而出 聖惠方

根氣味苦冷無毒主治解蠱毒石臼搗篩每用三

錢溫水服立已

蘇頌

牽牛子

別錄下品

釋名黑丑

綱目草金鈴

炮炙論

盆餽草

綱目

狗耳草

救荒宏景

曰此藥始出田野人牽牛謝藥故以名之時珍曰  
近人隱其名爲黑丑白者爲白丑蓋以丑屬牛也  
金鈴象子形盆餽狗耳象葉形段成式酉陽雜俎  
云盆餽草蔓如薯蕷結實後斷之狀如盆餽是矣

集解

宏景曰牽牛作藤生花狀如蘿豆黃色子作小房實黑色形如桔子核恭曰此花似旋花

子三月生苗作藤蔓繞籬牆高者或二三丈其葉種青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作毬每毬內有子四五枚大如蕎麥有三棱有黑白二種九月後收之宗奭曰花朵如鼓子花但碧色日出開日西萎其核如木猴梨子而色黑謂子似蕎麥非也時珍曰牽牛有黑白二種黑者處處野生尤多其蔓有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉花不作瓣如旋花而大其實有蒂裏之生青枯白其核與棠棣核一樣但色深黑爾白者人多種之其蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉圓有斜尖竝如山藥莖葉其花小于黑牽牛花淺碧帶紅色其實蒂長寸許其生青枯白色稍粗人亦采嫩實蜜煎爲果食呼爲天茄因其蒂似茄也因

子修治

敷曰凡采得子曬乾水淘去浮者再曬拌酒蒸從已至未曬乾收之臨用春去黑皮

時珍曰今多只碾取頭末去皮  
麩不用亦有半生半熟用者

氣味苦寒有毒

權曰甘有小毒說曰多食稍冷杲

曰辛熱雄烈泄人元氣

天明曰味

荳得青木  
香乾薑良

主治下氣療腳滿水腫除風毒利小便

別錄治痃癖

氣塊利大小便除虛腫落胎

甄取腰痛下冷膿瀉

蠱毒藥并一切氣壅滯

大和山茱萸服去水病孟

除氣分溼熱三焦壅結

李果逐痰消飲通大腸氣祕孟

風祕殺蟲達命門

時珍

發明

宗奭曰牽牛丸服治大腸風祕壅結不可久服亦行脾腎氣故也好古曰牽牛以氣藥引

則入氣以大黃引則入血利大腸下水積色白者屬火善走黑者屬水白者屬金若非病形與證俱實深戒不賬滿不大便祕者不可輕用驅逐致虛先哲

杲曰牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒乃瀉氣之藥其味辛 辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼乃誤矣何也凡用牽牛少則動大便多則泄下如水感南北方熱火之化所生火能平金而泄肺溼去則無氣得周流所謂五臟有邪更相平也今不問有溼誤哉況牽牛食或有熱證俱用牽牛尅化之藥豈不溼熱反以辛藥泄之傷人元氣且牽牛辛烈比之諸

辛藥泄氣尤甚其傷人必矣經云辛泄氣辛走氣  
是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中脾  
胃主血當血中泄火以黃芩之苦寒泄火當歸身  
之辛溫和血生地黃之苦寒涼血益血少加紅花  
則專用須于補中益氣泄陰火之藥內加而用之何  
謂重陽之藥以泄水泄元氣利其小便竭其津液是  
俱可耽嗜脫人元氣見人有酒食病痞者多服牽牛  
丸散取快一時藥過仍痞隨服隨效效後復痞以致  
久服脫人元氣猶不知悔也張仲景治七種溼熱小便  
能泄溼利小便乎爲溼病之根在下焦是血分中氣病  
瀉氣使氣血俱損也經云毋盛盛毋虛虛毋絕人生命此  
謂也用者戒之白牽牛亦同時珍曰牽牛

牛自宋以後北人常用取快及劉守真張子和出  
又倡爲通用下藥李明之目擊其事故著此說極  
力闢之然東漢時此藥未入本草故仲景不知假  
使知之必有用法不應捐棄況仲景未用之藥亦  
多矣執此而論蓋矯枉過正矣牽牛治水氣在脾  
喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹腫及大腸風祕氣祕  
不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室夫人  
年幾六十平生苦腸結病旬日一行甚于生產服  
養血潤燥藥則泥膈不快服消黃通利藥則若罔  
知如此三十餘年矣時珍診其人體肥膏梁而多  
憂鬱日吐酸痰盈許乃寬又多火病此乃三焦之多  
腑氣壅滯有升無降津液皆化爲痰飲不能下滋  
非血燥比也潤劑留滯消化黃徒入血分不能通腸  
氣俱爲痰阻故無效也乃用牽牛末阜莢膏丸  
服卽便通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食與  
且復精爽蓋牽牛能走氣分通三焦氣順則痰逐食  
飲消上下通快矣外甥柳喬素多酒色病下極脹逐

痛二便不通不能坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人叩子子思此乃溼熱之邪在精道壅脹隧路病在二陰之閒故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也乃用棟實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平牽牛能達右腎命門走精隧人所不知惟東垣李明之炒黑入佐沈香杜仲破故紙官桂諸藥深得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾溼太過通身浮腫喘不得臥腹如鼓海金沙散亦以牽牛爲君則東垣未盡棄牽牛不用但貴施之得道耳

附方

舊八新

搜風通滯

風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿浸一宿長流

水上洗半日生絹袋盛掛風處令乾

每日鹽湯下三十粒極能搜風亦消虛腫久服令人體清瘦

斗門

三焦壅塞

神不爽利膈丸用牽牛子四兩半

生半炒不蛀臯莢酥炙二兩爲末生薑自然汁煮  
糊丸梧子大每服二十丸荆芥湯下王袞博濟  
**方一切積氣宿食不消黑牽牛頭爲末四兩用蘿**  
**白豆蔻末一錢搗丸梧子大每服一**  
**二十丸白湯下名順氣丸**普濟方一男婦五積般  
積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末八兩餘滓以新  
瓦炒香再搗取四兩煉蜜丸梧子大至重者三十  
五丸陳橘皮生薑煎湯臥時服半夜未動再服三  
十九丸當下積聚之物尋常行氣每服十九甚妙  
方博濟胸膈食積牽牛末一兩巴豆霜三個研末水  
所傷湯下氣築奔衝不可忍牛郎丸用黑牽牛半  
儒門事親一錢紫蘇湯追蟲取積方同上用酒  
下普濟方追蟲取積方同上用酒腫腎氣作痛黑  
牽牛等分炒爲末每服三錢用豬腰子切縫入茴  
香百粒川椒五十粒摻牽牛末入內紮定紙包煨

熟空心食之酒下取出惡物效

楊仁齋直指方

錢

白糖化湯調下

鄭氏家傳方

大便不通

生半熟爲末每服二

箇要方用牽牛子半

錢一兩爲末每服二

大黃

等分○一方加牽牛子微炒搗頭末一兩

大黃湯下未通再以茶服一方加生檳榔等分

錢

牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖炒半兩

大黃湯下未通再以茶服一方加生檳榔等分

大黃

牽牛子梧子大每湯服三十丸

寇氏衍義

爲未熟蜜丸

牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麥麴

水鹽脹滿四兩和作燒餅臥時烙熟食之以茶下

水鹽脹滿

白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麥麴

水鹽脹滿四兩和作燒餅臥時烙熟食之以茶下

水鹽脹滿

白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麥麴

水鹽脹滿四兩和作燒餅臥時烙熟食之以茶下

降氣爲驗

河閒宣明方

諸水飲病川泛溢非盃杓可取必以

神禹

決水之法治之故名禹功散用黑牽牛頭末

四兩茴香一兩炒爲末每服一二錢以生薑自然

汁調下當轉下氣

儒門事親

陰水陽水黑牽牛頭末三兩陳米飯鍋

也

一兩爲末糊丸梧子大每服五十

丸薑湯下欲利服百丸

糕一兩爲末糊丸梧子大每服五十

丸薑湯下欲利服百丸

醫方捷徑水腫尿滯牛

末每服方寸匕以小溼氣中滿足脛微腫小便不便利爲度干金方

### 溼氣中滿

利氣急欬嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩爲末每服二錢薑湯

下或臨時水丸每棗湯下三十丸

普濟方

### 水氣

### 浮腫

氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸

### 小便空心

分二服水從脾溼腫滿方見海金沙下

風毒腳氣

按之

### 小便

中出聖惠方牽牛子搗末蜜丸小豆大每服五丸生薑

### 子核

湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑色正如棗

### 肘後方

小兒腫病大小便不利黑牽牛白牽牛各二兩炒取頭末井華水和丸綠

### 豆大

每服二十丸蘿蔔子煎湯下聖濟總錄

### 牽牛

生研一錢青皮加木香減半丸服

鄭氏小兒方

牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分

### 黑牽牛

白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分

三歲兒服二十丸米湯下

小兒方

鄭氏

**疳氣耳聾**

疳氣攻腎耳聾陰腫

牽牛子半個去膜薄切

入一

散

加少鹽溼紙包煨

牽牛子末每以一

片同

空心服

鄭氏

**米飯作角子**

二個炙熟

**風熱赤眼**

白牽牛末以葱白

煮研丸綠豆大每

半時

服五丸葱湯下服訖睡

普濟方

時衛生家寶方

服米飲下

普濟方

**面上粉刺**

瘡子如米粉

黑牽牛酒浸三

汁擦面後用藥

**面上風刺**

瘡子如米粉

黑牽牛末先以薑

宿爲末以薑

日洗

塗之

摘玄方法

**面上粉刺**

瘡子如米粉

黑牽牛末先以薑

宿爲末以薑

日洗

黑牽牛末先以薑

日洗

黑牽牛末先以薑

日洗

惠之方

夜傳

**面上雀斑**

黑牽牛末

雞子清調

黑牽牛末

黑牽牛末

黑牽牛末

黑牽牛末

黑牽牛末

黑牽牛末

小兒急驚

煩渴痰潮聲

高氣急

腫脹喘滿胸

馬脾風

不急治死在旦夕

各取末一錢每用五分蜜湯調下

盛加輕粉一

白牽牛半生半炒黑牽牛半生半炒大黃煨檳榔

各取末一錢每用五分蜜湯調下

盛加輕粉一

散字名

全幼心鑑

**小兒夜啼**

黑牽牛末

一錢水調傅

生牛黃奪命

全幼心鑑

# 臨月滑胎

牽牛子一兩赤土少許研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢

王袞博濟方

# 小便血淋

牽牛子二兩半生半炒爲末每服二錢

經驗良方

# 腸風瀉血

牽牛五兩牙阜三兩水浸三日去阜以酒一升煮乾焙研末蜜丸梧子大每服

經驗良方

# 七丸空心酒下

一日三服下出黃物不妨

本事方

# 病減後日服五丸米飲下

本事方

熟透

# 黑白色牽牛各一兩炒爲末

以豬肉四兩切碎炒熟

○效○

# 又方白牽牛頭末四兩沒藥一錢爲細末

欲服藥先日勿夜飲次早空心將豬肉四兩炙切片蘸

○效○

# 減用忌酒色油膩三日

儒門事親量人加漏瘡水溢乃

腎

# 虛也牽牛末二錢半入切開豬腎中竹葉包定煨熟

空心食溫酒送下借腎入腎一縱一橫兩得其

便惡水既泄不復直指方

# 一切癰疽

發背無名腫毒年少氣壯者用黑白牽牛

各一合布包搗碎以好醋一盃熬至八分露一宿次日五更溫服以大便出膿血爲妙名濟世散

張三丰仙方 滼熱頭痛 黑牽牛七粒砂仁一粒研末井

愈濟總錄 聖氣滯腰痛 牽牛不拘多少以新瓦燒赤安

撥動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麵三匙水和捍開切作碩子五更初以水一盞煮熟連湯溫下痛卽已未住隔日再作予常有此疾每發一服痛卽止 許學士本事方

## 旋花

本經上品

釋名

旋蓄

蘇

恭筋根

本經

續筋根

圓

鼓子花

圓

猶腸草

經

圖美草

別錄

天劍草

綱

纏枝牡丹

恭

曰旋蓄也

圓

平澤

經

筋

人

故一  
藥別

一名筋根

曰旋蓄當作蓄

旋音福

鍛用根人

旋覆用花入藥

今云旋蓄誤矣

頌

曰別錄言其根主續筋故南人呼爲續筋根一名  
狹腸草象形也宗奭曰世俗謂之鼓子花言其花  
形肖也時珍曰其花不作瓣狀如軍中所吹鼓子  
故有旋花鼓子之名一種千葉者色似粉紅牡丹  
俗呼爲纏枝牡丹

### 集解

別錄曰旋花生豫州平澤五月采陰乾保昇

蕷而狹長花紅色根無毛節蒸熟堪啖味甘美名筋根二八月采根曰乾宗奭曰今河北汎西關陝

田野中甚多最難鋤艾治之又生四五開花其根寸截置土灌漑涉旬苗生韓保昇說是矣時珍

曰旋花田野塉塹皆生逐節延蔓葉如波菜葉而小至秋開花如白牽牛子花粉紅色亦有千葉者其根色白大如筋不結子○頌曰黔南施州出一

種旋花粗莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

正誤別錄曰花一名金沸宏景曰旋花東人呼爲山薑南人呼爲美草根似杜若亦似高良薑爲

腹中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止飢近有人從江南還用此術與人斷穀皆得半百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色味辛狀如荳蔻此旋花卽其花也今山東甚多又註旋覆花曰別有旋蓄根出河南來北國亦有形似芎藭惟合旋蓄膏用之餘無所入○恭曰旋花乃旋覆花也陶說乃山薑爾山薑味辛都非此類又因旋覆花名金沸遂作此花別名皆誤矣又云從北國來者根似芎藭與高良薑全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛溫無毒時珍曰花根莖葉並主面肝黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣經利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄搗汁服主丹

毒熱器補勞損益精氣珍時

**發明**

時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋

病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不

飢時珍自京師還見北土車夫每截之云暮歸

煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

**附方**

舊新一方

被研斷筋傳之日三易半月卽斷筋便

續此方

出蘇景中療奴有祕

要外臺祕要太乙金鎖丹

效者王燾

五兩覆盆子五兩蓮花蕊

花三兩五月五日采之雞頭子仁一百顆並爲末

以金櫻子二百枚去皮水

一升下三十丸

和藥杵二千下丸梧子大每空心溫鹽汁

酒調車前末半合

服之至百日永不泄

如要泄以冷水

**紫葳**

本品

**校正**

移入此部

**釋名**

凌霄

蘇

**陵苕**

本經

**陵時**

郭璞

**女葳**

甄權

**芨華**

本經

**武威**

吳瞿陵

吳鬼目

吳氏時珍曰俗謂赤豔曰紫歲歲此花赤豔故名附木而上高數丈

故曰凌霄

正誤

宏景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫歲華必當奇異今瞿麥處

處有之不應乃在太行山

恭曰紫歲瞿麥皆本經藥體性既乖生處亦不相關爾雅云苕一名陵苕

郭璞注云一名陵時又名凌霄此爲眞也

頴達詩疏亦云苕一名陵時今本草無陵時之名

惟鼠尾草有之豈所傳不同抑陶蘇之誤耶

時珍按吳氏本草紫歲一名瞿陵陶宏景誤作瞿麥

字爾鼠尾止名陵翹無陵

時蘇頌亦誤矣並正之

集解

別錄曰紫歲生西海川谷及山陽恭曰此凌霄花也連莖葉用詩云有苕之華云其黃矣

爾雅云陵苕黃華蘋白華芨山中亦有白花者頌

今處處皆有多生山中人家園圃亦或栽之初

作蔓生依大木久延至巔其花黃赤夏中乃盛今  
醫家多采花乾之入女科藥用時珍曰凌霄野生  
蔓纏數尺得木而上卽高數丈年久者藤大如杯  
君初生枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋

開花一枝十餘朵大如牽牛花而頭開五瓣赭黃  
色有細點秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許  
其子輕薄如榆仁馬兜鈴仁其根長亦如兜鈴根狀秋後采之陰乾

**花同氣味酸微寒無毒**普曰神農雷公岐伯辛扁

畏鹹時珍曰花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏瞇

**主治婦人產乳餘**

**疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎**本經產後奔血不

定淋瀝主熱風風癟大小便不利腸中結實

**酒**甄權

**鱉熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下**大明

莖葉氣味苦平無毒主治瘻癧益氣錄熱風身癢

遊風風癰瘀血帶下花及根功同明治喉痹熱痛

涼血生肌時

珍

發明

時珍曰凌霄花及根甘酸而寒莖葉帶苦手足厥陰經藥也行血分能去血中伏火故主

產乳崩漏諸疾及

血熱生風之證也

附方

舊十一新

婦人血崩

凌霄花爲末每酒服二錢後服四物湯

丹溪纂要

糞後下血

凌霄花浸酒頻飲之

普濟方消渴飲水

凌霄花搗碎水一盞

半煎一盞分二

聖濟總錄

嬰兒不乳

百日內小兒無故口青不飲乳用凌霄花大藍

大藍

葉芒消大黃等分

分爲末以羊髓和丸梧子大每研

一丸以乳送下便可喫乳熱者可服寒者勿服昔

有人休官後雲遊湖湘脩合

# 久近風癘

凌霄花或根葉爲末

此方救危甚多  
○普濟方 每服三錢溫酒下服畢解髮不住手梳口噙冷水

溫則吐去再噙再梳至二十日乃止如此四十九

日絕根百無所忌  
○方賢奇效方

# 通身風癘

凌霄花爲末酒服一錢

○醫學正傳 潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒全蠍炒各七個爲末每服二錢溫酒下先

以藥湯浴過服此出臭汗爲效

○儒王門事親加蟬蛻五品各九個作一服

○楊氏家藏方用凌霄花山厄子等分爲末每茶服二

錢日二服數日除根臨川曾子仁用之有效

○楊氏家藏方用凌霄花半兩硫黃一兩

胡桃四個膩粉一錢研膏生絹包揩

走皮趨瘡

滿

項浸淫溼爛延及兩耳癢而出水發歇不定田

野名悲羊瘡用凌霄花并葉煎湯日日洗之

○楊

仁齋直指方 婦人陰瘡或臍調搽 摘玄方耳卒聾閉

凌霄葉杵取自然  
汁滴之

斗門方

女經不行

凌霄花爲末每服二錢食前溫酒下徐

氏胎產方

# 營實牆蘿

音眉○本經上品

# 釋名薔薇

別錄山棘

別錄牛勒

別錄刺花

綱目時珍曰此

草蔓柔靡依牆援而生故名牆蘿

其莖多棘刺勒

入牛喜食之故有山刺牛勒諸名

其子成簇而生

如營星然故謂之營實

# 集解

別錄曰營實生零陵川谷及蜀郡八月九月采陰乾

宏景曰營實卽薔薇子也以白花者

莖葉可煮作飲其根亦可煮釀酒保昇曰所

爲良莖葉多刺其花有百葉出入六出或在有之蔓生莖閒多刺其花有百葉出入六出或赤或白子若杜棠子時珍曰薔薇野生林塹閒春抽嫩蕪小兒掐去皮刺食之旣長則成叢似蔓而

莖硬多刺小葉尖薄有細齒四五月開花四出黃心有白色粉紅二者結子成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根采無時人家栽玩者莖粗葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色花最大者名佛見笑小者名木香皆香豔可人不入藥用南番有薺薇露云是此花之露水香馥常異

### 營實氣味酸溫無毒

別錄曰  
微寒

主治癰疽惡瘡結肉

跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節本經久服輕身益

氣別錄治上焦有熱好瞑

時珍

### 附方

新

眼熱昏暗

營實枸杞子地膚子各二兩爲末每服三錢溫酒下

聖惠方

根氣味苦濇冷無毒

主治止洩痢腹痛五臟客熱

除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌別錄治

熱毒風除邪氣止赤白痢腸風瀉血通結血治牙

齒痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬大頭瘡白禿甄權除

風熱溼熱縮小便止消渴

時珍曰

發明

時珍曰營實薔薇根能入陽明經除風熱溼熱生肌殺蟲故癰疽瘡癩古方常用而洩痢

消渴遺尿好瞑亦皆陽明病也

附方

舊七新五

消渴尿多

薔薇根日服之

一把水煎

千金方

小便失禁

薔薇

根煮汁飲或爲末酒服

野生白花者更良

聖惠方

少小尿牀

薔薇根五錢煎酒夜

飲外臺祕要

小兒疳痢

頻數用生薔薇根洗切煎濃

以愈爲度

千金方

口

**咽痛癰**

語聲不出。薔薇根皮射干一兩。甘草炙口。半兩。每服二錢。水煎服之。

**舌糜爛**

薔薇根避風打去土煮濃汁溫含令吐。冬用根皮夏用枝葉口瘡日久延及胸中生者皆效。

瘡三年已上不瘡。

千金方。小兒月蝕。薔薇根四兩地榆二錢爲末先以鹽湯洗過傅之。

全幼心鑑。

癰腫節毒。潰爛疼痛。用薔薇皮筋骨毒更炙熨之。

**痛**

因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薔薇根白皮洗三斤水酒十斤煮一炷香每日任飲以愈爲

度。○鄧筆峯雜興方。用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一盞日服一次。

**金瘡腫痛**

寸七一日三服。抱朴子箭刺入肉膿囊。薔薇根燒灰每白湯服方。

不出以薔薇根末摻之服鼠撲。

十日卽穿皮出也。外臺祕要。骨哽不出。薔薇根末水服。

方才寸七日

三同上

**葉主治**下疳瘡痏研洗傅之黃花者更良

**方**攝生

**月季花**

**綱目**

**釋名**月月紅

**見**勝春

瘦客

鬪雪紅

**集解**

時珍曰處處人家多栽插之亦薔薇類也青莖長蔓硬刺葉小於薔薇而花深紅千葉厚

**辨**逐月開放

不結子也

**氣味**甘溫無毒

**主治**活血消腫傅毒

**時珍**

**附方**

新癩癰未破

用月季花頭

二錢沈香

五錢莞花

炒三錢碎

剉入大鯽魚腹中

就以魚腸封固

酒水各一盞煮熟食之

卽愈魚須

安龕水內遊死

者方效此是家傳方

活人多矣

試談

楚翁

方

**栝樓** 本經  
中品

**校正**

併入圖經  
天花粉

卷之八

**釋名** 果羸

音裸

**瓜蔞**

綱目

**天瓜**

別錄

**黃瓜**

別錄

**地樓**

本經

**澤姑**

**別錄**

**根名白藥**

圖經

**天花粉**

圖經

**瑞雪**

時珍

曰

贏與蓏同

木上曰果

上曰蓏

同上

地下曰蓏此物蔓生附木故得兼名詩云果贏之實亦施于字是矣栝樓卽果贏二字音轉也亦作蓏

蓏後人又轉爲瓜蔞愈轉愈失其眞矣古者瓜姑同音故有譯姑之名齊人謂之天瓜象形也雷

敷炮炙論以圓者爲栝長者爲樓亦出牽强但分雌雄可也其根作粉潔白如雪故謂之天花粉蘇頌圖經重出天花粉謬矣今削之

**集解**

別錄曰

**栝樓** 生弘農川谷及山陰地根入土深者良生鹵地者有毒

二月八月采根曝乾

三十日成妄景曰出近道藤生狀如土瓜而葉有乾又入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入摩

膏用恭曰出陝州者白實最佳頌曰所在有之三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作又有細毛七月開花似壺盧花淺黃色結實在花下大如拳者功用皆同根亦名白藥皮黃肉白時珍曰其根直下生年久者長數尺秋後掘者結實有粉夏月掘者有筋無粉不堪用其實圓長青時如瓜黃時如熟柿山家小兒亦食之內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈

實脩治敷曰凡使皮子莖根其效各別其栝圓黃皮厚蒂小樓則形長赤皮蒂粗陰人服樓陽人服栝並去殼皮革膜及油用根亦取大二三圍者去皮搗爛以水澄粉用時珍曰栝樓古方全用後世乃分子瓢各用

氣味苦寒無毒

時珍曰味甘不苦

主治胸痹悅澤人面

錄別

潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大

腸消癰腫瘡毒時子炒用補虛勞口乾潤心肺治

吐血腸風瀉血赤白痢手面皺大明

發明

震亨曰栝樓實治胸痹者以其性味甘潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼失其降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜

其爲治嗽之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱

熱爲治消渴之神藥時珍曰張仲景治胸痹痛引

心背欬唾喘息及結胸滿痛皆用栝樓實乃取其

甘寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味原不

不苦而隨文傳會爾

附方

舊十二新八

痰欬不止

瓜蔞仁一兩文蛤七分爲末以薑汁澄濃腳丸彈子爲

大鳴之○乾欬無痰熟瓜蔓搗爛絞汁入蜜等分  
摘玄方

楊起方簡便方欬嗽有痰熟瓜蔓十個明礬二兩搗和餅  
下五十七丸

醫方摘要

痰喘氣急

研末糊丸梧子大每薑大同

食藥盡病除普濟方

熱欬不止熟瓜蔓二個明礬一棗大同

茶蜜湯洗去子以盃盛于飯上蒸至飯熟

取出時時挑三四匙蘸之

摘玄方肺熱痰欬

胸膈塞滿用瓜蔓仁半夏湯泡七次焙研各一兩  
薑汁打麪糊丸梧子大每服五十丸食後薑湯下

嚴用和濟生方

肺痿欬血不止用栝樓五十個連瓢瓦焙烏梅肉五十個焙杏仁去

薄皮尖炒二十一個爲末每用一捻以豬肺一片切  
濟生方

酒痰欬嗽用此救肺瓜蔓仁青黛等分研末薑汁

蜜丸芡子大每噙一丸

丹溪心法

飲酒發熱

卽上方研膏日食數匙一男子年二十病此服之而愈

摘玄方

飲酒

痰澼

兩脇脹滿時復嘔吐腹中如水聲

栝樓實去殼焙一兩神麴炒半兩爲末每服二錢葱白湯下

聖惠方

小兒痰喘

欬嗽膈熱久不瘥瓜蔓實一枚去子爲末以寒食麵和作餅子

日炙黃再研末每服一錢溫水化

下婦人夜熱

痰嗽月經

不調形瘦者用瓜蔓仁一兩青黛香附童尿浸

丹溪心法

曬一兩五錢爲末蜜調噙化之

癆痰嗽

胸痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽

梧子大每米飲下二三

胸中癆痛

身背喘息欬唾短氣寸脈沈遲

十丸日二服杜王方

胸中癆痛

短氣寸脈沈遲

關上緊數用大栝樓實一枚切薤白半斤以白酒

七斤煮二升分再服加半夏四兩更善

仲景金匱方清痰利膈

治欬嗽用肥大栝樓洗取子切焙等分爲半

未用洗栝樓水并瓢同熬成膏和丸梧子中風喝

大每薑湯下三五十丸良

楊文蔚方

斜熨用瓜蔓絞汁和大麥麴作餅炙熟

發

病頭痛

熱

進退用大栝樓一枚取瓢細剉置甕盃中用

熱湯

一盞

沐浴之蓋定良久去滓服

聖惠方

熱病頭痛

發

發黃狂悶煩熱不識人者大瓜蔓實黃者一枚以

新汲水九合浸淘

取汁入蜜半合朴消八分

盡分再服便瘥

蘇頌圖經本草

眼黃脾熱用青瓜蔓

蓋七分臥時服五更瀉下黃酒

小兒黃疸

眼黃脾熱用青瓜蔓

立可名逐黃散

普濟方

小兒黃疸

便不通腹脹用瓜蔓焙研每服二錢熱酒下頻服

以通爲度

紹興劉駐云魏明州病此御醫

效此方治之得消渴煩亂

黃枯樓一個酒一盞洗

去皮子取瓢煎成膏入

白礬末一兩爲丸梧子大

燥渴腸祕

九月十月熟米飲下十丸

聖惠方

取瓢實

取瓢

拌乾葛粉銀石器中慢火炒熟爲末食後夜臥各以沸湯點服二錢

寇宗奭衍義

吐血不

止枯樓泥固煅存性研三錢

糯米

枯樓個燒灰

一

赤小豆半兩爲末每空心酒服一錢

普濟方

久痢五色

大熟瓜蔓一個入

火毒

半年杭州一道人傳此而愈

本事方

大腸脫

葛洪肘後方

白唇

肛生枯樓搗汁溫服之以豬肉汁洗

葛洪肘後方

小兒脫肛

白唇

白唇

齒焦久則兩頰光眉赤唇焦啼哭黃瓜

葛洪肘後方

小兒脫肛

白唇

白唇

米飲下二十丸摘玄方

牙齒疼痛

瓜蔓子

大根

白唇

白礬五錢在內固濟煅存性爲末糊丸

梧子

大根

白唇

白唇

湯嗽之危咽喉腫痛

語聲

不出經進方

用枯樓

甘草炒各二

氏得效方

皮白殭蠶炒

甘草炒各二

錢半薰一日二服名發聲散

御藥院方

錢半爲末每服三錢半薑湯下或以綿裹半

堅齒

白殭蠶炒

甘草炒各二

錢半薰一日二服名發聲散

**烏鬚**

大栝樓

一個開項

入青鹽二兩

杏仁去皮尖

煅存性研末

每日揩牙三次

定蚯蚓泥和鹽

固濟炭火

煅存性研末

每日常以藥投

之卽生黑者其治

口齒之功

未易具陳

普濟方

有驗如先

人光潤

冬月不

面黑令白

栝樓瓢三兩杏仁一兩豬肚

人皺

栝樓實一個取子細研

以酒與童子小便各半

亦可

聖濟錄

七分溫服無實用根

上翕令白色酒服一錢七合面

控乾炒香瓦

熟搗以白酒一斗煮

一夜流出去滓

蓋煎

陳良甫婦人良方

良方

栝樓汁不下

瓜蔞子淘洗

控乾炒香瓦

熟搗以白酒一斗煮

栝樓

栝樓搗末井花水服

一升日三服

姚僧坦集驗方

乳癰初發

栝樓一枚

溫服一寸七

栝樓搗末井花水服

一升日三服

子母祕錄

便毒初發

黃瓜蔓一個黃連

五錢水煎連服效

栝樓搗末井花水服

一升日三服

李仲南梅師方

便毒初發

黃瓜蔓一個黃連

五錢水煎連服效

栝樓搗末井花水服

一升日三服

生栝樓一二個打碎酒浸一

罐仙乾坤祕韞一

永類方

日夜熱飲

腥仙乾坤祕韞一

**熱遊丹腫**

栝樓子仁末二大兩

調塗

楊氏產乳集驗方

驗方

楊梅瘡痘

如小

指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮膚風熱不過十服愈用

栝樓皮爲末每服三錢燒酒下日

服

日三

過十服愈用

栝樓皮爲末每服三錢燒酒下日

日三

簡方

集

**根脩治**

**天花粉**

周憲王曰秋冬采根去皮寸切水浸逐日換水四五日取出搗泥以

絹衣瀝汁澄

乾用

**氣味苦寒無毒**

時珍曰甘微苦酸微寒之才曰枸

杞爲之使惡乾薑畏牛膝乾漆反

烏頭

**主治**

消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷

本

除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口燥短氣止小

**便利通月水**

別錄

治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰

發背痔瘻瘍排膿生肌長肉消撲損瘀血

大明

### 發明

恭曰用根作粉潔白美好食之大宜虛熱人

者非此不能除與辛酸同用導腫氣成無已曰津液不足則爲渴枯樓根味苦微寒潤枯燥而通行津液是爲渴所宜也時珍曰枯樓根味甘微苦酸其莖葉味酸酸能生津感召之理故能止渴潤枯微苦降火甘不傷胃昔人只言其苦寒似未深察

### 附方

舊新十二消渴飲水千金方作粉法取大枯樓根去皮寸切水浸五日逐

日易水取出搗研濾過澄粉曬乾每服方寸匕水化下日三服亦可入粥及乳酪中食之○肘後方用枯樓根薄切炙取玉兩水五升煮四升隨意飲之○外臺祕要用生枯樓根三十斤以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用煖酒先食服如雞子大日三服最妙○聖惠方用枯樓根

黃連三兩爲末蜜丸梧子大每服三十丸日二服  
又玉壺丸用栝樓根人參等分爲末蜜丸梧子大

每服三十丸用栝樓根三兩水五升  
麥蘆冬湯下傷寒煩渴思飲栝樓根煮一升分二服先以淡竹

冷飲汁然後服此外臺祕要半升分二服先以淡竹  
等分爲散飲服方寸匕永類方合頓服隨有黃水從

### 黑疸危疾

瓜蔓根一斤搗汁六

小便出如不出再服楊起簡便方小兒發黃皮肉面目皆黃用生  
蜜二大匙和勻暖服一日一服廣利方根末乳汁調服半合  
肚熱頭痛用栝樓根末搗取汁二合

### 小兒熱病

肚熱頭痛用栝樓根末搗取汁二合

錢聖方虛熱咳嗽天花粉一兩人參三錢爲末半偏集簡方

### 小兒囊腫

天花粉一錢米湯下

瘡痛極劫之立住用綿袋包暖陰囊取天花粉五錢以醋酒一盃浸之自卯至午微煎滾露五

一夜次早低凳坐定兩手按膝飲本草蒙筌  
下卽愈未上再一服

天花粉一錢米湯下

兩炙甘草一錢半水煎入酒服全幼心鑑

### 耳卒烘烘

枯樓根削尖以臘豬脂煎三沸

取塞耳三日卽愈

耳後方耳聾未久水煮汁如常釀酒久服

枯樓根三十斤細切以

肘後方甚良

耳聾未久水煮汁如常釀酒久服

枯樓根三十斤細切以

肘後方錢爲末

溫酒每服二錢李仲南永類方

乳癰用枯樓根末一兩乳香一

以五錢酒水煎楊氏產乳癰腫初起

孟詭食療用枯樓根燒存性研

酒熬燥搗篩以苦酒和

塗紙上貼之○楊文蔚方用枯樓

根赤小豆等分爲末醋調塗之

枯樓根末一兩爲末米

石等分爲末水調楊梅天泡

天花粉川芎薺各四

粉滑

茶之普濟方楊梅天泡

兩槐花一兩爲末米

米

糊丸梧子大每空心淡薑湯下七八十丸

簡便方折傷腫痛

枯樓根搗塗重布裹之熱

葛洪肘後方箭鏃不出

枯樓根搗傅之日三易

鍼

刺入內

方同上

痘後目障

天花粉蛇蛻洗焙等分爲末羊子肝批開入藥在內

米泔汁煮熟切食次女病此服之旬餘而愈

周密齊東野語

莖葉氣味

酸寒無毒主治中熱傷暑

別錄

王瓜

本經中品

釋名土瓜

本經

鈞蘿

郭璞

老鴉瓜

圖經

馬兜鈞

音

赤雹

子

衍義

野甜瓜

綱目

師姑草

宿主

公鬚

頌曰

月令四月

王瓜生卽此也

均房閒人呼爲老鴉瓜

亦曰

菟葵

按爾雅云黃菟

郭璞注云似土瓜而土瓜

自謂之

葵姑

又名鉤

別

則菟葵別是一物也

又曰

芳菲

亦謂之

土瓜

別

是一物非此土瓜也

異類同名甚多不可不辨

時

珍曰土瓜其根作土氣其實似瓜也

或云根味如

瓜故名土瓜

王字不知何義

瓜似雹子熟則色赤

鴉喜食之故俗名赤雹老鴉瓜一葉之下鬚故俚人呼爲公公鬚與地黃苗名婆婆嫗可爲屬對集解別錄曰生魯地平澤田野及人家垣牆間三時赤如彈子其根不入大方止單行小方爾鄭玄注月令四月王瓜生以爲菝葜殊謬矣恭曰四月開生苗延蔓葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多

黃肉白苗葉相似根狀不同若療黃疸破血南者謂之土瓜根北閒者其實纍纍相連大如棗皮大勝也宗奭曰王瓜其殼徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根卽土瓜根也于細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用時珍曰王瓜三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹其葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澀而不光六七月開五出小黃花成簇結子纍纍熟時有紅黃二色皮亦粗澀根不似葛但如栝樓根之小者澄粉甚白膩須

深掘二三尺乃得正根江西人栽  
之沃土取根作蔬食味如山藥

根氣味苦寒無毒

權曰平藏器曰有小毒能吐下人取汁制雄汞

主治消

渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾

本經

療諸邪

氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水治馬骨刺人瘡

錄別

天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞排膿消撲

損瘀血破癥癬落胎

大主

蠱毒小兒閃癖痞滿痰

瘡并取根及葉搗汁少少服當吐下

藏器

利大小便

治面黑面瘡

珍時

附方

舊五新七

小兒發黃

土瓜根生搗汁三合與服不適三次蘇頌圖經黃

痘變黑

醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服

便如泄

乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩白石脂二兩菟絲子酒浸二兩桂心一兩牡蠣粉

一兩爲末每服二錢大麥粥飲下

衛生寶鑑小便不通

土瓜根搗汁入少水解之筒吹入下部○

大便不通

上方吹入肛門內二便不通前後吹之取通

乳汁不下

土瓜根爲末酒服一錢一日二服楊氏產乳方

經水不利

下帶

少腹滿或經一月再見者土瓜根散主之土瓜根芍藥桂枝廬蟲各三兩爲末酒服方寸匕日三服

仲景婦人陰癩方同金匱方

一切漏疾

土瓜根搗傅之燥則易千金

土瓜根大如指長三寸切以酒半升潰一宿服當吐下

外臺祕要面

**上痱瘡**

土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面塗藥旦復洗之百日光彩射人夫妻不

相識也

曾用有

**耳聾灸法**

溼土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一

灸

愈乃止

聖濟總錄

**子氣味酸苦平無毒主治生用潤心肺治黃病炒**

**用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢**

大主蠱毒

甄權

**胃吐食**

時珍

**附方**

新八

**消渴飲水**

兩

五七度瘥

聖惠方

傳尸

**勞瘵**

赤電兒

俗名王瓜

焙爲末

每酒服一錢

十

藥神書

**反胃吐食**

馬電兒

燈上燒

存性

一錢入好棗肉平胃散末

二錢酒服食

丹溪纂要

**痰熱**

即下即野甜瓜

北方多有之

昌葛

頭風

懸枯樓一個赤雹兒七個焙大力子卽牛蒡子焙四兩爲末每食後茶或酒服三錢忌動

風發熱之物

筋骨痛擊馬雹兒子炒開口爲末酒

痛溆

不可忍小圓瓜瓢籬上大如彈丸紅色皮上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等

分爲末

溫酒下每服二錢臨臥衛生家寶方

瘀血作痛

研末無灰酒空心服二錢

大腸下血

王瓜一兩燒存性地黃二兩集簡方

米飲下三十丸

指南方

葛

本經中品

校正

併入開寶葛粉

釋名

雞齊

本經鹿藿別錄

黃斤

別錄時珍曰葛從曷諧聲也鹿食九草此其一

種故曰鹿藿

斤未詳

集解

別錄曰

葛根生汶山山谷五月采根曝乾宏

大者破而日乾之南康廬陵閒最勝多肉而少筋  
甘美但爲藥不及耳恭曰葛雖除毒其根入土五  
微毒也本經葛穀卽是其實也頌曰今處處有之  
江浙猶多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似  
椒葉而小色青七月著花粉紫色似豌豆花不結  
實根形大如手臂紫黑色五月午時采根曝  
乾以入土深者爲佳今人多作粉食宗奭曰澧鼎  
之閒冬月取生葛搗爛入水中揉出粉澄成垛入  
沸湯中良久色如膠其體甚韌以蜜拌食擦入生  
薑少許尤妙又切入茶中待賓雖甘而無益又將  
生葛根煮熟作果實賣吉州南安亦然時珍曰葛  
有野生有家種其蔓延長取治可作繩紿其根外  
紫內白長者七八尺其葉有三尖如楓葉而長面  
青背淡其花成穗纍纍相綴紅紫色其莢如小黃  
豆莢亦有毛其子綠色扁扁如鹽梅子核生嚼腥

氣八九月采之本經所謂葛穀是也唐蘇恭亦言葛穀是實而宋蘇頌謂葛花不結實誤矣其花曬乾亦可  
燂食

葛根氣味甘辛平無毒

別錄曰生根汁大寒好古曰氣平味甘升也陽也陽

明經行經的藥也

主治消渴身大熱嘔吐諸癆起陰氣解諸毒

本經療

傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止

脇風痛

別錄

治天行上氣嘔逆開胃下食解酒毒

甄權

治胸膈煩熱發狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇

蠱嚙置毒箭傷

大

殺野葛巴豆百藥毒

之

生者墮

胎蒸食消酒毒可斷穀不饑作粉猶妙藏器作粉止

渴利大小便解酒去煩熱壓丹石傳小兒熱瘡搗汁飲治小兒熱痞開獵狗傷搗汁飲并末傳之

蘇恭

散鬱火

時珍

正經本草

發明宏景曰生葛搗汁飲解溫病發熱五月五日中時取根爲屑療金瘡斷血爲要藥亦療瘧及瘡至良頌曰張仲景治傷寒有葛根湯以其主大熱解肌發腠理故也元素曰升陽生津脾虛作渴者非此不除勿多用恐傷胃氣張仲景治太陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根又有葛根黃芩黃連解肌湯是用此以斷太陽入陽明之路非卽太陽藥也頭顱痛如破乃陽明中風可用葛根葱白湯爲陽明仙藥若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明

爲引賊破家也。震亨曰：凡癰痘已見紅點不可用葛根升麻湯恐表虛反增斑爛也。杲曰：乾葛其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉聖藥也。徐用誠曰：葛根氣味俱薄輕而上行浮而微降陽中陰也。其用有四：止渴一也，解酒二也；發散表邪三也；發瘡疹難出四也。時珍曰：本草十劑云：輕可去實，麻黃葛根之屬蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經，肺主皮毛，葛根乃陽明經藥兼入脾經，脾主肌肉，所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同也。

## 附方

舊十五

## 數種傷寒

庸人不能分別今取一藥兼治天行時氣初覺頭痛

內熱脈洪者葛根四兩水二升入豉一升煮取半升服生薑汁尤佳。傷寒類要時氣頭痛去滓分服汗出卽瘥未汗再服若心熱加巵子仁十枚。傷寒頭痛豉一升以童子小便八升煎聖惠方。

取二升分三服食葱粥取汗 梅師方 妊娠熱病

葛根汁二升分三服傷寒類要

預防熱病急黃賊風半升爲散每食後米飲服方寸匕日三

服有病五服 龐安常傷寒論 生葛搗汁一小盞服去

煩躁熱渴 葛粉四兩先以水浸粟米半升一夜漉出拌勻煮熟以糜飲和食

聖惠方食醫心鏡

小兒熱渴久不止葛根半兩乾嘔不息

葛根搗汁一升瘥

後方 小兒嘔吐 壯熱食癟葛粉二錢水二合調勻傾入錫鑼中重湯盪熟以糜飲和食

聖惠方食醫心鏡

食醫心鏡 心熱吐血 不止生葛搗汁半升頓服立瘥

廣利方衄血不

止 即生葛搗汁服三服 因食熱物發者生葛根二斤搗汁

昇入藕一升和梅師方 傷筋出血

葛根搗汁飲乾者煎服外臺祕

服 梅師方 傷筋出血 仍熬屑傅之

葛根搗汁飲乾者煎服外臺祕

要腎腰疼痛

生葛根嚼之嚙汁取效乃止

肘後方

金創中風

瘡強欲死

生葛根四大兩以水三升煮取一升去滓分服口噤者灌之若乾者搗末調三指撮仍以此及竹瀝

多服取效

貞元廣利方

服藥過劑者煎汁服

肘後方

金創酒醉

不醒

生葛汁飲二升便愈

千金方

諸藥中毒

發狂煩悶吐下欲死葛根煮汁服

肘後方

解中鳩毒

氣欲絕者葛粉三合水三盞

聖惠方

虎傷

人瘡

生葛煮濃汁洗之仍搗末水服

梅師方

葛穀氣味甘平無毒

主治下痢十歲已上

本解酒經

葛花氣味同主治消酒

別錄宏景曰同小豆花腸

乾末酒服飲酒不醉也

時珍

葛花氣味同主治消酒

乾末酒服飲酒不醉也

本草綱目草部卷二十一

風下血

時珍

葉主治金瘡止血援傅之

別錄

蔓主治卒喉痹燒研水服方寸匕

蘇恭

消癰腫

時珍

附方

新

婦人吹乳

藤蔓燒灰酒服

二錢

三

衛生易簡方

初

起

葛蔓燒灰水

調傅

千金方

小兒口噤

病在咽中如麻豆

許令兒吐沫不能

乳食

葛蔓燒灰

一字和乳

汗點

之卽瘥

聖惠方

附錄

鐵葛

拾遺

藏器

曰根味甘溫無毒主一切風

血氣羸弱

令人壯健久服治風緩偏風

生山南峽中葉似

枸杞

根如葛黑色

黃環

本經

狼跋子

別錄

下品

下品

大正圖目錄

卷之二

葛

附鐵葛

黃環

是

品

品

品

葛

附鐵葛

黃環

是

釋名凌泉

本經

大就

本經

葛

唐本

生芻

吳普

根韭

吳普

實名

狼跋子

別錄

度穀

唐本

黃環

葉黃而圓故名

如蘿藦呼白環之義亦是葛

類故名就葛跋乃狼足名

其莢似之故曰狼跋子

集解

別錄

蜀黃環

一名生芻

二月生苗

正赤高二尺

葉黃圓端大經日

葉有汁黃白五月實圓

三月采根黃色

從理如車輻解

宏景曰似防己亦作車輻

根莖

理解蜀都賦云青珠黃環卽此或云是大戟花定

非矣用甚稀

市人以有識者又曰狼跋子出交廣

大戟制搗以雜木投水中魚無大小皆浮出而

死恭曰黃環惟襄陽大有餘處雖有亦稀巴西人

形扁制搗以雜木投水中魚無大小皆浮出而

死恭曰黃環惟襄陽大有餘處雖有亦稀巴西人

謂之就葛今園庭亦種之作藤生大者莖徑六七

寸根亦葛類陶云似防己者近之取葛根誤食之

吐利不止土漿解之此真黃環也今太常收劍南

來者乃雞屎葛根非黃環也其花紫色其子名狼

吐利不止土漿解之此真黃環也今太常收劍南

跋子角生似阜莢交廣送入太常者正是黃環子  
也花實與葛同時時珍曰吳普所說甚詳而唐宋  
本草不收何也范子計然云黃環出魏郡以黃色者爲善

黃環

根

氣味苦平無毒

普曰

神農黃帝有毒桐君扁鵲苦櫂曰大寒有小毒

之才曰鳶尾爲之使惡蒺藜防己乾薑

主治

鹽毒鬼疰鬼魅邪氣在

臟中除欬逆寒熱

本經

治上氣急及百邪

甄權

治痰嗽

消水腫利小便

時珍

附方

新

水腫

黃環根曬乾每服五錢水煎

服小便利爲效

儒門事親

狼跋子氣味苦寒有小毒主治惡瘡瘍疥殺蟲魚

別名

苦酒磨塗瘡疥效

宏景

錄苦酒磨塗瘡疥效

別名

天蠻冬

天蠶冬

本經上品

釋名

蠶冬 音顛勒

本經

天棘

綱目

萬歲藤

禹錫曰

爾雅云  
一名顛棘或名地

蠶冬或名筵  
注云門冬也

一名滿冬抱朴子

云一名

淫羊藿在中岳名天蠶冬

在西岳名普松在京陸山阜名顛棘

在北岳名

名無不愈在南岳名百部

越人名浣草雖處處有之

其名不同其實一也別

有百部草其根有百許如一而苗小異其苗似拔

者爲蠶俗作門此草蔓茂而功同麥

葬冬或曰天棘爾雅云髦顛棘也

因其細葉如髦

有細棘也顛天音相近也按救荒本草云俗名萬

歲藤又名婆蘿樹其形與治肺之功頗同百部故

亦名百部也牆蘿乃營實苗而爾雅指爲蠶冬蓋

古書錯簡也

集解

別錄曰天藪冬生奉高山谷二月三月七月八月采根曝乾宏景曰奉高泰山下縣名也

今處處有之以高地大根味甘者爲好桐君藥錄云蔓生葉有刺五月花白十月實黑根數十枚張華博物志云天藪冬莖閒有逆刺若葉滑者名絲體一名顛棘拔根入湯可以浣縑素白如絨紺類也今越人名爲浣草勝於用灰此非藪冬乃相似爾按此說與桐君之說相亂今人所采皆是有刺者本名顛勒亦粗相似用此浣衣則淨不復更有蔓冬恐蔓冬自一種或即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾恭曰此有二種一種苗有刺而澗一種無刺而滑皆是藪冬俗云顛棘浣草者形貌詔之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨藪冬浣草互名也詔音命目之也頽曰處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如苘香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天藪冬夏生細白花亦有黃色及紫色者秋結黑子在其根枝旁入伏後無花暗結子其根白

或黃紫色大如手指圓實而長二三寸大者爲勝  
一科二十枚同撮頗與百部根相類洛中出者  
**大葉粗榦殊不相類**嶺南者無花餘無他異禹錫  
曰抱朴子言生高地根短味甜氣香者爲上生水  
側下地葉似細蘿而微黃根長而味多苦氣臭者  
次之若以服食令人下氣爲益又遲也入山便可  
蒸煮啖之斷穀或爲散仍取汁作酒服散猶佳時  
珍曰生苗時亦可以沃地栽種子亦堪種但晚成  
**根脩治**宏景曰薑冬采得蒸剝去皮食之甚甘美  
止飢雖曝乾猶脂潤難搗必須曝於日中  
或火烘之今人呼苗爲棘刺煮作飲宜人而終非  
真棘刺也頌曰三七八月采根蒸剝去皮四破  
去心曝乾用敷曰采得去皮心用柳木餉及柳木  
柴蒸一伏時灑酒令遍更添火蒸作小架去地二  
尺攤于上曝乾用

**氣味苦平無毒**

別錄曰甘大寒好古曰氣寒味微苦而辛氣薄味厚陽中之陰入手

太陰足少陰經氣分之藥之才曰垣衣地黃貝母爲之使畏曾青損之曰服天蠶冬禁食鯉魚誤食中毒者浮萍汁解之搗汁制雄黃硇砂主治諸暴風溼偏痹強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不饑本保定肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補別錄肺氣欬逆喘息促急肺痿生癰吐膿除熱通腎氣止消渴去熱中風治溼疥宜久服煮食之令人肌體滑澤白淨除身上一切惡氣不潔之疾甄權鎮心潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰去風熱煩悶大明主心病嗌乾心痛渴而欲飲瘥歷嗜臥足下熱而痛好

潤燥滋陰清金降火時陽事不起宜常服之

思邈

發明

權曰天薑冬冷而能補患人五虛而熱者宜加用之和地黃爲使服之耐老頭不白宗奭

曰治肺熱之功爲多其味苦專泄而不專收寒多入禁服之元素曰苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天薑冬之功也保定肺氣治血熱侵肺上氣喘促宜加人參黃芪爲主用之神效嘉謨曰天麥薑冬並入手太陰祛煩解渴止欬消痰而麥薑冬兼行手少陰清心降火使肺不犯邪故止欬立效天薑冬行足少陰滋腎助元全其母氣故清痰殊功蓋腎主津液燥則凝而爲痰得潤劑則化所謂治痰之本也好古曰手太陰足少陰經營衛枯涸宜以溼劑潤之天薑冬人參五味枸杞子同爲生脈之劑此上焦獨取寸口之意趙繼宗曰五藥雖爲生脈之劑然生地黃貝母爲天薑冬之使地黃車前爲麥薑冬之使茯苓爲人參之使若有君無使是獨行無功也故張三丰與胡漢尚書長

生不老方用天薑冬三斤地黃一斤乃有君而有使也禹錫曰抱朴子言入山便可以天薑冬蒸煮搗汁作液膏服至百日丁壯兼倍駛于虎及黃精尤善杜子微服之御八十妾一百四十歲日行三百里慎微曰列仙傳云赤松子服天薑冬齒落更生細髮復出太原甘始服天薑冬在人間三百餘年聖化經云以天薑冬茯苓等分爲末日服方寸七年則不畏寒大寒時單衣汗出也時珍曰天薑冬清金降火益水之上源故能下通腎氣入滋補方合羣藥用之有效若脾胃虛寒人單餌旣久必病腸滑反成痼疾此物性寒而潤能利大腸故也

## 附方

舊三新

## 服食法

孫真人枕中記云八九月采

寸七日三服無問山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風溼不仁冷痹惡瘡

癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫蟲出釀酒服去  
癥病積聚風痰顛狂三蟲伏尸除溼痹輕身益氣  
令人不饑百日還年耐老釀酒初熟微酸久停則  
香美諸酒不及也忌鯉魚○臘仙神隱云用乾天  
蠶冬十斤杏仁一斤搗末蜜漬每服方寸匕名仙人糧  
居山遠行辟穀良服至十日身輕目明二十日百  
病愈顏色如花三十日髮白更黑齒落重生五十  
日行及奔馬百日延年○又法天蠶冬搗汁微火  
煎取五斗入白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可  
丸卽止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半寸一  
服一餅一日三服百日已上有益○又法天蠶冬  
末一升松脂末一升蠟蜜一升和煎丸如梧子大  
每日早午晚各服三十丸  
**天蠶冬酒**補五臟調六腑令人無病  
以水二石煮汁一石糯米一斗細  
**天蠶冬膏**去積  
麴十斤如常炊釀酒熟日飲三盃

痰補肺療欬嗽失血潤五臟殺三蟲伏尸除瘟疫  
輕身益氣令人不飢以天蠶冬流水泡過去皮心  
搗爛取汁砂鍋文武炭火煮勿令大沸以十斤爲  
率熬至三斤卻入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋  
土中一七去火毒每日早晚白湯調服

匙若動大便以酒服之

醫方摘要

肺痿欬嗽

吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴生天蠶冬搗汁一  
斗酒一斗飴一升紫苑四合銅器煎至可丸每服一  
杏仁大一丸日

陰虛火動

有痰不堪用燥劑者天蠶冬一斤水浸洗去心  
三服

肘後方

取肉十二兩石臼搗爛五味子水洗去核取肉四  
兩曬乾不見火共搗丸梧子大每服二十丸茶下

日三服

○滋陰養血

溫補下元三才丸用天蠶冬

簡便方

以酒灑之九蒸九曬待乾秤之人參一兩爲  
末蒸肉搗和丸梧子大每服三十丸食前溫酒

下日三服

古活法機要

潔虛勞體痛

天蠶冬末酒服方寸匕

千金方

**肺勞風熱**

止渴去熱天蠶冬去皮心煮食或曝乾爲末蜜丸服尤佳亦可洗面孟詵食

**療婦人骨蒸**

煩熱寢汗口乾引飲氣喘天蠶冬十兩麥蘢冬八兩並去心爲末以生地

黃三斤

取汁熬膏和丸梧子大

每服五十丸以逍遙散去甘草煎湯下活法機要

風顛發

作則吐耳如蟬鳴引脇牽痛天蠶冬去心皮曝搗爲末酒服方寸匕日三服久服良

外臺祕要

**小腸偏墜**

天蠶冬三錢烏藥五錢以水煎服吳珠活人心統

冬曝乾同蜜搗作丸日用洗面

聖濟總錄不愈者天蠶冬

**口瘡連年**

麥蘢冬並去心

玄參等分爲末煉蜜丸乃僧居寮所傳方也

齊德之外科精義諸般癰

腫新掘天蠶冬三五兩洗淨沙盆搗細

以好酒瀝汁頓服未效再服必愈此祖傳經驗方也

虞

百部

別錄  
中品

釋名婆婦草

日華

野天蓼冬

綱目

時珍曰其根多者

百十連屬如部伍然故

以名之

集解

宏景曰山野處處有之其根數十相連似天

草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸切

短含嚥汁主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此卽百部也

其土肥潤是以長大也

藏器曰天蓼冬根有十餘

莖圓短實潤味甘百部多者五六十莖長尖內虛

味苦不同苗蔓亦別今人以蓼冬當百部說不明

也

頌曰今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作

藤蔓葉大而尖長頗似竹葉而青色面光根下一

撮十五六枚黃白色二三八月宋曝乾用

時珍曰

百部亦有細葉如茴香者其莖青肥嫩時亦可煮

食其根長者近尺新時亦肥實但乾則虛瘦無脂

潤爾生時擘開去心曝之鄭樵通志言葉如薯蕷者謬矣

### 根脩治

數日凡采得以竹刀劈去心皮花作數十條懸簷下風乾卻用酒浸一宿漉出焙乾

判用或一窠八十三條者號曰地仙苗若脩事餌之可千歲也

### 氣味甘微溫無毒

權曰甘無毒大明曰苦無毒恭微寒有小毒時珍曰苦微甘

無主治欬嗽上氣火炙酒漬飲之

別錄治肺熱潤肺

甄權治傳尸骨蒸勞治疳殺蛇蟲寸白蟯蟲及一切

樹木蛀蟲燼之卽死殺蟲及蠅蝶

大明宏景曰作湯洗牛犬去蟲

火炙酒浸空腹飲治疥癬去蟲蠶咬毒

器藏

### 發明

時珍曰百部亦天蠶冬之類故皆治肺病殺蟲但百部氣溫而不寒寒嗽宜之天蠶冬性

寒而不熱熱嗽宜之此爲異耳

## 附方

舊新五

## 暴欬嗽

張文仲方用百部根漬酒每溫服一升日三服○葛洪方用百部藤根搗自然汁和蜜等分沸湯煎膏噙嚥○普

濟方治卒欬不止用百部根懸火上炙乾每含嚥汁勿令人知

## 小兒寒嗽

用百部丸

炒麻黃去節各七錢半爲末杏仁去皮尖炒仍以百部根二十斤搗取二汁

## 三十年嗽

煎如飴服方寸七日以

錢乙小兒方加服深師加蜜二斤外臺遍身黃腫掘洗搗罨臍上以帛包根在藥土以帛包根自消也

## 遍身黃腫

掘新鮮百條以根

加飴一斤千金方加糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥土以帛包根一百餘個數待二日後口內作酒氣則水從小便中出腫包根一名野天蠻冬一名楊氏經驗其苗葉柔細一根下有百餘個數

方誤吞銅錢

百部根四兩酒一升漬一宿溫

百蟲

外臺祕要

入耳

于耳門上百部炒研生油調一字

聖濟總錄

熏衣去蝨

百部秦艽末入竹

籠燒烟熏之自落亦可  
煮湯洗之

經驗方

附錄白粧

別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟  
令百病不起

一名王富一名箭幹生山

陵葉如小竹根黃白三月四月采根曝乾

時珍曰此物氣味主治俱近百部故附之

何首烏

宋開寶

釋名交藤

本夜合

傳地精

本陳知白

開馬肝石

綱目

桃柳藤

日華

九真藤

綱目

赤葛

斗門

瘡痔

綱目

紅內消

大明

目其

藥本草無名因何首烏見藤夜交何卽采食有功

因此采人爲名爾時珍曰漢武時有馬肝石能治

人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒  
外科呼爲瘡弔紅內消斗門方云取根若獲九數  
者服之乃仙故名九真藤

### 集解

頌曰何首烏本出順州南河縣今在處有之  
嶺外江南諸州皆有以西洛嵩山及河南柏

城縣者爲勝春生苗蔓延竹木牆壁閒莖紫色葉  
葉相對如薯蕷而不光澤夏秋開黃白花如葛勒  
花結子有棱似蕎麥而細小纏如粟大秋冬取根  
大者如拳各有五棱瓣似小甜瓜有赤白二種赤  
服者雄白者雌一云春采根秋采花九蒸九曝乃可  
服此藥本名交藤因何首烏服而得名也唐元和  
七年僧文象遇茅山老人遂傳此事李翹乃著何  
首烏傳云何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父何  
名延秀能嗣本名田兒生而閼弱年五十八無妻  
子常慕道術隨師在山一日醉臥山野忽見有藤  
二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交  
田兒驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者

後有山老忽來示之答曰子旣無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一二錢七日而思人道數月似強健因此常服又加至二錢經年舊疾皆痊髮烏容少十年之內卽生數男乃改名能嗣又與其子延秀服皆壽百六十歲延秀生首烏首烏服藥亦生數子年百三十歲髮猶黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽亦長遂敘其事傳之云何首烏味甘性溫無毒茯苓爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癥風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血瘕黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三道名夜合四名地精五名何首烏本出處州江南諸道皆有苗如木藁葉有光澤形如桃柳其背偏皆單生不相對有雌雄者苗色黃白雌者黃赤根遠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏中秋初三時候晴明日兼雌雄采之乘潤以布帛拭去泥土勿損皮烈日曝乾密器貯之每月再曝

用時去皮爲末酒下最良遇有疾卽用茯苓湯下  
爲使凡服用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出  
導引尤良忌豬肉血羊血無鱗魚觸藥無力其根  
形大如拳連珠其有形如鳥獸山岳之狀者珍也  
掘得去皮生喫得味甘甜可休糧讚曰神效助道  
著在仙書雌雄相交夜合晝疏服之去穀日居月  
諸返老還少變安病軀有緣者遇蕞爾自如○明  
州刺史李遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南  
恩州桂州韶州潮州賀州廣州潘州四會縣者爲上  
州桂林康州春州高州勒州循州晉興縣出者次  
髮髭青黑一百年者如盜大號山哥服之一年顏  
色紅悅一百五十年者如盜大號山伯服之一年  
齒落更生二百年者如斗栲栳大號山翁服之一年  
年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲栳大  
號山精純陽之體久服成地仙也時珍曰凡諸名  
山深山產者卽大而佳也

根脩治

志曰春夏秋采其根雌雄共用乘溼以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸經

宿去皮銅刀切薄片入甑內以瓮鍋蒸之旋以熱水

從上淋下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用

時珍曰近時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮

去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三

升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一

層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何首

烏曬乾再以豆蒸如此九蒸九曬乃用

地黃能

伏硃砂

主治

瘧癰消癰腫療頭面風瘡治五痔止心痛益血氣黑鬚髮悅顏色久服長筋骨益精髓

延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾

開

久服令

人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風大瀉肝風古好

## 發明

時珍曰何首烏足厥陰少陰藥也白者入氣分赤者入血分腎主閉藏肝主疏泄此物氣

溫味苦澀苦補腎溫補肝能收斂精氣所以能養血益肝固精益腎健筋骨烏鬚髮爲滋補良藥不

寒不燥功在地黃天蠶冬諸藥之上氣血太和則風虛癱腫瘰癧諸疾可知矣此藥流傳雖久服者

尚寡嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進世宗肅皇帝服餌有效連生皇嗣於是何首烏之

方天下大行矣宋懷州知州李治與一武臣同怪其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術

則服何首烏丸也乃傳其方後治得病盛暑中半體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂浹

體其活血治風之功大有補益其方用赤白何首烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼爲

溫酒下五十丸亦可末服

附方

舊四新十二

七寶美髯丹

續嗣延年用赤白何首烏鬚髮壯筋骨固精氣

烏各一斤米泔水浸三四日瓷片刮去皮用淘淨  
黑豆二升以砂鍋木甑鋪豆及首烏重鋪蓋蒸  
之豆熟取出去豆暴乾換豆再蒸如此九次暴乾  
爲末赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜  
及浮者取沈者捻塊以入乳十盞浸勻曬乾研末  
牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第七次蒸之  
至第九次止曬乾當歸八兩酒浸生芽研爛曬補骨脂四  
酒浸曬菟絲子八兩酒浸生芽研爛曬枸杞子八兩  
兩以黑脂麻炒香並忌鐵器石臼爲末煉蜜和丸  
彈子大一百五十丸每日三丸清晨溫酒下午時  
薑湯下臥時鹽湯下其餘並丸梧子大每日空服

食滋補

和劑局方

何首烏丸

專壯筋骨長精髓補

血氣久服黑鬚髮堅陽道令人多子輕身

延年月計不足歲計有餘用何首烏三斤銅刀切

以米泔水浸軟切之牛膝去苗一斤切以

片乾者以米泔水浸

軟切之牛膝去苗一斤切以

片乾者以米泔水浸

軟切之牛膝去苗一斤切以

片乾者以米泔水浸

軟切之牛膝去苗一斤切以

鋪黑豆一斗淘淨用木甑鋪豆一層鋪藥一層重重  
此三次爲末蒸棗肉和丸梧子大每服三五十  
何首烏各半斤去粗皮陰乾石臼杵末每日無灰白丸  
酒服一錢○積善堂方用赤白何首烏各半極大  
曬乾以壯婦男兒乳汁拌曬三度候乾未臼春爲宿  
末以蜜雲棗肉和杵爲丸如梧子大每服二十丸  
每十日加十丸止空心溫酒鹽湯任下丸  
方不分作四分一分用當歸汁浸一分人乳  
石臼爲末蒸棗肉和丸梧子大每服二十丸  
禁忌百沸湯下骨軟風疾腰膝子大每服三十丸  
一斤分旱蓮汁浸三分人乳浸三日取出生地黃  
者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿曝乾木臼  
杵末棗肉和丸梧子大每服四十丸浸半空心酒  
心酒白紋瘡空瓦

下

經寬筋治損

何首烏十斤生黑豆半斤同煎

驗方

炒取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮

二兩爲末酒糊丸梧子大每服三十丸茶湯下

方永類皮裏作痛

不知何處用何首烏末薑汁調成膏塗之以帛裹佳火炙鞋底熨之

驗方

經自汗不止

何首烏末津調封

驗方

白汗不止

何首烏末食前

驗方

米飲服二錢

聖惠方小兒龜背

龜尿

調紅內消

驗方

久安自破傷血出

何首烏末傅之卽止

驗方

久不破下至胸前者皆

治之用九真藤一名赤葛

驗方

卽何首烏其葉如杏其根如雞卵亦類癰子取根

洗淨日日生嚼并取葉搗塗之數服卽止

瘡

紅內消不限多少瓶中文武火熬煎臨熱入好

灰酒相等再煎數沸時時飲之其滓焙研爲

末酒煮麪糊丸梧子大空心溫酒下三十丸疾退  
宜常服之卽赤何首烏也建昌產者良 陳自明

外科 精義

大風癩疾

浸一七九曬胡麻四兩九蒸

九曬爲末每酒服二錢日二聖惠方

疥癩滿身

不可治者何首烏

湯洗浴甚能解痛生肉王袞博濟方

莖葉主治風瘡疥癩作癢煎湯洗浴甚效

時珍

# 本草綱目草部卷十八上終

本草綱目直音

卷一八

七

本草綱目草部第十八卷下

草之七 蔓草類

草辭別錄中品

釋名赤節別錄

吳普

竹木

炮炙

白菝葜

時珍曰

草

論

解名義

未

詳曰華本草言時人呼爲白菝葜

象形也

赤節百枝與狗脊同名

集解別錄

乾弘景曰

今處處有之

根似菝葜而小異根

大不甚有角節色小淺

恭曰此有二種莖有刺者

根白實無刺者根虛軟軟者爲勝蔓生葉似薯蕷

頌曰今河峽汴東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉

俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白

數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許

大春秋采根曝乾今成德軍所產者根亦如山薯

一

草辭

草部第十八卷下

而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月采根利刀切片曝乾用時珍曰草薢蔓生葉似菝葜而大如盃其根長硬大者如商陸而堅今人皆以土茯苓爲草薢誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草又以草薢爲狗脊亦誤矣詳狗脊下宋史以懷慶草薢充貢

根氣味苦平無毒

別錄曰甘之才曰薏苡爲之使畏葵根大黃柴胡前胡牡蠣主

治腰脊痛強骨節風寒溼周痹惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺老人五緩關節老血

別錄冷氣

癆痹腰腳癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷腎閒有膀胱宿水

甄權

頭旋癇疾補水臟堅筋骨益

精明目中風失音

大明

補肝虛好古治白濁莖中痛痔

# 瘻壞瘡

時珍

發明 時珍曰草薢足陽明厥陰經藥也厥陰主筋所以能治緩弱癥瘕遺濁惡瘡諸病之屬風溼者溼草薢菝葜土茯苓三物形雖不同而主治之功不相遠豈亦一類數種乎雷敷炮炙論序云囊皺漩多夜煎竹木竹木草薢也漩多白濁皆是溼氣下漩楊惔家藏方治真元不足下焦虛寒小便頻數白清濁如膏有草薢分清飲正此意也又楊子建萬全方云凡人小便頻數不計度數便時莖內痛不可忍者此疾必先大腑祕熱不通水液只就小痛全白清護命方云大腑祕熱不重證也此疾必先大腑愈加乾渴甚則渾身熱心躁思涼水如此小痛全白清濁大腸小便頻數隨虛水入于小腸故便時作痛也不飲酒者血必平生過食辛熱葷膩之物又因色傷而然此小痛者不同也宜用草乃者

薢一兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽爲末每服  
二錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸  
仍以葱湯頻洗穀道令氣得  
通則小便數及痛自減也

附方

舊二新三腰腳痺軟行履不穩者萆薢二十四分

三錢

七禁牛肉

唐德宗貞元廣利方

小便頻數

川萆薢一斤爲末酒糊丸梧子大每

九丸

鹽酒下七十集玄方

白濁頻數

璇面如油澄下如膏乃真元不足下焦虛寒萆薢分

清飲用草薢

石菖蒲益智仁烏藥等分每服四錢水一盞入鹽一捻煎七分食前溫服日一服效乃

止

腸風痔漏

如聖散用萆薢貫眾去土等分爲末每服三錢溫酒空心服之

傳家祕寶方

頭痛發汗

草薢旋覆花虎頭骨酥炙等分爲散欲發時以溫酒服二錢暖分

臥取

汗立瘥

聖濟錄

**拔葜** 上蒲八切下棄八切

別錄中品

**釋名**

**菝葜**

**同金剛根**

日華

**鐵菱角**

綱目

**王瓜草**

日華時珍曰

跋  
誠猶拔結也  
拔而江浙人謂之

**拔葜根**

亦曰金剛根  
楚人謂

之鐵菱角皆狀其堅而有尖刺也

鄭樵

通志云其葉頗近王瓜故名王瓜草

**集解**

別錄曰生山野二月八月采根曝乾

弘景曰陶云三

種乃狗脊菝葜草薢相類非也

根不相類草薢細長而白色菝葜根作塊結

赤色殊非狗脊之流

須曰今近道及江浙州郡

多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏

藥葉而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作

塊人呼金剛根

時珍曰菝葜山野中甚多其莖似

蔓而堅強植生有刺其葉圓大狀如馬蹄光澤似

本草綱目 卷一百一十一  
柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬  
鬚如刺其葉煎飲酸澑野人采其根葉入染家用  
名鐵菱角吳普本草以拔葜爲狗脊非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒主治腰背寒痛風痹益血

氣止小便利別錄治時疾瘧瘴大補肝經風虛好治

消渴血崩下利時葉治風腫止痛撲損惡瘡和鹽少許搗塗傳佳日華子

發明時珍曰拔葜足厥陰少陰藥氣溫味酸性澑而收與草薢彷彿孫真人元旦所飲辟邪屠

蘇酒中亦用之頌曰取根浸赤汁煮粉食辟瘴

附方新五小便滑數金剛根爲末每服三錢溫酒下睡時○儒門事親方沙石

淋疾重者取去根本用拔葜二兩爲末每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰腹須臾卽通也

聖濟錄

# 消渴不止

拔穀卽拔葜咀半兩水三盞烏梅一箇煎一盞溫服普濟方

下痢赤白

金剛根臘茶等分爲末白梅肉搗丸芡子大每服五七丸小兒三丸白痢甘草

湯下赤痢烏梅湯

易簡方

風毒腳弱

痹滿上氣田舍貧家

下解以水三斛煮取九斗漬麴去滓取一

斛漬飲如常釀酒任意日飲之

肘後方

土茯苓

綱目

校正

禹餘糧

釋名土草薢

綱目

刺豬苓

經圖

山豬糞

綱目

山地栗

綱目時珍曰按陶弘景注

仙遺糧

綱目

冷飯團

綱目

硬飯

綱目

山地栗

綱目時珍曰按陶弘景注

石部禹餘糧

雲南中平澤有一種藤生葉如拔葜

根作塊有節似拔葜而色赤味如薯蕷亦名禹餘

糧言昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說卽今土茯苓也故今尙有仙遺糧

名觀陶氏此說卽今土茯苓也故今尙有仙遺糧

冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草禹餘糧蘇頌圖經豬苓下刺豬苓皆此物也今皆併之茯苓俗又名過岡龍謬稱也

集解

藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蓋連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澀人取以當穀食不飢頌曰施州一種刺豬苓蔓生春夏采根削皮焙乾彼土人用傅瘡毒殊效時珍曰土茯苓楚蜀山箐中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其根狀如菝葜而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種入藥用白者良按中山經云鼓鐘之山有草焉名曰榮草其葉如柳其本如雞卵食之已風寒卽此也昔人不知用此近時弘治正德間因楊梅瘡盛行率用輕粉藥取效毒留筋骨潰爛終身至人用此遂爲要藥諸醫無從考證往往指爲萆薢及菝葜然其根苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗相

近蓋亦草薢  
菝葜之類也

根氣味甘淡平無毒

時珍曰  
忌茶茗

主治食之當穀不飢

調中止洩健行不睡

藏器曰  
忌茶茗

健脾胃強筋骨去風溼利

關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞粉銀朱

毒時

珍

發明

機曰近有好淫之人多病楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變爲癰漏延綿

歲月竟致廢篤惟剉土草薢三兩或加阜莢牽牛

各一錢水六盃煎三盃分三服不數劑多瘥蓋此

疾始由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久而

水衰肝挾相火來凌脾土土屬溼主肌肉溼熱鬱

蓄于肌腠故發爲癰腫甚則拘攣內經所謂溼氣

害人皮肉筋骨是也土草薢甘淡而平能去脾溼氣

溼去則營衛從而筋脈柔肌肉實而拘攣癰漏愈矣初病服之不效者火盛而溼未鬱也此藥長于去溼不能去熱病久則熱衰氣耗而溼鬱爲多故也時珍曰楊梅瘡古方不載亦無病者近時起于嶺表傳及四方蓋嶺表風土卑炎嵐瘴熏蒸飲啖辛熱男女淫猥溼熱之邪積畜旣深發爲毒瘡遂致互相傳染自南而北遍及海宇然皆淫邪之人病之其類有數種治之則一也其證多屬厥陰陽明二經而兼乎他經邪之所在則先發出如兼少陰太陰則發于咽喉兼太陽少陽則發于頭耳之類蓋相火寄于厥陰肌肉屬於陽明故也醫用輕粉銀朱劫劑五七日卽愈蓋水銀性走而不守加以鹽礬升爲輕粉銀朱其性燥烈善逐痰涎涎乃脾之液此物入胃氣歸陽明故涎被劫隨火上升從喉嚨出故瘡卽乾瘦而愈若服之過劑及用不得法則毒氣竄入經絡筋骨之間莫之能出痰涎旣去血液耗涸筋失所養營衛不從變爲筋骨攣痛發爲癰毒疳漏久則生蟲爲癰手足皴

裂遂成廢瘡惟土茯苓氣平味甘而淡爲陽明本藥能健脾胃去風溼脾胃健則營衛從風溼去則筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月卽愈服輕粉藥筋骨攀痛癱瘓不能動履者服之亦效其方用土茯苓一兩薏苡仁三分氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大盃煎飲一日三服惟忌飲茶及牛羊雞鴛魚內燒酒法麪房勞蓋祕方也

## 附方

新

## 楊梅毒瘡

鄧筆峯雜興

方用冷飯團四兩

阜角子七箇

水煎代茶飲

淺者

二七深者

四七見效

○一方冷飯團一兩

五加皮

一錢用好酒煎

日一服

## 小兒楊梅

瘡起于口內延及遍身

以土草薢末

乳汁調服

月餘自愈

外科發揮

已外科發揮

云服輕粉致傷脾胃氣

筋骨疼痛久而潰爛成癰

連年累月

外科發揮

已外科發揮

云服輕粉致傷脾胃氣

筋骨疼痛久而潰爛成癰

連年累月

## 骨攀癰漏

群

已外科發揮

云服輕粉致傷脾胃氣

筋骨疼痛久而潰爛成癰

連年累月

土茯苓

至于終身成廢疾者土草薢一兩有熱加芩連氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘卽安○朱氏集驗方用過山龍四兩卽硬飯加四物湯一兩阜角子七箇川椒四十九粒燈心七根水煎日飲色白者良忌鐵器發物陸氏積德堂方

# 白芨

本經下品

# 釋名白草

本經

# 白根

別錄

# 兔核

別錄

# 貓兒卵

綱目

# 崑崙

別錄

宗奭

# 集解

別錄

乾弘景曰

近道處處有之

作藤生

根如白芷

赤黑肉白

如芍藥不似

白芷蔓生

枝端有五

破片竹穿

日乾

恭曰根似

天蠶冬一株

下有十許

根皮赤黑肉白

如芍藥不似

白芷蔓生

枝端有五

葉所在有之頌曰今江淮及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同一窠皮黑白肉白一種赤殼花實功用皆同但表裏俱赤

爾

俱赤

**根氣味**苦平無毒

別錄曰甘微寒權曰有毒之才曰代赭爲之使反烏頭

主

**治癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇**

**溫瘡女子陰中腫痛帶下赤白**

本經殺火毒別錄治發

**背癩癰面上炮瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生**

**肌止痛**

大解狼毒時珍

**發明**

弘景曰生取根搗傅癰腫有效頌曰今醫治風及金瘡面藥方多用之往往與白芨相須

用而

附方

舊三  
新十

發背初起

水調白殼末塗之時後方

疔瘡初起

同方

惠方上

聖

一切癰腫

權曰白殼赤小豆蘭草爲末雞子白調塗之○陶隱居方用白

殼二分藜蘆一分爲末酒和貼之日三上

面上酒皺

白殼各半兩爲末雞子白石脂杏仁半分雞屎

清調塗旦洗

面上酒皺

白殼二分杏仁半分雞屎各半兩爲末蜜和雜水拭

面方

肘

面生粉刺

白殼二分爲末蜜和雜水拭

白殼黃蘖等分爲末生

面生粉刺

白殼白芷等分爲末

湯火灼

傷

白殼末傳之

○外臺方

諸物哽咽

白殼水服二錢

白殼白芷等分

白殼半夏泡等分

聖惠方

刺諸哽

及竹木哽在咽中

爲末酒服半錢日二服

白殼半夏泡等分

白殼半夏泡等分

白殼半夏泡等分

白殼半夏泡等分

刺在

肉中方

胎孕不下

白殼生半夏等分爲末滴水

丸梧子大每榆皮湯下五十

丸

保

# 風痺筋急

腫痛屈轉易常處白芨二分熟附子一分爲末每酒服半刀圭

命集

日二服

以身中熱行爲候十日

便覺忌豬肉冷水

千金方

諸瘡不斂

白芨赤蘢

各三錢炒研輕粉

一錢用葱白漿水洗淨傅之

瑞竹堂方

# 女萎

本草李當之

## 集解

恭曰女萎葉似白芨蔓生花白子細荆襄之閒名爲女萎亦名蔓楚用苗不用根與萎蕤

全別今太常謬以爲白頭翁者是也

時珍曰諸家誤以女萎解葳蕤正誤見葳蕤下

## 脩治

敷曰凡采得陰乾去頭并白蕊於槐砧上剉拌豆淋酒蒸之從巳至未出曬乾

氣味

## 辛溫無毒主治

止下痢消食之

當

風寒洒酒霍亂洩

## 痢腸鳴遊氣

上下無常驚癲寒熱百病出汗

當

唐本草

附方

三新

久痢脫肛

女萎切

一升燒熏

蠶下

不止

女萎

雲實各一兩用烏頭二兩桂心五錢爲末

梧子大每服五丸水下一日三服

肘後方

身

體癒瘍

斑駁女葳膏

用魯國女葳白芷各一分附

石磨破和煎入麝香一錢以浮

七合和煎入麝香一錢以浮

日擦之

古今錄驗

赭魁

本經下品

釋名

時珍曰其根如魁乃酒器名

集解

別錄曰生山谷中二月采弘景曰狀如小芋

者如升蔓生草木上葉似杜衡陶所說乃土卵也

土卵不堪藥用梁漢人蒸食之名黃獨非赭魁也

保昇曰苗蔓延生葉似蘿藦根若菝葜皮紫黑肉

黃赤大者輪囷如升小者如拳所在有之時珍曰

大者輪囷如升小者如拳所在有之時珍曰

**赭魁**閩人用之染青甌中云易上色沈括筆談云本草所論赭魁皆未詳審今南中極多膚黑肌赤似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭彼人以染皮製靴閩人謂之餘糧本草石部禹餘糧謂是禹餘糧者非矣禹餘糧乃今之土茯苓可食故得糧名赭魁不可食豈得稱

糧耶土卵卽土芋也見菜部

**根氣味甘平無毒**

恭曰有小毒

**主治心腹積聚除三蟲**

## 鷺抱

宋圖經

本經

**集解**

頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆其根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月采根切片陰乾用

**氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉**

腫痛及解蠻箭藥毒搗末酒服有效亦消風熱結

毒酒摩塗之立愈

蘇頌

伏雞子根

拾遺

釋名承露仙

集解

藏器曰生四明天台山蔓延生葉圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無

毒主治

解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘧瘴

中惡寒熱頭痛疽瘡馬黃牛瘡水磨服之新者尤

佳亦傳癰腫與陳家白藥同功

藏器

附錄仰盆

拾遺藏器曰味辛溫有小毒水磨服少許治蠱飛尸喉痹亦磨傅皮膚惡腫生

東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆狀大如雞卵手腳軟痹並生研服之塗之生嶺南山石閒引蔓而生葉有三桿花紫色與伏雞子同名承露仙而伏雞子葉圓時珍曰以根三兩磨汁或煎濃汁服並解蠱毒

## 千金藤

宋開寶

## 校正

自木部移入此

藏器曰千金藤有數種南北名模不同大畧主療相似或是皆近千金藤也生北地根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒盧閒有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹生冬青亦名千金藤江西林閒有草生葉頭有瘦子似鶴膝葉如柳亦名千金藤又一種似荷葉只大如錢許亦呼爲千金藤又名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴爲名豈俱一物亦狀異而名同耶若取的稱未知孰是又云嶺南有陳思峩亦名千金藤

## 人肝藤

拾遺藏器曰主解諸腫毒遊風

## 氣味

缺

主治一切血毒諸氣

霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫大毒藥

石發癲癇悉主之

藏器

附錄陳思峩

拾遺藏器曰出嶺南山野蔓生如小豆根及葉辛香一名石黃香一名千金藤其根味辛平無毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫

天行壯熱喉痹蠱毒並煮汁服之亦磨塗瘡腫珣

曰味苦平浸酒服治風補益輕身

九仙子

綱目

釋名仙女嬌

集解時珍曰九仙子出均州太和山一根連綴九枚大者如雞子小者如半夏白色二月生苗蔓高六七尺莖細而光葉如烏柏葉而短扁不圓每葉極生子枝或一或二裊裊下垂六七月開碎

青黃色花隨卽結實碎子叢簇如穀精草子狀九月采根

**氣味**苦涼無毒主治

咽痛喉痺散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良

時珍

**山豆根**

宋開寶

**釋名**解毒

綱目

**黃結**

綱目

**中藥**

豆因以爲名

**集解**

頌曰山豆根生劍南及宜州果州山谷今廣西亦有以忠州萬州者爲佳苗蔓如豆葉青

經冬不凋八月采根廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱效

**氣味**甘寒無毒

時珍曰

按沈括筆談云山豆根

味極苦本草言味甘大誤矣

**主**

治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽治人及馬急黃殺小蟲

開寶

含之嚥汁解咽喉腫毒極妙

蘇研頌

末湯服五分治腹脹喘漏酒服三錢治女人血氣  
腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患  
熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗

蜘蛛傷

時珍

附方

舊十  
新三

解中蠱毒

密取山豆根和水研服少許  
未定再服已禁聲者亦愈

五般急黃

山豆根末水服  
若帶蠱氣以酒下

霍亂吐痢

山豆根  
末橘皮

湯下  
三錢

赤白下痢  
山豆根末蜜丸梧子大每服二十

丸空腹白湯下三服自止  
已上

並備  
急方

水蠱腹大  
有聲而皮色黑者山豆根  
末酒服二錢

聖惠方  
卒患腹

痛  
山豆根水研半  
盞服入口卽定

頭風熱痛  
山豆根末油  
調塗兩太陽

頭上白

**屑**山豆根末浸油日塗之

# 牙齦腫痛

山豆根一片含于痛處已上並備急方喉

**中發癰者**

山豆根磨醋噙之追涎卽愈勢重不能言頻以雞翎掃入喉中引涎出就能言語

**永**

類方

**麩豆諸瘡**

煩熱甚者水研山豆根汁服少許

經驗方

**疥癬蟲瘡**

山豆根末臘豬脂

調塗備急方

**喉風急證**

牙關緊閉水穀不下山豆根白藥等分水

煎噙之

下二三口卽愈

楊清叟外科

**黃藥子**

宋開寶

**校正**

自木部移入此

**釋名**木藥子

綱目

**大苦**

綱目

**赤藥**

圖經

**紅藥子**

時珍曰

按沈括筆談

云本草甘草

注引郭璞注爾雅云

大苦者云卽

甘草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖赤有節節有

枝相當此乃黃藥也其味

極苦故曰大苦非甘草也

集解

頌曰黃藥原出嶺南今夔陝州郡及明越秦隴山中亦有之以忠州萬州者爲勝藤生高

三四尺根及莖似小桑十月采根秦州出者謂之紅藥子施州謂之赤藥葉似蕎麥枝梗赤色七月

開白花其根溼時紅赤色曝乾卽黃本經有藥實根云生蜀郡山谷蘇恭云卽藥子也用其核仁疑

此爲不同時珍曰黃藥子今處人栽之其莖高

二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外

褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆搗

其根入染藍甌中云易變色也唐蘇恭言藥實根即藥子宋蘇頌遂以爲黃藥之實然今黃藥冬枯

春生開碎花無實蘇恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘇頌所以言亦未可憑信也

根氣味苦平無毒

大明日涼治馬心肺熱疾

主治諸惡腫瘡瘻

喉癆蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗寶涼血降火

開

## 消癰解毒時

珍

### 發明

頌曰孫思邈千金月令方療忽生癰疾一二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如

輕虛卽是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶口以糠火燒一伏時待酒冷方開時時飲一盃不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消卽停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其效云得之邕州從事張岩峯目擊有效復試其驗如神其方並同惟小有異處是燒酒候香出外瓶頭有津出卽止不待一宿火不可過猛耳

### 附方

舊

### 新三項下癰氣

黃藥子

一斤洗剉酒

一斗浸

之每日早晚常服一盞忌一

切毒物及戒怒仍以線逐日度之乃知其效也

斗門方

吐血不止

藥子一兩

水煎服

聖惠 咯血吐血

百一選方用蒲黃黃藥子等分爲末掌中舐之○王袞博濟方用黃

藥子漢防己各一兩爲末

每服一錢小麥湯食後調服一日二服

鼻衄不止

黃藥子爲

末每服二錢煎淡膠湯下

良久以新水調麪一匙頭服之兵部手集方只以新汲水磨汁一盃頓服

濟眾簡要

產後血運惡物冲心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢

水二盞婦人油釵二隻同煎

一小便俱利血自下也禹講師經驗方

天泡水瘡

黃藥子末搽

之集簡方

解毒子

唐本草

釋名 地不容

唐苦藥子

經圖

集解

恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼爲解毒子也頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而

大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐  
纍纍相連如藥實而圓大采無時又開州興元府  
出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬  
藥用時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一  
切毒川蜀諸處皆有卽解毒子也或云印州苦  
藥子卽黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之

根氣味苦大寒無毒主治解蠱毒止煩熱辟瘴癘  
利喉閉及痰毒唐本治五臟邪氣清肺壓熱蘇頌消痰  
降火利咽喉退目赤時珍

附方新二咽喉腫痛水漿不下苦藥山豆根甘草消石各一分射干柑皮升麻各半兩爲末蜜丸噙  
之聖惠方眉棱骨痛熱毒攻眼頭痛眉痛壯熱不止解毒子木香川芎大黃各三分爲末漿水調膏  
攤貼乾卽易之曾濟方

## 附錄奴會子

海藥珣

曰味辛平無毒主小兒無辜冷疳虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨

劉五娘方用爲煎服生西國諸戎大小如苦藥子

本經曰味辛溫無毒

主邪氣諸癆疼酸續絕傷補骨髓一名連木別錄

蜀郡山谷采無時參曰此藥子也當今盛用

胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血

止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子

肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥子

雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此

則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疏樹子

中國人名藥子去皮取中仁細研服治諸病也

## 白藥子

草唐本

### 集解

恭曰白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似壺蘆蔓六月開白花八月結

子亦名瓜蔞九月葉落枝折采根洗切日乾根皮

黃色名白藥子頌曰今夔施合州江西嶺南亦有

之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之

**根氣味**辛溫無毒

權曰苦冷

**主治**金瘡生肌

唐本

消腫毒

喉痹消痰止嗽治渴并吐血

大明

治喉中熱塞不通

咽中常痛腫

甄權

解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷

乾末傅之能止血痛

馬志

散血降火消痰解毒

時珍

**附方**

舊四新八

天行熱病

白藥爲末漿水

一盞冷調二

盞冷

當利數行

如不

止喫

仰臥少頃

心悶或腹鳴

洗去粗皮焙乾等分

搗篩酒服

蘇頌圖經

咽喉

疔瘻

痛當利

數行

如不

止喫

聖濟錄

錢服仰臥少頃

心悶或腹鳴

洗去粗皮焙乾等分

搗篩酒服

蘇頌圖經

咽喉

洗去粗皮焙乾等分

搗篩酒服

蘇頌圖經

咽喉

白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽牛一半爲

末防風末三兩和匀每茶服一錢

聖惠方

咽喉

### 中熱寒

(腫痛散血消痰白藥朴消等分爲末吹之日四五次直指方)

### 咽喉腫痛

白藥末一兩龍腦一分蜜和丸

芡子大每含嚥一丸

聖惠方 吐血不止 (白藥燒存性糯米丸)

米飲服三錢

聖惠方

### 衄血不止

(紅棗白藥各燒存性等分爲末糯米飲服或煎湯洗鐵罩散用白藥子一兩)

鼻頻頻縮藥令胎熱不安

經驗良方 (鐵罩散用白藥子一兩白芷半兩爲末每服二兩)

錢紫蘇湯下心煩熱入砂糖少許

聖惠方 (白芷半兩爲末每服二兩)

一切疳眼 (赤爛生醫白藥子一兩甘草半兩)

同上

兩爲末豬肝一具批開摻末

五錢煮熟食之 (直指方)

小兒疳瀉 (吐利方)

諸

骨哽咽白藥煎米醋細嚥在上

出在下卽下出 (普濟方)

癰腫不散 (吐利方)

生白

藥根搗貼乾則易之無生者研末水和貼

圖經

### 附錄陳家白藥

(拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必

附錄陳家白藥 (拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必)

吐出未盡更服亦去心胸煩熱天行瘧瘴出蒼梧  
陳家故有陳家之號明山有之蔓及根並似土瓜  
葉如錢根似防己緊小者良人亦采食之與婆羅  
門白藥及赤藥功用並相似時珍曰按劉恂嶺表錄云陳家白藥善解毒諸藥皆不及之救人甚多  
封州康州有種之者廣府每歲充土貢按此藥當時充貢今無復有或有

### 甘家白藥

拾遺藏器曰味大寒有小毒

解諸藥毒水研服卽吐出未盡再吐與陳家白藥功相似二物性冷與霍亂下利人相反出龔州以南生陰處葉似車前根如半夏其汁飲之如蜜因此而名嶺南多毒物亦多解毒物豈天資之乎

### 會州白藥

拾遺藏器曰主金瘡生膚止血

### 衝洞根

碎末傅之出會州葉如白芨  
拾遺藏器曰味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等  
毒出嶺南恩州取根陰乾功用同陳家白藥而苗蔓不相似珣曰苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫主一切毒氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出

也

# 突厥白

宋開寶藏器曰補腰續筋出突厥國味苦主金瘡生血止血

灰諸藥合成就者志曰今所用者出潞州其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷

花似牽牛而紫上有白棱二月八月采根曝乾

# 威靈仙

宋開寶

## 釋名

時珍曰威言其性猛也靈仙言其功神也

## 集解

志曰出商州上洛山及華山并平澤以不聞水聲者良生先于眾草方莖數葉相對冬月

丙丁戊己日采根用恭曰九月末至十二月采根陰乾餘月並不堪采頌曰今陝西及河東河北汴東江湖州郡皆有之初生作蔓莖如釵股七月內生花六出淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密多鬚似穀每年朽敗九月采根時珍曰其根每年旁引深轉茂一根叢

鬚數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑俗稱鐵腳威靈仙以此別有數種根鬚一樣但色或黃或白皆不可用

### 根氣味苦溫無毒

元素曰味甘純陽入太陽經

冥味微辛鹹不苦忌茗麴湯主治諸風宣通五臟去腹內冷滯心

膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼療折傷久服無有溫疫瘧

開寶

推新舊積滯消

### 胸中痰唾散皮膚大腸風邪

李果

### 發明

頌曰唐貞元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云威靈仙去眾風通十二經脈朝服暮效疏

宣五臟冷膾宿水變病微利不瀉人服此四肢健手足微煖並得清涼先時商州有人病手足不輕

遂不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之道旁以求救者遇一年新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊不知之遂傳其事此藥治丈夫婦人中風不語手足不遂口眼喎斜言語蹇滯筋骨節風遶臍風胎風頭風暗風心風風狂大風皮膚風癢白癩風熱毒風瘡頭旋目眩手足頑痹腰膝疼痛久立不得曾經損墜臂腰痛腎臟風壅傷寒瘴氣憎寒壯熱頭風痛流涕黃疸黑疸頭面浮腫腹內宿滯心頭痰水小腸秘服此立通氣病痔瘻瘻成膿陰汗盜汗大氣急坐臥不安氣衝眼赤攻衝脾胃諸氣痰熱欬嗽茶滓膀胱宿膿口中涎水冷熱氣壅肚腹脹滿好喫茶皆治之其法采得根陰乾月餘搗末溫酒調一錢行則減之病除乃停服其性殺藥可加及六錢利過兩七空腹服之如人本性殺藥可加及六錢利過兩

茶及麪湯以甘草卮子代飲可也又以一味洗焙爲末以好酒和令微溼入在竹筒內緊塞九蒸十九曝如乾添酒洒之以白蜜和丸梧子大每服二十九至三十丸溫酒下崔元亮海上集驗方著其詳如此恭曰腰腎腳膝積聚腸內諸冷病積年不瘥者如服之無不立效宗奭曰其性快多服疏人五臟真者皆宜服之尤效其性好走亦可橫行故崔元亮氣震亨曰威靈仙屬木治痛風之要藥也在上下言其去眾風通十二經脈朝服暮效凡采得聞流水聲者知其性好走也須不聞水聲者乃佳時珍曰威靈仙氣溫味微辛鹹辛泄氣鹹泄水故風久溼珍痰飲之病氣壯者服之有捷效其性大抵疏利久溼珍服恐損真氣氣弱者亦不可服之

## 附方

舊十四新十六

## 腳氣入腹

脹悶喘急用威靈仙末

服二錢酒下痛減一分

## 腰腳諸痛

千金方用威靈仙末空心服一錢逐日以微利

藥

亦減一分

## 腰腳諸痛

溫酒服一錢逐日以微利

大便方

亦減一分

爲度○經驗方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸梧子大以浸藥酒每服二十丸腎臟風壅腰膝沈重威靈仙末蜜丸梧子大溫酒

是風毒積滯如未利再服一百丸取下後食粥補之一月仍常服溫補藥孫兆方名放杖丸

集驗

筋骨毒痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者

威靈仙三斤水酒十瓶封煮一炷香出

火毒逐日飲之以破傷風病威靈仙半兩獨頭蒜

愈爲度集簡方一箇香油一錢同搗

燭熱酒衝服汗出卽

手足麻痺時發疼痛或打撲

癱瘓等證威靈仙炒五兩生川烏頭五靈脂各四兩

兩爲末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下忌

兩生韭根二茶

濟方男婦氣痛不拘久近威靈仙五兩生韭根二茶

普個灰火烟一宿五更視雞子殼軟爲度去滓溫服

以乾物壓之側睡向塊邊渣再煎次日服覺塊刺

痛是其驗也

## 噎塞膈氣

威靈仙一把醋蜜各半盃煎五分服之

吐出宿痰愈

膈玄方

## 停痰宿飲

喘咳嘔逆全不入食

威靈仙焙

經駁方

## 下痰宿飲

咳嗽嘔逆全不入食

威靈仙焙

熬膏丸

綠豆大每服七丸至十丸

薑汁浸焙爲末用牛角水

湯下一日三服

一月爲驗忌茶麵

## 腹中痞積

威靈仙末

仙楂桃兒各一兩爲末

每溫普濟茶各二錢

酒服三錢名化鐵丸

普濟大腸冷積蜜丸梧子

大酒服三錢名化鐵丸

普濟大腸冷積蜜丸梧子

至二十丸

經驗良方

## 腸風瀉血

久者威靈仙雞冠花各二

雨米醋二升煮乾炒爲末

以雞子白和作小餅

炙乾再研每服二錢陳米飲下

日二服

生薑湯下十九丸

聖濟

瘡腫痛後洗冷再溫之

外科精義

## 諸骨哽咽

威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞

水二錘煎

一鍾溫服○乾坤生意用威靈仙米醋浸二日曬

研末醋糊丸梧子大每服二三丸半茶半湯下如

欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐○聖

藥

濟錄治雞鷺骨哽赤莖威靈仙五錢  
井華水煎服卽軟如綿吞下也甚效 飛絲纏陰腫

欲斷以威靈仙搗汁浸洗一  
人病此得效 李樓怪證方 痘瘡黑陷 鐵腳威靈

錢腦子一分溫水調服取下瘡  
癩爲效意同百祥丸 儒門事親

茜草

本經上品

校正

併入有名未用別錄苗根

釋名蒨

音茜

茅蒐

音搜

茹蘆

音如閻

地血

別錄

染緋草

蜀本

血

見愁

宿土

風車草

宿土

過山龍

補遺

牛蔓

時珍曰

接陸佃

云許氏說文言

居本草

蒐乃人血所化則草鬼爲蒐以

此也

東方有而少不如西方多則西草爲茜又以此

也

陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛

者爲蒨牽別爲茹連覆爲蘆則蒨茹蘆之名又取

此義也人血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本

草云四補草其根茜草也一名西天王草一名四

岳近陽草一名鐵塔草風車兒草藏器曰有名未用苗根卽茜根也茜苗二字相似傳寫之誤爾宜之併

集解

別錄曰茜根生喬山山谷二月三月采根曝乾又曰苗根生山陰谷中蔓草木上莖有刺

實如椒弘

景曰此卽今染絳茜草也東閒諸處乃有而少不如西多詩云茹蘆在阪者是也保昇曰

染絳草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱濶四五葉對

生節閒蔓延草木上根紫赤色所在皆有八月采

須曰今圃人亦作畦種蒔故史記云干畝卮其

人與千戶侯等言其利厚也蒔珍曰茜草十二月

生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一

節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀面青背綠七八

月開花結實如小

椒大中有細子

根脩治

穀曰凡使用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鉛鐵器勿用赤柳草根眞相似只是味酸

澹誤服令人患內障眼速  
服甘草水止之卽毒氣散

**氣味**苦寒無毒

權曰甘大明日

酸入藥炒用震亨曰熱元素曰微酸鹹溫陰中之  
陰別錄曰苗根鹹平無毒之才曰畏鼠姑汁制雄

**黃**

**主治**寒溼風痹黃疸補中

本經止血內崩下血膀胱

胱不足踴跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳又

苗根主痹及熱中傷跌折

別錄

治六極傷心肺吐血

**瀉血**

甄權

止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲

損淤血泄精痔瘻瘍排膿酒煎服

大明通經脈治

**骨節風痛活血行血**

時珍

**發明**

藏器曰茜草主蠱毒煮汁服周禮庶民掌除蟲毒以嘉草攻之嘉草者蘘荷與茜也主蠱

爲最震亨曰俗人治痛風用草藥取速效如石絲爲君過山龍等佐之皆性熱而燥不能養陰卻能燥溼病之淺者溼痰得燥而開淤血得熱而行故亦暫效若病深而血少者則愈劫愈虛而病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手足厥陰血分之藥也專于行血活血俗方用治女子經水不通以一兩煎酒服之一日卽通甚效名醫別錄水言其久服益精氣輕身曰華子言

## 附方

舊三

## 吐血不定

茜根一兩搗末每服二錢水煎冷服亦可水和二錢服

周應簡要

新八

## 吐血燥渴

及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分爲末并水丸彈丸

濟眾方

大溫水化服

## 鼻血不止

茜根艾葉各一兩烏梅肉二錢半爲末煉蜜丸梧子大烏梅湯

蜜丸

五十丸

本事方

## 五旬行經

婦人五十後經水不止者作敗

血論用茜根一名過山龍薑一兩阿膠側柏葉炙黃芩各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作

六帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之

唐瑤經驗方女子經閉方見前心發明

癥心煩內熱茜根煮汁服

傷寒類要解中蠱毒吐下血如豬肝茜草根襄荷葉

各三分水四升煮二升服卽愈自當呼蠱主姓名也

陳延之小品方

黑蠆烏髮茜草

一斤生地黃三斤取汁以水五大盞煎茜絞汁將滓再煎三度以汁同地黃汁微火煎如膏以瓶盛

之每日空心溫酒服半匙一月蠆

聖濟錄 蠕蛄漏瘡茜根

髮如漆也忌蘿蔔五辛千年石灰等分爲末油調傅之

儒門事親方脫肛不收茜根石榴皮各一握酒一盞煎

七分溫服

預解瘡疹時行瘡疹正發服此則可無

聖惠方患茜根煎汁入少酒飲之

奇效良方

**附錄血藤**

宋圖經頌曰生信州葉如葵蘭葉根如大拇指其色黃彼人五月采用攻血治

氣塊

時珍曰按虞搏云血藤卽過山龍理亦相近未知的否姑附之

**翦草**

華日

**集解**

藏器曰翦草生山澤閒葉如茗而細江東用之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰

按許叔微本事方言翦草狀如茜草又如細辛婺台二州皆有之惟婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云卽茜草也未有的據

**根氣味苦涼無毒**

頌曰主治諸惡瘡疥癬風癩瘻平

**蝕有蟲浸酒服**

大主一切失血時明

**發明**

元素曰上部血須用翦草牡丹皮天蠶冬麥贊冬時珍曰許學士本事方去翦草治勞瘵

吐血損肺及血妄行名曰神傳膏其法每用一斤淨洗曬爲末入生蜜二斤和爲膏以器盛之不得犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每服一匙可也有一貴婦病療得此方九日藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥屋上土墜器中不可用再合成就將服爲籍覆器又不得食再合未就而夫人卒矣此藥之異有如此若小小血妄行只一啜而愈也此藥絕妙若此而世失傳惜哉

附方

新

風蟲牙痛

翦草

細辛

藁本

等分煎水

熱漱少頃白止

中藏經

風瘡

癩瘻

滑肌散治風邪客于肌中渾身癩瘻致生瘡

疥及脾肺

風毒攻衝

生瘡乾溼

日久不瘥用

翦草七兩

不見火輕粉

一錢爲末

翦草七兩不見火輕粉

和劑局方

防己

本經中品

釋名

解離

本經

石解

時珍曰

按東垣李杲云防己如

險健之人幸災樂禍能首爲亂

階若善用之亦可禦敵其名

或取此義解離因其紋解也

集解

別錄曰

防己生漢中川谷

二月八月采根

桔梗內有黑紋如車輻解者良

弘景曰今出白內黃如陰

建平大而青白色虛軟者好黑點木

食亦須之

頌曰今黔中亦有之但漢中出者破之

文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛

折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青牛

白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防己

恭言木防己不任用而古方張仲景治傷寒有增蘇

減木防己湯及防己地黃湯五物防己湯黃芪六

物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防己

湯藏器曰如陶所說漢木二防己卽是根苗爲名

木防己不任用而古方張仲景治傷寒有增蘇

減木防己湯及防己地黃湯五物防己湯黃芪六

物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防己

湯藏器曰如陶所說漢木二防己卽是根苗爲名

木防己不任用而古方張仲景治傷寒有增蘇

減木防己湯及防己地黃湯五物防己湯黃芪六

物等湯孫思邈治遺尿小便澀亦有三物木防己

湯藏器曰如陶所說漢木二防己卽是根苗爲名

本草綱目 卷二十一  
脩治

數曰凡使勿用木條色黃腥皮皺上有丁足

子不堪用惟要心有花文黃色者細剉以車前草根相對蒸半日曬乾取用時

珍曰今人多去皮剉酒洗曬乾用

別錄曰苦溫普曰神農辛黃帝岐伯桐君苦無毒李當之大寒權曰

苦有小毒元素曰大苦辛寒陰也泄也之才曰殷孽爲之使殺雄黃毒惡細辛畏草薢女菀鹹伏

消石主治風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利大小便

本經療

水腫風腫去膀胱熱傷寒熱邪氣中風手腳攣急

通腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸癰疥癬蟲瘡

別錄治溼風口面喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽

甄權治中下溼熱腫洩腳氣行十二經元木防己主

治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘧風

水腫去膀胱熱

權甄

發明

弘景曰防己是療風水要藥藏器曰治風用木防己治水用漢防己元素曰去下焦溼腫

及痛并泄膀胱火邪必用漢防己草龍膽爲君黃草知母甘草佐之防己乃太陽本經藥也杲曰本草十劑云通可去滯通草防己之屬是也夫防己苦寒能瀉血中溼熱通其滯塞亦能瀉大便補陰瀉陽助秋冬瀉春夏之藥也比之於人則險健陰突險此瞑眩之藥也故聖人存而不廢大抵補其臭則可惡下咽則令人身心煩亂飲食減少抵于十二經有溼熱壅塞不通及下注腳氣除膀胱而補之者若夫飲食勞倦陰虛生內熱元氣穀食無胱至聞敵而已虧以防己泄大便則重亡其血此不可用一也

本草綱目草部 卷之十一  
如人大渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜滲泄而  
防己乃下焦血分藥此不可用二也外傷風寒邪  
氣病禁用血藥此不可用三也大抵上焦溼熱者  
皆不可用下焦溼熱流入十二經

### 附方

舊三

### 皮水附腫

按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢聶聶動者防己茯苓湯主之

新九

### 防己

黃芪桂枝各三兩

甘草三兩

每服一兩水一升煎半升服日二服

張仲景

汗出身重脈浮

防己黃芪湯主之

防己一兩黃芪二兩

生薑二錢半白朮七錢

方

### 風水惡風

己一兩

黃芪二兩

半炙甘草半兩

剉散每服五錢

生薑四片棗一枚

水一盞半煎八分

溫服良久再服

腹痛加芍藥

水

炎

甘草半兩

剉散每服五錢

生薑四片棗一枚

方

### 風溼相搏

關節沈痛微腫

惡風方同上

小便淋濇

三物木

水

防己湯

其人

用木

防己

防風

葵子各二兩

咬咀水

膈閒支飲

人

千金方

其人

喘

滿心下痞堅面黧黑其脈沈緊得之數十日醫

吐

下之不愈木防己湯主之虛者卽愈實者三日

復

與之不愈去石膏加三錢芒消主之用木防己

三兩

人參四兩桂枝二兩石膏雞子大一枚以水

六升

煮二升分張仲景方

傷寒喘急

防己人參等分爲末桑

服

白湯服二錢不拘老小

肺痿

喘嗽漢防己末二錢漿水一蓋

者

漢防己芩等分爲末糯

米飲

每服一錢古今錄驗

鼻衄

不止生防己末

二錢

仍以少許聖惠方

霍亂

利防己白芷等分爲末新汲水服

二錢

仍以少許聖惠方

吐利

防己白芷等分爲末新汲水服

目睛

暴痛防己酒浸三次爲末每一

解雄黃毒

防己煎水服二錢

服之

煎汁

實主治脫肛焙研煎飲代茶

後

通草

本經中品

釋名

木通

士

附支

本

萬年藤

普

甄

子

名燕蘆

權

時珍曰有細孔兩頭皆通故名通草卽今所謂木通也今之通草乃古之通脫木也宋本草混注爲一名實相亂今分出

集解

別錄

采枝陰

乾

弘景曰

今出近道遼

樹藤生

汁白

莖有細孔兩頭皆通含

一頭吹之則氣出彼頭者

良或云卽蓄藤莖也

恭曰此物大者徑三寸每節

有二三枝枝頭有五葉子長三四寸核黑

瓢白食

之甘美

南人謂爲燕蘆

子或名烏蘆

子遇七八月

采之

贓器曰江東人呼爲畜蓄

子江西人呼爲擎

子如算袋瓢

黃子黑食之去皮

蘇云色白者乃猴

蓄也領曰今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之

藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗類

石韋又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜食之甘美卽陳士良本草所謂檉子也其枝今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也古方所用通草皆今之木通其通脫木稀有用者或以木通爲蒲萄苗者非矣按張氏燕吳行紀載揚州甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉子垂梢際如苦棟與今所說不同或別一物也時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

## 氣味辛平無毒

別錄曰甘權曰微寒普曰神農黃帝辛雷公苦果曰味甘而淡氣平

令人不忘去惡蟲本經療脾疸常欲眠心煩噦出音聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒陽中陰也主治除脾胃寒熱通利九竅血脈關節味薄降也

折鼈鼻瘻肉墮胎去三蟲別錄治五淋利小便開闢

格治人多睡主水腫浮大

甄權

利諸經脈寒熱不通

之氣孟詵

理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并

葱飲有效

土良

安心除煩止渴退熱明耳目治鼻塞

通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止痛催生

下胞女人血閉月候不匀天行時疾頭痛目眩羸

劣乳結及下乳

大明

利大小便令人心寬下氣

藏器

主

諸瘻瘍喉痹咽痛濃煎含嚥珣通經利竅導小腸

火呆

# 發明

某曰本草十劑通可去滯通草防己之屬是  
大便通草甘淡能助西方秋氣下降利小便專瀉  
氣滯也肺受熱邪津液氣化之原絕則寒水斷流  
膀胱受溼熱癃閉約縮小便不通宜此治之其症  
胸中煩熱口燥舌乾咽乾大渴引飲小便淋瀝或  
閉塞不通脛痙腳熱並宜通草主之凡氣味與之類  
同者茯苓澤瀉燈草豬苓琥珀瞿麥車前子之類皆  
可以滲溼利小便泄其滯氣也又曰木通下行為  
泄小腸火利小便與琥珀同功無他藥可比時珍行  
曰木通手厥陰心包絡手足太陽小腸膀胱之藥  
利小便通大腸治遍身拘痛利九竅下能泄溼熱  
及利小便治淋之功甄權曰華子輩始發揚之蓋  
其能泄丙丁之火則肺不受邪能通水道水源既  
清則津液自化而諸經之溼與熱皆由小便泄去旣  
故古方導赤散用之亦瀉南補北扶西抑東之意  
楊仁齋直指方言人遍身胸腹隱熱疼痛拘急足意

冷皆是伏熱傷血血屬于心宜  
木通以通心竅則經絡流行也

附方

舊二新

一心熱尿赤

面赤唇乾咬牙口渴導赤散用木通生地黃炙甘草等分

入水煎服竹葉七片水

婦人血氣

木通濃煎三五盞飲錢氏方

金瘡跋折

通釀酒日飲草煮汁

鼠瘻不消

方同

根主治項下瘦瘤

甄權

子氣味甘寒無毒

說曰平南人多食之北人不知其功

主治厚腸胃

令人能食下三焦惡氣續五臟斷絕氣使語聲足氣通十二經脈和核食之

說除孟除三焦客熱胃口熱

閉悶不下食

良時

通脫木象

法

釋名

通草

音綱目

活蕶

音

離南

頌曰爾雅離南活蕶卽

又名倚商

枲曰陰竅濤

而不利水腫閉

而不行用

之立通因有通草之名

與木通同功

嘉謨曰白蘿

中藏脫木得

故名通脫

集解

藏器曰

通脫木生山側葉似朶麻其莖空心

中有白蘿輕白可愛

女人取以飭物俗名通

草頌曰郭璞言生江

南高丈許大葉似荷而肥莖

中蘿正白今園圃亦有種蒔者或作蜜煎充果食

氣味甘淡寒無毒

枲曰甘平降

也陽中陰也

主治

利陰竅治五

淋除水腫癃閉瀉肺

李解諸毒蟲痛

蘇明目退熱

李解諸毒蟲痛

蘇明目退熱

李解諸毒蟲痛

蘇明目退熱

李解諸毒蟲痛

蘇明目退熱

本草綱目 卷一百一十一  
下乳催生

機 汪

發明

杲曰通草瀉肺利小便甘平以緩陰血也與燈草同功宜生用之時珍曰通草色白而氣

寒味淡而體輕故入太陰肺經引熱下降而利小便入陽明胃經通氣上達而下乳汁其氣寒降也

其味淡

升也

附方

新

洗頭風痛

新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙關緊者幹口灌之

王璆百  
一選方

花上粉

主治諸蟲瘻惡瘡痔疾納之

藏器

療瘰癧及

胸中伏氣攻咽

蘇頌

附錄天壽根

圖經頌曰出台州每歲土貢其性涼治胸膈煩熱土人常用有效

釣藤

別錄下品

校正

自木部移入此

釋名

弘景曰出建平亦作弔藤療小兒不入餘方時珍曰其刺曲如釣鈎故名或作弔從簡耳

集解

恭曰釣藤出梁州葉細長其莖閒有刺若釣鈎頌曰今秦中興元府有之三月采宗奭曰

湖南

湖北江南江西山中皆有之藤長八九尺或

一二丈大如拇指

其中空小人用致酒甕中盜取

酒以氣吸之涓涓不斷

時珍曰狀如蒲萄藤而有

釣紫色古方多用皮後世多用釣取其力銳爾

氣味甘微寒無毒

保昇曰苦權曰甘平時珍曰初微甘後微苦平

主治

小兒寒熱十二驚癇

別錄

小兒驚啼癲癇熱壅

客忤胎風

甄權

大人頭旋目眩平肝風除心熱小兒

內釣腹痛發斑疹

時珍

**發明**

時珍曰釣藤手足厥陰藥也足厥陰主風手通心包于肝木風靜火息則諸證自除或云入數寸于小麥中蒸熟喂馬易肥

**附方**

新聖濟錄厥陰主火驚癇眩運皆肝風相火之病釣藤分爲散每服半錢溫水服日三

**服名**

延齡散釣藤一兩消石半兩甘草炙一夜三度○卒得癆疾

合煎二合每服棗許日五

聖惠方斑疹不快

釣藤鈎子紫草茸等分爲末每服一字或半錢溫酒服

錢氏

方

**附錄倒掛藤**

拾遺藏器曰味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛血上欲死煮汁服

之生深山有逆刺如懸鉤倒掛于樹葉尖而長

**黃藤**

目綱

**集解**

時珍曰黃藤生嶺南狀若防己俚人常服此藤縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史云甚

有  
效

**氣味**甘苦平無毒主治飲食中毒利小便煮汁頻

**服卽解**

時珍

**白蕘藿**

本經上品

**釋名**白葛

普

**集解**

別錄曰生交州山谷弘景曰此藥解毒莫之與敵而人不復用不聞識者恭曰荆襄山谷

今有之蔓生山南人謂之白葛苗似蘿摩葉圓厚

莖有白毛與眾草異用藿療毒有效而交廣又有

白花藤亦解毒用根不用苗保昇曰蔓生葉圓若

尊今襄州北汝州南岡上有五月六月采苗日乾

**氣味**苦平無毒主治蛇虺蜂蠍猘狗菜肉蠱毒鬼

疰風症諸大毒不可入口者皆消除之又去血可

末著痛上立清毒入腹者煮汁飲卽解

本經

風邪熱

極煮汁飲搗傅諸毒妙

李珣

## 白花藤

唐本草

**集解**

恭曰

生嶺南交州廣州平澤苗似野葛葉似

女貞莖葉俱無毛而白花其根似葛而骨柔

皮厚肉白大療毒用根不用苗保昇曰蔓生白花

葉有細毛根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋

敷

曰凡使勿用菜花藤真相似只是味酸

滷白花藤味甘采得去根細剉陰乾用

**氣味**

**苦寒無毒**

**主治**

**解諸藥菜肉中**

**毒漬酒主虛**

# 勞風熱

唐本

## 發明

時珍曰蘇言用根雷言用苗都可用爾按葛洪肘後方云席辨刺史在嶺南日久言俚人

皆因飲食入毒多不卽覺漸不能食或心中漸脹先寒似瘴急含白銀一宿變色者卽是也銀青是

藍藥銀黃赤是菌藥菌音混草名也但取白花藤四兩出嵩州者爲上不得取近野葛生者洗切同

乾藍實四兩水七升煮取半空腹頓服少悶勿怪其毒卽解

## 白英

本經上品

## 校正

併入別錄鬼目

## 釋名

穀菜別錄

## 白草

同上

## 白幕

拾遺

## 排風

同上

## 子名鬼目

時珍曰

白英謂其花色穀菜象其葉文排風言其功用鬼目象其子形別錄有名未用復出鬼目雖苗子

不同實一物也故併之

本草綱目 卷一百一十一  
集解

別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰鬼目一名來甘實赤如五

味十月采弘景曰鬼目俗人呼爲白草子是矣又曰白英方藥不復用此有斛菜花益州乃有苦菜土人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五樞實圓若龍葵子生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾雅名芍郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳璫珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極解熱毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫皓時有鬼目菜緣棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之卽此物也又羊蹄草一名鬼目嶺南有木果亦名鬼目葉似楮子大如鴨子七八月熟黃色味酸可食皆與此同名異物也

根苗氣味甘寒無毒

主治寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年

本經

葉作羹飲甚療勞

弘景

煩熱風癱丹毒瘴瘧寒熱小

兒結熱煮汁飲之

藏器

鬼目

子也

氣味酸平無毒主治

明目

別錄

附方

新

目赤頭旋

眼花面腫風熱上攻

用排風子

焙甘草炙菊花焙各一兩爲末

每服二錢臥時溫水下

聖濟錄

蘿摩

唐本草

校正

研入拾遺合子

釋名

翟音

芄蘭

詩疏

白環藤

拾

實名雀瓢

陸機

研合子

拾遺

羊婆嫋

綱目

婆婆鍼線包

藏器

曰漢高帝用子傅

軍士金瘡故名研合子

時珍曰白環卽莢字之訛也其實嫩時有漿裂時  
如瓢故有雀瓢羊婆嫋之稱其中一子有一條白  
線包又名婆婆鍼袋兒也

### 集解

弘景曰蘿藦作藤生摘之有白乳汁人家多  
種之葉厚而大可生啖亦蒸煮食之謠云去  
家千里勿食蘿藦枸杞言其補益精氣强盛陰道  
與枸杞葉同也恭曰按陸機詩疏云蘿藦一名莢  
蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢是女青別名也蘿藦葉  
似女青故亦名雀瓢女青葉似蘿藦兩葉相對子  
似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇莖葉並臭  
生平澤別錄云葉嫩時似蘿藦圓端大莖實黑藏  
器曰蘿藦東人呼爲白環藤生籬落閒折之有白  
汁一名雀瓢其女青終非白環二物相似不能分  
別又曰研合子作藤生蔓延籬落閒至秋霜合子  
如柳絮一名雞腸一名薰桑時珍曰研合子卽蘿  
藦子也三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟  
其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如

構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二  
三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及  
漿霜後枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子商人  
取其絨作坐褥代綿云甚輕暖詩云芄蘭之支童  
子佩觿芄蘭之葉童子佩觿音解角錐也此  
物實尖垂于支閒似之蝶音涉張弓指彊也此  
葉後彎似之故以比興也一種莖葉及花皆似蘿  
摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此  
則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二物相似  
者也蘇恭言其根似白薇子似瓢形則誤矣當從  
陳說此乃藤生女青與蛇銜根  
之女青名同物異宜互攷之

子

葉

氣味甘辛溫無毒

時珍曰  
甘微辛

主治虛勞補益精氣強陰道葉煮食功同子唐擣  
子傅金瘡生膚止血搗葉傅腫毒器取汁傅丹毒  
藏

赤腫及蛇蟲毒卽消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二

三度能爛絲毒卽化作膿也

時珍

**附方**

新二

補益虛損

極益房勞用蘿摩

四兩

枸杞根

皮五味子柏子仁

酸棗仁乾地

黃各三兩爲末

每服方寸

匕酒下日三服

千金方

損傷血出

痛不可忍用

離上婆婆鍼

黃各三兩爲末

每服方寸

匕酒下日三服

千金方

損傷血出

離上婆婆鍼

**瘡口立效**

袖珍

**赤地利**

唐本草

**校正**

併入拾遺

五毒草

**釋名赤薜荔**

綱目五毒草

拾遺

五叢

拾遺

蛇藴

拾遺

山蕎麥

拾遺

山蕎麥

圖經時珍

並未詳

**集解**

恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿摩根皮赤黑肉黃赤二月八月采根日乾頌曰所在皆

有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色根若拔契皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾收藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似狗脊亦名蛇蕘名同物異時珍曰五毒草卽赤地利今併爲一

根脩治

數曰凡采得細剉用藍葉并根同入生絹袋盛之蒸一伏時去藍曬用

氣味苦平無毒

藏器曰酸平伏丹砂

主治赤白冷熱諸痢斷

血破血帶下赤白生肌肉

唐本

主癰疽惡瘡毒腫赤

白游癰蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅之亦擣莖葉傅之

恐毒入腹煮汁飲

器藏

發明

時珍曰唐張文仲備急方治青赤黃白等痢鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可

矣知

附方

舊二

小兒熱瘡

身面皆有如火燒者赤地利末粉之

火瘡滅瘢

赤地利末油調塗

利末

油調塗聖惠

紫葛

唐本草

集解

恭曰生山谷中苗似蒲萄長丈許根紫色大者徑二三寸保昇曰所在皆有今出雍州葉似蘡薁其根皮肉俱紫色三八月采根皮日乾

明曰紫葛有二種此是藤生者頌曰今惟江甯府及台州生之春生冬

枯似蒲萄而紫色

根皮氣味甘苦寒無毒

大明曰苦滑冷燒灰制消石

主治癰腫

惡瘡擣末醋和封之

恭主癰緩攀急并熱毒風通

小腸大生肌散血

時

附方

舊二

產後煩渴

血氣上衝也

紫葛二兩水

二升煎一升去滓呷之

金瘡

傷損

生肌破血用紫葛二兩順

流水三蓋煎

一蓋半分三服酒煎亦妙

並經驗力

烏蔹莓

草唐本

釋名

五葉莓

弘景

龍草

同拔爾

龍葛

同

赤葛

綱目

五爪

龍

同

赤潑藤

時珍曰

五葉如白蔹故曰烏蔹俗名

五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍

曰葛並取蔓形赤潑

與赤葛及拔音相近

集解

弘景曰

五葉莓生籬援閒作藤擣根傅癰癧

有效

恭曰

蔓生平澤葉似白蔹

四月五月采

之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采

苗用時珍曰

壅莖間甚多其藤柔而有棱一枝一

時珍曰

葛並取蔓形赤潑

與赤葛及拔音相近

時珍曰

五葉如白蔹故曰烏蔹俗名

五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍

曰葛並取蔓形赤潑

與赤葛及拔音相近

時珍曰

蔓生平澤葉似白蔹

四月五月采

之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采

苗用時珍曰

壅莖間甚多其藤柔而有棱一枝一

時珍曰

葛並取蔓形赤潑

與赤葛及拔音相近

時珍曰

蔓生平澤葉似白蔹

鬚凡五葉葉長而光有疎齒面青背淡七八月結苞成簇青白色花大如粟黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺擣之多涎滑傳滋醫學集成謂卽紫葛楊起簡便方謂卽老鴉眼睛草

斗門方

謂卽何首烏並誤矣

### 氣味酸苦寒無毒

主治癰癧瘡腫蟲咬擣根傳之景弘風毒熱腫游丹擣傅并飲汁蘇恭涼血解毒利小便根擂酒服消癰腫神效時珍

附方

新五小便尿血

錢白湯下

衛生易簡方

喉痹

腫痛

五爪龍草車前草馬蘭菊各一握

徐祖傳方也

醫學正傳項下熱腫

俗名蝦蟆瘧五葉藤

擣傅之丹溪纂要

一切腫毒

發背乳癰便毒惡瘡初起者並用五

葉藤或根一握生薑

一塊擣爛入好酒一盃絞汁

熱服取汗以渣傅之卽散

一用大蒜代薑亦可

壽域神方

跌撲損傷

五爪龍擣汁和童尿熱酒服之取汗

簡便方

## 葎草

唐本草

## 校正

併入有名未用勒草

釋名勒草

別錄葛勒蔓

蜀圖

來莓草

別本時珍曰此草莖有細刺善

## 集解

恭曰葎草生故墟道旁

人膚故名勒草訛爲葎草又訛爲來

勒草卽此今併爲一

勒人膚故名勒草訛爲葎草又訛爲來

勒皆方音也別錄勒草卽此今併爲一

蔓生有細刺亦名葛葎蔓古方亦時用之保

昇曰野處多有之葉似大麻花黃白色子若大麻

子俗名葛勒蔓夏采莖葉曝乾用別錄曰勒草生

山谷如栝樓時珍曰二月生苗莖有細刺葉對節生一葉五尖微似蕷麻而有細齒八九月開細紫

花成簇結子  
狀如黃麻子

氣味甘苦寒無毒主治勒草主瘀血止精益盛氣  
別錄葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁

或生擣汁服

蘇恭

生汁一合服治傷寒汗後虛熱

宗奭

療膏淋久痢疥癩

蘇頌

潤三焦消五穀益五臟除九

蟲辟溫疫傳蛇蠍傷

珍時

附方

舊三新六

小便石淋

葛

葎草掘出根

挽斷以盃于坎

中承取汁服

一升石當出不

出更服○

范汪方 小便膏淋

葎草

擣生汁三升

酢二合

合和頓服當尿下白汁

尿

血淋瀝

同上產婦汗血

污衣赤色

方同上

久痢成疳

葛勒蔓未以管

吹入肛門中不

新久瘧疾

用葛葎草一握一名勒

過數次如神

蔓去兩頭秋

冬用乾者

恒山末等分以淡漿水二大盞浸藥星月

下露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈

遍體癩瘡

瘡

葎草一擔以水二石煮取一石漬

之不過三作愈並韋亩獨行方

烏癩風瘡葛葎草

草三秤切洗益母草一秤切

以水二石五斗煮取

一石五斗去滓入瓮中浸浴一時方出坐密室中

又暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令見風明日又

浴如浴時瘙癢不可忍切勿搔動少頃漸定後隔

三日一作以愈爲度

聖濟錄

羊桃

本經

釋名鬼桃

本經羊腸同蕤楚

爾姚弋或細子

並未詳

集解

別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采陰乾引景曰山野多有甚似家桃又非山桃花

甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有蕘楚卽此方藥不復用

保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱

不能爲樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼爲細

子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃其花白色子

如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤

色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以爲汲灌

重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰

中脫之可韜筆管也時珍曰羊桃莖大如指似樹

而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下

白有毛狀似芒麻而團其條浸水有涎滑

莖根氣味

苦寒有毒

藏器曰甘無毒

主治熛熱身暴赤色

除小兒熱風水積聚惡瘍

本經

去五臟五水大腹利

小便益氣可作浴湯

別錄煮汁洗風癩及諸瘡腫極

效恭蘇根浸酒服治風熱羸老

藏器

附方

舊一  
新三

傷寒變蠶

四肢煩疼不食多睡羊桃十斤擣熟浸熱湯三斗日正午

時入坐一炊久不傷寒毒攻

手足腫痛羊桃煮汁千金入少鹽漬之

水氣鼓脹

各半斤剉水一斗煮五升熬如稀餳每

空心茶服一匙二便利

食粥補之聖惠方蜘蛛咬毒立愈

絡石

本經上品

釋名石鯀

吳普作鯀石

石龍藤

別錄

懸石

同

耐冬

蘇

雲花

吳雲英

吳普雲丹

吳普

石血

蘇

雲珠

別錄

又名畧石

石領

俗名耐冬以其包絡石木而生故名絡石

山南人謂之石血療產後血結大良也

集解

別錄曰絡石生太山川谷或石山之陰或高  
山巖石上或生人閒五月采弘景曰不識此

藥方法無用者或云是石類旣生人間則非石猶  
如石斛繫石爲名耳恭曰此物生陰溼處冬夏常

青實黑而圓其莖蔓延遶樹石側若在石閒者葉  
細厚而圓短遶樹生者葉大而薄人家亦種之爲

橘葉莖節著處卽生根鬚包絡石旁花白子黑六  
月七月采莖葉曰乾藏器曰在石者良在木者隨

木性有功與薜荔相似更有石血地錦等十餘種  
藤並是其類大畧皆主風血暖腰腳變白不老蘇

恭言石血卽絡石殊誤矣絡石貼石而生其蔓折之有  
尖一頭赤色時珍曰絡石貼石而生其蔓折之有

白汁其葉小于指頭厚實木強面青背淡濁而不  
光有尖葉圓葉二種功用相同蓋

一物也蘇恭所說不誤但欠詳耳

莖葉脩治

雷曰凡采得用粗布揩去毛子  
以熟甘草水浸一伏時切曬用

**氣味**苦溫無毒

別錄曰微寒曾曰神農苦小溫雷公苦平無毒扁鵲桐君甘無毒當

之曰大寒藥中君也采無時時珍曰味甘微酸不苦之才曰杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏貝母菖蒲殺殷

孽毒

**主治**

風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫

閉水漿不下

本經

大驚入腹除邪氣養腎主腰髓痛

堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老

延年通神

別錄

主一切風變白宜老

藏器

蝮蛇瘡毒心

悶服汁并洗之刀斧傷瘡傅之立瘥

蘇恭

**發明**

時珍曰絡石性質耐久氣味平和神農列之上品李當之稱爲藥中之君其功主筋骨關

節風熱癰腫變白耐老卽醫家鮮知用者豈以其近賤而忽之耶服之當浸酒耳仁存堂方云小便蓋有虛熱而腎不足故土邪干水史載之言夏則土燥水濁冬則土堅水清卽此理也醫者往往峻補其疾反甚惟服博金散則水火旣濟源潔而流兩清矣用絡石人參茯苓各二兩龍骨煅一兩爲末每服二錢空心米飲下日二服

## 附方

舊二新二

## 小便白濁方

同喉痹腫塞

## 喉痹腫塞

喘息不通須

## 癰疽焮痛

臾欲絕神驗

## 癰疽焮痛

止

方用絡石草一兩水一升煎一大蓋外臺秘要細細呷之少頃卽通靈寶散用鬼繫腰生竹籬陰溼石岸閒絡石而生者好絡木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角用莖葉一兩洗曬勿見火阜莢刺一兩新瓦炒甘草節半兩大桔樓一箇取仁炒香乳香沒藥各黃角三錢每服二錢水一盞酒半盞慢火煎至一盞溫服

外科精要

木蓮 遺拾

釋名

薛荔 拾

木饅頭

綱時珍曰木蓮饅頭象其實形也薛荔

音壁利未詳山海經作草荔

集解

藏器曰薛荔夤緣樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉長二三寸厚若石韋生子似蓮房打

破有白汁停久如漆中

有細子一年一熟子亦入藥采無時

頌曰薛荔絡石極相類莖葉粗大如藤

狀木蓮更大于絡石其實若蓮房

時珍曰木蓮延藤木垣牆而生四時不凋厚葉莖強

樹木

大如絡石不延藤

花而實大如盆

微似蓮蓬而稍長正如無花果

之生者六七月

實內空而紅八月後則滿腹細子

大如稗子

一子一鬚其味微澀

其殼虛輕烏鳥童兒皆食之

葉氣味酸平無毒

主治背癰乾末服之下利卽愈

蘇頌

主風血暖腰腳

變白不衰

藏器

治血淋痛滯藤葉一握甘草炙一分

日煎服之

時珍

發明

慎微曰圖經言薜荔治背瘡近見宜興縣一老舉人年七十餘患發背村中無醫藥急取

薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以滓傳之後用他藥傅貼

遂愈其功實在薜荔乃知圖經之言不妄

藤汁主治白癩風癩瘍風惡瘡疥癬塗之

大明

木蓮氣味甘平濇無毒

時珍曰嶺南人言食之發瘡

主治壯陽

道尤勝

蘇頌

固精消腫散毒止血下乳治久痢腸痔

心痛陰癩

時珍

**附方**

**新八**

**驚悸遺精**

木饅頭炒白牽牛等分爲末每服二錢用米飲調下乾坤秘

醞

**陰癩囊腫**

木蓮卽木饅頭子小茴香等分爲末每空

心酒服

二錢

集簡酒痢腸風

黑散子治風入臟或食毒

取效

二錢

積熱大便鮮血疼痛肛出

或久患酒痢木饅頭燒存性

櫻櫻皮燒存性

烏梅

去核粉草炙等分爲末

每服二錢水一盞煎服

惠民和局方

大腸風下血

大便更滯木饅頭燒枳殼炒等

楊倓家

**大腸脫下**

木饅頭連皮子切炒茯苓豬苓等分爲末每服二錢槐花酒下

藏方

**一切癰疽**

初起不問發於何處用木蓮四十九箇揩去毛

丹治

夢遺名鎖陽

曾濟方

一切癰疽

木蓮四十九箇揩去毛

研細酒解

開溫服功

與忍冬

草相上下陳自明外科精要

乳汁不通

木蓮二個

箇爛煮食之并飲汁盡

一日卽通無

子婦人食之亦有乳也

集簡方

本草綱目草部

卷八下

木蓮附地錦扶芳藤

是

## 附錄地錦

拾遺藏器曰味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊

淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣樹石冬月不死山人產後用之一名地噤時珍曰別有地錦草與此不同見草之六

## 扶芳藤

拾遺

## 釋名滂藤

### 集解

藏器曰生吳郡藤苗小時如絡石蔓延樹木山人取楓樹上者用亦如桑上寄生之意忌

### 采冢

墓閒者隋朝稠禪師作青飲進湯帝止渴者卽此

莖葉氣味苦小溫無毒主治一切血一切氣一切冷大主風血腰腳去百病久服延年變白不老効

細浸酒飲器

藏

常春藤

拾遺

釋名土鼓藤

拾遺

龍鱗薛荔

日華

藏器曰

小兒取其

於地打作

鼓聲故名

土鼓

李邕改

爲常

春藤

集解

藏器曰葉頭尖結子正圓熟時如珠碧色

生林薄間作蔓繞草木上其

氣味莖葉苦子甘溫無毒

主治

風血羸老腹內諸

冷血閉強腰腳變白煮服浸酒皆宜

藏器

凡一切癰

疽腫毒初起取莖葉一握研汁和酒溫服利下惡

物去其根本

時珍○外

科精要

本草綱目草部 卷二十一 附方

新疗瘡黴凹用髮總劄住將尖葉薜荔搗汁

四圍

聖惠方

衄血不止飲之

龍鱗薜荔研水

千歲蘡

別錄上品

校正

併入用別錄有未

釋名蘡蕪

別錄

拾遺藏器曰此藤冬只凋葉大者盤薄故曰千歲蘡

集解

別錄曰千歲蘡生太山山谷

弘景曰藤生如蒲萄葉似鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥

都不識用仙經數處須之

藏器曰蔓似葛葉下白

其子赤條中有白汁陸機草木疏云一名苣瓜連

蔓而生蔓白子赤可食酢而不美

幽州人謂之推

蘡毛詩云葛蘡注云似葛之草蘇恭謂爲蘡蔓深

是妄言頌曰處處有之藤生蔓延木上葉如蒲

萄

而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結

實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏間取汁用

陶陳二氏所說得之宗奭曰唐開元末訪隱民姜

撫年幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還  
黑長生可致藤生太湖終南帝遣使多取以賜老  
臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號沖和  
先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝  
取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠云常春  
藤乃千歲蘢也旱藕乃牡蒙也方家久不用故撫內  
易名以神之民以酒漬藤飲之多暴死乃止撫內  
慚乃請求藥牢山遂逃去今書此以備世疑時珍  
曰按千歲蘢原無常春之名惟陳藏器本草土鼓  
藤下言李邕名爲常春藤浸酒服羸老變白則撫  
所用乃土鼓藤也其葉與

千歲蘢

不同

或名同

耳

正誤

見果部

下

氣味

甘平無毒

主治

補五臟

益氣續筋骨

長肌肉

去諸痹

久服輕身

不飢耐老

通神明

別錄

本草綱目 卷之二  
藁根主治緩筋令不痛錄別

忍冬

別錄上品

釋名金銀藤

綱目

鴛鴦藤

綱目

老翁鬚

綱目

左

纏藤

綱目

金釵股

綱目

通靈草

土宿

蜜桶藤

弘景曰

處處有之藤生凌

冬不凋故名忍冬

時珍曰

其花長瓣垂鬚黃白相

半而藤左纏故有金銀鴛鴦以下諸名

金釵股貴

其功也土宿真君云蜜桶藤陰草也

取汁能伏硫制汞故有通靈之稱

集解

別錄曰

忍冬十二月采陰乾

恭曰

藤生繞覆草木上莖苗紫赤色宿蔓有薄皮膜之其嫩

蔓有毛葉似胡豆亦上

下有毛花白

藥紫今人或以絡石當之非矣

時珍曰忍冬在處有之附樹延

四月開花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小如半

蔓莖微紫色對節生葉葉似薜荔而青有濶毛三

邊狀長藥花初開者藥瓣俱色白經二三日則色  
變黃新舊相參黃白相映故呼金銀花氣甚芬芳  
四月采花陰乾藤葉不拘時采陰乾

氣味甘溫無毒

權曰辛藏器曰小寒云溫者非也

主治寒熱身腫

久服輕身長年益壽

別錄

治腹脹滿能止氣下澼

甄權

熱毒血痢水痢濃煎服

藏器

治飛尸遁尸風尸沈尸

尸注鬼擊一切風溼氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅

諸惡瘡散熱解毒

珍時

發明

弘景曰忍冬煮汁釀酒飲補虛療風此旣長年益壽可常采服而仙經少用凡易得之草

人多不肯爲之更求難得者貴遠賤近庸人之情也時珍曰忍冬莖葉及花功用皆同昔人稱其治

風除脹解痢逐尸爲要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡爲要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也按陳自明外科精要云忍冬酒治癰疽發背初發便當服此其效甚奇勝于紅內消洪內翰邁沈內翰括諸方所載甚詳如瘍醫丹陽僧江西僧鑒清金陵王琪王尉子駿海州劉秀才純臣等所載療癰疽發背經效奇方皆是此物故張相公云誰知至賤之中乃有殊常之效正此類也

附方

舊一新  
十七

忍冬酒

治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或項或背或

腰或脇或乳或手足皆有奇效鄉落之間僻陋之所貧乏之中藥材難得但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之其效甚妙用忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入生餅子酒少許稀調得所塗于四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌槌損不可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二

盃文武火慢煎至一盃入無灰好酒一大盃再煎十數沸去滓分爲三服一日一夜喫盡病勢重者

如無生者只用乾者然力終不及生者效速陳自明外

### 忍冬圓

治消渴愈後預防發癰疽先宜服此用忍冬草根莖花葉皆可不拘

多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出

臘乾入甘草少許碾爲細末以浸藥酒打麪糊丸梧子大每服五十丸至百丸湯酒任下此

藥不特治癰疽大能止渴

外科精要

五痔諸

瘻方同一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱用自然汁半盃煎八分服之以滓傅上敗毒托

瘻方同喉痹乳蛾方同敷腫拔毒金銀藤燒存性葉焙

便毒方同乾爲末各三錢大黃焙爲末四錢凡腫毒初發以水酒調搽四圍留心洩氣楊誠經驗方

## 疽托裏

治癰疽發背腸癰爛癰無名腫毒焮痛實狀類傷寒不問老幼虛實服之未成者

內消已成者卽潰忍冬葉黃芪各五兩

當歸一兩甘草八錢爲細末每服二錢酒

一盞半煎一把搗爛隨

病上下服日再服以

渣傳之和劑局方

惡瘡不愈左纏藤入雄黃五分水二升

瓦罐煎之以紙封七重穿一孔待氣出以

孔薰之三時久大出黃水後用生肌藥取效

方輕粉毒癰方同

瘡久成漏忍冬草浸酒日日常

## 熱毒血痢

飲忍冬藤濃煎聖惠方

五種尸注飛尸者遊走皮

發刺痛變動不常也遁尸者附骨入肉攻

每發不可見死尸聞哀哭便作也風尸者淫躍四

未不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沈尸

者纏結臟腑沖引心膈每發絞切遇寒冷便作也

沈尸則大作也並是身中尸鬼引接外邪宜用忍冬莖

戶注者舉身沈重精神錯雜常覺昏廢每節氣至

葉剉數斛煮取濃汁煎稠每服雞子大鬼擊身青  
許溫酒化下一日二三服 肘後方

飲之作痛用金銀花一兩水煎 李樓怪病奇方  
花爲末每服二錢熟酒 雖骨引痛鷺

調下也衛生易簡方 腳氣作痛  
花下每服二錢熟酒 雖骨引痛鷺

夷堅志 洪邁 口舌生瘡 赤梗蜜桶藤高腳地銅盤馬  
上取涎出卽忍冬膏 治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡

愈 普濟方 忍冬膏 用金銀藤四兩吸鐵石三錢

香油一斤熬枯去滓入黃丹八兩待熬  
至滴水不散如常攤用 乾坤祕韞

甘藤

宋嘉祐

校正

自木部移入此部

釋名 甜藤

嘉祐

感藤 時珍曰甘感音相近也又有甜

藤

甘露藤

皆此類並附之忍冬

一名甜藤  
與此不同

集解

藏器曰生江南山谷其藤大如雞卵狀如木防已研斷吹之氣出一頭其汁甘美如蜜

汁氣味

甘平無毒主治調中益氣通血氣解諸熱

止渴

藏器除煩悶利五臟治腎釣氣其葉研傅蛇蟲

咬

大解熱痢及膝腫

時珍

附錄

甘露藤嘉祐藏器曰生嶺南藤蔓如筋人服之得肥一名肥藤味甘溫無毒主風

血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏

色天明曰止消渴潤五臟除腹內諸冷

甜藤拾遺

藏器曰生江南山林下蔓如葛味甘寒無毒主熱

煩解毒調中氣令人肥健搗汁和米粉作糗餌食

甜美止洩又治剝馬血毒入肉及狂犬牛馬熱黃

傅蛇咬瘡又有小葉尖長氣辛臭者搗傅小兒腹

除痞滿

門癬

舍水藤

海藥

校正

自木部移入此併  
入拾遺大瓠藤

釋名 大瓠藤

集解

珣曰按劉欣期交州記云舍水藤生嶺南及北海邊山谷狀若葛葉似枸杞多在路旁行人乏水處便喫此藤故以爲名藏器曰安南朱崖

儋耳無水處皆種大瓠藤取汁用之藤狀如瓠斷之水出飲之清美時珍曰顧微廣州記云水藤去地一丈斷之更生根至地水不絕山行口渴斷取汁飲之陳氏所謂大瓠藤蓋卽此物也

藤中水氣味甘平無毒

藏器曰寒

主治解煩渴心燥瘴

癘丹石發動亦宜服之

李止

渴潤五臟去溼痹天

行時氣利小便其葉搗傅中水爛瘡皮皯

藏器

治人

體有損痛沐髮令長

時珍○廣州記

附錄鼠藤

拾遺珣曰顧微廣州記云鼠愛食此藤故名其咬處人取爲藥藏器曰生南海

海畔山谷作藤繞樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛彼人食之如甘蔗味甘溫無毒主丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白腰腳痛冷除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃黃服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤

宋經圖

集解

頌曰生江淮及浙東山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有鬚夏

月採取根苗  
南人多用之

氣味苦溫無毒主治解風勞同麻黃治傷寒發汗

同大黃墮胎氣

蘇頌

流氣活血治心腹痛

時珍

附方

新六

癰氣作痛

天仙藤一兩好酒一盃服之

效

孫天仁集效方

痰注臂痛

天仙藤

白朮羌活

白芷梢各三錢

片子

水煎服

仍間服

千金五

錢每服五

錢

片子

水煎服

至半

套丸

楊仁齋直指方

妊娠水腫

始自兩足漸

足趾

出水謂之子氣

乃婦人素有風氣或衝任有

血風

不可作水妄投湯藥宜

天仙藤散主之

天仙藤

散等分爲末每

煎

藤洗

微炒香附子炒

陳皮甘草烏藥等分

煎

服

三錢水一大盞

一日三服

小便利氣脈通腫漸消

至七

分空心服

一日三服

利氣脈通腫漸消

不須多

服此乃淮南名醫

陳景初祕方也

得于李

伯時家

得于李

明婦人良方

陳自

產後腹痛

兒枕痛

天仙藤五兩炒

用末每服炒生薑汁

童子小便

和細酒調

一切血氣

腹痛卽上方

溫酒調服

肺熱

童子小便

細酒調

一切血氣

腹痛卽上方

溫酒調服

肺熱

鼻皺桐油入黃連末用天仙藤燒熱油傅之

摘玄方

# 紫金藤

宋圖經

釋名山甘草

集解

頌曰生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條采皮曬乾

氣味

缺

主治丈夫腎氣

蘇頌

消損傷淤血搗傅惡瘡

腫毒

時珍

附方

新二

紫金藤丸

補腎

臟暖丹田

興陽道減小便

虛面目

黧黑口乾舌濇

夢想虛驚耳鳴

目淚腰胯

沈重百節

痠疼項筋緊急

背髀勞倦陰汗

盜汗及

婦人子宮久冷

月水不調或多或少

赤白帶下並

宜服之用紫金藤巴戟

天去心三兩

吳茱萸

高良

**薑**肉桂青鹽各二兩爲末酒糊丸梧子大每溫酒下二十丸日三服和劑方死胎不下

**紫**金藤葵根各七錢土牛膝三兩土當歸四錢肉桂二錢麝香三分爲末米糊丸梧子大硃砂爲衣

每服五十丸乳香湯下極驗葛靜觀方

**南藤**

宋開寶

**校正**

自木部移入此併入有名未用別錄丁公寄圖經石南藤

**釋名**石南藤

圖經

丁公藤

開寶

丁公寄

別錄

丁父

別錄

風藤

志曰

生依南樹故號南藤

藏器曰

丁公寄

因以得名

**集解**

別錄曰

丁公寄生石閒蔓延木上葉細大枝

赤莖其大如礆黃有汁七月七日采

頌曰

南山山谷今泉州榮州有之生

藤卽丁公藤也

生南山山谷今泉州榮州有之生

依南木莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖采

無時又曰天台石南藤四時不凋土人采葉治腰

痛時珍曰今江南湖南諸大山有之細藤圓膩紫

肉桂青鹽各二兩爲末酒糊丸梧子

大每溫酒下二十丸日三服和劑方死胎不下

紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩土當歸四錢肉桂二錢麝香三分爲末米糊丸梧子大硃砂爲衣

每服五十丸乳香湯

下極驗葛靜觀方

本草綱目草部  
綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹處有小紫瘤疣中有小孔四時不凋莖葉皆臭而極粹白花蛇食其葉

氣味辛溫無毒

別錄甘

主治金瘡痛延年

別錄主風血

補衰老起陽強腰腳除痺變白逐冷氣排風邪煮

汁服冬月浸酒服

藏器

煮汁服治上氣欬嗽

珍時

發明

志曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜禱

草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤治療風乃拜泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所在母服之遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤和諸藥熬膏市之號南藤膏白花蛇喜食其葉故

猶捷治諸風

**附錄烈節**

宋圖經頌曰生榮州多在林箐中春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實

九月采莖曬乾味辛溫無毒主肢節風冷筋脈急痛作湯浴之佳時珍曰楊倓家藏經驗方有烈節酒治歷節風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各

一兩爲粗末絹袋盛之以無灰酒二百盞浸三日每用一盞入生酒一盞溫服表弟武東叔年二十餘患此痛不可忍涪城馬東之以此治之而安

**清風藤**

宋圖經

**釋名青藤**

綱目尋風藤綱目

**集解**

頌曰生台州天台山中其苗蔓廷木上四時常青土人采莖用

**氣味**

缺

**主治**

蘇頌治風溼流注歷節鶴膝麻痺

**癰癧損傷瘡腫入酒藥中用**

時珍

本草綱目草部

卷二十六

附方新風溼痹痛

青藤根三兩防己一兩咬咀一入酒一瓶煮飲

普濟方

切諸風

青藤膏用青藤出太平荻港上者二三月采之不拘多少入金內微火熬七日夜成

膏收

入

甕器內用時先備梳三五把量人虛實以

酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌其後遍身發

癢不可當急以梳梳之要癢止卽飲冷水一

口便解風病皆愈也避風數日良

集簡方

百棱藤

宋圖經

釋名百靈藤

綱目

集解

須曰生台州山中春生苗蔓延木上無花葉冬采皮入藥土人用

氣味

缺

主治盜汗

蘇治一切風痛風瘡以五斤剉

水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服

時珍

**附方**

**新**

**頭風腦痛**

百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗作飯候冷拌神麴

炒末九兩同入甕中如常釀酒經三五日更炊糯

米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出爲效○

聖惠方

一切風痺不拘久近百靈藤五斤水三斗煎一斗瀘汁再煎至三升

入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各

二兩爲末同煎別入白蜜五合熬如餳狀瓷瓶收各

之每服一匙溫酒下一日二

服忌毒物滑物聖惠方

大風瘡疾百靈藤四斗兩水一斗

煮三升去滓入粳米四合煮粥於密室中浴畢乃

食暖臥取汗汗後皮膚起如麩片每隔日一作五

六十日後漸愈毛

髮卽生聖惠方

**省藤**

**拾**

**釋名**

**赤藤**

**綱**

**紅藤**

**綱**

**校正**

**自木部**

**移入此部**

集解

藏器曰生南地深山皮赤大如指堪縛物片片自解也

氣味苦平無毒主治蛇蟲薺汁服之齒痛打碎含

之煮粥飼狗去癇

藏器

治諸風通五淋殺蟲

時珍

發明

時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之

一日寓居邵武天王寺夜半醉歸口渴甚見廡閒甕水映月瑩然卽連酌飲之其甘如飴迨曉蟲出

盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也

附方

新五淋澇痛赤藤卽做草鞋者白茯苓芒麻根等分爲末百沸湯下每服一錢如神○

紫藤

宋開寶原方

**集解**

藏器曰藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼爲招豆藤其子作角角中仁熬香著酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花搘碎拭酒醋白腐壞

**氣味**

甘微溫有小毒主治作煎如糖服下水癰病

器藏

**落鴈木**

海藥

**校正**

自木部移入此

**釋名**

珣曰藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中或云鴈銜至代州鴈門而生以此爲名

**集解**

珣曰按徐表南州記云落鴈木生南海山野中蔓生四邊如刀削代州鴈門亦有之蜀中雅州亦有頌曰雅州出者苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶無花實彼人四月采苗入藥用

**莖葉氣味**

甘平溫無毒主治風痛傷折腳氣腫腹

滿虛脹以粉木皮同煮汁洗之立效又婦人陰瘡

浮泡以椿木皮同煮汁洗之珣產後血氣痛并折

傷內損諸疾煮汁服

蘇頌

附錄折傷木

唐本草恭曰生資州山谷藤繞樹木上葉似荊草葉而光厚八月九月采

莖日乾味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水各半煮濃汁飲每始

王木

唐本草恭曰生資州藤繞樹木上葉似蘿藦葉二月八月采莖陰乾味苦平無毒主傷折

跌筋骨生肌破血止痛以酒水各半煮濃汁飲之

風延莓

拾遺藏器曰生南海山野中他

處無有也蔓繞草木上細葉蜀都賦云風連蔓延於蘭臯是也味苦寒無毒主小兒發熱發強驚癇

寒熱熱淋利小便解煩明目並煮服之珣曰主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴溪毒一切瘡

腫並宜  
煎服

千里及遺拾

校正併入圖經

千里光

集解

藏器曰宣湖閒有之

頌曰千里及藤生道旁籬落閒葉細而厚

苗秋有花土人采花葉入服藥又筠州有千里光  
生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝榦圓而青  
春生苗秋有黃花不結實采莖葉入眼藥名黃花演蓋一物也

氣味苦平有小毒

頌曰苦寒無毒

主治天下疫氣結黃

瘴瘧蠱毒煮汁服取吐下亦搗傅蛇犬咬

器藏同甘

草煮汁飲退熱明目不入眾藥

蘇頌

同小青煎服治

赤痢腹痛

時珍

附方一 燭弦風眼

千里光草以筍殼葉包煨熟  
捻汁滴入目中 經驗良方

藤黃

海藥

校正

自木部  
移入此

釋名樹名海藤

荀曰按郭義恭廣志云出岳鄂等州諸山厓樹名海藤花有蕊散落

石上彼人收之謂之沙黃就樹采者輕妙謂之臘黃

今人訛爲銅黃銅藤音謬也此與石淚采之無異

畫家及丹竈家時用之時珍曰今畫家所用藤黃皆經煎煉成者舐之麻人按周達觀眞臘記云

國有畫黃乃樹脂番人以刀斫樹枝滴下次年

收之似與郭氏說微不同不知卽一物否也

氣味酸澀有毒主治

艸牙蛀齒點之便落

李珣

附錄諸藤

增一十九種

地龍藤

拾遺藏器曰生天目山繞樹蟠屈如龍故名吳中亦有而小異味苦無毒主風血羸

老腹內腰腳諸冷食不

### 龍手藤

藏器曰出安荔浦石上向陽者葉如

補虛益陽去冷氣風痹以醋酒浸近火令溫空心

服之取

### 牛領藤

藏器曰生嶺南高山形褊如牛領取之陰乾味甘溫無毒主腹內冷

腰膝痛弱小便白數陽道乏煮汁或浸酒服

### 牛嫋藤

藏器曰生深山大如樹牛好食之其人不饑其根食之令人髮落

中  
邊  
人  
山  
毒  
山  
溫  
藏  
無  
主  
曰  
吉

### 鬼膊藤

藏器曰江南林潤如樹牛好食之其人不饑其根食之令人髮落

葉如梨葉子如榦子藤味苦溫無

### 斑珠藤

藏器曰生江南林潤如樹牛好食之其人不饑其根食之令人髮落

山谷中不凋子如珠而斑冬月取之味甘

### 息王藤

藏器曰生無

藏器曰生嶺南山谷冬月不凋味苦溫無

### 萬一藤

藏器曰生無

毒主產後腹痛血露不盡濃煮汁服

### 曼遊藤

藏器曰生無

生嶺南蔓如小豆一名萬

### 吉主蛇咬杵末水和傅之

爲天門山谷

狀如寄生着大樹葉如柳春花色紫蜀人謂之沈  
蘓藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癬

### 百丈青

藏器曰生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生味苦平無毒解諸毒物天行瘴瘧疫

毒並煮汁服亦生搗

對生味苦平無毒解諸毒物天行瘴瘧疫汁服其根令人下痢

### 溫藤

藏器曰生江南山谷着樹不凋莖葉味甘溫無毒浸酒服主風血積冷

### 藍藤

藏器曰生新羅國根如細辛味辛溫無毒主冷氣欬嗽煮汁服

### 瓜藤

宋圖經頌曰生施州四時有葉無花采皮無去粗皮焙乾等分搗

羅用甘草水調貼之

### 金棱藤

頌曰生施州四時有葉無花采無時味辛

溫無毒主筋骨疼痛與續筋根馬接腳同洗

去粗皮焙乾等分爲末酒服二錢無所忌

### 含春

### 藤

頌曰生台州其苗延木冬獨用藤

### 獨用藤

頌曰生施州四時有葉無

花葉上有倒刺采皮無時味苦辛熱無毒主心氣痛和小蒜頭葉焙等分研末酒服一錢

### 祁婆

**藤**

頌曰生天台山中蔓延水上四時常有土人采葉治諸風有效

**野豬尾**

施州藤

纏大木四時有葉無花味苦澁涼無毒主心氣痛解熱毒同百藥頭等分焙研爲末每酒服二錢

**石合草**

頌曰生施州藤纏木上四時有葉無花土人采葉味甘涼無毒主一切惡瘡斂瘡口

**水焙研溫**

**骨路支**

拾遺藏器曰味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑

崑國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有之名飛

藤○此條原附錄紫葳之後鈔書遺落附于此也

**萬一簾**

生嶺南簾蔓如小豆亦名萬吉主治蛇咬杵篩爲末水和如泥傅癰上

本草綱目草部第十八卷下終