


欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷三十四

二至



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

備急千金要方

傷寒方

凡陰熱解毒無病之辨

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

物故多用苦參青箱艾
安也夫熱盛非苦酢物
之又不用苦酢等藥此

金匱要略卷三十二
如救火不以水也必不可得脫免也

又曰今諸療多用辛甘薑桂人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參青箱葶藶艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝于向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按藥次也便以青箱苦參艾苦酒療之但稍與促其間無不解也

扁鵲曰病在腠理湯熨之所及病在血脉針石之所及病在骨髓無可奈何而凡醫治病或言且待使病成乃

頓去之此為妄矣當預約束家中及所部曲具語解此
意使有病者知之為要

治溫氣病欲死方

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則除諸

毒病服之覆取汗皆愈

張文仲及肘後云治熱
毒氣死破棺千金湯

苦參湯治熱病五六日已上方

苦參

三兩

黃芩

二兩

生地黃

八兩

右三味㕮咀以水八升煎取二升適寒溫服一升日

再

凝雪湯治時行毒病七八日熱積聚胸中煩亂欲死起
死人搦湯方

芫花一升以水三升煮取一升半漬故布薄膈上不
過三薄熱即除當溫暖四肢護厥逆也

栝蒌湯治傷寒中風五六日已上但胃中煩乾嘔方

栝蒌實

一枚

黃芩

甘草

各三兩

生薑

四兩

大棗

十二枚

柴胡

半斤

右六味以水一斗二升煮取五升絞去滓適寒
溫服一升日三

蘆根飲子治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食方

生蘆根切

青竹茹

各一升

粳米

三合

生薑

三兩

右四味以水七升先煮千里鞋底二隻取五升澄清
下藥煮取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草

三兩

生蘆根

切一升

橘皮

一兩

粳米

三合

右四味呔咀以水五升煮取二升隨便稍飲不瘥更作取瘥止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏

麥門冬

半夏

竹葉

人參

二兩

各一升

把二

右五味呔咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一升

米熟湯成飲一升日三服一方加生薑五兩

此方正仲景

竹葉湯方前卷汗後門中已有此方仍少甘草分兩不別

治熱毒攻手足赤腫焮熱疼腫痛欲脫方

煮馬尿若羊尿汁漬之日三度

又方濃煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止
又方稻穰灰汁漬之

又方取好酒煮苦參以漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

漏蘆連翹湯治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹毒熱赤

腫赤痛生障醫方

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白朮

升麻

甘草各一兩

枳實

大黃各三兩

右九味以水九升煮取三升分三服相去如人行五里久更服熱盛者可加芒硝二兩

猪膽湯治傷寒五六日斑出方

猪膽

苦酒各三合

雞子一枚

右三味合煎三沸强者盡服之羸者須煎六七沸分
為二服汗出即愈

治人及六畜時氣熱病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之一莖是穉穰即不瘡瘡若黑者搗
蒜封之

又方煮芸薹洗之

治熱病後豌豆瘡方

黃連三兩以水二升煮取八合頓服之

金定四庫全書
卷三十一
又方真波斯青黛大如棗水服之瘥

又方青木香二兩以水三升煮取一升頓服之愈

又方若赤黑發如疥大一作疾火者煎羊脂摩傅之

又方小豆屑雞子白和而傅之

又方以婦人月水帛拭之

又方小兒著取月水汁和水浴之

又方灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左女右

木香湯治瘡煩疼者方

青木香 二兩

薰陸香

礬石

丁香 各一兩

麝香 半兩

右五味以水四升煮取一升半再服熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代之病輕者去礬石神

驗

又方芒硝和猪膽塗上勿動痂落無痕仍卧黄土末上良此病小便澀有血者內壞瘡皆黑靨不出膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢四合

大猪膽一具

右二味合煎三沸服一合日五服之良

治豌豆瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜徧身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數

食之

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此方

牡蠣 二兩半 石膏 一兩六銖

右二味治下篩酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大用治大病瘥後小勞便鼻衄者

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏扇 一斤切 猪脂 一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之內

喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻

芍藥

羚羊角

各三兩

通草

四兩

射干

二兩

生蘆根

切一升

右六味呔咀以水七升煮取二升半分作二服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏

半升

蜜

一斤

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎取

如錫含如棗核許盡復含之大良

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗

二十枚

烏梅

十枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗矣

禹餘糧湯傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦治之方

禹餘糧

赤石脂

各一斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不止當利小便

治傷寒後下利膿血方

阿膠

兩一

黃蘗

兩二

黃連

兩四

梔子

枚十四

右四味以水六升煮取二升去滓內阿膠更煎

令消分為三服

甲乙方無黃蘗有黃芩

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蠶蟲在下部方

麝香

礬石

巴豆

附子

真珠

雄黃 各等分

右六味治合取桑條如箭籛長三寸以綿纏頭二寸唾濡綿展取藥著綿上內穀道中半日復易之日再神效

麻黃升麻湯治傷寒六七日其人大下後脉沈遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄痢不止為難治者方

麻黃

知母

姜蕤

亦作菖蒲

黃芩

各三兩

升麻

芍藥

當歸

乾薑

石膏

茯苓

白朮

桂心

甘草

麥門冬

各二兩

右十四味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

次內諸藥煮取三升分服一升微取汗愈

治溫毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤

滯下伏氣腹痛諸熱毒方

梔子

二十七枚

豉

一升

薤白

一握

右三味以水四升先煮梔子薤白令熟次內豉煮取
二升半分三服頻服取瘥

治病後虛腫方

豉

五升

醇酒

一斗

右二味煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性覆取汗

治汗不止方

地黃三斤切以水一斗煮取三升分作三服

又方白朮葉作飲飲之

又方白朮方寸匕以飲服之

治卒得汗不止方

以溫酒服牛羊脂愈

又方服屎亦止

治盜汗及汗無時方

以韭根四十九枚水二升煮一升頓服之為度

又方豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過三

劑即止

又方死人席緣燒灰煮汁洗身瘡

止汗方

杜仲

牡蠣

各等分

右二味治下篩臨夜卧以水服五錢匕

又方

牡蠣

雷丸

麻黃根

各三兩

乾薑

甘草

各一兩

米粉

二升

右六味治下篩隨汗處粉之

牡蠣散治卧即盜汗風虛頭痛方

牡蠣

白朮

防風

各三兩

右三味治下節酒服方寸匕日二止汗無出此方一
切泄汗服之三日皆愈

備急千金要方卷三十二

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十三 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

傷寒方

勞復第十一 論方 食忌

論曰凡熱病新瘥及大病之後食猪肉及羊血肥魚油
膩等必當大下利醫所不能治也必至于死若食餅餌
粢黍飴脯鱠炙棗栗諸菓物脯脩及堅食難消之物胃

氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也

病新瘥後但得食糜粥寧少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與之也引日轉久可漸食羊肉白糜若羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新瘥後當靜卧慎勿早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得病已瘥未健詣

華敷視脉曰雖瘥尚虛未得復陽氣不足慎勿勞事餘
勞尚可女勞則死當吐舌數寸其婦聞其夫瘥從百餘
里來省之經宿交接中間三日發熱口噤臨死舌出數
寸而死病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略
無不死有士蓋正者疾愈後六十日已能行射獵以房
室即吐涎而死及熱病房室名為陰陽易之病皆難治
多死近者有一士大夫小得傷寒瘥已十餘日能乘馬
行來自謂平復以房室即小腹急痛手足拘攣而死時

病瘥後未滿五日食一切肉麵者病更發大困

時病瘥後新起飲酒及韭菜病更發

時病新瘥食生魚酢下痢必不止

時病新瘥食生菜令顏色終身不平復

時病新汗解飲冷水者損心胞令人虛補乃不復

時病新瘥食生棗及羊肉者必膈上作熱蒸

時病新瘥食犬羊等肉者必作骨中蒸熱

時病新瘥食魚肉與瓜生菜令人身熱

一本作腫

時病新瘥食蒜鱠者病發必致大困

黃龍湯治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方

仲景名小柴胡湯方

柴胡

斤半

半夏

升半

黃芩

兩三

人參

甘草

兩各二

生薑

兩四

大棗

枚十二

右七味以水一斗煮取五升去滓服五合日三

不嘔而渴者去半夏加栝蒌根四兩

補大病後不足虛勞方

萬病虛勞同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四

升煎取一升如人體溫稍稍飲之不得過多十日服
不絕為佳

治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作方

梔子仁三七枚 石膏五兩 香豉一升

鼠屎尖頭大者二十枚

右四味咬咀以水七升煮取三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復之方

取洗手足汁飲一合取頭中垢如棗核大吞一枚

枳實梔子湯治大病已後勞復者方

枳實

三枚

梔子

十四枚

豉

一升 綿裹

右三味以酢漿七升先煎減三升次內枳實梔子煮取二升次內豉煮五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者內大黃如博棊子五六枚

治病新瘥遇美飲食食過多勞復者方

取所食餘燒為末飲調服二錢七日以三服

治新瘥早起及食多勞復者方

豉合五

鼠屎二十一枚
尖頭者

右二味以水二升煮取一升盡服之温卧令小汗愈

崔氏加梔子七枚尤良肘後有麻子仁内一升加水一升亦可内枳實三枚葱白一虎口

治重病新瘥早起勞及飲食多致發欲死方

燒鼈甲末飲服方寸匕

治食大飽不消勞復脉實者方

豉一升 鼠屎二十枚 梔子七枚 大黃三兩

右四味以水六升煮取二升分三服微取汗應

小鴨澹者止不澹者復作

治勞復垂死方

暖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服即愈小

男兒亦得

麥門冬湯治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬

一兩

甘草

二兩

京棗

二十枚

竹葉

切一升

右四味以水七升煮粳米一升令熟去米內諸

藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯內口中用之

有效

治食勞方

麩二升煮取汁服之

又方杏仁五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

又方燒人屎灰水服方寸匕為度

欲令病人不復方

燒頭垢如梧桐子大吞服之

治傷寒瘥後一年心下停水不能食者方

生地黃斤五 白朮斤一 好麩斤二

右三味合搗令相得曝乾下篩酒服方寸七日三加至二七

論曰婦人溫病雖瘥未嘗平復血脉未和尚有熱毒而

與之交接得病者名為陰陽之病其人身體重熱上衝

胃頭重不能舉眼中生眵一作四肢一作拘急小腹

絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急

熱上衝胃頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨

髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著床不能動搖起止仰人
或引歲月方死醫者張苗說有婢得病瘥後數日有六
人犯之皆死

治婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人方

取女人中裨近隱處燒服方寸匕三日小便即利陰
頭微腫此為愈矣女人病可取男裨一如此法

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣裳以覆男子立愈

令病人不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若
米飲汁服之

治男子新病起近房內復者方

取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹
絞痛欲死

治病後髮亂不可理通頭法

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之

細將釵子領髮斯須並自通矣

百合第十二

論方

論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病已後不平復變成斯病其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溲者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其證以治之百合之為病令人意欲食復不能食或有

美時或有不用聞飲食臭時如有寒其實無寒如有熱
其實無熱常默默欲卧復不得眠至朝口苦小便赤澀
欲行復不能行諸藥不能治治之即劇吐利如有神靈
所為也百合病身形如和其脉微數其候每溺時即頭
覺痛者六十日乃愈百合病候之溺時頭不覺痛淅淅
然寒者四十日愈百合病候之溺時覺快然但覺頭眩
者二十日愈百合病證其人或未病而豫見其候者或
已病四五日而出或病一月二十日後見其候者治之

常誤也依證治之

論曰百合病見在于陰而攻其陽則陰不得解也復發

其汗為逆也見在于陽而攻其陰則陽不能解也復下

之其病不愈

要畧云見于陰者以陽法救之見于陽者以陰法解之見陽攻陰復發其汗此為逆

其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難治

百合知母湯治百合病已經發汗之後更發者之方

百合

七枚

知母

三兩

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明旦

去水取百合更以泉水二升煮取一升汁置之復取
知母切以泉水二升煮取一升汁合和百合汁中復
煮取一升半再服不瘥更依法合服

百合滑石代赭湯治百合病已經下之後更發者方

百合

七枚
擘

滑石

三兩

代赭

一兩

右三味先以泉水漬百合一宿明旦去水更以泉水
二升煮百合取一升去滓又以水二升煮餘二味取
一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

百合雞子湯治百合病已經吐之後更發者方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升
取雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

百合地黃湯治百合病始不經發汗吐下其病如初者
方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升
內生地黃汁一升復煎取一升半分再服大便當去
惡沫為候也

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人身洗
身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不瘥可用括蔘根并
牡蠣等分為散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱者方

百合根

乾一兩

滑石

三兩

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利利者止勿
復服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色搗篩為散飲服方寸
匕日三滿消痛止

備急千金要方卷三十三

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十四 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第十三 論方

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起卧不安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡飲食不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食

於上者則聲喝也

作喝一

毒食下部者則乾咽也此由温

毒氣所為食于上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹

洗之食于肛外者熏之并用雄黃三片稍置瓦餅中炭

火燒向肛熏之并服湯也

治狐惑湯

黃連

兩四

黃草

兩四

右二味呔咀白酢漿一斗漬一宿煮取二升分為三

服

赤小豆當歸散其人脉數無熱微煩默默但欲卧汗出
初得之三四日眼赤如鳩眼得之七八日其四眥黃黑
能食者膿已成也治之之方

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當歸三
兩為末漿水服方寸匕日三即愈

瀉心湯其病形不可攻不可灸因火為邪血散脉中傷
脉尚可傷臟則劇并輸益腫黃汁出經合外爛肉腐為
癰膿此為火疽醫所傷也夫脉數者不可灸因火為邪

即為煩因虛逐實血走脉中火氣雖微內攻有力焦骨

傷筋血難復也應在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中

幅堅而嘔吐腸鳴者方

仲景名半夏瀉心要略名甘草瀉心

半夏

升半

黃芩

人參

乾薑

甘草

各三兩

黃連

一兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗煮取六升分服一升日三

傷寒發黃第十四

論證方
針灸圖

論曰黃有五種有黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸黃汗者

身體四肢微腫胸滿不渴汗出如黃蘗汁良由大汗出
卒入水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱
以冷水洗之熱因留胃中食生黃瓜熏上所致若成黑
疸者多死穀疸者食畢頭眩心忪怫鬱不安面發黃由
失饑大食胃氣衝重所致酒疸者心中懊痛足脛滿小
便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致女勞疸者身
目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交
接竟入水所致但依後方治之

黃汗之為病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣色正黃如藥汁其脉自沈從何得之此病以汗出入水中浴水從汗孔入因而得之

黃者芍藥桂酒湯治黃汗方

黃耆

五兩

芍藥

三兩

桂心

三兩

右三味㕮咀以苦酒一升水七升合煎取三升飲一升當心煩也至六七日稍稍自除心煩者苦酒阻故也

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發于陽部其人振寒而微熱

桂枝黃耆湯治諸病黃疸宜利其小便假令脉浮當以汗解方

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

黃耆

五兩

大棗

十二枚

右六味以水八升微火煎取三升去滓溫服一升發微汗須臾不汗者飲稀熱粥以助湯若不汗更

服湯

麻黃醇酒湯治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃三兩以醇酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

治黃疸方

瓜蒂

秫米

赤小豆

各二枚

右三味治下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汗或從口中出汁升餘則愈病

輕者如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人極

吹鼻中無不死大慎之

刪繁療天行毒熱通貫臟腑沈伏骨髓之間或為黃疽黑

疽赤疽白疽穀疽馬黃等病喘息須臾不絕也

大黃圓治同前

大黃

葶藶子

各二兩

右二味為末蜜和丸如梧子大未食服十九日三病

瘥止

又方大黃

二兩

黃連

三兩

黃蘗

黃芩

各一兩

麴衣合五

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸日三不知加至五丸

茵陳湯治黃疸身體面目盡黃方

茵陳

黃連各三兩

黃芩二兩

大黃

甘草

人參各一兩

梔子二十枚

右七味呔咀以水一斗煮取三升分三服日三亦治

酒疸酒癖

三黃散治同前

大黃

黃連

黃芩

各四兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可為丸

五苓散治黃疸利小便方

豬苓

茯苓

澤瀉

白朮

桂心

各三十銖

右五味擣篩為散渴時水服方寸匕極飲水即利小

便及汗出愈

此方與第九卷方相重以分兩不同故重出

秦椒散治黃疸飲少溺多方

秦椒

六銖

瓜蒂

半兩

右二味治下節水服方寸匕日三

小半夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可除熱熱除必噦方

半夏

生薑

各半斤

右二味以水七升煮取一升五合分再服有人常積氣結而死其心上暖以此湯少許汁入口遂活

治黃疸方

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥穢麥亦得用之

治黃疸變成黑疸醫所不能治者方

土瓜根搗汁一小升頓服日一平旦服至食時病從小便出先須量病人力不得多服力衰則起不得

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃煮藥汁衆醫不能療者方

茵陳

梔子 各四兩

黃芩

大黃

柴胡

升麻 各三兩

龍膽 二兩

右七味以水八升煮取二升七分三服若身

體羸去大黃加梔子五六兩生地黄一升

延年錄無茵陳有梔

子四兩桔萸三兩芒硝二兩近效方加枳實二兩

夫黃發已久變作桃皮色

心下有堅嘔逆不下飲食小便極赤色少四肢逆冷

脉深沉極微細遲者不宜服此方得下必變哕也宜

與大茵陳湯除大黃與生地黄五兩服湯盡消息看

脉小浮出形小見不甚沈微便可治也脉浮見者黃
當明不復作桃皮色心下自寬也大茵陳湯方次出後十一味者是
苦參散治人無漸忽然振寒發黃皮膚黃麴塵出小便
赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯散餘熱
不除久黃者宜吐下方

苦參

黃連

瓜蒂

黃蘗

大黃

各一兩

葶藶

二兩

右六味治下篩飲服方寸匕當大吐吐者日一服不

吐日再亦得下服五日知可消息不覺退更服之小折便消息之

治發黃方

茵陳

黃蘗

梔子

大黃

各三兩

黃連

二兩

右五味哎咀以水九升煮取三升分三服先服湯後

服丸方

大黃

五兩

茵陳

梔子

各三兩

黃芩

黃蘗

黃連 各二兩

右六味為末以蜜丸如梧子大白飲服二十九令微

利

麻黃連翹赤小豆湯治傷寒瘀熱在裏身體必發黃方

麻黃

連翹

甘草 各二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

杏仁 三十枚

赤小豆 一升

生梓白皮 切二升

右八味以咀以勞水一斗先煮麻黃去沫次內諸藥

煎取三升分三服

茵陳湯治傷寒七八日內實痰熱結身黃如橘小便不利腹微脹滿宜下之方

茵陳

六兩

大黃

三兩

梔子

四十枚

右三味㕮咀以水一斗二升先煮茵陳取五升去滓

次內梔子大黃煎取三升分服一升日三小便當利

如皂莢沫狀色正赤當腹減黃悉隨小便去也

范注用療

穀疸小品方用石膏一斤

大黃黃蘗湯治發黃腹滿小便不利而赤自汗出此為
表和裏實當下之方

大黃

三兩

黃蘗

芒硝

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內芒硝復煎
取一升先食頓飲之

茵陳圓治時行病急黃并瘴癘疫氣及瘡瘡之方

茵陳

梔子

芒硝

杏仁

各三兩

巴豆

一兩

恒山

鼈甲

各二兩

豉

五兩

大黃五兩

右九味為末以錫為丸如梧子大飲服三丸以吐利為佳不知加一丸初覺體氣有異急服之即瘥神效
治急黃熱氣骨蒸兩目赤脉方

芒硝一兩

大黃一兩半末

生地黄汁八合

右三味合和一服五合日二以利為度不須二服

治風疸小便或黃或白洒洒寒熱好卧不欲動方

三月生艾

一束搗取銅器中煎如漆密封之

大黃

黃連

凝水石

栝蒌根

苦參

葶藶

各六銖

右七味六味為末以艾煎和丸如梧子大先食服五丸日二可至二十丸有熱加苦參渴加栝蒌小便澀加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

濕疸之為病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如狔肝狀其小腹滿者

急下之亦治一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石

滑石

各五兩

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三先食服之便利如血者已當汗出瘥

寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃痰熱以行跗陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脉浮為傷腎跗陽脉緊為傷脾風寒相薄食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下

流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡黃名曰穀疸
治勞疸穀疸丸方

苦參

三兩

龍膽

一兩

右二味為末牛膽和為丸如梧子大先食以麥粥飲
服五丸日三不知稍加之

刪繁方加梔子仁三七枚以猪膽和為丸

夫酒疸其脉浮者先吐之沈弦者先下之夫人病酒疸
者或無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜吐之方前苦參
散七味者是酒疸必小便不利其候當心中熱足下熱

是其證也夫酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如
啖蒜齏狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微
黃故云

枳實大黃湯治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸心
中懊懣而不甚熱或乾嘔方

枳實五枚

大黃三兩

豆豉半升

梔子七枚

右四味以水六升煮取二升分三服心中熱疼

懊懣皆主之

凝水石散治肉疸飲少小便多如白泔色此病得之從酒方

凝水石

白石脂

栝萐根

桂心

各三
十銖

菟絲子

知母

各十
八銖

右六味治下篩麥粥飲服五分七日三服五日知十

日瘥

茯苓圓治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者方

茯苓

茵陳

乾薑

各一
兩

白朮

熬

枳實 各三
十銖

半夏

杏仁 各十
八銖

甘遂 六
銖

蜀椒

當歸 各十
二銖

右十味為末蜜和丸如梧子大空腹服三九日三稍

稍加以小便利為度 千金翼加黃連一兩大黃十八
銖名茵陳丸治黑疸身體闇黑

小便
澀

半夏湯治酒癖陰胃心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至

小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所

致方

半夏升一

生薑

黃芩

茵陳

當歸各一兩

前胡

枳實

甘草

大戟各二兩

茯苓

白朮各三兩

右十一味呔咀以水一斗煮取三升分作三服

牛膽圓治酒疸身黃麴塵出方

牛膽一枚

芫花升一

蕘花升半

瓜蒂兩三

大黃兩八

右五味四味呔咀以清酒一斗漬一宿煮減半去滓

內牛膽微火煎令可丸如大豆服一丸日移六七尺
 不知復服一丸至八九丸膈上吐膈下下或不吐而自
 愈

大茵陳湯治內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊
 數者大發黃多是酒客勞熱食少胃中熱或溫毒內熱
 者故黃如金色方

茵陳

黃蘗 各一兩半

大黃

白朮 各三兩

黃芩

甘草

茯苓

梔萸根

前胡

枳實各二兩

梔子二十枚

右十一味以水九升煮取三升分三服得快下消息三四日更治之

茵陳圓治氣淋臏脹腹大身體面目悉黃及酒疸短氣

不得息方

茵陳

天門冬

梔子各四兩

大黃

桂心各三兩

通草

石膏各二兩

半夏半升

右八味蒸大黃通草天門冬半夏梔子曝令乾合搗

篩蜜丸如大豆服三丸日三忌生魚以豆羹服不得用酒一方去石膏內滑石二兩不知加至十丸

黃家至日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之當膀胱急小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹臃脹而滿如欲作水狀大便必黑時溇泄此女勞疸非水也腹滿者難治

硝石礬石散治女勞疸方

硝石

礬石

各半兩

右二味治下篩大麥粥汁服方寸匕日三重衣覆取
汗病隨大小便出小便正黃大便正黑

黃疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體黃額黑大
便溏黑足下熱此為女勞腹滿者難治治之方

滑石

石膏各等分

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三小便極
利則瘥

針灸黃疸法

正面圖第一

寅門
脣裏

上斷
顛顛

上脣
俠人中

舌下
俠承漿

巨關
陰縫

上管

寅門穴從鼻頭直入髮際度取通繩分為三斷繩取一

分入髮際當繩頭針是穴治馬黃黃疸等病

上斷裏穴正當人中及脣針三鏗治馬黃黃疸等病

上脣穴入口裏邊在上縫赤白脉是針三鏗治馬黃黃

疸四時等病

舌下穴俠舌兩邊針治黃疸等病

脣裏穴正當承漿裏邊通齒斷針三銓治馬黃黃疸寒暑溫疫等病

顛顛穴在眉眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治四時寒暑所苦疸氣溫病等

俠人中穴火針治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者

俠承漿穴去承漿兩邊各一寸治馬黃急疫等病

巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病

上管穴在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病

男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黃黃疸等病若女人玉

門是穴男女針灸無在

覆面圖第二

風府
肝輸

熱府
脾輸

肺輸
腎輸

心輸
脚後跟

風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸針之治頭中

百病馬黃黃疸等病

熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分針灸無在

治馬黃黃疸等病

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸五分灸主
黃疸通治百毒病

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸五分

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸五分

脚後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸
毒等病

側面圖第三

耳中
臍石子頭

頰裏

手太陽
錢孔

太衝

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃黃疸寒暑

疫毒等病

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針主治馬黃

黃疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸

臍石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太澤澤當文
作淵

向上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病

錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸
太衝穴針灸隨便治馬黃黃疸溫疫毒等病



備急千金要方卷三十四

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣秦聯登