

百六十五六

漢	書	門
三	六	八
九	〇	八
冊	架	函
號	類	

庫	文	閣	內
函	一	六	〇
架	冊	號	類
漢	書		

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (130)
函號	300 211






Faint vertical text in columns, possibly bleed-through from the reverse side. The text is largely illegible due to fading.

Large area of very faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side.

67



重校聖濟總錄卷一百六十五

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校司

產後門

產後下痢

產後腫滿

產後小便不通

產後大便不通

產後下痢

論曰冷熱不調則水穀之精不化不化則腸胃虛弱冷熱之氣乘虛入客故為痢也婦人產後血氣

不足腸胃俱虛冷熱之氣易為傷動故冷則色白熱則色赤二者兼之則赤白俱下

治產後赤白痢臍腹撮痛當歸湯方

當歸 切焙 犀角 屑 黃芩 去黑心 黃連 去鬚
各一兩 二兩

右四味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後冷熱痢腹痛駐車丸方

乾薑 二兩 微炮 黃連 去鬚 六兩 阿膠 炒別 為末

當歸 剉各 二兩

右四味除膠外擣羅為末用多年陳醋消膠令

鎔和為丸併手丸如梧桐子大每服三十九以

陳米飲下日再服甚者如丸數

治產後赤白痢久不止臍腹疴痛地榆飲方

地榆 剉焙 乾 酸石榴皮 各一兩 黃連

去須 當歸 剉炒 二兩

右四味擣為麤散每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓食前溫服

治產後脾胃虛冷水穀不化脹滿或時寒極及下

痢温脾丸方

乾薑炮 人參 桔梗炒 甘草炙 各三兩 法麩各五

炮桂去麋皮 附子炮裂去皮臍 細辛去苗葉 枳實各二兩

三枚去 吳茱萸湯洗焙 大麥蘖炒 各五兩

右一十一味擣羅為末煉蜜和丸如梧桐子大

每服二十九温酒下加至三十九日三

治產後下痢赤白腹痛煩熱當歸湯方

當歸剉 厚朴去麋皮生薑汁炙令香 黃連去須 各一兩半

肉豆蔻去殼 甘草炙 各一兩

右五味麋擣篩每服三錢匕水一盞煎至七八

去滓温服食前

治產後下痢赤白心煩腹痛芍藥飲方

芍藥二兩 甘草炙 阿膠炙 艾葉炙 當歸剉 各二兩

生乾地黄炒 各二兩

右六味擣為麋散每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓温服不拘時

治產後冷熱痢久下不止烏梅丸方

烏梅二百枚 當歸四兩 乾薑微炮 桂去麋皮 附子十兩

炮裂去皮

黃連

去須十兩

蜀椒

去目并開口者炒出汗四兩

細辛

去苗葉

人參

黃蘗

各六兩剉

右一十味除烏梅外各搗羅爲末再合和勻以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之搗如泥盤中與藥摻令相得鍊蜜和杵二千下丸如梧桐子大每服十九食前米飲下加至二十九日三

治產後赤白痢日久不止腸痛阿膠丸方

阿膠

炒令燥

黃連

去須

赤茯苓

去黑皮

當歸

剉炒

黃蘗

各一兩

乾薑

三分

炮

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下食前日再

治產後赤白痢腸腹疔痛烏梅黃連丸方

烏梅

去核炒

黃連

去須

當歸

剉炒

阿膠

炒令燥各一兩

蠟

一兩半

右五味除蠟外搗羅爲末鍊蜜和丸如梧子大每服三十九米飲下日三服

治產後赤白痢腸鳴腹痛黃連丸方

黃連

去須

當歸

剉炒

胡粉

阿膠

炒令燥各一兩

半無食子 二枚

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服三十丸食前米飲下

治產後赤白痢日久臍腹冷痛菜萸丸方

吳茱萸 一兩黑豆 黃連 去須剉 一兩半

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服二十丸煎芍藥湯下空心食前服

治產後赤白痢膿血相兼疔痛黃耆湯方

黃耆 剉一兩 赤石脂 一兩 阿膠 炒令燥 黃連 去須各一

兩黃蘗 三分 白朮 一兩 龍骨 一兩 火燒紅

右七味鹿藿篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫服日二夜一

治產後赤白痢臍腹痛當歸芍藥湯方

當歸 剉炒 芍藥 地榆 龍骨 火燒紅 黃連 去須

各一 艾葉 炙 甘草 炙 剉 黃芩 乾薑 炮 厚朴

去麋皮生薑 汁炙各三分

右一十味鹿藿篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服食前日二

治產後下痢赤白日久羸瘦黃連湯方

黃連去須 甘草炙 熟艾炙 芍藥 乾薑炮 當

歸剉炒 人參各一兩

右七味鹿藹篩每服二錢匕水一盞煎七分去

滓溫服食前日三

治產後血痢結澀疔痛當歸丸方

當歸剉炒 甘草炙 白朮各一兩半 桂去麁皮 人參各

分 桑根白皮剉 乾薑炮 細辛去苗葉各一兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服三

十丸米飲下空心食前日三服

治產後痢赤如血煩熱渴躁腹痛阿膠散方

阿膠炒令燥 黃連去須 黃蘗 芍藥 地榆剉

甘草炙剉 虎杖酒浸炙剉 艾葉各一兩半

右八味搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前

日再服

治產後血痢腹痛不止訶梨勒散方

訶梨勒炮去核 阿膠炒令燥 黃蘗 地榆 甘草

剉

右五味等分搗羅為散每服二錢匕米飲調下
食前服日三

治產後血痢不止牛角鯁散方

黃牛角鯁 二兩半 燒灰 橡實 一兩 炒 側栢葉 半兩 剉焙

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲調下空心

食前服

治產後腸胃氣虛泄痢木穀燥濕丸方

黃連 去須三分 烏梅肉 熬二分半 酸石榴皮 當歸 剉焙

赤石脂 各半兩 乾薑 炮一兩半

右六味搗羅為末鍊密丸如梧子大空腹米飲
下二十九加至三十九

治產後下痢赤白當歸湯方

當歸 切焙 酸石榴皮 炒 地榆 各三兩 大豆黃 炒五

合糯米 炒二合 甘草 炙剉半兩

右六味麝搗篩每服三錢七水一盞入薤白二
寸切同煎至八分去滓空心食前溫服

治產後下痢赤白久不差甘草散方

甘草 半生半炙 黃連 去須炒各二兩

右二味搗羅為散每服二錢七温漿水調食前服

治產後痢不止木香散方

木香 三分 訶梨勒皮 酥炒令黄 一兩半

右二味搗羅為散研勻每服二錢七米飲調下

治產後冷痢疾桂薑散方

桂 去麤皮以薑汁半 阿膠 炙令 當歸 切焙各 合塗炙合薑汁盡 半兩

右三味搗羅為細散空心以陳米飲調下二錢

七日再服

治產後痢疾春蕨散方

右取新生蕨菜不限多少陰乾為細散每日空

心陳米飲調下三錢七

治產後冷痢疾乳薑散方

右以乾薑二兩炮搗羅為細末以人乳汁和作

餅以慢火炙令黄熟研為細散每服空心陳米

飲調下三錢七

治產後下痢久不止芸薑食方

芸薑 不拘多 少洗淨

右一味爛煮飽食佳

治產後血痢不止樗皮丸方

臭樗皮根剉炒

右一味擣羅爲末水和丸如棗核大以麩裏捏作小餛飩二七枚煮熟空腹吞之日再

治產後冷痢不止散方

黃連去須炒 乾薑炮 訶梨勒麩裏煨去核 地榆炙剉各一

兩甘草炙剉 烏梅肉炒三分

右六味擣羅爲散每服二錢七陳米飲調下食

前服

治產後氣痢不止腹痛木香散方

木香三分 訶梨勒半生半煨並去核一兩一分 當歸切

白朮 肉豆蔻去殼各半兩

右五味擣羅爲散每服二錢七陳米飲調下

治產後水瀉不止厚朴湯方

厚朴去麁皮拌生薑汁炙 白茯苓去黑皮 黃連去須各半兩

當歸剉炮一分 枳殼去瓢麩炒一分

右五味剉如麻豆大每服三錢七水一盞煎至

七分去滓空腹温服

治產後下痢赤白兼下血赤石脂湯方

赤石脂 黃連 去須 地榆 各三分 甘草 炙一分 厚

朴 去麋皮生薑汁炙到二分半 乾薑 炮裂一分半 當歸 切焙半兩

右七味麋擣篩每服三錢匕水一盞入薤白三

寸切同煎七分去滓食前温服

治產後下痢赤白久不止身面虛腫大豆飲方

大豆 炒一升 小麥 半升 蒲黃 半兩 吳茱萸 炒一兩

右四味麋擣篩每服五錢水一盞半煎至八分

去滓温服

治產後心腹脹滿飲食不消時作水痢白朮湯方

白朮 厚朴 去麋皮生薑汁炙 草豆蔻 去皮 枳殼 去瓢

麴炒各三分 白茯苓 去黑皮 木香 人參 各半兩

右七味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入

生薑三片同煎至八分去滓温服日二

治產後冷痢臍下痛羸瘦不能食白朮散方

白朮 芍藥 炒各三分 木香 半生 黃連 去須炒 縮砂

人 各半兩 陳翹 炒一兩 厚朴 去麋皮生薑汁炙一兩

右七味搗羅為散每服二錢匕煎乾薑米飲調下

治產後赤白痢臍下疔痛當歸飲方

- 當歸 切焙
- 赤芍藥
- 艾葉 炒
- 地榆
- 白龍骨
- 黃耆 剉各一兩
- 厚朴 去麤皮生薑汁炙
- 黃芩 去黑心
- 乾薑 炮
- 甘草 炙各三分

右一十味鹿搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治產後赤痢黃連丸方

- 黃連 去須炒一兩
- 阿膠 炙燥
- 當歸 切焙
- 乾薑 炮各三分
- 赤茯苓 去黑皮半兩
- 甘草 炙剉一分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服二十丸空米飲下

治產後冷痢臍下痛不能食白豆蔻散方

- 白豆蔻
- 白朮
- 甘草 炙剉
- 肉豆蔻 人
- 白茯苓 去黑皮
- 芍藥 各三分
- 桂 去麤皮
- 陳橘皮 去白焙各
- 枳殼 去瓢麩炒一分

右九味搗羅為散每服二錢匕空腹米飲調下

治產後血痢不止臍腹痛地榆湯方

地榆 芍藥 各三分 阿膠 炙燥 當歸 切焙 甘草

炙判 木香 各半兩 乾薑 炮裂一分

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞煎至八分

去滓溫服

治產後赤白痢芍藥丸方

芍藥 炒 艾葉 各一兩 地榆 炒 當歸 切焙 白朮 各

分 龍骨 碎 乾薑 炮各半兩

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

治產後痢疾紫桂丸方

桂 去麤皮 甘遂 丁香 芫花 醋炒焦 木香

巴豆 去心皮壓去油 硃砂 各等分

右七味搗羅為細末醋麩糊為丸小菴豆大每

服二丸至三丸溫水下加減更量虛實此丸取

積最勝不以久近皆能化逐產後逐積滯尤妙

產後腫滿

論曰產後氣血俱虛寒濕客搏致脾胃怯弱不能

播散諸氣使水血不分流溢肌膚故為腫滿利其小水則病可愈

治產後通身腫滿氣喘煩悶防已湯方

防已 枳殼 去瓢麩炒 桑根白皮 剉

芎藭 萎蕤 當歸 切焙各一兩 葶藶 隔紙炒一分

木香 半兩

右八味麩搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破煎至七分去滓溫服以疎利腫消為度

治產後腫滿因宿有抑鬱滯氣留結不散變為浮

腫煩悶欬逆惡血不行大腹皮湯方

大腹皮 赤茯苓 去黑皮 當歸 切片

紫蘇莖葉 青橘皮 湯浸去白炒 甘草 炙剉

木通 剉各一兩 桑根白皮 剉 木香 檳榔 剉

大黃 剉炒各半兩

右一十一味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治產後浮腫煩悶羌活湯方

羌活 去蘆頭 青橘皮 去白麩炒各半兩 芎藭

枳殼

去瓢 麩炒

生乾地黄

焙

桑根白皮

白朮

剉各一兩

赤茯苓

去黑皮

牽牛子

略炒

訶梨勒皮

微炒

木香

各半兩

石一十一味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時候

治產後腫滿喘咳防已枳殼湯方

防已

一兩

枳殼

去瓢 麩炒二兩

木香

半兩

桑根白皮

剉

當歸

焙切

紫蘇莖

剉

檳榔

剉各一兩

右七味麩搗篩每服五錢七水一盞半煎至一

盞去滓溫服不拘時候

治產後腫滿喘急咳嗽貝母湯方

貝母

去心

桑根白皮

剉

紫苑

赤茯苓

去黑皮

五味子

各一兩

杏仁

去皮尖雙仁別研

人參

各一兩半

葶藶

隔紙炒半兩

右八味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

治產後偏身腫滿牽牛子丸方

牽牛子

半生半熟

枳殼

去瓢 麩炒各一兩

當歸

切焙

生乾地黄焙 芎藭 桑根白皮剉 木香

訶梨勒炮去核 防已各半兩

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧子大每服二十丸煎桑根白皮湯下不拘時

治產後腫滿心煩氣悶腸胃不利羚羊角湯方

羚羊角屑 延胡索 枳殼去瓢 芍藥

劉寄奴 檳榔剉 桑根白皮剉等分

右七味麩搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後腫滿煩悶喘欬枳殼丸方

枳殼去瓢 防已各二兩 訶梨勒皮半兩

大黃炒一兩 當歸切片二兩 郁李子去皮別研半兩

桑根白皮剉一兩

右七味除研外搗羅爲末拌勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九生薑紫蘇湯下不拘時

治產後通身暴腫煩悶不食商陸湯方

商陸剉二兩 防風去叉一兩 甘草炙半兩 附子炮裂去皮臍一

赤小豆二合 麻子人三合

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓温服不拘時

治產後偏身頭面浮腫乾地黄湯方

生乾地黄焙 白朮 芍藥 赤茯苓去黑皮

桑根白皮剉二兩 甘草剉半兩 赤小豆五合 黃耆

剉 商陸根剉各二兩

右九味並生用麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓温服不拘時

治產後頭面四肢腫滿氣喘欬嗽貝母丸方

貝母去心 赤茯苓去黑皮 紫苑 桑根

白皮剉 杏仁去皮尖 雙入 五味子

人參各一兩 大棗一十枚 煮熟去皮核 別研

右八味除研二味外擣羅爲末以杏仁棗膏拌

如乾更入鍊蜜少許丸如梧桐子大每服二十

丸至三十丸濃煎商陸根湯下不拘時

治產後頭面浮腫兩脅痛枳殼丸方

枳殼去瓢麩炒 訶梨勒煨去核 當歸切焙

大黃剉炒 防已 芍藥微炒 各 郁李人酒浸

去皮 木香 芎藭 甘草 炙剉各半兩 牽牛子 一兩

炒搗取半兩用

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如~~子~~大每服

二十九煎桑白皮棗湯下加至三十九

治產後腫滿不能食防已湯方

防已 二兩 防風 去義 芎藭 附子 炮裂去皮臍 甘

草 炙剉 當歸 切焙 陳橘皮 去白焙 赤小豆 揀

合

右八味吹咀如麻豆每服三錢七水一盞入生

薑三片同煎至六分去滓食前溫服

治產後血風通身浮腫柘黃湯方

柘黃 枳殼 去瓢 白朮 地丁 各一兩半 黃耆 剉

人參 欬冬花 桔梗 炒各二兩

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至六分

去滓溫服不拘時

產後小便不通

論曰產後血氣俱弱津液虛少將溫過度熱入膀胱

氣脈內燥壅塞不通始則淋瀝甚則不通令人

少腹繞臍脹痛氣滯滿於內亦令胞轉治法使氣得通即愈

治產後小便不通澤瀉散方

澤瀉剉二兩 井泉石半兩研 車前子洗焙乾 赤茯苓

去黑皮剉 當歸切各一兩半炒 葶藶子紙上炒 甘遂生各半兩

右七味搗羅為散每服一錢匕蜜湯溫調下食

前日再服

治產後小便煩悶滑石湯方

滑石 當歸切焙 木通剉各一兩 冬葵子炒 黃芩

去黑心 麥門冬去心焙各三分

右六味鹿藹篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓溫服食前服

治產後小便不通木通湯方

木通細剉 黃芩去黑心 石韋去毛各一兩 榆白皮細切

冬葵子炒各二兩 甘草炙三分 白朮一兩半剉

右七味鹿藹篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服食前日二

治產後小便不通葵根湯方

葵根 二兩 洗剉 亂髮灰 半兩 大黃 桂 去麁皮 滑石

木通 剉 當歸 剉炒各一兩

右七味麁搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓温服食前日再

治產後小便不通髮灰湯方

淨髮 燒灰 車前子 大黃 剉炒 桂 去麁皮 當歸

切焙 滑石 各一兩 冬瓜子 五合 木通 剉一兩半

右八味麁搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓温服日二夜一

治產後小便不通黃芩湯方

黃芩 去黑心 瞿麥 取穗 當歸 切焙 冬葵子 炒

木通 剉各一兩

右五味麁搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓温服日三

治產後小便不通車前子湯方

車前子 洗焙 瞿麥 取穗 當歸 切焙各一兩

黃芩 去黑心洗 鬱金 各半兩剉

右五味麁搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去

重刊聖濟總錄 卷一百一十五 天 產後門

滓温服不拘時日二

治產小便不通葵子湯方

葵子 炒 石膏 生研 滑石 各一兩 貝齒 四枚

阿膠 炒令燥

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温服日三

治產後小便秘澀小腹疼痛當歸湯方

當歸 切焙 白芷 剉微 紫葛 芍藥 各半

白茅根 胡荽 各三分

右六味細剉每服五錢匕水一盞半入葱白五寸同煎至八分去滓温服食後夜臥

治產後小便秘澀小腹疼痛榆白皮散方

榆白皮 剉 木通 剉炒 黃芩 去黑心 葵子 炒各半兩

芍藥 芎藭 滑石 搗研 蒲黃 各三分

右八味搗研為散每服二錢匕濃煎木通湯調下

產後大便不通

論曰大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗

重刊聖濟總錄 卷一百一十五 產後門 三

胃中枯燥潤養不足糟粕壅滯故大便難而或致不通凡新產之人喜病此者由去血多內亡津液故也

治產後大便秘澀不通臍腹堅痛十聖丸方

檳榔剉 木香 芫蕒 羌活去蘆頭 官桂去皮

一兩 大黃剉蒸 郁李人去皮尖別 當歸切焙

熟乾地黄焙 人參各二兩

右十味除郁李人外搗羅爲末入郁李人和勻鍊蜜爲丸梧子大每服二十九米飲下不拘時

以利爲度

治產後大便不通三腕湯方

大腹皮剉 紫蘇莖葉 羌活去蘆頭 甘草炙

木瓜切焙 芫蕒 陳橘皮去白切焙 檳榔剉 沉香

白朮 木香各一兩

右十一味麤搗篩每服二錢七水一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後大便秘澀不通訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核 大黃剉炒 當歸切炒 熟乾地黄

焙大麻人別研人參各一兩半

右六味搗羅五味為末與大麻仁同研令勻鍊蜜和丸如梧子大每服三十九米飲下不拘時服

治產後大腸虛結秘澀不通厚朴丸方

厚朴去麁皮生人參 陳橘皮去白 大黃剉

郁李仁去皮別研如膏各一兩 當歸切焙一兩半

右六味搗羅五味為末入郁李仁膏同研令勻鍊蜜和丸如梧子大每服三十九溫水下不拘時

治產後大便不通人參丸方

人參 檳榔剉各一兩半 當歸切焙一兩 厚朴去麁皮生

炙透三分 郁李仁去雙仁皮尖研如膏半兩

右五味搗羅四味為末入郁李仁膏同研勻鍊蜜為丸如梧子大每服二十九溫水下加至三十

丸不拘時服

治產後大便秘澀不通大黃丸方

大黃剉炒 赤芍藥 當歸切焙 厚朴去麁皮

透各一兩 枳實去瓢 大麻仁別研 生地黄焙各三分

右七味搗羅六味為末與麻人膏同研勻鍊蜜

和丸如梧子大每服二十九米飲下不拘時服

治產後大便秘澁不通調胃散方

大黃剉炒 當歸切焙 麥門冬去心焙 桃仁去雙

尖炒 生地黄焙 菖蒲剉 鼈甲醋炙去 柴胡去

各一兩 厚朴去麋皮姜 秦艽去苗 黃連去須各

桂去麋皮 吳茱萸湯洗去涎焙 乾炒半兩

右十三味擣羅為散每服二錢七溫水調下空

心食前服

治產後風熱大便秘澁大黃丸方

大黃剉 大麻仁研如膏 當歸切焙各三兩 生地黄四

兩

右四味擣羅三味為末與麻仁膏研勻鍊蜜和

丸如梧子大每服二十九米飲下以利為度

治產後腸胃燥熱大便秘澁郁李仁飲方

郁李仁去雙仁皮尖 朴硝研各一兩 當歸切焙 生

地黄焙各一兩

右四味將二味麋擣篩與別研者二味和勻每

服三錢七水一盞煎至七分去滓溫服未通更

服

治產後大便秘澁升麻湯方

升麻 大黃剉各一兩 當歸切焙二兩 生地黄焙三兩

前胡去蘆頭二兩半 山梔子仁微炒二兩

右六味麤擣篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓食前溫服

治產後熱燥大便秘澁升麻湯方

升麻 枳實去瓢麩炒 黃芩去黑心各三分 大黃剉 梔子

仁 杏仁去雙仁皮尖麩炒 當歸切焙 人參 甘草

炙 生地黄焙各一兩

右十味麤擣篩每服五錢七水一盞煎至七分去滓食前服

治產後大便不通皂莢內藥方

豬牙皂莢生 杏仁湯退去皮尖生 蛇蛻皮微炙

乾薑炮各一分 蜜半兩

右五味先擣前四味細羅為末於銚子內熬蜜三兩沸後下藥末不住手攪候可丸即丸如棗核大每一丸用綿紙裹藥以麻油潤藥上內下

部中仰卧便通未通再內

治產後熱毒氣結燥大便不通壅滯氣悶疼痛腰

重脅脹大腹皮湯方

大腹皮

五枚

枳殼

去瓢

赤芍藥

剉各

一兩

秦艽

去苗

羌活

去蘆頭

天門冬

去心

焙

乾三分

生乾地黄

焙一兩

甘草

炙三分

郁李

去皮

半兩炒

右九味麤擣篩每服三錢七水一盞煎至七分

去滓温服得利爲度

治產後大腸結燥秘澁氣壅脹悶欲死宜蜜煎導

方

蜜 半椀

右一味銚內微火煎之攪令稠如餳取出搓如

手指大小約長二寸內下部中須臾卽通未通

再內不妨

治產後大便不通大腸結燥腹中壅脹內藥方

皂莢

不蛀者一挺去皮子酥炙擣爲末

鹽豉

半合

白蜜

一合

右三味先熬蜜令消次下鹽豉皂莢末慢火煎

不住手攪候如餳卽止丸如棗核內一丸入下

部中未通可內三五丸不妨藥入後自化如得
通利即隨出

治產後下部閉塞大便秘結不通以烏梅導方

烏梅 四十枚

右一味溫湯浸取肉搗丸如小檳榔大每用一
枚內下部中立通

治產後大腸熱燥糟粕結鞭藥勢不入大便不通
宜以皂莢導方

皂莢 肥不蛀者去皮子一挺

右一味搗羅為末鍊蜜和丸如棗大取一九內
下部中須臾即通

治產後大便不通七八日以上者溫中丸方

硫黃 用柳木細研飛過生用

右一味用水浸炊餅和丸如梧子大每服二十
丸或三十丸用木香少許煎湯吞下即効

治大便不通不問老幼皆可喫中和散方

附子 一兩半生半熟 大黃 一兩半生半炒

右二味同碾為散每服二錢七溫米飲調下臨

重校聖濟總錄
卷一百六十五
三
燕遠堂
卧服

重校聖濟總錄卷一百六十五終

重校聖濟總錄卷一百六十六

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

產後門

產後大小便不通 產後乳汁不下

產後妬乳 產後乳結核

產後乳結癰

產後大小便不通

論曰內經謂大腸與膀胱受五藏濁氣名曰傳化

重校聖濟總錄 卷一百六十六 產後門 一 燕遠堂

之府此不能久留輸寫者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸閉澀不能傳導故大小便俱不通也

治產後大小便不通茯苓丸方

赤茯苓去黑皮 當歸切片

人參 枳殼去瓢 白朮剉炒 大麻人別研如膏

各半 大黃剉炒

右八味擣羅七味為末與麻人研勻鍊蜜和丸如梧子大每服二十九煎茅根湯下以利為度

治產後風氣壅結大小便不通赤芍藥丸方

赤芍藥一分 官桂去麋皮 瞿麥穗三分

大黃剉炒 檳榔剉 當歸切焙 羌活去蘆頭

右七味擣羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服二十九丸米飲下以利為度

治產後因腫滿小腹急脹大小便不通木香丸方

木香炮 牽牛子微炒二兩別擣羅為末 防已 陳橘

皮去白炒各 羚羊角鎊 訶梨勒炮去核 檳榔剉

一兩

右七味擣羅為末鍊蜜和丸如梧子大每服二十九丸生薑橘皮湯下以利為度

治產後大小便不通榆白皮湯方

榆白皮剉碎桂皮去麂當歸切焙甘草炙剉滑
石各一兩

右五味鹿搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食前溫服以利為度

治產後大小便不通葱膠湯方

葱白一握牛膠一片廣二寸長四寸

右二味剉碎以水三升和煮消盡去滓溫服

治產後冷熱不調大小便不通木香煮散方


木香炮為末青黛研各一兩

右二味再研勻每服二錢水半盞麻油少許同煎十餘沸和滓溫服之少頃即通未通再服

治產後藏府壅滯腸胃燥澀大小便秘三脫散方

大腹皮炙剉紫蘇莖葉 沉香 木瓜切焙
羌活去蘆頭白木 芎藭 木香 甘草炙

陳橘皮去白檳榔麩裏煨熟去麩



右十一味搗為麤散每服三錢七水一盞煎六分去滓温服不拘時

治產後大小便不通腹脹氣急芍藥湯方

- 赤芍藥 芒消 別研 杏仁 去皮尖雙仁 麩炒各一兩
- 大麻仁 三分研 如膏 大黃 剉炒 當歸 切炒各二兩

右六味將四味麤搗篩入大麻仁同研令勻每服三錢七水一盞半煎八分去滓下芒硝末半錢七温服以利為度

治產後大小便不通臍下妨悶兼痛石韋湯方

- 石韋 去毛 赤芍藥 各一兩 當歸 二兩 剉炒 赤茯苓 去黑
- 皮 瞿麥 取穗各一兩 冬葵子 二合 炒 大黃 半兩 剉

右七味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓温服以利為度

治產後關格閉塞大小便不通大黃丸方

- 大黃 二兩 剉炒 芒硝 一兩 別研 黃芩 去黑 赤芍藥
- 杏仁 去雙仁皮 尖麩炒 赤茯苓 去黑 生地黃 焙各一兩

右七味搗羅為末煉蜜和杵丸如梧子大每服二十九食前煎粟米飲下以利為度

治產後大小便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩悶氣短汗出腹滿濡藏湯方

生葛根 五兩切無生者用乾葛二兩 大黃 半兩剉炒

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服以利為度

治產後內熱大小便不通柴胡湯方

柴胡 去苗 黃芩 去黑心 陳橘皮 湯浸去白切焙 羚羊角 鑄澤瀉各三分 赤茯苓 去黑皮 梔子人 各一兩 芒消 別研 石膏 各一兩半


右九味麤搗篩八味每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓下芒消末半錢匕更煎一沸溫服

治產後大小便不通梔子人湯方

梔子人 石膏 碎 黃芩 圓小者 澤瀉 柴胡 去苗 赤芍藥 剉 麥麩 各一兩半 車前葉 切半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服以利為度

治產後胃膈噎塞心下痞堅行滯氣消飲食通大小便木香丸方



木香 二兩 牽牛子 二十四兩炒香別搗取末一十二兩 草澄茄

補骨脂 炒 檳榔 酸粟米飲裏濕紙煨熟去飯各四兩

右五味擣四味為末與牽牛末和勻漸滴井華

水和丸菜豆大每服四十九茶湯熟水食後任

下

治產後大小便不通臍下疼痛兼腹滿急脹檳榔

散方

檳榔 剉半兩 桂 去麤皮 芎藭 獨活 去蘆頭 木香 各

兩 大黃 剉 赤茯苓 去黑皮 郁李人 去皮尖 雙人

右八味擣羅為末每服二錢七食前溫水調下

以利為度

治產後大小不通并服瀉藥腹脹氣喘方

鹽 半斤炒 令變色

右一味先以漿水一斗半煎沸下鹽在湯中攪

和傾盆中看冷熱通手即入盆中坐浸腰腹須

臾便通湯或漸冷即入新熱湯投之常令稍熱

人困即扶起少頃又浸

治產後大小便秘澀木通飲方

木通 剉炒 冬葵根 剉合陳橘皮 湯浸去黃芩
去黑甘草 炙剉 當歸 切焙 蒲黃 微炒 瞿麥穗
心 各半 兩

右八味麤擣篩每服五錢七水一盞煎至八分
去滓日再服

產後乳汁不下

論曰新產水血俱下暴傷津液氣脉未順所以乳
汁不下也若能調其衝任治手太陽少陰之經不
足則乳脉自然流行若其經虛氣脉閉而不通雖

強治之亦無益也

治產後乳無汁石鐘乳湯方

石鐘乳 細研 白石脂 各一分 木通 三分 消石 一分
桔梗 炒二兩

右五味剉碎如麻豆大每服三錢七水一盞煎
七分去滓溫服不拘時

治產後乳不流行下妳如聖散方

地膽草 枯蘘根 萵苣子

右三味等分擣羅為散每服二錢七溫葱酒調

下日三四服

治產後乳無汁漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭 木通各一兩 鐘乳半兩

右三味搗剉如麻豆大每服三錢匕水一盞黍米半合同煎後米熟瀘去滓温服不拘時

治產後乳汁不下木通湯方

木通 鐘乳各一兩 漏蘆去蘆頭二兩 栝蔞根

甘草各一分

右五味搗剉如麻豆大每服三錢匕水一盞半

黍米一撮同煎候米熟去滓温服不拘時

治產後乳汁不下桔梗湯方

桔梗一兩 漏蘆去蘆頭 鐘乳粉各半兩 蟾螬三分炙乾

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎六分去

滓温服不拘時

治產後乳汁少或不下木通飲方

木通剉一兩半 甘草炙剉 枳殼去瓢各半兩 芍藥

蘆漏去蘆頭 桑根白皮剉 黃芩去黑心 淡竹葉

一握切

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產後乳汁少或不下猪蹄湯方

猪蹄 四隻以水五升煮汁三升澄清 瞿麥 去梗 漏蘆 去蘆頭 木通 剉各一兩

右四味內三味麤搗篩每服三錢匕猪蹄汁一盞煎七分去滓溫服不拘時

治產後乳無汁麥門冬散方

麥門冬 去心焙 鐘乳粉 理石 研 土瓜根 各半兩

蟻螬 七枚炙乾 乾棗 七枚去核炒

右六味搗羅為散每服三錢匕濃煎木通湯調下不拘時服

治產後因病乳汁少或不下猪蹄湯方

母猪蹄 一具細剉 白油麻 二合洗研細 蟻螬 七枚炙乾為末

右三味先將猪蹄用水五碗煮令熟入研了油麻再煮俱熟入蟻螬末略煮便傾出細絹濾澄清時煖一盞飲之不拘時

治乳汁不下王瓜酒方

右以王瓜不計多少用酒煮至爛熟飲酒嚼王瓜下其乳脉白通

治產後乳汁不下或汁少鬼箭湯方

鬼箭羽 五兩 剉碎

右一味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎七分去

滓温服不拘時

治產後乳汁不下寄生湯方

桑寄生 三兩 握 細剉

右一味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎七分去

滓温服不拘時

治產後乳汁不下或少括萋酒方

括萋 黃大者一枚 剉碎

右一味熟擣令爛用好酒五盞煎取三盞去滓

每服一小盞煖服不拘時

治產後乳無汁露蜂房散方

露蜂房 三枚 剉碎 畧炒

右一味擣羅為散每服二錢匕温酒調下不拘時服

重校聖濟總錄 卷百三十一 治產後乳無汁括蕒散方

括蕒根 五兩切 焙乾

右一味搗羅為散每服二錢匕以白粥飲調下
溫酒亦得早晨日午至夜各一

治產後乳無汁魚灰散方

鯉魚頭 五枚剉碎 瓦上燒灰

右一味細研為散每服二錢匕以溫酒調下早
晨午時夜卧各一

治產後乳汁少或不下王瓜根湯方

王瓜根 五兩以水五碗閉搗絞取汁三碗去滓不用

右一味取汁每服一盞入酒少許同煎七分溫
服不拘時

治產後乳汁不下萵苣飲方

萵苣子 一合 淘 糯米 各半 合淘 粳米 各半 合淘

右三味用甘草半兩煎汁一升研前三味濾去
滓分作三服服之立下

又方

木通 剉 鐘乳 細研為粉 麥門冬 去心焙 各半兩

重校聖濟總錄 卷百三十一 產後門 十一

右三味搗羅為散每服二錢匕食後溫酒調下
日再

治乳無汁下乳漏蘆散方

漏蘆 三分 括蔞根 各一兩

木通 劉二 蟾蜍 研三

右五味搗研勻每服二錢匕食後溫酒調下日
再服

又方

母豬蹄 一隻 木通 三兩

右二味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半
煎八分去滓食後溫服并取此汁作羹亦得

產後妬乳

論曰氣血流行則上為乳汁下為月水上下通達
不失常度是為平人宜通而塞則為痛熱氣復乘
之則為腫向之流行者壅遏矣儻失調治則結鞭
成核身體壯熱甚憎風遂為乳癰世傳氣結乳閉
亦為妬乳者此也

治產後乳汁不泄結滯腫痛連翹湯方

連翹 未門者 射干 杏仁 泡去皮尖 大黃 剉炒

柴胡 去苗 甘草 炙剉 升麻 防已 芍藥

芒消 研各一兩

右十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎八分去滓溫服不拘時

治產後妬乳乳汁不泄結之癰腫元參湯方

元參 芍藥 連翹 去梗 防已 射干

升麻 剉 芒消 白斂 大黃 剉炒 杏仁 去皮尖雙

仁炒各一兩 甘草 炙三分

右十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎一

盞去滓溫服不拘時

治產後妬乳乳汁不通踈腫痛漏蘆散

漏蘆 去蘆頭 地錦 蔓荆實 去白皮 威靈仙 去土

當歸 切焙 黃耆 剉各一兩

右六味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時服

治產後乳汁不泄結成癰腫熱痛升麻湯方

升麻 元參 芍藥 生地 焙 連翹 焙 瞿麥

取穗各一兩 射干半兩 甘草炙一分

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓不拘時溫服

治產後妬乳塗傅方

野葛 芍藥 薤白 當歸 木通各半兩

附子一分春月不用此一味

右六味各細剉如麻豆大用醋浸半日後同煎沸即先煎豬脂八分一碗令煙出次入亂髮一分洗去垢煎令消次入松脂一兩半蠟半兩再

煎沸綿布濾去滓瓷合盛冷則以故帛傅乳上

乾則易之

治產後妬乳乳汁不泄蘊結成癰連翹湯方

連翹 大黃畧炒各半兩 黃耆剉一兩 犀角屑

芍藥 木通細剉 升麻 黃芩去黑心各三分 竹葉

一握切 芒消半兩

右十味麤擣篩每服三錢匕水一盞半煎八分去滓溫服不拘時

治產後妬乳壅結疼痛牡丹皮散方

牡丹皮

威靈仙

洗焙

黃耆

剉

桂皮

去麁

大黃

酒蒸當歸

切焙各一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下日三

不拘時服

治產後妬乳鹿角散方

鹿角

一兩半

故靴頭

二枚

右二味燒灰研細每服二錢匕煎當歸酒溫調

下不拘時服

治產後妬乳欲成癰鐵粉散方

鐵粉

研

細辛

去苗葉

芎藭

人參

防風

去叉

乾薑

炮

黃芩

去黑心

桂皮

去麁皮

芍藥

肉蓯蓉

酒浸

切焙各一兩

右十二味搗羅為散每服三錢匕酒調下日四

五服或膿血敗壞自出為効

治產後妬乳或癰雞屎散方

雞屎

炒乾一兩

麝香

半錢細研

右二味為細散每服一錢匕煎荆芥酒溫調下

不拘時服

重刊聖濟總錄 卷五十一 五 燕遠堂
治產後乳汁不泄結滯不消熱腫二灰散方

蔓荆實

燒存性

皂莢刺

燒存性 各一兩

右二味合研為散每服二錢匕温酒調下不拘時服

治產後妬乳結腫不消熱痛傳乳方

升麻

木香

檀香

各半兩

右三味各取成塊者逐味就沙盆內用酒少許帶濕磨三味相等即用鵝毛刷傳乳上如乾以水潤之常令濕潤一日兩次傳之

治產後妬乳結滯成癰腫發熱疼痛櫛皮湯洗方

櫛皮

二升 細切

右一味以水一斗煮取七升通手便洗不拘時頻煖洗之

治產後妬乳成癰腫或已破膿血未散天麻草洗方

天麻草

五兩 細切

右一味以水一斗煮取七升去滓通手洗之不拘時頻頻煖洗

產後乳結核

論曰產後乳結核者以氣血虛弱風邪搏之乳脉凝滯故結而為核日久不差蘊積生熱熱勝則腫甚則成癰也

治產後乳結核或成癰腫發熱疼痛枳殼湯方

枳殼

去瓢 麩炒

芍藥

人參

黃耆

剉木通

剉

當歸

切焙

桂

去麩 皮

蒺藜子

炒去 角

鷄骨

醋炙

大黃

剉炒各 一兩

右十味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後乳結核堅鞭疼痛當歸散方

當歸

切焙

芍藥

黃耆

剉蒺藜子

炒去 角

鷄骨

剉

炙附子

炮裂去 皮臍

枳實

去瓢 麩炒

桂

去麩 皮

人參

剉

薏苡仁

各一 兩

右十味擣羅為散每服三錢匕酒調服日三

治產後乳結核或堅鞭疼痛莽草散方

莽草葉

一兩

紫萸

各半

大黃

剉

赤小豆

二兩

右四味擣為末用醋調如糊傅結核上頻易之

每易則先以熱葱湯洗

治產後乳腫熱痛外傳膏方

黃連去須三分 大黃生 鼠糞炒各半兩

右三味擣羅爲末用米糊調傳乳四邊頻易之
每易先用熟葱湯洗

治產後乳結及初結作癰服此麥門冬湯方

麥門冬去心 黃芩去黑 芍藥 赤茯苓去

苓去黑 甘草 木通剉各二兩 桑寄生 防風去

人參各三兩

右十味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半
入棗二枚擘煎取一盞去滓入沙糖一棗大令
銷溫服不拘時候乳漸消減卽服後方天門冬
丸

治產後乳結核天門冬丸方

天門冬去心焙 木通剉 黃耆剉 防風去 生

地焙 桑寄生剉 人參各一兩 羌活去蘆頭 大黃

一兩 白芷 升麻各三分 澤蘭去枝 茯神去木

天雄炮裂去 黃芩去黑 枳實去瓢 五味子各

右十七味搗羅為末鍊蜜為丸梧子大每服二十九加至三十九温酒下日三

治產後乳結核疼痛或腫欲成癰外消膏方

伏龍肝 半兩 大黃 剉半兩 生薑 一分洗切研細

右三味除薑外為細末和勻用醋調作膏看大小攤貼病上早晚易之

治產後乳結核欲壞不壞托裏散方

威靈仙 洗焙 當歸 切焙 牡丹皮 芍藥 剉

黃耆 桂 去麋皮各一兩 大黃 炮半兩

右七味搗羅為散每服三錢匕温酒調下不拘時候

治產後乳腫或結核敗壞熱悶升麻湯方

升麻 白歛 各一兩半 大黃 生半兩 黃芩 去黑心一兩

芒消 研半兩 桂 去麋皮一兩 人參 黃耆 剉各三分

右八味搗為麋末每服三錢匕水一盞煎七分去滓温服不拘時

治產後乳腫煩熱蔓荆實散方

蔓荆實炒二兩 甘草炙半兩

右二味擣羅為散每服二錢匕温酒調下不拘時服

治產後乳結核腫痛發熱煩悶大黃湯方

大黃剉畧炒 芍藥 枳實劈破炒去子 馬蹄炙焦黃各一兩

右四味鹿擣篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓温服不拘時

治產後乳初覺有核漸發熱痛累日不退欲成癰

黃芩湯方

黃芩圓小者 甘草炙剉 桑寄生剉 防已去叉木

通剉 麥門冬去心焙 赤芍藥 黃耆剉 大黃各一兩

右九味鹿擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓温服不拘時

治乳結核堅韌當歸散方

當歸切焙 桂去鹿皮各半兩 芍藥 人參 枳實去瓢

麩炒各三分 蒺藜子炒去角 鷄骨炙各一兩 木通剉 黃耆剉各一兩半

右九味擣羅為散每服二錢匕空腹酒調下日再

產後乳結癰

論曰產後衝任不足氣血俱虛邪熱潛行入於足陽明之脉其直行者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中衝脉者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至胃中而散也其經為邪熱攻衝則血為之擊搏氣為之留滯擊搏則痛作留滯則腫生內經所謂營氣不從逆於內理乃生癰腫產後多有此疾

者以乳汁蘊積與氣相搏故也

治產後乳癰欲結未結發熱腫痛當歸飲方

當歸切焙 芍藥 牡丹皮 生地焙 人參

黃耆剉 大黃生 升麻 連翹各一兩

右九味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時

治產後乳結核或腫痛漸成癰煩熱黃耆湯方

黃耆剉 生地焙 麥門冬去心 升麻各一兩半 人參

赤茯苓去黑皮 當歸切炒 芍藥 遠志去心

甘草 生各半兩

右十味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治產後乳結癰腫痛煩熱鐵粉散方

鐵粉 別研 肉蓯蓉 酒浸切焙 桂 去麤皮 細辛 去苗葉

芎藭 人參 防風 去叉 乾薑 炮 黃芩 去黑心

芍藥 當歸 切焙 甘草 炙剉各一兩

右十二味擣羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時

治乳癰疼痛寒熱蛇蛻皮散方

蛇蛻皮 燒灰半兩 麝香 二錢


右二味研細每服二錢匕熱酒調下不拘時

治產後乳結癰膿敗壞不散發熱疼痛芍藥湯方

芍藥 桂 去麤皮 黃耆 剉 赤茯苓 去黑皮 生地 焙

當歸 切炒各一兩 甘草 炙剉 麥門冬 去心 人參 各一兩

右九味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大切煎至八分去滓下朴硝末一



錢七再煎令沸溫服不拘時

治產後乳癰熱痛未結膿者甘草飲方

甘草 半兩半炙半生 括蕒 一枚去皮用瓢

右二味先以酒三盞煎甘草至二盞入括蕒瓢煎至一盞去滓溫服半盞如稠卽以溫酒少許解之未効再作

治產後乳癰膿潰未潰熱痛不已括蕒散方

括蕒實 二兩 敗醬 細辛 去苗 乾薑 炮 桔梗 炒 防風 去叉 人參 厚朴 去麋皮生姜汁炙各半兩

右八味擣羅爲散每服三錢匕溫酒調下水一盞煎至八分溫服亦得不拘時

治乳汁不出蘊積在內結成癰腫此名妬乳蜂房

散方

露蜂房 燒灰

右一味研細每服二錢匕水一盞煎至六分溫服不拘時

治產後乳癰欲結未結膿攻疼痛黃耆膏方

黃耆 剉 芎藭 當歸 切焙 黃芩 去黑心 黃連 去須

白欬 芍藥 防風 去义各一兩

右八味擣羅為末用鷄子白調隨大小貼之每

日一易

治產後乳癰腫痛膿不消散托外膏方

黃耆 剉一兩半 白芷 大黃 剉炒各一兩 當歸 切炒

續斷 各三分 薤白 切三合 松脂 二兩別研 豬脂 五兩

生地黄 汁一升 蠟 一兩

右十味將前五味擣為細末入地黄汁慢火煎

漸稠次入豬脂松脂薤蠟等再煎成膏以新布

濾過新瓷器盛候冷攤帛上看大小貼之逐日

一易

治產後乳癰破膿血不盡豬蹄湯洗方

豬蹄 一具 當歸 切炒 芍藥 黃芩 去黑心

獨活 去蘆頭 莽草 大黃 剉炒 芩藟 各半兩

右八味擣羅七味為細末將豬蹄剉洗令淨以

水五升煮熟去滓澄清內藥再煎令熱通手洗

乳上令透拭乾良久又煖洗不拘次數

治乳癰黃連膏方

黃連去須 大黃剉炒各一分 鼠糞末半兩

右三味為細末煮黍米粥飲調如膏於四邊傅之

治乳汁不時泄蘊積於內遂成癰漏蘆膏方

漏蘆 黃芩去黑心各一兩 米粉半兩

右三味為細末新水調如膏塗之

治乳癰腫痛大黃散方

大黃剉 陳實各一兩 芍藥一分 馬蹄炙剉一兩半

右四味擣羅為散每服二錢匕空腹米飲調下

蓋覆取汗服三劑差

治乳腫初覺有異麥門冬湯方

生麥門冬去心 黃耆剉 防風去叉 桑寄生各一兩

甘草炙三分 木通二兩 黃芩去黑心 赤芍藥各一兩

半兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半

入棗二枚煎至八分去滓內乳糖一分再煎一

沸去滓溫服

重校聖濟總錄

卷一百六十六

三

燕遊堂

重校聖濟總錄卷一百六十六

