


準繩卷第七



七數上 目疾

漢書門	一三五九
類號函架冊	二四九
	三〇九
	七八三

內閣文庫	漢書
函架冊號類	一三五九
	二四九
	三〇九
	七八三

內閣文庫	
番號	漢 12549
冊數	78 ( 34 )
函號	301 62





傷寒證治準繩帙之七

淺草文庫

金壇王肯堂輯 門人南昌張綺校

勞復食復

女勞復

龐病新差後氣血津液虛耗慎勿為諸勞動事凡言語思慮勞神梳浴潔頰勞力勞則生熱而復病如初也又新差後精髓枯燥切不可為房事犯房事勞復必死魏督郵顧子獻病差後華佗囑之慎勿勞事餘事尚可女勞即死此是女勞復非陰陽易也又素問云病熱而有所遺者是新差後腸胃尚弱若多食則難消化而復病如初也此是食復新差強人足兩月

一職制職負取調可中出學  
似此二便職負一人操可相例學  
一職人



虛弱人足百日則無復病矣

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大

黃如博碁子大五六枚病者名曰勞復病熱少愈而強食之餘熱未盡日作勞動

氣留搏兩陽相合而病者名曰食復勞復則熱氣浮越與枳實梔子鼓湯以解之不待虛煩懊懣也食復則胃有宿積加大黃以下之不待腹滿譫語之候也

枳實梔子鼓湯方

枳實 叁枚炙

梔子 拾肆枚

鼓 壹升

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下鼓更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似

汗傷寒之邪自外入勞復之邪自內發發汗吐下當隨宜施治也

枳實梔子鼓湯則應吐劑此云覆令微似汗出者以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之內經曰火淫所勝以苦發之此之謂也

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解

之脉沉實者以下解之差後餘熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脉浮者熱在

表也故以汗解脉沉者熱在裏也故以下解之

海大抵勞者動也動非一種有內外血氣之異焉若勞

乎氣則無力與精神者法宜微舉之若勞乎血與筋骨

者以四物之類補之若勞在脾內為中州調中可已此

為有形病也但見外證則謂之復病非為勞也如再感

風寒是已



許記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脉弦數心不得寧真勞復也予診之曰勞心之所致神之所舍未復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感之於心矣此勞則當補子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛而補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者

錦囊

也與荀子言未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也

補脾湯治傷寒得汗差後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和

人參

白朮

甘草

橘皮 去白

青皮 去白

乾薑 各等分

右為末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得

海麥門冬湯治勞復氣欲絕者用之有效能起死回生

麥門冬 去心 壹兩

甘草 炙貳兩

粳米 半合

右為細末水二盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半



入藥五錢七棗二枚去核新竹葉一十五片同煎至一盞去渣溫服不能服者綿滴口中又治小兒不能灌藥者宜用此綿滴法。此方不用石膏以其三焦無火熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏若加人參大妙。

○社大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲以上黃牛乳一升水四升煎至一升如人饑稍稍飲不得多期十日服不住佳。

○治篤病新起早勞食飲多致勞復欲死燒鼈甲服方

○雄鼠屎湯 治勞復

梔子 拾肆枚

雄鼠屎 貳柒粒兩頭尖者是枳殼叁枚

右為細末每服四錢水一盞半入蔥白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎。

七味蔥白湯 治傷寒或因起動勞復或因吃食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此方。

蔥白 連須

乾葛

新豉 半合

生薑 切壹合

麥門冬 去心

熟地黄 各叁錢

流水 肆升以杓揚之

右七味用清水煎二分減二去滓分二服漸漸服之



取汗

千金方

治勞復或食復發熱者

梔子仁

石膏

各參錢

豶鼠屎

拾肆粒

豉

半合

右用水二鍾煎至一鍾去滓通口服之

補中益氣湯

治勞復發熱氣高而喘身熱而煩四肢

怠憊

人參

貳錢

白朮

軟苗柴胡

陳皮

白芍藥

各壹錢

當歸身

黃芪

各壹錢貳分

甘草

升麻

各伍分

右作一服用水二鍾煎至八分去滓溫服 若下元

陰火動或夢中失精或虛勞煩盛或自汗陰虛不足

者加知母黃蘗

各壹錢

五味子

粒

麥門冬

壹錢半

主之若

兼有宿食不消心下痞者去升麻人參加枳實黃連

各壹錢

主之若不能眠者加遠志酸棗仁

各壹錢

茯神

半主之凡脈弱人虛倍用人參自汗盜汗倍用黃

食少胃弱倍用白朮外熱多倍加軟苗柴胡之類

吳夫大病新瘥後血氣虛弱餘熱未盡古人所謂如

水浸墻水退則墻蘇不可犯之但宜安卧守靜以養

氣設或早起動勞則血氣沸騰而發熱也經言脈浮者

以汗解之脈實者以下解之若不可汗不可下宜小柴



胡湯隨證增損以和之或澼然汗出而解或寒顫汗出而解也凡新瘥後虛煩不得眠者參胡溫膽湯加酸棗仁主之凡虛羸少氣氣逆欲嘔者竹葉石膏湯主之虛熱燥渴者亦用此湯去半夏主之活人書治勞復身熱者殺鼠屎湯主之千金治勞復以麥門冬湯主之易老加人參以益元氣也若身熱食少無力者以參胡三白湯或補中益氣湯增損主之如無熱而下虛有寒者以黃芪建中湯虛甚者以大建中湯人參養榮湯之類主之若陰虛火動者必少加知母黃檗以救腎水也凡新瘥後只宜先進白稀粥湯次進濃者又次進糜粥

亦須少少與之常令不足則不可盡意過食之也其諸般肉食等物皆不可食經言病人新差脉已解但日暮微煩者此食穀早或多故也蓋胃弱不能消化宜減穀則愈矣經言食復發熱者以枳實梔子豉湯主之如宿食內結大便不去者加大黃如圍碁子大五六枚下之又曰食復發熱不解者以柴胡湯加減隨證用之若食少胃弱痞悶者以四君子湯為主而加味以主之如有表熱加軟苗柴胡內外有熱少佐黃芩心下痞悶心煩有內熱加枳實黃連如不眠更加酸棗仁有痰加橘紅半夏嘔吐者亦加之如米食不化加神麩麥蘖肉食



傷寒勞復後復已  
不化加棠求子枳實青皮之類消尅之也貴在通變而

凡男子大病瘥後早犯女色而為病者名曰女勞復也  
其候頭重不舉目中生花腰背疼痛或小腹裏急絞痛  
或憎寒發熱或時陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶活人  
書以猥鼠屎湯主之有熱者以竹皮湯燒棍散主之干  
金方以赤衣散主之虛弱者以人參三白湯調下赤衣  
散為妙若小腹急痛脉沉逆冷者以當歸四逆湯加附  
子吳茱萸送下赤衣散救之仍以吳茱萸一升酒拌炒  
熨小腹為佳凡卵縮入腹離經脉見者死不可救也

竹皮湯 治女勞復頭重不舉目中生花腹中絞痛有  
熱者

青竹皮 刮取半升

右用水二鍾煎至七分温服之

千金赤衣散 治女勞復并陰易

室女月經布近隱處者燒灰用白湯下日三服

凡酒味苦辛乃大熱有毒者也且大寒惟酒不冰其熱  
可見也蓋傷寒熱病本熱未解而欲飲酒則轉加熱盛  
而病增劇若脉弦大者須用小柴胡湯加葛根黃連烏  
梅王之若脉洪大者以人參白虎湯加葛根黃連王之

飲酒復



丁集石膏湯黃連解毒湯皆可用多加雞子尤必

千金赤石脂 治文榮煎并食具

亦用水二匙煎至十分盪服之

青汁文半枚 治脈沉逆冷者以當歸四逆湯加

燕雀更送下赤石脂散救之仍以吳茱萸一升酒拌炒

許文惠 治文榮煎重不舉目中主其煎中然保亦

瘥後諸病

水氣大病差後從腰已下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

尿大病差後脾胃氣虛不能制約腎水歸於隧道故水溢下焦腰以下為腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬 澤瀉 括蔞根 蜀漆洗去脚

葶藶熬 萆薢根洗去鹹已 海藻上等分

右七味異搗下篩為散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三

鹹味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦泄之蜀漆葶藶括蔞



傷寒差後病  
滿陸之酸辛期  
若以導腫濕

喜唾大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥

溫之宜理中丸成汗後陽氣不足胃中虛寒不內津液故喜唾不了了與理中丸以溫其胃。

加益智仁更佳

千金方瘥後口乾喜唾或咽痛用大棗十枚烏梅三

箇共搗細入煉蜜丸如棗核大含口中徐徐嚥下或

咽痛不愈者以山豆根凉水浸含嚥苦汁亦佳

欲吐傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主

之傷寒解後津液不足而虛羸餘熱未盡熱則傷氣故少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱

竹葉石膏湯方

竹葉貳把石膏壹斤半夏半升人參參兩

甘草貳兩粳米半升麥門冬壹升去心

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯

成去米溫服一升日三服

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參粳米之甘以補不足辛者散也氣逆者欲其散半夏之辛以散逆氣

日暮微煩病人脉已解而日暮微煩以病新差人強與

穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈陽明主於申酉

戊宿食在胃故日暮微煩當小下之以損宿穀只用梔子鼓湯痞鞭加枳實

以前俱出仲景書以後續增



補遺

驚悸 茯神散 治傷寒後虛羸心氣乏力弱驚悸多忘

茯神

黃芪

菖蒲

白芍藥

人參

遠志

右咬咀每服五錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓溫服

龍齒丸 治傷寒後伏熱在心心虛驚悸

龍齒

人參

生乾地黄

茯神 各壹兩

遠志 去骨

鐵粉

黃連 去須

馬牙硝 細研

防風 各柒錢半

麝香 細研五分

麥門冬 去心焙壹兩半

右為細末都研令勻煉蜜和丸如梧子大每服二十

丸竹葉金銀湯下不拘時服

溫膽湯 治傷寒瘥後調理

半夏 湯泡

茯苓 去皮

陳皮 去白

枳實 炒各貳錢

竹茹 壹錢

甘草 半錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

加味溫膽湯 治瘥後心膽虛怯觸事易驚夢寐不安

氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣困之或復自

汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安



枳實麪炒

半夏湯泡

白茯苓法皮

橘紅

人參各壹錢半

竹茹

香附

麥門冬去心

柴胡

桔梗各壹錢

甘艸半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不

拘時服

煩熱柴胡湯

治傷寒後夾勞五心煩熱背膊疼痛手

足無力不能飲食

柴胡

赤茯苓

鼈甲去裙襴醋浸炙

黃芪各壹兩

秦艸

地骨皮

黃芩去黑心

枳殼去瓢麪炒

葛根各半兩

甘草炙

人參各柒錢半

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分不拘時溫服

虛汗鼈甲散

治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向

晚增寒

鼈甲去裙襴醋炙黃

附子炮拆去皮臍

甘草炙

肉苻蓉酒浸去皮炙乾

人參

黃芪

熟地黄

桃仁去皮尖雙仁麪炒

枳殼去瓢麪炒

杜仲炙黃

五味子

柴胡

牛膝各柒錢半

牡蠣煨

蒼朮炒各壹兩



傷寒後虛羸  
右咬咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分不拘時溫服

治傷寒後虛羸日夜汗出不止心燥口乾咽喉不利

黃雌雞壹隻腸肚淨去理如常法

牡蠣煨粉

麻黃根各貳兩

肉苻蓉壹兩酒浸壹宿刮去鱗甲切

右先將雞麻黃根以水七大盞煮取汁三大盞去雞麻黃根後下肉苻蓉牡蠣煎取一盞半去滓分三服

空心午前夜後臨卧時服

治大病差後多虛汗

龍骨

牡蠣煨粉

麻黃各等分

右為末以粉身

喘嗽紫苑散 治傷寒後肺痿勞嗽唾膿血腥臭連連

不止漸將羸瘦

紫苑洗去苗土

天門冬

貝母煨微黃各壹兩

生乾地黄

桔梗各壹兩半

百合

知母各柒錢半

右咬咀每服肆錢水一鍾半煎六分去滓溫服無時

夢泄牡蠣散 治傷寒後虛損心多怔悸夜夢洩精

牡蠣煨粉

桂心

鹿茸酥炙

白芍藥

龍骨各壹兩

甘草炙半兩



右咬咀每服五錢水一大盞生薑壹錢棗三枚煎  
五分去滓食前温服

麝羊角丸 治傷寒夜夢精泄不禁身體枯燥瘡瘡骨

立者

麝羊角屑 犀角屑 石龍芮

葶子炒 龍骨 硃砂細研

鹿茸酒浸 澤瀉各壹兩半 桂心

木香各壹兩

右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服  
三十九食前用温酒下

失音 二瀝湯 治傷寒失音不語

竹瀝 荆瀝 梨汁各壹合

右攪令勻以綿濾過分温四服空心日晚各一服

嘔噦 人參湯 治傷寒後虛羸少力嘔噦氣逆

人參 白茯苓去皮 半夏湯洗七次炒

陳皮去白 白朮各半兩 麥門冬去心焙

黃芪各壹兩 甘艸炙貳錢半

右咬咀每服五錢匕水一盞半生薑三片棗二枚擘  
破同煎至八分去滓食前温服

下利 訶梨勒丸 治傷寒後膿血利下部疼痛



傷寒後病  
訶梨勒去核

人參 各壹兩

白茯苓 去皮

當歸 焙

木香

白芷 各柒錢半

牡丹皮 半兩

右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十九丸食前米飲下日再服

黃連丸 治傷寒熱病後熱毒下利膿血

黃連 炒柒錢半 烏梅肉 炒貳兩

右為細末煉蜜入少蠟和搗五六百杵丸如梧桐子大每服二十九丸加至三十九丸空心米飲下

訶梨勒飲 治傷寒後氣不和自利無度

訶梨勒 肆枚二生二煨去核

草豆蔻 肆枚二生二煨去皮

右咬咀每服二錢匕漿水一盞煎至六分去滓空心溫服

燥腸丸 治傷寒汗下後大小便自利腹中痛者

附子 壹枚炮

乾薑 壹兩

龍骨

吳茱萸

訶梨勒 去核

御米殼 各半兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸溫水下利止勿服

腰痛治傷發汗吐下後體虛元臟積冷氣刺腰痛轉動艱難



原蠶蛾 半斤 糯米 半升

右二味同炒令米色焦然後搗羅為末每用半兩以米醋調如稀糊入鈔子內煎攪令稠乘熱攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷即易之

杜仲酒 治傷寒後體虛元臟挾風冷腰膝疼痛行履不得

杜仲 去麤皮 炙貳兩 獨活 半兩 附子 炮裂去皮臍

牛膝 各壹兩 仙靈脾 柒錢半

右細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七日後開每日取三二合溫服日三服未差再浸服

不得眠 梔子烏梅湯 治傷寒瘥後不得眠

梔子 黃芩 各貳錢 柴胡 參錢  
甘草 壹錢 烏梅 參箇 去核

右作一服水二鍾生薑三片竹葉十四片豆豉三十粒煎至一鍾不拘時服

發豌豆瘡 千金方治豌豆瘡只以黃連一味酒炒水煎服之外以赤小豆為末入真青黛以雞子清和塗瘡上其效如神

遺毒凡傷寒汗出不徹邪熱結耳後一寸二三分或耳下俱腫鞭者名曰發頤此為遺熱成毒之所致也宜速



消散則可若緩則成膿又為害也

連翹敗毒散 治發願初腫服此消之

羌活中 獨活中 連翹上 荆芥中

防風中 柴胡中 升麻下 桔梗中

甘草下 川芎中 牛蒡子新瓦上炒研

當歸尾酒洗中 紅花酒洗下 蘇木下

天花粉中

右用水一鍾好酒一鍾同煎一鍾去滓徐徐溫服如

未消加穿山甲蛤粉炒壹錢腫至面者加香白芷壹錢漏

蓋伍如大便燥實者加酒浸大黃壹錢半壯者倍用之

凡內有熱或寒熱交作者倍用柴胡加酒洗黃芩壹錢

酒炒黃連壹錢

消毒救苦散 消腫散毒用米醋調塗傅四圍留頭如

乾即又傅

大黃叁錢 黃芩 黃連 黃蘗

芙蓉葉 大薊根 白芨 白斂

天南星 半夏 紅花 檀花

當歸尾 赤小豆 白芷各壹錢半 朴硝

雄黃另研末各壹錢

一方用見腫消草生白芨白斂土大黃生大薊根野苧



麻根共搗成餅入朴硝一錢和勻貼腫上留頭勿貼如乾即換之若更加生山慈菇金線重樓根尤妙

內托消毒散 治發願有膿不可消者已破未破服之

人參中 黃芪上 防風中 白芷中

川芎中 當歸中 桔梗中 連翹中

升麻中 柴胡中 金銀花中 甘草節中

右用水一鍾好酒一鍾同煎一鍾去滓徐徐溫服瘡破者以玄武膏貼之四圍赤腫不退者仍以前藥塗之兼服蠟礬丸最妙

昏冒凡傷寒汗出愈後漸覺昏昏不醒如鬼祟之狀或

錯語呻吟者此因汗出未盡邪熱伏于心胞所致也活人書用知母麻黃湯以汗之但慮病後血氣俱虛豈可與發汗若脈弱人虛者只宜十味溫膽湯加黃連主之若有寒熱潮熱日晡發熱者以小柴胡湯隨證增損主之

傷寒瘥後虛弱治例

當歸六黃湯 治傷寒新瘥後虛熱盜汗不止

當歸身酒洗壹錢伍分 黃蘗炒 黃芩炒各柒分

黃連炒伍分 黃芪鹽水炙貳錢 生地黃酒洗

熟地黃酒蒸各壹錢



傷寒後病 卷之七

右作一服水二鍾煎至八分食遠溫服之

加味黃芪建中湯 治陽虛無熱惡寒盜汗無力下虛者

黃芪 各貳錢 白芍藥 壹錢半 當歸 壹錢半

人參 白朮 麻黃根 牡蠣粉 各壹錢

官桂 伍分 飴糖 壹匙 大棗 貳枚

右煎法同前

滋陰補腎丸 治病後陰虛精血不足四肢少力心神

不寧夜夢遺精或虛熱盜汗飲食進少不為肌肉身

體羸弱面色青黃而無血色宜服此丸滋腎水制虛

火大有益也

熟地黃 酒蒸 生地黃 酒浸 白朮 各貳兩 人參

麥門冬 去心 五味子 當歸 酒浸 白芍藥 酒炒

川芎 黃芪 鹽水炙 山藥 蛤粉 另研極細

茯苓 去皮 砂仁 各壹兩 知母 炒壹兩 黃蘗 炒貳兩

右十六味共為細末煉蜜和成於石臼內杵千餘下

丸如梧桐子大每服五十九丸空心淡鹽湯下

加味補陰丸 治證同前

黃蘗 鹽酒拌炒四兩 熟地黃 知母 鹽酒拌炒

敗龜板 醋炙各貳兩 虎脛骨 鎖陽 醋炙

傷寒後病 卷之七



白芍藥 酒炒

當歸 酒浸

川牛膝 酒洗

杜仲 醋炙去絲

砂仁 以上各壹兩

若冬月天寒加乾薑炮伍錢

右為末煉蜜入猪脊髓五條共搗和成石臼內杵千餘下丸如梧桐子大每服五十九丸空心淡鹽酒或鹽湯下

硃砂安神丸 治病後心神不安夜卧不寧或亂夢不得眠

得眠

硃砂 另研水飛貳錢用一半為衣

黃連 炒

生地黄 酒洗焙乾各壹錢半

當歸身 酒浸壹錢

甘草 炙半錢

右為細末湯浸蒸餅糊為丸如菉豆大硃砂為衣陰乾每服三十九丸以口中津液嚥下或燈心湯下

加味枳朮丸 治病後胃弱食少服此進飲食強胃氣

枳實 炒 神麴 炒 大麥蘖 炒 棠球子

陳皮 各壹兩 人參 白朮 各壹兩

右為末荷葉燒飯和丸如梧桐子大每服七八十九

白湯下如夏有熱加薑炒黃連 柒錢 如冬月天寒加

砂仁 壹兩 如氣鬱不舒暢加香附 壹兩 如痰多加橘紅 壹兩

去陳皮更加半夏麴 壹兩



傷寒後病

六君子湯 治傷寒汗下之後將見平復宜服此調理

助脾進食辟邪氣大妙

人參

白朮

黃耆

白茯苓

山藥

甘草

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎

至七分去滓溫服

養脾湯 治傷寒後脾胃虛弱不思飲食

茯苓

乾薑

白朮

丁香

人參

甘草

右如法事治一處搗羅為末每服三錢水一盞煎至

六分溫服日三不拘時候

健脾散 治傷寒後脾胃虛弱不欲飲食縱食不能消

化

訶梨勒皮

白朮

麥蘖

人參

乾薑

神麴

甘草

枳殼

大腹皮

右咬咀每服四錢水一中盞人生薑半分煎至六分

去滓不拘時稍熱服

傷寒後病

失之七

三



助脾進食辟邪氣大妙

走瀉不吐却淋煎水

古方用此煎水入土薑半合煎至六分

右投單煎服四錢淋瀝水薑大煎水兩分同煎

至人參兩分溫服煎水煎麥藥煎水

養脾西藥海皮天後白木煎水煎麥藥煎水

外夜苓 乾薑煎水白木煎水

對單煎香 或對寒對單胃虛惡不消食煎水煎麥藥煎水

六分煎服日三不許煎劑 每服三錢水一盞煎至

### 陰陽易

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝曾頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急者燒視散主之

燒視散取婦人中視近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視襠燒灰用

嘗治傷寒病未平復犯房室命在須臾用獨參湯調燒視散凡服參一二斤餘得愈者三四人信哉用藥不可執一也



傷寒陰陽易 ○附

治傷寒病新瘥陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰跨連腹內痛名曰陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病名曰陽易婦人病新瘥未平復而男子與之交接得病名曰陰易若二男二女並不自相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒著於人如換易然其病之狀身熱衝胸頭重不能舉眼中生花四肢拘急小腹絞痛手足拳則死亦有不能即死者病苦少腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便恍恍翕翕氣力轉小着

床不能動搖起止仰人或牽引歲月方死宜燒棍散

鼠糞湯竹茹湯青竹茹湯乾薑湯當歸白朮湯選用之

海藏云熱者燒棍散竹茹湯寒者當歸白朮湯至于校正方妙香丸條下治雜病陰陽易中有牛黃腦麝之類是治其熱證也

青竹茹湯 婦人病未平復因有所動致熱氣衝胸手足拘急插搦如中風狀宜此湯

瓜蒌根 壹兩 青竹茹 刮半升 淡竹是

右以水二升煮取一升二合去查分二三服

妙香丸 治陰陽易不瘥大便不通心神昏亂驚惕不安者

安者



傷寒陰陽易。○帳之七

辰砂另研細水 水腦

膩粉

麝香

牛黃各柒錢半 金箔伍片

巴豆霜貳錢半

右為細末入黃蠟錢叁蜜一小匙同煉勻和藥為丸每藥一兩作三十九丸米飲下五丸弱者三丸壯者或七丸亦可取大便通即止

**百一**治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

**海**若陰陽易果得陰脉當隨證用之若脉在厥陰當歸四逆湯送下燒棍散若脉在少陰通脉四逆湯送

**下燒棍散** 若脉在太陰四順理中丸送下燒棍散所用之藥各隨其經而效自速也

**殺鼠糞湯** 療傷寒病後男子陰易

韭白根壹把

殺鼠糞拾肆粒兩頭尖者是

右二味以水五升煮取半升去查再煎三沸温服得効未汗再服亦理諸般勞復

**當歸白朮湯** 治婦人未平復因有所動小腹急痛腰膝四肢不任舉動無力發熱者

白朮

當歸

桂枝

附子生

甘草

芍藥



黃芪

人參 各貳錢半

生薑 半兩

右咬咀水煎服食頃再服溫覆取微汗差

李良佐子病太陽證尺寸脉俱浮數按之無力余見其內陰虛與神木加乾薑湯而愈後再病余視之見神不舒垂頭不欲語疑其有房過問之犯房過乎必頭重目眩曰唯與大建中三四服外陽內收脉返沉小始見陰候又與已寒加芍藥懷香等丸五六服三日內約服丸六七百丸脉復生又用大建中按之大汗作而解  
○山因女色病陰證傷寒者用陳皮熟鍋內炒焦以酒烹下瀝酒飲之

葶根散

治傷寒後陰陽易頭重百節解痛翕翕氣劣著床不能起動甚者手足拳卵腫疼痛

葶根

括萋根 各貳兩

青竹茹

乾薑

炮各半兩

右細剉和勻分八服每服用水一大盞煎至五分去滓入鼠糞末一字攪勻不拘時服聖濟方搗篩五錢七水一盞半煎至一盞去滓食前溫服一名豐本湯  
治傷寒婦人得病雖瘥未滿百日不可與交合為陰陽易之病必身體拘急手足拳欲死丈夫病名曰陰易  
婦人病名曰陽易速當汗之可痊滿四日不可療宜



令服此藥其病體重小腹急熱上衝胸頭重不能舉  
眼中生花膝脛拘急

○用乾薑肆兩沸湯調連進服以衣被覆出汗方解手  
足伸而愈

二灰散 治傷寒陰陽易

手足指甲

貳拾片男病用女  
者女病用男者

中衣襦

近隱處壹片男病  
用女女病用男者

右並燒作灰研令細分三服不拘時用溫酒調下或  
米湯調服亦可

醫林曰離經脈見多主死太過曰至一呼三至曰至不

及曰損一呼一至曰損二脈唯陰陽易病有之

○張假如婦人病新瘥未平復而男子與之交因感外邪  
而卒病實非餘邪相染醫見病速謂之陰易于法何以  
別乎夫易病者有上條所見之證存焉其與外所感豈  
相侔哉設若風寒外傷當有表證安有小腹裏急引陰  
中拘攣者乎或又云假如男子病新瘥未平復強合陰  
陽而自病仍小腹裏急引陰中拘攣證同易病求其理  
何故不染易他人而自復未審其證治可同何法也病  
雖自理復與易同亦用燒棍散以誘安其氣夫易病之  
為合陰陽感動餘邪而其人正氣本虛故能染着不然



安得受其邪哉。今病自復，緣正氣尚虛，而餘邪因動，悉非外感。故與易同，亦用燒棍散，以安正氣，正氣安，餘邪自平矣。

中時學皆平，如文云：雖咳，思于時，猶蓋未平，夏氣令  
時，料若若，若風寒，也，當有素，安有，小，則寒，意，則  
限乎，夫是，涼，皆，有，土，利，而，良，之，益，其，與，也，而，涼，宜  
而卒，涼，實，非，益，深，則，榮，習，良，涼，數，時，之，則，是，于，去，所以  
或，則，咳，嗽，入，無，涼，寒，未，平，野，而，思，于，與，之，交，因，涼，水，平  
之，曰，鮮，一，和，一，至，曰，鮮，二，和，鮮，則，是，涼，宜，之，

○四時傷寒不同

論文已見首篇總例

冬為傷寒 春為溫病 夏為暑病 秋為瘧  
一歲長幼病相似為疫 多眠多汗脉浮為風溫  
一身盡痛為濕 身反張為瘕

○ 吳夫傷寒之病自霜降之後天令大寒而感之者乃傷寒也若天令溫暖而感之者為冬溫也如至春天令溫暖有人壯熱為病者乃溫病也若天令尚寒冰雪未解而感寒者亦曰傷寒也若三月至七八月之間天道忽有暴寒而感之者此名時行寒疫也若夏至後壯熱脉洪者謂之熱病也如四時天令不正感而為病長幼相



傷寒四時不同 卷之七  
似互相傳染者謂之時行之氣也。夫時氣者一曰時疫。蓋受天地疫癘之氣而為病，乃非寒也。又有溫瘧、風溫、溫毒、溫疫、中風、傷風、中濕、風濕、中暑、中暍、濕溫等證，一皆發熱，狀似傷寒，故醫家通以傷寒稱之者，為發熱傳變皆相類也。至于用藥則不同矣。但發表解肌有差別爾。蓋冬月傷寒者人之着寒而即病也。若不即病，至春變為溫病，至夏變為熱病，溫病熱病乃因伏寒為變，既變不得復言其寒矣。其寒疫乃天時之暴寒，與冬時之嚴寒又有輕重之不同。時氣自是天行疫癘之氣，又非寒比也。溫病乃山澤蒸氣暑病，乃炎日之火風，乃天之

邪傷于人者也有中者為重傷者為輕。溫瘧風溫等病又是傷寒壞證，更感異氣所變，各有其因不同，豈可通以傷寒稱而治之。如不識其名妄行治療，本中暑作熱病治之，濕溫作風溫治之，虛實混淆是非，紊亂天人，天年可不慎哉。

凡四時傷寒通宜補散。故丹溪治傷寒多用補中益氣湯。氣虛者四君子湯加發散劑。血虛者四物湯加發散劑。東垣治風濕用補中益氣加羌活。防風升麻。本蒼木海藏治風濕無汗者用神朮湯。有汗者用白朮湯。治剛瘕用神朮湯加羌活。麻黃治柔瘕用白朮湯加桂心。



葛木治風濕用白朮湯隨證加藥治中暍脉弦細芤遲者用黃芪湯此皆與仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒同意也

傷寒與中寒不同  
仲景論傷寒而未及乎中寒先哲治冒大寒昏中者用附子理中湯其議藥則得之矣曰傷曰中未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病因其舊有鬱熱風寒外束肌腠自密鬱發為熱病邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝輩微表而安以病體不甚虛也若中寒則倉卒感受其病即發而暴因其腠理踈豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此氣大虛不急治則死矣

傷寒傷暑傷濕亦如傷寒之漸入也中風中暑中濕亦如中寒之暴受也除傷寒外雜病首卷晰矣

冬為傷寒

從霜降已後至春分已前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也治法除暑濕瘧疾外皆傷寒法也

行秋令也... 傷寒... 治法... 傷寒法也

傷寒... 治法... 傷寒法也







行於春。腠理開泄，少陰不藏，房室勞傷，辛苦之人，陽氣泄於外，腎水虧于內。當春之月，水當發生，陽以外泄，氣為鼓舞，腎水內竭，孰為滋養？此兩者同為生化之源，源既已絕，木何賴以生乎？身之所存者熱也。時強木長，故為溫病。

論曰：太陽病發熱而渴，不惡寒者為溫病。釋曰：太陽病者，脈浮、頭項痛、而腰脊強也。傷於寒者，當惡寒，若不惡寒而渴者，轉屬陽明，則表證已罷，邪傳于裏矣。今不惡寒，則非傷寒證，似陽明而與太陽兼見，則非傷寒之明也。故決其為溫病。

○活人書云：夏至已前發熱，惡寒、頭疼、身體痛、其脈浮

緊者，溫病也。春月傷寒，謂之溫病；冬傷於寒，輕者夏

至已前發為溫病，蓋因春溫煖之氣而發也。又非溫疫也。

治溫病與冬月傷寒，夏月熱病不同，蓋熱輕故也。春初

秋末陽氣在裏，其病稍輕，縱不用藥治之，五六日亦自安。升麻湯、解肌湯、柴胡桂

枝湯最良。熱多者小柴胡湯主之，不渴外有微熱者

小柴胡加桂枝也。嗽者小柴胡加五味子也。或煩渴

發熱不惡寒者，並竹葉石膏湯次第服之。麻黃桂枝

大青龍唯西北二方四時行之，無有不驗。若江淮間

地偏煖處，唯冬月及正初乃可用。正方自春末至夏



至已前桂枝麻黃大青龍內宜加減也。按活人所云溫病有二其用升麻解肌等者乃正傷寒太陽證惡寒而不渴者特以其發於溫煖之時故謂之溫病爾其用竹葉石膏湯者乃仲景所謂渴不惡寒之溫病也要須細別勿令誤也然不惡寒而渴之溫病四時皆有之不獨春時而已

溫毒陽脉洪數陰脉實大者遇溫熱變為溫毒成此前

又感溫熱者也陽主表陰主裏洪數實大皆熱也兩熱相合變為溫毒

活人云初春發斑咳嗽為溫毒

吳冬有非節之煖名曰冬溫此即時行之氣也若發

斑者又曰溫毒而亦時氣發斑也又傷寒壞病陽脉洪數陰脉實大更遇溫熱變為溫毒其病最重也蓋此因前熱多日不解更感溫熱之氣而為病故曰重也若無汗者以三黃石膏湯汗之若有自汗者宜人參白虎湯主之煩熱錯語不得眠者白虎合黃連解毒湯主之表熱又盛者更加柴胡主之若內實大便不通宜三黃瀉心湯下之或大柴胡湯加芒硝下之亦可若斑出如錦紋者多難治也宜人參化斑湯玄參升麻并黑膏大青四物湯主之方論詳發斑發汗不解身灼熱為風溫其證脉浮汗出身重多眠



傷寒者為溫病之類也  
病不獨見於春間  
故另立風溫門

診尺膚熱甚脉盛躁者病溫也。夫精者身之本也故藏於精者春不病溫。

針灸凡治溫病可刺五十九穴。成註云所謂五十九

穴者刺兩手內外側各三凡十二痛五指間各一凡八

痛足亦如之頭入髮際一寸傍三分各三凡六痛顛上

一顛會一髮際一廉泉一風池三天柱一內經云氣口

取之若氣口人迎皆靜者勿刺也人迎謂結喉動脈也王太僕註素問五十九

刺云刺頭上五行五行者以越諸陽之熱逆也。謂頭中

懸會前頂白會後頂五穴頭第二行兩傍五穴承光通天絡却玉枕十穴第二行兩傍臨泣目窓正營承靈腦

空十穴也大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也。

氣街三里巨虛上下兼此八者以瀉胃中之熱也。

雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也。五藏

俞傍五此十者以瀉五藏之熱也。謂背第五行兩傍臑戶神堂臑門意舍志

室十穴也  
○附

雲傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病

也。經曰溫病之脉行在諸經不知何經之動隨其經之

所在而取之。如太陽證汗下後過經不愈診得尺寸

俱浮者太陽溫病也。如身熱目疼汗下後過經不愈

汗下後過經不愈  
溫病



傷寒春為溫病之七  
診得尺寸脉俱長者陽明溫病也。如胸脇痛汗下後  
過經不愈診得尺寸脉俱弦者少陽溫病也。如腹滿  
噎乾診得尺寸脉俱沉細過經不愈者太陰溫病也。  
如口燥舌乾而渴診得尺寸俱沉過經不愈者少陰溫  
病也。如煩滿囊縮診得尺寸俱微緩過經不愈者厥  
陰溫病也。是故隨其經而取之隨其證而治之如發斑  
乃溫毒也。

汪愚謂溫與熱有輕重之分故仲景云若遇溫氣則為  
溫病更遇溫熱則為溫毒熱比溫為尤重故也苟但冬  
于寒至春而發不感異氣名曰溫病此病之稍輕者

也溫病未已更遇溫氣變為溫病亦可名曰溫病此病  
之稍重者也傷寒例以再遇溫氣名曰溫疫又有不應  
冬月傷寒至春而病溫者此特感春溫之氣可名曰春  
溫如冬之傷寒秋之傷濕夏之中暑相同也以此觀之  
是春之病溫有三種不同有冬傷于寒至春發為溫病  
者有溫病未已更遇溫氣則為溫病與重感溫氣相雜  
而為溫病者有不因冬傷于寒不因更遇溫氣只于春  
時感春溫之氣而病者若此三者皆可名為溫病不必  
各立名色只要知其病源之不同也  
升麻解肌湯方治傷寒溫病天行頭痛壯熱



葛根

壹兩

麻黃

去節湯泡  
柴錢半

黃芩

芍藥

各半兩

桂心

甘草

炙各貳  
錢半

右咬咀每服四錢水一盞半棗一枚煮八分服日三

三四日不解脉浮者宜重服取汗脉沉實者宜下之

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡

疹已發未發皆可服之

升麻

芍藥

甘草

各貳錢半

乾葛

叁錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞

咽乾咳嗽涕唾稠粘

柴胡

去苗

乾葛

荆芥

去梗

赤芍藥

石膏

各壹  
錢半

前胡

去苗

升麻

桑白皮

黃芩

各壹  
錢

右作一服水二鍾生薑三片豆豉二十粒煎至一鍾

不拘時服

三黃石膏湯

石膏

四錢

黃芩

黃連

各貳  
錢

黃礬

山梔仁

各壹錢  
伍分

香豉

百粒

麻黃

貳錢若天  
寒用叁錢

甘艸

壹錢



右作一服用水二鍾煎至一鍾瀉清通口服以衣被  
覆取汗而愈

升不吐部類

治大人小兒疳積氣滯及更

式并一銀木二鍾土薑三升豆豉二十粒煎至一鍾

枳實

桑白皮

黃芩

谷壹

赤芍藥

石膏

谷壹

前貼

去苗

柴胡

去苗

薄荷

陳茶

去味

因薄荷類藥垂懸

### 夏為暑病

按中暍中暑中熱名雖不同實一病也若冬傷于寒至  
夏而變為熱病者此則過時而發自內達表之病俗謂  
晚發是也又非暴中暑熱新病之可比或曰新中暑病  
脉虛晚發熱病脉盛

暍病治法有清熱有解肌

太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也出惡

寒身熱而不渴者中風也汗出惡太陽中暍者發熱

惡寒身重而疼痛其脉弦細訖遲小便已灑灑然毛聳

手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡

方集夏為暑病失之



寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

成病有在表有在裏者有表裏

俱病者此則表裏俱病者也發熱惡寒身重疼痛者表

中喝也脉弦細芤遲者中暑脉虛也小便已灑灑然毛

聳手足逆冷者太陽經氣不足也小有勞身即熱者謂

勞動其陽而喝即發也口開前板齒燥者重有熱也內

經曰因於暑汗煩則喘喝口開謂喘喝也以喘喝不止

故前板齒乾燥若發汗以去表邪則外虛陽氣故惡寒

甚若以溫針助陽則火熱內攻故發熱甚若下之以除

裏熱則內虛而膀胱燥故淋甚○徐氏曰此條無治法

東垣以清暑益氣湯主之所謂發千古之秘也

○太陽中喝者身熱疼重而脉

微弱此亦夏月傷於水水行皮中所致也

成經曰脉虛身熱得之傷

暑以水灌漑而得之○瓜蒂一物散或云五苓散

○中喝與傷寒相似而異張氏曰清邪中上濁邪中下其

風寒濕者皆地之氣係濁邪所以俱中足經惟暑乃大

之氣係清邪所以中手少陰心經也其證多與傷寒相

似但喝與傷寒脉不同耳夫傷寒雖惡寒發熱初病未

至於煩渴惟暑則不然初病即渴所以與傷寒為異也

且傷寒之脉必浮盛中暑之脉虛弱或弦細芤遲者有

之經曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑此之

謂也假如太陽病項背強几几反汗出惡風若當炎暑

之時豈不與中喝相似惟其不渴故與桂枝加葛湯主

之凡居夏秋之令炎暑之時必當依經詳審則無差失

之患矣○汪以證言之傷寒惡寒傷熱惡熱以脉言之

傷寒脉盛傷暑脉虛且暑脉虛細與濕瘧之脉有相似

傷寒脉盛傷暑脉虛且暑脉虛細與濕瘧之脉有相似

傷寒脉盛傷暑脉虛且暑脉虛細與濕瘧之脉有相似

傷寒脉盛傷暑脉虛且暑脉虛細與濕瘧之脉有相似



者而證則不同暑則自汗而渴濕則不渴瘧則身疼也  
脉洪身熱惡寒為熱病活人云夏月發熱惡寒頭疼身  
體肢節痛重其脉洪盛者熱病也冬傷於寒因暑氣而  
發為熱病治熱病與傷寒同有汗宜桂枝湯無汗宜麻  
黃湯加煩躁者宜大青龍湯然夏月藥性須帶涼不可  
大温桂枝麻黃大青龍須用加減夏至前桂枝加黃芩  
半兩夏至後桂枝麻黃大青龍加知母一兩石膏二兩  
或加升麻半兩蓋桂枝麻黃湯性熱及煖處非西北之  
比夏月服之必有發黃斑出之失熱病三日外與前湯  
不差脉勢仍改邪氣猶在經絡未入藏府者桂枝石膏

湯主之此方夏至後代桂枝證用若加麻 兩可代

麻黃青龍證用也若三月至夏為晚發傷寒梔子升麻

湯亦可選用之萬曆癸卯興化李氏一壻應舉于南京時方盛夏傷寒一太學生新讀仲景書

自說知醫授以桂枝湯入腹即斃大抵麻桂二湯乃隆冬正傷寒之藥施之温病尚不可况熱病乎

桂枝石膏湯 治法見前論有汗脉緩為桂枝證無汗

脉緊為麻黃青龍證

桂枝去麩

黃芩各半

梔子叁錢

白芍藥

升麻

乾葛

生薑以上各

石膏碎

甘草炙各壹兩

右咬咀每服五錢半水一盞半煮至八分去查食頃



再服若得汗即停後服

梔子升麻湯 治晚發傷寒三月至夏為晚發

生地黄

切碎半斤

梔子

拾枚

升麻

壹兩半

柴胡

石膏

各貳兩半

咬咀每服五錢水一盞半煎八分頓服病不解更作

○**吳**自夏至以後時令炎暑有人壯熱煩渴而不惡寒者乃熱病也凡脉浮洪者發于太陽也洪而長者陽明也弦而數者少陽也然此發在三陽為可治若脉沉細微小足冷者發在三陰為難治也大抵熱病大熱須得脉洪大有力或滑數有力為脉病相應為之可治若小

弱無力為之難治若人虛脉弱者宜以人參湯與之而扶其元氣也不可以攻其熱如脉洪身疼壯熱無汗煩亂者宜六神通解散發汗則愈或人參羌活散加葛根淡豆豉生薑以汗之輕者只用十味芎蘇散汗之亦佳如夾暑加香薷扁豆雙解之若兼有內傷生冷飲食停滯或嘔吐惡心中脘痞悶或惡風或增寒拘急者宜藿香正氣散加香薷扁豆葛根以發汗名二香湯也若發散熱不解者在太陽經宜用人參羌活散加黃芩在陽明經宜用升麻葛根湯加黃芩熱甚燥渴脉大者白虎湯加人參主之在少陽宜用小柴胡湯隨證增損治之



若夾暑者加黃連香薷主之若熱而大便自利小便不利煩渴者五苓散去桂加葛根黃連香薷滑石之類主之若表裏俱熱而自利脈浮數而小便不利者小柴胡湯合四苓散主之若其不解或傳經變證或裏實可下或陰寒可溫或發斑黃等證皆從正傷寒條內治之也凡熱病一二日泄利腹滿熱甚者死三四日目昏譫語熱盛而脈小者死四五日熱盛脈小足冷者死六七日汗不出嘔吐譫語昏沉脈急促者死六七日舌本焦黑燥者死七八日衄血吐血躁熱脈大者死九日發痙搐昏亂者死凡熱病脈促結代沉小皆難治也熱病不

得汗而脈躁急者死以得汗而熱反盛脈躁急者死也脈虛身熱惡寒為中暑治法方論詳雜病本門及後條脛冷腹滿頭痛渴而無熱者濕溫活人云濕溫者兩脛逆冷胸腹滿多汗頭痛妄言其人常傷於濕因而中暑濕熱相搏則發濕溫其脈陽濡而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暈如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

許癸丑年故人王彥龍作毗陵倉官季夏時病胸項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬日予診之

傷寒論卷之十一 辨濕溫病脈證并治法第十一 三十九



其脉關前濡關後數予曰當作濕温治之盖先受暑後受濕暑濕相搏是名濕温先以白虎加人參湯次白虎加蒼朮湯頭痛漸退足漸温汗漸止三日愈此名賊邪悞用藥有死之理有人難曰何名賊邪予曰難經云五邪有實邪虚邪正邪微邪賊邪從後來者為虚邪從前來者為實邪從所不勝來者為賊邪從所勝來者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑而濕邪勝之水尅火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經曰濕温之脉陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於

陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕温是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漿

漿未嘗乾每服此藥二三盞即愈

海濕温汗少者白虎加蒼朮汗多者白虎加桂枝白虎加桂枝方見

孫保慶門外有酒家姓姜者善歌唱孫愛之忽數日不見使人問之則曰病久將命絕孫診之遍身皆潤兩足冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急問其所服藥取而視之皆陰病藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈姜氏



傷寒夏暑... 既安詣孫謝因請問曰某得病劇蒙尚藥一治而甦願  
聞治法孫曰汝病傷暑也始則陽微厥而脉小無力衆  
醫謂陰病遂用陰藥其病愈厥予用五苓散大利小便  
則腹減白虎解利邪熱則病愈凡陰病脛冷兩臂亦冷  
汝今脛冷臂不冷則非下厥上行所以知是陽微厥也  
保立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼自汗  
四肢沉重謂之濕溫蒼朮石膏湯主之即白虎加  
蒼朮湯

蒼朮石膏湯方

蒼朮

半兩

石膏

參錢

知母

貳錢半

甘州

壹錢

一右咬咀水一盞煎至半盞溫服謂內有濕也多不欲

飲水如身熱脉洪無汗多渴者熱在上焦積於胸中

宜桔梗散

此非濕溫病  
乃熱病也

桔梗散方

薄荷

黃芩

甘草

梔子

各壹錢

連翹

貳錢

桔梗

參錢

右剉每服五錢水煎加竹葉如大便澀加大黃半兩

脉虛身熱得之傷暑劉純曰按許學士云傷暑其脉弦

細朮遲何也內經曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形

則氣消而脉虛弱所謂弦細朮遲皆虛脉也仲景以弦

為陰而朱肱亦曰中暑脉細弱則皆虛脉也可知矣



暑證有冒有傷有中戴氏曰冒傷中三者輕重之分或  
腹痛水泄胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲此二者  
冒暑也可用黃連香薷飲黃連退熱香薷消暑或身熱頭疼躁  
亂不寧者或身如針刺者此為熱傷肉分當以解毒白  
虎湯加柴胡氣虛加人參或咳嗽發寒熱盜汗不止  
脈數者熱傷肺經火乘金也此為中暑宜用清肺湯柴  
胡天水散之類

夏月伏陰在內丹溪曰夏月陽氣盡出于地人之腹屬  
地氣於此時浮于肌表腹中虛矣夏月伏陰在內此陰  
字有虛之義若作陰冷看誤矣前人治暑有用大順散

溫熱藥者蓋以涼亭水閣寒泉冰雪所傷也非為伏陰  
而用火令之時爍石流金有何陰冷孫真人令人夏月  
服生脈散非虛而何劉氏曰潔古謂靜而得之為中  
暑動而得之為中熱東垣謂避暑於深堂大厦得之曰  
中暑宜大順散勞役得之曰中熱宜蒼朮白虎湯夫暑  
熱一也夏令之氣也靜居堂厦而病乃夏月傷冷之病  
何以中暑而求別于中熱耶王氏曰竊謂暑熱者夏  
之令也火行于天地間人或勞役或飢餓元氣虧之不  
足以禦天令亢極于是受傷而為病名曰中暑亦名曰  
中熱其實一也今乃以動靜所得分之何哉夫中暑者



固多在勞役之人勞役則虛虛則邪入邪入則病不虛則天令雖亢亦無由以傷之類避暑于深堂大厦得頭疼惡熱等證者蓋亦傷寒之類耳不可以中暑名之其所以煩心與肌膚大熱者非暑邪也身中陽氣受陰寒所遏而作也既非暑邪豈可以中暑名乎苟欲治之則辛溫輕揚之劑發散可也夫大順散一方甘草最多乾薑杏仁肉桂次之除肉桂外其三物皆炒其初意本為病者伏熱引飲過多脾胃受濕嘔吐水穀不分藏府不調所立故甘草乾薑皆火炒又肉桂而非桂枝蓋溫中藥也其杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得

之之證吾恐不能解表反增內煩矣今世俗往往不明類曰夏月陰氣在內大順散為必用之藥夫陰氣非寒氣也蓋夏月陽氣發散在外而陰氣則在內耳豈空視陰氣為寒氣而用溫熱之藥乎陰果為寒何以夏則飲水乎其蒼朮白虎湯雖宜用然亦豈可視為通行之藥乎必參之治暑諸方隨所見之證而用之然後合理夫所謂靜而得之證雖當暑月即非暑病宜分出之勿使後人有似同而異之忽

暑傷五藏為證不同陳氏曰暑入心則壅悶昏不知人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則噴滿痿躄



入腎則消渴。徐氏曰暑暍之證變異不等非止歸五藏蓋人之形氣有虛實感有輕重輕則後時而發至秋成瘡痢是也重則即時而發如已上證至有輕變重重變輕亦自感有淺深傳有兼併况人之形志苦樂不一豈得無變異乎四時之證皆然

暑病宜補元氣東垣曰脾胃虛弱遇六七月濕旺汗泄身重短氣四肢痿軟脚欹眼黑此腎與膀胱俱竭之狀也况汗大泄則亡津液津者庚大腸所主三伏庚金受囚木無可制故風濕相搏骨節煩疼也夫壬膀胱已絕于巳癸腎水已絕于午人更逢濕旺助熱為邪西北方

之寒清絕矣聖人立法夏宜補者為熱傷元氣以人參麥門冬五味滋水之源瀉內火補庚金益元氣也

中暑發為痿厥諸證東垣曰長夏濕熱蒸人損傷元氣四肢困倦精神短少兩脚痿軟遇早晚之際則發寒厥日高之後復熱如火乃陰陽氣血俱不足也或心胸痞滿肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩小便黃而少大便溏而頻或利或渴自汗體重此血先病而氣不病也若濕氣先搏脉必洪緩而遲病雖互換少差其天暑濕令則一宜以清燥之劑治之或遠行大熱而渴則熱舍于腎故水不勝火發為骨痿此濕熱成痿也或熱厥而陰



傷寒夏熱病之類也  
虛或寒厥而氣虛四肢如火為熱厥四肢寒冷為寒厥  
寒厥腹中有寒熱厥腹中有熱為脾主四肢故也。徐  
氏曰此論暑熱證候則同冬月傷寒傳變為證之不一  
彼為寒傷形此為熱傷氣若元氣虛甚受病忽于一時  
不救者與傷寒陰毒頃刻害人實同故東垣啓是病例  
大開後人之盲瞶也宜與痿門互看

暑風 賈氏曰此由火熱制金不能平木搖搦不省人事  
其脉虛浮浮者風也虛者暑也俗名暑風乃相火甚而  
行令也先以溫水化蘇合香丸次以黃連香薷飲加羌  
活或雙解散加香薷尤良

治暑大法 賈氏曰暑者相火行令也人感之其脉虛外  
證頭疼口乾面垢自汗倦怠或背惡熱甚者迷悶不省  
而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛泄利下血發黃生斑皆  
是其證治法清心利小便為上汗多者不可利宜白虎  
湯次分表裏以治如在表頭疼惡寒雙解加香薷及二  
香散十味香薷散如在半表半裏瀉泄煩渴飲水吐逆  
五苓散執甚煩渴益元散若表解裡熱宜半夏解毒湯  
下神芩丸或老人及素弱人冒暑脉微下利渴而喜溫  
或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附半箇冷飲次  
以來復丹五苓散治之凡夏月暑證不可服諸熱燥劑



傷寒論卷之六 傷寒之類  
致斑毒發黃小便不利悶亂而死矣。徐氏曰此言治暑之法可謂詳備然於暑風相火為病而用蘇合香丸至用雙解皆當審諦脈證不可差失詳蘇合丸但可用於陰寒所遏或內傷生冷及氣中或中惡者此等又不可謂暑風相火之證矣學者審之。陶氏曰中暑脈虛而伏身熱背惡寒面垢自汗煩躁大渴毛聳惡寒昏冒倦怠而身不痛與傷寒諸證不同內外俱熱口燥煩渴四肢微冷而身不痛用白虎湯。痰逆惡寒橘皮湯。執悶不惡寒竹葉石膏湯。頭痛惡心煩躁心下不挾小便不利五苓散下消暑丸。中暑用小柴胡湯。良最

○秋為瘧

幼疾狀相似為疫

夏傷於暑秋必病瘧。○脈陰陽俱盛重於陰者變為溫瘧。○凡傷寒壞病前熱未除其脈陰陽俱盛重感寒邪變為溫瘧也寒熱往來口苦胸脇滿者小柴胡湯加芍藥少加桂枝主之若熱多者倍用柴胡寒多者倍用桂枝若熱甚而煩渴人參白虎湯少加薄桂主之若單熱無寒者不用桂也但有寒必少佐之如熱多者小柴胡湯合白虎湯主之痰多而熱者小柴胡合二陳湯主之若食少胃弱者加白朮心下痞加枳實黃連脈虛者必倍人參口渴者去半夏加括蕒根主之若邪熱蘊結于



傷寒秘要卷一 傷寒之類  
裏大便秘實脉滑大有力者以大柴胡湯下之若變瘡  
已正宜於雜病中求之

藥少吐衄封主之昔燕多皆用柴胡寒多皆用桂  
變為溫熱少寒燕封來口苦咽乾渴者小柴胡湯吐苦  
嘔。凡屬寒熱前燕未創其和創則其溫重寒寒平  
夏則必暑熱必涼寒。和創則其溫重寒寒重溫寒平  
小柴胡湯

一歲長幼疾狀相似為疫

春應暖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此  
非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者  
為時行疫病也。按說文民皆疾為疫從疒役聲今省  
作及爾釋名厲礪也病氣流行中人如磨礪傷物也疫  
役也多有鬼行役役不任也後人有溫疫寒疫時氣大  
頭傷寒等名其實皆疫也俗謂之瘟病即溫病之訛而  
名實淆矣。按傷寒例云傷寒病熱未已再遇風寒濕  
而各變為一病也何至于溫既曰再遇溫熱變為溫毒  
矣又曰再遇溫氣變為溫疫是獨溫之再遇而有二病



之異且疫者特感非時之氣眾人病一般也如冬應寒而反大溫人感冬溫而病則所謂溫疫如春夏應溫熱而反大寒人感暴寒而病則所謂寒疫也何待再遇於異氣耶茲云再遇溫氣變為溫疫是傷寒再遇異氣而變病也再遇異氣而變病未必眾人病相似安可以疫言傷寒例云陽氣濡弱陰脈弦緊此溫疫之脈也活人書注此脈于冬溫條下是以溫疫冬溫合為一病殊不知冬溫特感非時之氣耳溫疫是傷寒再遇於異氣也豈可合為一病邪此理未明故書此以似明哲愚謂感溫熱而為溫毒感溫氣而為溫疫此乃有微甚之分但

疫字疑誤恐當作疾字若作疫字則冬溫又何一字長幼病相似也一家病相似方可言疫况此傷寒病熱未已再遇溫氣而病何至于一家傳染病相似哉

溫疫陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變為溫疫以此冬傷於寒發為溫病脈之變證方治如說成此前熱未

者也溫熱相合變為溫疫

丹衆人病一般者天行時疫也有宜補宜散宜降

大黃

黃芩

黃連

人參

桔梗

防風

滑石

香附

蒼朮

人中黃

止時之熱者



傷寒與疫病  
右麴糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下  
一氣虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者  
二陳湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

本糞清臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱  
疾中毒并惡瘡蠱毒取汁浸阜角甘蔗治天行熱疾

丹解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多  
少酒取無灰酒一處研去滓溫服須臾大瀉毒亦隨出

雖十分渴亦不可飲水飲水難救

柴胡石膏湯 治時行溫疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞  
咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

柴胡

石膏 煨

赤芍藥

前胡

乾葛 各拾伍兩

升麻 貳拾伍兩

黃芩

桑皮 各參拾柒兩半

荆芥穗 參拾柒兩

右咬咀每服五錢水一盞生薑三片豆豉十餘粒同  
煎七分去滓熱服小兒分三次更量大小加減不拘  
時候

右三方熱多裏多者宜之

按溫疫之治與傷寒陽證相同然經所謂溫疫者即  
溫病也宜參溫病條處之

寒疫活人云一歲之中病無長幼率相似此則時行之



之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨證施行所以聖散子不問陰陽表裏也

老君神明散

白朮 壹錢

桔梗 貳錢

附子 炮去黑皮

細辛 各壹兩

烏頭 肆兩炮去皮尖

右五味為麤末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄三寸匕以水一碗煮令大沸分三服

聖散子 蘇內翰序全文見活人書時毒流行用聖散

子者一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫之行平日煎煮一釜不問老幼良賤各一盞即時氣不入

草豆蔻 拾箇麩裹煨去皮

猪苓 去皮 石菖蒲

茯苓 良薑

獨活 去蘆 附子 炮製去皮臍

麻黃 去根 厚朴 去皮薑製

藁本 芍藥

枳殼 麩炒去穰

柴胡 澤瀉 細辛

防風 去義 白朮

藿香 半夏

吳茱萸 湯洗

蒼朮 甘草 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎取八分去滓熱服餘



查再煎空心服之

右二方治疫寒多表多者宜之

按寒疫之證必與傷寒陰證同乃可用前執藥至謂不問陰陽表裏無不取効決無此理後世以過信蘇長公故施聖散子殺人如麻者屢矣嗟乎可不慎哉

果寒疫乃天之暴寒為病也凡四時之中天令或有暴風寒之作人感冒而即病者名曰寒疫也其證與正傷寒同但暴寒為輕耳治法若初作頭疼增寒拘急或嘔逆惡心中腕痞悶或飲食停滯不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散增損一二味主之若已發熱者宜

用十味芩蘇散汗之若身痛骨節疼而發熱者宜人參羌活散加葱白葛根生薑以汗之或神朮湯亦可若有自汗不宜再汗之宜九味羌活湯主之若熱不解或變別證宜從正傷寒條內治之也

龐病源載從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱病者此屬春時陽氣發外冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病暑病相



似但治有殊耳其治法初用摩膏火灸唯二日法鍼用  
崔文衍解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而更不  
解者勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若用藜蘆丸  
不吐者服赤小豆瓜蒂散吐之已解視病尚未了者  
復一法鍼之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯  
下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳食不消病  
亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七  
日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日  
在胸五日入胃乃可下也熱在胃而下外之熱乘虛而  
入胃然要當復下之不得下多致胃爛發斑者赤斑出

五死一生劇者黑斑出十死一生人有強弱相倍也病  
者過日不時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無  
熱但狂言煩躁不安精神言語不與人相主當者治法  
在可水五苓散證中。此巢氏載若時行寒疫之法云  
與溫病暑病相似但治有殊者據溫病無摩膏火灸又  
有冬溫瘡豆更有四時藏府陰陽毒又夏至後有五種  
熱病時令盛暑用藥稍寒故治有殊也

崔文衍解散 治時氣不和傷寒發熱

桔梗

細辛

白朮

烏頭

壹觔

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知為度

此三方  
統而有  
毒不可  
輕用



傷寒集書卷之七  
若時氣不和只服一錢五銖七辟惡欲省病一服了  
去此時行寒疫通用之無病預服以辟寒為佳皆酒  
調下

藜蘆散 辟温疫 即千金

藜蘆 躑躅 乾薑 各壹兩

阜角 各壹兩 細辛 拾捌銖 附子 牡丹皮 桂枝

朱砂 另研查

末之絳囊中帶一方寸匕男左女右臂上着之覺有  
病之時更以粟米大內鼻中酒服一錢匕覆取汗日  
再

赤小豆瓜蒂散 方見

鷄子湯 治時氣熱盛狂語欲走

生鷄子 柒枚 芒硝 壹兩

右用井花水一大升內二味同攪千遍去沫頓服之  
快利為度

禦法雄黃丸 治疫不相染

雄黃 壹兩 赤小豆 炒熟 丹參 鬼箭羽 各貳兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每日空心以温水下  
五丸可與病人同床共衣亦不相染

活務成子螢火丸 主辟疫疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂



傷寒 諸毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭羽去皮

蒺藜各壹兩

雄黃

雌黃各貳兩

礬石壹兩燒

麝羊角

鍛竈灰

鐵錘柄入鐵處燒焦各壹兩半

右九味搗為散以雞子黃并雄鷄冠一具和之如杏仁大作三角縫囊盛五丸帶左臂上仍可掛於門戶治時疫不相傳染方

用水磨雄黃塗于鼻上或以明雄黃一塊重五錢以絹帛包繫頭頂心亦妙一方或以上好香油塗鼻中亦可一方以桃樹葉上蟲搗爛以凉水調服之

亦可一方以赤小豆同糯米浸水缸中每日取水用之一方用貫仲浸水用之

四時非時之氣時氣者乃天疫暴厲之氣流行凡四時之令不正者乃有此氣行也若人感之則長幼相似而病及能傳染於人其作與傷寒相似蓋傷寒因寒而得之此乃疫氣不可與寒同論也治法要當辟散疫氣扶正氣為主若多日不解邪熱傳變何證宜從傷寒變證條內詳而用之惟發散之藥則不同矣凡發散湯劑香正氣散等皆選而用之也



春溫 活人曰春應溫而清氣折之責邪在肝或曰熱  
頭疼目眩嘔吐長幼率用升麻葛根湯解肌湯四  
時通用敗毒散。陶氏曰交春分後... 不惡  
寒而渴者為溫病用辛涼之藥微解肌不可大發汗  
急證見者用寒涼之藥急攻下不可誤汗誤下常須  
識此表證不與正傷寒同治裏證同

夏溫 活人曰夏應暑而寒氣折之責邪在心或身熱  
頭痛腹滿自利長幼率相似理中湯射干湯半夏桂  
甘湯。陶氏曰交夏至後有頭疼發熱不惡寒而渴  
此名溫病愈加熱者名熱病止用辛涼之藥解肌不

宜大汗裏證見急攻下表證不與正傷寒同治裏證  
治法同

秋溫 活人曰秋應涼而大熱抑之責邪在肺濕熱相  
搏民多病癰咳嗽喘急沸草散白虎加蒼朮湯病癰  
發黃茵陳五苓散。陶氏曰交秋至霜降前有頭疼  
發熱不惡寒身體痛小便短者名濕病亦用辛涼之  
藥加躁以解肌亦不宜汗裏證見者宜攻下表證不  
與正傷寒同

冬溫 活人曰冬應寒而反大溫折之責邪在腎宜萎  
蕤湯



○丹溪云冬温為病非其時而有其氣者冬時嚴寒君

手當閉藏而反發泄於外專用補藥帶表藥

作人中黃方 用竹筒兩頭留節一節中作一竅內甘

草於中仍以竹末釘塞其竅冬月置大糞缸內浸一

月取出曬乾用治温毒用此藥一味入補藥帶表同煎服之

活人曰仲夏之時毒與傷寒大異蓋傷寒者傷寒

氣而作冬温者感暑氣而作寒疫者暴寒折人非觸冒

之過其治法不同所施寒熱温涼之劑亦異不可拘以

日數發汗吐下隨證施行要之治熱以寒温而行之治

温以清冷而行之治寒以熱涼而行之治清以温熱而

行之以平為期不可以過此為大法

神効沃雪湯附治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣

相傳服之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼朮堅者炮刮去皮 乾薑炮製 甘草炙各陸兩

厚朴去皮薑製 防風嫩者 白芍藥去皮 乾葛各肆兩

右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不

拘時少頃取生薑葱作羹投之避風坐卧身體微潤

即愈如疫氣正相傳染清晨進一服為佳常服每用

二錢水一盞煎至八分服



二錢木一錢煎至八分服

竹葉湯或桑葉五叶煎至五分服

蘇合少煎服半量葱白美對之

木如即食服四錢水二錢煎至一

乳林薑燒切風嫩昔白芍藥去葶藶各

蒼木去葶藶各甘草各

卧對服之或天雷此藥如不可拘以

軒校天雷感則宜對寒創則二錢未辨却計變惡惡

行之以平為限不可以斷此為大去之

### 多眠多汗脉浮為風温

陽脉浮滑陰脉濡弱者更遇於風變為風温此

風者也難經曰中風之脉陽浮而滑陰濡而弱風來乘熱故變風温

若發汗已身灼熱者名曰風温風温為病脉陰陽俱浮

自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小

便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時

瘈瘲若火重之一逆尚引日再逆促命期已

發汗已身灼熱者非傷寒為風温也風傷於上而陽受邪也衛者氣也風則傷衛脉陰陽俱浮自汗出者衛受

受風温而氣昏也鼻息必鼾語言難出者風温外甚而氣擁不利也若被下者則傷藏氣太陽膀胱經也內經

曰膀胱不利為癰不約為遺溺癰者小便不利也太陽



之脈起目內眥內經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕小便不利直視失溲為下後渴津液損藏氣風溫外勝經絡欲絕也為難治若被火者則火助風溫成熱微者熱痲而發黃劇者熱甚而生風如驚癇而時瘳痲也先曾被火為一逆若更以火薰之是再逆也一逆尚猶延引時日而不愈其再逆者必致危殆故云促命其

○附

活風溫者脈尺寸俱浮頭疼身熱常自汗出體重其息必喘四肢不收嘿嘿但欲眠治在少陰厥陰不可發汗發即譫語獨語內煩燥不得卧若驚癇目亂無精如此死者醫殺之耳。風溫忌發汗宜萎蕤湯身灼熱者知母乾葛湯如渴甚者括萎根湯脈沉身重汗出者漢防

風溫忌發汗

已湯

萎蕤湯 治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩疼喉咽乾舌強胸內疼痞腰背強

葛根

白芷

麻黃

用沸湯泡

杏仁

去皮尖雙仁者

甘草

炙各半兩

萎蕤

柒錢半

石膏

杵碎

羌活

去蘆各壹兩

川芎

叁錢

青木香

壹錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎半鍾日三四服

又方

萎蕤

白薇

麻黃



傷寒風濕

獨活

杏仁

川芎

青木香

甘艸各壹兩

石膏三兩

右咬咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗若一

寒一熱加朴硝二錢半大黃二兩下之如無木香可

用麝香一分小品方云萎蕤湯治冬溫春月中風傷

寒則發頭腦疼痛咽喉乾舌強肉疼心胃痞滿腰背

強

知母乾葛湯 治風溫身體灼熱甚者

知母

萎蕤各叁錢

天南星生

麻黃去根節

防風

杏仁

羌活各貳錢

甘草

黃芩

木香

升麻

人參

川芎各壹錢

石膏陸錢

葛根搗錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服

防已湯 治風溫脉浮身重汗出一方無人參

防已肆兩

甘艸炙

黃芪蜜炙

人參各壹兩

生薑貳兩

白朮叁兩

右咬咀每服五錢水一盞半煮取一中盞去滓飲訖

仍坐被中汗出如虫行或被卧取汗出

許學士云風溫誤汗用防已黃芪湯救之

傷寒風濕

失之七

三九



括萋根湯 治風温灼熱大渴

石膏 人參 乾萋各貳錢 括萋根叁錢

防風 知母各壹錢半 甘草壹錢

右作一服水二鍾煎至一鍾通口服祖再煎

葛根龍膽湯 治風温脉弱身重汗出

石膏五分 甘草柒分 龍膽草 桂枝各壹錢  
無汗不用

白芍藥 大青各壹錢半 葛根 升麻各貳錢

姜蕤叁錢 生薑叁片

右煎服法同前

治風温活人本方姜蕤湯以有麻黃不敢用宜白朮

湯主之方見前太陽病發熱條

若頭眩汗出筋惕肉瞤者加牡

蠣 若腰背強鞭者加羌活 若舌乾發渴者加人參

若身灼熱甚者加知母 若身體重多汗者加黃芪

若內傷冷者不加

而解者是也 有頭中重者此中 中者是也 有先濕而後感風者身痛發熱日晡則甚 名風濕者是也 太陽家病與太陽病相似其不同者有脈沈而細者是也 經家脈亦沉而細若相似者曰脈沈相似而證有異濕則身疼則不疼也



傷寒風濕 阿膠之七

石膏 人參 乾薑 桂枝 芍藥 甘草

防風 知母 黃芩 白朮 茯苓 白芍 白朮 白朮

右作一服水二鍾煎至一鍾通口服在再煎

葛根龍膽湯 治風濕麻痺身重汗出

石膏 五分 甘草 一分 龍膽 一分 桂枝 一分 芍藥 一分

管內射令管不吐

苦良以燕其管吐酸母 苦良艷重多行管吐黃莖

馳之 苦艷背起躡管吐美哉 苦舌掉發風管吐人參

濕主之 濕發熱刺 苦與却行出前出肉脚管吐

一身盡痛為濕

成濕有數種有濕痺者痺者痛也濕則關節疼但當利其小便者是也有寒濕相搏其證但頭汗出背強欲得被覆向火者是也有風濕相搏者一身盡痛法當汗出而解者是也有頭中寒濕此中之淺者故鼻塞納藥鼻中者是也有先濕而後感風者身痛發熱日晡劇者此名風濕者是也太陽家病與太陽相似其不同者有脉沈而細者是也痙家脉亦沉而細疑若相似答曰脉雖相似而證有異濕則身疼痙則身不疼也

脉法脉經曰沉而緩沉而細皆中濕 脉大或脉浮虛



傷其... 而瀉者皆寒濕。脉來滑疾濕熱。脉洪而緩陰陽兩  
虛濕熱自甚。脉浮風濕。趙氏曰仲景論風濕之脉  
浮虛而瀉夫浮者風也瀉者濕也脉經亦曰脉來甚者  
為病寒濕也活人書以一浮脉為風濕之脉浮可言風  
不可言濕當從仲景浮虛而瀉可也

風濕病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病  
傷於汗出當風或久傷取冷所致也。成一身盡疼者濕也發熱日晡所劇者風也若汗出當風而得之者則先客濕而後感風若久傷取冷得之者則先傷風而後中濕可與麻黃杏仁  
甘草湯  
麻黃杏仁薏苡仁甘草湯方

味黃去節

薏苡仁谷半

甘草炙貳錢半

杏仁拾枚去皮尖炒

水三盞煎至一盞半去滓分二服避風取微汗

風濕相搏傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉  
側不嘔不渴脉浮虛而瀉者桂枝附子湯主之。以散表

若大便鞭小便自利去桂加白朮湯。此條妙。在脉浮虛而瀉脉若沉實滑大數者非也。風濕相

搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此

可發汗汗之病不愈者何也答曰發其汗汗大出者但

風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微

微似欲汗出者風濕俱去也。成值天陰雨不止明其濕勝也內經曰陽受風氣陰



傷寒論

物之也

卷三

受濕氣又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之  
風濕相搏則風在外而濕在內汗大出者其氣暴暴則  
外邪出而裏邪不能出故風去而濕在汗微微而出者  
其氣緩緩則內外之邪皆出故風濕俱去也○麻黃白  
桂湯桂枝附子湯風濕宜汗○風濕相搏骨節煩疼掣

痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不

欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之活人用杏仁湯

寒濕相搏濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若

下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱

胸中有寒渴欲得水而不能飲則口燥煩也成濕勝則多汗傷寒

則無汗寒濕相搏雖有汗而不能周身故但頭汗出也皆陽也腹陰也太陽之脈夾脊抵腰太陽客寒濕表氣不利而背強也裏有邪者外不惡寒表有邪者則惡寒欲得被覆向火者寒濕在表而惡寒也若下之早則傷

胃氣損其津液故致噦而胃滿小便不利下後裏虛而陽氣因虛而陷於下焦為丹田有熱表中寒乘而胃中為胃上有寒使舌上生白胎滑也藏燥則欲小以胃上客寒濕故不能飲而但口燥煩也○或云曰胸湯甘草附子湯小便不利五苓散理中去薑加選用○小便利者桂枝加附子理中加茯苓茯苓白湯

頭中寒濕濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞

而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故

鼻塞內藥鼻中則愈成病有淺深證有中外此則濕氣淺者也何以言之濕家不云關節

煩疼而云身上疼者是濕氣不流關節而外客肌表也  
不云發熱身似熏黃復云發熱面黃而喘是濕不干於脾而薄於上焦也陰受濕氣則濕邪為深今頭痛鼻塞而煩是濕客於陽而不客於陰也濕家之脉當沉細為濕氣內流脉大者陽也則濕不內流而外在表也又以自能飲食胸腹別無滿痞為腹中和無病知其濕氣微

傷寒論

卷三

六十一



內藥鼻中以宣泄  
頭中寒濕○瓜蒂散

**濕熱**濕家之為病一身盡疼發熱身色如熏黃也成身黃如

橘于色者陽明瘵熱也此身如熏黃即非陽明瘵熱身黃發熱者梔子檳皮湯主之為表裏有熱則身不疼痛此一身盡疼非傷寒容熱也知濕邪在經而使之脾惡濕濕傷則脾病而色見是以身發黃者為其黃如烟熏非正黃色也○徐氏曰此本濕熱證而論不言熱無治法或治以白朮附子湯甘草附子湯桂枝加桂等藥愚意恐與濕熱病不宜

**濕痺**太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺濕

痺之候其人小便不利大便反快但當利其小便或云甘草

附子湯麻黃連翹赤小豆湯千金翼細作緩○金匱曰務傷皮腠濕流關節疼痛而煩者濕氣內流也濕同水也脉沉而細者水性趣下也痺痛也因其關節煩疼而曰濕痺非脚氣之痺也內經曰濕勝則濡泄小便不

大便反快者濕氣內勝也但當利其小便以宣泄腹

濕氣古云治濕不利小便非其治也○趙氏曰活人一身盡疼發熱身黃小便不利大便反快此名中濕

注云脉細者非也愚詳仲景上文脉沉而細為濕痺活以脉細為非豈濕痺與中濕異歟既曰身黃

不熱其色如熏黃與黃如橘于色豈中濕與陽明熱豕下之早則噦又下之早則額上汗出微喘小便

利者死下利不止者亦先此又有不可下者也

**風寒濕雜合為痺**活人曰風寒濕雜至合而為痺

身重汗出惡風痛如歷節狀防已黃芪湯○經曰病身

熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤日脉赤獨頭搖卒

口噤背反張者此太陽中風重感寒濕為瘥也或云白

朮黃芪附子湯徐氏曰錯雜之邪合至當論其先後多少分治可也



濕病與傷寒相似黃氏曰太陽濕家病與太陽傷寒相  
似其不同者濕脉沉而細也○愚按脉經曰脉大或浮  
虛皆寒濕是濕脉亦不專於沉細豈可恃此以差別傷  
寒還當以證參之庶幾無失濕脉與瘧脉亦有相似者  
而證則不同濕則身疼瘧則身不疼也○趙氏曰頭疼  
發熱皆身痛似與傷寒相似其不同者脉沉而細頭  
汗面黃飲食所以為異也夫太陽傷寒脉必浮盛今  
脉沉細若非濕證即陽證得陰脉也盖有面黃頭汗其  
為濕也明矣其濕家能飲食者為病在經而不干於裏  
也然大便反快而小便滯者亦經絡瀯滯不能施化所

致也

濕温活人曰其人傷濕又中于暑名曰濕温兩脛逆冷  
胸滿頭目痛妄言多汗其脉陽浮而弱陰小而急茯苓  
白朮湯白虎加蒼朮湯切勿發汗汗之名重喝必死○  
趙氏曰活人云嘗傷于濕因而中暑濕熱相搏則發濕  
温許學士云先受暑後受濕雖所言感受先後不同而  
其證治則一也又論脉曰陽濡而弱陰小而急許學士  
以關前為陽關後為陰紀氏則以浮為陽沉為陰雖所  
言部位不同而其脉狀則一也要之二說皆通不可偏  
廢然于用藥則白虎加蒼朮誠為至當但活人書前不



可表門兼言木附湯此濕溫門却但言白虎而不言木  
附何耶龐氏方云愚醫昧於冷熱之脉見足脛冷多行  
四逆輩如此醫殺之耳濕溫脉小緊有類傷寒脉但證  
候有異數進白虎則脛自溫而瘥朱氏之意豈以木附  
與四逆藥物相類恐犯龐氏之戒而此問不載設若濕  
氣勝藏府虛大便滑木附其可廢乎屠氏藥法見前。  
本義云一身盡痛不能轉側者謂之濕溫。吳氏曰經  
曰濕溫之脉陽濡而弱陰小而急活人書謂其人先傷  
於濕後傷於暑暑濕相搏其證多汗妄言雙脛逆冷者  
宜木附湯加人參香薷扁豆主之若脉大有力自汗煩

渴者人參白虎湯加白朮主之輕者或十味香薷飲清  
暑益氣湯增損主之但在除濕益元氣清暑而已方見

中暑門

死證濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不

止者亦死成濕家發汗則愈金匱要畧曰濕家身煩疼

大逆額上汗出而微喘者乃陽氣上逆也小便自利或

下利者陰氣下流也陰陽相離故云死矣內經曰陰陽

離缺精氣乃絕

麻黃加朮湯方

麻黃參兩

杏仁柒拾枚

桂枝去皮

白朮肆兩

甘草炙各貳兩

傷寒論卷之七 麻黃湯方 麻黃 參兩 杏仁 柒拾枚 桂枝 去皮 白朮 肆兩 甘草 炙各貳兩



傷寒論 卷之七  
右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥  
煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗  
此外治濕方論雜病首冊已詳不復贅敘

○身反張為瘵

有汗為柔瘵無汗為剛瘵證治詳見雜病五冊不復贅  
敘

中暑門之脈陽濡而弱陰小而急活人書謂其人先傷  
暑益屎黃熱主之臥床創感益示屎黃暑而身衣具  
盛者入參白朮葛根白朮主之痺者加木和香薷須臾

婦人傷寒

婦人傷寒六經傳變治例皆與男子同法惟經水適來  
適斷熱入血室與夫胎前產後崩漏帶下則治有殊別  
也

○熱入血室婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日  
熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱  
入血室也當刺期門隨其實而瀉之

東垣云安兒安聞  
夜夢亡人皆肝木  
大盛而為邪也刺  
期門與此義同

○許學士治一婦人患熱入血室證醫者不識用補血  
調氣藥延養數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小



柴胡已遲不可行也無已則有一焉刺期門穴斯可  
矣予不能針請善針者治之如言而愈或問曰熱入  
血室何謂而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣  
相搏上下流行或遇經水適來適斷邪氣乘虛而入  
血室血為邪迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復  
入臆中則血結於胸也何以言之婦人平居水當養  
於木血當養於肝方未受孕則下行之以為月水既  
娠則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳皆此  
血也今邪氣畜血併歸肝經聚於臆中結於乳下故  
手觸之則痛非湯劑可及故當刺期門也

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則譫語如見鬼  
狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

柴胡湯和之○犯胃氣謂  
下之犯上二焦謂發汗也

衍義云一婦人温病已十二日診其脉六七至而濇  
寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之  
病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對  
病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小  
柴胡湯加桂乾薑一日寒熱遂止又云我臍下急痛  
又與抵當丸微利臍下痛瘥身漸涼脉漸勻尚不了  
了仍復與小柴胡次日又云我但胸中熱燥口鼻乾



又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胸丸半服利三行次日虛煩不樂時亦有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用張

仲景方

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故如瘧狀發作有時小柴胡湯

主之

○附

雲婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入血室姪姪傷寒則不同也宜以四物安養胎血佐以汗下之藥治之

預防熱入血室

婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒脈浮而緩恐熱入血室故倍加芍藥桂枝加芍藥湯

桂枝

壹兩半

赤芍藥

叁兩

生薑

壹兩半

甘草

壹兩

大棗

陸枚

右剉細每服五錢水煎服

婦人傷寒

失之此

六十七



婦人傷寒脉浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室宜麻黃加生地黄湯

麻黃貳兩半 桂枝壹兩半 甘草半兩

生地黄貳兩 杏仁貳拾伍枚  
去皮尖

右咬咀每服五錢水煎服

活婦人傷寒經脉方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜用

乾薑柴胡湯

柴胡肆兩 括蕒棗 桂枝各壹兩半

牡蠣煨 乾薑 甘草各壹兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去渣溫服初

服微煩再服汗出而愈

羅小柴胡加地黄湯 治婦人室女傷寒發熱經水適

來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡

露方來忽間斷欲死

柴胡壹兩貳錢半 人參 黃芩

甘草炙 半夏湯洗 生地黄各棗

右為麤末每服五錢生薑三片棗二枚水煎服

雲婦人傷寒身熱脉長而弦屬陽明少陽往來寒熱夜

躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室不實滿者小柴

胡加牡丹皮湯主之大實滿者桃仁承氣湯下之



婦人傷寒  
小柴胡加牡丹皮湯方

柴胡

人參

牡丹皮

各貳兩

甘草

生薑

半夏

湯洗陸

大棗

黃芩

右剉細每服一兩水煎服

婦人傷寒頭痛脉浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉不行心下結鞭口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脉沉而數者當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯主之

柴胡

半夏

黃芩

生薑

大黃

芒硝

甘草

大棗

右剉每服一兩水煎去滓下芒硝并沸温服若脉不

沉數即不可下

許辛亥中寓居毗陵學官王仲禮其妹病傷寒發寒熱遇夜則如鬼物所憑六七日忽昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人疾勢極危召予視之予曰得病之初曾值月經來否其家曰月經方來病作而經遂止一二日發寒熱晝雖靜夜則有鬼祟從昨日誕生不省人事予曰此熱入血室之證也仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀發作有時此



名熱入血室醫者不曉以剛劑與之遂致胸膈不利涎  
潮上腕喘急息高昏冒不知人事當先化其痰後除其  
熱予急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次授  
以小柴胡加地黃湯三服而熱除不汗而自解矣  
雲婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脈沉而遲太陽  
標病少陽本病經水適斷桂枝加附子紅花湯

桂枝貳兩

芍藥

生薑各壹兩半

甘草炙壹兩

附子炮

紅花各伍錢

右剉細每服一兩水三盞煎服

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經

水過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草

芍藥

生地黄

川芎

各壹兩

右呖咀每服壹兩水三盞煎至一盞半去滓入髮灰

五錢調勻溫服不止者刺隱白

妊娠傷寒吳凡妊娠傷寒六經治例皆同但要安胎為

主凡藥中有犯胎者則不可用也如藿香正氣散十味

芩蘇散參蘇飲小柴胡湯之類有半夏能犯胎如用須

去之若痰多嘔逆必用以半夏麩則可如無沸湯泡

七次去皮臍生薑自然汁拌晒乾乃可用也凡川烏附

子夫雄側子肉桂乾薑大黃芒硝芫花甘遂大戟蜀漆



水蛭、蜜、桃仁、牡丹皮、乾漆、代赭石、瞿麥、牛膝等類之  
物皆動胎之藥，凡用必須斟酌仔細而詳之也。其餘詳  
見各條治例，不錄。凡護胎之法，傷寒熱病熱甚者宜用  
井底泥塗臍二寸，乾即又塗之。一方以白藥子為末，水  
調塗之。一方以伏龍肝末水調塗之，可護胎也。大抵妊  
娠傷寒，合用湯劑必加黃芩、白朮二味，能安胎也。或以  
此二味煎湯與之，或為細末，白湯調下二三錢，亦佳。如  
妊婦素稟弱者，藥中四物湯佐之，不可缺也。且如用小  
柴胡湯去半夏，加白朮，合四物湯用之，可以保胎除熱  
也。其效如神，餘皆倣此用之，則妙矣。

○**桂枝黃芪解肌湯**治婦人妊娠傷風自汗

人參

黃芪

當歸

川芎

甘草

炙各伍錢

芍藥

陸錢

加蒼朮、生地黃亦可

右為釐末，每服五錢，水煎溫服，無時。

○**海若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虛六合湯**

四物湯

肆兩

桂枝

地骨皮

各柒錢

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉緊太陽經病宜表實六合湯

四物湯

肆兩

麻黃

細辛

各半兩



若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脉浮而熱頭痛者  
太陽標病也宜風濕六合湯

四物湯

肆兩

防風

蒼朮

製各半錢

若妊娠傷寒下後過經不愈濕毒發斑如錦紋宜升麻  
六合湯

四物湯

肆兩

升麻

連翹

各半錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛而脉弦少陽證宜柴胡六合湯

四物湯

肆兩

柴胡

黃芩

各半錢

若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脉沉數陽明太陽  
急下之宜大黃六合湯

四物湯

兩四

大黃

伍錢

棗仁

去皮小大炒

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯

兩四

人參

五味子

各伍錢

若妊娠傷寒後虛痞脹滿者陽明本虛宜厚朴六合湯

四物湯

兩四

厚朴

枳實

炒各伍錢

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯

四物湯

兩四

梔子

黃芩

各伍錢

若妊娠傷寒大渴蒸蒸而煩脉長而大者宜石膏六合湯

湯

四物湯

兩四

石膏

知母

各伍錢



若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯

四物湯

四兩

茯苓

澤瀉

各五錢

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血者宜琥珀六合湯

四物湯

四兩

琥珀

茯苓

各伍錢

若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損動者宜膠艾六合湯

合湯

四物湯

四兩

阿膠

艾

各五錢一方加甘草同上

加甘草乾薑黃芪

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯

四物湯

四兩

附子

炮去皮

桂

各伍錢

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯下之

四物湯

四兩

生地黄

大黃

酒浸各伍錢

婦人妊娠或畜血抵當桃仁勿妄施要教子母俱無損大黃四物對分之

丹施孺人傷風未解兩足下脛冷嗽多不吐痰頭眩蓋其性急又當臨月

黃芩

半錢

陳皮

白朮

各壹錢

蘇梗

叁分

木通

枳殼

炒各伍分

麻黃

叁分

甘草

炙貳分



桔梗

蒼朮

各半錢

右水煎服無時

婦人有孕傷寒脉浮頭重腹中切痛宜桂枝芍藥當歸湯

桂枝

芍藥

當歸

各壹兩

右剉細每服一兩水煎

婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者太陰病也宜芍藥湯

芍藥

白朮

甘草

茯苓

各壹兩

右如前修服

治妊娠傷寒安胎宜阿膠散

人參

白茯苓

阿膠

炒

桑寄生

白朮

各等分

右搗羅為細末糯米飲調下二錢日二服

治妊娠傷寒安胎宜白朮散

白朮

黃芩

新瓦上炒香各等分

右為末每服三錢水一鍾生薑三片大棗一枚擘破

同煎至七分去滓溫服但覺頭疼發熱便可服二三服即瘥惟四肢厥冷陰證見者未可服

治妊娠傷寒憎寒發熱當發其汗宜蔥白湯

蔥白

拾莖

生薑

貳兩切



右劉水二盞煎至一盞連服取汗

○海蔥白一物湯用蔥白二把以水一升熟煮取汁令食盡亦主安胎若胎損須臾即出

紫蘇散 胎氣不和揆上心腹脹滿疼痛謂之子懸能安活胎亦下損胎又治傷寒頭疼發熱遍身疼痛

紫蘇葉

當歸 各壹兩

人參

甘艸 各半兩

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮 去白各壹兩

每服入錢水一鍾半生薑五片葱白三莖連須煎至一鍾去滓食前熱服若心腹甚痛者加木香玄胡索

研同煎服

芎蘇散 治妊婦傷寒頭痛增寒壯熱身痛項強

紫蘇葉

川芎

白芍藥

白朮

陳皮

乾葛

甘草

麥門冬 各等分

劉散每服四錢薑四片葱白三莖煎熱服

治婦人傷寒妊娠服藥例 若發熱惡寒不離桂枝芍

藥 若往來寒熱不離柴胡前胡 若大渴者不離知

母石膏五味子麥門冬 若大便泄者不離桂附乾薑

白朮 若大便燥結者不離大黃黃芩 若月經適來

適斷者不離小柴胡 若胎不安者不離人參阿膠白



木黃芩。若發汗者不離煎豉生薑麻黃旋覆。若頭痛者不離石膏山梔前胡。若傷暑頭痛者不離柴胡甘草石膏。若滿悶者不離枳實陳皮。若胎氣不安者不離黃芩麥門冬人參。若斑發黑者不離黃芩梔子升麻。

大治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

伏龍肝研為極細末調塗臍下三寸乾即易瘥即止

又方 井水泥塗乾即易之二方出本事有効

又方 浮萍 藍根 朴硝 蛤粉 大黃微炒

右為末水調傅臍上安胎解熱極妙

又方白藥子為末水調傅腹上

治妊娠霍亂二方附少陰吐利門

治妊娠發斑變為黑色宜梔子大青湯

黃芩 升麻 梔子仁各貳兩

大青 杏仁各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半細切蔥白三寸煎至一

盞去滓溫服

產後傷寒。新產後患傷寒不可輕易發汗蓋有產時傷力發熱去血過多發熱惡露不去發熱三日蒸乳發熱或有早起動勞飲食停滯一皆發熱狀類傷寒要在



仔細詳辨，切不可輒便發汗。大抵產後大血空虛，若汗之則變筋惕肉瞤，或鬱冒昏迷而不省，或風搖擗而不定，或大便秘澀而難去，其害非輕。切宜精審，凡有發熱，且與四物湯以川芎、當歸為君，最多白芍藥，須炒過酒蒸熟，地黃佐之，如發熱加軟苗柴胡、人參、乾薑主之。最効蓋乾薑之辛熱能引血藥入血分，氣藥入氣分也。且能去惡養新，有陽生陰長之道。以熱治熱，深合內經之旨。予嘗用之，取効如神，故錄以勸之。如有惡露未盡者，益母丸、黑神散必兼用之。若胃虛食少者，必加白朮、茯苓。有痰嘔逆者，必加陳皮、半夏。其餘六經各條治例皆

同。但藥中必加四物湯為主，乃養血務本之要也。

產後中風，數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶乾，嘔汗出，雖多，陽旦證耳，可與陽旦湯。即桂枝湯方，見太陽病。產後中風，發熱面赤，喘而頭痛，竹葉湯主之。

竹葉 壹把

葛根 叁兩

防風

桔梗

桂枝

人參

甘草 炙各壹兩

右咬咀，每服五錢，棗一枚，薑五片，水一盞半，煎一盞，去滓服。溫覆使汗出，若頭項強，用大附子半錢煎藥，揚去沫，嘔者加半夏一錢。



後傷  
六補

忌藥  
忌苦寒  
忌味

痛  
活

乳不通  
者宜壓  
熱下乳

婦人傷寒

七十九

產後發熱惡寒皆屬血氣虛左手脉不足補血右手脉不足補氣凡惡寒發熱又腹痛當去惡血惡寒發熱乳汁不通及膨者無子當消用麥芽二兩炒研細清湯作四服調下有子當下用木通通草猪蹄汁調煎服產後纔見身熱不可發表并一切苦寒藥必用乾薑治之大發其熱輕則用茯苓淡滲其熱

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等多是血虛或敗血作梗宜以平和之劑與服必效如玉露散或四物加北柴胡等分煎服若便以小柴胡湯及竹葉石膏湯之類竟不救者多矣

玉露散治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯悉治之涼膈壓熱下乳

人參

茯苓

甘草 各半兩

苦梗 炒

川芎

白芷 各壹兩

當歸 貳錢半

芍藥 柒錢半

右咬咀每服五錢水一盞煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半



大則蘇香瓜大黃二錢半通通  
古艾即每服五錢水一盞煎至十  
分盛冰以飲其

當歸 煎過半

芒藥 煎過半

苦野 炒

川芎 不可便

白芷 各壹兩

人參

茯苓 平相之

甘枳 各半兩

則菽豉黍苳之京煎製燕下  
王霸姑益垂對厚想木竹良豔北棘取蘇煎目昏蘇大

### 小兒傷寒

津傷寒表裏攻發 有表證惡風惡寒者當發表

風者白朮散惡寒者神木湯 如氣盛能食不大便無表證者可攻

裏 春主溫屬木身溫當發汗 海藏云神木湯 夏主長屬火

身熱而煩躁合大發散 海藏云神木湯 長夏主化屬土

及居四季同當調其飲食 海藏云四君子湯 秋主收屬金身

涼內溫合微下 海藏云通膈丸金花丸 冬主藏屬水身熱而惡

寒是熱在外而寒在內身寒而惡熱是熱在內而寒在

外海藏云熱在內者調胃承氣湯寒在內者調中湯丸

潔凡傷寒宜依四時陰陽升降逆順剛柔而施治法氣



升浮則順發之收藏則下之。有汗發熱惡風脉浮緩者風傷衛桂枝湯。無汗發熱惡寒不當風而自憎寒脉浮緊者寒傷榮麻黃湯。有汗發熱惡風脉浮緊無汗發熱惡寒脉浮緩謂之榮衛俱傷青龍桂枝麻黃各半湯。無汗發熱不惡風寒脉沉洪者可下之更詳認其厥與不厥量寒熱淺深而治之。有汗四肢厥脉沉微者名陰厥四逆湯。無汗四肢厥脉沉微者名陽厥大承氣湯加膩粉。如四肢不厥身熱內外皆陽不動三焦宜涼藥三五服下之。黃芩甘草湯。黃芩白朮湯。黃芩蒼朮湯。黃芩梔子湯。連翹飲子。小柴

胡湯。八正散。涼膈散。白虎湯。五黃散。此上

中下三焦藥宜選用之。中暑脉虛背惡寒自汗而渴者白虎湯身涼脉緊熱在內者急下之。口燥咽乾不大便是也。無汗身大熱者可發汗升麻湯大青膏天麻膏。有汗身大熱者桂枝湯惺惺散解肌湯小柴胡湯白朮防風湯可選用之。發汗者量四時暄暑燥濕風寒各宜春涼夏寒秋溫冬熱而發之。

錢傷風貪睡口中氣熱呵欠煩悶當發散與大青膏表證也。潔古補遺云小兒外感於風寒向急呵欠煩悶皮

涼寒藥



大青膏方

天麻

青黛

研各壹錢

白附子

生壹錢半

蝎尾

去毒生半錢

硃砂

研

天竺黃

研

麝香

各一字七

烏稍蛇肉

酒浸焙乾取末半兩

右同研細生蜜和成膏每服半阜子或一阜子大月中兒粳米大同牛黃膏薄荷水化一處服之五歲已

上同甘露散服

雄黃膏治傷風温壯熱引飲

雄黃

小棗大研蘿蔔根水并醋一大盞煮盡

甘艸末

川甜稍

各叁錢

寒水石

研細五錢七

腦子

一字七

硃砂 伍分

右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半阜子大

右前大青膏發散貪睡口氣熱呵欠煩悶表證者蓋

為三歲已下小兒未能言者設也

活尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱

桔梗

細辛

人參

白朮

甘草

括蕒根

白茯苓

川芎

各等分

右為末每服二錢薑二片薄荷二葉煎服三歲已下

作四五服凡小兒不問傷風傷寒風熱與此即愈







右為麤末木煎服

升麻黃芩湯 治傷風有汗頭疼發熱惡風

升麻 葛根 黃芩 芍藥 各伍錢半

甘草 壹錢半

右咬咀每服二錢水煎溫服

○右惺惺散等藥發散頭痛發熱惡風寒表證者考為

三歲已上小兒能言者設也能言故頭疼惡風寒可

問而知也前五方通治有汗無汗惡風惡寒第五方

治無汗惡寒第六方治有汗惡風

○錢與大青膏不解散有下證當下大黃丸主之大熱飲

水不止而善食者可微下餘不可下也此裏證也紫古補遺云大熱飲

水能食不大便用大黃丸作散子與服之如清便自調慎不可妄下恐外熱逐於內而變結胸危證多矣

○大黃丸治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止

有下證者宜服之

川芎 半兩 黑牽牛 半兩半生 大黃 酒蒸 壹兩

甘草 炙貳錢半

右為細末稀糊和丸麻子大二歲每服十九溫蜜水

下乳後服以溘利為度未利加丸數

○活頭額痛身體發熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹

飲三黃丸主之三方並見幼科 身體潮熱頭目昏痛



心神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣

湯主之洗心散見痘門

頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙聖丸

主之方見幼科食癖門

潔如身表無大熱而小便不利是有濕熱結膀胱仍用

勝濕藥白朮白茯苓之類利小便則其熱自退

雲小兒傷寒煩熱小便赤澁大便褐色面赤熱者導赤

散

錢傷風蕪藏蕪心則驚悸蕪肺則悶亂喘息哽氣長出  
氣嗽蕪腎則畏明各隨補母藏虛見故也

傷風手足冷脾藏怯也當先和脾後發散和脾益黃散

發散大青膏主之

此治陰厥有汗脈沉微者若陽厥無汗脈沉滑者不宜此法宜大承氣湯

而加膩粉

傷風自利脾藏虛怯也當補脾後發散補脾益黃散發

散大青膏主之未瘥調中丸主之有下證大黃丸下之

後服溫驚丸

傷風腹脹脾藏虛也當補肺必不喘後發散仍補脾也

去脹塌氣丸主之發散大青膏主之

傷風吐瀉

治見幼科準繩吐瀉門瀉用益黃散白朮散發散用大青膏

湯治夾驚傷寒熱極生風薄荷散

惡前惡後



薄荷葉半兩 羌活

麻黃去根節 甘草各壹錢 天竺黃

僵蠶炮各貳錢半 白附子炮各貳錢半

一為細末每服一錢水半盞煎至三分加竹瀝少許妙

聖小兒表傷寒則皮膚閉而為熱盛即生風欲為驚搐

血氣未實不能勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱

當發之宜大青膏

肺盛復有風冷則胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺

後發散風冷散肺瀉白散散風大青膏主之若止傷寒

則不胸滿

畏明

腎虛則畏明宜補腎地黄丸

有表者間用也黃膏發散之

傷風下後虛熱以藥下之太過胃中虛熱飲水無力當

生胃中津液多服白朮散。小兒結熱於內口乾而渴

身黃體重者宜白朮散

湯傷寒發渴宜白虎湯

潔大熱飲水能食不大便用大黃丸作散服之

右三方白朮散治虛渴為下後而食少胃虛者設也

白虎湯大黃丸治實渴為未經下而能食不大便者

設也

潔傷寒咳嗽吐清水哽氣長出氣是肺之不足也合用

已易集 失之七



阿膠散面白如枯骨者死不治。身熱咳嗽吐痰者當

用漏銀丸。方見幼科

右二方治咳嗽阿膠散治虛嗽為噎氣長出氣者設也漏銀丸治實嗽為痰盛喘滿者設也若有表證惡風寒而嗽者當用惺惺散加減四君子湯鼠粘子湯之類是也

陰厥陽厥見

潔身大熱吐逆不止者茯苓半夏湯即小半夏加茯苓湯方見嘔門

湯傷寒嘔者枳殼半夏湯

枳殼 半夏 各半兩

右水一碗薑十片煎至半碗十歲已下作五服

藿香正氣散治傷寒發嘔

藿香葉 厚朴製 半夏製

甘草炙 陳皮 蒼朮米泔浸各等分

右咬咀每服二錢水半盞薑三片棗一枚煎至二分去渣溫服

潔大吐者當下之白餅子珍珠丸消積丸三方俱見幼科食癰門

潮熱有時胸滿短氣嘔吐者桃枝丸方見幼科積熱門

右七方治傷寒嘔吐前二方治痰飲而吐中一方治有表而吐後四方治有裏而吐其桃枝丸治裏熱而



吐餘二方治表寒而吐也

湯傷寒自汗當補虛和陰陽小建中湯減桂加黃芪人

參地黃

黃芪 壹兩

白芍藥 叁兩

甘草

人參

熟地黃 各半兩

右咬咀每二錢水半盞煎至三分去查服

小兒傷寒形證 頭痛 體痛 鼻塞或流涕 喉內

喘息 兩手脉洪數 頰赤眼澁 身上寒毛起 口

鼻出水 眼赤黃 口乾澁 咳嗽 山根青色 噴

嚏

活頭目疼痛而畏人惡寒者此傷寒證也

○ 案設令小兒卒暴身壯熱惡寒四肢冷或耳尻冷鼻氣

熱為斑疹也與傷寒表證相似此胎氣始發自內之外

若與傷寒表證同治者悞也當作斑疹治之

○ 吳小兒傷寒六經治例皆同但有胎熱驚熱血熱客熱

寒熱潮熱痰熱食熱變蒸發熱痘疹發熱傷風發熱一

皆發作狀似傷寒要在明辨之爾况肌體嫩弱血氣未

定脉法不同藥劑輕小之別故畧其節要另開錄于左

以便覽焉

○ 凡小兒察面色為先要宜詳察色要略也



凡小兒視虎口脉紋者以男左女右手食指第一節為初關二節為中關三節為末關即寅卯辰三位也凡脉紋見初關者輕中關者重末關者病危也以紫脉為驚熱紅脉為傷寒為熱白主疳熱少血青主驚主風主寒主腹中痛主搐搦黃主傷乳食脾虛黑主冷氣主中惡主病沉困也凡紫赤青黑脉紋直透末關者死

凡小兒四五歲以一指按其三部脉六七歲以二指按切三部脉十歲已上當密排三指而切之宜詳脉訣要略也脉經曰四五歲已上者呼吸七八至細數者吉九至為熱十至為困五至為寒四至困也十歲左右者五

六至為平也

凡胎熱驚熱客熱血熱痰熱寒熱潮熱等治法並見幼科準繩宜詳玩之茲不具錄

凡食熱傷乳者則吐哕妳辦不消口中醋氣傷食則心下滿鞭噯氣作酸惡食右手氣口脉盛手心熱手背不熱則肚背先熱以此別之

凡治傷食發熱必以六君子湯為主或加神麴麥芽棠求子砂仁香附之類如內實者加枳實青皮熱不解者加軟苗柴胡炒黃連或黃芩之類以解如無熱宜服香

砂保和丸



凡變蒸發熱者以長氣血也夫變者氣上蒸者體熱也輕者發熱虛驚耳冷微汗唇中有白泡如珠子是也三日而愈重者寒熱脈亂腹疼啼叫不食凡乳食輒吐喎五日愈也

凡傷風發熱則貪睡脾澁呵欠頓悶鼻塞噴嚏或鼻流清涕口中氣熱或咳嗽聲重或自汗怕風也宜人參羌活散加減主之其餘治例宜傷風表證例也要在詳辨而治之爾

凡傷寒則怕寒拘急發熱翁翁然在表晝夜不止直待汗出方解錢氏曰男子則面黃體重女子則面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急也大抵傷寒則手背熱手心不熱左手人迎脈緊盛也其餘六經為病詳見六經發熱例同但藥劑宜輕小也亦有失驚失食傷寒要在審辨而已

凡痘疹發熱錢氏曰腮赤多躁噴嚏眼澁呵欠頓悶時發驚悸身重發熱耳尖鼻尖手足稍冷也或乍涼乍熱睡中驚惕起卧不安者乃其候也切不可認作傷寒輒用發汗或重被蓋覆取汗則大誤矣須仔細辨之凡壯熱痘疹欲出未出者宜用升麻葛根湯主之胃弱食少者必加人參白朮白茯苓主之若欲透斑更加紫



草茸為妙丹溪言但見紅點便忌葛根慮恐發得表虛  
瘡出爛熳也錢氏治斑瘡未透者以四君子湯加糯米  
煎先助胃氣也一方更加升麻紫草茸以透斑出凡痘  
瘡二日至足謂之出齊若小大不等根窠紅活者不必  
服藥至五日當灌漿若漿來肥滿光澤者不必服藥若  
五六日漿不來便當救之以人參黃芪當歸二味為君  
佐以白朮陳皮白芷川芎白芍藥防風炙甘草之類必  
須加肉桂三分或五分能引藥入血分化膿為妙若氣  
逆滿悶出不快者少加木香二三分主之如惡心嘔逆  
不食者須加丁香三粒以透胃氣升發痘毒外出然此

皆祕傳之法用之累驗者也若有痒塌寒戰咬牙手足  
冷或嘔或喘或大便下利者此表裏之氣俱虛也宜加  
肉苳蔻訶子各五分熟附子二分或五分主之或十宣  
內托散加此三味亦佳凡欲靨未靨頭溫足冷或瀉渴  
或氣促四肢冷悶亂不寧卧則哽氣寒戰咬牙無熱證  
者宜陳氏十一味異功散主之凡青乾紫陷有熱者不  
可用此宜八珍湯加黃芪升麻紫草茸生地黃之類主  
之其餘詳見幼科準繩痘疹門宜詳玩而用焉一方治  
痘瘡未透漿不至者以烏骨白雄雞冠上取血和白酒  
漿溫與之最効凡有痒塌抓損宜房中常燒乳香尤効



宜多用芪歸等湯大抵瘡癩變黑或青乾或此陷藥  
來昏沉汗出不止煩躁熱渴腹脹啼哭聲啞大小便不  
通者皆難救也凡瘡外黑裏赤者重外白裏黑者極重  
瘡端裏黑點如針孔者難治惟裏外肥紅者最吉若一  
發並出及一發如針頭密者皆難治也要在詳辨而已

温病

田春日温病未滿三日先用惺惺散二服後四五日  
不解煩渴嘔用白朮散如自汗口燥用製白虎湯至六  
七日大便燥結用四順飲子下小腹大實大滿并黃連  
隔九下初覺之時疑是瘡疹只用葛根升麻湯解肌

文化又五

元錄年之七月十日 朝錄卷下



