

醫方類聚卷之五十一

傷寒門五十二

聖惠方六

治時氣後復勞諸方

夫病新差血氣尚虛津液未復因以勞動更成病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡浴則勞於力未任勞而強之則生熱熱氣還於經絡復為病者名曰勞復也
治時氣後勞復虛熱不退四肢沉重或半起



半臥氣力虛羸宜服人參飲子方

人參二兩去蘆頭 小麥壹兩炙 石膏二兩

赤茯苓二兩 半夏一兩湯洗七遍去滑 前胡二兩去蘆頭 知

母二兩 黃芩二兩 竹葉握一

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞

入棗三枚生薑半分煎至五分去滓不計

時候温服

治時氣後勞復發寒熱進退鼈甲飲子方

鼈甲三分塗醋炙 前胡三分去蘆頭 人參三分去蘆

頭甘草三分炙 生薑一分 豉心一分 葱白七莖 雄

鼠糞十四枚

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞

煎至五分去滓不計時候温服

治時氣後數日已解勞復發者宜服梔子人

散方

梔子人兩 葱白切一合 豉一合 雄鼠糞十四枚 甘

草半兩炙 麻黃一兩去根節 枳殼壹兩麩炒

右件藥搗麤羅令勻每服半兩以水一大

蓋煎至五分去滓不計時候溫服當有微汗便愈

治時氣熱氣解後復發頭痛如初病者宜服此方

雄鼠糞三七枚石膏二兩葛根二兩梔子二兩
人葱白二合豉二合

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服未汗再服治時氣差後起早及食多勞復宜服陳橘皮

散方

陳橘皮一兩湯浸去白煎焙甘草半兩炙雄鼠糞二

枚白朮一兩豉一合檳榔一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治時氣後飲食過多脉候實數復發如初宜服鼓心散方

鼓心二合雄鼠糞二七枚白朮一兩川大黃二兩

微梔子一兩木通一兩

右件藥搗龕羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治時氣病差後勞復發熱嘔吐不下食宜服

蘆根飲子方

蘆根二兩竹茹二兩人參二兩去蘆頭二兩陳橘皮二兩湯浸

去白二兩生薑二兩石膏四兩細研

右件藥都剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候温服

治時氣後勞復身體疼痛壯熱方

雄鼠糞五枚豉半合梔子五枚枳實五枚麩五枚

右件藥剉碎以水一大盞半煮取一盞去

滓分爲三服不計時候相次温服之

治時氣勞復四肢煩疼宜服薄荷粥方

薄荷一握阿膠一兩炒令黃燥川升麻一兩豉心一合

右件藥細剉和勻以水兩碗煮取一碗去滓以粳米作稀粥服厚覆取汗差

治時氣新差起早勞復及食飲過多復發欲

死方右以鼈甲三兩醋塗炙令黃焦去裙
襴薄羅爲散每服二錢以粥飲調下不計
時候服

又方右取所食物燒作灰細研每服以粥飲
調下二錢

治時氣瘴疫諸方

治時氣瘴疫頭痛壯熱心如火煎面目黃黑
四肢沉重不得睡臥宜服茵陳散方

茵陳二兩黃連一兩半梔子人兩子芩兩

秦芫二兩知母二兩大青一兩赤芍藥一兩川芎

消二兩上瓜根二兩川大黃二兩碎微炒

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以新
汲水調下三錢須臾便喫白粥飲半大盞
以次喫葱茶一椀腹中稍覺轉動下利額
上似微潤卽以衣蓋取汗汗解便差

治時氣瘴疫辟毒宜服朱砂散方

朱砂二兩川烏頭二兩炮裂細辛躑躅
花半兩酒拌乾薑裂白朮藟根

兩半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温酒調下二錢厚覆汗出差

治時氣瘴疫老君神明白散方

白朮膏附子半兩炮裂 川烏頭半兩炮裂

桔梗半兩去 細辛半兩

右件藥搗細羅為散平旦以新汲水調下三錢若已得病三日向上者即以水一大盞煎至五分頓服衣覆取汗差

治時氣瘴疫赤者方

牡丹兩 皂莢壹兩去黑皮塗 細辛半兩 乾薑

半兩炮裂 附子半兩炮裂 桂心兩 真珠兩 躑躅

躑躅半兩醋拌

右件藥搗細羅為散初覺頭強惡寒便以少許內鼻中吸之取嚏為候相次以温酒調服二錢厚覆取汗愈

治時氣瘴疫消除惡寒鬼魅精邪等宜服雄黃丸方

珠璣
五

雄黃五兩 朱砂五兩 雌黃五兩 蒼朮兩 虎

頭骨壹兩 鬼督郵兩 鬼箭羽壹兩 鬼臼壹兩 殺羊

角壹兩 馬蹄壹兩 川烏頭兩 天雄壹兩 蕪黃

壹兩 皂莢壹兩 芎藭兩 麝香壹兩

右件藥搗羅為末都研令勻以蜜蠟一斤

青羊脂三兩和丸如彈子大晨昏燒一九

去萬鬼辟氣毒以絳袋子盛一九帶之及

懸於門戶上

治時氣瘡疫殺鬼丸方

虎頭骨半兩 朱砂半兩 真珠末半兩 雄黃半兩

曾青半兩 鬼臼半兩 皂莢半兩 桔梗半兩 芎

藭兩 蕪黃兩 白朮兩 白芷兩 鬼箭羽兩 鬼

督郵兩 藜蘆兩 菖蒲兩 女青兩

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

彈丸大男左女右以青囊帶一九

治時氣瘡疫百病宜服犀角丸方

犀角屑半兩 桂心兩 羚羊角屑兩 牛黃半兩

鬼臼兩 附子兩 獺肝兩 巴豆兩

頁
五

七

去皮心研紙 蜈蚣 二枚 麝香 半兩 真珠末
 裏塗去油 細研 朱砂 半兩 射罔 壹
 兩 雄黃 半兩 水飛過 貝齒 二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
 每服不計時候以溫水下五丸

治時氣瘴疫安息香丸方

安息香 一兩 朱砂 半兩 硫黃 半兩 雄黃 一兩
 細研 阿魏 半兩 松脂 兩 栢葉 兩 蒼朮 兩 白芷 兩 乾
 桃葉 三兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大時
 以一丸燒於所居之處仍亦宜用後方類
 浴之

治時氣瘴疫浴湯方

桃枝葉 十兩 白芷 三兩 栢葉 四兩
 右件藥搗篩為散每取三兩煎湯浴之極
 良

治時氣瘴疫殺鬼虎頭丸方

虎頭骨 二兩 朱砂 壹兩 雄黃 一兩 雌黃 一兩
 細研

鬼臼壹兩 皂莢兩 蕪荑兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大以絳囊盛一丸繫臂上男左女右家中懸屋四角月朔望夜半中庭燒一丸

治時氣瘴疫黃膏方

川大黃一兩 附子一兩 細辛壹兩

薑一兩 川椒一兩 桂心兩 巴

豆三十枚 研紙裏壓去油

右件藥細剉以醋浸一宿漉出用臘日猪

膏二斤煎三上三下絞去滓密器盛之初

覺不安便以熱酒服如梧桐子大一丸未

差再服又水調三丸熱灸手以摩身體數

百遍并治賊風遊走皮膚

治時氣瘴疫骨熱煩悶宜服獺肝丸方

獺肝二兩 人參一兩 沙參一兩 鬼臼

半兩 苦參半兩 計阜半兩 微赤剉

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以粥飲下二十九

治時氣瘴疫宜服鬼白丸方

鬼白一兩雄黃一兩龍腦一錢麝香一錢

去毛朱砂半兩甘草半兩微赤判

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以人參湯下十丸

治時氣瘴疫辟除毒氣宜用鬼箭羽丸方

鬼箭羽兩鬼白一兩赤小豆半合朱砂兩

細研水飛過雄黃半兩細研

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如豇豆大如

已患者手掌中水調一丸塗於口鼻上又

於空腹溫水下一丸如未染疾者但塗口

鼻兼以皂囊盛一丸繫肘後亦宜時燒一

丸忌羊血

治時氣瘴疫雄黃散方

雄黃壹兩雌黃壹兩白礬壹兩鬼箭羽兩羚羊

羊角屑兩

右件藥搗細羅為散入雄黃等研令勻以

三角絳囊盛一兩帶心前并門戶上又月

且以青布裹一錢中庭燒之辟瘴疫病人亦燒一錢熏之卽差

治時氣瘴疫彈鬼丸方

雄黃一兩朱砂壹兩石膏兩石膏兩川烏頭壹兩鼠婦兩

壹兩

右以正月建除日執厭日亦得擣羅爲末以白臘五兩銅器中火上銷下藥攪令凝丸如棟實大以赤穀裹一九男左女右帶之

治時氣瘴疫單行方社中西南柏樹東南枝取曝乾擣羅爲末以水調下一錢日三四服

又方正月上寅日取女青擣羅爲末四兩以三角絳囊盛繫戶上帳前

又方正月朔旦及七日吞麻子赤小豆各二十七枚又各以二七枚投於井中又以附子三枚令女子投於井中○四時纂要投麻子豆辟溫法魚龍河圖云除夜四更取麻子

小豆各二七粒家人髮少許投井中終歲不遭傷寒溫疫

又方冬至日取雄赤雞作階至立春日煮食令盡勿令他人知

又方二月二日取東行桑根大如指懸門戶上又令人各帶之

又方右以艾灸病人牀四角各一壯勿令知之

又方右以赤小豆新布囊盛之置井中三日

取出舉家皆服男子水下十粒女人服二十粒

又方桃木中蟲糞末細研水服一錢

又方鮑魚頭

壹枚燒為灰

赤小豆

半兩

右件藥擣細為散空心以溫水調下半錢酒下亦得

又方炒豉一升和木一斤酒漬恒將服之

治熱病一日諸方

夫熱病一日病在太陽太陽主表表謂皮膚

也病在皮膚之間故頭項腰脊皆痛宜汗之則愈也

治熱病一日頭痛身熱四肢煩疼宜服解肌散方

麻黃 二兩去根節 石膏 二兩 川升麻 壹兩 甘草 壹兩炙微

赤芍藥 兩 柴胡 壹兩 桔梗 壹兩去蘆頭 杏仁 雙兩湯浸去皮尖

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

熱服衣覆取汗未汗再服

治熱病一日頭痛壯熱宜服石膏散方

石膏 二兩 麻黃 二兩去根節 黃芩 兩 桂心 壹兩 赤芍

藥 壹兩 柴胡 壹兩去苗

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

治熱病一日頭痛項強身熱如火宜服葛根散方

類聚五十二
七十三

葛根二兩 赤芍藥二兩 麻黃二兩 去根節 白芷一兩

柴胡一兩 去苗 黃芩一兩 石膏二兩 桂心一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一大盞入葱白五寸生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗

治熱病一日頭痛壯熱煩悶宜服柴胡散方

柴胡壹兩 去苗 赤芍藥一兩 梔子半兩 黃芩半兩 石

膏二兩 葛根一兩

右件藥搗篩為散每服四錢用水一大盞

入葱白二莖豉半合煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病一日頭疼壯熱心中煩悶宜服梔子散方

梔子三分 黃芩三分 石膏一分 葛根一兩 柴胡

一兩 麥門冬壹兩 去心 焙

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入豉五十粒葱白二莖煎至五分去滓不計時候溫服

類聚五十二
十四

治熱病一日頭痛壯熱宜服麻黃散方

麻黃一兩去根節 川大黃三分剉碎微炒 黃芩半兩佳心

半兩 甘草半兩炙微赤剉 赤芍藥半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以新

汲水調下三錢服後蓋衣取汗未汗再服

治熱病一日壯熱頭痛宜服此方

甘草一兩炙微赤剉 生薑三分切 菰蘆二枚大者細剉梔中盛之

右件藥先將甘草生薑以酒一大盞半煎

至八分去滓熱投入菰蘆梔中絞取汁不

計時候分溫二服衣覆取汗

治熱病一日身體壯熱頭痛骨肉痠楚背脊

強口鼻乾手足微冷小便赤黃宜用桃柳湯

浴方

桃枝并葉五斤細剉 柳枝并葉五斤細剉

右以水一碩煮取七斗去滓帶熱避風處

淋浴浴後於密室中刺頭并眼後兩邊及

舌下血斷以鹽末塗針處便宜服葛鼓粥

葛鼓粥方

葛根一兩葱白五莖并豉壹合生薑壹兩切

右件藥以水三大盞煎至一盞半去滓下

粳米二合煮作粥承熱頓服衣蓋取汗

治熱病一日宜服發汗麻黃粥方

麻黃壹兩去根節豉半合

右件藥用水一大盞半煎至一盞去滓下

粳米半合煮作稀粥承熱頓服衣蓋取汗

治熱病二日諸方

夫熱病二日陽明受病病在肌肉故肉熱鼻

乾不得眠也故可摩膏火灸發汗而愈也

治熱病二日頭痛壯熱肢節不利宜服麻黃

散方

麻黃二兩去根節川大黃一兩剉碎微炒葛根一兩剉甘

草半兩剉桂心一兩柴胡一兩赤芍藥一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱

服衣蓋取汗

治熱病二日口苦咽乾頭痛壯熱宜服前胡

散方

前胡一兩去蘆頭 葛根半兩剉 桂心半兩 旋復花半兩

麻黃二兩去根節 杏仁壹兩湯浸去皮尖

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞入生薑半分葱白五寸煎至五分去滓

不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

治熱病二日頭痛壯熱宜服桂枝散方

桂枝兩半 葛根半兩 麻黃三分去根節 石膏一兩 赤芍

藥兩半 甘草微赤剉 杏仁雙半湯浸去皮尖

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分葱白五寸煎至六分去滓

不計時候熱服衣覆取汗未汗再服

治熱病二日頭痛口苦雖經發汗未解可服

柴胡散方

柴胡壹兩去苗 人參壹兩去蘆頭 甘草一兩炙 黃芩

一兩 赤茯苓兩半夏七遍去滑

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一中

盞入葱白五寸生薑半分煎至六分去滓

不計時候溫服令自有汗即解

治熱病二日頭痛壯熱宜服黃芩散方

黃芩三分麻黃壹兩去根節川大黃半兩生碎微炒葛根

半兩桂心半兩赤芍藥半兩甘草半兩炙微赤剉川朴

消石半兩石膏壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以葱

豉湯調下二錢衣蓋取汗未汗再服

治熱病二日發汗未解頭痛壯熱宜服此方

麻黃壹兩去根節甘草壹兩炙微赤剉葛根壹兩

右件藥細剉和勻分為六服每服以水一

大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時

候熱服衣蓋取汗

治熱病二日發汗後不解頭痛體熱宜服此

方

石膏壹兩細研麻黃半兩去根節甘草壹分炙微赤剉

右件藥並剉用水一大盞煎至五分去滓

入鷄子白一枚攪勻不計時候承熱頓服

衣蓋取汗未汗再服

治熱病三日諸方

夫熱病三日諸陽傳病訖病猶在表未入於藏故胃脇熱而耳聾可發汗而愈也

治熱病三日未得汗壯熱煩悶欲得飲水宜服葛根散方

葛根一兩 川大黃一兩 碎微炒 黃芩壹兩 麻黃二兩 去根桂心一兩 赤芍藥壹兩 甘草半兩 炙柴胡壹兩 梔子人兩 半兩 右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍熱服令有汗為度

治熱病三日發汗未解頭痛口乾心胃煩悶宜服大黃散方

川大黃壹兩 碎微炒 柴胡壹兩 秦艽壹兩 石 膏二兩 麻黃壹兩 去根節 甘草半兩 炙微赤

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中 煮入生薑半分煎至五分去滓不計時候 稍熱頻服汗出為度

類聚 卷五十一

頁五十一

治熱病三日頭痛口苦寒熱往來宜服柴胡飲子方

柴胡壹兩半 木通壹兩 赤芍藥一兩 豉一合

石等一兩 甘草半兩

右件藥都細剉和勻每服半兩用水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病三日頭疼壯熱宜服麻黃散方

麻黃壹兩 知母一兩 赤芍藥一兩 葛根壹兩

黃芩兩半 甘草兩半 白藥兩半 梔子兩半 細

辛半兩 柴胡半兩 石膏二兩

右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候稍熱服衣蓋取汗

治熱病三日表猶未解壯熱頭目四肢不利宜服發汗桂心散方

桂心兩半 柴胡一兩 甘草一分 葛根一兩

赤茯苓兩半 澤瀉兩半 赤芍藥兩半 麻黃一兩

右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一中

蓋入薄荷二七葉煎至六分去滓不計時
候稍熱服衣蓋取汗未汗再服

治熱病三日解毒氣苦參散方

苦參

一到

黃芩

二兩

甘草

半兩炙

微赤到

右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大
盞煎至六分去滓入生地黃汁一合攪令
勻不計時候分溫二服

治熱病三日經發汗熱退後尚寒熱往來不
能飲食宜服知母散方

知母

兩

枳實

壹兩

半

麤

梔子人

半

兩

右件藥搗篩爲散每服五錢用水一大盞
入豉少許煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病四日諸方

夫熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也
三陽受病訖傳入於陰故毒氣入於胃膈其
病咽喉乾胃膈滿故可吐而愈也
治熱病四日結胃滿痛壯熱身體疼痛宜服
苦參散令吐方

類聚五十一

苦參 半兩 恒山 兩半

右件藥搗篩為散以水二中蒸煎至一盞去滓不計時候盡飲之當吐即愈未吐再服

治熱病四日咽喉乾而腹滿宜服瓜蒂散吐

方

瓜蒂 一分 赤小豆 兩壹

右件藥搗麤羅為散每服二錢水以一盞蓋煎至五分去滓不計時候溫服以吐為

度

治熱病四日壯熱四肢沉重喫食不下宜服

柴胡散方

柴胡 壹兩 葛根 壹兩 川大黃 壹兩 石膏

壹兩 赤芍藥 三分 芩芩 二分 梔子 人兩半 川朴消 壹兩

前胡 一兩 龍甲 一兩 微黃 去裙襴 甘草 半兩

赤剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

類聚五十一

二十三

治熱病四日毒氣內攻身體疼痛壯熱 重
煩渴不止宜服麻黃散方

麻黃一兩去根節 桂心半兩 川大黃三分剉碎 茵陳

一兩 細辛半兩 柴胡半兩去苗 甘草半兩炙 菰蘆根

一兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病四日發汗不差身體壯熱心膈煩悶
不得睡臥宜服葛根散方

葛根二兩剉 龍膽半兩去蘆頭 大青半兩 桂心半兩 甘

草半兩炙 麻黃一兩去根節 葳蕤壹兩 赤芍藥壹兩

黃芩壹兩 石膏二兩 川升麻壹兩

右件藥都搗麤羅為散每服四錢以水一
大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病四日頭痛胃滿食即嘔逆宜服竹茹
散方

竹茹壹兩 陳橘皮壹兩湯浸去白瓢焙 葛根剉 枇杷

葉半兩拭去毛炙微黃 人參壹兩去蘆頭 蘆根剉

右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大
盞入粳米一百粒生薑半分煎至五分去
滓不計時候溫服

治熱病四日熱毒解後時來時往惡寒微熱
不能食宜服人參散方

人參壹兩去蘆頭 知母壹兩 枳實一兩麩炒 陳橘
皮一兩湯浸 梔子人兩壹 檳榔一兩 豉三兩微
甘草壹兩炙 微赤剉
右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病五日諸方

夫熱病五日少陰受病毒氣入於腹胃其病
口熱舌乾渴而引飲故可下而愈也

治熱病五日口苦舌乾煩熱頭痛不解者宜
服大黃散方

川大黃壹兩剉 黃連半兩去鬚 甘草半兩炙 黃
蘗半兩 梔子人兩 石膏兩
右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中

類聚五十一

盞入葱白一莖豉五十粒煎至五分去滓
不計時候溫服

治熱病五日壯熱骨節煩疼目眩脇下脹痛
不能飲食欲變成黃宜服柴胡散方

柴胡去苗枳實麩炒令黃色知母 黃芩 梔子

人參 麥門冬焙去心龍膽去蘆頭川大黃剉碎微炒

甘草炙微赤剉已上各一兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病五日頭痛壯熱骨節疼痛宜服黃芩
散方

黃芩壹兩梔子一兩前胡一兩去蘆頭赤芍藥一兩

甘草半兩炙微赤剉石膏二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入豉少半合煎至五分去滓不計時候溫
服

治熱病五日已得汗毒氣不盡猶乍寒乍熱
惛惛如醉脇下牢滿骨節疼痛不能下食舌

類聚五十一

二五

盞入葱白一莖豉五十粒煎至五分去滓
不計時候溫服

治熱病五日壯熱骨節煩疼目眩脇下脹痛
不能飲食欲變成黃宜服柴胡散方

柴胡去苗枳實洗炒令黃色知母 黃芩 梔子

人 麥門冬去心焙龍膽去蘆頭川大黃剉碎微炒

甘草炙微赤剉已上各一兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病五日頭痛壯熱骨節疼痛宜服黃芩
散方

黃芩壹兩梔子一兩前胡一兩去蘆頭赤芍藥一兩

甘草半兩炙微赤剉石膏二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入豉少半合煎至五分去滓不計時候溫
服

治熱病五日已得汗毒氣不盡猶乍寒乍熱
惛惛如醉脇下牢滿骨節疼痛不能下食舌

本乾燥口内生瘡宜服柴胡飲子方

柴胡二兩 升麻一兩 赤芍藥一兩 黃芩壹兩

甘草一兩 枳殼一兩 麥門冬二兩

心竹葉二兩 梔子人壹兩

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大

盞入豉五十粒葱白一莖煎至五分去滓

不計時候溫服

治熱病五日頭痛身疼皮肉如火心膈煩躁

宜服麥門冬散方

麥門冬二兩 赤芍藥一兩 黃芩壹兩 石膏二兩

梔子人半兩 犀角屑壹兩 川朴消二兩 地骨皮半兩

甘草半兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢水以一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病五日未解頭痛壯熱眼睛疼心腹痛

宜服茵陳散方

茵陳二兩 梔子人壹兩 黃芩一兩 柴胡壹兩 木通壹兩

川升麻壹兩 赤芍藥一兩 蘆薈根壹兩 川大

黃二兩到碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病六日諸方

夫熱病六日厥陰受病毒氣入於腸胃其人煩滿而陰縮故可下而愈也

治熱病六日不解通身肉熱毒氣令人更相染著宜服大青飲子方

大青二兩石膏三兩香豉二合葛根壹兩梔子人

生地黄二兩川芒消三兩甘草半兩

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病六日熱勢彌固大便秘澀心腹痞滿
食飲不下精神昏亂恍惚狂言其脉洪數宜

服驚甲散方

龍甲壹兩塗醋炙令黃去裙襴羚羊角壹兩杏仁壹兩
去皮尖雙人甘草半兩赤茯苓一兩白鮮一兩
麩少微黃壹兩麩炒茵陳壹兩川大黃二兩
皮一兩枳殼壹兩微黃去麩

炒

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病六日胃中瘀熱皮膚赤黃心神煩悶大小使不利宜服梔子散方

梔子人壹兩葛根兩茵陳兩土瓜根兩川

升麻壹兩川大黃兩碎兩芒消兩木通兩

甘草半兩微赤兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病六日不解壯熱頭疼小便赤澀口內生瘡粥食不下宜服石膏散方

石膏兩知母兩柴胡壹兩秦艽兩梔子

人參麥門冬二分黃連三分甘草半兩微赤兩

木通兩

右件藥搗篩為散每服五錢用水一大盞煎至五分去滓入蜜一合攪令勻更煎一二沸放溫慢慢含嚥之

治熱病七日諸方

夫熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲為再經病也再經病者謂經絡重受病也

治熱病七日煩躁而渴胃中痰熱宜服半夏散方

半夏半兩湯洗七遍去滑 赤芍藥一兩 前胡半兩去蘆頭 黃芩半兩 人參壹兩去蘆頭 知母一兩 麥門冬半兩去心 蘇根半兩 黃耆壹兩 赤茯苓半兩 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入粳米小麥各一百粒生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病七日不解寒熱往來胃脇苦滿不思飲食心煩欲吐宜服前胡散方

前胡壹兩去蘆頭 半夏半兩湯洗七遍去滑 黃芩三分 人參三分 蘆頭三分 赤芍藥三分 桂心三分 甘草半兩炙微赤剉 右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候溫服

治熱病七日徧身疼痛壯熱不解宜服地骨皮散方

地骨皮壹兩枳殼壹兩麩炒壹兩川大黃壹兩碎壹兩

赤芍藥半兩柴胡一兩鼈甲壹兩塗醋炙壹兩麥

門冬一兩焙去甘草半兩微赤到

右件藥持麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病七日或寒或熱 虛熱

毒氣不退心神不安宜服生地黃煎方

生地黃汁半升生麥門冬半升蜜半升人參一兩

頭白朮壹兩桂心壹兩甘草壹兩地骨皮二兩

川升麻兩石膏兩葶菜心切半

右件藥都剉以水三大椀煮至一椀絞去

滓下蜜地黃麥門冬汁三味同熬令稀稠

得所放冷不計時候每服取半合服之

治熱病七日四肢疼痛熱毒不退乍寒乍熱

乍劇乍差發動如瘧宜服鼈甲散方

鼈甲 二兩 塗醋炙 天門冬 一兩 人參 一兩

頭石膏 三兩 黃耆 兩 烏梅肉 一兩 恒山 兩

牛膝 壹兩 甘草 壹兩 炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉三七片豉五十粒煎至五分去滓

不計時候溫服

治熱病頭痛諸方

夫熱病三陽受病猶在於表邪毒之氣攻注於外循於風府而入於腦故令壯熱頭痛胃

膈壅滯其脉浮數者可汗及吐之即愈也

治熱病壯熱頭痛百骨痠疼宜服石膏散方

石膏 二兩 麻黃 一兩 去根節 葛根 兩 黃芩 三升

菊花 兩 梔子 三分 赤芍藥 三分 甘草 微赤

右件藥搗篩為散每服四錢水以一中盞

入豉少半合煎至六分去滓不計時候溫

服

治熱病四肢煩悶壯熱頭痛口舌乾燥宜服

犀角散方

類聚五十一

三十一

犀角屑

壹兩

人參

三分去

麥門冬

三分

甘草

一分

知母

半兩

赤茯苓

三分

石膏

一分

右件藥

搗篩為散

每服五錢

以水一大盞

入竹葉

二七片

煎至五分

去滓

不計時候

溫服

治熱病

頭痛

骨節煩疼

宜服葛根散方

葛根

壹兩

石膏

二兩

赤芍藥

壹兩

甘草

一分炙

甘菊花

壹兩

黃芩

壹兩

防風

半兩

去

右件藥

搗篩為散

每服四錢

用水一

大盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病頭痛四肢煩疼宜服取吐散方

人參

半兩

柴胡

一分

川大黃

一分

剉茵

陳

壹分

恒山

半兩

鼈甲

半兩

塗醋炙

令黃去裙襴

右件藥搗篩為散每服四錢用水一中盞

入豉五十粒煎至五分去滓不計時候頓

服取吐為度

治熱病頭痛宜用吹鼻瓜蒂散方

瓜蒂壹分赤小豆壹分麝香壹錢丁香壹分馬牙消兩半

右件藥搗細羅為散入麝香都研令勻以少許吹入鼻中當下黃水即差

治熱病頭疼不止方

石膏兩二芎藭兩半馬牙消兩一

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一大盞入生薑半分細茶末一錢煎至七分去滓不計時候分溫二服

治熱病頭痛不可忍方

地龍壹條沙糖三棗

右件藥相和以水一大盞調入瓷瓶中盛懸於井內去水相近一炊時出傾取清者不計時候都為一服勿令患人知

治熱病頭疼不可忍灌頂散方

馬牙消一分苦胡蘆子一分地龍乾者一分瓜蒂一分麝香半錢

右件藥搗細羅為散入麝香同研令勻吹

一字於鼻中當下腦中惡滯水便差

治熱病頭痛不可忍方

生馬齒莧一握切 川朴消壹兩

右件藥相和細研入清麻油調令如膏塗於頭上立差

治熱病頭疼發熱進退方

菰蘆一俵大者取瓢

右細剉置瓷碗中用熱酒一盞沃之蓋之良久去滓不計時候頓服未効再服

治熱病煩躁諸方

夫熱病煩躁者為陽勝於陰熱氣獨盛痞結於藏則三焦隔絕故身熱而煩躁也

治熱病未得汗體熱煩躁宜服龍膽散方

龍膽三分去蘆頭 葛根壹兩 桂心半兩 葳蕤三分赤

芍藥三分 黃耆三分 石膏二兩 麻黃三分去根節 大

青二分 川升麻三分 甘草三分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病熱毒在心脾狂亂煩躁宜服白鮮皮散方

白鮮皮一兩 川大黃半兩 刺大青半兩 麥門冬

壹兩去心焙 黃芩兩 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病頭痛目疼心中煩躁宜服葛根飲子方

葛根剉 赤芍藥剉 豉兩 葱白三莖

右件藥都以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候溫服

治熱病初覺煩躁頭痛腰痛宜服解毒飲子方

生地黄汁三合 黃芩壹分 生薑一分 白蜜半匙

右件藥細剉黃芩生薑二味以水一大盞煎至六分去滓次入地黄蜜更煎三兩沸不計時候分溫二服

治熱病經發汗熱不解心中躁熱煩悶宜服犀角散方

犀角屑兩半天竹黃壹分馬牙消兩一鐵粉兩一鉛

霜一分麝香錢半

右件藥都細研為散每服不計時候以竹葉湯溫溫調下二錢

治熱病心神煩躁不止宜服白鮮皮散方

白鮮皮兩一梔子人三分麥門冬三分去心焙用大

黃三分到微鬱金三分黃芩三分甘草一分到微赤到鉛

霜一分細研

右件藥擣細羅為散入鉛霜同研令勻每服不計時候以熱水調下二錢

治熱病毒熱不解口乾煩躁宜服黃芩散方

黃芩兩一梔子人兩半川大黃一兩到微甘草一兩

炙微鐵粉半兩細研川馬牙消兩一

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫蜜水調下二錢

治熱病狂言諸方

夫熱病毒氣攻心則心神煩亂陽氣大盛遂則狂言目赤心煩不得睡臥精神驚悸言語失常毒氣不除腸中結躁其脉洪數者是其候也

治熱病已得汗熱猶不解腹脹煩躁狂語不定可服大柴胡散方

柴胡壹兩 川大黃壹兩 碎微炒 黃芩兩 赤芍藥
枳實兩 半夏兩 湯洗 人參兩 去蘆
甘草兩 微赤生 黃耆兩 剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入竹茹一分生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病狂言煩渴宜服猪苓散方

猪苓壹兩 白鮮皮兩 龍膽兩 澤瀉兩
赤茯苓兩 麥門冬兩 心焙 黃芩兩 人參兩
蘆頭兩 甘草兩 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病狂言不止宜服白鮮皮散方

白鮮皮半兩 黃芩半兩 秦艽半兩 犀角屑半兩

草牛兩炙 麥門冬半兩 青半兩 杏仁半兩

去皮尖雙人 麩炒微黃

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病煩熱如火狂言妄語欲走宜服此方

黃芩兩 川遂壹兩煨 龍膽壹兩去

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫

水調服一錢須臾令病人飲水三兩盞腹滿則吐之此方療大熱急者甚效

治熱病五六日壯熱狂語欲走方

鷄子二枚取清 神川芒消半兩 寒水石半兩

細研

右件藥先以新汲水一小盞調芒消等末次下鷄子清攪令勻不計時候分為二服

治熱病狂言心神驚悸煩熱喘促宜服牛黃

丸方

牛黃一分犀角半兩人參半兩去蘆頭去茯神半兩

胡黃連半兩龍膽半兩去蘆頭去木香半兩羚羊角半兩

半朱砂半兩地骨皮半兩麥門冬壹兩心焙去川

升麻半兩甘草半兩麝香一分龍腦壹錢細研

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

梧桐子大每服不計時候以新汲水下十

五丸

治熱病狂語及諸黃雪煎方

川大黃五兩剉碎炒

右件藥搗剉羅為散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候以冷水調半匙服之治熱病煩渴諸方

夫熱氣入於腎藏則為煩渴為腎惡燥也今熱氣盛攻於腎故腎燥腎燥則渴而引飲也治熱病因此吐下後有熱毒未解煩渴不止宜服麥門冬散方

麥門冬壹兩心焙去赤芍藥壹兩黃連壹兩去蘆去甘草壹兩

微赤剉知母一兩黃芩一兩猪苓壹兩黑皮去菰蘆

壹枚

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病煩渴日夜喫水宜服黃耆散方

黃耆一兩 麥門冬一兩 去心 蘇蘇根壹兩 甘草半兩

剉生用

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病頭疼壯熱心躁煩渴宜服石膏茶方

石膏二兩 淡竹葉一握 薺苳半兩 木通半兩

右件藥細剉以水二大盞煎至一盞去滓分作四度點臘面茶不計時候服

治熱病煩渴飲水無度宜服犀角飲子方

犀角屑三分 石膏二兩 知母三分 川升麻三分

右件藥細剉用水二大盞入竹葉三七片小麥五十粒煎至一盞去滓入土瓜根汁一合蘇蘇根汁一合攪令勻不計時候分

温二服

又方小麥壹合麥門冬壹兩寒水石三分青竹葉

三分知母三分

右件藥細剉和勻分爲五服每服以水二

大盞煎至一盞去滓每渴時温服半中盞

治熱病積熱攻脾肺煩躁多渴飲水無度小

便數宜服知母散方

知母三分川大黃三分微炒黃芩三分麥門冬三分

去龍膽三分去一分甘草一分微赤剉

右件藥搗篩爲散每服四錢以水一中盞

入生蘆根五寸煎至五分去滓不計時候

温服

治熱病煩躁大渴飲水則逆宜此方

木瓜一分生薑一分薄荷一分

右件藥都細切以水一大盞煎至五分去

滓入蜜一合攪勻不計時候温服

治熱病煩渴不止兼除勞熱宜服黃芩散方

黃芩兩黃連半兩生乾地黃兩升麻半兩

知母半兩葛根半兩梔子一分大青半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病經吐下後有餘熱煩渴不止宜服人

參散方

人參三分黃連三分黃芩壹兩桂心半兩

薤根兩甘草三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病煩渴不止宜服麥門冬散方

麥門冬一兩甘草一分地骨皮壹兩

合壹知母兩土瓜根兩

右件藥搗羅為散每服五錢以水一大盞入葱白兩莖生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病煩渴不止或時頭痛乾嘔宜服猪苓散方

猪苓三分去黑皮麥門冬壹兩去心人參三分去蘆頭石

膏二兩甘草三分炙茅根三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病毒氣在心煩渴不止宜服石膏散方

石膏四兩麥門冬三分黃芩三分梔子三分地

骨皮三分柴胡三分去苗三分菝葜根三分葳蕤三分甘草三分

三分炙
微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治熱病煩渴不止宜服地骨皮散方

地骨皮一兩澤瀉一兩麥門冬壹兩梔子半兩

犀角屑半兩黃芩半兩甘草半兩
微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病發熱煩渴小便不利宜服猪苓散方

猪苓壹兩去黑皮壹兩赤茯苓壹兩木通壹兩滑石壹兩

澤瀉壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病大熱煩渴心躁不睡宜服牛黃散方

牛黃一分細研入柴胡一兩去苗黃連一兩去鬚黃芩兩

葛根壹兩剉甘草半兩炙

右件藥搗細羅為散不計時候以薄荷水

調下二錢

治熱病煩渴諸藏不安宜服三黃丸方

黃芩壹兩黃連一兩去鬚川大黃壹兩剉碎微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下三十九

又方右以生地黄搗絞取汁每服一合時時服之

又方右以生菰蘆根搗絞取汁每服一合時時服之

治熱病喘急諸方

夫熱病毒氣攻於心肺煩熱壅於胃膈而渴引飲水必致喘麤汗下之後胃氣尚虛熱毒

不退渴飲水過多水停心下故令喘急也

治熱病氣喘心膈煩悶或痰壅不能食宜服

前胡散方

前胡兩去 蘆頭兩去 赤茯苓兩去 麥門冬一兩半去心焙 甘

草三分炙 紫苑壹兩去根土 陳橘皮三分湯浸去白 蘇焙

大腹皮壹兩 桔梗壹兩去蘆頭 枳殼壹兩蘇炒 微黃去瓢

右件藥搗麤羅為散勿服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病肺壅氣喘膈中不利宜服大腹皮散

方

大腹皮壹兩 赤茯苓三分 枳實三分 蘇蘇炒 柴胡

三分 桑根白皮三分 人參壹兩去蘆頭

右件藥搗篩為散每服四錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病胃膈煩悶喘息奔急宜服杏人散方

杏人一兩湯浸去皮尖 前胡一兩去蘆頭 甘草

一兩炙 木通半兩 桑根白皮一兩 麥門冬

壹兩 去心

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病心膈煩熱肺壅喘急宜服此方

杏仁一兩湯浸去皮尖 雙一人麩炒微黃 馬兜苓半兩 麻黃兩 壹兩 半兩 去根節 麥門冬一兩 去心 五味子壹兩 桑根白皮半

三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病肺熱上氣奔喘宜服柴胡散方

柴胡壹兩 去苗 紫蘇莖葉一兩 陳橘皮壹兩 湯壹兩 浸去 煎焙

桑根白皮兩 石膏兩 麻黃半兩 去根節 杏仁一兩

一兩湯浸去皮尖 雙一人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病客熱在藏乾嘔口中多痰喘急煩悶

不能飲食宜服半夏散方

半夏壹兩 湯洗 麥門冬壹兩 去心 甘草半兩 炙微赤 剉

青竹茹兩 壹兩 葛根兩 陳橘皮半兩 湯浸 去白 煎焙

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服

治熱病飲水多卒上氣喘急方

淡竹葉一兩 陳橘皮半兩湯浸 桑根白皮

一兩

右件藥細剉和勻分為五服每服以水一
大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病肺癰喘急宜服皂莢丸方

皂莢

一兩半去黑皮

郁李人

三分湯浸去

甘草

三分炙

麻黃

三分去

甜葶藶

壹兩

泥如

右件藥搗羅為末入郁李人葶藶同研令
勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候
以粥飲下十丸

治熱病氣喘欬嗽宜服杏人煎方

杏人

五兩湯浸去

黃牛酥

壹兩

白蜜

兩生薑

汁二合

右件藥以酥拌杏仁炒令黃熟搗如膏入
蜜薑汁同煎如稠餈每服三錢含嚙津不
計時候服

治熱病發狂諸方

夫心者火也心主於血陽氣盛則血并於陽
熱邪攻於心絡則心神煩亂或詠或歌或言
或笑精神不守言語失常驚悸不安棄衣而
走此皆熱毒之氣壅滯心胃致令發狂也
治熱病伏熱在心精神恍惚發狂不得睡臥

宜服犀角散方

犀角屑半兩茵陳三分茯神二兩赤芍藥一兩梔子
人半兩麥門冬一兩生乾地黃二兩人參壹兩
蘆頭白鮮皮一兩
右件藥擣篩爲散每服五錢以水一大盞
入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候
溫服

治熱病壅熱發狂心忪驚悸宜服人參散方

人參三分去蘆頭犀角屑半兩甘草半兩炙黃芩

遠志半兩秦艽半兩地骨皮半兩沙參半兩頭夫蘆

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓下竹瀝一合攪令勻不計時候溫服

治熱病發汗後熱毒未盡因有所驚發熱癩狂宜服羚羊角散方

羚羊角屑半兩犀角屑半兩茯神半兩龍齒壹兩鐵粉一兩黃芩兩甘草半兩防風半兩蘆頭兩地

骨皮三分人參一分

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病發狂心熱煩悶多驚不得睡臥宜服茯神散方

茯神三分犀角屑兩龍齒一分川升麻兩麥門冬壹兩玄參兩甜竹根壹兩黃芩三分黃連一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓下朴消一錢地黃汁一合攪令勻不計時候溫服

治熱病熱盛發黃皮膚如金色小便赤澀大便不通口乾煩渴悶亂發狂宜服大青散方

大青半兩到黃藥半兩川朴消半兩川大黃半兩到

羚羊角屑半兩土瓜根兩梔子人兩秦艽半兩

去甘草半兩炙微赤到

右件藥擣細羅為散不計時候以冷蜜水調下二錢以利為度

治熱病已得汗熱不解腹滿脹痛煩躁發狂

宜服柴胡散方

柴胡去苗兩川大黃三分到黃芩三分赤芍藥

三分枳殼半兩麩炒半夏三分湯洗

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病毒熱在藏心神狂亂壯熱煩躁不得睡臥宜服朱砂丸方

朱砂壹兩細研 犬陰玄精生兩 牛黃兩 紫石英兩

飛過 細研水 白石英壹兩 飛過 天南星生兩

金箔五十片 龍腦一分 麝香兩 不灰木壹兩 牛糞火

燒壹炆時

右件藥都研令細用牛膽汁和丸如櫻桃

大不計時候以新汲水嚼下一丸

治熱病心神恍惚悲喜不恒發狂欲走宜服

鐵粉丸方

鐵粉半兩 牛黃半兩 金薄二七 銀薄二七

研麝香一分 遠志半兩 馬牙消三分 白僵

蠶一分 丹參兩 茯神兩 川升麻兩 白附子

壹分 炮裂

右件藥搗羅為散同研令勻鍊蜜和擣三

五百杵丸如梧桐子大不計時候以薄荷

湯下一十九

治熱病發狂心神恍惚宜服牛黃丸方

牛黃半兩 虎睛一對 茯神兩 石膏壹兩

川升麻三分 麥門冬一兩 玄參三分 生乾地黃

壹鐵粉壹兩
兩細研

右件藥搗羅為末同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大不計時候以荆芥湯下一十九

治熱病心氣熱盛恍惚不定發狂妄有所見

宜服天竹黃丸方

天竹黃三分牛黃壹分朱砂三分麝香細研

壹分黃連壹兩鐵粉兩遠志三分甘菊花細研

半馬牙消兩龍齒三分茯神兩龍腦一分

金銀薄各五甘草一分

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大不計時候以荆芥湯或薄荷湯嚼下十九

治熱病熱毒攻心胃躁悶癡狂方

雞子二枚川朴消兩

右件藥相和以新汲水一小盞熟調頓服之

治熱病嘔逆諸方

夫熱病胃中有熱則穀氣不和新穀入與熱

氣相搏胃氣不平故致嘔逆或吐下已後藏氣虛弱亦令嘔逆也

治熱病惡寒壯熱食則嘔逆宜服前胡飲子方

前胡 二兩去蘆頭 麥門冬 二兩去心 竹茹 二兩 陳橘皮 二兩 壹兩湯浸甘草 一兩炙 生地黄 二兩 葛根 二兩 白芍 焙 枇杷葉 一兩拭去毛炙微黃

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病壯熱嘔逆不下飲食宜服人參飲子方

人參 一兩去蘆頭 陳橘皮 壹兩湯浸 生薑 壹兩赤 茯苓 壹兩 葛根 一兩 麥門冬 一兩去心

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病壯熱惡寒食即嘔逆宜服麥門冬散方

麥門冬 一兩去心 前胡 一兩去蘆頭 陳橘皮 半兩湯浸去白

氣相搏胃氣不平故致嘔逆或吐下已後藏氣虛弱亦令嘔逆也

治熱病惡寒壯熱食則嘔逆宜服前胡飲子方

前胡二兩去蘆頭 麥門冬二兩去心 竹茹二兩 陳橘皮壹兩湯浸 甘草一兩炙微赤剉 生地黃二兩 葛根二兩 枇杷葉一兩拭去毛炙微黃

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病壯熱嘔逆不下飲食宜服人參飲子方

人參一兩去蘆頭 陳橘皮壹兩湯浸 生薑壹兩 茯苓壹兩 葛根一兩 麥門冬一兩去心

右件藥都細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病壯熱惡寒食即嘔逆宜服麥門冬散方

麥門冬一兩去心 前胡一兩去蘆頭 陳橘皮半兩湯浸去白

蘇汁草半兩炙生乾地黄壹兩人參半兩去

焙蘇汁草蘇赤劉蘇赤劉右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入竹茹半雞子大煎至六分去滓不計

治熱病煩渴飲水過多時有嘔逆方

枇杷葉一兩拭去茅根一兩葛根一兩

右搗篩為散以水三大盞煎至一盞半去

滓不計時候分溫三服

治熱病噦候諸方

夫熱病噦者由伏熱在於胃間令人胃滿氣

逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令噦也

治熱病未得汗躁熱飲水過多腹脹氣

嘔噦不止宜服丁香散方

丁香半兩人參壹兩去陳橘皮半兩去枇杷葉

半兩拭去前胡半兩去茅根一兩葛根半兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治熱病毒氣攻胃嘔噦不止宜服甘草飲子方

甘草一兩炙 陳橘皮一兩易麥川升麻

生薑壹兩 葛根一人參壹兩去

右件藥都細剉和勻每服半兩以水大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病腹胃虛脹心膈壅滯嘔噦不 宜服

半夏散方

半夏三分湯洗七遍去滑 柴胡一兩去苗 黃芩 赤芍藥

三分 甘草一分炙 桂 陳橘皮三分湯浸大
腹皮三分剉

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水 人盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病煩熱嘔噦不欲飲食宜服麥門冬散方

麥門冬壹兩半 柴胡一兩 蘆根 人參二分
去蘆 葛根一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水 盞
入竹茹一分煎至六分去滓 黃汁少半
合更煎一沸不計時候

治熱病胃中有熱穀氣入則胃氣 噦不

下食宜服前胡散方

前胡一兩去蘆頭 黃耆壹兩到 人參三分去蘆頭 麥門

冬牛兩去心 陳橘皮牛兩湯浸去白瓢焙 甘草炙微生

乾地黃三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入竹茹一分煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病往來寒熱胃脇滿悶噦逆宜服赤芍

藥散方

赤芍藥三分 前胡半兩去蘆頭 人參三分去蘆頭 心

兩犀角屑牛兩 陳橘皮三分湯浸去白瓢焙 赤茯苓三分

大腹皮半兩 蘆根半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病邪熱已退胃氣未和噦不能食宜服
白朮散方

白朮三分 蘆根三分 草薢三分 人參二分

頭陳橘皮二分 湯浸去白 枇杷葉三分 枳去 厚

朴三分 薑汁炙令香熟

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病噦逆不下食宜服白茅根散方

白茅根壹兩 百合一兩 陳橘皮一兩 湯浸去白 薤焙

根一兩 人參壹兩 去蘆頭

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病未得汗嘔噦不止方

麥門冬一兩半 蘆根壹兩 人參一兩 去蘆頭

右件藥擣羅為散每服半兩以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服

治熱病汗後餘熱不退諸方

夫熱病其人或未發汗吐下或經服藥已而脈洪大實數腹胃脹滿小便赤黃大便或煩或渴面色變赤此為腑藏有結故也治熱病得汗後餘熱不退頭痛心煩宜服石膏散方

石膏二兩 麥門冬一兩 知母半兩 人參半兩

黃芩三分 柴胡一分 犀角屑半兩 甘草半兩

赤剉 右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞入葱白兩莖豉五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病汗後餘熱不除寒熱往來頭重體宜服此方

葛根一兩 黃耆一兩 黃芩三分 梔子一兩 地

骨皮三分 柴胡一分 石膏一分 甘草半兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入豉三十粒煎至五分去滓不計時候

溫服

治熱病汗後餘熱不解頭項出汗身上無
方 痰熱在內渴欲飲水小便不利宜服茵陳散

茵陳 兩半 柴胡 去一兩 梔子 三分 猪苓 半兩 去

川大黃 三分 判 秦艽 三分 桑根白皮 判

木通 半兩 甘草 微赤

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病汗後餘熱不解往來寒熱不定宜服

葛根散方

葛根 三分 麻黃 一兩 柴胡 一兩 大青

葳蕤 半兩 赤芍藥 三分 黃芩 兩 麥門冬 去心 甘

草 微赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病後餘熱不解身體沉重宜服黃芩散

方

黃芩 壹兩 川升麻 壹兩 黃連 三分 石膏 兩 梔子

人壹兩麻黃根節甘草壹分炙

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病汗後餘熱不退頭痛脣乾宜服犀角

散方

犀角屑一兩知母一兩川升麻一兩黃連三分

門冬去心黃芩壹兩葛根一兩甘草半兩炙

石膏二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病汗後餘熱不解宜服此方

川升麻三分黃芩三分黃連一兩恒山一兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓空心溫服未吐再

服

治熱病已得汗餘熱未退宜服

石膏一兩知母一兩葳蕤一兩甘草三分炙

右件藥搗麤羅為散每服大

蓋人生薑半分煎至五分

候

溫服

治熱病汗後餘熱不除煩躁恍惚

宜服

人參散方

人參一兩去蘆頭 梔子一人兩 藍葉 甘草一分

芎藭赤白鮮皮 大青一分

右件藥搗篩為散每服四錢以水

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病心腹脹滿諸方

夫熱病服冷藥及飲冷水過多結在心下故心腹脹痛此為藏虛先有舊滯故也或吐下已後病不解內外有熱亦心腹脹滿此為有實也

治熱病心腹脹滿四肢煩悶不欲飲食宜服

檳榔散方

檳榔壹兩 白朮壹斤 枳殼壹兩 麩炒壹兩 人參壹兩

陳橘皮壹兩 湯浸壹兩 麥蘖壹兩 炒壹兩 黃川壹兩 大黃壹兩

碎二分 甘草三分

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治熱病心腹脹滿或時疼痛飲食全微宜服
赤芍藥散方

赤芍藥兩半 柴胡兩半 桔梗兩半 木通二分
劉赤茯苓兩半 鼈甲半 郁李人半兩 湯浸
炒

右件藥搗篩爲散每服四錢以水
盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病心腹脹滿不能飲食四肢

訶梨勒散方

訶梨勒三分 去核生用 赤茯苓壹兩半 陳橘皮人

參壹兩半 薑頭五分 甘草半兩 炙赤劉 白木兩一 檳榔兩一

右件藥搗篩爲散每服三錢以水
盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治熱病出汗後心腹脹滿嘔逆少氣宜服人

參散方

人參半兩去蘆頭 木香半兩 白朮三分 半夏半兩湯洗七遍

去甘草半兩炙 陳橘皮三分湯浸去白瓢焙

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病傷冷太過腹脹嘔逆不納飲食宜服

厚朴散方

厚朴壹兩去蘆頭 半夏壹兩湯洗七遍去滑 藿

香三分 人參壹兩去蘆頭 陳橘皮半兩湯浸 甘草

半兩炙 訶梨勒皮三分

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病得汗後熱不解心腹脹滿宜服柴胡

散方

柴胡一兩 白朮半兩 枳殼三分麩炒 黃芩三分

赤芍藥壹兩 訶梨勒皮三分 檳榔半兩 桔梗半兩

頭甘草 半兩炙 微赤剉

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病得汗後心腹脹滿疼痛宜服木香丸方

木香 壹兩 桂心 半兩 檳榔 一兩 訶梨勒皮 壹兩 桃人 半兩 湯浸去皮尖 雙入麩炒研入 枳殼 半兩 麩炒 微苦去麩 右件藥擣細羅為末鍊蜜和丸如梧桐子

大每服以生薑湯下二十九

治熱病欬嗽諸方

夫熱病邪熱客於肺則上膈煩壅其人必飲水水停心下則肺浮肺主於嗽水氣乘之故欬嗽也

治熱病壯熱欬嗽頭痛心悶宜服前胡散方

前胡 壹兩 盧頭 去 川升麻 壹兩 貝母 壹兩 煨 微黃 紫苑 壹兩 半洗 石膏 二兩 麥門冬 三兩 去 甘草 壹兩 土 石 杏人 壹兩 湯浸去皮尖 微赤剉 地骨皮 一兩 雙入麩炒 微黃

右件藥擣麤羅爲散每服五錢以水一大
盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時
候溫服

治熱病壯熱頭痛欬嗽宜服麥門冬散方

麥門冬兩半 葛根三分 柴胡一兩 貝母一兩
三分煨 百合半兩 川升麻半兩 梔子一分 甘草一分
微黃 一分炙令
微赤剉

右件藥擣麤羅爲散每服四錢用水一中
盞入豉半合葱白二莖煎至六分去滓不

計時候溫服

治熱病毒氣攻肺欬嗽喉中生瘡宜服生地

黃飲子方

生地黄二兩切 川升麻壹兩 玄參一兩 川大黃一兩
生柴胡二兩 貝母壹兩 煨
用柴胡大苗 貝母令微黃

右件藥細剉和勻每服 蓋煎

至五分去滓入蜜 沸放溫不

計時候服

治熱病心肺煩熱上氣欬嗽不得睡卧時時

渴欲飲水徧身浮腫宜服郁李人散方

郁李人一兩湯浸麻黃壹兩去根節貝母壹兩

微杏人一兩湯浸桑根白皮壹兩

赤茯苓壹兩猪苓壹兩黑皮壹兩去去菰蘆子人壹兩漢防

已壹兩

右件藥擣篩為散每服五錢用水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病心肝熱盛小便黃赤上氣欬嗽宜服

百合散方

百合一兩杏人壹兩湯浸木通一兩

判麥門冬三分甘草三分麻黃半兩去去

紫苑半兩洗甜葶蘆三分炒炒黃芩一兩

右件藥擣篩為散每服五錢用水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病欬嗽喘息促不得睡卧宜服桑白皮

散方

桑根白皮壹兩木通參分天門冬壹兩紫

蘇莖葉壹兩欬冬花一兩皂莢根皮壹兩川大

黃壹兩到半兩炙碎或炒甘草微赤到

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病欬嗽不止心胃煩悶上氣喘促宜服

麻黃散方

麻黃三分去根節大麻人壹兩前胡三分去蘆頭桑根

白皮壹兩到麥門冬一兩半去心焙紫蘇子三分甘草

半兩炙杏仁一兩湯浸去皮尖微赤到杏仁雙入麩炒微黃

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病八九日胃滿喘促欬嗽坐卧不安宜

服杏仁散方

杏仁一兩湯浸去皮尖枳殼半兩麩炒去心大腹皮

半兩天門冬一兩去心欬冬花半兩川大黃一兩到

微炒桑根白皮三分到甘草三分炙黃芩兩麻

黃三分去根節

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入燈心一束煎至五分去滓不計時候溫

服

治熱病胃中煩滿欬嗽不止宜服木通散方

木通剉一兩 梔子三分 川升麻三分 紫蘇莖葉

一兩 杏人雙入 麩炒微黃 赤茯苓壹兩 貝母

一兩 煨桑根白皮剉 枳殼三分 麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病咽喉腫痛諸方

夫熱病咽喉腫痛者是脾肺積熱不散致使

然也何者胃為水穀之海通於咽門肺主於氣居於膈上其氣貫於喉嚨邪熱伏留於脾肺故令咽喉腫痛也

治熱病胃中妨悶咽喉腫痛噎塞不通宜服射干散方

射干壹兩 川麻黃兩 絡石葉兩 前胡壹兩 去

百合兩 枳殼壹兩 麩炒微黃 黃藥兩 杏人湯浸

去皮尖 雙人 甘草半兩 炙微赤 剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大

蓋入生薑半分煎至五分去滓不計時候
溫服

治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾嘔頭疼
不下食宜服川升麻散方

川升麻 二兩 羚羊角屑 半兩 白藥 一兩 玄參 三分 麥
門冬 一兩 前胡 一兩 石膏 一兩 川朴消
二甘草 半兩 炙
兩 微赤剉

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大
盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候

溫服

治熱病咽喉閉塞連舌腫疼宜服馬蘭根散
方

馬蘭根 一兩 川升麻 壹兩 川大黃 三分 射干
三分 犀角屑 半兩 木通 半兩 玄參 一兩 棘針 半兩 甘
草 半兩 炙
微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病喉中熱毒閉塞腫痛宜服露蜂房散

方

露蜂房半兩 甘草半兩 射干半兩 川升麻半兩 玄參半兩

不伴藥搗羅為散每服三錢以水一中蓋煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病咽喉腫痛不利宜服鉛霜散方

鉛霜一分 川升麻半兩 黃藥半兩 鵬砂一分 地龍半兩 馬牙消一分 寒水石半兩 蛇退皮半兩 牛黃半兩 太陰玄精半兩 甘草半兩 為灰半兩

炙微赤剉

右伴藥搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以新汲水調下一錢

治熱病心胛虛熱肺氣暴壅喉中腫痛口舌

乾燥嚙津有妨不下飲食宜服含化犀角丸

方

犀角屑半兩 射干三分 黃藥半兩 子芩半兩 鬱金半兩

川大黃半兩 天門冬一分 玄參半兩 升麻半兩 絡石葉三分 甘草一分 馬牙消半兩

升麻半兩 絡石葉三分 甘草一分 馬牙消半兩

右件藥擣羅爲末入馬牙消研令勻鍊蜜
和擣三二百杵丸如小彈子大每服不計
時候常含一丸嚙津

治熱病脾肺壅熱咽喉腫塞連舌根痛宜服
含化射干丸方

射干壹兩 升麻一兩 鵬砂半兩 甘草半兩炙

豉心二合 杏仁半兩湯浸去皮尖雙

右件藥擣羅爲末入研了藥令勻鍊蜜和
擣三二百杵丸如小彈子大每服含一丸

嚙津

治熱病熱毒攻咽喉腫痛連舌根生瘡宜服
地黃煎方

生地黃汁半升 牛蒡根汁三合 蜜三合 黃丹壹兩 杏

人二兩湯浸去皮 鈆霜壹分 太陰玄精半兩

右件藥合和令勻入銀器內重湯煮用槐
枝子攪不得住看色紫卽傾入瓷合中盛
每服不計時候取如小彈子許人含嚙津

治熱病毒氣攻咽喉腫痛宜服此方

太陰玄精一兩 馬藺子半兩 鵬砂一分

右件藥都研令細每服不計時候以蜜水

調下一錢

又方黃藥壹兩 地龍一兩 馬牙消半兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以蜜

水調下一錢

治熱病口乾諸方

夫熱病口乾者由毒熱在於脾胃故也口為

脾之外候其藏若有積熱則津液枯少故令

口乾也

治熱病口乾煩熱宜服蘆根散方

蘆根二兩 地骨皮兩 茅根壹兩 甘草三分

赤葛根一兩 麥門冬一兩 黃芩一分 川升

麻壹兩

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞入竹茹一分煎至六分去滓不計時候

溫服

治熱病毒氣在心脾口乾煩悶宜服犀角散
方

犀角屑一兩 菰蘆根一兩 川升麻一兩 寒水石壹兩
生乾地黄壹兩

右件藥搗細羅為散每服一錢以新汲水
調下不計時候服

治執病心脾壅熱不退口乾煩渴時發躁悶
宜服黃芩丸方

黃芩一兩 梔子仁一兩 鐵粉一兩 菰蘆根一兩 馬

牙消壹兩 寒水石一兩

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和
擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時
候以溫漿水下三十丸

治熱病心脾積熱致口乾煩渴宜服菰蘆丸
方

菰蘆根壹兩 黃連壹兩 桑根白皮三分 犀角三分
人參三分 蘆頭去 地骨皮三分 鐵粉三分 黃芩三分
茯苓壹兩 麥門冬壹兩 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以小麥湯溫
下三十丸

治熱病心胃煩熱口乾皮肉黃宜服生地黃
煎方

生地黃汁合五生菡萏根汁合五蜜合二生麥門

冬汁合五酥兩一生藕汁合三

右件藥一處相和於鍋中熬令稍稠每服
不計時候抄服半匙

治熱病餘熱未退口乾煩渴宜服此方

知母壹兩甘草三分炙石膏壹兩

右件藥搗羅羅爲散每服五錢以水一大
盞入糯米五十粒煎至五分去滓不計時
候溫服

治熱病毒氣未解煩躁壯熱口乾悶亂宜服
此方

葱白五莖拍破合二甘草半兩炙

右件藥以水一大盞半煎至一盞去滓入

生地黄汁生牛蒡汁各二合微煖不計時候分爲三服

治熱病鼻衄諸方

夫熱病鼻衄者心藏傷熱所爲也心主血肺主氣肺開竅於鼻邪熱與血氣并故衄也氏病源衄者血從鼻出也

治熱病頭痛壯熱鼻衄及吐血心中緊硬偏身疼痛四肢煩悶宜服刺薊飲子方

刺薊壹兩生地黄壹兩雞蘇半兩生薑兩赤茯苓

半兩青竹茹一分生麥門冬一兩去心

右件藥並細剉以水三大盞煎至一盞半去滓不計時候分溫三服

治熱病鼻衄去五藏熱氣肯龍湯方

伏龍肝半兩當歸三分剉微炒甘草二分炙赤芍藥三分黃芩三分川朴消三分川升麻三分生乾地黃一兩半

右件藥搗麤羅爲散每服五錢以水一大盞入竹茹一分煎至五分去滓不計時候

温服

治熱病鼻衄不止此是陽毒傷肺宜服阿膠散方

阿膠三分搗碎伏龍肝三分黃芩三分葱白連

鬚二莖豉一合地骨皮三分

右件藥並細剉令勻都以水一大盞半煎至一盞去滓入生地黃汁二合攪令勻不計時候分温三服

治熱病鼻衄不止宜服黃芩散方

黃芩一兩川大黃一分梔子一分刺薊一分

蒲黃一分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

治熱病鼻衄出多面無顏色昏悶虛困熟乾地黄散方

熟乾地黄三分白芍藥三分黃耆一分阿膠半兩

搗碎炒當歸半兩人參三分天竹黃一分

三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以黃
著湯調下二錢

治熱病鼻衄不止貝母散方

貝母壹兩 刺薊壹兩 蒲黃壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以新
汲水調下一錢

治熱病鼻衄不止方

蛤粉錢一 黃丹錢半 香墨末錢壹

右件藥相和令勻以新汲水調頓服

治熱病鼻衄諸藥無效者宜用此方

赤馬通二枚 絞阿膠三片 炙令微黃 搗末

右件藥二味相和熟攪令勻每用少許滴
鼻中仍以新汲水略蘸足即止

治熱病衄血日夜無度身面如金黃方石以

韭根一握搗絞取汁以罐索投於井中深
處良久急取出瀝水相和滴二七滴於鼻
中差

治熱病鼻衄若血下數升者宜服此方

好松烟墨二兩

右擣細羅為末用鷄子白和丸如梧桐子大每服以生地黄汁下二十九如人行五里再服以差為度

治熱病口瘡諸方

夫熱病發汗吐下之後表裏俱虛毒氣未除伏熱在藏熱毒乘虛攻於心脾上膈煩壅頭痛咽乾故舌口生瘡也

治熱病口瘡心神煩躁大小便壅滯宜服犀

角散方

犀角屑半兩黃連壹兩去鬚兩川升麻三分川大黃壹兩
剉碎兩黃芩壹兩川朴消兩麥門冬壹兩焙半甘
草半兩炙兩微赤剉

右件藥擣羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓溫服如人行十餘里再服以利為度

治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩躁宜服川升麻散方

川升麻兩一 玄參兩一 黃連兩一 大青兩壹 柴胡

去帶兩壹 知母兩壹 黃芩兩壹 甘草三分 地骨

皮三分

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞入淡竹葉三七片煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病心藏壅熱口内生瘡宜服大青散方

大青兩一 沙參兩一 蘆頭兩去 川升麻兩一 大黃兩一

剉碎兩半 黃芩兩半 枳殼兩半 微炒兩半 生乾地黃兩一

川朴消三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病咽喉赤腫口内生瘡不能下食宜含

犀角煎方

犀角屑兩壹 川升麻兩一 大黃兩壹 碎兩半 馬牙

消兩半 黃蘗兩半 黃蘗兩壹

右件藥搗篩為散以水四大盞煎至一大

盞去滓入蜜三合相和更煎一兩沸放溫

徐徐含嚥

治熱病口瘡發歇疼痛不可忍宜塗龍膽煎方

龍膽壹兩去蘆頭黃連一兩去鬚川升麻壹兩槐白皮

剉壹兩大青一兩竹葉二兩薔薇根二兩

右件藥細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜二合慢火煎成膏塗於瘡上有涎吐之

治熱病口瘡洗心除熱去喉中鳴宜服石膏

煎方

石膏半斤研蜜一盞地黃汁壹中盞

右以水三大盞先煮石膏取一盞乃內蜜及地黃汁復煎取一盞去滓每服抄一匙含嚥

治熱病口瘡久不愈方

天門冬一兩半去心焙川升麻一兩玄參一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服以新絲薄裹一丸含嚥津

又方川升麻壹兩黃藥兩川大黃一兩碎微炒黃

丹半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服以新絲薄裹一丸含嚥津

治熱病口瘡赤腫疼痛不可忍方

黃藥一兩膩粉一錢馬牙消壹分

右件藥相和令勻每取少許貼於瘡上有涎吐却日三兩上用

治熱病口瘡赤腫疼痛方

薔薇根二兩黃藥一兩馬牙消一兩

右件藥都以水一大盞半煎至一盞半去滓温含冷吐

治熱病口瘡不歇方

牛膝一兩角蒿一兩黃藥半兩

右件藥細剉都以水二大盞煎取一盞半去滓温含冷吐

治熱病口瘡方

黃連一分槐白皮半兩甘草根半兩

右件藥細剉用水一大盞煎至半盞去滓
溫含冷吐

治熱病口舌生瘡石膽散方

石膽半錢馬牙消兩一分黃連半兩龍腦錢一分黃蘗

剉一分角蒿一分

右件藥搗細羅為散入龍腦石膽馬牙消
等更研令細每取半錢川新絲薄裹含良
久有涎即吐之

治熱病熱盛口中生瘡酥蜜煎方

酥三合蜜三合大青兩壹

右件藥先將大青搗羅為末入酥蜜中攪
和令勻慢火煎三兩沸入淨器盛不計時
候含一茶匙

治熱病吐血諸方

夫諸陽受病不發其汗熱毒入深結於五藏
內有瘀積故令吐血也
治熱病發汗而汗不發致內有積瘀故吐血
不止宜服生乾地黄散方

生乾地黃壹兩赤芍藥壹兩牡丹三分犀角屑兩半

刺薊兩一栢葉三分

右件藥搗篩為散每服四錢以一水中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病吐血不止心神煩悶宜服大黃散方

川大黃三分剉碎犀角屑壹兩赤芍藥兩一黃芩

兩一生乾地黃壹兩甘草三分炙微赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱宜服刺

薊散方

刺薊壹兩川升麻兩壹子芩兩一大青三分鷄蘇

莖葉兩壹赤芍藥兩壹犀角屑三分川朴消兩一

生乾地黃兩二甘草三分炙微赤

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病吐血兼鼻衄不止宜服竹茹散方

青竹茹壹兩子芩兩一蒲黃二錢伏龍肝末二錢

生藕汁二合

右件藥先以水一大盞半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃等三味攪令勻不計時候分為三服

治熱病毒氣未解心肺積熱吐血不止心中

壅悶宜服犀角散方

犀角屑半兩 梔子人半兩 地骨皮半兩 子芩半兩 川半兩 大黃半兩 麥門冬三分 甘草半兩 茯苓半兩 神半兩 升麻半兩 生乾地黃一兩 茅根半兩 蘆

根半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病吐血心胃不利宜服紅藍花散方

紅藍花一兩 川一兩 大黃一兩 訶梨勒皮三分 羚羊

羊角屑三分 黃芩三分 刺薊三分

右件藥搗羅羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下赤馬通汁半合更煎一兩沸不計時候溫服

又方石以生地黄搗絞取汁每服一小盞頻三五服即差

治熱病熱毒攻眼諸方

治熱病熱毒攻眼額角偏痛兩眼澁腫心神煩悶宜服玄參散方

玄參半兩 甘菊花半兩 地骨皮半兩 升麻半兩 黃連半兩 麥門冬壹兩 去心焙 梔子人兩 柴胡兩 去苗 甘草半兩 炙 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治病熱毒攻眼腫痛宜服洗肝散方

羚羊角屑兩 子芩兩 羌活半兩 柴胡半兩 去苗 川

大黃半兩 剉 防風半兩 去蘆頭 梔子人兩 甘草

花兩 黃連半兩 去鬚 犀角屑兩 甘草半兩 炙 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入淡竹葉三七片煎至六分去滓不計

時候溫服

治熱病熱毒攻眼生翳膜宜服青箱子丸方

青箱子

壹兩

枸杞子

半兩

澤瀉

半兩

麥門冬

壹兩

去心焙生乾地黃

壹兩

防風

壹兩

蘆頭

壹兩

細辛

壹兩

三分枳殼

壹兩

石決明

壹兩

車前子

壹兩

黃連

壹兩

三分黃連

壹兩

芫薺子

三分

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵凡

如梧桐子大每服以清粥飲下三十九不

計時候

治熱病毒氣攻兩眼赤腫疼痛宜用洗眼黃

藥湯

黃蘗

兩

黃連

兩

當歸

兩

甘草

兩

黃芩

兩

杏仁

一分

雙人主用

麩人

一分

右件藥細剉都以水三大盞煎取一大盞

半以紙濾去滓看冷煖避風處洗眼日三

五度用

治熱病熱毒氣攻眼生赤脉翳膜疼痛怕見

光明宜用洗眼梔子湯方

梔子人

兩

黃蘗

兩

黃芩

兩

麩人

一分

秦皮

兩

決明子

兩

棗

五顆

右件藥細剉都以水二大盞煎取一大盞
以絲濾去滓避風處看冷煖洗眼日三五
度用

治熱病毒氣攻眼赤腫疼痛宜服洗眼黃連
湯方

黃連一兩 甘草一兩 黃蘗二兩 秦皮一兩 秦艽一兩
去苗

右件藥細剉都以水三大盞煎至二大盞
去滓温温洗眼日三五度用

治熱病毒氣攻眼腫痛點眼方

黃連半兩 馬牙消一分 人乳汁半小盞

右件藥將黃連馬牙消等入於乳汁中浸
經一宿濾過取清點眼日五七度

治熱病發斑諸方

夫熱病在表或未發汗或已發汗吐下之後
表證未解毒氣不散煩熱而渴得水不能飲
表虛裏實故身體發斑狀如錦文也

治心肺藏熱毒攻於皮膚徧生赤斑重者其

色紫黑竹服解毒香鼓飲子方

香鼓二兩石膏二兩梔子人壹兩大青一兩川升麻

兩壹兩芒消兩甘草半兩川大黃一兩碎微炒

右件藥細剉拌和令勻每服半兩用水一

大盞入生薑半分葱白七寸煎至五分去

滓不計時候温服

治熱病目赤煩躁狂語坐卧不得身生赤斑

宜服犀角散方

犀角屑兩川大黃三分剉龍膽半兩去黃

苓一兩人參半兩去盧頭甘草半兩不灰木一兩

糞火燒為灰細研

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中

盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時

候温服

治熱病發斑宜服茵陳散方

茵陳二兩川大黃一兩剉玄參壹兩梔子人分壹

甘草半兩生用

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病發斑解毒宜服牛黃散方

牛黃牛兩細研人參壹兩去梔子三分川升麻

甘草三分川大黃一兩剉碎炒枳榔半木香

犀角屑一分羚羊角屑一分

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎竹

葉湯調下二錢

治熱病溫毒大疫發斑宜服生地黄膏方

生地黄半斤切豉升壹雄黃二錢麝香二錢細研

右件藥以猪膏二斤慢火煎地黄并豉三

分煎至二分絞去滓入雄黃麝香攪令勻

以瓷合內貯之每服不計時候以溫水調

下半匙服此藥後其毒皆從皮膚中出即

差

治熱病毒氣外攻皮膚斑出狂亂躁熱宜服

解毒犀角散方

犀角屑壹兩黃芩兩梔子半兩大青兩牛黃

半兩馬牙消壹兩天竹黃半兩赤茯苓半兩麥

門冬壹兩半 去心焙 黃連半兩 去鬚 麝香壹錢 細研 甘草半兩

用生

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎竹葉湯調下二錢

治熱病發赤斑心神煩躁宜服升麻散方

川升麻壹兩 川大黃兩兩 剉碎 微炒 甘草半兩 生用 人參

薑頭兩去 犀角屑兩 玄參兩

右件藥搗細羅為散每服以新汲水調下二錢日四五服

治熱病溫毒中人斑出赤者五死一生黑者

十死一生大疫難救並宜服此黑奴丸方

麻黃三分 去根節 川大黃半兩 剉碎 微炒 川芒消一兩 黃

芩一兩 伏龍肝一兩 竈突中墨一兩 梁上塵壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如彈子大每服不計時候以新汲水研下

一丸如渴但飲水須臾當寒寒定便汗出

即解如未解更服一丸

治熱病熱毒斑出頭面徧身大青散方

甘草牛兩炙
微赤判

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病毒氣攻皮膚生瘡痒痛宜服漏蘆散方

漏蘆壹兩木通一兩藍葉一兩犀角屑一兩梔子

人壹兩玄參壹兩川升麻壹兩川朴消一兩甘草兩半

炙微赤判

右件藥搗篩為散每服三錢水一中盞煎

至六分去滓入生地黃汁半合不計時候溫服

治熱病毒氣不散徧身生熱毒瘡宜服白鮮皮散方

白鮮皮兩半川升麻兩半黃芩兩半玄參兩半麥門

冬壹兩心焙去犀角屑兩半梔子兩半赤芍藥兩半

川大黃兩半碎微炒甘草兩半杏仁兩半浸去皮

尖雙人麩
炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中

蓋煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病累發汗毒氣不盡攻於頭面及身體發瘡如豆頭白根紫為毒氣盛宜服葛根散方

葛根壹兩 川升麻一兩 犀角屑一兩 知母一兩 黃

芩一兩 甘草壹兩 微赤剉 鬱金一兩 川大黃碎微炒

右件藥搗細羅為散每服二錢用雞子一枚取清以新汲水半盞同調藥不計時候服

治熱病毒氣壅為瘡腫宜塗半夏散方

半夏一兩 川大黃一兩 乳香壹兩

右件藥搗細羅為散以葱白三兩細切入諸藥同搗為膏用塗腫上可厚三分已來乾即重換

治熱病經五七日後毒氣攻皮膚生瘡腫宜服消腫退壅毒方

生油合 胡荽汁壹合 雞子白二枚

右件藥相和令勻空腹頓服如未止再服

之

又方川大黃

二兩
擣末
膩粉半兩

右件藥相和細研用生酥油調如膏塗

又方右以精豬肉薄切冷水浸裏乾搗於瘡腫上熱卽換之

治熱病熱毒發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆帶糜漿或沒或生方

葵菜爛煮以蒜壅同食之卽止

右件藥初患急宜食之若不早治極者多

死若病差後瘡癥色黑經歲方滅者此是惡毒時氣也永徽四年此瘡從西東流徧於海內若有此疾但依方煮食必效

治熱病發疱瘡諸方

夫熱病表虛裏實熱毒氣多發此瘡其瘡色白或赤發於皮膚頭作漿戴白膿者其毒則輕有紫黑色作根隱隱在肌肉裏其毒則重甚者五內七竅皆有瘡其瘡形如豌豆故以爲名也

治熱病胃中熱毒生疱瘡如豌豆宜服大黃散方

川大黃二兩剉碎微炒黃連壹兩半去鬚川升麻兩一兩

芩三分漏蘆三分玄參三分甘草三分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病熱毒盛

出頭黑服藍葉散方

藍葉壹兩犀角屑一兩半木香兩川升麻一兩半

玄參一兩蘧麥兩甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病疱瘡出心煩熱盛宜服犀角散方

犀角屑兩一兩川升麻兩一兩木香壹兩紫草兩一兩麥門

冬一兩漏蘆兩一兩香一分甘草壹兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病生疱瘡心神煩躁宜服地骨皮散方

地骨皮兩一兩黃芩兩一兩黃連壹兩去鬚川大黃兩一兩剉碎

微木香壹兩羚羊角屑一兩甘草微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病生疱瘡狀如豌豆宜服梔子飲子方

梔子人一兩蘧麥半兩木通半兩苦竹葉半兩黃

芩一兩甘草半兩鼓合

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治熱病壯熱頭痛發疱瘡如豌豆方

石膏二兩柴胡一兩虎杖一兩知母半兩赤芍

藥壹兩梔子人三分犀角屑半兩甘草半兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治熱病發疱瘡形如豌豆宜服發毒氣木香

散方

木香一分鼓合葱白壹麻黃半兩去乾薄荷

右件藥細剉都以水一大盞半煎至一盞

去滓不計時候分溫二服衣蓋取汗

治熱病毒氣盛生疱瘡如豌豆方

苦竹葉二兩小麥二兩石膏參兩

右件藥以水三大盞煎至一盞半去滓不

計時候分溫三服

又方胡荽一握生地黃參兩

右件藥相和搗絞取汁空心頓服

又方紫芎二兩

右件藥剉以水二大盞煎至一盞去滓

不計時候分溫二服

治熱病發黃諸方

夫熱病發黃一身面目俱黃徧體疼痛心煩
壯熱小腹脹滿眼睛赤澀肩項疼強腰背拘
急此由寒氣在表則熱稽於脾胃騰理不開
瘀熱在內宿穀鬱蒸不得消化則大小便不
通故身體面目皆變黃色凡發黃其寸口近
掌無脉口鼻氣冷並不可療必死之候也
治熱病黃疸熱渴及患酒勞胃滿氣促皮膚

漸黃如金色宜服犀角散方

犀角屑兩葛根三分通草一分知母三分人參

一兩去柴胡去苗藍葉三分桔梗三分去蘆頭桑

根白皮三分赤茯苓三分秦艽三分去苗

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

煎至五分去滓入竹瀝一合攪令勻不計

時候溫服

治熱病黃疸目黃如金小便如血心煩躁悶
口苦頭痛宜服茵陳散方

茵陳三分木通一分梔子一分甘草一分半兩

菡萏根兩麥門冬一分柴胡一分秦艽一分

一兩去苗

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治熱病黃疸熱渴額上汗出手足熱小便赤
宜服龍膽散方

龍膽一分去蘆頭川升麻半兩麥門冬一分犀角

屑一兩甘草半兩赤微判梔子人兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓入生地黃汁一合更煎一兩沸

治熱病面目俱黃心腹堅滿氣急精神恍惚

語多倒錯宜服麥門冬散方

麥門冬一兩半茵陳一兩梔子人兩川升麻半兩黃芩半兩川大黃半兩碎微炒大青半兩川芒消半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治黃疸徧身面目悉黃宜服黃連散方

黃連一兩大青壹兩梔子人兩茵陳壹兩柴胡壹兩地骨皮壹兩黃芩壹兩川芒消壹兩川大黃壹兩甘草壹兩碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治黃疸通身並黃宜服茵陳散方

茵陳二兩 菝葜根二兩 川升麻壹兩 龍膽二兩 蘆頭六分

寒水石三兩 甘草壹兩 炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓入地黃汁半合更煎一

沸不計時候溫服

治心黃熱毒攻舌急眼黃宜服犀角飲子方

犀角屑半兩 茵陳三分 黃芩半兩 梔子人半兩 川升

麻半兩 甜竹葉握一 川大黃三分 剉微炒 川芒消三分

甘草三分 炙微赤剉

右件藥細剉拌令勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治徧身黃如橘色心脇滿急宜服梔子人散方

梔子人一兩 黃芩一兩 柴胡一兩 川升麻壹兩 龍

膽一兩 去蘆頭 川大黃一兩 剉微炒 菝葜一枚 乾者川芒

消二兩 甘草半兩 炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入葱白兩莖煎至六分去滓不計時候

溫服

治熱病多有內瘀卽成黃疸若用瓜蒂散吹鼻中令黃汁出後多差忽然振寒便發黃皮膚如黃塵出小便赤少大便時閉氣力有異食飲不妨餘熱不除久黃者宜服苦參散方

苦參半兩黃連半兩甜葶藶半兩瓜半兩

蒂一分黃芩兩黃蘗一分川大黃半兩

右件藥搗細羅爲散每服以粥飲調下二錢不計時候服

治熱病發黃病宜服茵陳九方

茵陳半兩恒山一分梔子兩鼈甲一兩塗醋

去裙兩川朴兩川大黃一兩刺木香兩犀

角屑兩川升麻兩巴豆一分皮心研杏

人一兩法浸去皮尖雙人麩炒黃別研如膏

右件藥搗羅爲末入杏仁巴豆同研令勻

鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

空心煎烏梅湯下三九如人行十里或利

或汗或吐爲效如未應卽再服三九

治熱病諸黃猪膏髮煎方

猪膏八兩亂髮如雞子大二枚

右安猪膏等於鎊中煎令髮消盡研絞去滓不計時候分爲四服如人行五里再服服盡則病從小便出

治熱病毒熱通貫臟腑深入骨髓之間或爲黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘急須臾不絕瓜蒂散方

瓜蒂二七枚赤小豆二七枚炒熟秫米二七粒

右件藥擣細羅爲散取如大豆粒吹於鼻中當有黃水出爲效

又方瓜蒂二七枚擣碎以水一中盞煎至五分去滓溫服

治熱病後脾胃虛不思飲食諸方

夫熱病毒氣盛時心胃煩躁多服冷藥及過於轉瀉或飲冷水過多水停心下傷於胃口病折已後熱勢既退脾胃乃虛不能摧伏五穀故不思飲食也

治熱病後脾胃虛不思飲食脇下有氣腹肚

不調宜服人參散方

人參壹兩去頭枳殼半兩麩炒甘草半兩炙

沉香兩黃耆兩厚朴二兩去蘆皮炙薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前

溫服

治熱病後脾胃氣虛四肢疼痛不思飲食宜

服白朮散方

白朮兩麥門冬半兩去心黃耆三分人參三分

頭前胡半兩去蘆頭陳橘皮一分易浸桂心半兩

白芍藥兩白茯苓兩當歸兩半洗七遍

去甘草半兩炙滑微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前

溫服

治熱病後脾胃氣不和可思食飲宜服溫中

和氣丁香散方

丁香兩一 甘草半兩炙 木香兩半 訶梨勒壹兩
皮人參半兩 陳橘皮半兩湯浸

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前
溫服

治熱病後脾胃氣虛冷痰滯不思飲食宜服

白茯苓散方

白茯苓半兩 人參半兩 柴胡半兩 草薢壹分
去皮半兩 半夏半兩 洗七 枇杷葉半兩 炙令微黃

厚朴半兩 去麤皮 塗小

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至五分去滓食前
溫服

治熱病後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩疼口
苦舌乾不思飲食宜服黃耆散方

黃耆一兩 人參一兩 白茯苓一兩 陳橘皮一兩

去白 枳殼一兩 訶梨勒一兩 用皮
甘草半兩 白朮一兩 五味子一兩

類聚五十一

卷五十一

醫方類聚卷之五十一

