

卷  
四五

醫方易簡新編

醫方易簡新編卷四目錄

治各種痧症疫癘中暑等症急救解毒附

黑痧

陰陽絞腸痧

烏痧脹

痧症垂危尿尿已出

中暑

中寒

中風試生死

又方

纏腰痧

痧脹諸忌

一切傷暑

暑月暈死

伏暑發熱

太陽中暈

黃疸痧

陽黃痧症

陰黃痧症

傷寒表邪黃疸痧

膽黃疸痧

穀疸  
勞疸

黃汗

黃疸

酒疸

脾癆黃疸

血症黃腫

食癆黃病

黃病

熱黃便秘

時疾黃疸  
婦女黃疸

內熱黃腫  
裏水黃腫

喘滿黃疸  
黃疸尿赤

腹脹黃腫

黃疸變黑

黑疸危症

食茶葉面黃

疸病食勞

傷寒瘟疫

卒暴諸病

陽毒發狂

瘟病頭痛

時氣欲死

天行時疫

時氣煩悶

天行發斑

避疫癘法

天行熱病

邪惡不染

時行熱毒

蝦蟇瘟

大頭瘟

黃胖病

瘟疫傷寒時症

狂走傷寒瘟症

霧露瘴氣

頂辟瘴癘

山嵐瘴氣

辟瘟丹

除瘟救苦丹

痧症起生丸

痧疫瘴癘菩提丸

烏痧脹又方

陰陽痧症

痧脹

弔筋弔腳痧

避弔痧預服可免

絞腸痧痛難忍

呂祖治疫方

大頭蝦蟇瘟

辟穰瘟疫

除疫救苦丹

辟瘟燒丹

又方

辟疫傳染

時行不染

時疫大行

入病家不染疫

解瘟丹

六合定中丸

痧脹第一方

白痧藥秘方

頭目痧脹點藥

又痧藥方

中暑不省

暑風入臟

解酷暑

中暑

中暑悶幾欲絕

消暑止渴

盛夏熱症

熱死

絞腸痧心腹痛

冬月中暑

絞腸痧刺法

霍亂

霍亂吐瀉垂危

暑月脹滿欲作霍亂

霍亂吐瀉轉筋

乾霍亂

羊毛痧

霍亂轉筋

霍亂吐瀉

轉筋垂危

乾霍亂又方

霍亂神效方

反筋腹瀉

絞腸霍亂

斑痧

風寒痧症

陰暑

瘧疾仙方

斷瘧第一良方

止瘧方

斷瘧神方

一兩金

熱瘧不寒

瘧疾渴甚

老瘧勞瘧

瘧疾不止

三陰瘧

中風尸厥

治瘧奇方

八珍湯

口眼歪斜方

中風不省人事

中風口喎

中風口噤

急中風口閉涎壅

中風失音

中風仆地

易簡新編

卷四 目錄

二

七味無價仙方

省風湯

導痰湯

癩症

癩病神方

風痰癩病

羊兒瘋

傷寒諸症

發散傷寒

傷寒結胸停食

陰症傷寒  
傷寒狂走

時疫傷寒狂燥

喉管傷寒

吐法

吐除痰積

發汗方

霍傷寒結胸法

薑熨法

傷寒

感冒

神白散

天中藥茶

解毒辟瘟丹

救苦丹

寸金丹

太乙紫金錠

菩提萬應丸

疫病初起

天行時氣

時行瘟疫瘴氣

休瘧飲

寒熱怪症

瘧後怪症

截瘧

陰毒傷寒

傷寒壞症

一切傷寒

瘧疾不已

天行發斑

夾色傷暑

傷寒夾色

傷寒初起

傷寒妙方

傷寒漏底

夾色傷寒

夾食傷寒

傷寒發狂

傷寒發黃

風寒溼痛

急救解毒附

救縊死法

又方

又方

官桂湯方

通關散方

救溺死法

又方

又方

又法

又法

又方

救天寒凍死

又法

又方

救中惡猝死法

又方

又法

又法

救驚斃

救夜臥斃死

又法

又法

救卒中邪魔

救客忤中惡

救服鹽滷

又方

又方

救煤毒暈倒

救烟火薰死

救男婦尸厥

救蠱毒及金蠶毒

救服砒毒

又方

又方

救中水銀毒

救中鉛粉毒

易簡新編

卷四 目錄

三

救誤吞鐵釘

救中一切藥毒及飲毒

救誤吞金銀

又方

救誤食銀硝

又方

救誤吞銅器

救誤吞鐵物

救誤吞針

又方

救誤吞竹木屑及芒刺

救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服木鱉子

救誤服一切葶毒笑葶毒

救誤吞諸草藥毒閉口椒毒斷腸草毒

救誤吞鐵骨等物

救誤吞針及一切鐵器皆治歌方

救中悶香蒙汗毒

救中麵毒

救中鈎吻毒

救中藥毒鳩毒

救中諸藥毒

救中飲食毒

救中野薑靈芝毒

又方

救中六畜肉毒

救中各肉自死毒

救中牛馬肉毒

救中瘟牛肉毒

救中瘟馬肉毒

救中瘟猪肉毒

救中河魴魚毒

又方

救中鱧魚毒

救中魚鱉毒

救中仙鶴血毒

救中蟹毒

救中團魚毒

救誤食馬蝗

救蝟螫毒

救中諸魚毒

救食雞蛋悶絕

救食鴨蛋不消

救服斑蝥毒

救白服諸毒

救中酒毒

救中燒酒醉死

又方

救中生鴉片毒

救中白菓毒

劣馬咬傷方

獼狗咬傷

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺螫人

活蝨入腹

蜈吞銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠱毒

中蠱吐血

中蠱下血

中百藥毒

中丹藥毒

中諸菜毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中猪肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中瘴氣

中邪氣

中飛絲毒

生漆惹人

尸疰中惡

惡疰腹痛

暗風猝倒

水溺猝死

人落水死

墮水凍死

易簡新編

卷四 目錄

四



中挑生毒

解硫磺毒

解瘴癘毒

治虎咬傷

拔蛇牙方

獸蛇咬傷

壁虎咬

銃子傷肉

人口咬傷

野芋頭毒

蜈蚣咬又方

飲鹹水毒

誤吞水蛭即蠅蟻

烟管傷喉

救湯火

飲酒醉死

解煤炭毒

解百毒 鹽毒 過食雞蛋停滯

狼虎熊傷

毒蛇咬傷

鼠咬

蟻叮

蛇入七孔

射工傷人

治中水毒

蚯蚓咬傷

解諸瓜毒

誤吞田螺

蠅入咽喉

狗咬傷

燒酒醉死

解食沙蟲水毒

鐵針入肉

諸蛇咬傷

蛇入人口

多腳蟲傷

從高墮死

蛇纏人足

蠅螻傷人

十種丹毒

烏黃蜂咬

山嵐瘴氣

誤吞蜈蚣

泡哥魚毒

毒狗咬

誤吞螞蝗生子

蚯蚓毒

蜘蛛毒

誤食碗絲

治各種痧症疫癘中寒中暑等症

大凡痧症各有不同而脈之細軟沉遲與虛脈象相封辨證不察痧脈誤認為氣血兩虧大用補劑無不垂危殊堪痛恨特列

痧症瘟疫時氣一門以示誤認為虛損者之一助云爾

### 黑痧

凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又曰

滿痧 急用蕎麥焙乾研碎去皮為末溫酒調服三錢重者再

服自愈忌茶

### 陰陽絞腸痧

凡腹痛手足冷身有紅點名曰陰絞腸痧 以燈草蘸油點火焯

其紅點用明礬末三錢開水調服

凡腸腹俱痛手足俱暖名曰陽絞腸痧 宜針刺其手指爪甲一

分半處出血亦服明礬取吐即愈切不可進穀食若吃粥與米

湯即死難救矣

### 烏痧脹

真蘇油一鍾溫服取吐即安

### 痧症垂危尿

頂髮數十根白礬研二錢陰陽水一碗調服取吐 或用生

### 屎已出

芋苳二個搗爛放病人口內咽下即醒醒後再喫數片又將鹽

置刀頭燒紅淬入水中乘熱灌下死者亦活 或用生芋芳二

個搗爛灌下置病人於地以熱尿澆肚臍眼亦可

### 中暑

凡盛暑之時忽然昏暈跌倒氣欲絕者名曰中暑 急取道路熱

土一塊大蒜四個剝淨衣皮共搗爛以新汲井水和勻去渣

灌之即愈或用皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一錢灌之

### 中寒

凡感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或腹痛及傷寒發熱

頭疼惡風無論內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣行於經絡

腰腳酸痛及婦人難產經水不調氣壅不通等症均治

白芷七分川芎七分薑製仙半夏七分官桂心七分白茯苓八

分桔梗八分當歸三錢白芍紹酒炒一分枳壳五分川厚朴薑汁

五分乾薑八分炒陳皮六分麻黃三分甘草清炙五分茅山蒼朮米泔炒

二錢葱白頭三個生薑三片清水煎熱服之如調經前方加陳慚

艾醋炒錢

### 中風試生死

凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不入者 生天南星一錢

生半夏一錢北細辛研極細一錢猪牙皂一錢好麝香一分共研極

又方

細末以此藥川少許吹入鼻中有嚏者可治無嚏者不治

凡中風痰厥昏迷卒倒不省人事氣欲絕者用巴豆紙包捉

油出盡去豈用紙作燃或加牙皂末燃燒薰入鼻內即醒可治

纏腰痧

凡一時昏倒腹痛眩暈腰間如有繩纏急者以真蒜油一盞灌

下得吐即愈

痧脹諸忌

凡痧脹忌食薑茶烟酒及熱粥用藥忌甘草紫蘇半夏總以提利

極透為要用香草嫩頭七個食鹽少許沖湯涼服氣通自愈加

甚宜服

一切傷暑

凡暑月貪涼臥濕或生冷不節真邪相犯以致吐利或發熱頭疼

體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死均可

治之用香薷一斤厚朴薑汁製半斤白扁豆炒半斤對

散體虛者每日服二錢體實者每日服四錢用水二盞紹

酒半杯煎至半盞以前散藥入碗中調和俟水冷連進二服立

效

暑月暈死

凡中暈猝死者急取地漿水一升飲之甚妙或以熱土圍臍傍

伏暑發熱

令人尿臍中仍用熱土一大塊 大蒜五 個搗爛去滓熱水調灌即活當以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹即醒

凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病 黃連一斤切

片以好紹酒二升半煮乾焙研糊丸如梧子大每服二 錢熱

水調下每日三服

太陽中暈

凡身熱頭痛而脉微細弱極此夏月傷冷水水行皮中所致 瓜

蒂七個水一升煮至五合頓服取吐即愈

黃疸痧

黃疸痧一證古人多言為濕熱及有五疸之分者曰黃疸曰穀

疸曰酒疸曰勞疸曰黃汗皆未足以盡之而不知黃之大要有

四曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰膽黃此四黃症人往往忽之

其害匪淺惟景岳論之甚詳 余特將各種疸症羅致之明辨

之對症服藥自無不治

陽黃痧症

凡因濕多成熟熱則生黃此即所謂濕熱證也然其証身熱煩渴

或躁擾不寧或消穀善飢或小水熱痛赤澀或大便秘結其脉

必洪滑有力此証不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致

之但察其元氣尚強脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便  
便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺

血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲 茯苓二錢 澤瀉

二錢 木通二錢 猪苓一錢 梔子一錢 枳殼一錢 車前子一錢 水

一鍾半煎八分食遠溫服 如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草

之屬只須加一味如大便堅硬脹滿者加大黃一錢 如小水不

利熱甚者加茵陳二錢 如邪熱蓄血腹痛者加紅花一錢

青皮一錢五分

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澀疴症

茵陳三錢 焦梔子三錢 澤瀉三錢 青皮三錢 甘草一錢 甘菊花

二錢 水三鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

### 陰黃痧症

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃為意專用清利此症宜調補

心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退 人參二錢無力用

盜黨參七白朮二錢 茯苓二錢 炙甘草一錢 加黑棗七個煨生

薑三片水煎服若元氣虛不至甚而兼多寒濕者茵陳五苓散方加減用之亦可

### 傷寒表邪黃疸

凡表邪未清而濕熱又甚者其証必表裏兼見身面悉黃者俱是

### 疸

用茵陳蒿末一錢焦梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢

甘菊花二錢白茯苓二錢水煎溫服若內熱甚而表邪仍在

者前方加柴胡五分白朮一錢猪苓一錢山查一錢煨荔枝七

個去甘菊花水煎溫服若但有濕熱內實脹閉等症而外無

表邪者及穀疸發熱不食大小便閉或食即頭眩宜用茵陳

九錢四錢大黃五分山梔一分分作二服水二鍾煎八分食遠溫服

若因內傷勞倦致染傷寒者亦多有發黃之症但察其本無濕

熱實邪等症即當以治陰黃疸之法調補治之若祇知攻邪則

未有不敗故孫真人曰黃膽脈浮者當以汗解之方用桂枝加

灸黃芪湯煎服此即補虛散邪之法也

### 膽黃疸

凡膽黃症皆因傷膽而然膽既受傷則臟氣之損敗可知使非修

緝培補則必至決裂故凡遇此等証務宜大用甘溫速救元氣



穀疸

然必察其所因之本或兼酸以收其散亡或兼澁以固其虛脫  
或兼斂以鎮其失守之神魂或開導以釋其不解之疑畏凡用  
諸藥大都宜同陰黃証治法當必有得生者若治此証而再加  
尅伐清濕利水則真如壓卵矣

治黃疸瘵之法本宜清濕利小便然亦有不宜利者當細察其  
病症脉象可照各方治之

金匱要略曰跌陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒寒  
即食滿尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩  
穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱  
身體盡黃名曰穀疸此症寒熱不食食即頭眩心胸不安因飲  
食傷脾久久發黃者是 宜用茵陳九錢 製大黃四錢五分 山桅一錢

五分分作二服每服水二鍾煎八分食遠温服

勞疸

凡額黑微汗手心足心熱薄暮即發膀胱急大便溏黑名曰勞疸

又名女勞疸此症因大熱大勞男女交接所致身目俱黃日晡  
發熱惡寒小腹滿小便難 用猪油熬膏半斤亂髮如雞子大

三團和煎髮消藥成分兩次服黃病從小便出也若非因交媾所致發熱惡寒小腹急大便澀用滑石一錢石膏一錢研末

大麥汁服小便大利者愈腹滿不利者難治

黃汗

凡汗出染衣色如黃柏汁者身體微腫名曰黃汗用生茅根一

把切細以猪肉一斤合生薑食自愈或用山豆根末水服二

錢若帶蠱氣以紹酒溫服

黃疸

凡身面眼目黃如金色小便黃而無汗者曰黃疸此症寸口無脉

鼻出冷汗腹膨形如烟薰頭搖視直環口黎黑油汗發黃久之

變黑者不治若喜睡吐涎茵陳蒿一二錢白蘚皮一二錢水

二鍾煎服每日二服自愈或薏苡根煎湯頻服亦治若睛黃

小便赤用生薑菁子末熟水服亦可或用絲瓜蒂四十九枚丁

香四十九枚乾鍋內燒存性為末吹鼻取出黃水亦可楷

酒疸

凡心中懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑食時欲吐鼻燥名

曰酒疸其脉浮者先吐之其脉沉者先下之再用炙黃芪二兩

水蘭即澤蘭為末紹酒溫服夫病酒必小便不利心中熱足下

熱是其証也

脾癆黃疔

青礬四兩當歸四兩好紹酒浸七日焙炒香百草霜三兩研末以袋盛之入

酒瓶浸三日煎熬為丸如梧子大每服五丸重者七丸溫水

下一月後黃盡去矣

血症黃腫

緣礬四兩百草霜一升麵半斤為末砂糖和丸如梧子大每服

二三十丸食後薑湯下

食勞黃病

絲瓜連子燒存性研末每服二錢因食麵得病麵湯下因飲酒

得病溫酒下連進數服即愈

黃病

凡面目及徧身皆黃小便赤心煩口乾者秦艽三兩牛乳一大

煮至七合作數次溫服

熱黃便結

蕪青子搗末水和絞汁服少頃當瀉一切惡物並葛出

時疾黃疸

狂悶煩熱不識人事者大瓜婁實黃者一枚以新汲水九合

浸淘取汁入蜜半合搗硝八分作二次服便瘥

婦女黃疸

凡經水不調房事觸犯以致黃疸者白礬五錢黃蠟五錢陳橘

皮三錢研末化蠟為丸如梧子大每服五十九以當歸三錢酒浸洗

內熱黃疸

川芎一分 酒炒紅花一錢 煎湯吞丸

地丁一兩研末以好紹酒沖服每服三錢再用生薑切片時時週身擦之其黃自退也或加茵陳蒿末不拘多少同擦尤妙

裏水黃腫

凡一身面目黃腫其脉沉細小便不利者名曰裏水黃腫急用甘

草藤黃湯主之 麻黃四兩 水五升煮至三升去沫渣加生甘

草二兩 水二升與前煮麻黃湯同熬至三升光景不必煎矣每

服半碗汗出自愈宜避風寒

喘滿黃疸

凡小便自利氣多喘滿者 仙半夏半斤 生薑半斤 水七升

煮至一升半服之 前有人氣逆喘急而死幸心下尚暖急以

此方煎湯灌入少許即活

黃疸尿赤

凡肝木氣盛木來尅土其症必心腹滿脹或黃腫如土色急服此

腹脹黃腫

方能助土益元無不立驗故脹滿黃腫及瘡痢泄疾均治 茅

山蒼朮二斤米泔水浸二宿 皂礬一斤醋炒煨成赤色礬色本錄味酸

化燥濕之涎痰黃酒四兩浸麴麴四兩兩乾 人瓶火煨為末調

利小便消食穀

黃疸變黑

醋為丸如梧子大每服三四十九米湯吞服一日二次服之時  
珍常以此方加平胃散治一賤役果有神驗  
凡醫所不能治者急用土瓜根搗汁平旦時卯時溫服一碗午  
刻黃黑水當從小便出不出再服自瘥

黑疸危症

瓜蒌根一斤搗汁溫服隨有黃水從小便出不出身服

食茶葉而黃

紅花椒不拘多少炒研末為丸如梧子大每服十丸茶湯下自退

瘧病食勞

杏仁五兩紹酒一杯水三碗煎服汗出自愈

傷寒瘟疫

凡已發未發者梨木皮一兩生甘草一兩黃稊穀一合鍋底煤

卒暴諸病

凡中風中暑中寒中氣中毒中惡及乾霍亂一切卒暴之症生  
薑汁一杯童便二杯同調溫服立解蓋生薑能開痰下氣童便  
能滋陰降火也

陽毒發狂

凡陽毒瘟疫熱極發狂發斑大渴倍常者陽毒即暑毒也急用小麥奴一

錢 梁上塵一錢釜底煤一錢灶突黑一錢黃芩一錢麻黃四分

硝黃月分以蜜為丸如彈子大用水化服或汗出或微瀉即愈

瘟病頭痛

夫麥乃心之苗屬火而奴則麥質將成爲濕熱所蒸上黑黴者與釜煤灶突同取火化之義誠急救經驗之良方也

凡瘟病初起頭痛肚熱脉大者以小蒜一斤杵汁三合温服再

服二次便愈 或用生梓木削去黑皮取裏白者切片一升

水二升五合煎汁每服八合自瘥

時氣欲死

大錢一百枚水一斗煮至八升入麝香末三分頻飲或吐或下

卽愈

天行時疾

棗仁二十七枚煎服而愈 前有陳孜如癡人一般袁仲陽敬

事之孜曰今春當有疫疾可服棗核中仁二十七枚後果得時

疾服之卽愈又云天時不正常服棗仁百邪不敢干犯仲陽服

之有效則棗仁果有治邪之說矣

生藕汁一盞生蜜一合和勻服之

時氣煩悶

凡天行斑疹須臾遍身皆戴白漿此惡毒時氣也急煮葵菜葉搗

多以蒜薤啖之卽止

天行發斑

常以向東桃枝煎熬湯浴之自解 松葉細切紹酒温服每日

避疫癘法

天行熱病

三服能避瘟疫

凡天行熱病伏熱頭目不清神志昏塞及諸大毒者以船底苔

五兩和酥餅末五分麵糊丸如梧子大每日溫酒調吞三四十

丸自解

邪惡不染

五月五日午時多採蒼耳嫩葉陰乾收之臨時為末冷水調服

二錢或水煎服能避邪惡

時行熱毒

浮萍五兩五月十日兩麻黃五錢去根真好桂心五錢附片五錢四物

搗研細篩每服一錢以水一大鍾生薑五分同煎至六分渣

熱服汗出乃瘥

凡惡疾癘瘡遍身者將前方濃煎出汗洗浴多效此古方之歷驗

奇效也

蝦蟇瘟

凡天行時氣面色紅赤頭頂腫大各蝦蟇瘟以金線鼃搗汁水

調空心燉服極效或用葶花三錢染坊有此物出在福建細研和雞蛋清

一個燒酒一杯調服再將側柏葉不拘多少搗自然汁調蚓泥敷頂

腫處大頭瘟亦治

犬頭瘟

凡頭面腫大如斗二目難開危急者 牛蒡子炒研 黃甘菊花三錢

荊芥穗三錢 龍膽草三錢 黃柏稍 三錢 羌活三錢 防風三錢

白芷三錢 苦桔梗三錢 連翹去心爭 蔓荆子去蒂淨 薄荷葉三錢

錢藁本三錢 元參三錢 升麻三錢 川芎三錢 生甘草三錢 右藥

共合一處人淨砂鍋內注井水十碗在病人房內炭火漫熬至

五碗為度去渣將病者仰臥徐徐灌之勿令間斷服完其腫自

消須善調養數日再服一劑必無後患

黃胖病

馬蘭頭根不拘 杓汁半碗沖紹酒服之每日一次半月即愈

瘟疫傷寒時

凡飯後氣膈心口脹悶填塞不舒者 上好蒸酒不拘 燉熱將布

症

二塊蘸酒自胸向下擦抹如布冷即換熱布輪替擦抹如此數

次滯氣下通即能大便而瘳

狂走傷寒癰

卅出過小雞蛋殼不拘 泡湯服之即睡

霧露瘴氣

凡頭痛心煩頭強顫掉欲吐者 新猪尿二升紹酒一升絞汁燉

服汗出自愈

頑辟癘癘

桃仁一斤 吳茱萸四兩 青鹽四兩 同炒熟以新瓶密封七日取



出棟去菜鹽將桃仁去皮尖每嚼三十枚瘡癘不染山居尤宜服之

### 山嵐瘴氣

尾角磨水服之甚良 或水調服麝香三分亦解 或羚羊角

### 辟瘟丹

末水調服一錢亦可 紅棗二斤 茵陳切碎八兩 大黃切片八兩 加水安息更妙係外洋來者大藥店方真如無

### 除瘟救苦丹

亦用石藥三味合放一處清早常燒能却時症瘟氣 專治一切瘟疫時症傷寒感冒無論已傳經未傳經大人每服

一丸小兒半丸凉水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時切不可食熱湯熱物汗出之後不忌此丹百發百中奇效無比

有力者宜修合以濟世功德無量 瓜兒天麻二錢 麻黃二錢 乾薑炒一兩 松蘿茶一兩 棗豆粉二錢 生甘草八錢 硃砂飛過

雄黃飛過八分 生大黃一兩 右藥共研細末煉蜜為丸如彈子大收磁罐內勿令泄氣患此症者可照服之

### 起生丸

專治一切危急痧症每服五粒重者七九粒或十三粒含舌上

覺麻用凉水吞下或津嚥亦可立效如神若遇輕痧只須三顆

痧疫瘴癘苦  
提丸

時宜備帶便於救濟務須乾燥毋使霉黥實有回生之功真

茅山蒼木一兩子丁香一兩雄黃水飛淨晒大劈砂水飛淨晒

麝香當門子二錢真囀酥切薄片灰燥透磨右藥各取淨細

末秤準分兩五月五日午時和勻以堆花燒紹酒法丸如細菜

豆大灰燥瓶收藏勿使出氣

專治時行瘟疫諸病不服水土山嵐瘴氣等症 紫油厚樸薑

製炒十兩真茅山蒼木炒十兩仙半夏薑汁製陳皮十兩砂仁十兩枳

壳炒十兩香附紹酒製白茯苓十兩白扁豆十兩黃芩紹酒炒藿

香十兩南薄荷十兩紫蘇葉十兩山查肉炒十兩神麩炒十兩麥芽

炒十兩生甘草十兩右藥各十兩共為末川鮮荷葉十兩煎濃湯

為丸每丸重三錢大人一丸幼者半丸此方屢試屢驗無論大

小男女疫瘴重者每服二丸凡時行瘟疫發熱惡寒頭痛身

痛胸腹脹滿每用一丸生薑湯調服忌葷腥油膩凡暑症肚

痛泄瀉口渴發熱小便不利大便秘下血川藿香沖湯調服忌魚

腥凡藿亂吐瀉攪腸痧腹痛轉筋用胡椒七粒敲碎菜豆四

十九粒煎湯取用一九調服忌薑湯米湯○凡瘧疾寒熱往來用白開水加生薑搗自然汁調化一九熱服忌葷腥○凡咳嗽多痰日部五分煎湯入生薑一片調化一九服之○凡紅白痢疾腹痛下墜車前子二錢煎湯調化一九服之忌雞肉○凡傷食痞滿泄瀉生薑沖湯調化一九服之○凡感冒風寒或水土不服山嵐瘴氣雜症生薑沖湯調化一九服之如途中無引白開水調服亦可孕婦忌服恐動胎致墮切戒切戒

烏痧脹

丁香 雄精 蒼朮 硃砂 各等分為末再取饴酥亦等分切片紹酒浸研漿和前藥末搗為丸如芥子大晒乾藏貯溫茶送嚥七粒立甦

陰陽痧症

凡陰痧腹痛手足冷看身上有紅點以燈草爆之陽痧腹亦痛而手足煖用銀針刺指甲出血不拘陰痧陽痧只用食鹽二斤炒熱用青布裹作二包背上熨之冷則易或臍上亦可

痧脹

急將病人頭頂紅髮拔去腿彎指頭刺血出將口抉開用白鴈腳花三枝泡湯灌下即活開花時連根葉風乾收貯以便救急如腹痛難忍以白扁豆

葉三十張搗汁沖井水服立驗

吊筋吊脚痧

凡兩足不仁畏冷筋抽急用布將膝下緊紮紮住兩膝後委中穴

刺出惡血一面將菜豆擦頂心再將菜豆滑石煎服遲則不救

此病初起急將病人頭髮打開用真菜豆粉井水調勻不住手

擦頭頂心上再用菜豆滑石粉二味井水調服即安

避吊痧預服

生香附三錢 陳皮一錢 蒼朮一錢 蘇葉二錢 甘草一錢 生薑三錢

可免

片加葱頭三箇水煎服 方藥平淡治愈不少

絞腸痧痛難

食鹽炒 陰陽水一鍾調服半碗湯半碗水 腹痛稍止即服藿

忍

香正氣散 藿香 白芷 桔梗 半夏薑汁製 紫蘇 陳皮

白木炒 大腹皮 厚樸薑汁製 炙甘草五分 生薑三片 黑棗二

枚水煎溫服 此散治四時不正之氣水土不服脾胃不和吐

瀉腹痛飲食停滯惡心胸滿等症

呂祖治疫方

柴胡紹酒炒 麥芽炒 蘇葉三兩 青木香二兩 冬朮二兩 白芍

一兩 冬椿米一斤 白扁豆炒 神麩二兩 糯米煮湯為丸如桂

圓大薑湯調服

大頭蝦蟆瘟

殭蠶白二兩

薑黃五分

蠟五分

大黃四兩

共為細末薑汁

打糊為丸重一錢一丸大人一丸小兒半丸蜜水調服如頸  
臉皆腫者 福建蕘花三錢 燒酒一杯雞蛋清一箇同攪勻服

之即愈

辟癘瘟疫

上品硃砂一兩

細研蜜和丸如麻子大常以太歲日平日一家

大小勿食諸物向東各吞三七丸勿令近穢水無瘟疫 或正

月七日新布囊盛赤小豆置井中三日取出男吞七粒女吞十

四粒竟年無病 或六月六日採馬齒莧瀹過曬乾元日煮熟

同鹽醋食之可解疫氣 或除夕夜以紅小豆 川椒 各十

七粒投井中勿令人知能却瘟疫 或以大麻子廿一粒於元

旦投井中亦良

傳除疫救苦

專治一切瘟疫時症傷寒感冒無論已傳經未傳經大人服一

丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時切

不可食熱湯熱物汗出之後不忌 此丹極平淡却極神驗百

發百中有力者能先行製合濟人最妙 明天麻 麻黃 乾

丹

薑 松蘿茶 菜豆粉各一兩 甘草 硃砂 雄黃各入 生大

黃二兩 共研細末煉蜜為丸如彈子大涼水調服

辟瘟燒丹 蒼朮 紅棗各一斤研末杆膏丸彈子大遇疫每日燒一 二丸

又方 大管仲一箇 浸水缸內加白礬少許不染瘟疫

辟疫傳染 松毛不拘 切細為末每日紹酒調服二錢燒酒亦可三服後能

避瘟疫

時行不染 車前子隔紙焙為末水調服二錢即不染

時疫大行 自家水缸內每早投黑豆一撮全家無恙 五更時潛投黑豆

一大握於井中勿令人見凡飲水家俱無傳染

入病家不染 雄黃末 蒼朮研末 以香油調塗鼻孔既出病家用紙條探鼻

疫 取嚏飲雄黃調紹酒一杯自無傳染燒酒調服更妙

解瘟丹 凡端午夏至前後燒二 三 丸能遠疫鬼及蛇蝎等物 蒼朮半斤

明雄黃一兩 白芷四兩 肉桂一兩 艾葉四兩 乳香 芸香 甘

松 三奈 唵叭香各一兩 硫黃五錢 共研細末人榆麩三合加

紅棗煮爛去核同榆麩煮糊合葯末為丸陰乾收好勿令洩氣

六合定中丸

遇有時疫日焚二三九極妙須端午日製

藜葉 藿香葉 香茹 各四兩 木香 另研細末一兩 赤茯苓 二兩 生甘

草 一兩 木瓜 二兩 檀香 另研細末一兩 羌活 二兩 枳壳 二兩 厚朴 制表一

錢 柴胡 一兩 共為細末煉蜜杵勻為丸一錢五分治方列後

治四時瘟疫薑湯法 春冬宜用薑湯 宜用黑豆甘草湯下 秋夏

治婦人產後惡路不盡紅花山查煎湯下

治大人小兒傷飲食萊服子煎湯下

治男婦心胃痛吳茱萸湯下

治感冒頭痛發熱薑湯調服

治小兒發熱吐乳山查燈心湯下

治心口飽脹嘔吐生薑湯服

治小兒驚風薄荷湯下

治中暑冰水或冷水調服

治霍亂轉筋陰陽水煎服

治痢疾脹瀉溫水調服

治瘧疾薑湯調服

治胃口不開開水調服

痧脹第一方

梣香 一兩 細辛 三錢 荆芥 五錢 廣鬱金 五錢 各生研極細末

每服 一錢 清茶調送下孕婦亦可服惟宜少勿多

白痧藥秘方

蟾酥 五分 冰片 五分 牙硝 三錢 硼砂 一錢 珍珠 一錢 白檀香 一錢

分飛滑石 七錢 共研為極細末用小瓦瓶收貯發痧時聞嚙取

嚏

頭目痧脹點藥

硃砂 錢 麝香 三釐 硼砂 五分 冰片 三釐 雄黃 飛五分 牙硝 三分

五月五日午時共為細末貯小瓶內遇痧發者用點眼角內男

左女右

又痧藥方

西黃 三錢 雄黃 九錢 火硝 六錢 麝香 四錢 華撥 三錢 冰片 四錢

硼砂 九錢 辰砂 二錢 葱子 三錢

中暑不省

皂莢 一兩 燒存性 甘草 一兩 為末溫水調一錢灌之用大蝦

暑風入臟

蟻將竹刀破開肚皮腸膽不可去捲在胸口綳條縛定一燥即

換一箇凶者換至七箇立愈試驗屢效之神方也



解酷暑

乾葛二兩 烏梅肉四兩 薤葉四兩 青鹽一兩 白糖一斤 俱為末

和糖搗如乾燥加白蜜為丸噙下

中暑

水蓼搗汁灌之 或黑芝蔴畧炒井水搗汁灌之 或蒜頭搗

爛取路上熱土攪水飲之甚妙

中暑悶幾欲絕

取扁豆葉搗汁飲之即愈 或挖地坑深三尺取新汲水傾入

絕

坑內攪濁澄清飲數甌即愈

消暑止渴

百藥煎細陳茶等分為末 烏梅肉搗爛和丸如芡實大每含

下一丸

盛夏熱症

凡盛夏忽然頭大如斗身熱如火者 用黃芩一兩煎汁一茶杯

微溫一氣吃下立愈

熱死

凡中酷熱死者不可用冷水澆及飲冷水急用草繩盤存臍上以

路上熱黃土填放在內令眾人以小便澆之或熱湯亦可

絞腸痧心腹痛

雄黃 焰硝等分淨研極細末每用小許點小眼角立效或大

蒜搗爛塗足心即愈或用生明礬二錢為末以熱開水冷水各

半名陰陽水調服即止

冬月中暑

一婦人冬月忽然惡寒發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫皆認  
虛弱用滌痰二陳湯不效反甚後延余往診輕按其脈細弱似  
虛及重按實取脈伏而緊確平傷暑且屬陰暑眾人皆以為不  
然豈冬月中暑之理乎余於病家問之曰夏月有無晒皮綿  
各衣於病前兩日穿之婦曰發熱之先一日却取夏月所晒綿  
衣即穿綿袄次日隨覺身熱余曰誠哉傷暑也凡盛暑所晒衣  
服乘熱收入箱中其暑不散今因穿衣開箱陰暑潛受無怪脈  
伏而緊也幸此婦體氣素虛先服之二陳湯一劑尚不送命否  
則立見其斃即用 黃連 香薷飲進二服其病瘳矣

絞腸痧刺法

凡絞腸痧手足厥冷腹疼不可忍者急取溫水微帶熱於病者膝  
灣內用手帕打着有紫黑點以針刺去惡血即愈

霍亂

凡霍亂欲瀉不瀉者 白開水一碗入炒食鹽一撮候湯冷飲之

如不止將針刺少商穴十指頭出血立愈穴在第十指頭上  
指甲之兩傍與出指

甲之處相齊只離指甲兩  
邊各一葉葉之地是也

霍亂吐瀉垂危

藿香 陳皮 各半兩 水二盞煎一盞溫服

霍亂吐瀉轉筋  
凡暑月脹滿欲作霍亂未得吐下者 鮮紫蘇搗汁飲一盞甚效

凡霍亂脹滿上不得吐下不得瀉名乾霍亂亦名攪腸痧 小蒜

一升水二升煮一升燉服 或乾黃土地掘深三尺以新汲水

投之攪濁稍澄取清飲之連服三五盞即愈大忌米湯

凡羊毛炒初起身發寒熱胸口迷悶前心坎後背心有紅點如疹

子形先用細針挑破取出羊毛又名羊毛疔再用明雄黃研末

二錢青布包紮蘸熱酒於前心坎擦之自瘡外四圍大圈之中

擦抹其毛即至後背心再於背心照前擦之其羊毛隨布俱拔

出方用 金銀花 二錢 野菊花 蒲公英 天葵子 紫背

地丁香 各一錢二分 煎滾加紹酒半杯再煎熱服連渣滓服略

蓋被取汗 如發熱口渴便閉 黃連 黃芩 黃柏 梔子

各一錢 加生大黃 五分 葱頭 五箇 水煎服

以墨書木瓜二字於痛處仍令病人口呼木瓜隨聲而愈

霍亂轉筋

筋

乾霍亂

易筋片扁

六

三

或木瓜煎湯服仍以湯浸青布裹其足 或大蒜搗塗足心立愈 或木瓜艾葉黑糖煎水加鹽飲效

凡轉筋不可忍者 男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩旁

邊即愈或以熱湯漬之亦可 又勉強站直立少頃即愈

### 霍亂吐瀉

陳皮 五錢 藿香 五錢 黃土澄水二鍾煎一鍾服之立愈 或生

薑一兩打碎炒熟 淬醋敷臍下立止 或車前末 三錢 開水沖

服即愈 或車前子澤瀉薑製厚樸 各等分研末每服錢半小兒七分熱水下

凡不吐不瀉心腹脹痛煩悶欲絕者用 檳榔 五錢 童便 一盞 水

一盞 同煎服 將病人腿腕橫紋上蘸溫水拍打紫血脈紋見

以針或磁片刺破出紫血立愈 或生白礬為末開水下一錢

### 轉筋垂危

凡霍亂轉筋垂危者如腹尚有煖氣以鹽填臍中炙鹽上七壯甦

醒

### 乾霍亂

此症腹痛汗出或吐瀉或不吐瀉發在夏至後霜降前忌穀食及

薑取三角尖小磁片一撮老茶一撮同人鍋內炒熱煎水頻服

因汗出故不宜食薑

凡腹痛出汗吐瀉不止危在頃刻者用 食鹽一兩 生薑五錢 切

片同炒色變以水一碗煎服不宜熱服好後不可即飲食

生王瓜一條 絞汁 生薑取汁一和 勻灌下即愈

或食鹽炒 紅猪牙皂莢一錢 煎水服吐即效

反筋腹瀉 凡兩手抽掣搐搦用婦女木梳煎水服效

絞腸霍亂 白礬二錢 飯和為丸一服即止

斑痧 用食鹽一握在前後心腰脇擦出許多紫點立散 又搗蒜頭

塗兩足心

風寒痧症 如死去者用生薑汁滴兩眼角內肉立效重症四角俱點即活

陰暑 凡夏天走入陰冷屋中及冷衙堂內易受陰暑此症四肢厥冷指

甲唇舌皆青昏迷不醒急用雞蛋十箇煮熟去壳以好銀簪插

入蛋內乘熱置肚腹上以手轉蛋俟蛋與簪變黑則換之十換

即效

瘧疾仙方 歸身一錢 茯苓一錢 陳皮一錢 甘草五分 好燒酒一杯以藥併

入用兩碗合蓋菜皮紙糊口勿令洩氣掘一地潭埋甕一晝夜

食之

又獨蒔蒜 雄黃 搗爛為丸如圓眼大晒乾收貯發四五次

後於雞鳴時用一九搥研井花水調服

斷瘡第一方

鮮野艾頭七箇 大蒜三榔 浮麥一撮 同搗極爛土墻上陳年小

黃蜆壳半片 或蚘子壳將搗爛之藥撈一撮放在壳內準罨脈

息上男左女右用綢帕緊繫紮好一週時去之起一水泡瘡卽

止罨紮之時勿令四眼見不可早斷恐致生他疾 此方曾試驗神效之良方慎勿輕視

止瘡方

又獨蒔蒜十二箇 桃仁一百箇 搗爛加入上好黃丹再搗

勻丸如黃豆大每服三丸當發日早晨溫酒一杯面東吞下

又白糖四兩 調化燒酒內溫服飲至微醺自止

又新汲泉水煎至百沸一碗約至半碗發瘡時寒過熱來起

坐椅上去被增衣不時熱服少許助汗多發一兩箇時辰覺腹

中寒冷氣盡舒暢卽止

斷瘡神方

又真川貝去心研極細末六兩 生半夏研極細末六兩 五月五日午時合和銅鍋

微炒至嫩黃色冷定裝入磁瓶勿令泄氣每服一分五釐生薑

汁二三匙和藥隔水燉熱在爐未夾先一時服之即愈重者再服一次愈後忌發物及雞蛋南瓜芋芡等二三月勿至可發耳又生薑一塊搗爛入淨鍋焙成餅如茶杯底大厚二分許取置桌上畧退火氣貼風門穴外用碗口大新膏藥一張四圍以手按緊貼不可絲毫走氣中間薑餅處勿按恐其散碎萬宜仔細或絲毫不緊必有冷水流出不效俟下期再治風門穴在頸後第二骨節與第三骨節交縫處臨發察明貼之即愈膏藥勿揭聽其自下但須發至三五次後乃可用

又旱蓮草搗爛男左女右置寸口脈上以古文錢壓定蓋帛緊縛住良久起小泡謂之天灸即愈

又官司草即車前子草嫩腦頭搓熟早一時辰塞鼻孔男左女右

又大棗頭七八枚連皮生薑五錢煎濃湯極熱服日飲十餘次亦效

效

一兩金

治久瘧人虛雞子二箇打散入白糖一兩打勻蒸熟食立止

熱瘧不寒

川山甲一兩紅棗十箇同燒存性研末每服二錢發日五更井

華水服

童便和蜜煎沸未發時燉服

鰲甲醋炙研末酒服二錢隔夜一服清早一服臨時一服無不

斷者入雄黃少許更佳

瘧疾不止

鼠板燒存性研末酒服二錢 又硃砂三分巴豆仁一粒研為

末飯為丸分十丸於未發前一時取一丸貼眉心一過時揭去

效 又苦參一牙為細末用好醋打麩糊丸桐子大臨發之日

早晨用桃枝七寸柳枝七寸泡湯一茶鍾服三錢

三陰瘧

草果一錢置碗內水半碗水上蓋以綿紙紙上用 人參三錢

隔一夜於次日飯鍋內蒸之只將人參煎湯服不用草果即愈如不愈再進一服無有不止者

又方烏梅三枚陳皮青皮當歸知母各三錢水二碗煎

一碗清晨向東方服五服除根初起者加炙穿山甲三錢同煎

中風尸厥

凡中風厥倒牙關緊閉不省人事用 猪牙皂莢去皮弦二兩用

水中黃化取北細辛五錢去共為細末用少許吹鼻中即醒

又用針刺第十箇指甲離指甲一韭葉許出血為妙 如痰涎



壅盛服此先吐其痰然後川藥猪牙皂莢四條去黑皮炙黃白礬一兩

共為細末温酒調三錢徐灌下

治痢奇方

紫河車一具米水洗淨人參五錢當歸五錢將河車蒸熟搗爛再將

人參當歸研末同搗勻為丸如桐子大每服三五丸日進三

服人乳下開服八珍湯無不愈者

八珍湯

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 熟地 芍藥

黃柏酒炒知母酒炒水煎服

口眼歪斜方

菘菴草不拘多少煎湯露過人芽糖三兩空心燉服即愈

中風不省人事

凡中風不省人事得病之日便進此藥免成廢人 柏葉一握葱

白一握連根細研如泥無灰酒一大鍾煎一二十沸去渣温服

如不飲酒分作四五次服

凡中風中痰中暑中氣乾霍亂 生薑自然汁一鍾童便一鍾和

勻灌下

中風口喎

皂角五兩去皮為末用三年陳米醋和之左喎塗右右喎塗左乾

更易之

中風口噤

荆芥為末酒服二錢或烏梅肉和南星細辛共研末用中指蘸

擦牙關

急中風口閉

凡急中風口閉涎壅垂死者一服即瘥用江子二粒去皮膜白礬如搗

涎壅

一丸用綿裹放口中近喉處良久吐痰乃愈

塊將二味新瓦上煨令江子焦赤為度煉蜜丸如芡實大每服

中風失音

急搗梨汁頻服朱丹溪云梨者利也流利下行之謂

中風仆地

大蒜一大把路上熱黃土攪和研爛以新汲水和之去渣挖開

齒灌之

七味無價仙方

雄黃南星半夏川烏草烏硃砂再加一味白天麻共研細末每

服三分酒下不論手足頑麻口眼斜喎渾身風痺等症俱效

省風湯

治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜攣急疼痛風盛痰實防風

南星生用各二錢半夏浸洗生用黃芩甘草各一錢生薑五片引不拘時

服此藥同導痰湯合服尤妙

導痰湯

治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通陳皮半夏茯苓

甘草南星枳殼麩炒各等分生薑五片引食後服

癩症

癩病神方

羊蹄根 一錢搗 桐油渣 五分和勻 爲丸冷水送下吐愈

有一婦人病狂十餘年遇異人授此方初服心間如有物脫去神

氣洒然至再服而愈 亦治男婦抑鬱頭狂及風痰迷悶 鬱

金 七兩 明礬 三兩 爲末糊丸開水下 三錢藥完病愈

生白礬 一兩入猪膽內陰乾 北細辛 五錢 爲末蜜丸桐子大一歲十九茶

湯下大人服五十丸久服痰自大便出

羊兒瘋

地龍 上條 麝香 七分 葱頭 七箇 黃梔子 七箇 雞宗青 七箇 生薑

一兩 飛羅麩 一兩 右藥椿爛和勻烘熱以絹帕縛於腹上過三

日見有青筋照方脩藥再縛三日無青則愈重者不過三服卽

可除根永不復發

傷寒諸症

無論陰陽虛實一切等症用 潔白糖 五錢 陰症葱薑湯調

下 陽症白滾湯調下 暑症或中熱中暈 喝暑熱也太陽

經中熱爲暈其症汗出惡寒身熱而渴新汲水下 虛症米湯

下 實症陳皮湯下 傷食山查湯下 結胸症淡鹽湯下

蛔厥症烏梅湯下 緊痧腹痛新汲水下 婦人血崩鍋臍煤

發散傷寒

湯下

不問陰陽二症倉卒無藥 生薑一兩 葱白十莖 好酒二大碗

煎一碗熱服蓋被周身汗透即解勿令太過忌大葷五七日春

秋依此方夏月葱薑減半冬月加黑豆二合炒煎服尤效

又生薑五片 葱白四莖 紫蘇葉三錢無此味細茶代 泡湯熱服

陳香糟六兩 生薑四兩 水菖蒲根四兩 鹽二兩 共搗勻炒熟為

餅敷胸前痛處以火熨之內響即去如口渴任喫茶水待大便

利下惡物即愈

陰症傷寒

葱八兩 麥麩一斤 鹽一斤 乾薑四兩 共炒熟用青絹或布包熨

臍上稍冷再炒熱熨以手足俱煖有脉為度

又七月七日採絲瓜葉陰乾為末每服一錢酒下即生

如手足紫黑者 黑料豆三合 炒熟好酒煎服加葱鬚同滾更

妙此方甚效 如腹痛面青甚者 鴿子糞一大 研末極細熱

酒沖薰覆被汗出即愈或服少許

傷寒狂走

雞子殼出過小雞者泡湯服即睡

時疫傷寒狂燥  
喉管傷寒

凡時疫傷寒舌黃煩燥狂言發熱 吞生雞子一枚即時清爽  
凡喉中作癢難過不可喫茶酒湯水將薄荷二分麝香一分作極  
細末飲入喉中待其氣通吐出涎水碗許然後喫陳黃米湯半

吐法

茶杯即愈若不知者竟喫茶酒等項便不可救  
此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或食氣逆不通  
等症皆可以此吐之 蘿苳子搗碎以溫湯和攪取清汁徐徐  
飲之少頃即吐即有吐不盡者

亦必從  
下行矣

吐除痰積

凡邪實上焦及痰涎積蓄吐之宜此

甜瓜蒂不拘多少微炒為細末每服一二錢蘘汁調服 膝痛加全

蝎頭痛加鬱金服此自吐 又瓜蒂一錢好茶一錢為末每

服二錢蘘汁調服

發汗方

乾薑 黃丹 枯礬 胡椒各三共為末用滴燒酒為丸一服

分作二丸男左女右置手心上按會陰穴片時即出汗足心有

汗方止去藥凡一切病不能發汗者皆可用此方會陰穴在穀

道前腎囊後正中間即是

法  
霍傷寒結胸

凡病傷寒結胸其有中氣虛弱不堪攻擊內消者須以此法外霍  
之則滯行邪散其效如神 葱白頭 生薑 生蘿蔔此味加無

似子

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗一處炒熟用手巾或

白布包作大餅罨胸前脹痛處此藥須分二包冷則輪換罨之

無不即時開通汗出而愈不宜太熱 又法 大蒜一二十頭

搗爛攤厚紙或薄絹上貼於脹處少頃即散用治一切脹痛無

不神妙

薑熨法

治傷寒胸膈不寬作痛一切寒結熱結痰結痞結水結等症

生薑搗爛去汁將渣炒熱絹包漸漸揉熨心胸膈下其痛豁然

自開如薑冷再添炒熱再熨如熱結微炒 如大小便結熨臍

腹 又華陀救卒病方用葱白炒熱熨臍再以葱白三寸研爛

用酒煎灌之陽氣即回兼治陽脫

傷寒

凡傷寒五六日發黃急將

麻油半盞和水半盞入雞子清一枚

攪勻服之神效

凡傷寒并一切雜症嘔噦手足逆冷

橘紅

一兩生薑

一兩

水二碗煎八分徐徐嚥下即愈

感冒

凡風熱發癢起斑塊 防風 荆芥 黃芩 連翹 各一錢 甘草

五分 升麻 四分 木通 六分 枳壳 八分 桔梗 七分 水煎服

風疹塊 白雞冠花煎水洗

神白散

治感冒一切風寒 白芷一兩 甘草五錢 淡豆豉 生薑三片

葱白三筒 煎服取汗

天中藥茶

治男婦小兒感冒一切時症神效 細陳茶 一斤 武夷 加後藥末

於五月五日午時配合其應如響 石菖蒲 一兩 羌活 陳皮

川芎 北細辛 麥芽 炒 生吳黃 生甘草 乾薑 不炒 各

生枳實 五錢 蘇葉 四兩 上硃砂 一兩 明雄黃 一兩 另以上茶藥

和勻曬乾日中噴上好火酒待滋潤拌之又拌入硃砂雄黃末

再噴火酒再拌再噴當大日中晒乾如無日色即以火微微烘

乾用磁罐收貯勿令洩氣遇患者無論時刻即秤三錢用沸湯

泡少刻候藥味出連服二三次有汗即止無汗即出蛇咬取汗

亦妙

解毒辟瘟丹

此方不論四時感冒風寒頭痛發熱并瘟疫山嵐瘴氣等症用此

解散神效有力者宜修合濟人甚效 蒼木 十兩 厚朴 四兩 薑

陳皮 三兩 炙草 二兩 蘇葉 六兩 藿香 四兩 羌活 六兩 防風 六兩

北細辛 四兩 川芎 四兩 白芷 三兩 石羔 五兩 山查肉 四兩 麥芽

炒四枳壳 兩 炒二黃芩 六兩 升麻 三兩 黑山梔 三兩 神麩 八兩

共為細末神麩打糊為丸彈子大每服薑葱煎湯下或丸如梧子大亦可

### 救苦丹

治傷寒感冒頭疼口渴身熱目脹筋骨酸痛一切風寒之症

居家出門俱不可少 紫蘇葉 四兩 羌活 四兩 川芎 二兩 生草

一兩 黃芩 一兩 防風 二兩 白芷 二兩 生地 二兩 北細辛 一兩 南

蒼木 二兩 陳皮 二兩 葛根 四兩 香附 三兩 加厚樸 二兩 麥芽 一

錢枳壳 五錢 共為細末生薑汁打麩糊為丸桐子大每服三錢

### 寸金丹

治一切感冒惡心嘔吐泄瀉傷食發熱一切雜症 如遇瘟疫用

此甚效 烏藥 防風 羌活 前胡 白芷 川芎 製半

真薑 赤茯苓 砂仁 炒以上 枳殼 炒五 炙草 一兩 白蔻仁 炒二

草果仁 淨 厚樸 薑汁 木香 紫蘇 薄荷 蒼木 香附 炒



太乙紫金錠

藿香葉 陳皮以上各三兩 共為細末用神麩二十二兩研末用薑汁打糊和藥為錠每錠重一二錢陰乾用硃砂水飛為衣薑湯化下

解諸毒瘵諸瘡利關竅通治百病此藥真能起死回生製之濟人奇效不可盡述凡居家出入與大王及閩廣雲貴仕宦者俱

宜備帶

山茨菇

先去毛皮焙二兩

川文蛤

一名五倍子地破淨焙二兩

麝香

揀淨毛皮乾研末三錢

金子

一名續隨子白者去油一兩

硃砂

有神氣者研極細末三錢

玄黃

鮮紅大塊者研極細三錢

大戟

一兩

以上諸藥各擇精品於淨室中炮製畢候端午七夕重陽或天德天醫月德黃道上吉之辰淨室修合數日前并宜齋沐將煎藥六味復秤準入於大乳鉢內再研數百轉方入細石臼中漸加糯米濃飲調和燦濕得中方用杵搗千餘下至光潤為度每錠重一錢病勢重者連服二錠以取通利後用溫粥補之修合時除合藥潔淨之人餘皆忌見總要虔誠潔淨方效

身館新編 卷四  
治一切飲食藥毒蟲毒瘴氣及喫自死牛馬猪羊六畜等肉惡菌腫毒人悞食之必昏亂卒倒或生異症并用凉水磨服

治南方山嵐瘴氣烟霧疫癘最能傷人纔覺意思不快憎寒惡熱欲嘔不嘔即用凉水磨服

治癰疽發背對口疔瘡大泡無名腫毒蛙節紅絲等疔及楊梅結毒諸惡瘡諸風癢疹新久痔瘡赤腫未破時並用無灰淡酒磨服外用凉水磨塗患處日夜數次覺癢立消出膿血者亦可減少

治陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈痞塞邪毒未出瘟疫煩亂發狂喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服

治赤白痢疾肚腹泄瀉急痛霍亂絞腸痧及痰喘等症並用薑湯磨服

治心氣痛及諸般氣痛用無灰酒或薑湯磨服

治男婦急中顛邪喝叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼魘失心狂亂羊猪顛風俱用石菖蒲煎湯磨服

一治中風中氣口眼歪邪牙關緊急言語蹇澁胸脈攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱難諸癰等症並用酒磨燉熟服之

一治一切惡蛇瘋犬毒蛇溪澗諸毒等蟲傷人隨即發腫攻注遍身毒氣入裏昏悶喊叫命在須臾俱用酒磨灌下並塗患處再飲葱湯一碗蓋破出汗立甦

一治新久瘡疾臨發時取東流水煎桃柳枝湯磨服

一治小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫瘡疔牙關緊閉並用薄荷浸水磨濃加蜜調服仍磨擦患處

一治牙痛水磨塗痛處再含少許良久嚥下

一治小兒因父母遺毒生下百日內皮場及穀道眼眶俱損爛者用清水磨服

一治打撲損傷用松節炒沖入無灰酒磨服

一治湯火傷用東流水磨塗傷處

一治年深月久頭脹頭疼太陽痛偏正頭風及時病愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒磨服仍磨塗太陽穴上

治婦女經水不通紅花湯磨服

治傳尸癆瘵諸藥不能見效涼水磨或檀香湯磨服

遇天行疫症延街及巷遍染者用桃根煎水磨濃抹入鼻孔次

服少許任入病家再不沾染

服此丹大人用一錢虛弱者減半小兒未及週歲者每服半分

或一分一二歲者服二三分服後吐利方效勢重者連服二錢

以取通利方用溫粥補之孕婦忌服

### 菩提萬應丸

治夏秋一切時症中暑霍亂瘧痢等症輕者一服重者二服神效

有力者修合濟人陰功不淺

陳皮 厚樸

薑汁製

蒼朮

製半夏 製香附

柴胡 薄荷

黃芩

枳殼

各一兩

山查 麥芽

神麩

砂仁 各二兩 甘草

藿香

各五錢

用乾荷葉煎湯拌前藥曬乾為

末蜜丸彈子大每丸重一錢隨引服之 一切感冒及瘟疫時

時症頭疼骨痛咳嗽痰喘用生薑葱白煎湯調服 中暑用香

薤煎湯調服

紅白痢用車前子煎湯調服

泄瀉用薑茶湯

調服 水瀉小

便不通口渴淡竹葉燈心煎湯調服

久瀉不

止糯米飲調服多服自效 瘧疾用薑湯調服久瘧必用人參

湯 霍亂吐瀉用胡椒七粒菴豆四十九粒煎湯調服 心胃

痛用檳榔煎湯調服 黃疸用茵陳湯調服多服方效

其餘山嵐瘴氣水土不服並胸膈飽悶宿食不消一切雜症或

在路途無引俱用清茶或開水調服孕婦忌服

疫病初起

凡疫病初起一兩日頭痛身熱骨節痛 川芎十兩 紫蘇一斤 陳

皮十兩 茯苓十兩 甘草十兩 乾葛兩 製半夏十兩 柴胡二十

枳殼十兩 桔梗十兩 香附十兩 共為末每用兩許薑葱湯下衣

覆取汗如冬月加白芷麻黃各八兩 如兼飲食停滯嘔吐無

汗等症及山嵐瘴氣雨溼蒸氣或中寒腹痛吐痢中暑冒風吐

瀉不服水土 藿香兩 蒼朮一斤 厚樸一斤 陳皮一斤 製半

夏一斤 茯苓一斤 白芷一斤 桔梗一斤 紫蘇一斤 大腹皮一斤

甘草十兩 共為末每服一兩薑湯下此名藿香正氣散

凡三四日得汗後未解眼眶痛或寒熱往來口苦嘔吐 黃芩

柴胡 半夏 人參 甘草 乾葛 茯苓 陳皮 芍藥

各等分薑三片棗一枚水煎服

凡三四日後熱盛大便秘不通 薄荷一兩 黃芩一兩 連翹一兩 石

膏一兩 滑石七錢 川芎一兩 麻黃八錢 桔梗一兩 甘草一兩 樸

硝五錢 荆芥一兩 防風二兩 當歸二兩 芍藥一兩 梔子一兩 白

朮五錢兩 大黃審病加減 共為粗末每用一兩五錢再量病虛實加減

白滾湯下煎服亦可

### 天行時氣

甜瓜蒂丁香赤小豆各四十枚 為末和井華水服之然後取赤大

豆作末分吹兩鼻中須臾取汗黃色如蘖及出黃蟲或痢或吐

皆愈

### 時行瘟疫瘴

凡時行瘟疫山嵐瘴氣感冒風寒乍冷乍熱胸膈膨脹不思飲食

氣

週身骨痛頭痛發燒傷食嘔吐瀉痢不止神效甘露茶方 厚

樸 防風 陳皮 蒼朮 神麩 山查 穀芽 台烏 各

等分為粗末每劑一錢加陳武彝茶一錢同煎作茶飲不拘大

小男女俱可服孕婦切忌

### 休瘧飲

此止瘧最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質

而瘡有不能止者俱宜用此此化暴善後之第一方也其有他

證加減俱宜如法 人參 白朮炒 當歸各三錢 何首烏製五錢 炙

甘草八分 水一鍾半煎七分食遠服渣再煎或用陰陽水各一

鍾煎一鍾俱露一宿次早服一鍾飯後食遠再服一鍾 如陽

虛多寒宜溫中散寒者加乾薑肉桂之類甚者或加製附子

如陰虛多熱煩渴喜冷宜滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者

加知母或加黃芩 如腎陰不足水不制火虛煩虛餒腰痠腳

軟或脾虛痞悶者加熟地枸杞山藥杜仲之類以滋脾胃之真

陰 如邪有未淨而留連難愈者於此方加柴胡麻黃細辛紫

蘇之屬自無不可 如氣血多滯者或用紹酒水各鍾煎服或

服藥後飲酒數杯亦可

### 寒熱怪症

凡寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鍾日漸黃瘦

菜菔木香等分煎水服效

### 瘡後怪症

凡口鼻中氣出盤旋不散凝如墨蓋十日漸至肩與肉相連堅勝

金石無由飲食 澤瀉煎汁日飲三次五日效

截瘧

凡邪散已透而血氣微虛者宜此截瘧大效 牛膝二錢 當歸

陳皮各三錢 用好紹酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分

溫服

凡氣血俱虛久瘧不止或急欲取效者宜此主之如神 何首烏

白三錢以至一兩隨輕重用之 當歸二錢 人參三五錢或一兩隨宜 陳皮二三錢大虛者不必用 薑

者用三五錢 水二鍾煎八分於發前二三時溫服之若善飲

者以酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不必用酒

凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止者用此截之甚佳已經屢驗

何首烏兩製一 當歸 甘草 半夏 青皮 陳皮 柴胡各三錢

用井水河水名一鍾煎一鍾渣亦如之同露一宿次早溫

服一鍾飯後食遠再服一鍾

凡瘧疾形實氣強多溼多痰者宜此截之大效 半夏 青皮各五錢

木賊 厚樸各三錢 白蒼木 檳榔各一錢 用陳酒二鍾煎八

分露一宿於未發之先二時溫服

陰毒傷寒

凡房後受寒面青身冷頭疼腹痛手足厥逆脈息沈細 大附子



傷寒壞症

三枚炮裂去皮臍為末每服三錢薑汁半盞冷酒沖半盞下

凡傷寒時疫不問陰陽老幼妊婦誤服藥餌因重垂死脈息沈伏不省人事七日以後皆可服之百不失一人參一兩如無用黨

參水二鍾緊火

煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有

汗出脈復立瘥

一切傷寒

不問陰陽輕重老少男女孕婦皆可服 白芷一兩 生甘草五錢

薑三片 葱白三寸 棗一枚 豉五十粒 水二碗煎服取汗不汗再服

病至半月未得汗者皆可服如煎藥時得黃色無不愈者煎時

要至誠忌婦女雞犬見此方又治一切風邪

瘧疾不已

凡二三十日不止者用人參三分如無用參鬚煎服立愈

天行發斑

凡赤黑色者青木香一兩 水二升煮一升服

夾色傷暑

生鹽炒黃以青布包熨小腹鹽冷換之熨好為度

傷寒夾色

生薑三錢芝蔴半合炒熟葱白三根細茶二錢研爛好酒半斤

同煎至四兩濾去渣熱服將被蓋睡係夾食自吐出有寒汗自

發出如中陰者即回陽

傷寒初起

急取梨葉十餘塊搗極爛煖熱燒酒沖入和勻以布隔渣取酒飲之用被蓋睡俟汗出抹去自愈

傷寒妙方

陳皮八分防風一分白芷一分川芎二分蘇葉一分枳實一分

甘草一分加黑棗二枚生薑三片水一鍾煎至七分服

傷寒漏底

生枇杷葉一塊生薑二片尖檳榔二片白紫蘇梗二寸水楊梅

葶三條細茶一撮用水一鍾和各藥飯上蒸熟取水飲之神效

夾色傷寒

多用雞蛋煮熟以銀器剖作兩片乘熱貼臍蛋黑換之貼至蛋

不黑而止

夾食傷寒

葛根六錢煎汁磨三角尖磁器片頻服宿食盡吐自然發汗而愈

凡傷寒大小便秘結菹菜葉煎湯服一碗效

煩燥熱極吞生雞子一兩箇效

傷寒發狂

五六日後忽發黃色用麻油半杯入雞蛋白一枚和勻服效

傷寒發黃

生南星 生半夏 辣椒子 羌活 獨活 蒼朮等分共研

風寒溼痛

末加酒炒熱敷至起腫而愈

急救解壽附

凡自刎自縊凍死溺死及服毒等症事關人命人多畏懼不敢不知律書未載洗冤錄一卷及他書方藥原示人救治之法今悉敘載入以便檢閱有定識者依此出力救之功莫大焉善莫比焉

救縊死法

凡縊從早至夜雖僵定猶可救從夜至早稍難若心口溫者一日以上大可救治不可割斷繩索緩緩抱解將屍安放平用虛頭要扶正先將手足慢慢灣曲然後將大小便用棉軟物塞緊不令泄氣令一人坐於頭前以腳踏其肩以手提其髮不可使頭下垂直令喉頸通順再用二人將細筆管入耳內不住吹氣不住手揉按胸腹摩擦臂足再一人以己口對縊人之口輕輕呼吸其氣如此一飯間即氣從口出眼開甦醒後用官桂湯方煎湯及清粥湯灌之令潤咽喉無不活者但不可先將茶水灌之活雞冠血滴入喉鼻之中男左女右男用雄雞女用母雞頃刻甦醒

又方

又方

官桂湯方

真山羊血三分研末用好紹酒三盃溫灌下立活

製半夏壹錢厚樸壹錢官桂五分乾薑五分生甘草五分廣皮五分

八分 水煎服

通關散方

北細辛五分猪牙皂五分生半夏五分麝香一分共為極細末

救溺死法

將瓦瓶收貯噓鼻如前方救治再將其兩手大指拇並排平正以小帶縛定於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用陳艾揉透火灸三七壯即活凡無故中邪而縊者以多灸為要凡溺即令人撈起急將口撬開橫嘯筋一隻使可出水以竹管吹其兩耳研生半夏末吹入其鼻孔皂角末置管中吹入穀道如係夏月將溺人肚皮覆牛背上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然從口中并大小便流出再用生薑湯化蘇合丸灌下或生薑汁灌之若無牛則用大鍋覆寬橙上將溺人肚臍覆對鍋底兩人擡橙搖動亦可出水如係冬月急將濕衣解去為之更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取灶內初煨草灰多多鋪於被褥之上將溺人覆臥於上以棉枕一個墊臍

下再以草灰渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰墜於眼內其撬口啣筋灌蘇合丸薑湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法甦醒後冬天宜少飲溫熱紹酒夏天宜少飲粥湯按灰性燥而能拔水凡蠅溺水死者以灰埋之少頃卽活此明驗也

又方

用通關散頻頻吹入鼻孔內有嚏可生

又方

用好陳醋灌鼻中綿裹石灰納下竅水卽出

又法

先打壁泥一堵置地上以溺人仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣踰入泥間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救

又法

凡溺人倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟合見火但一近火則必大笑凍死者亦然以酒罈一個燒紙片一把放罈內急以罈口覆臍上冷卽再燒紙片入罈覆臍去水卽活以上俱見洗冤錄集解

又方

凡墮水凍死者尙有微氣勿以火炙用布袋盛熱草灰放在心頭冷卽換待眼開以溫熱紹酒灌之

救天寒凍死

以熱炭灰盛布袋溫其心口冷即換之俟目開為度再以紹酒及溫粥湯灌之漸活再用生薑三錢水煎溫服

又法

用鹽或草薦捲之以索繫定放平坦處令二人相對推踏令滾轉往來如打鹽法俟四肢溫即活

又方

用生半夏二錢研極細末吹入耳鼻內凡縊死溺死壓死凡凍死溺死者飲湯酒切忌太熱恐傷齒盡落死心頭溫者皆可治

救中惡猝死

凡中惡客忤猝死者或先病及睡臥間忽然而絕或猝然撲地及一切痰壅手足搐扯皆是 用葦菜心黃於男左女右鼻內刺

入六七寸令目開血出即活或蒜頭搗汁或葦菜搗汁灌鼻亦可此症切忌以白湯水灌之蓋湯入則痰涎永繫心絡致生他疾

又方

用皂角末或生半夏末如豆大各吹兩鼻中或用生半夏五錢

生薑汁一杯調灌之即愈凡產婦益癡癡撲

又法

視上唇內沿有如粟米粒形者以銀針挑破取出血即活 令人尿其面即甦此扁鵲法也

又法

燒炭一爐以陳醋撥炭上使患者鼻中得聞醋氣即活須提其

兩手勿令驚或灌醋於鼻中亦可

救驚斃

以醇紹酒二杯溫灌之即醒

救夜臥斃死

勿用火照急取樛塵納鼻中或用皂角末吹兩耳取嚏再用好

紹酒調蘇合丸灌之即醒 鍋底黑水灌二錢并吹鼻

又法

於黑中痛咬其足跟及足大姆指頻頻輕呼其名及唾其面再

灌以生薑汁湯必活

又法

凡斃死兩足大姆指向上生毛處用陳艾揉棉如黃豆大以火炙

三七壯即活 洗冤錄註

救卒中邪魔

用雄黃末吹鼻中即愈

多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣沖心胸不即治殺

人搗墨水和服二錢或用菖蒲汁含之立止

救客忤中惡

凡中忤中惡鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驀然倒地厥冷掘

拳口鼻出清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖勿移動

令人圍繞燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候醒乃漸

移動用犀角五錢麝香二錢五分硃砂二錢五分研極細末以開水調服

一錢即效

救服鹽瀉

用活金魚二尾搗爛以熱開水沖調徐徐灌下取吐即生如勢重危急者以活雞或活鴨兩三隻斷去頭將頸塞於口中以熱

血灌下可解多有得生者

又方

以雞蛋一二十個攪散入生大黃末五錢攪勻徐徐灌下能利瀉即愈或用肥皂搗極爛清水調灌一吐即愈

又方

將常用抹桌布搓出濁水灌之使吐吐出即安但切不可用熱水洗冤錄註或用生豆腐漿灌吐自安

救煤毒暈倒

急移於風涼處用鹽菜水灌之即愈如無菜水則以現汲井水灌之或蘿蔔搗汁灌口鼻效

救烟火薰死

白蘿蔔搗汁灌之立醒如無則用葉乾者水泡透搗汁亦治凡人奄奄死去脉動無氣氣閉不通名謂尸厥將菖蒲末納入耳

救男婦尸厥

鼻孔中再用真猓桂末四分放舌下或刺取本人左角髮方寸燒灰研末過細篩和熱酒灌之立愈



救蠱毒及金

蠶毒

救服砒毒

先以白礬末令嚙之不澀反覺味甘次再食黑豆又不腥乃中  
毒也即濃煎石榴皮根湯飲之吐出活盡自愈

凡服砒未久者用雞蛋一二十個打入碗中攪勻入明礬末三錢

徐徐灌下吐則再灌以吐盡為止如服砒已久不能吐者急用

黑鉛一塊約重四兩用井水於石上磨出黑汁隨磨隨灌候吐

盡砒毒方無後患

用熱豆腐漿灌之或熱鴨血亦解

又方

用榆樹根皮內蛀末井水調服三錢神效或生甘草汁同藍靛

汁和勻調服或用生菜豆五合搗粉取新汲水打和絞汁飲之

救中水銀毒

救中鉛粉毒

亦效  
以炭末屑煎汁飲即解

以麻油調蜂蜜如餵糖與食即解或用沙糖調水服或搗蘿蔔

汁飲之亦愈

救誤吞鐵釘

救中一切藥

用桴炭皮半碗研末乾粥三碗即愈

飲糞清立解取則中宿糞布包濾汁最效食穉欲取亦便統解諸毒他藥不及若症勢危急最宜飲此惡死甚於

毒及飲食毒

惡穢也

救誤吞金銀

胸膈痛甚 用羊脛骨煨末每服三錢米湯調下立從大便出

中黃金毒者食鷓鴣肉解之 中白銀毒者以黃連三錢甘草

一兩解之 洗冤錄詳註 或用葱白煮汁飲之 或輕者用真

金從大便出 輕粉即效 或升麻八分麻仁一兩煎湯灌一二服

將陳年大麥去芒刺炒研成粉用黃糖少許拌食一日三次每

服一盞三四日即解下只可吃飯粥不可喫湯水或飲生鴨熱

血或多食核桃俱化 凡喫吞五金以 糖半觔啖之

腸胃漸爛延日垂死 以飴糖四兩熬作丸不時用好麻油送

下服完再合須服至百日外無患

服黃泥水一二碗即愈

多食葶薺核桃自化 小兒易吞銅 錢此方最效

用燒透樨炭帶紅研極細末以沙糖調服二三錢立愈或多用

砂仁煎濃汁服即從大便解出 亦治 吞銅

生取蝦蟆眼一枚木通數錢煎湯熬吞下針尖自穿蝦蟆眼內

救誤吞針

救誤吞銅器

救誤吞鐵物

又方

救誤食銀硝

又方

又方

救誤吞竹木

屑及芒刺

救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服木鱉

子

救誤服一切

笑草毒 磨艾菰

諸草藥毒 閉

口椒毒 斷腸

救誤吞鐵骨

從大便出

或用鹽蛋一個 甚菜一把 箸灸不切 斷食之 即裹針從大便下

用半生半熟出芽蠶豆搗極爛用葦菜汁和丸吞之自下

搶喉不下 用鐵斧於石上磨水隨卽灌之卽下或取鵝涎飲

之亦效 或用芝蔴炒研末滾水調服

剝新木炭皮研末和粥多食炭屑裊針自大便下

其症口乾兩臉赤五心熱下利不止 以菴豆濃煎湯冷服卽

愈 或芭蕉葉搗汁飲之利止卽安切忌熱湯

凡雄黃硃砂見安皆毒 以漢防已煎湯飲之

發抖欲死 急以肉桂二錢煎服立愈或用香油一兩白糖一

兩和勻灌之亦治

俱飲以地漿水立愈 其法於淨土地上掘三尺深以水傾注

攪成泥水謂之地漿取半清半濁者飲之所謂洗盡腹中毒全

憑地上漿愈後永戒食鱧魚 水銀毒亦解

腸中不能轉送覺重墜者 多食葶菜猪油自出

鐵腳威靈仙沙糖和水煎一口吞下去鐵見軟如棉

救中悶香蒙

飲冷水即解 臥室內夜間貯清水一盆不受此患或甘草水

汗毒

之均

救中麵毒

飲生蘿葡汁立解或用生蒜搗爛和醋食亦解

救中鈎吻毒

即野葛其葉有毛生池旁形似芹菜誤食殺人 急用薺芎八兩水六升煮至二升分兩次溫服即解薺芎一名空沙參即胡

救中藥毒鳩

其人雖死心胸尚溫皆可治 用菘豆粉三合井水調灌即解

毒

或扁豆為末溫水下 或葛粉水調服 或用犀角磨水飲之

救中諸藥毒

煩悶欲死 俱用葛根煎濃汁服無患

救中飲食毒

飲饌中毒倉卒不知何物 急以生甘草八錢薺芎八錢煎湯

飲之入口即活此症覺腹中不快以生黃豆試之口嚼不聞腥

氣者是 心煩悶者苦參煮汁飲之吐出即止

救中野薑靈

心疼胸脹腸瀉腹痛欲死 急取黃泥漿灌之或橄欖搗為泥

芝毒

食之或生甘草汁磨紫金錠調服即解

又方

用淨銀花籐葉煎濃汁飲之鮮者更妙

救中六畜毒

取伏龍肝四錢研末水調服得吐即解

救中各肉日死毒

救中牛馬肉

毒

救中瘟牛肉毒

救中瘟馬肉毒

救中瘟猪肉毒

救中河鮑魚

毒

又方

救中鱧魚毒

救中魚鱉毒

救中仙鶴血

毒

用黃柏末一匙入肉食之即解

用生甘草一兩煎湯飲一二大碗或煎紹酒服亦可取吐或瀉

即解倘口乾決不可飲水飲之即死

早稻草煎湯服之立醒

蘆根搗汁或紹酒煎服即解並煎洗浴

猪骨燒灰調服即愈

此魚毒在肝血脂子并眼其肝人口爛舌人腹爛腸脂令舌糜

子令腹脹眼令目花昏急以糞汁灌之或飲麻油吐之即愈

梅花腦子為末水調服五倍子白礬等分為末水調服

用橄欖汁煎湯服或用槐花炒黃與乾胭脂等分水調灌之亦

效

用生蠟食即解如無服地漿水亦解切忌服荆芥

以靛汁一碗陳皮二三錢煎湯候極冷服之即解

其鶴或傍樹枝或臥叢草將頭搔痒遺有頂血毒粘在樹草間

人以手摸腳踏登時赤腫疼痛異常急以青松毛和糯米飯

救中蟹毒

同搗敷之無不立愈

救中團魚毒

以生薑汁搗飲解之或紫蘇黑豆煎服亦解或靛青汁冬瓜汁藕汁均解乾蒜煮汁服之亦解

卽驚也螫腹下隱隱有蛇皮之狀其色大紅乃毒蛇化也悞食之必腹痛欲死手足發青而亡是毒氣攻腸也 急用白茯苓

五錢 白芷三錢 雄黃三錢 丹砂一錢 山查一錢 枳實一錢 水煎

救誤食馬蝗

服痛止再服二劑毒消自解或靛青水加食鹽飲之亦解或悶或脹且痒且痛者是也 用田中泥或山中黃泥水調飲之卽瘥

救蝎螫毒

取井底泥敷之乾則再換或以明礬爲末水蘸擦

救中諸魚毒

冬瓜仁或橘皮煎湯服卽解 黑豆煮汁服之亦解

救食雞蛋

飲醋卽解

救食鴨蛋

飲糯米泔水一盞立消

救服斑蝥毒

腹痛吐逆不止用菘豆或黑豆煎水服

救自服諸毒

麻油和雞蛋灌之

救中酒毒

經日不醒 用黑豆一升煮汁乘温灌三盞即醒而愈即愈

救中燒酒醉死

急用生蝶滴水灌之或取井底泥罨心膈以新汲井水浸其髮

再以青布浸濕貼胸膈上温則可換仍時時以清冷水少少灌

之白醒 或用菜豆粉盪皮多食即解

用鍋蓋上氣流水半盞灌下即醒

又方 救中生鴉片毒

南瓜脂漿灌之即解夏月南瓜籐盛時肥梗中間剪斷有脂漿

流出收貯磁瓶內隨時可以救此患也或用活金魚一個鴉片

效 又阿魏一兩水 開灌盡吐即愈

救中白菓毒

凡中此毒者驟然一喊即暈去儼若驚狀 用白鯨頭煎湯灌之

三四次即醒或用白菓殼煎水服亦解

劣馬咬傷方

絞馬糞汁服之并以洗瘡愈

狗狗咬傷

急於無風處以冷水洗淨即服菲汁一盃隔七日又一盃四十

九日共服七盃百日內忌食酸鹹一年內忌魚腥終身忌食狗

肉方得保全否則十有九死凡遇惡犬咬傷倉猝無藥急以百

之牛糞蚊蚯蚓糞敷之 之口嚼杏仁爛敷之

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺螫人

活蝨入腹

誤吞銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠱毒

中蠱吐血

中蠱下血

中百藥毒

中丹藥毒

能殺人白礬塗良

醋磨生鐵敷之

醋磨附子敷之

之立止

敗梳篦一枚分為二段以一段燒研末一段用水五升煮取一

升調服即下出又治又治醫蝨成癩

取飴糖一觔漸漸食盡便出誤吞竹木亦可治

舊象牙梳屑磨水服之可出

刮舊象牙梳屑和水敷之立愈

真雄黃研末冷酒服凡以藥汁解毒皆不可熱飲冷服乃效

生甘草五錢以水濃煎燉服吐痰即愈

小麥麩一合冷水調分兩服半日當下

蝟皮燒灰細研熟水調服二錢

橫紋甘草截成小段麻油煎過常嚼久而取效

淡竹葉濃煎服之

蜘蛛咬亦可治 刺雞冠血塗之 或頭垢擦

或嚼小蒜塗之 或頭髮燒爛燻之

又雞蛋輕敲小孔合



中諸菜毒 甘草胡粉具以等分爲末水服

誤中瓜毒 服瓜皮湯良

中野菌毒 笑者防風剉碎水煎冷灌立愈

中柑毒 服柑皮湯愈

中梨毒 服梨葉湯愈

中馬肉毒 服蘆根汁良

中馬肝毒 狗糞調酒服

中狗肉毒 杏仁三兩連皮研熱湯調溫服三盞吐出愈

中猪肉毒 猪糞不拘多少燒末水調下三服愈

中鴨肉毒 糯米泔溫服一中盞愈

解砒石毒 麻油一盃灌之 或用白芷末井水服二錢 或用菘豆粉一

兩銀硃一錢 雞蛋白一個 麻油半鍾 冷水二鍾 服下即連砒吐

出

誤食桐油 服甘草汁愈 或用乾柿餅食之即解

中瘴氣 犀角雄黃麝香羚羊角俱可治

中邪氣

中飛絲毒

生漆惹人

尸疰中惡

惡疰腹痛

暗風猝倒

水溺猝死

人落水死

墮水凍死

中挑生毒

入腹升麻犀角麝干等分為末水調服

嚼蘇葉愈

成毒生椒葉煎湯洗

近死尸惡氣入腹終身不愈用阿魏三兩每用二錢拌麪包作

餛飩十餘枚煮熟食之日三服至三七日永除忌五辛油物

不可忍者呵魏末熱酒服三錢

不省人事細辛末吹鼻中

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下部須與出水乃活

裹石灰納下部中水出盡即活

只有微氣者勿以火炙用布袋盛熱灰放在心頭冷即換待眼

開以溫酒飲之

凡喫魚肉瓜果皆可挑生初中毒覺胸腹稍痛明日漸加攪刺滿

十日則物生能動躍騰上則胸痛沉下則腹痛脇下忽腫起如

癰癤狀頃刻間大如椀以菘豆嚼試若香甜即是搗小升麻

為末取冷熱水調二大盞連服之洞下瀉出生葱數莖根鬚皆

具瘧卽消續煎平胃散飲之日食白粥卽愈 在上膈者卽前

云胸痛是也用熱茶一甌投膽礬五分於茶中候礬化盡通口

呷服良久再以雞翎探喉中卽吐出 在下膈者卽前云腹痛

是也用米飲下鬱金末二錢卽瀉下其毒次用人參白朮各五

錢爲末用無灰酒納瓶內慢火熬半日度酒熟溫服之每日一

盞五日乃止然後飲食如故

用麝香一分置口內卽醒

用熱豆腐切細片徧身貼之冷卽換甦醒乃止心頭熱者可治

烏梅肉焙一兩砂糖五錢用水一茶杯煎七分呷之

凡受煤烟氣一時昏倒急宜用清涼水灌之卽醒

萵苣菜搗汁飲之立解

急以磁瓦有鋒者或刺額上或刺眉叢或刺兩臂臑立出血一

升卽解血紅而多者輕血紫而少者重 避瘴氣神效方用白

朮陳皮茯苓半夏黃芩梔仁山查神曲各一錢連喬前胡蒼朮

各七分生甘草四分生薑引煎服多劑凡遊宦不服水土者並

飲酒醉死  
燒酒醉死  
解硫磺毒  
解煤炭毒  
解食沙蟲毒  
解瘴癘毒

解百蠱毒

效

芝蔴油多飲取吐 或黑豆為末入酒絞汁服半碗亦效 或

白鴨血熱飲之

過食雞蛋滯

宜飲好醋少許即消

鐵針入肉

烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服一二錢

治虎咬傷

用薤白搗汁飲之渣并塗之 虎爪傷用地蚕搗爛塗之

狼虎熊傷

潰爛血流痛不可當先用葱湯洗再用清油洗又飲清油一碗

用麻油和白礬納傷口中外用冬瓜瓢蓋頻換

諸蛇咬傷

用好醋先飲一二盃以繩紮傷處兩頭再用五靈脂五錢雄黃

二錢五分共為末酒調二錢灌之少時咬處出黃水水盡則腫

消後以雄黃末糝之口合自愈 或生薑搗爛敷之乾再換

或用燒酒淋洗去毒用人糞厚封即消

拔蛇牙方

凡蛇咬必有一齒脫在傷處以致腫爛用燈心燒灰糝之即出

毒蛇咬傷

急於傷處上下用布綑扎使毒不走即浸小便洗出蛇牙取床

帳中臭蟲入口嚼碎吞之並敷傷口或急飲好醋二碗或麻油亦

可隨將傷處緊紮兩頭以熱小便洗淨次用白芷為末麥冬湯調服或五錢或一兩頃刻黃水出盡卻以渣敷患處雖將死者亦活 或用細辛白芷各三錢雄黃五分研末每服一錢酒送下外用白芷熬水洗

蛇人人口

凡因畏熱貪涼臥於地下有蛇入口不能出者用刀破蛇尾生椒

二粒裏之須臾即退出

獸蛇咬傷

凡一切惡獸毒蛇咬傷毒中人腹眼黑口噤手足強直 白礬二

錢生甘草二錢研末和勻每服二錢冷水調下更以此末香油調敷傷處

鼠咬

貓毛燒存性入麝香少許香油調敷 又乾荔枝肉嚼爛敷患處效

多腳蟲傷

雞屎塗之 或八角擦即愈 甚者取活公雞血熱飲之雞頭燒灰

加明礬雄黃醋和搽之

壁虎咬

柿漆水塗之 壁虎入耳雞冠血滴入即出

蜘蛛叮

生芝蔴嚼爛敷之忌洗浴

從高墮死

總宜扶坐不可使臥恐瘀血冲心用淡豆豉一杯煎水去渣服如氣欲絕以熱小便灌服

銃子傷肉

蜂蜜八兩煎滾加好燒酒一斤儘量熱服取汗安臥次日銃子自出

蛇入七孔

割母猪尾血滴入即出

蛇纏人足

熱小便淋之即解

人口咬傷

若牙黃入肉不出重則喪命輕亦爛成錮疾速用小便洗之又浸一兩時待其牙黃出後以鼈甲龜板炙灰麻油和敷效

射工傷人

即樹上雞毛蟲是也觸着則能放毛射人初痒後痛久則外痒內痛骨肉皆爛宜用豆豉清油搗敷患處少時手出可見去豆

蠿蝮傷人

豉用白芷煎水洗之如肉已爛用海螵蛸末糝之效  
雄黃白礬等末茶調以鵝翎刷之立消

野芋頭毒

石榴葉煎水服 黃土煎水服

治中水毒

手足至肘膝俱冷浮萍煎水浸洗

十種丹毒

一從頭項起腫散開者葱白搗汁塗二從頭項起紅腫痛苦異

常赤小豆研末鷄蛋白調塗二從面部起紅腫伏龍肝研末卽  
竈心土牛皮膠調塗四從背上起赤點桑白皮研末羊油和塗  
五從兩臂起赤腫黃色柳木燒灰井水和塗六從兩脇起赤腫  
舊鐵繡研末猪油和塗七從脚背上起紅腫猪槽下土研末蔴  
油和塗八從臍上起紅腫檳榔研末醋和塗九從兩脚起紅腫  
羊油和乳香塗十從陰囊下起紅腫門限下干步土研末羊油  
和塗更有毒重者滿身皆是汕菜子搗酒頻飲汕菜葉搗敷無  
葉以子代之

### 蜈蚣咬又方

大蜘蛛一個放於患處吸出毒氣蛛卽腹脹放水盆內解之如  
蛛死而痛尙未止又換一蛛吸之如無蜘蛛以香油大紙燃點  
着吹息以烟薰患處毒自消

蜂蝎惡蟲傷亦治

先以尿洗之再用鴨口涎搽 或石灰水浸之

### 蚯蚓咬傷

烏黃蜂咬

### 飲鹹水毒

米醋飲之或食乾柿餅效

### 解諸瓜毒

木瓜皮煎汁飲或飲鹽湯效

山嵐瘴氣

誤吞水蛭

誤吞田螺

誤吞蜈蚣

烟管傷喉

蠅入咽喉

泡哥魚毒

救湯火

生熟大蒜各七片共食之少時腹鳴或吐血或大便而愈

即馬蝗也害人性命急飲青靛水可泄出或多飲蜂蜜即出

以水多灌鴨口少頃將鴨倒提接取流出之涎飲下即化

喫生雞血或雞蛋白數箇服下少頃痛稍定復喫生茶油一杯

遂惡心令吐血裏蜈蚣而出後用雄黃末調水服

細辛嚼碎含之效

蝦蟆眼睛研爛嚥下

用船底青苔搗爛冷水沖服若不愈加青皮五錢煎水冷服立

愈

凡被湯泡火燒者切勿以冷水及尿泥激之其熱氣遇冷則入之

愈深火毒攻心而速之死矣宜急以鹽糝之然後用藥敷為妙

以蚌壳燒灰存性研末入冰射少許從四面掃之漸入于中

此急救最驗之方也 或用夜明砂黃丹水粉三味各一錢雞

蛋五個煮熟去黃久即將前藥和人同炒退火氣研貼敷傷處

乾再換數次肉白即愈神效 或梔子末和雞蛋清調刷之



或生芝蔴研如泥塗之 又生蘿葡搗爛塗之 或生大黃

末 或蔴油或桐油俱可調服 俱生肌止痛 又多年陳醬緩

緩塗之但愈後有黑癍 又醋和黃土塗之 痛甚者菜油碗

浸一刻卽止疼若不能浸之處頻頻塗之 油火灼傷者石膏

末敷之 或生蘿葡搗塗 又湯潑火燒救命散 黃栢黃連

黃芩黃耆薄荷 各一兩 飛滑石 三兩 共爲細末香油豬油調搽

奇效 湯火瘡方 槐花子 生大黃 地榆 芙蓉粉 等分

爲末雞蛋清調敷

### 狗咬傷

青苔和冰糖搗勻敷患處二三次卽愈新舊傷口皆治

又桃白皮一握水三升煎一升服 或蚯蚓糞敷

凡被狗咬必先吮盡惡血再用小便洗淨然後用藥

### 毒狗咬

凡被咬而聲類狗此毒入心也用斑蝥二十四個同米一撮炒黃

去斑蝥將米爲末另用 杏仁 三錢 川連 三分 扶神 一錢 甘草

三分 煎水開米末服下卽愈

凡癩狗咬若不急治至一月則腹懷狗胎其人作狗吠毒深不可

治矣被咬後其毒上攻頭上生有紅髮須扯去此方男子二十  
一日可治女子十四日可治過期則難治 斑蝥七個去翅同米

炒黃色去米不用

如火虛弱者  
只別三四個

生大黃

五錢

金銀花

三錢

殭蠶

七個

酒水各一碗煎至碗半飽時服服後小便解下血塊候至

小便清白方為毒盡然後食溫粥一碗則止而不解矣但百日

內忌聞鑼鼓聲須避處幽僻之所又忌食猪羊雞魚酒葱及發

氣動風之物又忌穿麻布衣帳又忌往麻地茄地赤豆地上行

走犯之復發不可治 乘毒未發用斑蝥七個去頭足翅用雞

蛋二枚打破同蒸去斑蝥淡食雞蛋於小便內取下血塊若痛

脹不解則血塊未淨仍可食塊盡乃止 或用斑蝥同米炒黃

色以米研末蒸蛋食

洗冤錄詳

斑蝥有毒中其毒者用玉簪

花搗水飲之即解但須張大口吞切不可使水近齒近則齒傷

又方 槐樹老皮內軟白皮一塊安放傷處再以麵粉水和作

圈圍之內以人糞填滿上蓋槐樹白皮一塊用艾丸如芡實大

灸二七壯候熱透身上出汗為度

又內服方 地榆三兩銅鎖一把同人新砂鍋內酒水各一大

碗半煎至一碗空心溫服其毒內消並無後患再以明雄黃一

錢麻油一茶鍾調服三日三服其傷處灸後再以生甘草末杏

仁搗和沙糖敷之若灸處起泡則以麻油調生大黃末敷取效

凡螞蝗入腹生子腸痛黃瘦者 田中泥和水飲數碗蛭必盡下

或用牛羊熱血生調猪油飲之亦下

形如大麻瘋眉髮皆落每夕聞身中有聲如蚓鳴多用白鹽煎湯

浸洗數次即愈

焮熱成片如癩子疼痛難忍 苧蔴葉連梗洗淨搗汁調青黛

或藍靛不必太濃鳴翎蘸敷日敷十餘次苧蔴汁須鮮搗隔宿者不可用

凡誤食碗絲則頃刻喉舌腫大難於飲食急以 綠蔴桿一枝將

一頭燒透當烟筒呼吸其腫即消

### 蜘蛛毒

### 誤食碗絲

子

### 蚯蚓毒

卷之九

目錄

三

醫方易簡新編卷五目錄

治外科各症並跌打損傷

活命仙方

瘡疽懸久

瘡疽托裏散

腸癰

參芪托裏散

癰癧流注

癰疽氣虛作渴

癰毒內虛

潰瘍寒熱

瘡潰便溏

瘡瘍邪入筋絡

血虛瘡瘍疼痛

瘡瘍癩腫

臂癰堅硬腫痛

癰癧等瘡

瘡瘍虧損多汗

四氣流注

瘡瘍陽氣脫陷厥逆

瘡不腫痛腐潰

肺疽辨症

肺癰辨症

肺疽傷脾

頸項四肢瘡腫

瘡瘍痊後枯乾

面部生瘡

降癰散

後方

百草煎

廓清飲

面部生瘡

天行斑瘡

頭斑瘡

灸瘡血出

乳癰初起

乳巖

癰疽發背欲死吸毒

癰疽發背臭腐

發背灸法

又吸毒方

癰疽不消並成膿未破

背疽

便癰

男子陰頭癰

肺癰吐膿血

乳癰

乳癰潰爛見心

乳癆乳癰

乳吹乳癰

乳硬作痛

兩乳頭陷

乳頭裂瘡神方

辨疔瘡法

拔疔紅膏

疔瘡惡瘡

疔瘡危急

魚臍疔瘡

魚臍疔瘡頭黑

魚口便毒初起

蛇頭瘡

瘡毒腫硬無頭

疔腫

紫馬疔

軟疔

時行暑癰

肺癰

蛇頭指瘡

發背初起

又方

疔瘡初起治法

血疔血出不止

治瘡癩頭新綠雲膏

治連珠癩串

銀靑散

中肥足潰

久年痔漏

痔漏瘡痛

蠶退除漏

外痔搽藥

癰瘡搽藥

疥瘡方

疥不除根

鵝掌風癰

腎囊風痒

坐板瘡痒

牛皮癬癩

頸面花癬

雲頭白癩

凍瘡潰爛

遊火疼痛

漆瘡腫爛

漆瘡方

凍瘡

手足凍裂

癩瘡拔毒方

癩瘡收口方

竹木刺入肉方

治毒初起

消毒神效

風毒灸法

鐵箍散

黑龍丹

追管丸

消管丸

完善丸

石花膏

懸癰初起

天行斑瘡

拔疔秘方

疔瘡走黃

紅絲疔

翻膏疔毒

丹石結毒

楊梅結毒

黃靈丹

盤根癰毒

爛腿癩瘡

生肌八寶丹

頑惡毒腐黑靈丹

環跳兩膝漫腫

玉紅膏

驅毒散

隔皮取膿法

跌打內傷

箭鏃各傷

皮金膏

重物壓傷

脇破腸出

破傷風

誤斷指頭

易簡新編

卷五目錄

二

人咬傷痛

碰傷脚域

跌打損傷

皮破出血

內傷久發

竹木瓦刺

閃腰挫氣

修煉花蕊石方

面目傷腫

頸生痰核

縮瘤膏

鼠瘦核痛

頸上癭瘡

內消潔癭秘方

諸毒腫方

巴膏

無名腫毒

惡瘡不斂

諸瘡年久不瘥

腦疽發背初起

發背對口

拔毒異法

腫毒等瘡

癰大臭爛

腸癰不可藥治

對口初起

呂祖治發背靈寶膏

發背神方

又方

發背膏藥方

發背無名腫毒等瘡

對口仙方

三香定痛飲

又方

對口瘡方

各種癰疽瘡疔

烏龍膏

腸癰

大小腸癰

項癭瘰

危急肺癰

肺痿

又方

肺癰咳嗽

又肺癰奇方



肺風瘡

肺風瘡

懸癰

囊癰

又方

洗痔方

外敷藥方

痔漏丸方

疔瘡方

見疔苗速救方

唇疔

破傷風方

又神方

又方

一切魚口便毒頑瘡

魚口方

坐板瘡神方

乾疥腫痒

鬚邊疽年久不愈

脇疽

骨疽

蛇纏丹毒

赤白蛇纏瘡

天蛇頭疔

禿蛇

禿瘡

牛皮癬效方

一切頑癬

牛皮癬方

膿窠瘡

漏瘡

甘露丸

大麻風癩

癩風眉落

騎馬癰方

上疔方

爛膀瘡方

雷頭風

搭手

賺瘡久害

多年賺瘡

又方

黃瘡羊鬚瘡

漆瘡

流火神方

小兒頭疽

足瘡

甲疽膿血

疔腮腫痛

濕痰流注

塗背瘡

耳而肥瘡

敗毒散

痔方

破傷風方

癬方

湯泡火燒

化耳聾方

生猴子方

軍門止血

魚口便毒

消諸核方

跌打損傷方

跌打損傷氣絕

跌打及墻壁厭傷

跌撲欲死面青頭縮

刀傷盛損及爛入寸許

金瘡折傷

金刃傷

刀傷急救

打傷方

壓倒打死

箭鏃鉛彈傷

箭鏃及針物在喉

墜車落馬筋骨痛

竹木刺入喉

接骨神方

砒霜毒

鎗刀傷重

狗咬成瘡方

惡蛇傷

救砒霜毒方

解諸骨哽方

雞骨哽方

雞骨魚刺

湯火傷

烟薰欲死

湯火傷灼

馬咬及踏傷

少林接指方

截血法

人咬傷

箭頭入肉

刃傷

刃傷血出不止

金瘡湯出

自刎斷喉

七釐散

湯火傷

湯火傷膏貼

撲打粹死

撲折欲死

跌壓傷死

加味四物湯

附子餅炙法

麥冬粳米飲

神燈照法

牛膠蒸法

銀花甘草湯

蠟礬丸

移毒散

干槌膏

消毒神效丹

移山過海散

護心散

簡便敷毒方

驗多骨法

癩疽

異疽似癰

疔瘡初起

又方

誤食猪肉走黃

走黃又方

誤食瘟肉生疔

治毒膏

瘡毒一筆銷

胎元七味丸

楊梅瘡秘方

楊梅結毒

敷疔藥

被毆後傷風

四生散治跌打損傷

打傷危急

跌打損傷

破傷風

角弓反張  
牙關緊閉

頭面跌傷

眼睛跌出

車碾及墜馬傷

跌撲傷筋

治閃肭奇方

墜樓墜馬損壞手足

悞割舌頭

楊梅結毒惡瘡

試驗奇方

楊梅瘡成結毒

各種疔瘡試驗奇方

又辨色歌訣

疔毒初起

生疔發熱口渴便閉

疔毒將欲成黃

疔毒已經走黃

疔發項上三陽受毒

立馬回疔丹

疔發項下三陰受毒

挑疔根法

拔疔散

製蟾酥丸法

完瘡散

跌打夾棍傷移傷

杖瘡

又攤藥

肚破腸出

湯火膏油傷

沸水油湯火傷

諸刺入肉腫痛

箭鏃竹木刺入肉

跌閃腫痛

新舊損傷

又方

又敷方

養筋活血丹

刀傷

火瘡

泡傷皮肉

接骨方

又方

金瘡傷重

金瘡並木石損傷敷方

金瘡痛不可忍

止金瘡血方

又方

金瘡血毒昏暈

傷癩脹喘

去金瘡腐肉

墜馬血瘡

血不透膜

破傷風

中毒箭方

火藥湯泡傷

金瘡內爛生蛆

又方

中毒箭後皮肉癩腫



活命仙方

治外科各症並跌打損傷

凡一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥也  
穿山甲三錢 蛤粉炒黃 白芷三錢 防風三錢 天花粉三錢 赤芍

藥三錢 歸尾三錢 乳香三錢 沒藥三錢 貝母三錢 金銀花三錢

皂刺二錢 陳皮三錢 甘草三錢 紹酒一碗煎數沸溫服

瘡疽懸久

凡瘡疽已久元氣虛弱攻伐已過不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生  
人參另煎 黃芪鹽水炒 當歸二錢

川芎二錢 芍藥炒 白米炒 茯苓二錢 金銀花一錢 白芷七分

連翹五分 甘草五分 清水煎服 若腐肉既潰而新肉不能

收斂屬氣虛者四君子湯為主 人參二錢 白朮二錢 茯苓二錢

清炙甘草一錢 加大黑棗七個 煨生薑一大片 水煎服 或

加粳米百粒 亦可 若血虛者四物湯為主 熟地黃三錢 當

歸三錢 川芎一錢 芍藥二錢 水二鍾煎服 氣血俱虛者十

全大補湯為主即前四君四物湯方內加 黃耆一錢 肉桂

心研沖五分 一錢 水煎服並忌寒涼消毒之劑

瘡疽托裏散

凡一切瘡疽始終常服不致內陷

瓜蒌

大者一個

當歸 紹酒浸

五錢 黃芪 米炒

一兩五錢

白芍藥

一兩五錢

生甘草

一兩五錢

熟地

一兩 天花粉

一兩

金銀花

一兩

皂刺 炒

一兩

右藥以無灰酒浸

之入磁器內厚紙封口再用油紙重封隔水蓋煮至藥香取出

分服直至瘡愈立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大且不

動臟腑不傷血氣不問陰陽腫潰屢試屢驗若發背腦疽勢

甚者更用隔蒜炙之若脉氣沉實大小便秘先用疎通之劑

隨服此藥功效甚速若火毒已退不作膿或不潰者更宜服

此托裏 若潰而不斂及膿清者宜用大補

凡腸疽癰疽發背乳癰及一切腫毒或焮痛憎寒壯熱者

金銀花 二錢

黃芪 二錢

當歸 二錢

生甘草 二錢

紹酒

一鍾水

一鍾分病上下食前食後服之少頃再服一劑瘡洋敷患處老

少虛實皆可服

參芪托裏散

凡瘡瘍氣血俱虛不能起發或潰腐不能收斂及惡寒發熱者

人參 氣虛者多用之

一錢

黃芪 米炒

一錢

白朮 炒

一錢

當歸 一錢

熟地 一錢

一錢



癩癧流注

芍藥紹酒炒 茯苓 一錢 陳皮 一錢 水煎服

凡癩癧流注及一切癰疽不足之症不作膿或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食不思睡卧不安盜汗不止

人參 一錢 黃芪炙 當歸酒炒 川芎 一錢 芍藥炒 白朮炒

熟地 二錢 五味子炒研 麥冬去心 生甘草 五分 水二鍾薑片

黑棗 三枚 煎七分碗食遠温服

癰疽氣虛作渴

黃芪米炒 生甘草 一錢 天花粉 一錢 加入人參一錢亦可

水二鍾煎八分頻服之 若氣血俱虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜照癩癧流注方治之

癰毒內虛

凡癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛迭見者 黃芪炙 麥冬 二錢

人參 一錢 熟地 二錢 茯苓 一錢 甘草炙 白芍藥 一錢 當歸 二錢

川芎五分 遠志五分 官桂研 煨薑片 大黑棗 三個 水煎服

潰瘍寒熱

凡潰瘍氣血俱虛寒熱往來或晡熱內熱或婦人諸瘡經候不調

小便頻數大便不實等症即瘡瘍氣血虛而發熱者皆久服之

亦收瘡口 人參 一錢 黃芪 一錢 當歸 二錢 熟地 三錢 川芎 一錢

瘡潰便溏

芍藥一錢 柴胡五分 生甘草八分 水煎服

凡瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫陷腹鳴疼痛大便溏泄  
神思昏潰此寒變內陷緩則不治 附子製 乾薑炒 益志  
一錢 丁香五分 羌活一錢 淡沉香五分 木香五分 茴香五分

陳皮一錢 甘草炙二錢 生薑一片 水煎服

瘡瘍邪入筋絡

凡瘡瘍外不焮腫內便調和此邪在筋絡也 人參一錢 黃芪一錢

當歸二錢 甘草炙一錢 紅花一錢 柴胡一錢 連翹一錢 羌活一錢

蒼木米泔浸炒防風一錢 黃芩一錢 桂枝七分 紹酒一杯 煎服

血虛瘡瘍疼

粟殼去蒂炒當歸紹酒炒白芍藥炒川芎一錢五分

乳香一錢 沒藥一錢 真肉桂心一錢 生薑片 黑棗三個 水煎服

瘡瘍焮腫

凡瘡瘍焮腫在外其脉多浮邪勝必侵於內宜用此托之

人參一錢 白木炒當歸三錢 黃芪鹽水炒芍藥炒茯苓一錢

甘草炙地骨皮一錢 肉桂心一錢 防己紹酒炒黃芩錢防風錢

先以蒼木一升水五升濃煎去滓入前藥再煮至二升終日飲

臂癱堅硬腫

凡臂癱堅硬腫痛兩尺脉緊無力者 羌活一錢 黃柏錢防風錢

楠

當歸尾一錢 藁木一錢 肉桂一錢 連翹八分 蒼朮米泔浸炒一錢

皮八分 黃芪鹽水炒一錢五分 紹酒一鍾 水二鍾 煎八分 碗食前服

癩癧等瘡

凡癩癧等瘡足三陰虛者 人參一錢 白朮一錢 茯苓一錢 乾薑錢 甘草錢

草一錢 當歸一錢 川芎一錢 熟地一錢 芍藥一錢 黃柏紹酒炒七分

知母紹酒炒七分 水煎服

瘡瘍虧損多汗

凡瘡瘍真陽虧損或膿血過多失於補托以致上氣喘急自汗盜汗氣喘短搐頭暈泄瀉等症 人參五錢 附子炮去皮臍一兩

汗

乾薑炒三錢 白朮三錢 水煎作二次服

四氣流注

凡四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘攣自汗氣短小便不利或手足浮腫 附子製四錢 防己四錢 桔梗四錢 甘草炙二錢

白朮二錢 茯苓三錢 生薑三片 水煎食遠服

瘡瘍陽氣脫陷厥逆

凡瘡瘍陽氣脫陷嘔吐畏寒泄瀉厥逆等症 附子製一錢 乾薑炒一錢

瘡不腫痛腐

凡脾胃虛寒瘡屬純陰或藥損元氣不腫痛不腐潰或腹痛泄瀉

陷厥逆

芍藥炒一錢 人參一錢 甘草炙一錢 茯苓一錢 肉桂心一錢 白朮一錢

水煎食遠涼服

潰

嘔吐厥逆及陽氣脫陷等症 柴胡 五分 人參 三錢 白朮 三錢

黃芪 二錢 乾薑 一錢 附子 一錢 生甘草 二錢 陳皮 一錢 當歸 一錢

二錢 升麻 五分 紹酒 一鍾 水煎涼服 如不應倍加薑附

肺疽辨症

凡疽毒在外者易識惟肺中患疽難知於何辨之若患者兩脚骨

疼痛或脚骨不痛而舌下生物如細豆一粒心口之上內作微

痛及咳嗽口乾咽燥等情此即肺中生毒之証也即用 桔梗

三錢 生甘草 三錢 煎服服下如覺稍安肺之患毒無疑矣再用

犀黃丸服之 乳香 一兩 沒藥 一兩 麝香 一錢 五分 犀黃 三分

雄精 五錢 共研和勻煮黃米飯一兩同搗爛為丸如菜豆大 晒

燥忌每服三錢陳紹酒熱吞送下連服十服自愈 世人但知

脚疼醫脚咳嗽醫嗽舌下一粒便以刀刺為害不淺

肺癰辨症

凡口吐臭痰胸中發腥作痛者肺癰也此症有三不治時吐臭痰

如硬米飯者不治嘔膿不止者不治白痰變赤者不治惟嘔惡

而膿自出者易治宜服 地黃保生歸脾等湯輪服自愈若不

早治悔之晚矣

肺疽肺癰兩症如無力者以陳年芥菜瀘每晨取半杯滾豆腐漿沖服服則胸中一塊塞上塞下塞至數次方能吐出連吐惡膿日服自愈終身戒食鴨豆白鯊紅蘿蔔鯉魚甲魚食則復發難生

### 肺疽傷脾

凡肺疽脾氣虧損久咳吐膿或中滿不食必須補脾上以生肺金否則不治 麥冬七分 生黃芪二錢五分 當歸二錢 北五味四分

人參一錢 茯苓二錢 陳皮一錢 桔梗六分 清炙甘草五分 生薑片一

大黑棗三錢 水煎服

### 頸項四肢瘡

凡四肢頸項等處不問軟硬赤白腫痛皆因抑鬱所致或日晡發熱或潰而不斂 人參一錢 黃芪一錢 當歸二錢 川芎一錢

熟地二錢 芍藥一錢 貝母一錢 香附一錢 茯苓一錢 陳皮一錢

白朮二錢 柴胡六分 生甘草七分 桔梗七分 薑一片 水煎服

如口乾加五味子七粒 麥門冬一錢 如寒熱往來加軟柴

胡七分 地骨皮一錢 如膿清重加人參一錢 黃芪一錢

如膿多重加川芎一錢 當歸一錢 如肌肉遲生加白斂一錢 官桂一分

瘡瘍痊後枯乾

凡瘡瘍將痊或痊後口乾其渴舌胎黃色此乃腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能相濟故煩燥作渴小便頻數或白濁陰痿飲食不多肌膚漸消或腿腫脚瘦服此以降心火滋腎

水則諸症頓止口舌生瘡不絕亦治熟地九蒸九晒山茱萸四兩

紹酒浸山藥四兩澤瀉蒸焙三兩白茯苓三兩牡丹皮三兩桂心一兩

北五味半生半炒共研細末熬膏加蜜少許和丸如桐子大

每服五六十九五更末言語前空心鹽湯送下

面部生瘡

硫黃五分白芷五分天花粉五分水粉五分全蝎一個蟬蛻五個

共研細末用黃蠟麻油向離火方熬油入前末

藥和勻每於臨卧時洗面淨以少許塗面勿近眼目數日間腫

處自平赤員風刺均治

降癰散

凡癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即消已成者斂毒速潰可愈

若陽毒熾盛而疼痛勢凶者宜先用此方其解毒散毒之功神

效最速若堅頑深固者宜用後方薄荷葉野菊花根

葉握土貝母握茅根一握乾者可為末鮮者可搗爛同具

後方

母研勻外將茅根煎濃湯去粗用調前末乘熱敷患處仍留前  
剩湯頓煖不時潤於藥上但不可用冷湯冷則不散不行反能  
為痛約敷半日即宜換之真妙方也

凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

腦荷倍用

生南星

土貝母

朴硝各等分

風化石灰倍用

同為末用鹽瀰調杵

稠粘敷患處經宿乾易之不必留頭若膿成者留頭亦可或炒  
熟攤絹貼之亦可或用麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止  
痛速效加麝香冰片少許更妙

百草煎

凡百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒濕氣留聚走注疼

痛等症無不奇效

百草

凡出野山間者無論諸品皆可取用然若以山草為勝辛香者佳冬月可

用乾者須預

不論多寡取以多煎濃湯乘熱薰洗患處仍用布

帛蘸熨良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘

但以頻敷為善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者

可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不利湯得藥性則

湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以煎膏者其義亦

此此誠外科中最多最佳之法也

凡洗水鼓腫脹每次須用草二十觔煎濃湯二鍋用大盆盛

賒以蓆篋遮風薰洗良久每日一次或二次內服廓清飲等劑

甚妙

### 廓清飲

枳壳二錢厚樸一錢五分大腹皮一錢白芥子五分或一錢

蘿蔔子生搗一錢如中不其茯苓連皮用二錢澤瀉二錢陳皮一錢

水煎食遠温服

### 面部生瘡

硫黃五分白芷五分天花粉五分水粉五分全蝎一個蟬蛻五個芫菁七個

共研細末用黃蠟麻油向離火方熬油入前末藥和勻每於臨

卧時洗面淨以少許塗面勿近眼目數日間腫處自平赤鼻風刺均治

### 天行斑瘡

凡須與遍身皆戴白漿此惡毒氣也唐高宗永徽四年此瘡自西

域東流於海內但煮葵菜葉不拘多少以蒜蘆不拘多少同咀

燕之即愈今有患者亦仍試驗

### 頭斑瘡

晉元帝時天行發斑瘡頭面及身頭更周匝狀如火燒瘡皆戴白

漿不治數日必斃此時毒氣所致毒氣攻心自不救矣瘡後癢



灸瘡血出

黯彌歲方滅名曰虜瘡此症今人有之特患人不識耳予曾試  
驗特載於左以白蜜升麻時時食之並以水煮升麻綿拈湯洗  
患處或用好蜜遍摩瘡上以蜜煎升麻頻頻拭之

前有一人灸火至五壯血出不止如尿手冷欲絕急以好紹酒  
半盃炒黃芩二錢為末再用陳好紹酒調服立止

乳癰初起

芙蓉根切碎好紹酒煎盡量飲即內消 或用當歸八錢生黃  
芪五錢 金銀花五錢 炙甘草一錢八分 桔梗一錢五分 紹酒

二碗煎八分半飢半飽時服 或用鹿角尖三亦煨紅存性研

末熱紹酒調服重者二服即消 或葱汁一鍾飲之

乳巖

凡乳中初起堅硬一粒如豆大漸長至如蛋大 七八年必破破則

難治急用生螃蟹殼瓦上焙焦為末紹酒沖服 錢二服之以消度

冬瓜一個削去蓋合瘡上瓜當爛再削去合之此分散熱毒之

死吸毒

意瓜未盡瘡口已斂小矣即將膏藥護之甚妙

癰疽發背

桐葉泡陳醋同蒸貼之退熱止痛漸生肌肉收口驗之

發背灸法

小麥麩和好作條圍瘡口再用杏仁去皮尖研爛填滿熟艾作薄餅

又吸毒方

如圍大三餅四面點火灸之灸三餅完黃水出即消

凡癰疽發背初發腫時便以紙一張水浸濕搭腫上視其上一點  
先乾者即是正頂先以水和麩作圈安於患處正頂上以大螞  
蝗一條安於中頻以冷水灌之螞蝗當吮其穴膿血出毒即散  
如毒大蝗小須用三四條若吮著正穴蝗死毒去用水救蝗放  
棄若血不止以藕節研爛塗之茅草花亦可 或用大薊根不  
炒洗淨泥切碎研如膏塗瘡上初發者能消散已成者速潰  
或牛皮膠二兩 紹酒二斤 同煮候溶化放溫令病者徐徐飲盡

未成即消已潰易瘥

腫疽不消丑成膿未破

蠶繭空殼蛾兒出過 燒灰 紹酒調服

背疽

瓜萘一個 乳香 沒藥 各五錢 生甘草三錢 右用陳紹酒煎服

便癰

皂角要不去者 燒過陰乾為末 紹酒調服 或用皂莢子十粒

水煎服 或用皂莢炒黑小粉炒等分 共研末和勻以熱醋調

仍以紙攤貼患處頻頻水潤之 或用胡桃仁七粒 燒過陰乾

為末 紹酒調服

男子陰頭癰  
肺癰吐膿血

鱉甲煨為末雞子清調服。

白芨研末三錢調真藕粉內代熟食之至三五兩即愈 或將

白芨燉蛋糕 或入粥中吃俱可 或芥菜滷埋土中陳三年

者飲之或作醬油入菜吃或綠橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿水即愈

赤豆三研爛去渣溫服留渣紹酒調敷患處 或螞蟻小腳尖

陰陽瓦焙乾為末每服三錢紹酒溫調飲之盡量飲蓋破出汗

或生半夏一連鬚葱白根同槌爛棉紙二層捲裹左乳塞右鼻

右乳塞左鼻重者再換 或白芥子炒黃一兩研末燒白酒沖盡量

飲 或蒲公英三錢金銀花三錢當歸三錢乾葛一錢五分紹酒一大

鍾水一大鍾同煎食後服服後再飲酒一醉出汗 或皂角刺

燒灰和海蛤粉為末熟紹酒調下揉散亦可其效如神

貓腹下毛要多乾鍋內煨存性為末乾摻或清油調入輕粉少

許敷之 或銀杏八兩半紹酒研服立效或黃瓜萁一二個

連皮穰子切碎以無灰酒一盞於瓶內煮半盞去渣時時溫服

瓜萁大而紅活者搗碎 生甘草 當歸紹酒洗各五錢另研乳香沒

乳癆乳癰

乳癰潰爛見心

易簡新編

卷五

七

乳吹乳癰

藥各一錢作二劑紹酒三盃煎二盃飲以渣乘熱敷患處瘰癧治

鹿蕊花根 蒲公英 金銀花 防風 紹酒水各一盃煎八

分空心溫服出汗 或葱一握連根搗爛敷患處用瓦罐盛炭

火蓋葱上一時蒸熟出汗即消 或金銀花一兩 蒲公英一兩

酒水各半煎服以渣熱敷患處即患睡醒即消蛇頭瘡亦治此方最妙

乳硬作痛

嫩桑葉左採研細米飲調攤紙上貼患處

兩乳頭陷

升麻 葛根 連翹 當歸身 黃柏各二錢 黃芪三錢 肉桂五分

炙甘草 牛蒡子各一錢 水一鍾紹酒二杯煎至一鍾食遠熱服

乳頭裂瘡

茄子不拘多少秋後冷露裂開者陰乾燒存性為末水調敷之

辨疔瘡法

凡瘡腫以針刺之不痛無血者疔也 或嚼生黃豆二三粒口不

覺腥臭者即是疔毒急用銀針刺破擠出惡血更令一人吃飽

飲火酒數杯後口含冷水吮盡惡血水溫吐出再含吮之至痛

痒不吮自愈 或用蒼耳草根葉搗爛入童便絞汁冷服一鍾

每日三次仍以根莖苗葉任取一束燒灰存性為末用醋汁鹽

澱和如泥先將瘡中心及四邊刺破令血極出拭盡敷之不過

拔疔紅膏

十次即拔疔出或用白梅肉荔枝肉同搗成膏捻作餅子依疔瘡大小敷上其疔即出

銀硃

水飛晒乾

草薢仁

一錢

嫩松香

五錢

黃丹

水飛晒乾

輕粉

五分

共搗成膏以銀針將疔瘡頭挑破用紅布一塊照疔毒之大小將膏藥滋鋪放貼之不一日疔即拔出如畏痛者不必挑破即以紅膏攤貼亦妙

疔瘡惡瘡

荔枝五個以狗糞中米淘淨晒乾研末與糯米粥不拘多少

同研成膏攤紙上貼之留一孔出毒氣或紫花蒂下一大劑

水煎熱服

疔瘡危急

甘菊花葉

須黃菊葉

一大把搗自然汁一盞服之即將葉渣敷

患處立醒

用根亦可

或蟬脫薑蠶為末酸醋塗搽四圍留出

瘡口根出少長然後拔去再用藥塗瘡

魚臍疔瘡

絲瓜葉

連鬚葱

葦葉

同入石鉢內搗爛如泥以紹酒和

汁服之以渣搽貼病在左手貼左腋下在右手貼右腋下左足貼左勝右足貼右勝在中貼心臍並用棉包住後下紅絲皆白

魚臍疔瘡頭

則愈如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救矣  
凡魚臍瘡頭黑皮破黃水出四畔浮漿 蛇蛻一大條陰陽瓦煨

黑

存性細研末雞子清調敷

魚口便毒初起

生白礬三錢重者五錢研末好生酒調服欲吐忍之出汗即愈

起

愈一半次日全消 或槐子七錢紹酒煎熱服出汗為度

或鹿角燒灰三錢核桃皮燒灰三錢和勻好紹酒調服

蛇頭瘡

凡蛇頭瘡生於大指之上節或生他指痛不可忍臭不可聞者

猪膽一個入白礬末一錢於膽中罨指患處即止痛雄黃末亦

可 或用金絲草即落蘇金銀花藤 五葉紫萐 天蒿麥

俱切碎 陳好醋濃煎先薰後洗

瘡腫硬無頭

蛇蛻 貼於腫處

疔腫

凡疔腫及無名腫毒捻破頭去白水以葱同蜂蜜搗貼患處神

效 或芙蓉根不見天日同酒糟搗爛敷之

紫馬疔

紫花帶丁 仙喬草 夏枯草 石板莧 用陳紹酒煎服

軟癩

抱退雞蛋殼燒灰清油調搽愈

時行暑癩

肺癰

蛇頭指瘡

發背初起

又方

疔瘡初起治法

血疔血出不止

桐油 麻油各半斤同熬滴水成珠再入黃丹半斤收貯攤貼立效

綠橘葉搗汁一杯服之吐出膿血即愈 或薏苡仁三合搗爛

水二盞煮成一盞入酒少許分作二服

雄黃 輕粉 蟾酥 冰片四味研末以新汲水調濃燉熱敷

患處指用紙蓋之日換三四次

生薑一塊 炭火炙一層削一層為末以猪膽汁調塗 或用

羊油猪油生切片冷水浸貼熱即換之 或芭蕉根搗爛塗之

或乾人屎燒灰醋和敷之乾再塗

好京墨用老醋磨極濃將瘡脚四圍塗之再用老薑和猪膽搗

爛塗在瘡上用紙封之乾再如前塗之

凡起小泡發痒或麻木寒熱頭痛惡心即是疔毒用銀針挑破擠

盡惡血口含冷水吮之溫則換水吮至不痛不痒用生大黃末

水調塗腫硬之處則毒不走散隨飲麻油一杯取菊花打汁一

碗沖酒服無花用糧葉

飲麻油一杯或火焙銀器乘熱烙瘡口即止

治瘡癩頭新  
綠雲膏

凡瘡癩頭頻發不愈並治疔毒初出膿水不暢貼之立能呼膿拔  
毒消腫定痛 麻油三兩以葶麻仁四十九粒 松香八兩以葱  
在麻油內煤枯棟草麻仁 共研極細末將松香先放銅杓  
研猪苦膽汁用大者三枚 銅綠二兩 內火上溶化乃下麻油膽汁銅綠熬勻搗干餘下再烘烱傾入

治連珠癩串

凡男女大小頸項頰下耳之前後結核壘塊連珠癩串不痛不疼  
或破微疼皮赤潰爛久不收口年近者一料收功年遠者服兩  
料無不全愈 凡用香梗芋莖十斤去皮勿烘炒切片晒極燥  
錢甜酒送下如不飲酒者米湯送下或喫燥片酒下亦可此方  
屢用效勿以價廉輕視若將方刊印傳送以濟無力醫藥者  
功大馮又治喉癬亦效 凡遇絞腸痧發尿尿俱出垂危者急食

銀青散

凡男子下疳疼極潮痒女子陰戶兩旁淫濕瘡瘍膿水淋漓紅癩  
腫疼並治玉莖梅毒瘡疔腐及小兒痘疤橫爛並痘後餘毒不滿  
頭發黃泡等症用此皆效 白螺殼取墻頭上白色者佳火煨  
過揀去泥研細末一兩

凡遇絞腸痧發尿尿俱出垂危者急食



橄欖核火煨存性寒水石另研極細取大蘇花冰片分二錢共研細末以磁瓶盛貯勿使出氣臨用時以麻油調搽如濕處燥擦不必用麻油極效

### 中肥足潰

凡農家糞澆地上烈日晒逼之下足踐於此受熱氣之毒必足趾

腫痛似潰非潰俗名惹肥以鴨毛煎湯和皂礬洗之即瘥

### 久年痔漏

凡患二三十年者三服除根用白蓮花蕊一兩五錢當歸紹酒

錢黑丑一兩五錢取頭為末共研細末每服二錢空心酒下多服

自效忌食發火等物

### 痔漏瘡痛 蠶退除漏

活鯉魚鱗三五片以棉裹如棗形納入肛門坐片時痛即止辛苦勞碌之人忽患腸痔臟毒愈而頻發膿水常流皆因乏力醫藥調治失宜將成管漏 笮過頭蠶紙一張晒燥小刀刮去

蠶空殼以瓦燥煨黃好紹酒服連服十張除根

### 外痔搽藥

五倍子十個取核挑大金頭蜈蚣二條剪碎兒茶敲碎

將二味和勻裝入梔子內用紙封固陰陽瓦煨以青烟盡為度取起研末 配熊膽一錢 冰片五分再研以猪膽調搽再用皮

癬瘡搽藥

稍湯揉洗然後搽藥屢試極驗

白薇三錢 白芷二錢 花椒炒出汗 細茶葉二錢 大黃五錢 明礬五錢

寒水石另研 蛇床子二錢 雄黃一錢 百部二錢 樟腦一錢 共為

細末用生臘脂油去衣膜和勻搗隨意擦之甚效 薰法用

紅棗三枚 陳艾三分 雄黃三分 花椒三分 以上四味安火爐

內燒之薰焙衣被晾冷穿蓋不受火氣治疥亦妙

疥瘡方

大楓子肉二兩 紫草油四錢 共搗爛為丸以夏布包紮瘡癢

時擦之不數日可愈

疥不除根

日久不斷時要報發 以雄猪肚一個洗淨 配囟圖牙皂根五錢

裝猪肚內煮爛揀去皂食肚一月喫肚十個瘡斷根矣已治多

人皆效如嫌肚淡難喫用花椒鹽蘸食之亦可

鵝掌風癬

以陳艾側柏葉湯乘熱薰洗一月愈 或雄黃甲片火焙薰之

愈 或豆腐泔水洗手愈

腎囊風痒

以初滾飯湯洗之數次即愈 或以鼈甲 蛇床子 白芷

研末以棉撲之或用麻油調搽

坐板瘡痒

先以砂仁殼煎湯淨之。用茅廁坑墻上之泥刮下晒燥研細以麻油調搽三次全愈。

牛皮癬癩

上椶皮一斤勿見火晒燥磨末。燒酒一斤榆麩四兩浸七日常搽擦年久者搽一年斷根。

頸面花癬

以核桃葉擦之可痒。或臘梅花葉擦之亦瘥。如老人。頸。頸。燥。壓。癢。痛。以熟地汁塗之即愈。

如兩腿陰面濕癬以葶薺鐵線粉擦之立瘥。鐵線粉即火炮

雲頭白癩

以茄子花擦之愈。或以花紅擦之永不復發。已經試驗。

凍瘡潰爛

蚶子殼搗碎極細以麻油調搽如濕處燥搽數日全愈。

遊火疼痛

磬紅不拘多少用雞蛋清調搽紅腫疼痛處可痊。

漆瘡腫爛

白果煎湯洗浴立刻消腫。一二次全愈。

如腐潰者以蠟黃塗之即愈。

漆瘡方

用真香油調樟腦搽腫赤處即消。

凍瘡

將蘿蔔剉空以臘燭油灌內灰火滾數沸搽患處。

或端午午時姜葱艾煎湯洗患處不生凍瘡。

手足凍裂

廉瘡拔毒方

白芨為末用 蘿蔔煎滾以臘燭油調敷裂處不數日愈

凡治廉瘡須先用此方拔去毒水再用收口藥立效坐版及流膿

瘡並治 立青 四兩 礬紅 二兩 共為細末香油調搽瘡內出水

其毒可治拔出惟畧有疼痛須忍之

廉瘡收口方

用前方拔毒盡後瘡不起邊內有紅肉用此藥收口甚易

冰片 三分 石決明 二錢 川連 一錢 血竭 五分 琥珀末 一錢 乳香 一錢

寒水石 三錢 黃栢 五錢 共為細末加糞甚者再加飛礬 五分

搽藥時用温苦茶洗瘡一次上藥一次不數日收口

竹木刺入肉方

用牛膝搗爛罨之其刺即出即瘡口已合者刺亦可出

治毒初起

凡癰疽腫毒肚癰發背臟毒跨馬魚口等症初起三天之內照方

一服即行消散如毒勢旺者連服三服無不盡消

雞子一枚 傾入碗內攪勻入芒硝 二錢 隔湯燉熟用好紹酒送

食隨量飲食盡為度

消毒神效

凡發背癰疽初起即散已成搽三次收小出毒隨愈名曰消毒神

效丹屢試屢驗 鮮山藥 五兩 不見火 土紅硃 二兩 松香 一兩

風毒灸法

全蝎十個 白糖一兩 共搗爛團之 留頂藥上蓋紙周時一換

凡肩背腰俞臂腿環跳貼骨等處感受風寒濕氣以致漫腫無頭

皮色不變惟痠痛麻木筋拘抽痛不能轉側動搖等症即將手

按拏看骨頂痛之處用墨點記隨後法灸之即消散耽延日

久致生腫毒極難收功 沉香研五分 丁香研五分 木香研五分 麝香

一分 乳香燈草炒研六分 甲片炒研五分 臨用時共研勻 以大核桃殼

半個將藥末裝滿覆於墨記之處 再用乾麩水調做生饅頭

式作一圈子圍住核桃殼不致移動上用濕荷葉一張蓋護以

防火星脫下燙肉仍控一孔留出桃殼將艾圓作龍眼核大放

核殼上點火灸之初灸不覺熱至五六壯方有艾熱之氣鑽透

於內能受熱者可灸十四壯不能受熱者止灸十一壯灸過其

毒即消 如病甚者多灸兩三次決不成毒灸畢隨愈屢驗

凡一切癰疽發背不拘已成未成已穿未穿並可以治 濕者棉

花乾撲燥者用麻油調搽 芙蓉葉四兩 蘇芙蓉者更妙或生

研亦生赤小豆末四兩 以陳米醋和為餅或生 以蜜磨塗腫處中間

陰乾或石灰收燥

### 黑龍丹

留出毒頭乾則頻換。初起者即覺清涼痛定腫消。已成者膿聚毒出。已穿潰者即膿出易斂妙不可言。

凡一切惡瘡怪毒或生於橫肉筋巢之間因擠膿出力太過以致

齧肉突出如梅如粟翻花紅赤久不縮入此乃損傷氣脈使然

若輒以降餌腐化但腐去其小者復又突出大者屢舐屢突經

年累月終不痊愈此方奏捷。大熟地切片烘乾炒枯大烏梅

肉煨炒一兩以枯熟地末一兩配烏梅炭三錢共研勻碾極細搽膏

藥上貼之不過三五日其齧肉收進用粉霜收口即愈。如陰

虛腎氣不足之人或患脫肛諸藥不效用此丹以防風升麻各一錢煎湯調搽立即收入再服補腎煎劑試應如神。

### 追管丸

凡痔漏不拘遠年近日有漏通腸污從孔出者先用此方追盡膿

毒服後消管丸自然見效。胡黃蓮生薑汁炒刺蝟皮一兩淨瓦上

乾真麝香二分共製研末和勻以軟飯壽為丸如麻子大每服錢一

食前酒下如服藥後膿水反多乃藥力到處不必懼也。

### 消管丸

凡一切腸臟痔毒成管成漏服追管丸後再服此丸自然管消不

三三九

用刀鍼掛綫誠起痼疾之良法也 胡黃蓮炒取淨末穿山甲

一兩麻油炒石決明煨取淨末淨槐米微炒取淨末石末和勻

煉蜜為丸如麻子大早晚每服一錢清米湯下至重者四十日

可愈再服後完善丸如瘡口四邊有硬肉突出者可加鱸爾二

十個炒研細末和入前藥內為丸照前服法可愈

凡患痔漏服前退追消管丸病愈後不守禁忌或食猪肝番茄酒

色瘡必復萌急服此丸除根 夏枯草花十兩連翹五兩甘

草節五兩金銀花四兩共研細末以山東淨銀花一斤熬濃汁

法丸如棗豆大每晨空心淡鹽湯送下三錢若起漏一二年者

服一料全愈三五年者服兩料全愈此方乃 康熙年間浙江

提督陳山凱患痔漏用之屢效

石花膏

凡辛苦勞碌之人嗜酒多慾忽生外痔作痛難行服此得瀉可止

痛行走再用搽藥自能除根 麒麟菜一兩洗去灰用天泉水

凡懸癰生於肛門前腎囊後初發如松子大漸如蓮子大十餘日

赤腫如桃李成膿即破破則難愈延久成弱症初起急治

懸癰初起

大粉甘草剉截寸段以急流水一大盂文武火蘸水炙之水盡  
爲度劈開中心有水潤爲止如無再蘸水炙透槌碎每服兩  
用無灰酒二碗煎至一碗溫服次日再服服完消盡如消未盡  
再服一料無不愈前治一人年力少壯忽患懸癰漸大如桃  
李赤腫非凡難以行動隨用全蝎二十個洗去鹽瓦上煨研  
配胡桃肉二兩共搗勻用好酒送下一頓食盡次日腫痛減半又  
將前藥減半連服兩日患若失蓋治病原要審人強弱毒起遲  
速而施療治故不必拘於炙甘草之方一例而論也

### 大行斑瘡

凡比歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白頭  
漿水逐次隨生不急療治數日必死瘥後瘡瘢黯黑周年方退  
此惡毒之氣以蜜水通搽瘡上再以蜜煎升麻拭之內以蘆根  
湯煮粥食之

### 拔疔秘方

鮐魚鱗用手刮下不可見水陰乾收貯用時以銀鍼撥開疔頭  
將一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿揭開其疔連根拔出後再  
用生肌散收功前有兩婦人犬脚趾患瘡二年不收功將鮐



疔瘡走黃

紅絲疔

翻唇疔毒

丹石結毒

魚鱗一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日而愈

凡患疔毒誤食豬肉走黃法不在治 急烏芭蕉根汁服之立救

凡男女生紅絲疔須用鍼挑斷其絲將多年黃坑上碎椽子木煨

灰 用飴糖拌塗在紅絲疔上聽出疔瘡頭疔卽拔出無害若

不急治隔一日外卽難救治矣

凡少年唇口患疔並連七個頭腫如斗心悶神昏諸醫復絕有女

丐曰此名七星趕凡急以蜩蟲搗爛塗之頃刻瘡口流出黃水

腫消神清次日全愈治唇疔多效如無蜩蟲以五穀蟲錢一煨末

白礬分三蟾酥分三燒酒化洋其搗勻塗疔上少刻疔破流出毒水亦效

凡疔生唇口上卽看大腿腕有紫筋起者急用銀鍼刺出血卽瘥

凡服過房術丹石之藥變生淫濕廣瘡醫復圖速效投以隱藥治

之致成結毒終身不愈者用紅棗三斤以杉木作薪煮棗其火

逐次鉗出悶炭俟棗爛爲度剝去皮核將所悶之炭儘數磨末

和棗搗勻爲丸如彈子大每日任意嚼之以土茯苓湯過下久

久服之勿得間斷此治棉花結毒之要方也常服俱痊揆紅棗

楊梅結毒

能解丹石之毒杉木專祛濕熱之浸是以奏功如反掌也

凡遍身頭面魚口便毒疔赤腫痛甚極者立愈 土茯苓錢五銀花

錢一花粉錢五蜈蚣三錢去足錢一蒲公英錢一萆薢錢一穿山甲錢三

片全蝎三個天蟲炒芒硝五錢退五分土木鱉五分去

生大黃錢五生甘草五分大班毛五分老薑三片右以河水

三碗煎至碗半濾出露一宿去脚取清者空心溫服臨睡時將

口咬蘆管使火毒從上出而解大便瀉數次之後以猪肉好酒

啖之瀉止瘡瘡再服後方 槐米兩四川草薺兩四白薺皮兩三蒼耳

子兩二甘草兩一連翹兩二地膚子兩二胡麻仁兩二金銀花兩三共炒磨末

和蜜為丸如桐子大早晚以錢五茯苓煎湯吞錢三忌食茶

凡一切癰疽發背對口大毒腐肉黑暗死肌堅硬臭穢難聞用此

摻之膏藥蓋過夜即周迴裂縫與好肉分界膿流肌活肉色轉

紅疼痛稍緩其腐肉自化自脫不用刀針剪割穢氣亦無甚靈

驗 生白礬研 枯白礬研 腰而雄黃水飛淨 右共研極

細篩過再碾于餘愈碾愈妙裝磁瓶內勿使染塵凡去腐肉儘

黃靈丹

盤根癰毒

可用之若新肉上搽之要痛片刻見膿水即不痛矣如好肉與腐肉間濕須先將金花散搽好肉上腐處亦搽此丹自不痛也此丹用粉糊打條子亦可去輕淺不瀉之管屢效

爛腿賺瘡

凡生盤根牙癰毒串沿滿口腐爛其牙床骨竟有連身一扇脫落者須用桑皮紙搽此藥在上捲作紙撚式塞於牙根邊久塞可保不脫如遇飲食時可去藥條再換即口換數次亦無妨礙

凡男女新久爛腿並洩脚發賺瘡等症能去腐長肉收功名珍珠散 煨石膏研細末 飛淨東丹一兩 二味和勻再篩再煨如治

爛腿賺瘡用真香油調搽上益油紙一日一換不可用茶水淨

洗如有膿水流開只可抹在好肉上因瘡口若見濕氣收功最

慢如婦女一遇月經雖愈復發須再搽久則奏效凡諸瘡毒用

升藥提過之後隨用此散呼膿長肉將收口時用生肌八寶丹

生肌八寶丹

凡瘡毒膿腐已盡用此丹搽上自能生肌長肉平口收功神效無

比 珠母拾取露天蚌壳左磨者半片須 血竭三錢 蘆甘石三兩

以黃連二錢 煎出 兒茶一兩 火煨石膏三兩 赤石脂三兩 火煨

汁取露天蚌壳左磨者半片須 血竭三錢 蘆甘石三兩

陳年絲吐渣

一兩最不可過性

梅花冰片

臨用時將藥末五錢加入冰片一分

右藥共研勻細碾如香灰色磁瓶盛貯聽用此藥比珍珠西黃

八寶丹功效倍之幸勿輕視

### 頑惡毒腐黑

凡

### 靈丹

一切頑惡毒腐甚有如菌如芝去而復生綿纏不絕昇丹所不能提拔者必用此丹搽之遂漸可以起根拔盡多效

大巴豆

一名江子淘去泥

望麻子

不必去壳

以上二味連殼安於石

臼槌碎候天晴之日將風爐放在天井內無日色之處上放鐵

鍋以炭火用長柄刮刀將二味炒二日為度磨粗末照前式將

二味於鐵鍋內再炒三日去淨油氣方可研為細末磁瓶收貯

聽用刮刀須用長柄者恐柄短則炒藥者近鍋口巴豆之氣熏

### 環跳兩膝漫腫

凡

人環跳穴處及兩膝附骨等處感受風寒濕氣面上不熱漫腫

無頭皮色不變微覺酸痛攣拘若不即治變生貼骨等癰難以

收功急用此藥透出外格提移他處出毒屢用皆效

紫荊皮炒 赤芍炒 香白芷一兩 石菖蒲一兩 五錢

見火獨活

右藥依法共磨末以好酒和葱五莖煎

玉紅膏

滾調搽不必留頂一日一換以腫消不痛為度

凡一切癰疽發背對口大毒腐去孔深洞見隔膜者用此藥塞瘡

口自能生肌長肉收口 當歸二白芷五錢紫草二錢甘草一兩二錢

以麻油一觔浸藥七日煎藥枯去渣再熬油至滴水成珠下白

臘二兩攪勻離火畧冷次下血竭細末四錢輕粉四錢待成膏

蓋好聽用愈宿愈佳凡瘡口深陷以新棉花塗膏以塞之即日

痊可不得加減藥味恐反不效

驅毒散

凡毒發於骨節間不便出毒之處此藥能驅之或上或下使無殘

疾之患 白芨一兩紫花帶丁八錢烏雞骨一錢大雄黃一錢

硃砂一錢輕粉一錢五倍子二錢大黃二錢牙皂八分

共為末以醋調敷毒之上截即移至下半截矣屢試如神再仍

照病人之虛實內服藥餌

隔皮取膿法

凡患毒深遠刀難直取並患人畏懼開刀者俟膿熟時用此甚善

如膿不從毛孔出者若用此藥塗之其不捺之處旁邊綻出一

個自會出膿屢效 驢蹄皮一兩即脚底 蕎麥麩一兩草烏四錢

刮去皮研五錢共為末和勻加食鹽五錢以水糊作薄餅丸上炙微黃色再研細以米醋調攤白紙上貼患處其膿水從毛孔而出蓋以草紙溲濕再換水盡紙燥腫即消

跌打內傷

凡跌打內傷並閃挫風氣一切疼痛立效 當歸二錢 通草一錢

桃仁二錢 穿山甲二錢 茜草一錢 川桂枝五分 杜仲二錢 自然

銅醋煎 淮牛膝五分 製大黃二錢 中青皮一錢 骨碎補去毛淨二錢

乳香二錢 沒藥二錢 白芷一錢 紅花一錢 蘇子一錢 降香一錢

甘草一錢 血竭三錢 三七一錢 地鱉蟲店內多有石南枝頭三錢

共煎湯加童便一酒鍾老酒一酒鍾溫服極重二服可愈今改

為末子藥如遇病不重者只需每服吃末子五錢外加童便一

盃老酒一盃送下輕者三服重者仍照方煎服

箭鏃各傷

凡箭鏃所傷血出不止用真降香末敷之即血止明日結痂無癢

軍中常帶之 又用栗炭燒紅透研細末乘熱罨之即止血疔

皮金膏

治跌仆擦傷釘鞋打傷足跟病久陰瘡擦痛並凍瘡足跟腫爛凡

小擦傷足跟並刀傷皮光潮濕皆效用 廣東皮金紙一張此

洋皮照患處大小剪取將金而貼傷處過宿即愈軍中宜備杭  
城雜貨店亦有售者

### 重物壓傷

凡手足肩背被重物打傷或青腫紫赤血痕疼痛不致內傷

以蘇木煎汁磨真降香塗之不可落水連擦數日其腫自散

又外治方以虎膽草搗爛擦之即愈

### 脇破傷出

凡人或因跌打急以油沫入煎人參枸杞淋之連食羊腎粥十日

愈冷水噴面更妙

### 破傷風

凡遇刀傷撲跌破傷風用天南星防風等分為末好酒調敷瘡口

即服後藥天南星防風白芷天麻各等分研細

末每服三錢童便和好酒調服即咬牙縮舌腰背反張勢在垂

危服之立可回生有瘀血者亦效再治破傷風以及婦人產

後驚風先以手三指並連直插人病人口內可入者易治若

止有二指可入者其症必危難治驗其病可先知生死等症

降香末搽之包以絲棉七日不可落水昌風不必再換二次

被人咬傷若牙黃入內不去必爛毒難愈速用人尿浸一二時

### 誤斷指頭

### 人咬傷痛

### 易簡新編

隆傷脚域

辰待其牙黃毒出然後用藥。用荔枝核焙研篩細搽之外用荔枝肉蓋貼雖落水亦不爛屢試如神。或以青州柿餅一個令人嗽口潔淨將餅咀嚼盛磁器內飯鍋上再蒸極爛敷之三日愈。蜈蚣一條研末。葶薺一箇去皮。葱管七寸共搗如膏貼患處周時一換五日其域根脫出。

跌打損傷

凡一切跌打損傷遍身青腫瘀停作痛及墮仆內傷一服即愈。白木耳四兩焙為細末每服一兩用麻油三匙串好酒調服日服三次藥完全愈。此方係那督憲蒞浙頒刻印示傳佈以惠民皆效。

皮破出血

凡跌撲皮破刀刃損傷金瘡流血搽此即止血生肌。

陳礪炭四兩大黃片二兩同炒至石灰銀紅色為度揀去大黃

將石灰碾細貯瓶聽用。或以陳年石灰研細將葦菜汁拌勻

如膏搭於無風兩日曬牆上俟陰乾取下再貯聽用。或以

生半夏末亦止血定痛。

內傷入發

凡跌撲隆傷胸脇腰肋等處並肩挑負重失足躓筋初時不覺延



至經年累月忽然疼痛浮面按之不痛擊重方覺或咳嗽吸氣

牽掣弔疼此乃內傷氣逆血滯日久恐患確毒 生大黃一兩

燒火席炒以老薑二兩串滾水一盃絞汁隔湯熬熟調大黃末如

膏塗於痛處不必留頭蓋以粗紙外用棉繫之一日一換三日

即愈如傷三五年者亦效此方比閃胸膏功勝十倍

### 竹木五刺

凡竹木刺入肉不出者用 蝦鹿角末以水調敷立出久者不過

一夕即出如磁鋒缺脚用三角白果去壳衣心以菜油浸透搗

爛作餅貼之再易而愈 如多年爛者四五次即瘥 若初起

者以生白果肉搗爛罨傷處亦效

### 閃腰挫氣

用番葡萄乾一兩好酒煎服重者兩三服即愈 或以礪砂研

細末點眼睛四角亦愈 或以王不留行一錢二分炒研細末

用好酒調服即愈 以上三方屢試皆驗

### 脩煉花蕊石

治一切金刃箭鏃傷及跌撲損傷狗咬至死者急以此藥搽傷處

其血化為水再搽便活更不疼痛如跌撲內傷血入臟腑用熱

酒與童便各半調服一錢隨量飲酒蓋煖安臥醒時即定痛行

疾無害兼治婦人子死腹中胎衣不下等症用童便温服一錢

無不立效 明硫黃 四兩 花蕊石 一兩 各錘碎如黃豆大用有

蓋無銑紫砂瓶一個將藥拌勻裝入蓋好封固再用紙巾黃泥

周圍糊上須一寸許厚候泥乾燥再將細鐵絲周圍紫緊仍用

紙巾黃泥周身糊上一寸許厚放於臨風處不見日色候乾勿

使泥上開裂然後用潔淨方磚一塊上用銀硃書五字外書硃

八卦 畫卦要從下 安磚於爐內以火字朝南向火門擇上吉閉

日齋戒沐浴將藥安放磚上土字上用燥銀炭十觔籠疊周匝

爐火自時寅發火先支後武漸漸上澈候炭燒過為度經宿勿

動次早取出研細末貯瓶聽用勿使走氣

方磚上硃畫八

卦中畫一圈放

丹瓶離南坎北

須依方位安置

三

三

三

三

三

三

三

三

火氣恐大須

砌紙爐以免

火氣冲延並

防露天風雨

面目傷腫

眼目打傷青腫以生半夏末水調塗即愈 凡指爪抓傷以橄欖核磨水搽之過宿則無痕跡

頸生痰核

全蟲一個用冷苦茶洗淨鹽味 以核桃一枚將肉取出置全

蟲於核桃殼內用黃泥裹好人灰火內煨好取出全蟲研末以

紹酒沖服每服一個不拘幾服痰核消盡則不必再服矣

縮瘤膏

凡瘤初起者縮之可以消除已成者縮之可不再大 海藻二兩

昆布二兩芫花二兩用青炭灰水熬化成膏再加入米醋一飯盞

將生南星二兩生半夏五倍子一兩其為細末加風化反炒紅

大黃末二兩收為膏縮之百日為度縮過百日初起者如不消

再縮俟消盡不縮已成者縮過百日自然不大不必再縮矣

凡未成膿者以柏葉搗塗熬鹽熨之氣下即消

鼠瘻核痛

舊琉璃燒灰菜油調搽神效

頸上癭瘡

凡未潰者內消已潰者亦愈外貼太乙膏收口而愈

方

夏枯草八兩元參五兩青鹽火燻過海藻兩天花粉一兩生地一兩

川大黃酒蒸貝母一兩海粉一兩白欬一兩薄荷葉一兩連翹一兩桔梗一兩

諸毒腫方

當歸酒洗一兩 枳殼麩炒一兩 焰硝一兩 甘草一兩 右為細末酒糊跌為丸

菜豆大食後臨卧低枕用白滾湯吞百餘丸就卧一時妙

杏仁不拘甜苦皆明剖開兩瓣擇邊稜齊全者數枚塗以塘雞糞加麝

香些須罨在瘡上移時毒聚則杏仁迸起乃毒未盡也即以第

二枚罨之毒起必輕無不愈者以毒盡所罨之藥自脫為度

巴膏

凡一切大瘡無名腫毒及痞塊惡毒神效 木鱉子二耐 象皮一耐

大穿山甲油煎化為度 巴豆仁三十粒 芝蔴油四斤 山梔子八十個

殼煎化 桃柳楊槐桑嫩枝各九條 將香油煤枯樹枝用鐵絲小

去渣 網撈出再入前藥煤化用絹袋濾去渣滓將前油復入鍋內熬

沸撤火稍定人炒過黃丹攪勻將鍋取起再入血竭三錢 兒茶三錢

製沒藥三錢 乳香三錢 硼砂五錢 細細攪勻用涼水一盆將膏傾入水

內用手扯藥干餘遍再換水數次拔去火氣收貯磁罐內臨用

重湯燉開攤貼忌用火烘

無名腫毒

澤蘭葉兩 廣膠五錢 另器酒化 沖入 白芨三錢 白芷三錢 淮牛膝三錢 人以臍為

中如患在臍以上及頭面者去牛膝人白芷在臍以下及足膝

惡瘡不斂

諸瘡年久不瘥

腦疽發背初起

者去白芷入牛膝上下俱患者二味並用水煎臨卧時服接飲

熱陳酒必得酩酊蓋被出汗為度已潰未潰服一二劑即愈

瓦松陰乾為末先以槐枝葱白湯洗淨搽之立效

鱖魚殼灰和醬塗之

採獨莖蒼耳草葉子用細切不見鐵器用沙鍋入水二大碗熬

至一碗如瘡在上部飯後徐徐服訖俟吐出吐定再服服以藥

盡為度如瘡在下部空心服瘡自破出膿以膏藥貼之並一切

惡瘡均治

發背對口

宮粉兩輕粉 銀硃 雄黃 乳香製沒藥分五厘各二

共研極細末先將好茶葉煎濃湯洗患處後將獐猪腰子切開

糝藥五分蓋患處待藥如蒸良久取去一日一次拔毒滅痛潰

出膿穢不可手擗輕者二次愈重者七八次可愈此方濟人甚

多一切癰疽潰爛有回生功效

拔毒異法

以極細鐵屑將好醋調之煎一二沸撈起醋中鐵屑鋪於患處

將上好磁石即吸鐵石頻頻吸之其毒自出

易簡方編

卷五

三

腫毒等瘡

紫花地丁三伏時採收晒乾研末飛羅麪為糊將末和成餅收貯臨用鹽醋浸一宿貼之甚效。

癰大臭爛

凡癰大如盤臭不可近用梧桐葉醋蒸貼之退熱止痛漸次收口秘方也極有神效。

腸癰不可藥治

皂刺紹酒煎服即從小便出膿立效。

對口初起

蛇蛻一條煨灰以好酒調服不論偏正立驗。

呂祖治發背

桐廬一人因母患發背百治不痊祈禱備至一夜夢祖師曰君至孝格天命子救汝若遲一日即不可復療遂授此方得痊留以傳世 括藁五枚取子去壳乳香五塊如棗大者二味共研細末以白蜜一斤同熬成膏每服三錢溫黃酒化服。

發背神方

狗牙要大者炒黑研細末聽用將生葱熬湯洗瘡再將前末用好醋調敷患處。

又方

鮮苦參根水洗淨搗爛同雞蛋清攪如糊未潰者滿塗之已潰者四圍敷之中心留頂若經時藥乾以井水掃潤之有起死回生之功真神方也。

發背膏藥方

此方得之甚難禮下於人設法購求方得到手合藥施送無不立

效 滴乳香

苦包燒淨末藥

神聖去油鮮紅血竭

白色兒

茶 上好銀硃

杭州定粉

上好黃丹

各四兩

上好銅綠

以上各藥另碾無遺篩細末共一處臨時照患瘡之大小用夾

連四油紙一塊用針多刺小孔每張秤藥末五錢用真好芝蔴

油調攤在油紙上再用油紙一塊益上周圍用線將二紙合縫

一處貼瘡上用軟絹紮緊自然止痛化腐生新過三日將膏揭

開濃煎葱湯將瘡上洗淨軟絹拭乾將膏翻過用針照前多刺

小孔貼之因藥品甚貴取其又得一而之藥力也無火之人

內服十全大補湯有火之人減去肉桂薑棗煎服兼以飲食

滋補無不取效至重者用膏二張百無一失寶之

紫花地丁三伏時採收晒乾為末飛羅麩為糊將末和成餅收

貯臨用鹽醋浸一宿貼之甚效

對口仙方

此名天疽十有八九無可救者豈可不慎乎急用鯽魚一尾去鱗

腸搗爛入頭垢

五

六錢再搗極勻

加蜂蜜半盃攪勻從外圍入

三香定痛飲

裏面留一孔出毒氣二次全消即時止痛如已成形有頭將出膿或他醫已治不效而出膿者內服三香定痛飲則能起死回生

木香 黃芪 紫蘇 人參 厚樸 甘草 桔梗 官桂

烏藥 當歸 白芍 白芷 川芎 防風 乳香 沒藥

右藥無分兩臨用酌定用水二鍾薑三棗煎八分食後服

又方

對口瘡方

薑汁磨金墨四邊圍住以白梅猪膽塗瘡口即愈  
黃臘一兩 頭髮三錢 宮粉三錢 麝香少許 香油三兩

右藥先將香油熬滾入頭髮次入黃臘化開再入宮粉畧熬

一滾退火入麝香將古乾紙裁成方入油內即取出冷定或

用五張或七張貼患處即出膿再貼十餘張即愈

各種癰疽瘡

凡一切癰疽及無名腫毒不論陰陽已潰未潰

桑條如手指粗細二根炭火上燒著一頭吹滅川心蕪瘡如

未成者便消或已成者便破有疔去疔有毒去毒蕪瘡者不疼

即安蕪不疼者若疼即愈

烏龍膏

凡一切癰疽發背無名腫毒初發焮熱未破者神效



腸癰

陳粉子隔年小麥粉砂鍋焙炒初炒如錫久炒則乾成黃黑色冷定又放地上放出火毒研為末陳米醋愈好調糊熬如黑漆磁確收貯臨用攤紙上剪貼之即如冰冷疼痛隨止少刻覺痒乾亦不可動或纏裹之久則自消心盡脫落藥易功大濟生者珍之凡小腹堅硬如掌而熱按之則前肉色如故或痠赤微腫小便頻數汗出憎寒脉緊實而有方服此效樸硝一錢大黃炒白芥子

大小腸癰

丹皮 桃仁各二錢右藥用水二盞煎八分食前或空心温服凡小腸癰則左足縮大腸癰則右足縮是也

項癭瘰

危急肺癰

地榆一斤 水十盞煎三盞再用生甘草二兩 金銀花一兩 再煎一盞空心服一服即消久亦不須兩服也但忌房事餘不必忌猪喉下肉子七枚研細每夜黃酒服一錢忌酸鹹油膩寒氣物橘葉絞汁 熬服之吐出膿血即愈

肺痿

凡肺癰者先因感受風寒未經發越停留肺中亦有七情飢飽勞役損傷脾肺而生者又有勞力內傷逆風響叫外寒侵入而生者其初則主登惡風咳嗽聲重胸膈隱痛項強不能轉側者是

又方

其真候也久則鼻流清涕咳吐膿痰黃色腥穢重則胸脇脹滿呼吸不利飲食減少脉洪自汗漸至久咳帶傷咳吐痰血寒熱往來形體消瘦咯吐痰膿聲啞咽痛其候轉為肺痿如此者百死一生之病也 大瓜萸一個開一孔內有子多少粒數配杏仁焙皮如數入瓜萸內將孔封好用黃泥包裹煨紅無烟候冷去杏仁將瓜萸又配貝母如前數共研為細末臨卧時將燈心湯漱口後用蜜調服二錢

肺癰咳嗽

嗽唾寒熱氣結頰赤童便五合大粉甘草寸許四破浸之露一夜平旦燉服一日一次

咳唾膿血胸中隱痛者用薏苡仁畧炒為末糯米飲調服或者煮粥或水煎服當下膿血即愈

又肺癰奇方

凡人肺癰初起時咳而兩胸即疼者是也宜速服此方

元參半斤天冬四兩桔梗二兩炙甘草一兩

右用水十盃煎至二盃再用蒲公英五錢金銀花五錢再煎一盃飽食後服之初起者即消日久者即生肉奇方也

疝風瘡

金頭蜈蚣 一條去頭足瓦上焙 雄黃 錢硫黃 一錢

右共研細末夏月用白茄子搗汁調擦冬月用柏油杵膏塗之臥塗於面次早洗去半月全愈

肺風瘡

黑芝蘇 去皮 蓮肉 不去心水浸軟 每早食之

懸癰

凡此症由於三陰虧損濕熱積聚而成此穴在於穀道之前陰器之後又為海底穴也初生狀如蓮子大小痒多痛日漸如桃李

大赤腫掀痛潰後輕則漏漏重則成癰盡氣血變為勞瘵不達

者多矣用大粉草 四兩 長流水浸透炭火炙乾再浸再炙如此

三度切片甘草 三兩 歸身 三兩水三盞漫火煎至稠膏去渣再

調煎稠厚為度每用 三錢 無灰熱酒一大盃化膏空心服之末

成者即消已成者即潰既潰者即斂此懸癰良藥也

囊癰

凡小腹作痛牽引腎子多寒少熱好飲熱湯乃疝氣也如陰囊紅腫發熱小便赤澀內熱口乾隨腫作痛乃囊癰之候不宜用疝

家熱藥宜清肝滲濕湯主之 川芎 龍膽草 天花粉 一錢

當歸 錢 生地 錢 柴胡 錢 山梔子 錢 黃芩 錢 澤瀉 分 木通 分 甘草

所加燈心水煎服食前飲之潰後燂藥用丰殼黃連青

黛各等分研極細敷之

抱出雞卵殼黃連輕粉等分爲末以煉過麻油敷之

洗痔方

河邊柳根鬚一把白芥子錢花椒錢煎湯薰洗其蟲頭黑白

從瘡出立愈芥子花椒不拘多少

外敷藥方

大黑棗三枚剖兩片去核入銅絲脚住外以淨紅土和泥包好

煨紅取起去土研細真蘇油調塗

痔漏丸方

當歸酒洗川連酒洗象牙末錢淨槐花錢小川芎酒洗滴乳香

二錢露蜂房樹上者槐樹上者佳右共研細末黃蠟二兩

溶化入前藥末爲丸桐子大每服五十九丸空心煎蘆湯送

下至五日漏孔內退出肉管待二指長用剪剪去再退出再

剪之內管盡出自然從內生肌長肉愈矣神效之極

疔瘡方

菊花四兩甘草四錢水煎二大盃服如疔瘡有絲者以燈草

一根蘸油迎絲頭連燒十餘次並燒瘡頭皆燒至不疼又燒至

復疼卽止

見疔苗速效方 凡患瘍症見食惡心不能食乃毒攻心也急服

菜豆粉一兩乳香三錢去油 每服五錢用甘草水送下如心

慌加硃砂三分酒調下亦可此為護心散

唇疔

以大腿灣中紫筋上銀針刺出血即愈

破傷風方

鴿糞尖者炒一錢 白麥麩炒一兩 蘇不拘兩數燒存性

以上三味為末如遇破傷風腫得頭如斗大或垂死者用黃

酒調服汗出即愈真奇方也

又神方

用手足十指甲香油炒黃為末黃酒沖服汗出即愈

又方

槐子合炒黃 好酒一碗煎入分熱服汗出愈

一切魚口便

凡二三年不愈者服此如手取之效

毒頑瘡

川大黃一兩香白芷三錢獨活三錢天南星三錢製半夏三錢

天花粉三錢大貝母五錢穿山甲五錢

右共研細末每藥一兩加粉霜三錢糯米濃汁為丸如鳳仙

花子大硃砂為衣每服三分空心白滾湯送下一日一服即

用柳根白皮熬水漱口十餘次不過十餘服即痊其毒從大

便而吐不洩極為平和。

魚口方

牛牙煨灰研末每服一兩黃酒調下一服愈。

坐板瘡神方

松香宮粉分等入葱管內瓦上炙乾為末真麻油調塗二次即愈。

或蚌殼燒灰存性研末和真冰片少許搽上二次神效。

乾疥腫痒

水銀錢輕粉錢潮腦錢大楓子肉耐杏仁皮尖蛇床子錢右為細末以舊油燭油調勻先以肥皂水洗澡塗患處愈。

鬚邊疽不愈

猪猫頭上毛各一撮燒灰加鼠糞一粒為末清油調塗立愈。

脇疽

赤小豆末敷仍煮豆食飲汁。

骨疽

瘡口不合骨從孔出掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞糞二升同艾及荆葉搗碎入坑內燒烟將疽就薰用衣擁之勿洩半日當有蟲出。

糯米粉合鹽嚼塗之。

兜糞杓上竹箬燒灰

蛇纏丹毒

研細用香油或麻油調塗患處愈。

赤白蛇纏瘡

荔枝肉同麻油嚼敷。

天蛇頭疔

羊糞晒乾研細篩過用老鼠煎油調搽二三次即愈且能生髮。

弄蛇

秃瘡

蕎麥麩

一兩炒黃研細 硫黃 五錢研細

右共研合勻 或羊油 或髓油 亦可調勻搽之

牛皮癬效方

牛膝 三錢 寒水石 三錢 白礬 二錢 花椒 一錢 五分

右為末以健猪油同雞蛋清調搽即愈

一切頑癬

雞子 四枚 和香油葱椒 炒作餅子 乘熱貼患處 乃效

牛皮癬方

烟膏即硝牛皮 刮下者 藥舖上買 研末 菜油調搽即愈

膿窠瘡

最舊羅緞鞋 一雙 最舊年久絲棉絮筋 二種 俱燒成灰 候冷 再用大楓子肉為末 合一處 以香油調勻 敷之 兩日全愈 如未乾

燥者 以灰摻之 乃效

漏瘡

人牙 灰 油 髮 灰 雄雞內金 灰 各等分 為末 麝香 輕粉 少許 油 調

甘露丸

比眼漏鼻漏 膝漏 或周身 或一處 不等 及諸瘡 年久不愈者

悉能治之 象牙末 八錢 飛白礬 五錢 大螞蜂窩 帶子者 七個 砂 六錢

刺猬皮 一張 以上二味 瓜兒血 渴 錢 明雄黃 七錢 兒茶 四錢

滴乳香 三錢 去淨油 沒藥 三錢 共研細末 溶黃臘為丸 如桐子

大每服二十四丸 槐花煎沖黃酒 空心送下 藥內加白頸蚯蚓

大麻風癩

槐花更妙服藥後忌醋葷腥氣惱

黃蘗末 皂莢刺灰各三錢 空心酒服下蟲物並不損人食白

粥兩三日服補氣藥數劑名神效散如肢腫用針刺出水再服

忌一切魚肉發風之物

癩風眉落

生半夏末 羊屎燒焦等分生薑自然汁調塗之

騎馬癩方

金銀花八兩煎水二盞 大黃兩當歸兩牛膝三錢 車前子五錢 生甘草五錢

地榆五錢 右藥共煎至半盞空心服用後即臥睡醒病失矣過

一日微瀉而愈神效奇方也須忌房事一月為要

上疔方

上疔者喉疔牙疔口疔等症也 輕粉三錢 硃砂七厘半

冰片二分 共研細末吹入口內無不效臨吹先用薄荷湯漱

爛膀瘡方

生石膏研末極細和粟丹桐油調搽三四次 愈

雷頭風

頭面疔瘡腫痛憎寒發熱狀若傷寒用荷葉一片升麻蒼朮各

五錢水煎溫服

搭手

全蝎去毒 三五枚 核桃肉研末 好酒沖服三四次 卽消

癩瘡久害

用葱白健猪油去膜潮腦五六錢 共搗極爛先用防風金銀花



多年腫瘡

甘草煎湯淋洗患處按乾後將前藥厚厚敷上用薄油紙裹好  
外用舊棉花紮緊一日兩換不可見風忌食發物數日生肌愈  
藥用磁盒緊盛莫洩香氣此方又可治杖瘡而跌打皮肉損傷  
此密雲縣牛蘭山楊醫傳 跌醫辨下疳疔皮不拘多少砂鍋內

又方

炒黑存性研末 芝麻油調搽患處如瘡濕者不必加油乾敷之  
即愈 此瘡百方不效者用此藥神效  
舊牛皮鞋掌取破碎者用陰陽瓦煨存性為末麻油調敷之愈

黃瘡羊鬚瘡

宮粉 松香 共研末燈盞油調搽之

漆瘡

石灰水調敷上一日除根

流火神方

夏枯草一斤 水二碗放養內薰痛處立止

小兒頭疽

用有妻室的卧房內地下脚踏處取土煨過用麻油調搽疽周

足瘡

圍留頂上如棋子大凡其膿血出效。或用鱸魚尾貼上亦效

甲疽膿血

甲疽鹽湯洗煨綠礬研末厚敷之

疔腫痛

努肉裏趾牡礪 棟厚處生研末紅花紹酒煎每服二錢仍用敷

赤小豆浸軟杵末水調塗之即消

赤小豆浸軟杵末水調塗之即消

濕痰流注

薑黃母子 大薑黃身上小釘子是也 為末小紅棗去核將藥末

入內填平用絲棉扎緊塞入鼻孔內隨量飲酒醉蓋煖出汗已

潰者自然愈未潰者內消神效之極真照左右塞之不可經婦

女之手

塗書瘡

並治頭疼耳邊發腫太陽疔腮疼不可忍 大黃一兩青木香三

薑黃三錢枳榔三錢 右藥共為細末用醋蜜和調塗患處中留一

孔乾則易塗二次愈

耳面肥瘡

馬齒莧為末和黃蘗末搽之

敗毒散

治一切諸瘡皆可服 金銀花兩當歸兩蒲公英兩荆芥錢連翹

錢生甘草錢三天花粉錢牛蒡子錢加燈心七根煎服

痔方

頂大木瓜一個 浸膏梁燒酒十斤封埋地中一月取出隨量飲

之酒盡自愈

破傷風方

老鷹一隻燒灰存性酒送下

癬方

雄黃一錢滑石一錢 硃砂一錢 共研細末搽患處

湯泡火燒

茶葉嚼爛敷患處即愈

化耳聾方

雄黃一錢 輕粉八分 鹵砂三錢 冰片五厘 共為細末用草筆

生猴子方

點上化為水每日點五七次不等 蜈蚣大鉗挑猴子其軟如腐挑盡白愈

重門止血

參三七 白蠟 乳香 降香 血竭 五倍子 牡蠣 上

魚口便毒

藥各等分不經火為極細末敷患處立愈 斑毛此個要頭雞蛋足俱全者將蛋頭打一孔用筋將蛋清黃攪勻再

消諸核方

將斑毛填入蛋內用紙打濕包固好入火灰內煨熟去殼將蛋 同斑毛細嚼用黃酒送下其毒從小便出即愈

凡毒塊毒核及痰核癰癧初起者敷之立消無不神效

昆布 天南星各二兩俱生研忌火梅花冰片五分 共和勻研極細末須晒燥

生研切勿近火

研細以錫盒盛貯勿令洩氣用時以薑汁醋蜜 三味調塗患處

跌打損傷方

四川提督軍門某昔得秘方治跌打損傷極效雖重傷瀕死但 有一絲之氣者立甦前任福建副將時軍中有一弁相鬪皆至

重傷其一則死矣馳往視之其一惟心頭有氣尙微煖亟命以

易簡新編 卷五

藥灌之覺胸間喀喀有聲不移時張目索食翌日遂能起行自  
後屢著神效其方或於重陽日或於十一月採野菊花連枝葉  
陰乾每用菊花一兩加童便無灰酒各一盃同煎熱服

跌打損傷氣

凡跌打損傷氣絕不能言者急以葦汁和童便蓋灌之或以昏

絕

迷不省人事者用蘇木錢二白蘇皮錢二細木耳錢二俱放瓦上焙焦

色木耳更要焦為妙共為末黃酒同黑糖調服服後將酒飲醉  
避風睡一宿即愈

跌打及

川蘇分一木香分二紅花分三甘草分四石研末黃酒送下均生用

跌撲

宮粉一錢和水服之愈

刀傷

千年石灰 輕粉 血竭 白蠟 研末摻之外以隨便膏藥

金瘡折傷

凡金瘡或磕損折傷血出不止疼痛難忍者 葱白 沙糖各等

金刀傷

研為泥封瘡口其疼立止又無疤痕之妙在寒泉試過應驗如神

刀傷急救

龍眼肉核剝淨外面光皮只用其仁搗爛研極細末填敷傷口即止  
柿餅搗爛塗之血止傷口自合

打傷方

白蠟兩 藤黃錢三 入麻油溶化塗傷處立愈此方止痛止血及湯火傷皆妙

壓倒打死

凡卒墮壓倒打死心尚溫者將本人如僧打坐令一人持其頭髮稍放低用半夏末吹入鼻中後以薑汁真麻油灌之再以乾

荷葉燒灰熱小便調下三錢日進三服自愈

箭鏃鉛彈傷

乾莧菜烏鬚和沙糖塗之箭鏃鉛彈皆可出

箭鏃及在喉

並在內不出者用 螻蛄即濕地上夜鳴拉呼腦子搗如泥敷

上不過三五次即出

墜車落馬筋

元胡索末好酒服二錢日進二次即愈

竹木刺入喉

故鏹燒紅浸酒一鍾乘熱飲之極妙

接骨神方

旱公牛角一個火上炙乾黃米麩不拘數榆樹皮白不拘數

花椒六七粒楊樹葉不拘數右共研細末以陳醋熬成

稀糊用青布攤貼再用長薄竹木片纏住時刻聞骨內響聲不

絕俟定即接 如牛馬跌傷及樹株皮風刮折者以此藥照法

治之俱效

砒霜毒

鎗刀傷重

狗咬成瘡方

惡蛇傷

救砒霜毒方

解諸骨哽方

雞骨哽方

雞骨魚刺

湯火傷

白明礬一塊 水一盃用銀簪順打起沫吹去沫又打又吹沫盡

止飲下吐出即解矣打沫不可逆行必要順打為妙

人參三七分輕粉分血竭一分象皮一分錢一分乳香錢二分

白蠟二分沒藥去油二分千年石灰六分降香錢一分冰片一分

右為細末敷傷處止血生肌長肉止痛神效

銀杏嚼細塗之

凡蛇傷頓撲不可療者 香白芷為末麥冬去心濃煎湯調下項

刻傷處出黃水待腫消皮合仍用此藥渣敷之 或以青木香

即馬兜鈴根水磨敷之仍煎湯飲吐妙

無名異即藥子漆匠用以煉桐油收水氣者研末吞下即活

艾葉煎酒服 或將栗子內衣燒灰服 或將虎骨研末服

或將狗倒吊取涎服 或將象牙末吹之

水仙花根汁服之 或服玉簪花根汁 或將雞燒灰水服

金鳳花子北名海南花炒為末吹入即出 或下

凡湯火潑燒急覓水中大蚌置磁盆中將其口向上無人處用冰

片三分真當門麝三分爲細末俟大蚌口自開時以匙挑冰麝

二 分傾入蚌口內其口自合而蚌內之肉悉化爲漿然後再

入冰麝少許用雞翎粘掃傷處先從四邊圍層層掃入每日用

二 杖痛處自滅及其火氣已退將用下蚌殼燒灰存性研細

末入冰麝少許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四面擦起漸及

於中亦可漸瘥或以杭粉爲細末同婦人所用好頭油調塗

如無柏子油亦可或用多年陳醬寬寬塗之再著人嚼生芝

蔴塗隨乾止痛如患處寬大令衆人共嚼塗之立愈

白蘿蔔生者嚼汁嚙之立爽

舊葫蘆瓢燒灰敷之

不論人屎馬屎鼠屎燒灰猪脂調塗內服蘇木湯一碗卽止痛

或服童便韭菜汁亦妙

真蘇木爲極細末摻於斷指間接定外用蠶繭包縛牢固數日

如固亦治刀矢所傷

凡跌撲損傷血流不止者 天花粉 五兩 薑黃 兩 赤芍 兩 白芷 兩

截血法

少林接指方

烟薰欲死  
湯火傷灼  
馬咬及踏傷

人咬傷

俱不見火為細末，青茶敷傷口，四邊其血即止。傷在頭上，敷頸周圍傷在手足，塗臂腿，上節如傷口肉硬，被風毒所襲，加獨活酒調敷。又不消，加紫荆皮末調敷，立愈。  
熱水淨去牙毒，淤血口嚼生白果塗之。如痛用芝麻油紙撚火煙薰即好。或搗生栗子敷，每日一換，止痛消腫。或濫瘡雞糞塗之，止痛不作膿。

箭頭入肉

如咬指爛欲脫者，鰲甲燒灰存性，麻油調塗。栝萸根搗敷之，曰三易自出。亦治鐵針入肉。

刀傷

凡殺傷不透膜者，乳香沒藥各一皂角子大研爛，童便半

盞好紹酒半盞同煎至半盞服之。須臾再用烏賊魚骨或龍骨

亦可為末敷傷處，若有預製花蕊石散敷之更妙。前有人見

殺傷氣猶未絕，急取葱白不拘多少遍敷傷處，繼而呻吟再易

葱白傷者無痛矣。此係推官宋家驗傷治法，見洗冤錄。

刀傷血出不止

真降香磁瓦未於石研細敷之。

金瘡腸出

小麥多用水煮瀝汁待極冷，合病人臥席上，含汁噴其背，則腸



自刎斷喉

七釐散

漸入初噴時勿令病人知勿使多人在旁言語如腸尚未入指  
席四角輕搖則自入既入須用麻油潤線縫之仍以潤帛紮束  
慎勿驚動免瘡口復逆洗冤錄載

須救在早遲則額冷氣絕乘初刎時氣未絕身未冷一面將頭  
墊曲合龍刀口拭去血一面急用大雄雞一隻快手輕去其毛

生剝皮乘熱包貼患處完好安穩枕臥自然漸醒善為調理愈

硃砂二錢真麝香二厘冰片二厘乳香五分沒藥半錢兒茶二錢

細紅花五分血竭兩右共細末於端午正午時製合磁瓶收

貯黃蠟封口勿令洩氣貯久更妙或端午時未預備此藥者即

選天德月德日合製事急臨時配合亦可服之只須七厘不可

多服孕婦忌服此散端治金刃跌打損傷骨斷筋折血流不

止者先以藥秤準七厘燒酒沖服量傷之大小再用燒酒調敷

如金刃傷重或人食喉割斷不必用雞皮包紮急用七厘乾摻

傷處止痛止血立效此方傳自軍營凡打仗受傷有起死回

生之功兩廣雲貴得此方者調治鬪毆諸恙重傷無不立痊竊

湯火傷

念藥既平淡配製甚易而奏功神奇較鐵扇散為更捷既救人  
生且息訟端願仁人預為製合以備送救急之用

凡湯火泡傷者切勿以冷水冷物淋搨恐熱氣內逼有爛入筋骨  
之患傷甚急飲小便一盃免火毒攻心若急迫無藥先以食鹽  
研末摻之護內不壞然後用藥敷之 生大黃不拘分兩先將  
桐油敷患處隨將藥末撒上即覺清涼其痛即止愈後且無痕  
跡一切單方皆不及此此方能立刻止痛也 又方用尿桶中  
宿尿或澆或浸一時之久再以蜂蜜麻油調敷此二方取之至  
便並垂危者亦能治之

湯火傷膏貼

凡有治不得法以致焮赤腫痛毒腐成膿用此膏貼之止痛歛  
麻油四兩當歸一兩入麻油內煎焦去渣再入黃蠟一兩攪化

隔水拔火氣以布攤貼取效

撲打猝死

凡撲死者但須心頭溫暖雖有經日亦可治先將死者盤屈在地  
上如僧打坐令一人將其髮捻住放低用生半夏末以竹管吹

入鼻中久之即活再以生薑自然汁灌之五絕亦治產暈邪  
魁自縊溺死屬死

撲折欲死

凡撲折及從高墜下木石傾壓落馬墜車以致瘀血凝滯氣絕欲

死者倉猝無藥急以熱小便灌之免惡血攻心再用乾淨黃土

五升槌碎甑蒸熱舊布重包二包更熨傷處數次痛止傷消但

不可太熱恐燙傷皮肉

跌壓傷死

凡跌壓傷重之人口耳出血昏暈不醒但看面色尚有生氣身體

尚軟皆可救治但不可多人環繞嘈雜驚慌致令魂魄不復急

令親人呼而扶之就坐於地緊為抱定曲其手足如僧打坐一

般隨以熱童便頻頻灌之即大人溺亦可須未食葱蒜尿色清

中服若有馬溺更妙強灌得二杯下喉便好然後輕移於相

呼之人懷中拖入室內如前坐法更以足心緊抵糞門不令洩

氣並將窗櫺遮蔽令暗一面以加味四物湯近身旁煎之傾入

碗內即放鼻下薰之總以使受傷者聞藥氣入腹則不致入口

惡逆乘熱用小鍾灌之如難急受少頃再灌陸續灌完不可使

臥其糞門更須頂緊恐其氣從下洩以致不救也必俟其腹中

動而有聲上下往來數遍急不能待方可使解不得令其早解所下盡

是瘀紫毒已解下方可令睡必至瘀盡所下是糞始停前藥否則再服一劑次第調理不可輕用補藥

加味四物湯

桃仁去皮尖 紅花 兩 山查 兩 生大黃 兩 當歸 二兩 川芎 二錢 炒白芍 三錢 熟地 九錢 用急流水急火煎數沸和童便一大盃灌服

附子餅炙法

凡潰瘍氣血俱虛不能收斂或風寒所襲氣血不能運行 生附子末黃酒和作餅分半厚安臍上以艾炙之每日數壯但令微

熱勿令疼痛餅乾再換以瘡口紅活為度

麥冬粳米飲

凡癰疽陰瘡法當灸而太過或陽瘡不當灸而誤灸以致火毒入裏頭項虛腫神昏痰喘急服此以解毒 麥冬 三錢 粳米 三錢

水二鍾煎一鍾徐徐熱服

神燈照法

凡癰疽初起及頭面難用艾炙者 雄黃 二錢 硃砂 二錢 血竭 二錢 沒藥 二錢 麝香 四分 共為細末每用三分紅紙裹搓撚長

七寸麻油浸透用火點著離瘡半寸自外而內周圍徐徐照之

火頭向上藥氣入內毒氣解散初用三條漸加至四五條瘡熱漸消仍須照之照後瘡根須用敷藥瘡口須貼膏藥此法能使

漸消仍須照之照後瘡根須用敷藥瘡口須貼膏藥此法能使

牛膠蒸法

未成者消已成者潰去腐生新如已大潰濃瀉不必用此照法  
凡癰疽發背頑惡不斂等瘡 牛皮膠 一塊 水熬熟稠攤厚紙上

翦一塊貼瘡口次用鹹醋煮軟布二塊乘熱趁膠紙上蒸之稍

溫再換蒸至瘡瘻膿出至盡預用 貫衆 二兩 煎湯熱洗去膠

紙外用膏藥貼之次日照前蒸洗直至膿盡瘡乾為度

銀花甘草湯

癰毒初起 金銀花 二兩 生甘草 二錢 水煎加黃酒沖服渣

搗敷患處鮮金銀花籐葉亦好瘡在下部者加牛膝 二錢

蠟礬丸

明亮白礬 一兩 生硃以好黃蠟 七錢 鎔化和丸如梧子大每服

十丸漸加至二十九開水送下治一切癰疽背瘡未破者消已

破者收口如服金石藥發瘡者以白礬末 一錢 作引溫酒調服

此方不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿老少

皆宜一日中服近百粒愈有力其功甚大不可以其錢近而忽

移毒散

凡毒發於骨節間能移之使無殘疾之患 白芨 一兩 紫花地下

錢 八五倍子 二錢 大黃 錢 烏雞骨 一錢 硃砂 錢 雄黃 錢 輕粉 一錢

牙皂 八分 共為末以醋調敷毒之上截即移至下截奇驗仍

照人虛實內服藥餌

### 干槌膏

凡一切腫毒瘡瘍發在五日內者貼之即消七日以外亦可日減

七八味淡而功奇價輕而效速勿忽視之

松香陳人者長錫勻密化傾冷水中大草麻子去殼銀硃研細

先以草麻仁四五兩置光青石上鐵錘槌極爛畧無細點然後

加松香末二三兩共槌至膠黏扯長二三寸不斷摘一塊用手

捏如錢厚視其軟硬得中即刮起作團滾入銀硃內黏遍用兩

手急扯扯至銀硃與膏勻極暫停候其顯出亮光再扯光如明

鏡紅如鮮血方收入磁瓶隔用以鐵錐挖一塊量瘡大小用手

捏成錢厚將膏黏油紙上貼患處冬夏老嫩得中在乎槌時審

量如嫩即加松香再槌總在未加銀硃之前定準老嫩方好如

捏膏黏指可畧津唾於指上即不黏

### 消毒神效丹

凡一切腫毒初起者消已成者收小出毒 鮮山藥五兩不土硃

一兩松香一兩白糖一兩全蝎十共搗爛圍之留頭藥上蓋紙周時一

### 移山過海散

凡毒生於致命處用此移於無害部位 雄黃 小麥麩 新鮮

護心散

蚯蚓糞共為末用醋調漸漸塗遍患處自能移至半邊

凡瘡毒內攻惡心嘔吐 萊豆粉一兩乳香三錢研淨硃砂一錢

甘草一錢共研細末早晚開水調服二錢

簡便敷毒方

鮮山藥一段小鯽魚一個同搗爛蚊患處

驗多骨法

推車蟲自燒爛炙研每一錢入乾薑五分研極細末吹孔內如

有骨次日不痛自出過周時無骨出則知本無多骨也

凡多骨疽生大腿旁 茯苓兩紫花蒂丁兩半藤錢金銀花三

水煎空心溫服五劑

癩疽

凡手足肩背鬢鬣如赤豆剝之汁出曰癩疽用 薺薺菜即油菜

煮汁服一升並食乾熟菜數頓少與鹽醬冬月用子研水服

異疽似癰

凡膿如豆汁今日去明日滿者即花症用 薺薺菜搗爛布袋盛

於熱灰中煨熱更互熨之無葉用乾者

疔瘡初起

生煤一塊冷水磨少許以新墨醮塗

又方

家園菊花搗汁一碗服下即消無花之時用根葉亦可頗有驗

誤食猪肉

搗芭蕉根汁服之甚效

走黃又方

醃白梅乾去核 荔子肉等分 加銀硃少許共搗爛用澆雞矢拌勻敷之留頭此真屢試屢驗之方未走黃者亦治

誤食瘟肉症

烏柏樹葉搗汁二碗燂服得瀉毒解無葉用嫩梗或根研水服

治毒膏

凡一切腫毒貼之神效 草蘇子四兩 去油皮 血竭三兩 蟾酥乳化一兩

香去淨油一兩 松香一兩 白 加頂好麝香三錢為膏貼之神效

瘡毒一筆銷

開洋花五十觔揀極淨煎膏將川烏草烏各一兩收之凡遇瘡

毒用筆蘸藥塗之

胎元七味丸

專治痔瘡不拘遠年近日濃血通腸者服之化管除根此方異人

傳授救人災難止人疼痛活人多矣只宜傳方施藥不可存心

取利 胎元三個即男子精帶 陳棕七錢數十年者 京牛黃三分

槐角子五錢 肥大者 刺猬皮三錢 象皮四錢 地榆三錢 共研

細末酥油為丸如蠶子大若不能丸加糯米糊少許即成每服

七丸空心白滾水送下三日化管止痛七日平滿血清濃止十

日除根第一奇方也

楊梅瘡秘方

用癩蝦蟆一個大者為佳紅眼者有毒不可用取時不可拿重



楊梅結毒

恐走蟾酥宜用圓口小瓶一個置於地上緩緩趕其白進晷  
者能飲酒一斤須折半斤置其瓶內隨用木蓋蓋固仍以紙條  
封緊勿令洩氣慢火煨煎先將瓦瓶與酒共煨蟻料過斤兩若  
干煎至折半可住火去蝦蟆只取清酒溫服服後卽將綿被覆  
蓋取汗俟汗止方可起動更勿坐立當風處恐入風氣若上部  
瘡多畧吃些粥服若下部瘡多空心服如一服未全愈停三四  
日再服一個決全妥矣且終身不發屢用屢效不可輕忽

凡楊梅積毒名爲金蟬脫殼

蝦蟆一個黃色大者佳

金銀花金者四兩銀者四兩

用陳紹酒一罈將蝦蟆金銀花搗爛用麻布包好浸入罈內煮

三炷香每日過量飲自愈

凡楊梅瘡及蠟燭花

即龜頭瘡

輕粉五分研細

紅棗五枚

用白麩包裏

木炭火內燒先起青烟看黃烟一起卽取出去核皮同輕粉搗

爛丸成五丸用黃酒送下過一時口內吐出青痰水大便泄出

魚凍樣穢物二三次服藥後用土茯苓煎湯漱口併當茶吃忌

一切鹽醬醋豆豉七日愈只吃米飯或白麩打鍋塊吃均可其

敷疔藥

效如神言難盡述

奶孩兒草 小將軍草 如意草 醬板半枝蓮草

皆可搗敷極效只須一種取其便者

被毆後傷風

荆芥 黃蠟 魚鱧炒黃色各五錢 艾葉三片 入無灰酒一盞重湯煮

一炷香熱飲之汗出即愈百日內忌雞肉

回生散治跌打損傷

黃丹兩 明松香兩 生半夏兩 石膏熟三兩 研末敷之

打傷危急

松節一觔 入鍋內炒起青烟為度用黃酒二觔 入鍋內一滾即

去渣半熱灌之

跌打損傷

取淨土蒸熟以布裹更換熨之勿太熱恐破血

跌傷風角弓反

南星 防風 白芷 天麻等分 共為末熱酒童便調下三錢

張牙關緊閉

重者五錢煎服亦可

頭面跌傷

生半夏 芙蓉葉等分 為末紹酒白蜜調敷

眼睛跌出

活猪身上封肉一小塊趁熱貼上少頃自納人

車碾及墜馬傷

服熱小便一盞立愈極驗

跌撲傷筋

韭菜搗爛敷之

治閃翳奇方  
墜樓墜馬損

壞手足

快割舌頭

楊梅結毒惡  
瘡試驗奇方

多年牆頭爛稻草燒俟火將過卽撒尿澆隱趁熱會在痛處  
真麻油一杯沖酒一壺儘量飲醉卽睡蓋厚被出汗睡醒筋骨  
自合痛亦自止冬月用火烘熱被再蓋

如未斷落先用雞子白皮將舌袋住次用 天花粉兩赤芍兩

薑黃兩白芷兩蜜調塗舌根止血隨用蜜調黃蠟稀稠敷在雞

皮上勤敷三日舌已接住方去雞子皮仍用蠟蜜勤敷七日愈

此症又名廣瘡時瘡棉花瘡總不出氣化傳染精化慾染二因傳

染者或遇生瘡之人鼻聞其氣或同食傳毒同廁染穢慾染者

或妓女變童交媾不潔精洩時毒氣乘肝腎之虛而人宜始終

調治得法輕者半年重者一載乃可全愈若不依正法醫之欲

求速效悞服輕粉水銀火鍊劫藥等類雖一時僥倖而愈不知

遺毒潛藏骨髓關竅之內積久復成結毒先從筋骨疼痛隨處

結腫皮色如常將爛時色方紫紅腐臭不堪以致腦頂塌陷腮

唇鼻梁壞損穿喉蝕且手足拘攣等患自損形軀併累妻子可

不慎哉如瘡初起由外傳染者毒在表宜急服透骨搜風散

透骨草錢一 生脂麻錢一 羌活錢一 獨活錢一 小黑豆錢一 槐子錢一 白糖錢一

紫葡萄錢一 六安茶錢一 核桃肉錢一 生羌片三 紅棗肉枚二 水煎露一宿

空心熱服被蓋出汗避風 如體氣厚實者再服楊梅一劑散

麻黃錢一 威靈仙錢八 大黃錢七 羌活錢五 白芷錢五 皂刺錢五 金銀花錢五

穿山甲錢五 蟬蛻錢五 防風錢三 用山羊肉一斤河水煮熟取清湯二

盃合入黃酒一盃共三盃將藥放入煎至一盃空心將羊肉淡

食至飽隨卽服藥湯蓋被出汗避風 如瘡初起由內慾染者

毒在裏宜先服九龍丹 木香 乳香 沒藥 兒茶 血竭

巴豆各等分 爲末生蜜調成一塊磁盒收貯臨時旋丸如豆

大每服九丸空心熱酒一盃送下行四五次方食稀粥腫甚者

間日再用一服自消 如服前藥汗後無論外染內染體實者

再服升麻解毒湯 升麻錢四 皂刺錢四 土茯苓片一 用水八盃煎至

四盃分四次服盡每次加麻油三茶匙爲引熱服 瘡在上食

後服在下食前服 若在項以上加白芷錢四 在喉加桔梗在胸

腹加白芍在肩背加羌活在下部加牛膝併煎 如體虛者再

服歸靈內托散。人參錢一白朮錢一木瓜錢一防己錢一金銀花錢一

天花粉錢一薏苡仁錢一白鮮皮錢一州者佳當歸錢一熟地錢一白芍錢一

川芎錢一土茯苓兩威靈仙分甘草分用水三器煎二器作二次

服併渣。瘡在上食前服瘡在下食後服若在下部加牛膝分五

元氣虛極倍加參歸。毒盛倍加金銀花蒲公英。外再用麥

冬去心慧苡仁錢五土茯苓兩常服以代茶。如以後瘡色淡白

減疼內毒已解用蝮蟬脫殼酒土茯苓兩大蝦蟆兩用好醇酒

五斤將此兩物浸酒內封酒餅口滾水煮二炷香久取出待次

日飲之以醉為止再蓋破出汗。餘存之酒每日隨量飲之酒

完即愈盡掃餘毒永無後患。外如侍從相近之人欲免其傳

染宜服護從丸。雄黃錢五川椒錢五杏仁錢一去皮尖炒共為末燒酒

調白麩糊為丸如梧子大每服十五丸白滾水送下決不傳染

凡結毒成腫筋骨疼痛先服搜風解毒湯。土茯苓兩白鮮皮分五

州金銀花分五薏苡仁分五防風分五木通分五木瓜分五皂角子四分

用水煎一日三服氣虛弱加人參分七血虛加當歸分七忌食牛羊

楊梅瘡成結毒

雞鵝等發物併肉魚茶燒酒禁房事 如遍身彼爛臭穢體氣

實者服化毒散虛者服猪脬子湯 化毒散方 生大黃兩穿山

甲錢五當歸尾錢五白殭蠶錢三蜈蚣一條 共研末每温酒調服二錢

一日二服 猪脬子湯方 猪脬子一兩碎黃耆三錢 鹽水炒 金銀花錢

天花粉錢一貝母去心研穿山甲炙研白鮮皮錢一白芷錢一木瓜錢一

青風藤錢一皂刺錢一甘草節錢一當歸五分白芍五分黃栝藎連仁

研防已七分鱉虱胡麻炒研用白皂土茯苓兩以河水四大盃煎

湯三盃將各藥入湯內煎至一盃服之一日二服 如結毒攻

於口鼻者宜服五寶散 石鍾乳四錢如乳頭下垂敲破硃砂

錢一珍珠二錢豆腐內煮冰片錢一琥珀錢二共為細末藥二錢加飛

籬麩八錢和勻每用土茯苓一觔煎水作五次服每次加五寶

散一分 如鼻子腐爛土茯苓內加辛夷三錢引藥上行

如結毒久而鼻爛損者宜服結毒紫金丹 龜板炙焦以白酒

未 硃砂六錢石決明六錢用九孔大者共研極細末和勻搗

爛米飯為丸如粟粒大每服一錢用土茯苓湯下 如結毒入

頭頂頭痛如破宜服天麻餅子天麻一錢薄荷一錢白附子一錢

甘松一錢白芷一錢蒼木一錢川芎一錢川烏一錢防風一錢細辛一錢

草烏一錢生甘草一錢雄黃一錢全蝎一錢共為末白麩打糊為

丸如豆大捻作餅子每服二十餅葱白煎湯送下外以碧雲散

向鼻孔吸之如壅塞鼻孔不通宜用通鼻散吹之葫蘆殼

燒石鍾乳一錢膽礬一錢水片各等分共為末吹鼻內每日吹二

次出黃水三日即通如毒攻咽喉腐爛臭蝕宜服硫黃不二

散硫黃一錢花一分共研細用涼水一鍾調服如結毒筋骨

疼痛宜服鉛灰散黑鉛半斤用銅杓化開傾入水中取出再

化再傾以針化盡為度澄去水將鉛灰傾在三重紙上紙下用

灰收乾水氣將鉛灰曬乾和硫黃各等分共研細末溫酒調服

凡患疔者如疔入肉其形小其根深純由火毒迅速攻心有朝發

夕死隨發隨死最緩者三五日死或因貪嗜煎炒燒炙厚味或

因悞食瘟死牛馬猪羊毒肉或因受四時不正疫氣致生是瘡

各種疔瘡試  
驗奇方

若不急治或藥不對症立判存亡可不慎哉

又辨色歌訣疔有五種顏色發於五臟

心經疔

疔名火焰發心經

往往生於唇指中

心作煩時神恍惚

痛兼麻痒胞黃紅

肝經疔

毒發肝經名紫燕

此患多於筋骨見

破流血水爛串筋

指青舌強神昏亂

脾經疔

黃鼓由於脾經毒

多生口角與顴骨

胞黃光潤紅色纏

麻痒硬癭兼嘔吐

肺經疔

毒發肺經名白刃

白胞頂硬根突峻

易腐易陷多損腮

咳吐痰涎氣急甚

腎經疔

從來黑靨發腎經

黑斑紫胞硬如釘

為毒極甚疼牽骨

驚悸沉昏目露睛



凡治疔症貴乎早三陰三陽更宜曉在下宜灸上宜針速醫即愈

緩難保

疔毒初起

金銀花二錢野菊花一錢蒲公英二錢紫背天葵子一錢紫花一錢  
地丁香二錢水煎滾加紹酒半盃於藥水內再滾熱服併渣  
服後蓋被取汗

生疔發熱口

黃連 黃芩 黃柏 梔子各等加生大黃一錢五分葱頭五

渴便閉

個水煎服

疔毒將欲成

黃

金銀花八分梔子八分地骨皮八分牛蒡子八分連翹八分木通八分  
牡蠣八分生軍八分天花粉八分皂刺八分乳香八分沒藥八分酒水各半  
煎服不飲酒者用水煎少加酒引

疔毒已經走

黃

蒼耳頭三錢野菊花三錢稀莖草三錢地丁香三錢半枝蓮三錢蚕休二錢  
麻黃錢一用好紹酒一斤煎至一大碗澄去渣熱服蓋被取汗

如手足冷六脈絕乃毒閉元氣也先宜急服蟾酥丸隨服木香流

氣飲其脈自見蟾酥丸須買現成法製者如無應急即旋製藥亦可其方載後木香末五分

當歸 白芍 川芎 紫蘇 桔梗 枳實一錢炒 大腹皮

澤瀉 甘草節各五分 烏藥 陳皮 半夏法製 茯苓 黃耆

防風 青皮各一錢 檳榔 枳殼炒五分 此木香流氣飲用生

薑三片 紅棗肉枚二 水煎服

如煩噪譫語者乃毒內攻也 大青葉 木通 梔子生 桔梗

麥門冬法 元參 人中黃 知母 升麻 淡竹葉 熟石膏

各一錢 大便閉加大黃燈心十二根水煎食遠服

如潰破後五心煩熱者乃餘毒未盡也 人參 陳皮 茯苓

麥冬去心 當歸 地骨皮 黃芪 白朮 遠志各一錢 柴胡

黃連 炙草各五錢 粳米一撮水煎食遠服

如針後出膿虛弱驚悸者乃元氣傷也 人參 麥冬 茯神

黃芪 白朮 元參 陳皮以上各一錢 甘草炙 遠志法 石菖蒲

酸棗仁炒研 五味子研各五分 臨服入硃砂三分水煎食遠服

如攻利太過致發渴脈虛大者 黃芪蜜炙 白朮土 人參 陳皮

甘草炙 當歸 升麻 柴胡各等分 薑棗引水煎服

如發汗之後汗不止熱不退瘡不疼便不利者乃裏虛也宜服

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎 當歸 生地 白芍

外加黃芪 麥冬去心 薑棗引水煎服

疔發頂上三

陽受毒 丹插入瘡孔內外以巴膏蓋之

立馬回疔丹 蟾酥酒化 輕粉 白丁香 硃砂各一錢 乳香六分 雄黃 硃砂

麝香各三分 蜈蚣一條 金頂砒五分 共為細末 麪糊搓如麥子大

插入瘡孔一粒

巴膏方列前

疔發項下三

陰受毒 先當灸艾火以遏其毒勢亦須針刺出惡血插入前藥一粒即

疔馬 蓋以巴膏若旁腫硬用針亂刺腫硬之處使多出惡血

挑疔根法

否則必至走黃 先將針身橫刮疔頂皮開方直針入疔根先出紫黑血再挑刺

至鮮血出以知痛為止隨填拔疔散滿瘡孔以蓋應膏蓋之過

三四時撥去舊藥換以新藥若藥乾無水不痛者此挑法未斷

疔根也再深挑之必要入藥知痛有毒水流乃止至三四日後

拔疔散

疔頂乾燥以琥珀膏貼之使疔根托出換九一膏拔之黃連膏抹之外蓋白膏藥生肌斂口

硃砂 白礬煨 硃砂 食鹽用鐵鏽刀燒紅燬之 各等分擇丁日午時研

末搽患處化硬搜根

製蟾酥丸法

蟾酥紹酒化 輕粉 銅綠 枯礬 胆礬 寒水石 乳香

沒藥 麝香各一錢 硃砂三錢 雄黃二錢 蝸牛二十個 以上各為末稱準

於端午日午時在淨室中先將蝸牛研爛同蟾酥和研調麩方

入各藥共搗極勻丸如棗豆大每服三丸用葱白五寸令患者

嚼爛吐於手心內男用左手女用右手將藥丸裹入葱泥內用

無灰熱紹酒一茶杯送下被蓋約人行五六里路病者出汗為

度甚者再用一服如外用之法搓條作餅隨症用之修合時忌

婦人雞犬見之

完瘡散

治溼爛諸瘡肉平不斂及諸瘡毒內肉既平而口有不收者皆宜

用此最妙 滑石飛 赤石脂飛 粉甘草三錢 右為末乾糝或

用麻油調敷 或加枯礬一錢疔者極宜 生薑 陳酒糟各

斤同搗爛炒熟罈傷處

跌打夾棍傷

凡搗傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手蕩乾良

搗傷

久即活血止痛不致潰爛熬水忌銅鐵器其洗手水過夜即臭

惡不可聞

杖瘡

川大黃兩加上冰片分二另研俱為末和勻涼水調如糊攤杖處

即時止痛一日後換膏藥貼之或加甘草一兩

又攤藥

大黃 白芷 生半夏各七錢 共為末以鮮薑汁調敷乾即再

敷以黑處血紅為度則換貼膏藥神效 又生半夏兩松香兩

共研蜜水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個即愈

肚破腸出

用大糞不拘多少新瓦焙乾為末茶油溼手黏糞末托腸入腹

綫縫傷口即用 赤石脂三錢 乳香去油五錢 沒藥去油五錢 鉛粉三錢 血竭

二錢 龍骨五錢 樟腦三錢 共為細末加 松香二錢 黃蠟二錢 和勻入麻

油冷成膏慢火煉至如稀糊棗抹填傷處止血再取初啼小雞

一隻去毛臍搗成肉醬敷處傷處軟帛包束日換一次如腸不可托

入須用陳米醋一盞煮開用鐵秤錘一個燒紅淬下醋內使病

易簡方編

卷五

湯火膏油傷

人間醋氣其腸自入仍將線縫口填藥若腸穿則不治矣  
生石膏搗爛以熟桐油調搽患處三四次即愈如日久腐爛用  
狗頭骨燒存性為末糝之

沸水油湯火

甜三七錢一生甘草錢二黃連錢一共為細末熟茶油調搽如重者加

傷

芭蕉根下蚯蚓七條用新瓦焙乾放地上出火氣研末茶油熬搽

諸刺入肉腫

凡竹木鐵釘磁器玻璃刺入肉不出腫痛用 牛七放入口中嚼

痛

爛取出敷患處二三次其刺自出

箭鏃竹木刺

凡竹刺在肉以蟻螯蟲研敷立效

入肉

凡竹木刺入肉嚼牛膝根罨之即出

凡箭鏃入肉用陳腌肉只取肥肉去皮切碎併挫象牙屑及人指

甲其為細末挫入碎肥肉極勻厚敷傷處四圍其箭頭即可脫

出後用刀鎗藥敷之

又以巴豆肉炒同蟻螂研勻塗傷處俟痒極拔出之

凡箭鏃針刺杵螻蛄敷塗患處自出

跌閃腫痛

生薑葱白同搗爛和麩炒熱罨之 如熱罨而痛者用梔子加

新舊損傷

麩炒熱卷之

羌活 獨活 血竭 枳殼 破故紙 歸尾 白芷 自然

銅 沉香 杜仲 小茴 大茴 丹皮 紅花 桃仁 麥

冬 五加皮 鬱金 三七 甘草 紹酒温服

凡跌打損傷無論新舊上中下三部 當歸 川芎 母丁香

乳香 三七 烏藥 西木香 續斷 秦膠 骨碎補

淮山 芍藥 血竭 肉桂 杜仲 小茴香 甘草 生地

青皮 麝香 薏苡仁 共為細末每用紹酒服二三錢

皂殼 生地黃 大黃 豆粉炒黃將上藥共為細末用醋

生地 當歸 川芎 赤芍 羌活 桂枝 烏藥 青皮

秦苑 續斷 杜仲 破故紙 甘草 木瓜 三七 枳殼

小茴香 香附 五加皮 威靈仙 以上二十味各等分共

研細末每用紹酒服二三錢

珍珠 五琥珀 艾絨 川連 乳香 生半夏 血餘 煨一錢

血竭 石脂 三七 生南星 煨石膏 共為極細末敷

刀傷

又敷方 養筋活血丹

又方

患處自愈

### 火瘡

凡被火傷不論何處即飲麻油一兩碗後用猪毛燒灰冰片

大黃 白蠟 共為細末用麻油調敷重者再用 羌活二錢

梔子錢三 土茯苓錢二 甘草八分 生大黃錢三 連翹錢二 飛淨硃砂五分 白蠟

錢一煎服如三五劑不愈另用 蜜炙黃耆五錢 土炒白朮五分

當歸五分 廣皮五分 茯神錢一 小茴香五分 薑製厚朴八分 川芎五分 甘草八分

水煎服

### 泡傷皮肉

### 接骨方

將陳年石灰用麻油調敷藥乾再塗二三日即愈

馬前子兩一 用小便浸過去皮毛切片和陳壁土炒研細末

自然銅七錢 火鍊七次醋浸七次為末 硃砂三錢 用水飛淨

黃牛角五錢 燒灰存性共為極細末黃酒服三分切不宜多

### 又方

此方不用包紮一服即愈 尿桶或尿坑年久灰磚火煨七次為

末 古錢一枚火鍊七次醋浸七次為末 一錢用灰磚末五分

和勻黃酒服三分 立效如多服一厘長骨一枝切記稱準

### 金瘡傷重

天花粉兩三 薑黃兩一 赤石藥兩二 白芷兩一 共研細末雖受傷至筋斷



脈絕血盡人危先用繩索及絹帶紮住血路然後用此藥以茶調敷用軟絹縛之其血立止腫亦頓消若金瘡著水翻花者可用茱汁調敷瘡口兩傍以火微炙之或稻桿烟薰之瘡口出水即愈

金瘡並木石

損傷敷方

金瘡痛不可

忍

止金瘡血方

又方

金瘡血竭昏暈

傷不透膜

金瘡內爛生蛆

陳年石灰六兩研碎篩過 錦紋大黃一兩切塊同石灰炒黃

去大黃再篩細敷傷處立效

防風 天南星湯泡各等分爲片每服五錢水黃酒各一盞加

生薑一片煎八分食後許久溫服三服效

乳香 沒藥 兒茶 桑白皮炒 龍骨水飛 石膏煨 黃丹水飛

真三七 各等分爲末摻之其血即止

象牙屑研細敷之立止

川芎五錢當歸兩爲片水煎臨服入童便紹酒各一大杯熱服

乳香錢沒藥錢研爛以童便好酒各半盞同藥溫服再用花蕊

石散龍骨等分爲末敷瘡口立止花蕊石散列前

皂礬飛過爲末乾摻其蛆即死

傷癩脹喘

凡金傷壓傷墜傷癩血在內胸腹脹滿喘促氣短諸狀

當歸二兩大黃二兩為末每服二錢不拘時候童便和黃酒調服

破傷風

凡破傷風腫痛身發寒熱天南星一兩防風一兩為末敷於瘡口又以香油潤之後以溫酒調服一錢

又方

凡破傷風牙關緊閉如角弓反張者天南星一錢防風一錢老酒入

童便少許煎服立效不愈再一劑有驗

去金瘡腐肉

凡金瘡腐肉未去土丹一兩飛淨微炒天一石一兩地上出火毒一兩共為

末磁罐收貯敷瘡上待腐肉化為黃水去盡肉肌淡紅方換斂

口生肌散其散花藥石一兩乳香一兩沒藥一兩各為末藥須用極

真者先將花藥石在炭火中煨紅蘸二末令烟再煨再蘸以

末盡為度取出置地上出火毒

中毒箭方

笋根一兩藍葉一兩紫檀一錢石灰一兩研作末以牛糞火燒令赤以上

藥為末不拘時候以藍葉汁調服一錢粥飲湯下亦可

中毒箭後皮

梨母子一兩研鍊去核鹽麩子一兩搗之暴乾更搗用絹羅之去

肉癩腫

粗渣棗豆三兩炒熟石灰二兩研末以牛糞火燒令赤色藍子一兩

馬血瘀  
火藥湯泡傷

黃連去三兩獨顆栗子三兩生用黑豆炒熟三兩糞灰五兩赤芍三兩共為細

末煉成膏每服一茶匙日三四服

地黃斤搗碎置鐵中熬乾以無灰酒一斗五升入藥飲之即散

生豬膏泔生扁柏葉同搗極爛敷傷處即止痛生肌不致腫

爛