

外科癰瘍機要

上中下三卷

薛氏醫百按

癘瘍機要序

夫醫猶理也醫之有瘍醫猶理之有兵也善為理者奇幻理固

齊其百司使紀綱法度各有所攝而不地則垂察之有

可以無變不幸而一隅乘釁然後不得已而兵起注

所尚也將藉之以除亂也彼其平居無事之時而勇藥

之本既已縝密完固而無所疎漏一旦有急則陰問與衛氣相

兵雖試而國家之元氣不虧醫之為道也亦然方

也湯液之所及也其在腸胃也湔浣之所及也若

之間甚至不可名狀者彼何為哉其能不攻刺乎其

乎顧攻有守而後攻擊有備而後擊苟不諦其虛實不量

羸而動曰攻擊之吾恐病未却而精已耗譬則忿兵數逞而國

計內空疥癬之疾將不為腹心之患者幾希噫可不慎乎故明

是則帶

大

商

於理者可與語醫也已世之以瘍名家者多矣然孰有如我立  
齋先生者耶蓋先生以岐黃世業旁通諸家微詞蹟旨靡不究  
竟其言以爲不知外科者無以通經絡之原委不精內經者無  
以究陰陽之變合內外殊科其揆一也故其視病不問大小必  
以治本爲第一義無急效無近期紓徐從容不勞而病自  
出癘瘍機要一編屬其友沈生梓之以傳沈生讀之  
意而訂古方以醫案而驗治效以調補爲守備之  
爲攻擊之權宜蓋不出乎廟堂之訐謨而坐得  
術假令業醫者而孰是焉旣不病於滯而不通  
無本奚至攻其所習而毀所不見耶噫若先生  
於理者矣是錄也顧不可傳哉或者曰誠若所  
門異業者非歟周官有疾醫瘍醫二職並存何也

也昔秦越人之為醫也聞秦貴小兒則小兒醫趙貴婦人則帶  
下醫周貴老人則耳自痺醫一醫而三習非其術成奇幻理固  
不殊也若周官所存則以其職言耳豈如後世其有以  
相通者哉古之任官居則為命卿而出則為  
理與兵兼焉孰謂內外醫果不相通者哉  
嘉靖歲甲寅中秋秀州沈啓原道卿甫著

方藥

之間與衛氣相

長自九

長自九

癰瘍機要上卷

薛氏醫按

吳郡薛 已著

新都吳玄有校

本症治法

變症治法

癰症治法

類症治法

各症治驗

癰症方藥

內經云風氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉潰臍而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰癰風其治法當刺肌肉骨髓以泄榮衛之沸熱靈樞經以銳針刺腫上出惡血近代先哲云感天地肅殺惡氣所致其上體先見或多者毒在上也下體先見或多者毒在下也蓋氣受邪則上多血受邪則下多氣血俱受

則上下齊見若眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝脚底  
先痛或穿者毒在腎遍身如癰者毒在脾目先損者毒在心此  
五臟受症之重也一曰皮死麻木不仁二曰肉死針刺不痛三  
曰血死爛潰四曰筋死指脫五曰骨死鼻柱壞此五臟受傷之  
不可治也若聲啞目盲尤爲難治大抵此症多由勞傷氣血腠  
理不密或醉後房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣相搏濕  
熱相火血隨火化而致故淮陽嶺南閩間多患之治當辨本症  
兼症變症類症陰陽虛實而治焉若妄投燥熱之類膿水淋漓  
則肝血愈燥風熱愈熾腎水愈傷相火愈旺反致敗症矣

### 本症治法

一癘瘍所患非止一臟然其氣血無有弗傷兼症無有弗雜况  
積歲而發見於外須分經絡之上下病勢之虛實不可槩施攻

毒之藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡可也經云真氣奪則虛邪氣勝則實凡云病屬有餘當認爲不足

一癘瘍當知有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一蓋兼症當審輕重變症當察後先類症當詳真偽而汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之源委而施治之蓋虛者形氣虛也實者病氣實而形氣則虛也

一癘瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千針蓋以砭血不如發汗之周遍也然發汗卽出血出血卽發汗二者一律若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺宜汗取委中出血則效若惡毒纏結於臟非蕩滌其內則不能痊若毒在外者非砭刺遍身患處及兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非外砭內泄其毒決不能退若上體患毒宜用醉仙散取其內蓄惡血於齒

縫中出及刺手指縫并臂腕以去肌表毒血下體患多宜用再造散令惡血陳蟲於穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一二日更刺之以血赤爲度如有寒熱頭疼等症當大補血氣

一癘瘍服輕粉之劑若腹痛去後兼有膿穢之物不可用藥止之若口舌腫痛穢水時流作渴發熱喜冷此爲上焦熱毒宜用瀉黃散若寒熱往來宜用小柴胡湯加知母若口齒縫出血發熱而大便秘結此爲熱毒內淫宜用黃連解毒湯若大便調和用濟生犀角地黃湯若穢水雖盡口舌不愈或發熱作渴而不飲冷此爲虛熱也宜用七味白朮散

一癘瘍手足或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛虧損氣血當用加味逍遙散加生地黃及換肌散兼服

一癘瘍生蟲者五方風邪翕合相火制金木盛所化內食五臟



而症見於外也宜用升麻湯送瀉青丸或樺皮散以清肺肝之邪外灸承漿以疏陽明任脉則風熱息而蟲不生矣肝經虛熱者佐以加味逍遙散六味地黃丸

一癘瘍久而不愈有不慎起居飲食內火妄動者有臟腑傷損氣血疲乏者有用攻伐之藥氣血愈虧者有不分兼變相雜用藥失宜者有病人諱疾忌醫者

一癘疾愈而復發有不戒厚味內熱傷脾者有不戒房勞火動傷腎者有不戒七情血氣傷損者有餘毒未盡兼症干動者有氣虛六淫外乘者古人云此症百無一生正謂此耳

### 兼症治法

一頭目眩暈若右寸關脉浮而無力脾肺氣虛也用補中益氣湯若左關尺脉數而無力肝腎氣虛也用六味地黃丸若右寸

尺脉浮大或微細陽氣虛也用八味地黃丸血虛者四物湯加  
參苓白朮氣虛者四君子湯加當歸黃芪肝經實熱者柴胡清  
肝散肝經虛熱者六味地黃丸脾氣虛弱者補中益氣湯脾虛  
有痰者半夏白朮天麻湯砭血過多者芎歸湯發熱惡寒者聖  
愈湯大凡發熱則真氣傷矣不可用苦寒藥恐復傷脾胃也  
一口喎目斜若手足牽搐或鬢稜痒動屬肝經血虛風熱用加  
味逍遙散六味地黃丸以生肝血滋腎水若寒熱往來或耳聾  
脇痛屬肝木熾盛先用小柴胡合四物湯以清肝火生肝血若  
筋攣骨痛或不能動履用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源  
若因服燥藥而致者用四物湯加生甘草金銀花以解熱毒益  
陰血凡此俱屬肝經血燥所致須用六味地黃丸補中益氣湯  
為主若因怒氣房勞而甚者用六味地黃丸十全大補湯為主

若因勞傷形體而甚者用補中益氣湯十全大補湯爲主

一夏秋濕熱行令若飲食不甘頭目眩暈遍身酸軟或兩腿麻木口渴自汗氣促身熱小便黃數大便稀溏濕熱傷元氣也用清燥湯如在夏令用清暑益氣湯若自汗盜汗氣高而喘身熱脈大元氣內傷也用補中益氣湯若嘔吐少食肚腹痞悶大便不實脾胃受傷也用六君子湯若胸腹不利飲食少思吐痰不止脾胃虛痞也用四君子湯若形氣倦怠肢體麻木飲食少思熱傷元氣也用人參益氣湯

一熱渴便濁若夜安晝熱者熱在氣分也用清心蓮子飲晝安夜熱者熱在血分也用四物二連湯俱佐以六味地黃丸若寒熱往來者肝經血虛也用加味逍遙散六味地黃丸  
一小便不利若因服燥藥而致者用四物湯加炒黑黃柏知母

生甘草以滋陰血若頻數而色黃者用四物湯加參朮麥門五味子以生氣血若短而色黃者用補中益氣湯加山藥麥門五味以滋化源經云無陰則陽無以生無陽則陰無以化

一大便不通若血虛內熱而澁滯者用四物湯加麥門五味子以生血潤燥若因燥熱之藥而患者用四物湯加連翹生甘草以生血清熱若服尅伐之藥而致者用四君子湯加芎歸以助氣生血若作渴飲冷者熱淫於內也用竹葉石膏湯以清胃火若作渴飲湯者腸胃虛熱也用竹葉黃芪湯以補氣生津若內熱作渴面赤飲湯者用四物湯送潤腸丸以涼血潤燥若腸胃滿脹燥在直腸而不通者用猪胆汁導之腸胃氣虛血涸而不通者用十全大補湯若肝膽邪盛脾土受侮而不能輸化者用小柴胡湯加山梔郁李仁枳殼治之

一怔忡無寐或兼衄血便血若內熱晡熱作渴飲湯肢體倦怠  
此脾血虛而火動也用四君子加芎歸若思慮傷脾動火而致  
用歸脾湯加山梔若發熱晡熱用八珍湯加酸棗仁茯神遠志  
若因心血虛損用栝子仁散大抵此症皆心脾血少所致但調  
補胃氣則痰清而神自安不必專於清熱治痰

一發熱惡寒若肢體倦怠煩躁作渴氣高而喘頭痛自汗者此  
內傷氣血也用補中益氣湯加五味麥門怠倦食少大便不調  
小便頻數洒淅惡寒者此脾肺氣虛也用升麻益胃湯煩躁作  
渴體倦少食或食而不化者此脾氣虛熱也用六君子湯

一發熱在午前脉數而有力者氣分熱也用清心蓮子飲脉數  
而無力者陽氣虛也用補中益氣湯午後脉數而有力者血分  
熱也用四物湯加牡丹皮脉數而無力者陰血虛也用四物湯

加參朮熟從兩脇起者肝虛也用四物湯加參朮黃芪從臍下起者腎虛也用四物湯加參朮黃栢知母五味麥門肉桂或大味丸其熱晝見夜伏夜見晝止或去來無定時或起作無定處或從脚起者此無根虛火也須用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若形體惡寒喜熱飲食者陽氣虛寒也急用八味丸

一口乾若惡冷飲食者胃氣虛而不能生津液也用七味白朮散若喜冷飲食者胃火盛而消燦津液也須用竹葉石膏湯夜間發熱口渴者腎水弱而不能上潤也當用六味地黃丸若因汗下之後而有前患胃氣虛也宜用八珍湯主之

一作渴若煩躁飲冷者屬上焦實熱用涼膈散兼大便秘結者屬下焦實熱用清涼飲若用尅伐之藥而渴者氣血虛也急用

八珍湯六味丸

一耳聾耳鳴若左寸關脈弦數者心肝二經虛熱也用四物湯加山梔柴胡生陰血右寸關脈浮大者脾肺二經虛熱也用補中益氣湯加山梔桔梗培陽氣若因怒便作用小柴胡湯加山梔芎歸清肝涼血若午前甚用小柴胡湯加參芪歸朮補氣清肝午後甚用四物湯加酒炒黑黃柏知母五味補陰降火如雨足心熱屬腎虛用六味丸以壯水之主兩足冷屬陽虛用八味丸以益火之源

一項強口噤腰背反張者氣血虛而發瘧也仲景張先生云足太陽病發汗太多則瘧風病下之則瘧復發汗則加拘急瘡家發汗則瘧蓋風能散氣故有汗而不惡寒曰柔瘧寒能澁血故無汗而惡寒曰剛瘧皆因內虛復汗亡津血筋無所養而然悉

屬虛象非風症也當大補氣血為主故產婦潰瘍勞傷氣血濕熱相火誤服尅伐之劑者多患之其義可見近以瘧為瘧傳寫之誤也

一婦女經閉若因鬱火傷脾以歸脾湯加山梔丹皮氣血俱虛

以八珍湯加山梔丹皮若因服燥藥傷血以四物湯加生甘草

若經候過期而來者氣血虛也八珍湯倍用參朮先期而來者

血虛熱也四物湯倍加參朮牡丹皮將來而作痛者氣虛血滯

也四物湯加茯苓白朮香附色紫而成塊者血熱也四物湯加

山梔丹皮作痛而色淡者血氣虛也用八珍湯其血崩之症肝

火不能藏血者用加味逍遙散脾虛不能統血者用補中益氣

湯凡此皆六淫七情虧損元氣所致當審其因而調補胃氣為主

### 變症治法

一身起疙瘡搔破膿水淋漓若寒熱往來者肝經氣血虛而有



火也用八珍散加丹皮柴胡寒熱內熱者血氣弱而虛熱也用八珍散倍用參朮若惡寒形寒者陽氣虛寒也用十全大補湯若肌膚搔如帛隔者氣血不能外榮也用人參養榮湯若面部搔之麻痒者氣血不能上榮也用補中益氣湯若痿軟筋攣者血氣不能滋養也用補中益氣湯佐以六味地黃丸

一口舌生瘡或咽喉作痛若飲食喜冷大便秘結者實熱也用四順清涼飲肌熱惡熱煩渴引飲者血虛也用當歸補血湯飲食惡寒大便不實者虛熱也用十全大補湯熱從下或從足起者腎虛熱也用加減八味丸若飲食難化四肢逆冷者命門火衰也用八味地黃丸

一牙齒作痛或牙齦潰爛若喜寒惡熱屬胃火加味清胃散爲主惡寒喜熱屬胃虛補中益氣湯爲主

一自汗盜汗蓋自汗屬氣虛盜汗屬血虛自汗用補中益氣湯  
送六味地黃丸盜汗用當歸六黃湯

內本連黃  
相炒黑用

送六味地黃丸

若因勞心而致以歸脾湯倍用茯苓酸棗仁

一唾痰或作喘若右寸脉浮緩者肺氣虛也用六君子湯加桔  
梗右寸脉洪滑者肺經有熱也用瀉白散右寸關脉浮緩遲弱  
者脾肺氣虛也用六君子湯加桔梗黃芪右寸關脉洪滑遲緩  
者脾熱傳肺也用瀉白瀉黃二散右尺脉微弱者命門火衰而  
脾肺虛也用人參理中丸如不應用八味地黃丸右寸脉洪數  
者心火尅肺金也用人參平肺散如不應用六味地黃丸左寸  
關脉洪弦數者心肝二經有熱也用柴胡清肝散如不應佐以  
牛黃清心丸清其風熱仍用六味地黃丸以鎮陽光左尺脉數  
而無力者腎虛而水泛上也用六味地黃丸加五味子以滋陰

如脉微細或手足冷或兼喘促急用八味地黃丸以補陽  
一舌赤裂或生芒刺兼作渴引飲或小便頻數不時發熱或熱  
無定處或足心熱起者乃腎水乾涸心火亢盛用加減八味丸  
主之佐以補中益氣湯若誤用寒涼之劑必變虛寒而歿  
一口舌生瘡作渴不止不時發熱或晝熱夜止或夜熱晝靜小  
便頻數其熱或從足心或從兩脇或從小腹中起外熱而無定  
處者此足三陰虧損之症也用加減八味丸爲主佐以十全大  
補湯若誤用寒涼治火之劑復傷脾胃胸腹虛痞飲食少思或  
大便不實小便不利胸腹膨脹肢體思腫或手足俱冷者此足  
三陰虧損之虛寒症也急用加減金匱腎氣丸亦有復生者  
一肚腹腫脹若朝寬暮急屬陰虛暮寬朝急屬陽虛朝暮皆急  
陰陽俱虛也陽虛者朝用六君子湯夕用加減腎氣丸陰虛者

朝用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸真陽虛者朝用八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄瀉口吸氣冷者此真陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不救也

一發熱惡寒若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入陽中則惡寒也用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱也用六味地黃丸若暑熱令而肢體倦怠此濕熱所乘屬形氣虛而病氣實也當專補陽氣用補中益氣湯若發熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱屬形病俱虛也當專補陰血用當歸補血湯

一發熱作渴若右寸關脉浮大而無力者脾肺之氣虛也用補中益氣湯數而有力者脾肺之氣熱也用竹葉石膏湯寸脉微

數而無力者肺氣虛熱也用竹葉黃芪湯尺脉微細或微數而無力者命門火衰也用八味地黃丸左寸關脉數而有力者心肝之氣熱也用柴胡梔子散數而無力者心肝之氣虛也地黃丸味地黃丸尺脉數而無力者腎經虛火也用加減八味丸瘡愈後口渴或先渴而患瘡或口舌生瘡或咽喉腫痛或唇裂古黃目赤痰涎上湧者皆敗症也非此丸不能救

一眼目昏弱或內障黑花屬血虛神勞用滋陰腎氣丸若視物無力或見非常之狀屬陰精虛弱用滋陰地黃丸若視物無力或視物皆大屬陽盛陰虛用六味地黃丸若目緊體倦或肌膚麻木屬脾肺氣虛用神效黃芪湯若至夜目暗燈下亦暗屬陽虛下陷用決明夜靈散若眼暗體倦內障耳鳴屬脾胃氣虛用益智聰明湯蓋五臟六腑之精氣皆稟受於脾土上貫於目脾

爲諸陰之首目爲血脉之宗當補脾土爲善

一衄血吐血若左寸關脉數而無力血虛也四物加參朮淨而無力氣虛也補中益氣湯尺脉數或無力腎虛也六味地黃丸右寸關脉數而有力者肺胃熱也犀角地黃湯數而無力者肺胃虛熱也先用濟生犀角地黃湯後用四物湯加參朮白朮尺脉數無力陰虛也用六味地黃丸若面黃目澀眇多手麻者肺虛也用黃芪芍藥湯

一飲食少思若因胃氣虛而不能食用四君子湯若因脾氣虛而不能化用六君子湯大便不實或嘔吐者脾氣虛寒也用六君子湯加乾薑木香若作嘔口渴或惡冷飲食者胃氣虛熱也用五味異功散毒冷飲食胃氣實熱也用瀉黃散

一帶下因經行產後外邪入胞傳於五臟而致之其色青者屬

於肝用加味逍遙散加防風濕熱壅滯小便赤澇用前散加炒  
黑龍膽草肝血不足或燥執風熱用六味丸逍遙散色赤者議  
於心用小柴胡湯加黃連山梔當歸思慮過傷者用妙詮疾得  
味丸色白者屬於肺用六味丸補中益氣湯加山梔色  
於脾用六味丸六君子湯加山梔柴胡不應用歸脾湯加酒炒  
屬於腎用六味丸氣血俱虛用八珍湯陽亦無妨然渴必未待  
湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼木黃芩

六味丸若病久元氣下陷或尅伐所傷蕩解之月

若拘於人之肥瘦而用燥濕瀉火之藥反傷脾胃爲患也用大

一二便下血若右關脉浮數氣虛而熱也用四君子加升麻

歸尺脉浮大或微弱元氣下陷也用補中益氣湯左關脉洪數

血虛也用四物湯加炒山梔升麻秦芫脉遲緩或浮大氣虛也

幸元壽安 萬壽幾更卷上 十 五百九

用四君子湯加升麻炮薑尺脈洪數或無力者腎虛也用六味地黃丸若因房勞傷損精氣陰虛火動而小便下血諸血病者不問脈症百端但用前九料煎服爲善

一泄瀉在五更或侵晨乃脾腎虛五更服四神丸日服力者肺散或不應或愈而復作急用八味丸補命門火以生腎氣白朮尺自止

黃目澀眩多手麻者

一大便不通屬脾肺虧損大腸津液乾涸

其日期飲食數多必待腹滿脹自欲去而不能乃積因脾氣滯也  
也用豬胆汁潤之若妄服苦寒辛散之劑元氣愈傷或也用芍止或成中痞之症若氣血虛者用八珍湯加麻子仁腸虛熱也  
用補中益氣湯加麻子仁腎液不能滋潤用六味地黃丸  
子仁若厚味積壅小便淋秘者肝腎虛也用六味地黃丸以滋



腎水用補中益氣湯以補脾胃若發熱晡熱用六君子湯加味  
逍遙散養陰血清風熱若兼筋骨痛先用透經解鬱湯秦苑訖  
黃湯後用八珍散加牡丹皮柴胡主之若誤服風劑而謔疾得  
者用易老祛風丸若兩股或陰囊或兩足必用四生散  
為善若誤服草烏川烏之類或敷巴豆砒石等味肌湧加酒炒  
成癘症治者審之

亦無妨然渴必未待

一面赤搔痒或鬚毛脫落屬肺經風熱

氣虛用補中益氣湯加天麻僵蚕血虛湯解之

鈎面發紫疔或成塊或鬚毛脫落屬肝經風熱先用也

加山梔丹皮鈎藤鈎後用加味道遙散凡症屬肝經血燥

但宜滋腎水生肝血則火自息風自定痒自止矣

一遍身疙塔或癩疹搔痒此風熱傷血用羌活當歸散氣虛者

佐以補中益氣湯加山梔釣藤鈎血虛者佐以加味逍遙散加  
釣藤鈎若手足皴裂不問黯白或在手足腿腕搔起白皮此風  
熱而秘瀉用清胃散加芍藥蓋腎開竅於二陰精血不足則大  
便秘塞而不通矣須用六味地黃丸補中益氣湯以滋力者肺  
一小便不利若不渴而不利者熱在下焦物化之有寒白木尺  
而不利者熱在上焦氣分也用清肺散黃目澀眩多手麻者  
六味地黃丸熱結膀胱而不利者用五  
化者用補中益氣湯脾肺之氣燥而不能化生者皆因脾氣不  
飲若轉筋便閉氣喘不問男女孕婦急用八味丸緩急也用芍  
一白濁足三陰經主之屬厚味濕熱所致者用加味清虛熱也  
腎虛熱者用六味地黃丸爲主佐以逍遙散脾腎虛熱者  
味丸佐以六君子湯肝脾鬱滯者六味丸佐以歸脾湯脾肺氣

九 虛者六味丸佐以補中益氣湯濕痰下注者益氣湯佐以六味

癘瘍類症

類症者與癘形狀相似而所因不同也

謹疾得

一兩膝如癬搔痒久則膿水淋漓或搔起白皮者名腎

用四生散以祛風邪用六味地黃丸以補腎水若頭湯加酒炒

熱口乾體倦痰熱血燥秋間益甚故俗多亦無妨然渴必未待

芷散加味逍遙散氣虛者佐以補中益

血虛者佐以芡物湯加柴胡牡丹皮或湯解之

一肢體或腿臂腕間患痞癩而遊走不定者赤白赤風也用大

白遊風為血虛陰火內動外邪所搏之症白用人參消<sub>屈背</sub>屈背

用加味逍遙散氣血俱虛用八珍湯晡熱內熱用加味逍遙散

六味地黃丸

辛氏醫安 萬壽綱要卷上 七 長百正

一遍身或頭面起疙瘩或如霞片或破而膿水淋漓或痒痛寒熱乃肝火血虛也用加味逍遙散若口苦脇痛小便淋瀝肝火血熱也用柴胡清肝散若婦女夜間譫語發熱熱入血室也用小柴胡湯加山梔生地黃血虛者四物合小柴胡湯寒方者用逍遙散以健脾胃生陰血此症多有因山物誤者用白木尺一婦人肢體癢疹疙瘡搔破成瘡膿甚目澀眵多手麻甚者甚者用四物湯加柴胡山梔丹皮清肝頭目不清用八珍散加丹皮山梔補脾氣生陰血若因脾氣不月水不調肚腹作痛用八珍湯六味丸若食少體倦也也用六經閉寒熱用八珍湯佐以加味逍遙散若病久元氣怯虛熱也全大補湯佐以歸脾湯

一女子十三四或十六七而天癸未至或婦人月經不調發赤

風 癢痒痛此屬肝火血熱用小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮防

一生蟲者乃相火制金不能平木而化耳非風邪所生謹疾得  
腎水生肝血或佐以灸承漿之類說見本症

一敷砒霜患處作痛或腐潰用濕泥頻塗換之若毒湯加酒炒  
苦楚或作吐瀉飲冷米醋一二杯即止多亦無妨然湯必未待  
麻油俱可

一敷貼雄黃藥悶亂或吐瀉用防已煎湯解之

一服辛熱藥而眉髮脫落者乃肝經血傷而火動非風也用大  
物湯六味丸以滋肝血生腎水

一服川烏草烏等藥悶亂流涎或昏憤嘔吐或出血吐血用大  
豆遠志防風甘草任用一味煎湯解之大凡服風藥過多皆宜

用之未應急用甘草生薑汁

一敷貼巴豆之藥患處作痛肌肉潰爛以生黃連為末水調敷之若毒入內吐瀉等症更以水調服一二錢大小豆菖蒲汁其

可

一敷貼藜蘆毒入內煎葱湯解之

尺册

一服祛風尅伐之藥嘔吐少食胸膈不利或形氣倦怠等症

六君子湯以補陽氣若煩躁作渴飲食不思或嘔吐等症

發熱用四物湯加參朮以生陰血餘從各門治之

本症治驗

也用力

一男子冬間口苦耳鳴陰囊濕痒來春面發紫塊微腫虛熱也

冬遍身色紫不知痛痒至春各處俱大至夏漸潰又至春

指潰此患在肝膽二經令刺手指縫并臂腿腕出黑血先與再

造散二服下毒穢更以小柴胡合四物湯加白芷防風天麻鯁刺漸愈又與換肌散但遍體微赤此血虛有火因家貧未得調理秋間發熱至春面仍發塊用前散并養血藥喜年少謹疾得愈

一膏粱之人鼻壤眉落指脫體潰熱渴晡甚用四物湯加酒炒黑黃栢知母五味麥門白芷天麻鯁刺三十餘劑熱渴少止時仲夏精神倦怠氣喘身熱小便黃數大便稀溏此元氣虛而時熱勝也用補中益氣湯頓安乃與換肌散及益氣湯兼服兩月更以生脉散代茶飲瘡少退時至仲秋眩暈少食自汗體重大便溏數此亦時濕之症用清燥湯調理而愈又用補中益氣湯少加酒炒黑黃栢知母鯁刺天麻兩月餘而瘡又因勞倦耳聾熱渴誤服祛風藥病氣益劇身發赤疹與益氣聰明湯月許而

愈

一男子赤痛熱渴膿水淋漓心煩掌熱目昧語瀆怔忡不寧此  
心經受症也用安神丸兼八珍湯少加木通炒黑黃連遠志元  
氣漸復却行砭刺外邪漸退但便燥作渴用柴胡飲并八珍湯  
而愈再用換肌散而瘥

一男子肚見青筋面起紫泡發熱作渴寅卯時甚脉弦數腿轉  
筋小便瀉此肝經火症先用柴胡飲熱退便利却用小柴胡合  
四物湯加龍膽草炒山梔三十餘劑及八珍湯加柴胡山梔養  
其氣血乃用換肌散去其內毒而安年餘因勞役飲食失宜寒  
熱頭痛遍身赤疹自用醉仙散而歿

一男子面發紫疔瘡膿水淋漓睡中搐搦遍身麻木漸發赤塊  
勞怒則痒肝脉洪大砭刺臂腿腕各出血用清胃湯加大黃解



因劑煎下瀉青丸肝脉少退以升麻湯數劑下前丸諸症少  
却用寶鑑換肌散斤許又用小柴胡合四物湯加參朮天麻  
刺百餘劑及六味地黃丸半載而愈後因勞遍身麻痒脉微  
遲此氣血俱虛不能榮於腠理用十全大補湯加五味麥門  
理年餘而安

男子面赤發紫泡下體痒痛午後發熱大便燥黑此火盛而  
血虛也用再造散及四物湯加防已膽草及刺腿指縫出毒血  
而便和仍以前藥加白朮白芷茯苓羌活獨活而便黃仍以四  
物去膽草防已少用獨活加玄參葶藶五十餘劑而瘡退却用  
補中益氣湯加天麻麥門而氣血漸充時仲秋霖雨遍身酸痛  
用清燥湯而安隨用換肌散胡麻散八珍湯兼服而愈  
上舍面發腫肌如癬後變疙塔色紫搔之出水此脾肺之症

也先用清胃湯以清胃熱解表毒又用四物湯加山梔黃芩柴胡皂角刺甘草節以養陰血祛風熱及砭臂腿腕手足指縫并患處以去毒血疎通隧道乃與八珍湯加白芷皂角刺五加皮全蝎及二聖散兼服月餘以養陰血治瘡毒又與補氣瀉滯湯少愈再與換肌散而全愈後因勞倦遂發赤暈日晡尤甚以四物湯加丹皮柴胡山梔并用補中益氣湯年餘雖勞而不發一男子遍身如癬搔痒成瘡色紫麻木掐之則痛小便數而少此脾胃受症邪多在表用清胃散更砭刺患處并臂腿腕出黑血神思漸爽但惡寒體倦口乾此邪氣去而真氣虛也以大劑參芪芎歸蒺藜桔梗數劑元氣頓復却用八珍湯加黃芪白芷蒺藜大麻軟柴胡及二聖散治之其瘡漸愈後用換肌散八珍湯等藥調理半載而痊後仍發誤用尅伐攻毒患兩感傷寒而

死

男子遍身疙瘩搔則痒掐則痛便閉作渴此邪在內也治以再造散二服微下三次用桃仁承氣湯加當歸四劑及砭出黑血漸知痛痒但形體倦怠用培養之劑復其元氣又用二聖散共瘡頓愈更用大補年餘而康後患痰涎壅盛舌強語澀用二陳蒼朮黃栢知母澤瀉四劑而愈再用補中益氣湯調理而安

一男子素清苦眉盡落病在肝膽二經也乃刺臂腿腕及患處出黑血空心服八珍湯加五味胡麻首烏威靈食後服換肌散

暑其無兼變之症又能篤守禁忌不半年而痊

一儒者脚心或痒痛或麻痒或腫脹二年後身體作痒漸變疙瘩發熱耳鳴日晡益甚此屬腎虛也乃砭刺臂腿腕及手足指縫去其瘀血用六味地黃丸料加五味柴胡五十餘劑以補腎

又用換肌散祛風丸以治瘡各斤許瘡漸愈得滋補守禁而瘡  
一上舍遍身患之形體俱虛余謂須用調補元氣完復方治其  
瘡不信恪服蛇酒以攻內毒更敷砒霜等藥以蝕外毒頓加嘔  
吐清水體痛如錐或以爲毒氣外發余曰脾主肌肉此因毒藥  
脾傷而然也反服祛毒之劑吐瀉不止而歿  
一男子用藥湯薰洗汗出不止喘嗽不食腹鳴足冷肢體抽搐  
余謂此因熱傷元氣腠理不密汗出亾陽耳是日果卒

### 類症治驗

欽天薛天契年踰六旬兩賺膿水淋漓發熱吐痰數年不愈屬  
腎臟風症用四生散而瘥年餘復作延及遍體日晡益甚痰滿  
益汗唇舌生瘡兩目皆赤此腎經虛火用加減八味丸諸症悉  
愈三年後小便淋瀝莖道瀉痛此陰已痿思色而精內敗也用

前元及補中益氣湯加麥門五味而愈

翟鴻臚兩賺生瘡漸至遍身各大寸許腫而色黯時出血水吐痰咽乾盜汗心煩溺赤足熱日晡益甚形體消瘦左尺脉洪數無力余以爲腎經虛火用六味丸不月諸症悉退三月元氣頓復

松江掌教翟立之素善飲遍身疙瘡搔起白屑上體爲甚面目焮腫成瘡結痂承漿潰膿眼赤出淚左關脉洪數有力或作癘風治之膿潰淋漓余謂肝火濕毒以四物湯加乾葛連翹山梔柴胡芩連一劑諸症悉退四劑全退兩睛各顯青白翳一片亦屬肝火再劑翳去乃用六味丸而愈

一儒者身發疙瘡時起赤暈憎寒發熱服癘風之藥眉落筋攣後疙瘡漸潰日晡熱甚肝脉弦洪餘脉數而無力此肝經血虛

風熱也先以小柴胡合四物湯加牡丹皮酒炒黑黃栢知母肝  
脉漸和晡熱漸退又用八珍湯加山梔寒熱頓去再與加味逍  
遙散加參朮釣藤鈎木賊服兩月瘡悉愈而眉漸生後因怒復  
作用小柴胡湯加芎歸鈎藤鈎木賊而愈後勞役發熱誤用寒  
劑不時身痒日晡赤暈早與補中益氣湯加五味麥門山藥午  
後與加減八味丸尋愈後食炙燂等物痰盛作渴仍發疔瘡小  
便白濁右關脉滑大有力用補中益氣湯加山梔諸症悉退

一男子愈後肌膚作痒口乾飲湯此中氣虛不能化生津液榮  
養肌膚午前服七味白朮散補中益氣湯午後服參芪芎歸五  
味麥門少愈又用十全大補湯加五味麥門全愈

一男子愈後因勞惡寒頭痛體倦余謂惡寒乃胃氣虛不能護  
衛肌表頭痛乃清氣虛不能上升巔頂用補中益氣湯加五味

參門益甚更兼口噤脉微細如無又加附子五分四劑而瘥

男子愈後每早吐痰碗許形體倦怠此中氣虛而不能尅化  
臥食以參芪白朮陳皮半夏麵爲丸臨臥服早間服補中益氣  
湯不月而愈蓋胃爲五穀之海脾爲消化之器若脾氣健旺運  
行不息痰自無矣

男子愈後惡寒頭暈食少體倦屬中氣虛弱用補中益氣湯  
加蔓荊子并十全大補湯加五味子血氣充而愈

一男子面起赤暈時或發腫臂手亦然搔起白屑服癘風藥內  
熱體倦脉大而虛此因元氣虛而陰血復傷用六味地黃丸補  
中益氣湯而尋愈

一男子兩目俱赤遍身痒痛搔起白皮此肝肺陰虛誤服祛風  
燥劑鼻赤面紫身發疙痞搔出血水用升麻湯下瀉青丸數服

又用加味逍遙散數劑身鼻漸白疔瘡漸消又用四物湯加參  
芪柴胡山梔并換肌散各百餘服喜其年少謹疾全愈

一男子愈後寒熱往來體瘦倦怠飲食不甘此因元氣虛而變  
症也午前用補中益氣湯加麥門五味午後用四物湯加麥門  
五味而愈

一男子遍身搔痒後成瘡出水洒淅惡寒皮膚皺起眉毛漸落  
大便秘結小便赤少此屬肺火爲患用補氣瀉滯湯四劑諸症  
漸退但倦怠惡寒小便清少此邪氣去而真氣虛也用補中益  
氣湯兼換肌散半載乃元氣復而諸症退時仲秋忽大便不實  
小便頻數體倦食少洒淅體重此濕邪乘虛而作用東垣益胃  
湯二劑頓安仍用前藥調理三月餘全愈

一儒者遍身作痒搔破膿水淋漓眉毛脫落如癩風症久服祛



風等藥致元氣虧損余用補中益氣湯加茯苓而愈後失調理  
日晡熱甚用八珍湯加五味麥門五十餘劑而痊

儒者懷抱久鬱先四肢如癘恪祛風消毒氣血愈虛延及遍  
身寒熱作渴肢體倦怠脉洪大而虛謂余何也余曰始因脾鬱  
血虛陰火妄動後因藥傷脾胃元氣下陷遂用補中益氣湯培  
補脾胃升舉元氣用歸脾湯解散鬱火生發脾血更以六味丸  
益腎肝精血引虛火歸源不兩月諸病悉愈

男子遍身生瘡膿水淋漓晡熱口乾兩足發熱形體消瘦雜  
服風瘡藥六年未愈尺脉洪數而無力此腎經瘡也如小兒腎  
疳之症用加減八味丸不半載而痊

男子遍身生瘡似疥非疥膿水淋漓兩腿爲甚作痒煩熱肢  
體倦怠年餘不愈余以謂腎經虛火用加減八味丸而瘥

一男子秋間發疔瘡兩月餘漸高有赤暈月餘出黑血此風熱血虛所致先用九味羌活湯風熱將愈再用補中益氣湯而愈後不慎房慾復作盜汗晡熱口乾唾痰體倦懶言用補中益氣湯加減八味丸頓愈

一男子兩掌每至秋皮厚皴裂起白屑內熱體倦此肝脾血燥故秋金用事之時而作用加味逍遙散加川芎熟地三十餘劑而愈再用六味丸加五味麥門服之半載後手足指縫臂腿腕皮厚色白搔之則木久服前藥方愈

一男子因大怒發熱眉髮頓落蓋髮屬腎而眉屬肝此肝腎素虛爲怒陰火愈盛銷鑠精血而然也用六味丸料加柴胡山梔黃栢數劑漸生又二十餘劑而完

一男子遍身搔痒服祛風辛燥之劑眉髮脫落余謂前藥復傷

肝腎精血虛而火內熾所致朝用八珍湯加麥門冬五味子夕用六味丸料加當歸黃芪治之風熱退而眉髮生矣

一男子染時瘡服換肌散之類眉毛頓脫遍身作痒或時赤暈乃燥藥損其陰血陽氣偏旺而然耳朝用四物湯倍熟地加茯苓白朮牡丹皮山梔生甘草夕用六味丸料加當歸黃芪治之瘡症既愈眉毫亦生

一男子素不慎房勞其髮忽落或發熱惡寒或吐痰頭暈或口乾作渴或小便如淋兩足發熱或冷至脛屬足三陰虧損而陰火內熾朝用十全大補湯夕用六味丸料加炒黑黃栢枸杞子治之諸症退而髮漸生

一男子素膏粱醇酒患腎臟風延及遍身服癘藥益甚又用搽藥於被中薰之嘔吐腹脹遍身浮腫潰爛膿水淋漓如無皮而

死

一男子足三陰虛患血風瘡症誤服祛風散毒之劑外敷斑猫巴豆等類肌肉潰爛嘔吐腹膨或泄瀉足冷或煩熱作渴此藥復傷脾胃虛敗也辭不治不越月而歿

一婦人膿水淋漓發熱作渴體倦惡寒經水不調久而不愈此肝脾虧損而虛熱也先用補中益氣湯加川芎炒山梔元氣漸復更以逍遙散而瘡漸愈

一婦人性急善怒月經不調內熱口苦患時瘡服敗毒之藥膿水淋漓熱渴頭眩日晡益甚用加味逍遙散服之漸愈因大怒月經如湧眼赤出淚用四物湯加山梔柴胡連芩數劑而愈年餘手足臂腕起白點漸大搔起白屑內熱盜汗月經兩月餘一至忽怒或惡寒頭痛或不食作嘔或胸乳作脹或腹內作痛或

小便見血或小水不利或白帶下注此皆肝木制伏脾土元氣虛而變症也用補中益氣湯加炒黑山梔及加味歸脾湯間服半年而愈

一婦人久鬱患在四肢腿腕尤甚誤用攻毒寒涼之劑晡熱肉熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱火傷脾也用歸脾湯數劑後兼服逍遙散五十餘劑而愈

一婦人身如丹毒搔破如癩熱渴頭暈日晡益甚此屬肝經風熱血燥用加味逍遙散而愈

一婦人素晡熱月經不調先手心赤痒至秋雨掌皮厚皴裂時起白皮此皆肝脾血燥用加味逍遙散加荆芥釣藤釣川芎熟地五十餘劑又用歸脾湯二十餘劑乃服六味丸而不再發一婦人兩腿腕紫黯寸許搔破出水或用祛風砭血年餘漸胤

如掌許乃服草烏等藥遍年搔痒時出血水內熱體倦飲食無味月經三月一至脉洪而數按之則潛此燥劑愈傷脾血也先以補中益氣湯加芍藥川芎五味十餘劑乃與加味逍遙散加熟地鈞藤鈞二十餘劑再用歸脾湯加川芎熟地黃治之而不發

一婦人日晡身痒內外用追毒祛風之劑膿水淋漓午前畏寒午後發熱殊類癘風用補中益氣湯加山梔鈞藤鈞又以加味逍遙散加川芎而愈

一婦人手心色赤搔痒發熱頭暈作渴晡甚服祛風清熱之藥膚見赤痕月經過期用加味逍遙散倍熟地熱止痒退更以四物湯加柴胡參芪炙甘草茯苓頭清渴止再用四物湯加參朮茯苓山梔赤暈亦消

一婦人素清苦四肢似癬疥作痒出水怒起赤暈服祛風敗毒等劑赤暈成瘡膿水淋漓晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱傷脾血也用歸脾湯逍遙散兩月而痊

一婦人遍身疙瘩搔痒敷追毒之藥成瘡出水寒熱脇痛小便不利月經不調服祛風之劑形體消瘦飲食少思此肝火血燥生風前藥益傷脾血耳先用歸脾湯二十餘劑又用加味逍遙散二十餘劑諸症漸愈乃用六味丸調理而瘡此等症候服風藥而死者多矣

一婦人愈後唇腫皴裂食少肌瘦晡熱益甚月水過期半年漸閉時發渴躁專於通經降火發渴愈甚唇脹出血此脾經虛熱而血愈耗也治以四物湯加參苓芪朮升麻丹皮柴胡山梔外疔漸愈又用八珍湯加丹皮柴胡五十餘劑月水調而諸症痊

一 小兒面部浮腫遍身如癰半年後變疙瘩色紫作痒敷巴豆等藥皮破出水痛痒寒熱大便堅硬脾肺脉洪數而實先用防風通聖散以解表裏便利調和又用四物湯加荆防黃芩柴胡皂角刺甘草節以涼血祛毒諸症漸退更以八珍湯加白朮荆防角刺五加皮而愈後但勞則上體發赤暈日晡益甚此屬氣血虛而有火用四物湯加丹皮參朮柴胡治之稍退又用補中益氣湯加酒炒黑黃栢知母月餘全愈

一 小兒遍身患疥如癰或痒或痛肢體消瘦日夜發熱口乾作渴大便不十年餘矣此肝脾食積鬱火用蘆薈丸不月而愈

一 女子十二歲善怒遍身作痒出水用柴胡川芎山梔芍藥以清肝火用生地當歸黃芩以涼肝血用白朮茯苓甘草以健脾胃而愈半載後遍身起赤痕或時眩暈寒熱余曰此亦肝火熾



盛血得熱而妄行其夜果經至

一女子赤暈如霞作痒發熱用小柴胡湯加生地連翹丹皮而愈大凡女子天癸未至婦人月經不調被驚着惱多有此症一小兒十五歲遍身似疥非疥膿水淋漓晡熱口乾形體骨立四年矣此腎疔之症用加減八味丸而痊

韓氏子年十四早喪天真面紅腫如風狀不時舉作或誤用癘風藥內虛發熱口燥煩渴甲辰冬邀治因請教焉先生云此內傷不足陰火上炎而類赤遊風症也藥宜滋其陰則火自降補其本則標自退大經領教用四君加參芪四十劑又用此作丸服斤許不兩月而平復若從有餘治之則謬誤多矣謹錄呈上乞附藥案以惠後之患者嘉靖丁未仲春門人朱大經頓首拜

書



癘瘍機要中卷

薛氏醫按

吳郡薛而已著

新都吳玄有校

續治諸症

一男子遍身患小瘡或時作痒口乾作渴服消風散起赤痒益甚服遇風丹膿水淋漓飲食無度肌肉消瘦尺脉洪數左尺尤甚余謂腎水不足虛火上炎為患先用加減八味丸其渴漸止用補中益氣湯加五味子肌肉漸生佐以八珍湯加牡丹皮麥門冬百餘劑而痊二年後不節房勞其瘡復作或於人言又復消風散之類其瘡復患余仍用前藥調治而痊

一男子善怒面青腿內賺患癬類色赤作痒或為砭刺出血發熱焮腫作痛服消風散而益甚服遇仙丹愈加發熱作渴仍服

之膿水淋漓其脉洪數左關爲甚余謂肝經血虛火內動復傷其血而瘡甚耳先用柴胡清肝散數劑又用四物山梔治之諸症漸愈用八珍湯地黃丸兩月餘而痊

一男子面赤作渴面常患小瘡作痒服祛風藥遍身發赤癩服花蛇酒更發赤暈遍行砭刺又服消風散發熱口渴飲水不止余謂肝經血虛而風熱也用梔子清肝散及地黃丸料煎服熱渴漸止瘡漸結靨又用八珍湯地黃丸瘡靨漸脫又服月餘瘡漸愈

一男子面生粉刺或生小癩服消風散瘡益甚服遇仙丹加遍身赤痒仍服前藥發熱炊腫又服旬餘潰而出水形體骨立先用四君當歸桔梗數劑飲食稍進又用八珍湯數劑而痊

一男子患腎臟風飲燒酒發赤暈衄出血敷追毒之藥成瘡出

水曰哺益甚類大麻風服遇仙丹眉毛折落大便下血虛羸內  
熱飲食甚少勢誠可畏余先用聖濟犀角地黃湯其血漸止又  
用五味異功散加當歸升麻飲食漸進用四物參朮牡丹內熱  
漸減用易老祛風丸膿水漸少又八珍牡丹皮之類月餘瘡漸  
結靨因思慮發熱盜汗瘡復作痒兼起赤暈用加味歸脾湯數  
劑汗熱漸止用加味逍遙散六味地黃丸而痊

一男子嗜膏粱炙燻醇酒辛辣之物遍身生痞癩甚爲作痒服  
消風散之類更起赤暈又砭出血其痒益甚敷敗毒之劑遂各  
成瘡膿水津津眉毛漸脫赤痒益甚此脾經積熱傷血所致余  
先用犀角地黃湯諸症稍退乃用濟生犀角地黃湯加黃連治  
之膿水漸止乃以八珍湯加山梔牡丹皮眉毛漸生因飲食失  
宜胸腹作脹飲食少思或大便下血用五味異功散加升麻飲

食漸進又用補中益氣湯而血止仍用異功散加當歸牡丹皮而痊

一男子內賺作痒色黯搔起白皮各砭刺出血其痒益甚更起赤暈延及外賺津淫不已服祛風之藥肢體亦然作渴引飲左尺脈洪大數而無力余謂此腎經虛火復傷其血火益甚而患耳先以八珍湯加五味子牡丹皮三十餘劑諸症漸愈乃佐以加減八味丸料又百餘劑而痊

一男子常咳嗽腿患白癩風皮膚搔起白屑服消風散之類痒益甚起赤暈各砭出血赤暈開胤而痒愈甚服遇仙丹之類成瘡出水殊類大麻風咳嗽吐痰面色皎白時或痿黃此脾肺二經虛熱之症先用五味異功散治之虛熱稍退又用地黃清肺飲肺氣漸清又用八珍湯六味丸而尋愈後又咳嗽痰喘患處

作痒用參酌飲二劑散其風邪又用五味異功散加桔梗補其肺氣而痊二年後咳嗽作渴飲水脉洪大左尺爲甚用加減八味丸補腎水而痊

一男子素不愼房勞其髮漸落或發熱惡寒或吐痰頭暈或口乾作渴或小便如淋兩足發熱或冷至脛屬足三陰虧損而陰火內熾朝用十全大補湯夕用加減八味丸諸症退而髮漸生後兩腿腕患紫癩風延於兩股作痒各砭出血痒處日甚服消風等藥患處微腫延及上體兩眼昏澀余謂腎臟風先用四生散四服後用易老祛風丸月餘用地黃丸兩月餘而痊後飲食起居失宜肢體色赤服二九隨愈

一男子患白癩風過飲或勞役患處色赤作痒服消風散之類頓起赤暈遍身皆痒砭出血服祛風藥患處出血恪服遇仙丹

患處愈燉元氣日虛余先用九味廬薈丸味羌活湯諸症頓愈  
用加味道遙散加味四物湯乃痊

一男子不時患疔瘡搔痒成瘡膿水淋漓惡寒發熱先用羌活  
富歸散而痒止又用易老祛風丸而不發後飲燒酒起赤暈二  
便不通口舌生瘡熱渴不通用防風通聖散二便通利但口乾  
體倦飲食不入用七味白朮散去木香四劑而安

一男子患瘡疥搔破出膿水面赤作渴大便堅實脉洪數左關  
寸爲甚此木火相搏也先用瀉青丸料前服熱勢頓減又用梔  
子柴胡散加味道遙散而瘡愈

一男子患搔痒破而成瘡如大麻風服遇仙丹發熱作渴大便  
秘結脉沉實右關爲甚此熱蓄於內也先用黃連內疎湯而大  
便通利又用防風通聖散去硝黃而熱渴止却用八珍湯而瘡



儒者素食膏粱發熱作渴飲冷患瘡如大麻風大便出黑血  
服清熱祛風等寒藥益甚余謂血分有熱火也故寒之不寒用  
四物二連湯以清熱涼血用六味地黃丸以補腎生水而熱退  
又用柴胡梔子散調理而痊

男子遍身患疔瘡作痒勞而益甚用參芪歸朮爲君佐以柴  
朮炒芩桔梗川芎炙草而瘡更用補氣血之藥後不再發

男子患疔瘡搔痒發熱形氣虛弱口鼻氣熱且喜飲冷屬外  
邪也以消風散二劑外邪悉解但倦怠少食更治以參芪歸朮  
陳皮炙草五味子而健又以補中益氣湯去柴胡升麻加茯苓  
芍藥乃痊

男子患前症多在醫脚勞役則痒益甚小便色黃服敗毒散

芥連之劑患處痒痛夜不得寐余謂脾氣下陷用補中益氣湯加五味麥門少用炒黑黃柏治之而痊凡病日間如故日晡倦怠或勞愈加晨起如故皆元氣虛也宜用前藥補而治之

一儒者遍身生瘡搔痒膿水淋漓自知醫服八珍荆防之類益甚脈洪大按之無力余謂此氣血虛熱也用八珍湯加牡丹皮治之而愈繼娶後兩足生瘡久不愈尺脈數而無力余用地黃丸八珍湯而痊

余甥凌雲漢年十六庚子夏作渴發熱吐痰唇燥遍身如疥兩腿尤多色黯作痒日晡愈熾仲冬腿患瘡尺脈洪數余曰疥腎疔也瘡骨疽也皆腎經虛症針之膿出其氣氤氳余謂火旺之際必變瘰症用六味地黃丸十全大補二旬諸症愈而瘰症具仍用前藥而愈抵冬畢姻至春其症復作仍服地黃丸數斤前

樂三百餘劑而愈

循勳李龍岡遍身患此腿足爲甚日晡益熅口乾作渴小便頻數此腎經虛熱用補中益氣湯六味地黃丸而痊

儒者善嚏患疥余以謂腠理不密外邪所搏用補中益氣湯用白芷川芎治之不從自服荆防敗毒散盜汗發熱作渴熅痛脹水淋漓仍用前湯倍加參芪五味而痊

一儒者患在臂脚日晡或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處發腫小便赤澀此肺腎陰虛余用補中益氣湯加五味子麥門冬而愈

一儒者遍身發癩誤服攻毒之劑元氣虛而不能愈余用補中益氣湯加茯苓治之其瘡頓愈又因調理失宜日晡益甚用八珍湯加五味子麥門冬五十餘劑而愈

一男子患疔瘡色黯作痒出黑血日晡至夜益甚其腿日腫夜消余以爲氣血虛而有熱朝用補中益氣湯夕用加味道遙散而愈

一男子時疫愈後遍身發癩作痒服補中益氣湯而愈有同患者不信余言乃用砭法出血死此因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉

一男子患癩乾痒作痛以芩連荆防山梔薄荷芍藥歸稍治之而愈

一儒者應試後遍身瘙痒後成疔瘡此勞傷元氣陰火內熾秋寒收歛腠理鬱熱內作用補中益氣湯加茯苓川芎白芷而愈後復勞仍作惑於人言服祛風敗毒藥如大風之狀又發熱作渴倦怠懶食余用補中益氣湯倍加參芪歸朮半夏茯苓五味

十麥門冬而愈

舉人陸世明會試途中勞役胸患斑歛赤作痛頭痛發熱形倦  
少食大便或溏或結小便赤澀此勞傷元氣而虛火內動投補  
中益氣湯一劑頓退再劑而痊又數劑而元氣復

男子脾腎氣血虛熱恪服四物黃栢知母之類元氣愈虛倦  
益甚余朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸加五味子煎服  
而愈後至閩爲商遍身搔痒時喜熱水浴之後患瘡癩破而出  
水用風藥益甚或赤或白眼作花痒先用胡麻散六味丸痒漸  
愈用六味丸消風散瘡漸愈用八珍湯六味丸而痊次年兩股  
小腹頸項復作痒用四生散六味丸而愈

一婦人經水先期勞役或氣惱則寒熱搔痒服祛風降火等藥  
不勞怒而自痒發熱更加痰喘氣促服化痰清氣之藥形氣倦

怠食少胸痞身發瘡疹服消毒之類膿水淋漓服大麻風藥口  
乾作渴欲水而不敢飲經水又過期眉間若動又服月餘眉毛  
脫落經水淋漓余謂心肝二經風熱相搏制金不能平木木尅  
脾土而不能統血肝火旺而不能藏血也眉間屬甲木而主風  
風動血燥而眉毛脫落又若動也經云水生木遂朝用地黃丸  
以滋腎水生肝血夕用加味道遙散以清肝火生肝血月餘諸  
症漸愈又佐以四君芎歸牡丹皮月餘經水旬日而止又兩月  
餘經水五十餘日而至乃夕用五味異功散加當歸服兩月經  
水四十餘日而至因怒惱寒熱經水如崩眉稜覺動脉洪數弦  
肝脾二脉爲甚用柴胡梔子散二劑以平肝火用五味異功散  
二劑以補脾氣發熱頓退經水頓止更以八珍湯倍加參朮及  
地黃丸兩月餘經水如期眉毛漸生因飲食停滯腹脹作痛另

服祛逐之劑泄瀉不止小腹重墜飲食甚少余先用六君子湯  
送四神丸數劑瀉漸止飲食稍進又用補中益氣湯倍用升麻  
效劑重墜漸愈後因勞心發熱飲食難化嘔吐涎水其熱自臍  
上起覺飢熱頻作乃用六君子湯加炮薑治之熱時飲稠米湯  
稍安兩月餘又常服加味歸脾補中益氣二湯而痊

婦人秋間肢體作痒時發寒熱日晡熱甚口苦喜酸月水先  
期面色常青熱甚則赤恪服清熱涼血後發疙瘡赤痒益甚乃  
用熱敗毒破而膿水淋漓余謂肝脾血燥虛熱不信仍治瘡毒  
其瘡益甚形氣倦怠飲食減少余先用補中益氣湯間佐以六  
石當歸元氣稍復乃以八珍湯倍用參朮少用川芎芍藥炒黑  
間佐以補中益氣湯諸症漸愈又以四君子湯爲主佐以加味  
逍遙散兩月餘膿水漸少又服月餘瘡漸結靨因怒惱寒熱腹

脹飲食少思患處復甚用六君子湯加山梔柴胡乃用四君子湯爲主而瘡漸愈又因怒月經甚多發熱作渴瘡痛出血用柴胡清肝散熱退痛止仍用四君子湯而結靨又用八珍山梔牡丹皮而瘡愈

一婦人遍身搔痒膿水淋漓發熱身如蟲行月經不調先用升麻湯送瀉青丸熱痒頓退又用加味逍遙散經行如期用換肌丸而瘡愈後因怒經行不止筋骨作痛用秦艽地黃湯易老祛風丸而痊

一婦人遍身患疔瘡發熱作痒內服敗毒祛風外搽攻毒追蝕各潰成瘡膿水津津形氣消瘦飲食日減惡寒發熱作渴飲冷脈浮數按之則濇此元氣復傷也先用七味白朮散數劑其渴漸止飲食稍加乃用八珍湯加柴胡牡丹皮膿水漸乾又用六



石芎歸丹皮山梔瘡漸收斂仍用八珍山梔牡丹皮而瘡愈

一婦人每秋間兩心手作痒搔起白皮因勞役怒惱則發寒熱遍身作痒起疙瘡或以爲風症內服花蛇等藥外敷硫黃之類惡處炊潰又服過仙丹熱渴益甚月水不通余謂脾肝二經血燥生風先用加味道遙散熱渴漸減又用八珍柴胡山梔患處少可後因怒氣發熱脇痛患處炊腫用加味道遙散四劑而安又用四君芎歸山梔牡丹皮半哉而痊

一婦人因怒寒熱發赤暈服祛風之藥發疙瘡或砭出血患處炊腫發熱頭痛內服外敷俱係風藥膿水淋漓服花蛇酒之類前症益甚更加晡熱煩渴不寐脉洪大按之如無余謂血脫煩燥先用補血當歸湯稍緩用四君當歸數劑得睡但倦怠頭暈少食用補中益氣湯加蔓荊子稍可又用八珍湯少用芎芍倍

用參朮三十餘劑而能步履又服月餘而痊

一婦人患白癩風誤以爲大麻風服蛇酒等藥患處焮腫經水兩三月一行余曰此肝血傷而內風也誤服風藥必筋脉拘急不信仍作風治果身起白屑四肢拳攣始信余言先用八珍湯四劑又用四君子湯二劑月餘乃以四君子湯又用八珍湯二劑又月餘諸症漸退元氣漸復又以四君子湯爲主以逍遙散爲佐將兩月瘡靨脫又月餘而愈

一婦人性急善怒月經不調內熱口苦患疥瘡作痒服敗毒之藥膿水淋漓熱渴頭眩目眇益甚用加味逍遙散漸愈後因大怒月經如湧眼赤出淚用四物湯加山梔柴胡連芩數劑而愈年餘左足臂腕起白點漸大搔起白屑內熱盜汗月經兩月餘一至每怒或惡寒頭痛或不食作嘔或胸乳作脹或腹內作痛

或小便見血或小水不利或白帶下注此皆肝木制伏脾土元氣虛而變症也用補中益氣湯加炒黑山梔及加味歸脾湯間服半年而愈後每怒惱患赤暈或以風疾治之發疔瘡又服遇仙丹赤腫作痒出膿水外敷追蝕之藥寒熱作渴又服胡麻草烏之藥遍身搔痒眉毛脫落膿水淋漓咳嗽發熱月經兩月一行余用四君當歸牡丹皮月餘熱渴稍止飲食稍進又服月餘咳嗽稍可却用八珍湯加牡丹皮二十餘劑患處漸乾經水如期後因傷食作瀉不食用六君子湯飲食漸進又因怒發熱作渴患處作痛經行不止用加味逍遙散漸可仍用四君子湯而全愈

一婦人性沉靜懷抱不樂月經過期遍身作痒服祛風清火之劑搔破成瘡出水不止其痒益甚或用消風散之類眉稜跳動

眉毛折落又服遇仙丹患處俱潰咳嗽發熱飲食日少月經先  
期余作肝脾鬱怒而血燥前藥復傷而益甚先用四君子歸山  
梔牡丹皮飲食漸進服月餘而嗽止又以加味道遙散加釣藤  
鈎二十餘劑而眉不動乃去釣藤倍加參朮當歸月餘瘡漸結  
靨又以八珍湯加山梔牡丹皮而痊

一婦人患前症膿水淋漓發熱作渴體倦惡寒經水不調久而  
不愈此肝脾虧損而虛熱也先用補中益氣湯加川芎山梔而  
元氣漸復又用逍遙散而瘡漸愈又產後患疥遍身作痒搔起  
疔瘡破而出膿或出血水誤服醉仙散殊類風症余用八珍湯  
數劑而安又用十全大補湯患處漸乾因惱怒停食腹脹少食  
發熱作渴患處復潰用六君子湯加炒黑山梔數劑飲食漸進  
又用八珍湯之類而痊

一婦人日晡身痒月餘口乾又月餘成瘡服祛風治瘡之劑膿水淋漓午前畏寒午後發熱殊類風症余謂此肝火傷脾外邪所搏先用補中益氣湯加山梔釣藤又用加味逍遙散兼八珍散而痊

一婦人素清苦因鬱怒患前症遍身患疙瘡晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余用歸脾湯數劑諸症稍退後兼加味逍遙散五十餘劑而愈

一婦人性燥患痞癰作痒膿水津淫寒熱口苦脇痛耳鳴腹脹溺瀝乃肝脾血虛火症用六君柴胡山梔龍膽數劑以逍遙散兼服漸愈又與六味逍遙散七十餘劑諸症悉退

一婦人患癩症作痒脉浮數以人參敗毒散二劑少愈更以消風散四劑而安又用柴胡清肝散而愈

一婦人患痲症痒痛大便秘脉沉實以四物湯加苓連大黃梔  
花治之而便利用四物二連湯而瘡愈

一婦人身如丹毒搔破淋漓熱渴頭眩日晡益甚用逍遙散加  
炒山梔陳皮而愈又用八珍柴胡山梔丹皮而愈

一婦人患前症誤用大麻風藥破而出水煩渴頭暈誠類風症  
六脉洪數心肝脾爲甚余曰風自火出此因怒動肝火血燥而  
生風耳非真風症也與逍遙散六味丸以清肝火滋脾血生腎  
水而愈

一婦人患前症搔破久不愈食少體倦此肝脾虧損陰虛發熱  
也先用補中益氣湯加川芎炒梔元氣漸復更以逍遙散而瘡  
愈

一婦人身如丹毒後發疙瘩搔破膿水淋漓熱渴頭暈日晡益

甚先用消風散二劑又用加味逍遙散而愈

一婦人患赤遊風晡熱痒甚余用清肝養血之劑不信乃服大  
麻風藥臂痛筋攣又服化痰順氣之劑四肢痿弱又一婦患前  
症數用風藥煎湯泡洗以致腹脹並歿

一女子月經先期或經行上身先發赤暈微腫作痒若遇氣惱  
赤痒益甚服祛風之藥患處更腫硬出紫血甚多其痒愈作余  
謂肝火血燥風藥復傷血而爲患也先用加味逍遙散清肝火  
益肝血赤痒少止用地黃丸滋腎水肝木各五十餘貼而痊  
後因惱怒經水不止發熱作渴患處赤痒先用加味小柴胡湯  
二劑諸症頓止又用加味逍遙散而安

一女子二十歲月經先期而或過期或有怒身發赤暈或患疙  
瘡六七日方退服祛風藥赤暈不退搔痒作渴執爲風症恪服

前藥搔破成瘡膿水津淫余曰此肝火生風再服是藥必致筋  
攣不悟後兩手果攣始信先用地黃丸四物湯月餘熱渴頓減  
乃佐以加味逍遙散又月餘患處膿少又用四君山梔牡丹皮  
二十餘劑指能伸屈因怒發熱經水不止睡中筋脉抽動不安  
以加味道遙散加鈞藤鈞治之而痊仍用四物山梔鈞藤鈞牡  
丹皮而瘡結靨乃去鈞藤鈞調理元氣復而瘡靨脫

一女子常患癩疹作痒因怒發熱變爲疔瘡舉腫痒甚余用梔  
子清肝散治之而愈後又怒患痕起赤暈遊走不定自砭出紫  
血甚痒徹骨其熱如炙如大麻風欲用風藥余給之曰然乃  
以當歸補血湯四劑其熱悉止又用聖愈湯加味道遙散而  
愈

一女子赤暈如霞作痒發熱用小柴胡湯加生地連翹丹皮而



愈後時常發熱遍身如蟲行因惱怒起赤暈作痒用柴胡清肝散熱痒頓止用加味逍遙散熱痒全止但見風起赤暈或發癢疹或患疙瘡用胡麻散隨愈

一女子常患疙瘡時或作痒服消風之類搔破成瘡其痒不止延及頭面余先用羌活當歸散其痒頓止用加味逍遙散其熱頓痊又用當歸飲而瘡亦愈用八珍柴胡山梔而不再作

一小兒因有食積服尅滯之劑肢體生瘡似疥服消毒之藥發疙瘡赤色作痒膿水津津余先用五味異功散加柴胡山梔以補脾胃平肝木赤痒漸消又用四味肥兒丸五味異功散治之而食積愈

一女子赤暈作痒寒熱發搐服風藥身發疙瘡搔破出水此肝血風熱之症先用加味小柴胡湯後用四味肥兒丸而愈後傷

風咳嗽頭面搔痒微腫先用消風散一劑又用梔子清肝散而  
痊

一小兒遍身生瘡小便不調頸間結核兩目連劄服祛風之劑  
眉毛脫落余謂肝經風熱之症先用大蘆薈丸後用四味肥兒  
丸漸愈後因飲食停滯發熱其瘡復舉用大蕪荑湯四味肥兒  
丸而痊後每停食遍身發赤作痒服四味肥兒丸卽愈

一小兒遍身患瘡似疥作痒肌體消瘦發熱齟爛口渴飲水大  
便不實此肝腎之症也先用地黃丸治之又用大蕪荑湯而愈  
後因飲食所傷其瘡復熾先用四味肥兒丸後用大蕪荑湯而  
痊

一小兒遍身生瘡似疥或痒或痛膿水淋漓眉毛脫落大便酸  
臭小便澄白余謂肝脾之症先用大蘆薈丸後用四味肥兒丸

諸症漸愈又佐以五味異功散而痊

一小兒遍身生瘡頭髮成穗眉毛脫落肌肉消瘦大便酸臭小便不調頸間結核肚大青筋余先用五味異功散月餘後用四味肥兒丸又用大蕪黃湯異功散而痊

一小兒先陰莖作痒小便不調後遍身生瘡作痒服消風敗毒之劑譬如大風之症頸間結核發熱如炙余先用柴胡梔子後用大蘆薈丸四味肥兒丸諸症少愈又用蝦蟇丸四味肥兒丸而痊

一小兒面部浮腫遍身如癩半年後變疔瘡色紫作痒敷巴豆等藥皮破出水痛痒寒熱大便堅硬脾肺脉洪數而實先用防風通聖散便利調和又用四物湯加荆防黃芩柴胡皂角刺甘草節諸症漸愈更以八珍湯加白朮荆防皂角刺五加皮而愈

後但勞則上體發赤暈日晡益甚此氣血虛而有火也先用四  
物湯加丹皮參朮柴胡治之稍愈又用補中益氣湯加酒炒黑  
黃栢知母月餘全愈後不守禁忌遍身生瘡誠如癘風大便秘  
臭肚大青筋頭髮成穗先用肥兒丸九月餘又用大蕪黃湯數劑  
又用大蘆薈丸四味肥兒丸而尋愈

一女子十二歲善怒遍身作痒出水用柴胡川芎山梔芍藥以  
清肝火用生地當歸黃芩以涼肝血用白朮茯苓甘草以健脾  
胃而愈半載之後遍身起赤痕或時眩暈寒熱余曰此亦肝火  
熾盛血得熱而妄行其夜果經至後因肝經血燥生瘡發熱作  
痒搔破出水眉毛脫落用大蘆薈丸四物二連湯而熱退用五  
味異功散四味肥兒丸而瘡愈

一小兒遍身生瘡大便下血發熱作渴腹大青筋眉毛漸落余

用大蘆薈丸五味異功散其瘡漸愈佐以補中益氣湯熱渴漸止又用異功散爲主佐以補中益氣湯加吳茱萸所製黃連治之血止瘡愈

一小兒十五歲遍身似疥非疥膿水淋漓晡熱口乾形體骨立四年矣此腎肝之症用六味丸而痊後陰莖作痒小便澄白患瘡疥如大風余用大蘆薈丸四味肥兒丸諸症漸愈又用大蕪黃湯而尋愈後停食吐瀉不食發赤癩先用二陳山查麥芽次用異功散飲食如前又用大蕪黃湯而愈

一女子赤暈如霞作痒發熱用小柴胡湯加生地黃連翹丹皮而愈

一女子性急多怒月經先期患痞癩色赤作痒搔破膿水不止服祛風藥其瘡益甚服花蛇酒四肢痠癢眉毛折脫余先用柴

薛氏醫按 癩癧癩癧要卷之中  
胡清肝散加鈎藤鈎數劑又用加味道遙散加鈎藤鈎諸症漸愈又用易老祛風丸而愈

一女子素有肝火因怒頸項結核寒熱晡熱遍身起赤暈作痒服祛風之藥搔破出水唇目搐動余以爲脾經血虛內熱生風用梔子清肝散加鈎藤鈎而搐熱頓減又用當歸川芎散而諸症漸愈乃用加味道遙散而痊

一小兒患赤遊風余先用羌活白芷散二劑又用加味道遙散而愈後傷風熱起疙瘩搔破出水或用大麻風藥十指拳攣膿水津津余先用秦茺地黃湯手指如常又用易老祛風丸而瘡亦痊

一小兒遍身搔痒或如蟲行內服胡麻散外敷解毒散患處皆潰誠如麻風之症視其唇或掣動或兩目連劄此肝木乘脾土

用升麻湯煎送瀉青丸而漸愈

一小兒遍身搔痒起赤暈後膿水不止先用歸脾飲二劑又用胡麻散而愈後因驚挾食發熱起赤暈用越鞠丸一錢枳朮蓬朮末各五分葱湯調服二次又用消風散一服赤暈頓消又用越鞠丸而痊

此藥大面空

木末齊五八慈感晴風二定又用油風精一服表最勝出又用  
因和精而愈針因驚外食發熱時表單用熱時此一證時木末  
小兒發熱針製時表單針數本不吐去用油風精二證又用  
此藥神效前致高書大面神愈



癩瘍機要下卷

薛氏醫按

吳郡薛 已著

新都吳玄有校

各症方藥

通天再造散 治癩風惡疾

欝金 錢五

大黃 煨

皂角刺 炒黑各一兩

白牽牛 六錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

寶鑑醉仙散 治癩風

胡麻子

牛蒡子

枸杞子

蔓荊子 各炒一兩

白蒺藜

瓜蒌根

苦參

防風 各五錢

右為末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨

午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿血

病根乃去仍量人輕重虛實用病重者須先以再造散下之  
候元氣將復方用此藥忌一切炙煇厚味止可食淡粥時菜  
諸蛇以淡酒蒸熟食之可以助藥勢  
寶鑑換肌散 治癩風久不愈或眉毛脫落鼻梁崩壞不月奏  
效如神

白花蛇

黑花蛇

各三兩  
酒浸

地龍

去土

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荊子

威靈仙

荆芥穗

菊花

苦參

紫參

沙參

木賊草

白蒺藜

炒

不灰木

甘草

天門冬

去心

赤芍藥

九節菖蒲

定風草

何首烏

不犯  
鉄

胡麻子

炒

草頭烏

去皮  
臍

川芎

蒼朮

木鱉子

各一  
兩

右各另爲末每服五錢温酒調下食後酒多尤妙

補氣瀉熱湯 治癩風

升麻 連翹各五分 蘇木 當歸 黃連 黃芪 全蝎

地龍去土各五分 生地黃 荆芥各四分 人參二分 甘草一分

桔梗 梧桐淚各一分 麝香少許 桃仁三個

蠓虫去翅足炒三個 白豆蔻二分 水蛭炒烟盡三個

右先將豆蔻麝香水蛭蠓虫各另為末和勻却將前藥用水

二鍾煎至一鍾去粗入桐淚前未再煎至七分空心熱服

海藏愈風丹 治癩病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癩風

癩疹皮膚燥痒搔破成瘡並皆主之

苦參一斤取末四兩 皂角一斤剉寸許無灰酒浸一宿以水一

土花蛇一條去腸陰乾酒浸取淨 白花蛇

烏梢蛇各一條依前酒浸取肉為末

右爲末入前二味和丸桐子太每服六七十丸空心通聖散送下乾物壓之日三服間日浴之汗出爲度

愚按前方果係癩風用之必效若肝經血熱脾經血虛腎經虛火脾肺氣虛遍身作痒搔破成瘡或內熱生風而鬢鬢脫落或皮膚赤暈或搔起白屑而類癩風者服之反成癩風矣

二聖散 治癩瘡

大黃 錢五

皂角刺 三錢 燒灰

右爲末每服二錢白湯調下早服樺皮散中服升麻湯下瀉青丸晚服二聖散皆爲疎泄血中風熱也

清胃散 治熱毒在表以此發散之

升麻 白芷 防風 白芍藥 乾葛 甘草 當歸

川芎 羌活 麻黃 紫浮萍 木賊草

右各等分每服五七錢水煎

防風通聖散 治風熱熾盛大便秘結發熱煩躁表裏俱實者

防風 當歸 川芎 芍藥 大黃煨 芒硝 連翹

薄荷 麻黃 桔梗 石膏煨 黃芩炒各一兩 白朮

山梔 荆芥各二分 甘草二兩 滑石三兩 白芷

蒺藜炒 鼠粘子各五錢

右為末每服三五錢白湯調下

透經解癩湯 治風熱筋攣骨痛

川山甲三錢炮 荆芥 紅花 蘇木 羌活 當歸 防風

蟬殼去土 天麻 甘草各七分 白芷一錢 連翹

川芎各五分

右水酒各半煎服

秦茺地黃湯 治風熱血燥筋骨作痛

秦茺 生地黃 當歸 川芎 羌活 防風 荆芥

甘草 白芷 升麻 白芍藥 大力干蒸

蔓荆子 各一錢

右水煎服

羌活當歸散 治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊或癩疹

搔痒膿水淋漓

羌活 當歸 川芎 黃連酒炒 鼠粘子蒸 防風

荆芥 甘草 黃芩酒浸炒 連翹 白芷 升麻一錢

右酒拌晒乾水煎

羌活白芷散 治風熱血燥手掌皴裂或頭面生瘡或遍身腫

塊或膿水淋漓

羌活 白芷 軟柴胡 荆芥 蔓荆子 防風

猪牙皂角 甘草 黃芩 黃連 酒炒各一錢

右水煎服

四生散 治腎臟風耳鳴目痒鼻赤齒浮或婦女血風瘡

白附子 獨活 黃芪 白蒺藜 各等分

右為末每服二錢用猪腰子劈開入藥濕紙裹煨熟細嚼鹽

湯下風癬酒下為丸亦可

消風散 治風熱癰疹痒痛或膿水淋漓或頭皮腫痒

荆芥穗 甘草 各二錢 陳皮 五錢 人參 白殭蚕 炒

茯苓 防風 芎藭 蟬殼 去土 羌活

藿香 各一兩 厚朴 姜製五錢

右每服五七錢薑水煎

九味羌活湯 治一切外因瘡毒

羌活 防風 蒼木各一錢五分 川芎 白芷 生地黃

黃芩 甘草各一錢五分 細辛五分

右水煎服

當歸飲 治血熱癰疹痒痛或膿水淋漓發熱等症

當歸 白芍藥 川芎 生地黃 防風 白蒺藜

荆芥各一錢五分 黃芪炒 甘草 何首烏各一錢

右水煎服

升麻湯 治風熱身如蟲行或唇反縱裂

升麻三分 茯苓 人參 防風 犀角鎊 羌活

官桂各二錢

右每服四錢水煎下瀉青丸



悍皮散 治肺風瘡疥癩疹及風刺粉刺

樺皮 四兩 炒灰

荆芥穗 二兩

甘草 炙五錢

枳殼 四兩 去穢 煨存性

杏仁 二兩 去皮 尖另研

右為末磁器貯之每服四五錢水煎

胡麻散 治風熱癩疹搔痒或兼赤暈寒熱形病俱實者

胡麻 一兩 二錢

荆芥穗

何首烏 不見鐵器 各八錢

威靈仙

防風 石菖蒲

牛旁子 炒

甘菊花 蔓荆子

白蒺藜 炒去刺

甘草 炒各六錢

右每服三錢酒調

易老祛風丸 治疥癩風瘡

黃芪

枳殼 炒

防風

芍藥

甘草

地骨皮

枸杞子

熟地黃

生地黃

各酒拌 杵膏

右各另爲末入二黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十九白湯下

白丁香散 治癘風眼中生翳肉

白丁香 貝母

右爲末入乳汁調點眼內

子和生眉散 治癘風眉毫脫落

半夏 羊糞各等分

右爲末薑汁調塗眉稜上如不應當參類疰眉脫條治之

燥洗癘瘡藥

何首烏 荆芥 防風 馬鞭草 蔓荆子各等分

右每用十兩水一斗煎數沸無風處洗出汗

解毒散 治風瘡解外毒

巴豆肉

皮硝各一兩

黃蜂窠

黑狗脊各七錢

白芷

雄黃

猪牙皂角

羊蹄根

輕粉

蟬殼去土

枯礬

寒水石各五錢

右爲末臘猪油調搽外毒既去却搽黃連散

愚按洗藥雖能疎通腠理而損元氣解毒散雖能攻毒而傷

良肉不宜多用

黃連散 治癘瘡清熱解毒

黃連五兩

五倍子一兩

右爲末唾津調塗之

加味道遙散 治血虛有熱遍身搔痒心煩目昏怔忡頰赤口

燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥

當歸炒

芍藥酒炒

茯苓

白朮炒各一錢

柴胡五分

牡丹皮

甘草 炙

山梔

炒各八分

右水煎服

當歸補血湯

治肌熱惡寒面目赤色煩渴引飲脉洪大而虛

重按似無此血虛也若誤服白虎湯必死

黃芪

炙一兩

當歸

酒製二錢

右水煎服

補中益氣湯

治中氣不足或因尅伐四肢倦怠口乾發熱飲

食無味或飲食勞倦頭痛煩躁惡寒自汗氣喘身熱等症

人參

當歸 各一錢

黃芪

炒

白朮

甘草

炙各一錢半

陳皮

炒

柴胡

升麻

各三分

右薑棗水煎空心午前服

四君子湯

治脾胃虛弱飲食少思大便不實等症

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

灸一錢

右薑棗水煎

八君子湯

治脾胃損傷飲食少思或大便不調面色痿黃等

症即四君子加陳皮半夏

七味白朮散

治中氣虛弱津液不足口乾作渴或口舌生瘡

不喜飲冷吐瀉等症

人參

白朮

木香

白茯苓

甘草

灸

藿香

各五分

乾葛

一錢

右水煎服

四物湯

治血虛發熱煩躁或晡熱作渴頭目不清若因脾虛

不能生血者用四君子湯

當歸

熟地黃

各二錢

芍藥

炒

川芎

各一錢

右水煎服

歸脾湯 治憂思傷脾內熱發熱或血妄行吐下或健忘驚悸

少寐或婦女經候不準晡熱內熱或唇口遍身瘡疥等症

白朮 黃芪炒 當歸 茯神 人參 龍眼肉 遠志

酸棗仁炒各一錢 木香五分 甘草分三

右薑棗水煎

八珍湯 治氣血俱虛惡寒發熱或煩躁作渴等症即前四君

四物二方相合

十全大補湯 治症同上或更兼自汗盜汗體倦食少等症即

八珍湯加黃芪肉桂

聖愈湯 治一切失血或血虛煩渴躁熱臥睡不寧或瘡症膿

水出多五心煩熱作渴等症

熟地黄生者自製

生地黄

當歸酒拌各一錢

人參

黃芪炒

川芎各一錢

右水煎服

弓歸湯 治失血煩熱作渴或頭痛眩暈

川芎三錢

當歸酒拌五錢

右水煎服

竹葉黃芪湯 治氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉

生地黃各二錢

黃芪 麥門冬

當歸 川芎

黃芩炒

甘草 芍藥

人參 半夏

石膏煨各一錢

右水煎服

竹葉石膏湯 治胃火盛而作渴

淡竹葉

石膏煨

桔梗

木通

薄荷

甘草各一錢

右薑水煎

濟生犀角地黃湯 治胃火盛血熱妄行或吐衄便血形氣虛

病氣實者

犀角鎊

生地黃

赤芍藥

牡丹皮

各一錢

當歸

右水煎傾出八犀末服若形氣病氣俱實再加黃芩黃連若因氣惱而致加山梔柴胡

桃仁承氣湯 治血結胸中手不可近或中焦蓄血寒熱胸滿

漱水不欲嚥善忘昏迷其人如狂

桃仁五分

大黃一錢

甘草三分

肉桂五分

右水煎服

瀉青丸 治肝經風熱頭目昏眩肌肉瞤動或牙關緊急痰涎

壅盛或頸項脇肋小腹陰囊腿股作痛凡屬肝經有餘之症



用之

當歸

川芎

山梔

龍膽草

酒拌  
炒焦

大黃

炒

羌活

防風

各等分

右為末密丸桐子大每服二三十九白湯下

椰子清肝散

治三焦肝膽經血虛風熱耳項胸乳等處痒痛

或發熱寒熱晡熱自汗或目唇搐動

柴胡

梔子

牡丹皮

各二錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子

炒各七分

甘草

五分

右水煎服

木胡清肝散

治風熱怒火或寒熱嘔吐等症

柴胡

山梔

炒各錢半

黃芩

炒

人參

川芎

各一錢

連翹

桔梗

各八分

甘草

五分

右水煎服

當歸川芎散 治手足少陽經血虛風熱耳內疼痛或寒熱少

食頸目不清日晡熱甚

當歸 川芎 柴胡 白朮 芍藥 山梔炒一分

牡丹皮 茯苓各八分 蔓荊子 甘草各五分

右水煎服

小柴胡湯 治肝膽經風熱或寒熱往來或晡熱潮熱默默不

欲飲食或因怒火口苦耳聾脇痛等症

柴胡二錢 黃芩一錢 人參 半夏各一錢 甘草炙五分

右薑棗水煎

大蘆薈丸 治疔火下疔或小兒疔膨食積口鼻生瘡或牙根

蝕爛或蟲蝕肛門痒痛

胡黃連 蘆薈 黃連炒 木香 白蕪荑炒 青皮

白雷丸 鶴虱草各一兩 麝香一錢

右為末蒸餅糊丸桐子大每服一錢空心米湯下

加味地黃丸 治腎經陰虛耳內痒痛或兩目昏花或吐痰氣

喘作渴發熱小便赤澀等症

乾山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉 白茯苓

熟地黃自製 生地黃 柴胡 五味子各另為末等分

右二地黃搗碎酒拌濕杵膏入前末和勻煉蜜丸桐子大每

服百丸空心白湯下

二陳湯 治中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思

陳皮 茯苓 半夏 甘草各一錢

右薑棗水煎

連翹飲子 治目惡日光或癡澀昏花不能久視迎風有淚

蔓荊子 甘草 連翹各三錢 黃芪炒 柴胡 黃芩酒拌各五分

生地黄 當歸 紅葵花 人參各三分 升麻

防風 羌活各一錢

右水煎服

四物龍膽湯 治肝經風熱眼暴赤痛或生雲翳

當歸 川芎 芍藥 生地黄 羌活 防風

龍膽草酒拌炒焦 防已

右水煎服

四物三連湯 治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱

當歸 生地黄 白芍藥炒各一錢 川芎七分 黃連炒五分

胡黃連三分

右每服五錢水煎

地芝丸 治目能近視不能遠視此陽氣不足陰氣有餘

生地黃焙乾四兩 天門冬去心 枳殼炒 甘菊花各二兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸清茶下

定志丸 治目能遠視不能近視此陰氣不足陽氣有餘

白茯苓 人參各二兩 遠志去心 石菖蒲各一兩

右為末煉蜜丸桐子大以硃砂為衣每服二三十丸温酒下

日三服

神効黃芪湯 治渾身或頭面手足麻木不仁兩目緊縮羞明

畏日或視物不明

黃芪二兩 人參八錢 甘草炙 白芍藥 蔓荊子各一兩

陳皮五錢

右每服五錢水煎臨臥熱服如麻木不止更加黃芪雖有熱症不用黃栢

益氣聰明湯 治脾胃傷損眼目昏暗或飲食勞役脾胃不足

致內瘕耳鳴

黃芪 甘草炙 人參各五錢 升麻 葛根 黃栢炒各二錢

芍藥一錢 蔓荊子一錢七分

右每服五錢水煎臨臥及五更服脾胃虛去黃栢

清涼飲 治實熱大便秘結或咽喉腫痛

當歸 赤芍藥 甘草炒 大黃蒸各等分

右每服五錢水煎

清胃散 治脾胃濕唇齒作痛或齒齲潰爛或連頭面作痛或

發熱惡寒或熱藥厚味所致

生地黃酒拌

當歸酒洗

牡丹皮

黃連各五分

升麻錢一

右水煎服如痛未止加石膏之類

涼膈散 治上焦實熱煩躁作渴或喉舌腫痛便溺秘赤

大黃 朴硝 甘草 梔子仁 黃芩 薄荷各一兩

連翹四兩

右每服三五錢水煎

黃連解毒湯 治瘡瘍焮痛煩躁飲冷脉洪數發狂言

黃芩 黃連 黃柏 山梔各炒一錢半

右水煎服

瀉黃散 治胃經實熱嘔吐或口舌生瘡

石膏煨 藿香各一錢 山梔五分 甘草五分 防風七分

右水煎服

潤腸丸 治脾胃伏火傷血或失血大腸乾燥大便不通或風

熱血結便秘食少

麻子 桃仁去皮尖 另研 羌活 當歸尾 大黃煨

皂角仁各一兩 秦莖五錢

右為末煉蜜或猪膽汁丸桐子大每服三五丸食前滾湯下如燥糞在肛門之間用膽汁導之即通若因津液乾涸不通當補氣血

滋腎丸 治不渴而小便不利者乃膀胱經熱甚不能生水宜用此藥以滋化源

肉桂三錢 知母 黃栢各酒炒 黑二兩

右為末水丸桐子大每服二百丸空心白滾湯下

清肺飲 治渴而小便不利乃肺經有熱絕寒水生化之源且



用此藥

茯苓

錢三

猪苓

錢三

燈心

錢一

木通

分七

藷麥

分五

萹蓄

分三

右為末作二劑水煎

芩清肺飲 治肺燥而小便不利

黃芩

山梔

各一錢

右水煎服

淋散 治膀胱有熱水道不通淋澀不出或尿如豆汁或成

砂石或熱拂便血

赤茯苓

錢一分五分

赤芍藥

山梔

各一錢

當歸

甘草

各一錢二分

右用燈心二十莖水煎

何心蓮子飲 治熱在血分口乾便濁夜則安靜晝則發熱或

口舌咽乾或生瘡煩渴小便濇淋

黃芩 麥門冬 地骨皮 車前子炒 甘草各一錢五分

石蓮肉 茯苓 黃芪炒 柴胡 人參各一錢

右水煎服

升陽益胃湯 治脾胃虛弱怠惰臥或值秋令體重節痛大

便不調小便頻數飲食不消洒淅惡寒悽慘不樂面色不和

乃陽不升也

羌活 獨活 防風各五錢 柴胡 白朮 茯苓內者不用

澤瀉各三錢 人參 黃芪各二兩 半夏 甘草炒各一兩

芍藥 黃連炒 陳皮各三錢

右每服三五錢薑棗水煎若服後小便愈數而病愈加是不

宜分利小便當減茯苓澤瀉

生脉散 治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言汗出不止口乾作渴等症

人參

錢五

麥門冬

錢二

五味子

錢一

右水煎服如不應倍之

酒燥飲 治氣血衰弱濕熱乘之遍身酸軟或濕熱行令肺金受邪腎無所養小便赤少大便不調或腰腿酸軟體重麻木或頭暈食少自汗口乾胸滿氣促懶於言語

黃芪

錢各一

蒼朮

錢各一

人參

白朮

神麴

錢各一

陳皮

錢各五

甘草

錢各

黃栢

錢各

麥門冬

當歸

錢各三

葛根

澤瀉

青皮

錢各二

五味子

錢各九

右水煎服

一神丸 治脾胃不足侵晨作浮或不時去後飲食少思肌肉

消瘦

補骨脂四兩

肉豆蔻二兩

生薑四兩

紅棗四十枚

右用水一盞者薑棗至水乾取棗肉和藥末杵勻丸桐子大每服五七十丸淡鹽湯下

六味丸

一名地黃丸加肉桂五味名如減八味丸

治腎虛發熱作渴痰咳頭暈喉燥

唇裂腰腿痠軟或自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰小便淋瀝等症

熟地黃自裂八兩

山茱萸去核

乾山藥各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉各三兩

右為末地黃杵膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食

前滾湯下

加減金匱腎氣丸

治脾胃虛腰重脚腫小便不利或肚腹腫

脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如神

白茯苓

三兩

附子

五錢

川牛膝

肉桂

車前子

澤瀉

山茱萸

山藥

牡丹皮

各一兩

熟地黃

四兩酒拌杵膏

右為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八十九空心米飲

下

五味異功散

治脾胃虛弱飲食少思或食而難化大便不實

等症

人參

白朮

炒

茯苓

各二錢

甘草

炙

陳皮

各一錢

右水煎服

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食少思等症

內豆蔻

五味子

各二兩

補骨脂

四兩

吳茱萸

炒一兩

右為末水二碗生薑八兩紅棗百枚煮熟取棗肉和末丸桐

子大每服五七十九空心食前白湯下

愈風丹 治諸風肢體麻木手足不隨等症

天麻

牛膝酒浸

草薢

玄參各六兩

杜仲七兩

羌活十四兩

當歸

熟地黃自製

生地黃各一斤

獨活五兩

肉桂三兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七十九溫酒下

瀉白散 治肺經實熱咳嗽

桑白皮

地骨皮各一兩

甘草五錢

右為末每服三錢白湯調下

半夏白朮天麻湯 治寒熱所鬱大便不利或嘔不食痰唾稠

粘頭目眩暈喘促氣短或頭痛身重四肢逆冷

半夏

天麻

黃芪

人參

蒼朮

陳皮

澤瀉

茯苓各一錢五分

白朮

神曲炒各一錢

大麥芽

乾薑炒黑冬三分

黃栢酒製二分

右每服五錢水煎服

牛黃清心丸 治諸風手足不隨痰涎壅盛言語蹇澁心忡健

忘或發顛狂

防風 白朮 白芍藥 羚羊角鎊 麝香另研 龍腦另研

麥門冬去心 黃芩各一兩 人參 神麩炒 芍藥 杏仁去皮尖

蒲黃炒各二兩 甘草五兩 白茯苓 芎藭 牛黃另研一兩二錢 山藥

柴胡 桔梗各一兩二錢半 雄黃另研二錢 牛黃另研一兩二錢 山藥

白欽 乾薑各七錢五分 當歸酒浸一兩半 大豆黃卷 阿膠

肉桂各一兩七錢 犀角三兩 大棗一百枚 金箔內四百為衣

右為末和勻同棗肉加煉蜜丸龍眼大以金箔為衣每服二

丸白湯化下

人參理中丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思等症

白朮炒 人參 乾薑泡 甘草炙各等分

右為末丸桐子大每服六七十九丸白湯下

人參平肺散 治心火剋肺傳為疽癢咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸

膈痞滿咽嗑不利

人參 陳皮 甘草炙 地骨皮 茯苓各一錢

知母炒七分 五味子件炒四分 青皮五分 桑白皮炒一錢

天門冬去心四分

右水煎服

决明夜靈散 治目至夜則昏雖有燈月亦不能睹

石决明 夜明砂各另研二錢 猪肝一兩或隔羊肝亦可

右以竹刀切肝作二片鋪藥於內用線縛定砂礬內米泔水



煮至半碗臨睡連肝食之

人參益氣湯 治暑熱傷氣肢體困倦飲食少思或發熱作渴等症

黃芪

八錢

人參

甘草

各五錢

炙甘草

升麻

柴胡

各一錢

白芍藥

三錢

五味子

一百四十粒

右作四劑水煎服

四七湯 治七情鬱結成痰或如梅核梗於喉間或中腕停痰

惡心嘔逆

紫蘇葉

厚朴

姜製

茯苓

各一錢

半夏

姜製一錢五分

右薑棗水煎

硫黃散

治紫白癩風

硫黃

一兩用醋一碗煎乾再晒

右為末以生薑蘆藥擦患處

神效當歸膏 治風瘡去腐肉生新肉其肉赤黯毒氣熾盛搽至淡赤或其毒已退收功甚速此膏生肌止痛補血續筋故與新肉相宜

當歸 黃蠟

生地黄 各一兩

麻油 六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去粗入蠟溶化候冷攪勻即成膏矣如用白蠟尤好

砭法 治風毒癩血壅盛或色赤走徹用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭夾之用線縛定兩指輕撮筋梢令磁正對患處懸一寸許再用筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等症

甘草炒一錢

人參各五錢

桔梗各五錢

遠志去心炒

扶神 黃芪

辰砂另研三錢

麝香二錢

木香煨二錢五分

右為末每服二錢溫酒調下

四味肥兒丸 治小兒食積五疳或白禿體瘦肚大筋青髮稀

成穗或遍身瘡疥等症

蕪荑炒

神麩炒

麥蘖炒

黃蓮各等分

右為末猪膽汁丸黍米大每服一二十九木通煎湯下米糊

丸亦可

地黃清肺飲 治肺肝咳嗽

明阿膠一錢炒

鼠粘子三分炒

馬兜鈴

甘草各五分

杏仁七枚去皮尖

糯米炒十粒

右水煎服量見加減

蟾蜍丸 治無辜疔症一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴身多癩者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食

一晝夜用布袋盛蛆置急水中一宿取出瓦上焙乾為末麝

香一字和勻粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下甚效

柴胡湯加山梔牡丹皮名治傷寒溫熱身熱惡風頭痛項強

四肢煩疼往來寒熱嘔歲痰實中暑瘧疾並服之方見前

愚按前方若肝膽經風熱肝火癩癰寒熱來日晡發熱潮熱

身熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或脇痛胸滿小便不

利或泄瀉吐酸苦水或肢體搐動唇目抽劄並宜用之

神効太乙膏 治癰疽瘡毒潰爛

玄參 白芷 當歸 肉桂 赤芍藥 大黃

生地黄

各一兩

右用麻油二斤入于銅鍋內煎至黑濾去粗徐入淨黃丹一斤

再煎滴水冲捻軟硬得中即成膏矣

金華散 治乾濕瘡癬

黃丹

一兩

輕粉

三錢

黃栢

黃連

各一兩

麝香

一字

右為末洗淨搽之乾用猪脂和傳麻油亦可

方治惡癬以紫貝草根生白礬少許同搗塗患處

又方

剪刀草

黃連

苦參

各五錢

真輕粉

二錢

右為末入麻油調敷

人楓子膏 治一切瘡疥膿窠等瘡

大楓子肉

白礬

各二兩

真輕粉

一兩

柏油

六兩

右為末將柏油溶化和勻用之

加味逍遙散 治肝脾血虛身發赤痕或發熱胸乳腹脹或搔

痒盜汗心煩體痛或頭目昏重怔忡頰赤或口燥咽乾食少

嗜臥或婦女月經不調惡寒發熱等症 方見前

歸脾湯 治憂思傷脾身發赤痕或搔破成瘡健忘怔忡驚悸

少寐或心脾作痛自汗盜汗咳吐痰血或肢體作痛大便不

調或婦女經候不準晡熱內熱或唇口生瘡流注等症 方見前

白癥方

人參 白朮 蒼朮 鹽炒 防已 酒拌 黃栢 酒拌 川芎 各一錢

陳皮 酒拌 當歸 茯苓 木瓜 紫胡稍 甘草 各五分

右薑水煎服如三劑不退加桂少許或用湯煎小便澀倍用

牛膝有熱加黃連身熱加羌活量兒大小用

化羅丸 治諸疳生蟲不時啼哭嘔吐清水肚腹脹痛辰白紫

黑腸頭濕蘊

蕪荑 青黛 蘆薈 蝦蟇燒灰 川芎 白芷 胡黃連

右各另為末等分猪膽浸膽成糕丸如麻子大每服一二十

丸食後并臨臥杏仁湯下

大肥兒丸 治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成穗

項間結核發熱作渴精神倦怠便去酸臭愛食泥土或口鼻

頭瘡或肚見青筋嚙齒下利便白五疳即四味肥兒丸加乾

蟾一兩蕪荑五錢

天麻丸 治肝疳眼目生翳昏花濕爛等症

青黛 川黃連 天麻 五靈脂 川芎 夜明砂微炒

蘆薈 龍膽草 防風 蟬蛻去足各一錢 全蝎二枚

麝香少許

右為末猪膽汁浸糕丸麻子大每服二三十九丸白滾湯下

阿魏膏 治一切痞塊不拘年月遠近甚者口齒蝕傷更服蘆

蒼丸

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲

生地黃 兩頭尖 大黃 白芷 天麻各五錢

槐柳桃枝各二錢 紅花四錢 木鱉子二十枚 去殼

亂髮如雞子大一 洗去膩

石用香油二斤四兩煎至黑色去粗入髮再煎待髮化盡去  
相徐下黃丹一斤煎至軟硬得中方入苾硝四錢阿魏四錢  
蘇合油麝香沒藥各五錢調勻即成膏矣攤貼患處內服消  
積丸藥黃丹須真正者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處大小



鋪之約半指厚以紙蓋之用熨斗熨良久如硝耗再加熨之  
熨二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

大防風湯 治膝風腫痛不問已潰未潰

附子 炮去皮

牛膝 酒浸

甘草 炙各一錢

人參

杜仲 姜製

當歸 酒浸

羌活

防風

白芍藥 炒

黃芪 各二錢

川芎 一錢五分

熟地黃 用生者酒并蒸一  
日忌裁器二錢

右每服三五錢薑水煎空心服進三五劑更服六味地黃丸

二三服

獨活湯 治鶴膝風不問腫潰疼痛及腰背四肢不仁

獨活

當歸

白朮

黃芪 炒

薄桂

牛膝 各一錢

甘草 炙五分

右薑葱水煎服量兒加減

清熱消毒散 治癰疽陽症腫痛發熱作渴

黃連炒

山梔 連翹

當歸各五分

川芎

芍藥炒

生地黃

金銀花各錢

甘草五分

右水煎服

神功散 治瘡毒未成者用之內消加乳沒尤妙

黃栢炒

草烏炒

血竭等分

右各另為末和勻用漱口水調搽小兒丹瘤用之亦效已破

者用之作痛

乳香定痛散 治瘡瘍潰爛疼痛

乳香

沒藥各三錢

滑石七錢

寒水石

一兩

冰片二錢

右為細末搽患處痛即止甚效

加減泡龍丸

治風痰壅盛驚搐昏睡等症

雄黃

辰石各二錢

天竺黃錢四

麝香分五

天麻六錢

牛膽南星八錢

右為末煎甘草膏丸皂角子大每一丸薄荷湯下

解毒散 治一切瘡毒風疹痒痛

黃栢炒

山梔等分

右為末水調搽若破而膿水淋漓用當歸膏或燭油調搽

黃金散 治天疱瘡止痛消毒

滑石

甘草等分

右為末挑破去水敷之

清涼解毒散 治症同前或作熨痛

大黃

黃栢

山梔

寒水石

煨等分

右各另為末調搽當歸膏尤好

製附子法

附子重一兩三四錢有蓮花瓣頭底圓平者先備童便五六碗將附子先埋熟草灰中半日乘熱投童便浸五七日揭皮切四塊仍浸二三日用粗紙數重包之浸濕埋灰大半日取出切片檢視有白星者乃用瓦上炙熟至無白星爲度如急用卽切火上炙黃用之亦効大凡陽氣脫陷子時至午寒惡未至亥發熱如用熟附子不應必用半生半熟更不應急用生附一二劑然後量症治之