

醫法考略

三

醫法青篇

卷之三

燕山琢之陳

璞

健菴弟

玠

同著

武林門人徐紹熙

較正

疾

疫

飲

肝風肝火

木乘土肝犯胃

肝疾脇痛

頭痛

頭

風

眩

暉

便 血
癲 狂 痘 痘
內 經 痘 痘
淋 濁 濁 濁
瘡 瘡 瘡 瘡
肺 膜 瘡 瘡
胸 痘 瘡 瘡

脫 黃 痘 痘
瘡 痘 痘 痘
便 便 便 便
腸 腸 腸 腸
胸 膜 膜 膜

痰

痰之為症。情狀變幻不一。古人不究其本。每以消痰之方論之後。人遵其法。而治之。有不驗者。稱為怪病。不知痰乃病之標。非病之本也。善治者。究其生痰之源。則不治痰而自無矣。細加詳考。痰乃飲食所化。有因外感六氣之邪。則肺脾升降之機失度。致飲食輸化不清。而生痰者。有因鬱火。則氣不舒。而蒸變者。有因多食甘膩肥腥茶酒。而生痰者。有因本質脾虛溫。

痰

濁凝滯而生痰者。又有腎水虛而泛痰者。此亦因土不制水。則腎中濁陰上逆。非腎中真有痰水上泛也。更有陰虛勞症。龍火上炎。燶肺以致痰咳者。此痰乃津液所化。必不濃厚。若欲消之。不惟無益。而反傷津液。愈治愈甚。其餘一切痰症。初起皆濁濕而生。雖有風火燥痰之名。亦皆因氣而化。非風火燥。自能生痰也。其主治之法。惟痰與氣。一時壅閉。咽喉者。不得不用豁痰降氣之劑。以開之。餘皆當治其本。故古人有

見痰體而治痰之論此誠千古之明訓。蓋痰本飲食。溫濁所化人豈能禁絕飲食。耑欲消之。至於外邪者。邪散則痰清如寒則溫之。熱痰則清之。濕痰則燥之。燥痰則潤之。風痰則散之是也。若不相宜必旋消旋生有至死而痰仍未能清者乃不知治本之故也。觀葉案治法有因鬱因火者必要開鬱清火為君以消痰佐之有因溫因熱者則用燥濕清熱佐以化痰之品若因肝腎虛而生痰者則純乎鎮攝固補此真知

治痰之本者。若因寒因湿者。更當於痰飲門。兼參而治之可也。

宿哮久矣。不發心悸震動。似乎懊惱之象。心煩此屬痰火。宜通鬱遏。

半夏 川連 石菖蒲 蛤粉 枳實 茯苓

鬱金 橘紅 竹瀝薑汁法丸

痰火鬱遏氣滯。吸烟上熱助壅。是氣滯熱鬱。因痰當清熱理氣。

川連 白朮 枳實 厚朴 半夏

荅參
薑湯為丸

痰火風虛眩暉防仆跌

天麻

半夏

橘紅

茯苓

羚羊

駒藤

老年痰火咳逆痰有穢氣

蘆根

苡仁

桃仁

絲瓜子

荸薺

大棗

下虛不納濁泛嘔逆痰穢氣

熟地炭

胡桃

炒杞子

炒牛膝

斛 茯神

痰火上逞蒙寢耳鳴頭暉

半夏

橘紅

茯苓

甘草

天麻

鉤藤

甘菊

羚羊

爪姜皮

脉弦長五火燔燎而肝陽胃陽為痰動怒抽掣此為
肝病宜靜養勿忿薄味清裏藥乃近理

羚羊角

犀角

川連

鬱金

山梔

北秦皮

牛黃

胆星

橘紅

生石炭

金薄

水法九竹葉燈心湯下

右關脈弦滑痰多舌干微強語言似塞蓋因痰火上
蒙津液不得上承高年頗慮風痺宜上宣通分進剛

燥膩滯之藥

半夏 金石斛 橘紅 黑梔 茶荳 鬱金

生草 石菖蒲 竹瀝 薑汁

昏昏如寐 神憤如迷 痰熱內閉 宜清痰利竅

半夏 石菖蒲 桔梗 枳實 鬱金 橘紅

竹瀝 薑汁

鬱痰 肝木內風

半夏 鬱金 石菖蒲 明天麻 白蒺藜 橘紅

茯苓 鈎藤

濕熱聚痰。脈沉弦。目黃肢末易有瘡疾。皆濕熱痰盛。
氣隧不得流暢。法當苦辛清裏。通機痰因火起。清熱
為最。

生茅术 黃柏 瓦萎皮 山梔 菜菔子 川連

半夏 厚朴 橘紅 竹瀝薑汁法丸

病後厚味蒸痰

風化硝 瓜萎仁霜 枳實 生茯苓 山梔 蕃金薑炒竹瀝

脉脹濕阻熱痰

半夏 茯苓 黑梔 捣紅 製蒺藜 遠志
降香

木火犯中，胃虛生痰，陽動內風，肝胆風火，貫隔痰多，經脈不利，宜清少陽鬱熱，使中宮自安。

半夏 陳皮 茯苓 金斛 桑葉 丹皮

左脉浮弦數，痰多脘中不爽，煩則火升眩暉，靜坐神安，宜少陽陽明同治。

羚羊 連翹 廣皮 炒麥芽 黑梔 香豉

痰火上盛，胃氣少攝，朝用通下暮服清肅上焦。

羚羊

半夏

茯苓

橘紅

黑梔皮

鬱金

苦丁茶

水丸晚服

熟地

淡荳蔻

杞子

五味

牛膝

茯苓

龜膠

蜜丸早服

色鮮明，屬上有痰飲，蓋上實則下虛，脉小不靜，弦滑。
當清肺胃之熱，益腎肝之精血。

燕窩膠

話梨膏

人參

黃芪

麥冬

山藥

茯苓 於术 黄节 鹿尾膠 羊內腎 菖蒲
故紙 青益

腎虛痰多食少體中微倦由乎藏聚未固當攝腎固
真乃治痰之本方為有益。

熟地 茯苓 补骨脂 胡桃肉 枳子 五味
牛膝 遠志 車前 煉蜜為丸

五十六

藝華毛子

毛毛

半聯

美英子

醉東都

醉東都

美英子

少林寺毛毛

美英子

少林寺毛毛

美英子

少林寺毛毛

美英子

少林寺毛毛

疫飲

內經止有積飲之說並無疫飲之名仲景始分疫飲。因有疫飲而又分懸飲溢飲支飲之義則立大小青龍半夏芩桂术甘腎氣等湯以及內飲外飲諸法可謂闡發前賢獨超千古與後人所立風疫濕疫熱疫酒疫食疫之法迥異總之疫之之作必由元氣虧乏及陰盛陽衰而起以致津液凝滯不能輸布留於胸中水之清者悉變濁水積陰則為飲飲凝陽則為痰。

若果真元充足胃強脾健則飲食不失其度運行不
停其機何痰飲之有故仲景云痰飲者當與溫藥和
之乃後人不知痰飲之義妄用滾痰丸茯苓丸消痰
破氣或填膩補等法大傷脾胃堆砌助濁其於仲景
治痰之法大相乘謬然痰與飲雖為同類而實有陰
陽之別陽盛陰虛則水氣凝而為痰陰盛陽虛則水
氣溢而為飲故王晉三依仲景之小半夏茯苓及外
臺飲三湯從脾胃二經分痰飲立法今葉氏又取仲

景之苓桂术甘外臺茯苓飲腎氣丸真武湯分內飲
外飲治法而於痰飲之症無遺蘊矣

高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆嘔咳形
寒仲景云飲積不治咳當以溫藥通和之

杏仁 桂枝 淡薑 茯苓 茯仁 灸草

向有耳聾鳴响是水虧木火蒙竅咳嗽有痰脇痛臥
着氣衝乃衛陽升而為痰飲宜開太陽以肅上

茯苓 桂枝 干薑 五味 白芍

炙草
當午時服

背寒咳逆此屬飲象先當辛通飲邪以降肺氣

鮮枇杷葉 杏仁 茶芩 橘紅 生薑 半夏

酒客谷少中虛痰飲時發胸中痞塞自速或飢遇冷即病是為陽氣受病不必見痰搜逐但護中焦脾胃使陽氣健運不息陰濁痰涎自消

生於术 桂枝 淡薑 茯仁 澤瀉 薑束湯丸

舌白咳嗽不渴非飲象而何宜溫藥和之

杏仁 茯仁 半夏 干薑 桂枝 茶芩

厚朴 炙草

形體似壯陽氣外泄畏風怯冷脾陽消泛水谷蒸變
痰飲遵仲景法溫藥和之

人參 淡附子

生於术

枳實

茯苓

澤瀉

荆滌薑汁法丸

陽虛則形寒汗出痰飲痞聚是陰濁成形乘陽氣衰
微上干竊踞必通其陽以掃陰氣

人參 熟附子

淡薑

炒川椒

桂枝

烏梅 生白芍

又方 真武丸三兩

茯苓

白芍

白朮

附子

生薑

右脈沉靜左脈微弦清陽日薄脾臟鼓運漸遲而為
痰飲依仲景外台飲以治脾陽非龍相之動搏而難
旋轉運脾宜合還少火寶參用之法

熟地

蓴蓉

枸杞

五味

萸肉

山藥

茯神

菟絲

覆盆

葛蒲

遠志

魚膠

龍骨

青鹽

熟蜜同東方搗丸早服五錢

茅术

於术

半夏

茯苓

廣皮

生益智

白蒺藜 鈎藤

董東湯泛丸晚服三錢開水下

體內豐溢脈來沉緩季脇痛歟下咽汨汨有聲吐痰頭痛皆脾胃陽微寒濕滯聚宜溫中佐以條達運通

蒼朮 厚朴 半夏

茯苓 陳皮 淡董

胡蘆巴

炙草

董汁泛丸

腸紅酒病氣衝喘嗽脫腸痞阻飲邪濁上宜仲景溫

通法

桂枝

茯苓

干薑

五味子

杏仁

白芍

痰飲

四

交草 生左牡蠣

肺胃濕痰，咳緩，脘中不爽，肌腠癩痒，皆濕邪未盡，痰飲窈踞，當用六安法。

杏仁 白芥子 炒半夏 茯苓 淡薑 橘紅

中焦痰熱，面色鮮明，脘中漾漾欲嘔，因鬱勃熱氣蒸為痰飲，宜清中焦熱痰。

杏仁 枳實 橘紅 佩薑皮 龙金 半夏曲

桔梗 黑梔

痰飲挾氣火上竊踞，脘痞不爽，宜理氣熱

半夏 茯苓 永姜 黑施皮 橘紅 麝金

飲伏經絡，背寒氣短，背痛，暎心，貫脇入腰，食粥噫氣，
脘痞，渴出黃沫，飲邪伏熱，乃陽傷，宜溫經通絡。

桂枝 生白朮 炒黑蜀漆 厚朴 茯苓 炮黑川烏

懸飲流入胃中，令人駁痛，湧噫酸水，當辛通其陽，以
驅飲

桂枝 半夏 茯苓 炒黑川椒 薑汁 淡附子

肝風肝火

肝者將軍之官相火內寄得真水以涵濡真炁以伏木火遂生生之機本無是症之名也蓋因情志不舒則生鬱言語不投則生嗔謀慮過度則自竭從中變攻衝激烈升之不熄為風陽抑而不透為鬱氣脘脴脹悶眩暉猝厥嘔逆淋閉見紅等病古人雖分肝風肝氣肝火之殊其實是一源若過鬱者宜辛宜涼乘勢達之為要過升者宜柔宜降緩其旋擾為先自竭

者全屬乎虛當培其子母之臟至於犯上侮中乘下患者甚多因古人未以此為病名葉立法分治有補前人之未備也當為後世準繩

因勞怒觸動情志至於嘔逆微冷條熱交丑寅漸作耳鳴咽痺食納久畱腕中是少陽木火盛於寅胆火脈貫耳犯逆之威必向陽明而後上凭諸竅脈右濤大胃逆不降食味不甘而腕中逆亂薰蒸日熾營血內耗無以養心寤不肯寐心搖蕩漾有難鳴狀今頭

重脫脾全是上焦為木火升騰宜以苦降其逆辛通
其痺用當歸龍會丸

當歸

龍胆草

川棟子

蘆薈

川連

吳萸

大茴

早晨服

又連翹

黑梔

羚羊角

鮮菊葉

紫苑

鬱金

杏仁

瓜萎皮

鮮菖蒲根

午後服

腹痛少減嘔逆已止上焦熱下焦冷肝陽尚未和平
仍宜當歸龍會法肝胆風火上鬱頭面清空之筋掣

不和治以清散

羚羊角 犀角 山梔 連翹 瓜萎皮 荷梗

薄荷梗 青菊葉

勞心陽動木火上蒙心神常動陽冒無制清靈上蒙頭中欲搘腕欲撫摩二便不利此腑氣之窒由乎肝胆厥拂逆宜從上焦治

羚羊 連翹 元參 麻金 杧冬

石菖蒲根
竹葉

脉左滻右弦氣火不降胸膈隱痛腕不爽是肝胆有

火最慮失血

川貝

山梔

丹皮

鬱金

鉤藤

瓜萎皮

茯苓

橘紅

因繫思擾動五志之陽陽化內風變幻不已夫陽莫
制水臟陰少藏自覺上熱下冷上實下虛法當以介
滑之酸以收之厚味以填之偏寒偏熱烏能治情志
中病

熟地

萸肉

五味

磁石

茯神

青鹽

肝風肝火

鱉甲膠 龜版膠 即溶膠為丸

下元水虧風木內震肝腎虛多驚恐非實熱疾火可攻劫

生地 阿膠 天冬 杞子 菊花炭 女貞實

陽升血熱脈小數形體日瘦口舌糜碎肩背掣痛肢節麻木膚腠搔痒目眩暈耳鳴日久此屬操持積勞陽升內風旋動燬筋捐液先宜清血分中熱繼當養血熄其內風勿勞可愈

生地

玄参

天冬

丹生

犀角

羚羊

連翹

竹葉心

九方
何首烏

生白芍

墨芝麻

冬桑葉

天冬

女貞子

茯神

青鹽

肝胆陽氣挾內風上騰不熄心中熱驚怖多恐進陽

鎮攝方法

龜甲

龍骨

牡蠣

茯神

遠志

石菖蒲

又神識畧安夜不得寐胸脅間時時閃爍欲動乃內

風不熄宜補心法

生地

丹參

玄參

茯神

枣仁

遠志

葛蒲

天冬

麦冬

桔梗

硃砂

風陽阻竅虛風麻痺清竅阻塞

天麻

鉤藤

白蒺藜

甘菊花

連翹

桑皮

絡熱竅痺夏季陽氣暴升煩勞擾動致內風上阻清竅口喝舌強呵欠機竅阻痺不靈脉數舌胎忌投溫散乃司氣所致非表邪為病也

犀角

羚角

鬱金

菖蒲

胆星

駒藤

連翹

橘紅

竹瀝

董汁

又清絡得效火風無擬忌投剛燥

犀角

羚角

鬱金

菖蒲

連翹

生地

元參

廣皮

竹瀝

董汁

氣火上鬱。腕中窒痛嘔涎先以開通壅遏。

香豉

瓜萎皮

山梔

鬱金

竹茹

半夏
杏仁

嗔怒宣嚷怒動阻火氣逆血痺咽痛食物厭惡耳前

後遺肩閃刺。宜解少陽。

夏枯草 丹皮 桑葉 鈎藤 山梔 地骨皮

頭痛燥煩忽然而至迅速莫如風火向有肝病目疾
喪明陰氣久傷育陰可使風清大忌發散蓋陰根久
傷煩燥頭痛當大補滋腎母以甦肝子補胃陰以杜
木火乘乘可望全可

人參 熟地 天冬 麦冬 龜膠

北五味
夜神

絡熱。鼻左竅有血。左肩脾臂痛皆君相多動營熱氣

偏脈得右虛左數先以清肝通絡

丹皮

山梔

羚羊

夏枯草

桑沙

鉤藤

連翹

青菊葉

肝陰虛內風乃身中陽氣之變動宜甘酸之屬治之。

生地

阿膠

牡蠣

災草

萸肉炭

挾陽內風上嶺目眥耳鳴不寐是肝虛火動宜滋宜清。

熟地炭

災龜甲

萸肉

五味

磁石

茯苓

旱蓮草

女貞子

肝風肝火

操持煩勞。陽氣挾內風上擾清空。頭眩耳鳴。目珠痛。
宜辛甘化風。仍是補肝用意。

枸杞子 桂元肉

歸身

災草

甘菊花

女貞子
夏枯草

交節病變。總是虛症。目泛舌強。脊背不舒。溲淋便濁。
皆腎液營。肝風乃張。當宗河間飲子。以濁藥輕服。

熟地

蕤英

炒杞子

麦冬

茯苓

川斛

生沙苑

石菖蒲

遠志

飲子煎服。

又緩肝潤血熄風。

製首烏 杞子 歸身 冬桑葉 胡麻 柏子仁

茯神 天冬 黑芝麻 黑豆皮 蜜為丸

高年水虧。肝陽升逆無制。兩脇熱如火。則火升而
赤。遇煩勞為甚。宜養肝陰。和陽為法。

九蒸首烏 天冬 黑芝麻 黑豆皮 胡麻 九蒸冬桑葉
北沙參 柏子仁 茯神 女貞子 青葉汁法丸早服

脈數面赤。是肝風擾動。宜和陽熄風。

生地 元參 羚角 連翹 蒲菖根 鮮銀花
麥冬

肝風肝火

左脇中動跳。這是肝風未熄。胃津內乏。無以擁護。此清養陽明為要。胃強不受木乘。病當自減。

枣仁 遠志 黄芪 蓮肉 人參 當歸

茯苓 茯神 陳皮 火草

胃虛。肝風內震。嘔痰咳嗽。頭痛眩暉。肢麻汗出。寒熱。

半夏 陳皮 茯苓 甘草 天麻 酸藤

色蒼形瘦。木火體質。身心過動。皆主火化。夫吐痰衝氣。乃肝胆相火犯胃。納食自少。宜解鬱和中。而調肝

胃節勞戒怒使內風勿動

杞子 豐仁 炒柏子仁 金石斛 半夏麴 橘紅

茯苓 黃菊花膏丸

木火體質復加鬱勃肝陰愈耗厥陽升騰頭暉目眩心悸宜養肝熄風泄木安胃

桑葉 鈎藤 遠志 石菖蒲 半夏麴 廣白皮

金斛 茯苓

左脈弦氣擰至咽心中憤憤不知何由乃耗陰陽元

肝風肝火

宜養肝之體清肝之用

乳石決明 鈎藤 橘紅 疦神木 鮮地黃 獅羊角

桑葉 黃菊花

晝夜不寐焦煩乃肝風內擾鼻準光亮飄肉浮腫宜
寶腸胃庶幾內風可熄

生牡蠣 炒生地 生白芍 南杏肉 菊花炭 矢草

木乘土肝犯胃

肝為風木之臟，又為將軍之官。其性急而動，為病居多。婦女尤甚。肝木旺，則乘脾土。致有嘔吐、脇痛、耳聾、寒熱、吐酸涎沫、腹脹、便溏不爽、肢冷、肌麻、胸膈痞悶等症。有陰陽虛實之殊。若肝陰胃陰未虧，肝陽亢逆，而犯胃者，用藥則用剛遠柔泄肝，如吳萸椒桂通胃。則半夏薑汁薑附益智枳朴等劑，以運脾陽。若中虛必用人參大半夏湯，附子粳米進退黃連瀉心等法。

治中溫胆湯是也。若肝陰胃汁已虛。木火熾盛。風陽擾胃。用藥忌剛。用柔。則阿膠生地白芍麻仁木瓜。養胃。則人參麦冬白朮梗米等藥。至於平治之法。則剛柔寒熱兼用。如烏梅丸逍遙散。六君子異功成已。則必加泄肝之品。用桑葉丹皮取桑葉輕清少陽之氣。熟丹皮辛苦清瀉肝膽之血。熱用金鈞子散者。金鈞子苦寒。直泄肝陽。延胡索理氣滯血濇之痛。此治肝木乘土之剛領也。若不知土敗木賊。肝氣日橫。脾胃日

敗延之不救者多矣故立嵒門聊為一助耳

人參大半夏湯運脾陽中虛

人參半夏白蜜附子粳米

進退黃連瀉心湯運脾陽瀉心

川連乾薑人參桂枝半夏木棗

烏梅丸嘔吐寒熱兼進

人參當歸烏梅黃連黃柏桂枝

干薑川椒附子細辛

木乘土

逍遙散 濕肝

歸身

白芍

柴胡

茯苓

白术

甘草

干薑

薄荷

六君子湯 补脾

人參

白术

茯苓

陳皮

半夏

甘草

異功散 补脾

人參

白术

茯苓

陳皮

甘草

戊己湯 补脾

人參 白朮 茯苓 陳皮 白芍 甘草

肝厥犯胃入隔

半夏 薑汁 杏仁 瓜萎皮 金齡子 延胡

白蔻 香豉

情懷不適陽氣鬱勃化內風掀旋轉動心悸流涎。麻
木悲歸左肢蓋肝因起病之源胃為傳病之所飲酒
中虛便溏宜和解肝胃

桑葉 丹皮炒 天麻 金斛 川貝 地骨皮

木來土

三

情志不遂肝木之氣逆行犯胃嘔吐隔脹宜理氣清
肝和血

延胡 川棟子 蘿梗 烏藥 香附 紅豆蔻

胃脘痛高突而堅嘔清涎滴水不能下喉四肢冷肌
膚麻木庭背畧緩此屬肝厥犯胃

開口吳萸 川棟子 炒延胡 生香附 良薑 山楂

脉左弦少寐氣從左升宜泄肝和胃

生牡蠣 川棟子 橘紅 伏苓 澤瀉 吉草

肝逆犯胃脘痛腹鳴氣擗至咽

川棟子 桂枝 淡薑 川椒 生白芍 吳萸
烏梅 瓢參

目微黃舌黃煩渴脇肋梗實呼吸周身牽掣起於頻
吐食物痰飲即胸脘痛脹此肝木犯胃諸氣渾阻宣
通氣分為宜

半夏 廣皮 香仁 白蔻仁 川棟子 延胡

瓜萎皮 生薑

木來土

木火之形氣阻脘中食少癢痛胃口為逆氣忌用燥
熱劫津以平肝和胃

降香 麝金 山梔 橘紅 枇杷葉 薑子

川貝 薑皮

脈小弦納谷脘中悶噎因悒鬱強飲火犯土胃氣不
得下行宜苦辛泄降法

黃連 麝金 淡豉 竹茹 半夏 丹皮

山梔 生薑

嗔怒動肝氣逆惡心胸脇悶動氣下墮欲便是中下
二焦損傷不復約束宜培土泄木法

烏梅

干薑

川連

川椒

人參

茯苓

川棟子

生芍

拒按為實目病屬肝痛必多嘔大便秘濇肝病及胃
當苦辛泄降火佐酸味

川連

生薑

淡豉

枳實

黃岑

白芍

氣滯脾弱宜逍遙散加鬱金砂仁

木乘土

大便未結。腹中猶痛。食入有欲便之意。胃陽未復。肝木因時令尚橫。用泄木安土法。

人参 木瓜 厚朴 茯苓 益智仁 青皮

動怒脘下痛。不欲食。是肝厥犯脾胃。宜泄肝木益脾土。

人参 焦白术 焦芍药 伽南香 炒焦烏梅 茯苓

又 人参 嫩鉤藤 明天麻 炒烏梅 茯苓 伽南香 檘紅

胃弱痰多。補虛宜通。肝陽易升。左頰赤。佐泄少陽。

人参 炒半夏 灸參 鉤藤 霜桑葉 煅薑 南棗

脾竅開舌出淡是少陽胆火犯土以養脾泄胆
人參　於术　天麻　董黃　桑葉　丹皮
能食運遲舌紋裂左頭內腫不喜飲水太陰脾陽鬱
法當補土泄木

於术　茯苓　陳皮　煨益智　紫胡　丹皮
白芍　炙草

脈小弱是陽虛由鬱勃內動少陽木火犯土遂致寢
食不適法當補土泄木

人參

半夏

廣皮

桑葉

白朮

丹皮

茯苓

甘草

薑枣

朱砂

大木

生地

熟地

朱砂

生地

熟地

肝疾脇痛

肝氣宜順而不宜逆。逆則脇痛。故治脇痛必湏平肝。平肝必湏補腎。腎水足而肝有養。其氣自平而脇痛止矣。內經云。肝無補法。補腎即補肝也。肝為血府。又為風臟。左脇陰血。右脇陽氣。故以肝血為左。然血凝必有氣滯。氣滯生痰。而痰氣興。血相搏而為兩脇皆痛。總由肝疾而成。肝風。肝火。木乘土。皆另立專門。至於脇痛一症。係由疾聚致成。虛氣亦當較論分治。庶

於肝疾無遺情矣。扉氣者。有虛實之分。若左閔脈弦而芤。左脇下成塊。上至氣衝胃口。下氣衝至丹田。由積怒傷肝。不能藏血。或失血刲血等症。是扉氣之虛也。宜開鬱潤肝養血。兼補腎水。若左閔脈弦急。如新張弓弦。左脇下痛。或有形跡。是扉氣之實也。多因鬱怒傷肝。肝氣結聚而成。然肝為剛臟。不受直折。宜理氣柔肝之劑。但血凝必有氣滯。氣滯則必生痰。而痰血相搏。兩脇皆痛。宜活血消痰。又有肝經鬱結。脉沉

喘者氣逆乾嘔左脇隱痛此木鬱則有悔土之意宜
疏肝緩胃之劑治之臨症權變智者自達矣

加減潤肝湯扇氣血虧失血衄血
肝經燥氣結成塊

山萸

桃仁

桂心

茯苓

柏子霜

細辛

阿膠

鬱金

製香附

薑引

理氣柔肝湯扇氣實左脇
下痛成塊

製香附

陳皮

枳壳

柴胡

白芍

桃仁

川棟子

延胡

歸尾

生牡蠣

桂枝

痰血凝滯兩脇皆痛宜清痰消瘀

瓜萎仁 半夏 陳皮 茯苓 延胡

桃仁

枳壳 麝金 歸尾 白芍

秋石

加竹瀝薑
汁童便

氣逆乾嘔宜疎肝緩胃

歸身 白芍 柴胡 茯苓

白朮 橘皮

半夏 枳實 千薑 竹茹

川棟子 灵草

左乳傍痛迄腰腹重按得熱少緩此屬陰絡虛寒

當歸 肉桂 小茴 丁香皮 茯苓 淡薑

痛從中起，遠及右脇。得食自緩。每痛必由下午黃昏。
是脈絡受傷。宜辛溫通絡。

當歸 茯苓 炮薑 肉桂 爬草 大棗

痛必右脇中有形。攻心嘔吐。清涎周身寒凜。痛止無
跡。此乃寒入脈絡。宜辛香溫通。

畢撥 半夏 川棟子 延胡 吳萸 良薑

茯苓 蒲黃

肝着。脇中痛。勞慾致傷氣血。

川棟皮 炒延胡 歸鬚 桃仁 生牡蠣 桂枝木
左脇前後板着。食後痛脹。病在絡。氣血皆窒。當辛香
緩通。

桃仁 歸鬚 小茴 川棟子 半夏 生牡蠣

橘紅

紫降香

白芥子

水泛為丸

痛在脇肋。遊走不一。漸至疫。多手足力少。是經絡受
傷。宜通少陽陽明之絡。通則不痛矣。

歸鬚

炒桃仁

澤蘭

柏子仁

香附

丹皮

穿山甲 乳香 没藥 水泛為丸

左脇痞積攻痛

生牡蠣

南山楂

炒延胡

川棟子

炒桃仁

歸鬚

丹皮

桂枝木

左脇宿傷腹背痛

炒桃仁

歸鬚

炒延胡

片董黃

五加皮

桂枝木

炒小面橘紅

左脇痛暮夜五心熱嗌肝腎陰虧

人參 生地 天冬 麦冬 柏子霜 生白芍
左脇骨痛，易飢嘔，涎，肝風內震，入絡

生地 阿膠 生白芍 丹皮 桔子仁 澤蘭
桃仁 桑枝

脇下痛，犯中焦，初起上吐下瀉，寒熱不止，病在少陽之絡。

青蒿梗 歸鬚 澤蘭 丹皮 紅花 蕙金
脈右弦，左小弱濶，脇痛本氣不足，日餌辛燥，氣泄血

耗傷及肝胃則夢寐紛紜是肝不藏魂傷及無形
宜用甘藥少佐攝鎮

人參 豉仁 茯神 火草 柏子仁 金箔

當歸 龍骨 桂元

頭痛

頭為諸陽之會。與厥陰肝脉會於巔頂。諸陰寒邪不能上逆。惟陽氣窒塞。濁陰濁邪得以上據。厥陰風火。乃能逆上作痛。故頭痛一症。皆由清陽不升。風火乘虛。上入所致。若係腦項至泥丸者。此真頭痛。必死不治。東垣云。高巔之上。惟風藥可到。總其大體而言。然風藥最能燥血。故李士材純用血藥。每見其長葉天士又云。虫蟻搜逐血絡。宣通陽氣為主。用法竒巧如

風火變動。與暑氣風邪上鬱而為頭痛者。用鮮荷葉
苦丁茶。蔓荆山梔等辛散清輕為主。如陰虛陽越而
為頭痛者。用仲景復脉湯。甘麦大枣法。加膠芍牡蠣
鎮攝。益虛和陽熄風為主。如厥陽風木上觸。魚內風
而為頭痛者。用首烏柏仁稽豆甘菊生芍杞子熄肝
風滋腎液為主。葉案於此一症。而條分縷晰。可謂手
法兼到也。

脈左弦數。右偏頭痛。左齒痛。

連翹 薄荷 羚角 夏枯草 黑梔皮 鮮菊葉
苦丁茶 乾荷葉
內風頭痛。淚冷。
炒杞子 製首烏 柴子仁 疗神 菊花炭 稽豆皮
風鬱頭痛。
鮮荷葉 苦丁茶 黃芩 黑梔 連翹 蔓荆子
川芎 白芷 白芍 木通

婦人頭痛在左。腦後厥陽。風木上觸。

生地 生白芍 柏子仁 炒杞子 菊花 茯神

當歸 川芎

暑風溫熱，混於上竅，津液無以運行，頭痛舌強，宜清

連翹 石膏 生草 滑石 蔓荆子 羚角

荷梗 桑葉

去血過多，脈數而動，為陰虛陽實，頭痛氣浮，筋惕

生地 阿膠 牡蠣 人參 白芍 天冬 火草

婦人臨晚頭痛，火升心嘈，風陽上冒，防厥

生地 阿膠 牡蠣 茯神 麦冬 白芍

當歸 川芎

頭痛滋膾後心下嘔逆厥陰見症用虫蟻血中搜逐
以攻通邪結兼養正

當歸 川芎 半夏 薑汁 焦全蝎 蜂房

山甲

太陽痛連額骨耳後牙齦宜治太陽少陽

連翹 羚角 牛蒡 赤芍 川芎

白芷
鮮菊葉

頭額中痛連及眉間是陽明風火宜清陽明少陽

連翹

卷之三

川芎

向正

葛根

黃岑

菊葉

夢荆子

鉤藤

頭風

頭風一症。有偏正之分。偏者主乎少陽。正者主乎陽明。為多。若少陽風淫火鬱。前人立法以柴胡為要藥。其補瀉之間。不離於此。無如陰虛火浮氣升吸短者。則厥脫之萌。由是而來。葉氏則另出心裁。以桑葉丹皮山梔荷葉。輕清涼泄少陽鬱遏邪條然而解。倘久則傷及肝陰。參入鹹涼柔鎮亦可收效。至於正者。雖主陽明。而病情不一。有氣虛血虛火亢邪風陰傷陽。

浮。痰厥腎厥之不同。如肝陰久耗。內風日旋。厥陽無一息之寧。痛掣已極。豈區區之湯散可計。惟與復脈之純甘。壯水阿黃之柔婉。以熄風和陽。俾剛元之威。一時頓減。用之屢效。豈虛証哉。並當於頭痛眩暉而用。

暑熱上蒙清竅。右偏頭痛。鼻竅流涕。咽喉甘腐。肢冷汗出。是外邪頭風。混虧精華。氣血蒙閉。宜刺風池。風府。清揚通竅。

西瓜衣 鮮蘆根 茎仁 通草

煎送蠟燭丸
黃蠟白蟬為丸

右偏頭風痛從牙齦起是少陽風火

炒生地

蔓荆子

黃菊花

茯苓

炒杞子

冬桑子

阿膠

炒丹皮

川斛

中年陰中陽虛內風偏頭痛冷淚宜用還少丹

熟地

山藥

山萸

茯苓

牛膝

枸杞

杜仲

遠志

五味

楮實

小茴

巴戟

蓴蓉

石菖蒲

胃虛風陽上逆頭痛嘔吐是陽明胃虛肝陽化風恐

有失明之憂。

炒半夏 焦參 苦丁茶 菊花炭 炒杞子 桔子霜
頭風目痛昏赤。火風上鬱。非徒清散可愈。從治風先
治血意。

歸身 炒白芍 杞子 沙苑 菊花 鈎藤

眩暉

經云。諸眩掉皆屬於肝頭為諸陽之會耳。目口鼻皆清空之竅。所患眩暉者非外來之邪。肝膽之風陽上胃耳。甚則昏厥跌仆。其症有扶痰扶火。中虛下虛。治胆治胃。治肝之分火盛者用羚羊山梔連翹茯苓元參生地丹皮桑葉以清泄上焦。竅絡之熱。此先胆治也。痰多者必從陽明消痰。如竹瀝薑汁菖蒲及二陳湯類。中虛則兼用入參外臺茯苓飲是也。下虛者必

從治腎滋肝育陰清陽鎮攝之治是也。至於天麻鉤藤菊花之屬皆係熄風之品可隨症加入此症之源本乎肝風當於肝風中風頭風各門合而參之。疫火脈左浮弦數疫多脘中不爽煩則火升眩暈靜坐稍安宜少陽陽明同治。

羚角 連翹 香豉 廣皮白 半夏曲 黑梔

痰火風在上舌乾頭眩

天麻 鉤藤 菊花 橘紅 半夏曲 茯苓

宜山梔 花粉 甘草 白术 白蒺藜
酒客中虛眩暉

半夏 陳皮 茯苓 甘草 白术 白蒺藜

鉤藤 天麻

內風挾痰，脈弦暉，眩暉，痰多胸痺，室塞，此清陽少旋。
內風日拂，最慮風痙。

明天麻 白蒺藜 桂枝木 半夏 橘紅 茯苓

苡仁 火草

眩暉

內風挾痰眩暉。吐出清水。

半夏 茯苓 天麻 廣皮 鈎藤 菊花

肝風內沸。故燬津液。頭暉。喉舌乾涸。

生地 天冬 麦冬 火肉 阿膠 生白芍

肝風動逆不熄。頭暉。

製首烏 杞子 黑芝麻 牛膝 菊花炭 桑椹子

胡麻 茯苓 青菜汁法丸

兩寸脉浮大。氣上升。頭眩甚。則嘔吐。厥陰上干。肝陽

宜鎮肝陽

製首烏 稽豆皮

炒杞子

柏子仁

紫石英

茯苓

天冬 南枣

操持驚恐。相火肝風上竄，目跳頭暉陰弱欲遺。左脉
弦勁，右小平。

生地 白芍 丹皮 鈎藤 天麻 白蒺藜

黃菊花 橘紅

絡熱眩暉。此內風上竄，上實下虛，先清標養血。

羚角 玄參 鐵金 石菖蒲 生地 連翹

川貝 花粉

陰虛陽升，暈厥煩勞即發。此虧水不能治木，厥陽化風。

熟地 牡蠣 五味 牛膝 龜版 天冬

茯神 遠志 茯兗 靈磁石

煩勞陽氣大動變化，內風眩暈能食病不在中上。以

介類沉潛為宜

淡菜膠 阿膠 茯兗 建蓮 龜膠

熟地 川斛 山藥汁丸

營虛內風逆心悸頭暈

炒杞子 桔子仁 胡麻 川斛 生左牡蠣 冬桑葉

下虛頭暈跗腫不能健步以上實下虛宜溫腎涼肝

肉蓯蓉 杞子 熟地 牡蠣 龜膠 連翹

山梔 桑葉 甘菊 石菖蒲

便血

便血一症古有腸風臟毒脈痔之分不外乎風淫腸濕熱傷脾胃二義內經謂絡受傷及結陰之肯為精切仲景論先便後血先血後便遠近上下虛實之分先便後血者為遠血是脾虛而不能攝血宜溫補脾陽先血後便者為近血是腸臟濕瘀或下虛八脉交損宜理下焦此遠近上下可決其臟腑之性情有失統攝血無所歸如漏危不已耳肺病燥濇宜清宜降

如桑麻丸及天冬地黃銀花柿餅之類是也。心病則燃血沸，宜清宜化。如葉葉地黃湯及補心丹之類是也。脾病必濕滑，宜燥宜升。如朮理中湯及東垣益氣湯之類是也。肝病有風陽廻痛，宜柔宜泄。如駐車丸及甘酸和緩之劑是也。腎病見形消腰折，宜補宜填。如虎清丸及理陰煎之類是也。葉案祖古方而運以匠心，為學者之津梁也。

竹葉地黃湯心熱血沸

竹葉 生地

丹皮

澤瀉

茯苓

麦冬

虎滑丸

腎虛腰折

熟地

虎胫骨 龜版

黃柏

知母

瑣陽

當歸

牛膝 白芍

陳皮

羯羊角膠丸

理陰煎

腎虛

熟地

當歸 千薑

肉桂

交草

黑地黃丸

腎虛

蒼朮

熟地炭 五味

千薑

更血

天真丸，脾濕腎燥；

精羊肉、內蔥蓉、山藥

當歸、黃芪

天冬

人參、白朮

班龍丸，溫煦竒督；

鹿角膠、鹿角霜、熟地、菟絲子、柏子仁

歸芍湯，腸臟濕癆；

當歸、炒白芍、焦朮、炒枳壳、地榆、炒槐實、柏葉炭

五仁湯，潤腸液。

火麻仁 桔子仁 杏仁 桃仁 郁李仁

駐車丸 肝陽風痛

黃連 阿膠 當歸 千薑

濕熱內蒸。腸風下血。宜酸苦法治。

川連 黃芩 烏梅肉 生芍藥 廣皮 厚朴

荆芥炭 菊花炭

濕遏脾陽。食入不化。飲酒厚味。即瀉腸血。未已。宜陽升。

人參 茅术 廣皮 生益智 防風

升麻
炙草

鬱怒。腸紅即來。腹中微痛。是木火乘腑。宜興和陰。

冬桑葉

丹皮

生芍藥

黑梔

廣皮

乾荷葉
生谷芽

木鬱土中。痔疾下血。因嗔怒腹滿。隨瀉血便後下血。

是風木鬱於土中。氣滯為膨。氣走為瀉。宜理中瀉木。

人參

附子

炮薑

茅术

厚朴

地榆

升麻

紫胡

大腸血熱。便血。脈數。

生地

銀花

黃芩

白芍

槐花

百草霜

柏葉炭 柴壳

內熱勝紅發痔。當清陰分之熱。

生地 炒丹皮 酒芩 槐花炭 柿餅炭 元參

黑梔 輻花

陽明不固。脉濡小食少。氣衰便血大。便時結時溏。宜甘酸固濡。合陽明為法。

人參 禹餘石 赤石脂 木瓜 炒烏梅 炒糯米

脾胃氣滯。中滿過放消。尅便血。食入易滯。是胃病血

便血

統於脾。脾健自能統攝。宜疎腑養臟。

九蒸白朮 山楂 茯苓 木瓜 炮薑 火草

脾胃陽虛。便血如注。而黃脈小。當益胃法。

人參 焦术 茯苓 火草 木瓜 炮薑

心脾營損。絡傷下血。是燥持損營。宜歸脾。飴糖丸。

焦术 人參 黃芪 歸身 火草 茯神

遠志 酸棗仁 木香 元肉 飴糖為丸

便後下血。是脾不能攝。為遠血也。

焦术 炒白芍 炮薑 火草 木瓜 炒荷葉

血去陰傷虛陽上冒脈小左數便實下血乃肝絡熱勝血不自寧肝胆火燭風翔上蒙清空鼻塞頭暉倉咳不已下虛上實陰傷陽浮宜清上理下

連翹 竹葉心 生地 元參 丹參 丹皮

川斛

脾腎虛內經以陰絡傷則血內溢酒氣傷臟血脫肛墜便甚治在脾胃

晚服歸脾湯去木香早服寐去丹瀉加五味肉阿膠

芡實連

中年形營氣餒，陰中之陽不足且便血已多是下虛宜溫養固下。

人參 茯苓 歸身 淫蕪夢 補骨脂 巴戟

炒遠志 精羊內熬膏為丸，每服五錢，米飲下。

脉左虛濇，右緩大尾閭痛連脊骨，便後有血，自覺惶惶欲暉，漁之納谷最少，是中下交損，八脈全虧，早服青囊班龍丸，峻補玉堂閑元，暮服歸脾膏，滋養營陰，須守經年，形體自固。

青囊班龍丸

鹿茸 鹿角膠 鹿角霜 桔子仁

熟地 邪子

菟絲子 赤茯苓 补骨脂

益陰泄陽。血止腰痠。腕中痺。咽燥喜涼飲。肛熱仍是
陰精失泄。用虎潛法。

熟地炭 白芍

當歸 地榆炭

龜膠

虎骨

知母 黃柏 猪脊髓丸

沫血鮮紅。凝塊紫黑。陰絡傷損治在下焦少腹疝瘕。

肝腎見症

人參 茯神 熟地炭 煙黑杞子 五味 炒地榆
生仲仲

竒督傷脈小漏血有年陰絡傷婦人不得孕育心中
痛墜血下不論便前後後間脊椎尻瘻楚而經水仍
至跗膝常冷是督脈陰液損傷宜壯固

鹿茸 鹿角霜 拘杞子 歸身 紫石英 沙苑
生杜仲 炒大面 补骨脂 禹餘石 蒸餅漿丸

壯年陽亢精氣化血臟熱血隨便出宜清熱理血
生地 丹皮 車前 潤瀉 枳壳 槐實
知母 黃柏 側柏葉 俱炒焦黑

卷之三

脫肛

脫肛一症其因不一有因久痢久瀉脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因酒食溫氣傷脾色慾傷腎而脫者有因腎氣本虛關門不固而脫者有因濕熱下墜而脫者又肛門為大腸之使受寒受熱下能致脫老人氣血已衰小兒氣血未旺皆易脫肛內經曰下者舉之徐之才曰濇可收脫葉天士治法亦不越乎升舉固攝益氣三法如氣虛下陷

者宗東垣補中益氣舉陷為主如腎虛不攝而脫者宗仲景禹穀石赤石脂丸及熟五味菟絲固攝下焦陰氣為主如脾弱氣陷脾胃氣虛下陷而脫者用固陰益氣兼以酸苦泄熱為主如老^年陽氣下陷而脫者有鹿茸陽起石提陽固氣一法又有肺氣虛而不能收攝肺與大腸為表裏用補中益氣加五味收提每見其長鑒者當自知之

濕熱氣虛下陷墮肛而痛溲溺陰囊筋牽肛痛宜從

東垣補中益氣

黃芪

白朮

人參

當歸

陳皮

炙草

升麻

柴胡

氣虛下陷，經年面色瘦黃，腹痛下血，是飲食傷脾，下陷為脫，久不愈，正氣已虛，宜甘溫益氣，少佐酸苦。

人參

川連

炒歸身

炒白芍

炙草

廣皮

石蓮肉

烏梅

幼稚肚翻純血。

不但氣陷，下焦之陰亦不攝，固面色

脫肛

舌灰已無華色宜益氣攝陰

人參 焦术 廣皮 白芍 歸身 炙草

五味 升麻 栾胡

營氣虛不攝便後少腹痛 肛墜溺則便滑是腎虛不

攝宜滋陰固攝

熟地炭 五味 莖肉炭 茯苓 炒志遠 炒菟絲

肛墜尻痛利多陰傷

熟地炭 五味 茯神 炒山楂 炒山藥 炒兔絲

煎送禹糧赤石丸即二味為丸

老年陽氣下陷腎真不攝肛墮氣血宜補元陽兼升

舉調補

人參 鹿茸 補骨脂 炒大茴 茯苓 五味

調入陽起石三分

月月

癲狂癇症

癲為陰邪在血分痰在包絡時發時止狂為陽邪在氣分痰入心發而不止癇為風邪在肝發後如平人癲者陰脈宜實狂者陽脈宜洪癇者風脈宜浮若相反為凶症如有下泄則為不治脉微細或沉弦亦為難治

癲病始發志意不樂甚則精神呆癡言語不倫睡如平時以邪併於陰也先宜吐頑痰然後開心竅治陰

邪為主

狂疾始發多怒不卧不避水火不辨親疎棄衣而走
踰牆上屋目直罵詈夜多不臥以邪併於陽先宜鍼
花水飲以生铁數斤燒紅打落碎花熬水入石膏龍
龍齒茯苓防風元參秦艽黃芩羌竹瀝飲之稍愈再
治陽邪

癇疾發則吐涎神昏卒倒口噤牙緊省後起居飲食
皆若平人是風邪併於肝腎脉宜浮緩弦急者凶宜

以皂角半夏細辛為末吹入鼻中取嚏無嚏則不治。
嚏後稍甦再以鹽水吐頑痰然後祛風調理其名有
五曰鷄犬馬牛猪病狀偶類其實一也其聲如羊者
心癇也其聲如犬者肝癇也其聲如牛者脾癇也如
鷄者肺癇也如猪者腎癇也

脈訣曰癲乃純陰狂乃純陽浮洪吉象沉急凶殃癲
癇宜虛緩況小急實或但弦急必死不失

承帝散導吐頑痰

赤豆 甜瓜蒂 藜蘆 麝金

又參蘆一味或梔子豆豉或烏附尖或常山或燒鹽皆能吐痰前方如吐不透量為加用吐後熟睡不可驚覺驚則復反若吐不出用麝香少許調服即止或照嘔吐門用重墮法亦可

又法癲疾久不愈以辰砂棗仁乳香人參調酒飲之大醉卧之勿驚可愈李士材曾治一道士久癲不愈令給鹹物食之不給水飲渴急以前方調酒飲之大醉一睡三日醒時病如失去

安神湯

癲疾吐後
安神開竅

人參

茯神

琥珀

菖蒲

遠志

枣仁

乳香

硃砂

南星

半夏

木香

酒煎另將琥珀乳香木香硃砂研細冲服飲醉
臥之勿驚

牛黃丸

狂疾服鉄花後稍甦用此清內

牛黃

硃砂

丹參

丹皮

鬱金

橘紅

大黃

南星

天麻

水片

甘草

蜜丸新汲水童便調服

狂疾脉左右不齊乍大乍小是邪祟相觸宜以蘿合
丸灌之稍甦用木香烏藥白蔻檀香砂陳藿蒼朴薑
草煎服又取東向桃柳枝各七寸煎湯灌之李士材之
治驗

虛人以歸脾湯調理

羌防湯癰症取嚏後用

羌活

防風

獨活

荆芥

細辛

膏本

川連

大黃

附子

烏頭

蒼耳

癇疾晝發宜升陽湯

蒼朮 防風 牡麻 柴胡 灾草

癇疾夜發宜加減四物湯

生地 當歸 茜草 茜胡 水姜 南星

半夏 葛蒲 遠志 杏仁

癇狂癇症痰迷心包絡宜清神湯

橘紅 半夏 胆心 瓜萎 鐘金 葛蒲

茯神 遠志 川連

癲加童便狂加竹瀝癇加天麻殼全蝎

癲狂癇症初起並宜艾灸法癲疾男取陽蹻女取陰
蹻並神門鬼眼百會各穴灸數壯狂疾取間使灸七壯
百會穴灸九壯癇疾晝發取陽蹻申脉夜發取陰蹻
照海四穴各灸數壯小兒驚癇取頂上旋毛中灸三
壯耳後絡脈灸數壯

神吊脉沉因驚恐以致癇疾語言不甚明了此痰火
阻其靈竅必須深戒酒肉厚味靜養善調可愈

川連 黃芩 山梔

枳實 橘紅

胆星

葛蒲 遠志

膽星

疫病已成痼疾久不愈

葛蒲 遠志

竹節白附子 天竹黃 陳胆星 石菖蒲 川連 蕤金

茯神 橘紅

陽氣鬱竅阻驚恐陽升風動宿痼遂發吐痰嘔逆不言絡脉失利

羚羊角 石菖蒲 胆星

遠志

連翹

鈎藤

天麻 橘紅

癇厥神呆肢強

犀角 羚羊

元參

葛蒲

炒半夏

炒遠志

鬱金 橘紅

木火動心神虛驚狂仍心悸怔忡夜卧不寐診脉虛
細非痰火有餘宜補心丹法

人參

茯神

枣仁

元參

丹參

天冬

麦冬

生地

川連

柏子仁

菖蒲

遠志

木火鬱血滯婦人每遇經來紫黑癥疾必發暮夜驚呼晝則神呆面白青多笑火風由肝而至宜瀉肝胆熱薰清神

丹參 丹皮 生地 黑梔 芫蔚子 胡連
調入琥珀末

入冬不寐癆疾遂發此陽不潛藏治在肝腎用虎潛丸法。

熟地 當歸 茵藥 知母 黃柏 干薑

陳皮

鎖陽

牛膝

龜版

虎骨

附片

火鬱心腎不交，癲疾脉不鼓，脂宜交心腎，益神志。

生地

龜甲

黃柏

酒炒

川連

菖蒲

茯神

遠志

山梔

竹葉

風陽上亢，五志陽升，神識迷惑，忽輕忽重，非有形質之邪，乃熱氣化風，上顛夜不寐，以極苦之藥使其元陽潛降。

木入生地

龍胆草

丹參

木通

山梔

蘆薈

青黛 薄荷

平昔操持身心皆動，悲憂驚恐情志內傷，神志恍惚似癲。陰陽臟絡不安，宜歟攝鎮固久進可效。宜靜養百日為安，勿勞發。

人參 珍珠 祜神 東仁 火草 生龍骨
萸肉 五味 金箔 密九硃砂為衣

大風一吹，小草低頭。大風再吹，小草彎腰。
大風三吹，小草躺倒。大風四吹，小草躺平。
大風五吹，小草躺死。大風六吹，小草躺僵。
大風七吹，小草躺僵。大風八吹，小草躺僵。
大風九吹，小草躺僵。大風十吹，小草躺僵。
大風十一吹，小草躺僵。大風十二吹，小草躺僵。
大風十三吹，小草躺僵。大風十四吹，小草躺僵。
大風十五吹，小草躺僵。大風十六吹，小草躺僵。
大風十七吹，小草躺僵。大風十八吹，小草躺僵。
大風十九吹，小草躺僵。大風二十吹，小草躺僵。
大風二十一吹，小草躺僵。大風二十二吹，小草躺僵。
大風二十三吹，小草躺僵。大風二十四吹，小草躺僵。
大風二十五吹，小草躺僵。大風二十六吹，小草躺僵。
大風二十七吹，小草躺僵。大風二十八吹，小草躺僵。
大風二十九吹，小草躺僵。大風三十吹，小草躺僵。
大風三十一吹，小草躺僵。大風三十二吹，小草躺僵。
大風三十三吹，小草躺僵。大風三十四吹，小草躺僵。
大風三十五吹，小草躺僵。大風三十六吹，小草躺僵。
大風三十七吹，小草躺僵。大風三十八吹，小草躺僵。
大風三十九吹，小草躺僵。大風四十吹，小草躺僵。
大風四十一吹，小草躺僵。大風四十二吹，小草躺僵。
大風四十三吹，小草躺僵。大風四十四吹，小草躺僵。
大風四十五吹，小草躺僵。大風四十六吹，小草躺僵。
大風四十七吹，小草躺僵。大風四十八吹，小草躺僵。
大風四十九吹，小草躺僵。大風五十吹，小草躺僵。

黃疸

疸名有五。曰黃疸。谷疸。酒疸。黃汗痘。女勞痘。不專於一症也。黃疸者。脾濕肺熱而移於膀胱。則腎肝心胆皆受也。谷疸者。飲食傷脾。濕熱不化。流於肌肉。四布皆黃。酒疸者。酒傷濕熱。陽氣漸薄。形體黃瘦。汗痘者。傷寒感冒。失汗失下。溫疫薰蒸。臟腑痺熱。發黃。女痘者。全屬腎虛。膀胱不運。瘀濁在內。穢蘊發黃。有陰陽之分。

黃疸

陽黃之作。濕從火化。瘀熱在裏。胆熱液泄。胃之濁氣
共併。上不得越。下不得泄。薰蒸逼鬱。侵於肺則身俱
黃。熱流膀胱。溺色變赤黃。如橘色。治在陽明。宜茵陳四苓散

陰黃之作。濕從水化。脾陽不能化熱。胆腋為濕所阻。
清於脾。浸淫肌肉。溢於皮膚。色如薰黃。陰主晦。治在
脾。宜茵陳四逆。或茵陳理中。

上盛者。一身盡熱。下鬱者。小便為難。若脈弦。脇痛少
陽。未罷。仍主以和渴。飲水漿。陽明化燥。急當瀉熱。溫

在上以辛散以風勝濕在下以苦泄以淡滻若狂蓄
血勢所必攻汗後溺白自宜投補酒客多熱先用清
中加之分利更顧其脾女勞有穢濁始以解泄繼之
滑竅終當峻補腎陰

脉訣曰。黃疸濕熱脉宜洪數不妨浮大微濇難醫。
又曰。黃疸濕熱鬱蒸成偏身皆黃及目睛陽黃色亮
身多熱陰黃色暗冷如冰。陽者身熱面紅口渴尿
赤黃色鮮亮。陰者身冷面色暗黃。

傷寒感冒。失汗失下濕熱入於膀胱薰蒸於肺口渴
大便溏小便赤面黃目黃色亮乃陽黃也宜茵陳四
苓散。

茵陳 茵苓 猪苓 白术 潭瀉 車前

谷疸能食煩倦手足汗出目黃鼻衄是谷留濕熱故
作煩倦火則瘶黃當用猪肚丸

白术 苦参 牡蠣 猪肚一具入藥煮爛搗丸

谷疸身冷面目皆黃色暗是濕傷於脾宜四逆及理中

茵陳四逆湯

茵陳 附子 肉桂 干薑 甘草

茵陳理中湯

茵陳 人參 白朮 炮姜 火草

谷疸初病似瘧。乃夏暑先伏秋涼繼受。因不慎食物。
胃脘氣滯。生熱內蒸。變現黃疸。溺黃便秘。若下必犯
太陰變脹。當宣濕熱為宜。

綿茵陳 茵苓

白蔻

枳壳

杏仁

桔梗 花粉

黃疸

三

酒疸發黃。自屬濕熱。脈虛濇腹鳴不和。形瘦行動不能耐。全 是陽氣漸薄。兼之勞煩致損脾胃。宜戊己湯。

人參 白朮 灵參 炙草 陳皮 茯苓
當歸 栀子 蕃薑 南棗

黃疸濕熱。薰蒸右脇高突。身面俱黃。不食不便。瘀熱久聚。恐成癰癧瘍。宜清熱利濕。

大豆黃卷 木防己 金銀花 生牡蠣 飛滑石 茯仁

黃疸濕熱在裏。脉沉鬱。蒸發黃中。痞惡心便結。溺赤。

三焦病也苦辛寒主之

杏仁 石膏 半夏 薑汁 山梔

黃柏
枳實汁

黃疸 一身面目盡黃不飢渴赤素積勞倦再感濕熱之氣誤以風寒發散消導湿甚所致

連翹 山梔 通草 赤小豆 花粉 香豉

煎送保和丸三錢

山梔 神曲 茯苓 半夏 陳皮 菜菔子

連翹 煉蜜為丸

黃疸

黃疸脈絡瘀熱心下痛年餘屢發痛緩能食目漸目
黃濁赤此脈絡凝瘀蘊於水谷之氣交蒸若攻之過
急必變脹滿用河間金鈴散加減

金鈴子 延胡 枳壳 柴胡 半夏 黃芩

黑梔 谷芽

黃疸變腫脹溫熱何擬宜苦辛滲利

鷄肫皮 海金沙 厚朴 大腹皮 猪苓 通草
脾液外越更熟泄氣為黃非濕熱之疸不欲食便溏

乃氣泄不收宜調理脾胃為法

人參 火草 生扁豆 山藥 茯神 茯仁

女勞疸者是色慄傷腎腎虛弱發黃身冷色暗乃陰
黃也先宜泄濁繼之滑竅終當滋腎宜金匱腎氣丸

熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉

肉桂 附子 車前 牛膝

女勞疸腎虛脈數發熱身熱色亮乃陽黃也宜知柏
地黃湯

熟地

山藥

山萸

丹皮

茯苓

澤鴻

黃柏

知母

車前

牛膝

甘草

白芍

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

內經瘡瘍

癰疽瘡瘍。外科本有專條。今觀葉氏醫案有內經瘡瘍。分別經絡受傷。虛瘍內發。血中浮熱。內風發現。又有乳瘻。肝瘻。腸瘻。痔漏。臟腑不調等症。井井有條。足可以增補。外科之遺漏。其如乳瘻者。少陽經絡氣血。皆少。由情懷失暢。氣鬱血痺。有形而痛。攻之非易。宜疎氣血。清肅少陽。內消為上。如已潰者。當依外科內托之法。虛瘍者。風熱既久未解。化成瘡瘍。當以和血。

祛風。如濕熱流注。當清熱通絡。去血浮熱。又有脾虛
血熱。生瘡搔痒。流黃水者。當用涼血理脾。又有肝癰
之症。臍左以上。內應肝血。結瘀吐痰。氣臭內癰。已見
宜降氣活肝血。開肝鬱。腸癰者。臍旁紫黑。少腹痛。二
便濇甚者。足筋縮皮膚有鱗甲紋。腸癰具矣。乃濕熱
瘀血結聚。六腑不通。當清濕熱消瘀。而兼通腑。用法
靈活。足可為後學之準繩也。

虛癟搔痒。流黃水。此脾虛血熱。宜理脾涼血。

當歸

生地

丹皮

白芍

人參

焦朮

茯苓

紫草

桑枝

脉不浮大。非關外風初起右掌二指已不屈伸。頭面
身半以上常有瘡泡之形。乃陽明脈絡內閼濕熱癟。
氣與食毒所致。宜解緩攻。

連翹

犀角

赤芍

酒軍

荆芥

片薑黃

能食二便通調。瘡愈有疤。自面及肢體。至於右掌。指
屈伸皆痛。仍是脈絡留邪。以致壅道為壅。藉酒力以

引導。通行營衛可愈。

銀花

連翹

犀角

生軍

荆芥

丹皮

黃芩

川芎

當歸

澤蘭

羚角

大豆黃卷

用無灰老酒浸服

血舍空隙。內風蠕動。外以熱湯泡洗。濕熱蒸襲肌竅。
遂有裂膿流水。周身漸加麻痺。陽脈亦衰。宜清營以
熄內風。疎利濕熱。以肅墮道。辛辣腥鮮勿進。尚可緩計。

製首烏

鮮生地

柏子仁

川斛

黑豆皮

虎骨

蚕沙 黄柏 草薢 熬膏丸酒兑服

久熟瘡瘍。五六年。環口燥裂。漏濤莖痛。

生地 熟地烏 丹皮 丹參 芫蔚子 銀花

地丁 紫草 共熬膏服。

血熱風動膚痒。

荆芥 防風 地膚子 赤芍 銀花 生地

木通 甘草

初因嘔吐。肝胃不和致病。故辛香剛燥愈劇。然久病

內癆

必入血絡。熱則火瘡不愈。木火皆令燥液。易飢易飽。
間有嘔逆。是胃病仍在。凡呆滯藥味。皆非對症。

胡麻

冬桑皮

生首烏

杏仁

鬱金

佩蘭葉

茯苓

苡仁

熬自然膏服

幼稚身瘦久瘡。血分有熱。精通之年。最宜安養脉象。
非有病

生首烏

胡麻

生地

地骨皮

金銀花

丹皮

生白芍

生草

蜜丸早晨服

脈來濡浮。久瘡變幻未罷。是衛陽疎豁。不耐寒暄。初受客邪。不解混處。氣血浸淫。僅在陽分。肌腠之患。宜升舉一法。氣壯則風濕盡驅。

人參

黃芪

川芎

當歸

防風

殼桑

蟬蛻

災草

薑枣

痰因於濕。久而變熱。壅於經隧。現瘡疾疥癬。已釀風濕之毒。混在氣血之中。邪正雜處。搜逐難驅。四肢為甚。宜從陽明升降。

連翹 赤芍 疊蚕 白鮮皮 防風 升麻

前胡 滑石 酒軍

風熱既久未鮮化成瘡瘍當以和血祛風

當歸 赤芍 川芎 莪枯草 牛蒡子

蟬蛻 疊蚕

頭顛熱癆未能泄邪此身熱有成膿之象辛涼兼理氣血可愈

連翹 犀角 銀花 丹皮 元參 生草

青菊葉

風熱毒閼項後腫

竹葉

滑石

蘆根

牛蒡

馬勃

薄荷葉

黑山梔

連翹

川貝

生草

瘡毒咯血失血都是暑入陰傷

竹葉心元參

生地

黑豆皮

麥冬

知母

秋痢半年未愈。瘰堅硬痛。瘍蠱久成熟。腑經病。可
冀其愈。

夏枯草

香附

茯苓

苡仁

川貝

丹皮

頭項結核。腹膨足腫。肝木犯中。痰氣凝滯。

夏枯草 牡蠣 澤瀉 茯苓 半夏 厚朴

橘紅 神曲 生薑附水磨汁泛丸

氣鬱痰核

夏枯草 生薑附 丹皮 山梔 連翹 鬱金

赤芍 橘紅

脉左數右長，頭項結癰，時衄，是血熱痰滯，宜涼血消瘀。

生地 丹皮 牵角 夏枯草 生鈎藤 黑梔

青貝母 晃布 海帶 生薄荷

燥急善怒氣火結癟。燼筋為痛。熱鬱化風阻滯。痺塞。
則腹鳴脘脹。苟非開懷歡暢。不能向安。

青母 山梔 瓜萎皮 鬱金 皂芥子 海藻

昆布 夏枯草

肝氣鬱遏宿痞乳癰

川棟子 夏枯草 薄荷梗 丹皮 黑梔 瓜萎皮

青橘葉 香附汁

乳房為少陽脈絡。經行之所。氣血皆少。由情懷失暢。

氣
血鬱滯。有形而痛。治在絡。恐日久竟沉痼。非癰之症。
脉不浮數。無寒熱。宜內消。

柴胡 莪桔草 歸身 白芍 川貝 無參

川芎 甘草

乳房結核。是少陽之結。乳血皆薄。攻之非易。恐釀成
瘍症。急宜內消。

青蒿 香附 橘葉 青菊葉 丹皮 澤蘭

鬱金 當歸鬚

因嗔怒失血致頭項左右筋腫痛連背部此屬鬱傷氣血經脈流行失司不全恐成流注清膿延綿之患治在少陽陽明。

生香附
蔓枯草
鮮菊葉
薄荷梗
黑柏
鈎藤
丹皮
鬱金

脉左數實血絡有熱暑風濕氣外加遂發疹塊壅腫搔癢是屬暑癆。

杏仁
連翹
滑石
寒水石
銀花
晚蚕沙

黃柏 防已

初病溫熱在經。久則入絡。膿瘍未已。漸至筋熱痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則癆。數年宿病。勿圖速攻。

犀角 連翹 元參 丹皮 生地 野赤豆皮

薑黃 桑枝 煎湯早服。夜服止疾。藜丸

瘡瘍服涼藥。陽傷氣阻。脘悶不運。腹脹。最怕瘍毒內

閉。急宜通陽。

厚朴 廣皮 薑皮 茯苓皮 連皮店仁 大腹皮

桂枝 澤鴻

納食主胃，運化主脾。癰癟痛潰，臥床不得舒展。臟腑氣機呆鈍，外科守定成方，木蕊歸地，不能托補氣血。反滯於裏，出納之權交失，且症乃水谷溫氣下垂，而致結於肝胃之界。若濕熱不為盡驅，補托養賊，貽害非淺。宜先清熱。

金石斛 槐米 金銀花 茵苓 晚蚕沙 石膏
嘗傷心辣，納食無味。此瘡痛大虛，當調其中。

內瘍

八

人參

歸身

炒白芍

木瓜

熟朮

廣皮

茯神

交草

膿血去多。痛尤未息。胃傷不嗜谷。口無味。左閨尺細。弱無力。正虛之據。仍宜托補。

人參

熟地

玉竹

柏子仁

歸身

丹參

枣仁

遠志

渴消膿血去多。元真大耗。脈無力。不嗜食。惡心。中州不振。寐則驚惕。神不守也。宜養營法。

人參

熟术

廣皮

茯神

災草

歸身

白芍

五味

棗仁

瘍損能食身熱宜六味地黃湯加青蒿梗
因瘍漏過進寒涼患腰痛牽引脊背晨起周身不自
自如乃脈絡之中氣血流行不暢久病諒非攻逐宜
兩和方法

羚角

當歸

黃芪

白蒺藜

桂枝

桑枝

瘍潰不合或清液滲去必腸絡空隙內風暗動攻胃
漏。

內瘍

九

則嘔逆吞酸。腹痛瀉泄不食。津液不升。舌焦黑不渴。
內外兼病。難治之症。

人參

炒烏梅

炒川椒

茯苓

生淡薑

廣皮

白芍

歸身

內瘡痛久。屈伸不得自如。經絡之脉。呆鈍。氣痺血瘀。
大便下血。是鉤結在裏。臍左之上。內應乎肝。吐痰氣
臭。肝瘡已見矣。

炒桃仁

新絳

紫苑

冬瓜子

降香末

金銀花

野蠶金汁

臍旁紫黑。先寒後熱。少腹痛如刀。刮二便皆濁。足筋縮皮膚有鱗甲。是腸瘻之患。宜內消。

老薑白 雨頭尖 小茴香 當歸尾 烈山甲 皂角刺
舌焦黃。小腹堅滿。小便不利。兩足皆痠。溫熱結聚。六腑不通。有腸瘻之患。

川棟子 小茴 丹皮 山梔 通草 青葱
壯熱旬日。周身筋脈牽掣。少腹堅硬。小便淋漓。忽冷

忽熱欲釀膿血乃腸瘻為病倣孫真人丹皮大黃湯。
丹皮 大黃 桃仁 冬衣仁 芒硝

痔瘻下血。濕熱居多。以淡滲通腑。

生於木 生菟絲粉 生象牙末 白蠟為丸

疝症

疝者。厥陰任脈受病。外感風濕寒邪。凝結於內。男子
之疝。牽引睾丸腹痛。女子內結癥瘕。帶下當分別寒
熱。氣血濕邪等症。若有陰莖生瘡。為下疳。陰囊腫爛。
為囊瘡。女子陰瘡。俱見外科癥瘕。帶下見婦科。各有專
條。至於疝症。陰囊睾子腫大。牽引少腹作痛。女子陰
旁結硬。氣衝腹痛。皆為疝也。寒者。囊冷結硬。睾子硬
大。為寒疝。熱者。溫熱流於肝經。囊不收。紅腫常痛。為

熱疝。濕者腫若水晶。不紅痒痛相兼。為濕疝。氣者陰。囊罩子腫大。引氣上衝。時發時止。多在右邊。為衝疝。血者。痛多腫少。多在左邊。肝脉滑為癟疝。肝邪者痛。則現。止則不見。是肝邪為患。名狐疝。腎者痛則引陰莖。或精隨溲下。為癃疝。又有小兒陰囊腫大而痛。因孕婦啼泣過傷。氣結不散。蘊於胞中。或寒氣內結。小兒囊硬腫墜。大而為胎疝。冷而痛者。照寒疝治。不冷不痛。照氣疝治。此外又有卒癩。風瘕。厥心。肝肺脾腎。

等名目皆屬同類而變其名總屬肝任為病而貫於各經之所由也。

經云。任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。又督脈生病。從少腹上衝心而痛。為腫疝。脾傳之腎。為瘕疝。三陽為病。發寒熱。其傳為癲疝。邪客於肝絡。令人卒疝暴痛。此素問言諸經之疝也。又經脉篇云。足陽明之筋病。瘻疝。腹筋急。脾病。陰器組痛。下引臍。兩脇痛。肝病。陰器不用。此靈樞言諸經之疝也。仲景先生。

獨以寒疝為名。其所出三方。亦以溫散祛寒。調營補虛為主。張子和又以辛香流氣。謂肝得疏泄。而病愈矣。其金鈴虎濬諸法。可謂發前人之未備。故疝病之本。不離乎肝。又不越乎寒。以肝脈絡於陰器。為至陰之臟。膀胱為寒水之經。故仲景以烏頭二方。專治寒邪為急。是治標之義。又以當歸羊肉一方。專補內虛。以下元而不傷陰。是治本也。子和以金鈴散。泄肝散。逃為主。以金鈴導膀胱小腸之熱。元胡和一身上下。

諸痛其所取虎潛一法以桑緩導引虎骨熄肝風壯筋骨。羊角毫版補髓填精佐以地黃補腎當歸補肝使以陳皮利氣芍藥通肝是治肝而顧及於腎是治疝之良法也。今觀葉天士先治生疝之法又更有進焉者其肯有暴疝多寒久疝多熱為剛領其餘隨症施治如氣墜下結者以鹿茸鹿角升陽為主其脹結有形痛宗丹溪通陽泄濁為治其溫熱鬱結用柔苦制熱其寒濕下墜通太陽膀胱祛寒去濕如下焦陰陽

疝

兩傷。用有情溫通以培生氣。兼通補熄風為主。可謂曲盡病情。諸法備矣。

脉訣曰。疝屬肝病。脉宜弦急牢急者生。弱急者死。弦長易治。

寒寒戰後熱。屬肝病。囊大浮腫。洩溺甚少。至晚愈加。是陽微獨聚。宜從氣分開泄。

桂枝 吴萸 川棟子 荻苓 生牡蠣 青皮
澤瀉

濕寒濕已久。入太陽膀胱之氣不利。陰囊莖腫。

茯苓 猪苓 潭鴻 白术 肉桂

獨活
漢防己

筋肝風筋痛，怒勞必發，宜通補熄風。

蕤英 补骨脂 歸鬚 小茴 韭子 茯苓

胡桃 青鹽 羊肉腎 蒸熟摺和丸

氣竒脉陽虛，動氣疝痛，遠脅汨汨有聲。男子精氣不

充，是下虛損傷，宜柔藥溫補，竒經八脈，勿用剛燥。

蕤英 歸身 炒杞子 小茴 炒沙苑 茯苓

紅棗肉丸

疝

四

氣疝壅於右。筋縮連小腹痛。此寒氣收引。宜溫通肝

川棟子 穿山甲

小茴

橘核

乳香

炮黑川鴉

韭白汁泛丸

瘕脣下少腹形象橫梗。痛達腰脇。以及陰囊。乃肝氣不宣。宜左金通脈。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

川棟子

元胡

青橘葉湯為丸

瘕
脉右弦左濇。當脣痛少腹。嘔吐黃濁。大便不通。此

屬肝氣瘕疝，辛香流氣所謂通則不痛耳。

炒桃仁

炒橘核

川棟子

炒元胡

韭白汁

薑頭尖

小茴

青皮

鬱
癰
怒
肝
疝
腫
脹
小
腹
下
墜
青
筋
外
突
脹
甚
延
及
腎
囊
乃
肝
疝
宜
用
子
和
金
鈴
法
泄
肝

金鈴子

元胡

歸鬚

橘核

小茴

青皮

青皮

黑梔

青葱管

肝犯
疝

少腹厥氣上衝吐酸食不化。下有宿疝。以肝濁

胃宜助脾陽

炮附子 千薑 吳萸 川棟子 猪肝汁

肝疝犯胃 吐或嘔逆 湿飲不入 呃逆不止 宜用朱南陽柔

肝泄濁之法

淮臘汁 雨頭尖 川棟子 延胡 歸鬚 桂心

肝疝犯胃 發肢冷 潮熱食減 是濁犯胃 宜泄肝安胃。

人參 附子 茯苓 川棟子 胡蘆巴 炒黑川椒

氣疝聚於右 有聲自消 行走勞動 必有形直墮陰

囊是腎氣虛寒

歸尾 鹿角

桂枝

小茴

川芎

茯苓

災草 生薑

羊肉膠為丸

痛自腎囊漸聚少腹之左。肝疝顯然暴疝多寒久疝多熱宜通泄法。

川連 小茴

黑梔子

橘核

川棟子

青木香

郁李仁 冬葵子

瘧母已久。肝絡受傷。延成疝症。宜用子和之法。

瘕

瘧

疝

有情溫通以培生氣

鹿角

穿山甲 全蝎

大茴香

當歸

炮黑川鳥

水安息香 炙黑大豆黃卷

赤淋酒和丸

疝

肝風腎虛 氣血失調 少腹衝痛 延及腎囊牽引宜

用子和虎清丸法

虎骨

龜版

熟地

當歸

陳皮

芍藥

羊內膠為丸

胎

小兒瘡囊腫大硬墜牽引少腹作痛 是胎氣寒結為病

橘核仁 川棟子 昆布 海帶 桃仁 元胡

青皮 烏藥 肉桂 小茴 吳萸黃連同炒用

酒糊丸，鹽湯下。若腫墜不硬，不冷氣冲少腹者。
純是胎氣凝結為疝。只用川棟元胡，青皮烏藥。
小茴橘核為丸。

淋濁

淋有五淋之名濁有精濁便濁之別當察氣分與血
分精道與水道確從何來大凡秘結宜通滑脫當補
若因心陽亢勤精強忍而瘀濁下注者利其火腑湿
熱甚而不宣者徹其泉源氣陷用升陽之法血瘀進
化結之方此數端人所易曉也惟厥陰內患其症最
急少腹違前陰如刺小水點滴難通環陰之脉絡皆
痺氣化機關已息葉案引朱南陽方法兼參李瀨湖

淋濁

意用滑利通陽。辛鹹泄急佐以猶經入絡之品。發前人之未備。景岳謂理其無形。以固有形。但知治肝治腎。而不知有治八脈之妙。葉天士先生引孫真人九法。升陽固精絡。使督任有權。漏危自己。若非深明醫理。而焉能如此。又有尿血一症。虛者居多。若有火亦能作痛。當於血淋同治。倘清之不愈。則耑究乎虛。上則主於心脾。下則主乎肝腎。久則亦從於八脈與。前症相同。要在認定陰陽。分致清混可也。

脉訣曰。小便淋閉。臭色必黃。實大可療。瀦小知止。臭色
黃者溫熱移於膀胱也。

又歌曰。諸淋皆緣寒熱濕下移膀胱瀆無時。水道瀦滯常作痛。寒熱濕石血症明。此專指小便閉塞瀦有濁汁如砂如血之狀也。

清熱如聖散。淋如砂石結痛尿難卒出

馬蘭花 茄子 茅根 冬葵子 莩蔗 积實

連翹 石葦 瞿麥 滑石 秋石

歸芍湯。淋如血汁。與溺俱下。

歸尾 赤芍 生地 牛膝 側柏葉 藕節

車前 茯苓 澤瀉 草梢

硝枳湯 氣淋下腹氣脹堅滿溺有餘澁

枳壳 芒硝 大黃 草稍 石葦 冬葵子

木通 茯苓 瞿麥 滑石 秋石

鹿霜湯 淋如脂膏精漏俱出

鹿角霜 兔絲子 桑螵蛸 茯苓 澤瀉

木通 草梢

蓆蓉地黃湯 冷客下焦先寒戰而便淋

蓆蓉

杞子

熟地

山藥

山萸

石斛

牛膝

肉桂

附片

茯苓

澤瀉

草梢

八正散

溫熱癥結淋濁

木通

車前

大黃

梔子

扁蓄

瞿麥

滑石

草稍

草薢

分清飲便淋清濁不分

萆薢

石菖蒲

益智仁

烏藥

赤茯

草稍
秋石

小薊飲

血淋

淋濁

三

小薊 藕節 生地 蒲黃 木通 黑梔

歸尾 草稍 滑石 竹葉

濕熱下注，澀痛淋濁當分利。

草薢 淡竹葉 木通 赤苓 瞿麥 編蓄

茵陳 海金沙

酒客，腹中氣墜，便積膏淋，濁膩溫熱居多，下虛不提，宜苦辛寒分消法。

黃柏 茯苓 草薢 海金沙 川棟子 青皮

防己
桑沙

淋濁短澑痛先通陽氣。

草薢
烏藥
益智仁
赤苓
遠志
琥珀末

心熱下遺於小腸則為淋濁以苦藥入心而通小腸。

人參
黃柏
川連
生地
茯苓
茯神

丹參
桔梗
石菖蒲

婦人氣閉成淋治在肺經。

紫苑
枇杷葉
杏仁
降香末
榧姜皮
鬱金

淋濁

四

黑梔 茵仁

熟入膀胱小溲血淋，莖中痛。

生地 黃芩 木通 甘草梢 知母 黃柏
赤苓 琥珀末

中年已後陰虧有熱，飲酒濕熱下墮，精濁淋血，皆陰
固攝。宗丹溪補陰丸法。

熟地 龜膠 秋石 天冬 茯苓 黃柏

知母 猪脊筋 機丸

精走潤淋脊骨生熱屬陰胃弱勿用膩滯

龜版 覆盆子 五味 歸身 鹿角膠 秋石

芡實 金櫻子膏丸

欲萌強忍敗精凝墮宜通瘀宣竅

生桃仁 杜牛膝 人中白 生黃柏 膏香二分調入

房勞強忍精血之傷敗濁阻於隧道每溺必痛徒進
清熱無用以溺與精同門異路棄案以射香入絡通
血杜牛膝通血冲敗濁已效仍治淋

韭菜白汁。九製大黃一兩。生白牽牛一兩。歸鬚五錢。

桂枝三錢。炒桃仁二兩。小茴香三錢。韭菜白汁泛丸。

丹溪謂五淋多因濕熱阻竅。久病尿管大痛不能溺出。是房勞強忍。敗精離位。變成污濁。阻竅宜泄濁可愈。葉天士倣李瀨湖法。參入朱南陽法。治甚妙。

兩頭尖 川棟子 韭白 小茴 桂枝 歸尾

沖入杜牛膝根汁

敗精宿於精闕。瘀久精血皆枯。勢必成勞。致成不救。

宜通利後仍當以任督衝帶調理如婦人之崩帶治
奇經八脈為要

鹿角 龜甲 當歸 枳子 茯苓 小茴
鮑魚

操持神耗過動天君水火不交精變為濁宣利清解
無功葉天士倣孫真人九法耑治奇經八脈隨效

鹿茸 人參 生菟絲粉 补骨脂 芝子 舶茴香

覆盆子 蓼芩 核桃肉 柏子霜 蒸餅為丸

脉緩濇溺後有血溺器膠濁四肢寒凜納食如常病在

奇經。

生鹿角

當歸

杞子

柏子仁

炒沙苑

小茴

便閉

按便閉症，當與腸痺淋濁門薰參。其大便不通，有血
液枯燥者，則用養血潤燥。若血燥風生，則用辛甘熄
風。或酸苦入陰，故三才五仁通幽虎潛等法，在所必
用也。若血液燥，則氣亦滯，致氣血結痺。又當於養陰
潤燥中，加行氣活血之品。若火腑秘結，宜苦滑重鎮
者，用更衣丸以通之。若老人陽虛風閉，用半硫丸。溫
潤以通之。腑陽不行，則用玉壺丹。辛以開鬱，或用三

焦通法。若溫熱傷氣，阻遏經腑，則理肺氣以開降之。
此治大便之閉也。小便閉者，為癃閉，另立專門，當兼
參而用。至於二便俱閉，當先大便。通小溲自利，此其大
畧也。若胃腑邪熱化燥，便堅；太陽熱邪傳入膀胱之
腑，便秘。又當於傷寒條下法中，承氣五苓等方，酌而
用之，斯無遺義矣。

更衣丸 火腑秘結

硃砂五錢，蘆薈七錢，好酒和丸，每服一錢，二分。

玉壺丹。肺陽不行。

印扁鵲玉壺丹用石硫黃九製成丹

製法葉案集方王
晋三得異授製法

半硫丸老人陽衰。

半夏硫黃二味為丸 硫黃用浮萍水煮至點火不燃

來復丹。陽室陰凝清濁混淆症脹。

玄精石煅 石硫黃如法 製硝石 五靈脂 青皮 陳皮
鬱熱燥結大便閉，納食中痞宣以宣通。

川連 蘆薈 萊菔子 炒山楂 廣皮 川棟子

山梔 青皮 厚朴 薑製

熱鬱氣阻三焦宜通利法。

杏仁 郁金 厚朴 廣皮白 蘆薈

川棟子
人中黃

血液枯燥減食過半糞堅彈丸脾胃病從勞傷治

當歸 麻仁 柏子仁 松子仁 肉蓴蓉

液耗胃弱火升便難宜用三才加冬葵斛

生地 天冬 人參 麦冬 玄神 川斛

陽明脉大環跳尻骨筋掣而痛大便燥艱常秘此老

年血枯內風燥甚宜微鹹微苦以入陰法

生地

阿膠

天冬

人中白

川斛

寒水石

柏子霜

火麻仁

陽升風秘

火麻仁

柏子仁

當歸

紅花

桃仁

郁李仁

飽飢勞碌中州受傷腕痛脇脹噯泄氣寬靜則安

川牛膝

大便

柏子仁

歸鬚

菠菜汁

韭菜汁

五靈脂

桃仁

丹皮

尚年不焦陰虛六腑不利多痛便難乃幽門之病宜

便閉

五仁潤燥以代通幽。是王道之治。

火麻仁 郁李仁

柏子仁

桃仁

松仁

當歸

白芍 牛膝 人中黃

脈小弱形瘦腸風已久食少便難。嗳嘔泄氣自寬爽。釋乃腑病通即為補。倣東垣通幽意。

當歸 桃仁

紅花

郁李仁

冬葵子

柏子霜

松仁 蘆薈

湯飲下咽。噯噫不已。不飢不食。大便干堅。若彈丸脉。

左弦實血鬱血結宜辛潤法

桃仁
冬葵子
皂角核
郁李仁
大黃

降香
鬱金

血液枯燥便難潤濡是下焦幽門氣鈍血燥宜東垣通幽意

鹹蓴蓉
生地
當歸
郁李仁
柏子仁

牛膝

氣血結痺脉實病久瘀熱在血胸不爽小腹墜能食不渴二便清少此屬血病用通幽法

桃仁
紅花
郁李仁
製大黃
歸鬚
小茴

桂枝木 川棟子

婦人大小便不爽。年老久病宜通絡。兼治奇經兩通下焦可愈。

當歸 川芎 生大黃 桂枝 川棟子 青皮

蓬術 三稜 五靈脂 炒黑查 炒香附

共為末。葱白搗汁泛丸。

癃閉

癃閉者，小便點滴不通，暴則為閉，久則為癃。病最為危急，即用葱頭炒熟，或炒鹽少腹熨之，或用麝香少許，入麝內以薑片蓋之，炙數壯。暴閉可通，暫救危急。內經曰：肝之脉過陰器，所生病者閉癃。又曰：督脈主宗筋。又曰：膀胱不利為癃，不約為遺溺。是膀胱為州都之官津液藏焉。氣化則能出矣。氣化者太陰肺也。若使肺燥不能生水，則氣化不及。法當清燥。若脾濕

癃閉

一

不運而精不上升。故肺不下輸。法當理脾燥濕。若水潤熱結。膀胱不利。法當濕腎滌熱。更宜以淡滲之品分利之。若厥陰熱鬱為癰。少腹脹滿。用穢濁氣味之品。直泄厥陰之閉。此皆發前人未發之秘訣。學者尤當究心焉。仍當與脾腸便閉淋濁各門。兼參詳察。而治之可也。

師燥不能生水。則氣化不及。而為癃閉。宜清肺燥。

沙參

麥冬

茯苓

桑葉 梨皮

蘆根

紫苑 枇杷葉

脾溫不運而精不上。肺不下輸而為癃閉。宜理脾燥
海。人參 焦术 茯苓 火草 半夏 橘皮

枳壳 厚朴

左脉弦數。溺短而痛。此屬膀胱瘻熱。為癃宜清。

生地 木通 黃芩 赤苓 丹皮

草稍
竹葉

澀壅三焦。舌白身熱。溺不利為癃閉。宜清利。

杏仁 桔梗 滑石 通草 連翹

蘆根
秋石

癃閉

秋暑穢濁。寒熱如瘧。上咳痰。下洞泄。三焦皆熱。氣不化。則小便不通為閑。宜芳香辟穢。分利滲熱。

藿香梗

厚朴

檀香汁磨

廣皮

木瓜

茯苓

澤鴻

薰服六一散

分消熱。熱畧減。小便畧通。其陰莖囊腫。是濕熱下墜入腑。與方書莖腫疑症有間。宜清河間法。

飛石滑

石膏

寒水石

杏仁

厚朴

猪苓

澤鴻

絲瓜葉

暑熱不得解散。壅腫癰閑宜通六腑。

防已 荚蒾皮 猪苓 通草 海金砂

苡仁
秋石

濕熱肺氣不降。痰閉二便不通。但理氣邪可宣通。

葦莖 菟丝子 桃仁 滑石 通草

西瓜翠衣
秋石

暑濕傷肺氣火司降。致有癃閑宜生津清養胃陰。以

潤肺。

麦冬 知母 甜杏仁 白芍參 胡麻

脉左弦如刃。六旬老人真陰衰。五液涸。小溲血水點。

滴不爽。少腹右脇聚瘕。此屬癰閑。非若少壯渴火通利。
柏子霜 小茴 鹿角霜 茯苓 當歸
蕤落 五谷虫
氣血結滯。脈實病久。瘀熱在血胸不爽。小腹墜能食。
不渴。二便濇少。此屬血病。用通幽法。

桃仁 紅花 郁李仁 荘大黃 歸鬚 小茴
川棟子 桂枝木

遠行勞動。肝腎氣乏。不司約束。下焦陰傷。二便皆濇。
背寒煩渴。少腹滿脹。宜通厥陰。

老韭根 穿山甲 雨頭尖 川棟子 歸鶴頭 小茴
橘紅 金汁

驅濁泄肝 僅止泄氣。二便未通葉案依東垣治王善
夫癃閉意滋腎丸三錢三服而效。

黃柏 知母 肉桂

膀胱不約遺溺宜五苓散加用。

茯苓 猪苓 澤瀉 白木 肉桂 車前

小兒遺溺是膀胱不約為癃症熱結。

癃閉

茯苓 瞿麦 车前 木通 猪尿泡 同煮爛服
小兒遺溺 形寒冷結膀胱 宜溫通滋腎

杜仲 破故紙 小茴 木香 烏藥 茄蒲
牛膝 猪尿泡 同煮服

腫滿水腫 草薢車前子 鮑參木通等分
水煎服 每日一劑 水腫消散後即停
利水消腫 藥力甚捷

腸痺

腸痺本與便閉同類。今另立一門者，欲人知腑病治臟。下病治上之法也。蓋腸痺較之燥屎堅結，欲便不通者，稍緩故葉案但聞降上焦肺氣，上竅開泄，下竅自通矣。若燥屎堅閉，則有三承氣潤腸丸通幽及溫脾之類，然便閉之症，傷寒門中急下之條無幾，餘皆感六淫之邪，病後而成者居多，斯時胃氣未復，元氣已虧，若遽下之，於理難進，莫若外治之法為穩，用蜜

煎導法。設不通。寒。虛者。間日再導。亦古人之設法。皆可兼參而用之可也。

肺氣不開降。食進院中難下。大便氣塞不爽。腸中收痛。此屬腸痺。

杏仁 枇杷葉 鐘金 瓜萎皮 山梔 香豉
食下腹脹。旬日一便。腸胃皆腑。以通為用。丹溪每治腸痺。必開肺氣。謂表裏相應之法。

杏仁 紫苑 冬葵子 桑葉 土瓜萎皮

身重不能轉移，尻骨板着必得撫摩少安大便不通，小溲短少不飢少飲是濕邪蒸鬱化熱阻於氣分，經腑氣隧皆阻病名湿痺。

木防己 杏仁 桂枝 石膏 桑葉 丹皮

舌白不渴不飢大便經旬不鮮皮膚麻痒腹中鳴動皆溫化熱阻遏氣分諸經脈絡皆閉倣丹溪法肺氣通則湿熱自走。

杏仁 瓜萎皮 鐘金 枳壳 山梔

香豉 紫苑

濕結在氣。二陽之痺。丹溪每治在肺。肺氣化則便自通。

杏仁 紫苑 枇杷葉 茾葉皮 鐘金 山梔皮

枳壳汁 桔梗汁

舌赤咽干。陽明津液衰。但痰多不肌不食。小便不爽。大便祕。倣古法九竅不利。為胃不和論治。

炒半夏 橘紅 竹茹 枳實 花粉

薑汁 茯苓

肺痺

肺為呼吸之橐籥，位居最高，受臟腑上朝之清氣，稟清肅之體，性主乎降。又為娇臟，不耐邪侵。凡六淫之氣一有所着，即能致病。其性惡寒惡熱，惡燥惡濕，最惡火風邪着，則失其清肅降令，遂痺塞不通矣。葉案立法，因於風者，則用薄荷桑葉牛蒡之屬；兼寒則用麻黃杏仁之類；若溫熱之邪壅遏而痺者，則有羚羊射干、連翹山梔兜鈴竹葉沙參象見。因溫則用通草。

滑石。桑皮。苡仁。威喜丸。因燥則梨皮。蘆根。枇杷葉。紫苑。開氣則姜皮。香豉。蘿子。桔梗。蔻仁。其葷莖湯。葶蘆大棗湯。一切藥品。總皆乎輕浮。不用重濁氣味。是所謂微辛以開之。微苦以降之。適有合乎輕清嬌臟之治也。肺主百脉。為病最多。就其配合之臟腑而言。肺與大腸為表裏。又與膀胱通氣化。故二便之通閉。實有關係焉。其他如肺痿。肺癰。喘嗽。咳嗽。失音。均當兼參而用之。

上焦氣分壅熱。肺氣渾阻。而浮胸痞寒熱。宜葦莖湯。

葦莖 桃仁 茲仁 瓜瓣

肺不開降。肺痺。則喘急。急痛。映兩脇。舌白。二便少。宜

葦莖湯。見前。

清邪在上。必用輕清氣藥。如苦寒治中下。上結治下。

兜鈴 牛蒡子 桔梗 生草 杏仁 賣干 麻黃

經熱清消。效痰痺痛。

桂枝 桑枝 木防己 生石膏 杏仁 茲仁

肺痺

花粉

渴飲欬甚。大便不爽。餘熱壅於氣分。

紫苑

通草

石膏

花粉

木防己

杏仁

偏冷偏熱。肺氣不和。則上焦不肅。

用微苦辛以宣通。

薄荷梗

桑葉

象貝

杏仁

沙參

黑山梔

溫邪形寒。腕痺。肺氣不通。治以苦辛。

杏仁

瓜萎皮

鬱金

山梔

蘋梗

香豉

婦人右股麻脹痛。咳嗽不得卧。二便不利。腕中痞脹。

是為肺痺。

紫苑

水姜皮

杏仁

山梔

鬱金

枳壳

桔梗

通草

風溫不解，邪結在肺，鼻竅干焦，喘急腹滿，聲音不出。此屬上痺，陰篤之病，急宜開其塞閉。

葶藶

大棗

葦莖

桃仁

苡仁

灰瓣

脈小濇，失血嘔逆之後，脘中痞悶，納谷脹脹，小便短赤，大便不通。此怒勞氣分逆亂，當從肺痺主治。

肺痺

三

赤大鮮枇杷葉 黑梔皮 杏仁 紫降香 土瓜萎皮 鐵金

蓮子 鈎藤

胸痺

胸痺與胸痞不同。胸痞有暴寒鬱結於胸者，有火鬱於中者，有寒熱互鬱者，有氣實填胸而痞者，有氣衰而成虛痞者，亦有肺胃津液枯濇，因燥而痞者，亦氣上焦濕濁瀰漫而痞者。若夫胸痺，則但因胸中陽虛不運，久而成痺。內經未曾詳言。惟金匱立方俱用辛滑溫通。所云寸口脉沉而遲，陽微陰弦。是知但有寒症，而無熱症。葉案宗之加減而治，亦惟流連上焦，清

陽為主。莫與胸痞結胸。噎膈痰食等症。清混斯得之矣。
胸脘清陽不運。胃痛徹背。午後為甚。不嗜飲食。
是陽傷陰濁。宜溫通陽氣。

薤白 半夏 茯苓 乾薑 桂枝

肺衛室痺。胸膈痺痛。咳嗆痰粘。苦辛開鬱為主。常戒
腥羶可愈。

芥萎皮 炒桃仁 冬瓜子 苦桔梗 紫苑 川貝母
脾胃陽虛。胸痺發必嘔吐甜水。黃濁黏。折生陽。甘味

色黃是中焦脾胃主病故內經辛以勝甘法治

半夏 干薑 厚朴 草蔻 良薑 杏仁

茯苓

痛久入血絡胸痛引痺

炒桃仁 延胡 川棟子 木防己 桂枝 青葱管

脉弦胸腕痛欲嘔便結此清陽失曠氣機不降久延致成噎格

薤白

杏仁

半夏

薑汁

厚朴

枳實

胸痺

胸痺因怒而致。痰氣凝結。

土瓜萎 半夏 薤白 桂枝 茯苓 生薑
脉沉如伏。痞脹格拒。脘膈上部氣壅。自左覺熱。凡木
鬱達之。火鬱發之。患在上宜吐之。

巴豆霜一分 川貝母三分 桔梗三分 為細末。熱湯服。吐後服。

胆道涼水即止

胸 痘

病症有暴寒鬱結於胸者有火鬱於中者有寒熱互鬱者有氣實填胸而痞者有氣衰而成虛痞者亦有氣衰而成虛痞者亦有肺胃津液枯濇因燥而痞者亦上焦濕濁而痞者古法仲景用苓桂薑甘以苦為泄辛甘為散其於邪傷津液用苦辛開啟而必資酸味以助之於上焦不舒者既有枳桔杏萎開降而又用梔豉除熱化腐疎暢清陽之氣葉案又從古人有

形無形。化出妙用。如保和化食。白金驅痰。附薑煖中。
參茯養胃。生脈飲液。臨症視其陰陽虛實。靈機應變。
可謂良矣。

熱氣痞結。胃汁消燥。舌乾便難。宜苦辛開氣。酸苦泄
熱。是治法矣。

川連 生薑 人參 枳實 橘紅 烏梅
生白芍

氣閉久則痞結。不飢不食不便。宜開氣理結。

川貝母 白蔻仁 麝金 杏仁 金銀花 萝豆壳

痰熱內閉。痞悶。陳腐粘凝。膠聚脫膜。熱氣下注。隱然
微痛。

黑梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

梔皮
降香

暮臥另進白金丸五錢

白朮

鬱金

氣窒熱鬱。仍治上可以通痞。

杏仁

鬱金

香附

梔皮

黑梔

蘿梗

因驚而得邪。遂入肝。故厥後熱。神識昏狂。面青舌白。
渴吐渴飲。胸次按之。而此屬痞結。乃在裏之症。宗仲
治。胸痞。

景以鴻心湯為法

川連 半夏 干薑 黃芩 人參

枳實
白芍

暑濕內伏。夾食面垢油亮目黃頭脹胸脘痞悶脈形

濡濇宜伏邪例治

滑石 黃芩 厚朴 杏仁 密仁

醋炒半夏
竹葉

胸痞自便狀如結胸食滯在胃。湿濁阻遏宜清解三焦。

淡黃芩 川連 淡薑 厚朴 醋炒半夏 鐘金

白蔻仁 滑石

送保和丸三錢

山楂 神曲

茯苓 半夏

半夏

陳皮 茶菔子

連翹

暑邪阻氣胸痞不飢熱不止舌白而渴此暑邪未盡
仍清氣分

竹茹 黃芩

知母

橘紅

鹽炒

滑石

桔梗

枳壳 鐘金

舌白腕痛嘔惡腹鳴此濕阻氣分胃痞成痛治在氣分

炒半夏

良薑

藿香

橘紅

烏藥

香附

胸痞

三