


婦
科
冰
鑑

三



婦科水鑑卷五

胎前門目錄

胎前總領一

惡阻二

胎阻三即腹痛

子腫子氣子滿皺腳腕胎四

子煩五

子懸胎上逼心六

子癩七

子嗽 八

子淋 九

轉胞 十

激經 十一

胎漏 十二

菜血 十三

吐血 十四

胎動不安 十五

子死腹中 十六

附胎動胎漏尿血辨

胎動不安墮胎小產滑胎 十五

子母存亡辨 十七

胎前癥瘕 十八

胎萎不長 十九

子瘕 二十

子啼 二十一

臟燥 二十二

兔胎 二十三

腸覃石廕 二十四

母子盛衰 二十五

胎孕慶常記

二六

胎前門藥方目錄

保生湯一

加味六君湯二

加味溫膽湯三

參橘飲四

加味平胃散五

加味芎歸湯六

導赤散七

五苓散 八

蜜消煎 九

延胡四物湯 十

加味膠艾四物湯 十一

全生白朮散 十二

天仙藤散 十三

茯苓導水湯 十四

知母飲 十五

犀角散 十六

紫蘓飲 十七

羚羊角散 十八

釣藤湯 十九

桔梗湯 二十

枳椇二陳湯 二十一

加味五淋散 二十二

安榮散 二十三

補中益氣合四卷散 二十四

舉胎四物湯 二十五

阿膠五苓散 二六

黃耆湯 二七

銀芎酒 二八

阿膠湯 二九

血餘四物湯 三十

清胃飲 三一

加味聖愈湯 三二

加味佛手散 三三

十聖散 三四

芎藭湯 三五

益母丸 三六

地黃飲 三七

獨參湯 三八

千金保胎丸 三九

平胃散 四十

黃連煎 四一

甘麥大棗湯 四二

香椽丸 四三

婦科冰鑑卷五

胎前諸證門

胎證綱領一

妊婦胎前妄顛極多其最易犯者惡阻胞阻子
子氣子滿子煩子懸子癩子嗽子淋轉胞激經
漏尿血吐血胎動不安墮胎小產滑胎子死腹
子母存亡胎兼癥瘕胎痿不長子瘠子啼臍燥
胎腸覃石痕母子盛衰等證共計廿四條皆當
一詳辨其餘胎前傷寒傷食瘡痢霍亂泄瀉等

當於雜證門中參考施治但須時刻保護胎原
致誤犯為要耳

惡阻 二

妊孕月餘惡心嘔吐名曰惡阻蓋婦人受胎之
胎門壅塞氣內阻挾胎氣衝逆於胃中宮鬱
不能舒布以致頭目昏眩心虛煩悶體重肢倦
酸擇食輕者勿藥可愈重者必須調理治此之
惟求於胃審其寒熱辨其痰飲或胃素虛或氣
衝隨宜施治鮮不效矣

暑胃素虛者保生湯 胃寒者必喜熱飲六君子

湯

吐多痰水且心煩頭目眩暈者其人必胃

中素有停飲也宜加味六君子湯 善嘔吐心中

煩熱慣悶喜飲涼漿者胃熱也加味溫膽湯

暑胃熱挾氣攻衝者參橘飲

倘愈止愈急者須效仲景法停藥月餘自安

保生湯本門一

六君子湯 見經閉門五

加味六君子湯本門二

加味溫膽湯本門三

麥橘飲本門四

胞阻三

孕婦腹痛名曰胞阻致此之由有食滯胎氣胞寒
水熱之分欲察其因須審肩處若在心胃分界者
屬食屬滯消導即愈在少腹之間小便清利者必
因胞血受寒法當養血溫煖下焦或小水閉澀而
痛者則是膀胱蓄熱所致但清熱決水其治無難
惟腹痛連腰乃胎氣作祟或有觸犯而然治此不

易。若兼下血尤屬可畏何也。蓋胎繫於腎腰者腎之府也。若不急為安養恐墮墮墜接踵而至矣。

若心胃作痛者食傷停滯也宜加味平胃散若大便秘結日久加大黃以攻之必倍甘草以緩其峻庶不傷胎。若少腹作痛者乃胞血受寒也宜加味芩歸飲。小便閉澀而痛者膀胱積熱也導赤散。若水盛陽虛不化者宜五苓散。若內熱大小便閉者蜜消煎。腰腹作痛胎動下血者宜延胡四物湯定痛而保胎。下血更

多而痛者須防墮胎宜加味膠艾四物湯

加味平胃散 本門五

加味芩歸飲 本門六

導赤散 本門七

五苓散 本門八

蜜消煎 本門九

延胡四物湯 本門十

加味膠艾四物湯 本門十一

子腫子氣子滿皺腳脆腳 四

孕婦頭面浮腫或漸及徧身小便短澁者水氣為病也名曰子腫自足腫至膝或指縫出水小便長利者濕氣為病也名曰子氣若徧身俱腫腹脹而喘在六七月之間者名曰子滿但兩腳腫而膚厚者屬濕名曰皴脚皮薄者屬水名曰脆脚大凡水之為病多喘但氣之為病多脹滿喘但屬肺脹滿屬脾也以其人素有水氣濕邪故受孕有腫滿之證兒未成形被水浸漬其胎每致損壞已成形者尚可調治故五六月後而有是證者每多生育

但兒手足軟而有疾耳

子腫全注白朮散 子氣天仙藤散 子滿皴脚

脆脚茯苓導水湯 子腫子氣亦宜準此

全生白朮散 本門十二

天仙藤散 本門十三

茯苓導水湯 本門十四

子煩五

孕婦別無他證惟時時心煩者名曰子煩由陰既
養胎孤陽獨旺上乘於心故使煩熱不寧也宜知

母飲加減主之或犀角散亦可

知母飲 本行十五

犀角散 本行十六

子懸胎上逼心六

孕婦心胸脹滿名曰子懸由其人素有寒氣重因食冷與氣相搏故胸次脹滿不舒也更加喘甚者名為胎上逼心其因亦然調之之法咸宜流氣養血為主惟紫菀飲兼善其功

紫菀飲 本行十七

子癇 七

厚婦忽然顛仆痰涎壅盛抽搐不省人事須臾自醒頃復如常名曰子癇乃肝心二經血虛所致蓋血虛則生熱熱盛則生風也經曰諸風掉眩皆屬於肝始發之際宜疎風清熱既醒之後須以養血為主所謂血和風自滅耳

善抽搐微者羚羊角散 甚者釣藤湯主之若口眼喎斜半身不遂則已成中風廢證當於中風門參考

鈴羊角散 本門十八

釣藤湯 本門十九

子嗽

妊娠咳嗽名曰子嗽。有感冒風寒痰飲上逆陰虛火動之不同。若不速治，必傷胎。感冒者必有表證，可據一散而解。痰飲上逆者，痰涎必多，法當理氣化痰。陰虛火動者，身體壯熱，其嗽午後益甚，須以壯水滋金為主。則痰可瘳而胎可保矣。

若感冒風寒者，桔梗湯。痰涎盛者，枳桔二陳。

湯 久嗽陰虛者 麦味地黄湯

桔梗湯

本門二十一

枳桔二陳湯 本門二十一

麦味地黄湯 見徑門四

子淋丸

孕婦小便頻數、窘澁、點痛、底痛者、名曰子淋、由氣血聚養胎元、不及輸連、滲道、遂使膀胱鬱熱、小水為之不利也、法當養血清熱、佐以利水、然亦有中氣虛弱、無力升提、胞壓於脬、因致小水不利者、須

從升補別之之法在脉有力無力間也

若因膀胱鬱熱者加味五淋散或安榮散五日久

倦怠脉虛弱者補中益氣合四苓散舉而利之

加味五淋散 本行二二

安榮散 本行二三

補中益氣合四苓散 本行二四

轉胞 十

妊娠臍下急痛欲小便不得飲食如常心煩不能
安卧者名曰轉胞凡尿急度趁或忍尿飽食胎因

下墜壓及胞系水竅閉遏故有是證當升提其胎
胎舉而胞系亦疏水道自通矣不可滲利非獨無
益也

宜先用丹溪舉胎法令穩婆剪去指甲香油塗手
從玉門托起其胎則尿自出暫救其急遂以舉
胎四物湯煎服探吐如是三四次則胎舉而小
便通利矣若其素賦氣虛者用補中益氣湯
服吐如上法亦安倘善不應乃係有飲宜阿膠
五苓散清而利之

舉胎四物湯

本門二五

補中益氣湯

見月經門四八

阿膠五苓散

本門二六

激經

十一

婦人受厚之後，經復循月者，名激經。緣胎尚微，其血榮養有餘，故坦然無恙。勿妄治療，俟胎形漸長，則血壅護胞中，而經不再見矣。今世云七八月產子者，率都由此惜人未能察耳。

胎漏 十二

妊娠下血其腹不痛謂之胎漏由衝任虛不能
約制血海或胞中蓄熱致使經水妄行或勞後傷
脾無力統攝歸原或怒氣傷肝因得疎泄肆權故
血時下淋漓不止當為速治否則胎乾而墮矣
若衝任氣虛者其漏下黃汁或如豆汁黃耆湯或
銀芎酒 胞中蓄熱其血心多或色紫黑阿膠
湯清之 勞後傷脾者歸脾湯 怒氣傷肝者

加味逍遙散

黃耆湯

本白二七

銀芎酒 本門二

阿膠湯 本門二九

歸脾湯 見月經門十四

加味道遙散 見月經門十

尿血 附胎動胎漏尿血辨

妊娠尿血 由於胞熱或勞怒動火血為大熱搏激

透滲入膀胱故血從尿出治此之注惟血餘四物湯

或加山梔仁足稱神劑

血餘四物湯 本門三十

按胎動胎漏尿血三證俱見下血第胎動腹痛
胎漏腹不痛然胎漏尿血腹皆不痛亦有差別
尿血出自溺孔胎漏出自人門為異耳

吐血十四

妊娘吐血皆屬於熱蓋氣血壅聚胎元胞中恒多
鬱熱或為暴怒傷肝或因膏粱積胃一有干犯則
火乘氣上血隨而溢也

若胞中鬱熱者芩連四物湯 怒動肝火者加味

道遠散 膏粱積胃者清胃飲 胃經有火者

犀角地黄湯

蒼連四物湯

見月經門二

加味逍遙散

見月經門十

清胃飲

本門三一

犀角地黄湯

見月經門四五

胎動不安墮胎小產滑胎

十五

氣血充盛形體壯實則胎元安固何患之有加以調攝穩如磐石苟或衝任虛損勞役太過因患他疾延綿偶為磕觸跌撲或暴怒以傷肝或房勞而

虧腎此不安墮胎小產滑胎所由出也蓋衝任虛
損胞中之其蔭養勞役太過氣血難以周榮他疾
延綿則胞蒂萎而下同磕觸跌撲則胎元損而難
安暴怒傷肝則疏泄用事子宮受搏因而不能弭
靜房勞虧腎則封藏失職真元盜洩難禦慾火熬
煎今世患是證者率由乎此然小產墮胎亦自有
別五七月兒體已成名為小產二三月形象未備
謂之墮胎若懷孕三五七月無故而墮及下次受
娠亦復如是者名曰滑胎犯此者宜預補肝腎以

杜後患、尤宜戒房慾、節勞役、庶幾有濟、種植者可
不慎歟、

若衝任虛損、勞役太過、腹痛不下血者、加味聖愈
湯、腹痛已下血者、加味佛手散、因患他疾
干犯者、十聖散、墮觸跌撲、胎欲墮者、芎藭湯
調下益母丸、暴怒傷肝者、逍遙散、房勞虧
腎者、地黃飲、慣於滑胎者、尤宜長需、偏腹痛
連腰、血下時多、挽留難矣、蓋胎繫於腎、腰為腎
府也、善胎已墮、血下不止、面黃唇白者、脫榮

證也急用獨參湯峻補其氣以生其血斯時也
有形之血不能速生無形之氣所當急顧使無
形生出有形也 善惡血瘀滯不行腹脇脹痛
者宜於廻生丹益母丸酌其宜而用之 屢經

墮胎者宜千金保胎丸

加味聖愈湯 本門三二

加味佛手散 本門三三

十聖散 本門三四

芳藿湯 本門三五

益母丸 本門三六

道遠散 見月經門九

地黃飲 本門三七

獨參湯 本門三八

廻生丹 見後產後門六六

千金保胎丸 本門三九

子死腹中 十六

妊婦胎死須先驗舌其色青而面紅和者子死之徵也當急驅逐不可遲延更兼肚腹脹大或腹如

水甚而冷冲嘔惡口出穢氣者最危之候也尤宜
急下然必審其虛實別其寒熱隨宜施用方盡活
人高手

吾人^處羸者佛手散天加肉桂人壯實者平胃散

加芒消

佛手散 見月經門八

平胃散 本門四本

子母存亡辨十七

凡妊婦一切凶危之候欲知子母存三者當於厚

婦面舌之色定之若面赤舌青其子必死面青舌赤其母已亡倘面舌俱見青色兩口角流涎沫者子母二命皆難保也

胎魚癥瘕十八

凡妊婦素有癥瘕或新有病當攻者俗云有娠不可攻削此臆說也經曰婦人重身毒之何如有故無殞亦無殞也言藥雖峻利有病則病受之不能傷及胎氣故重示亦無殞也之句但宜衰其大半而止毋過孟浪又何必據有娠不可攻之說也耶

胎萎不長 十九

夫胎處於胞中全賴氣血滋養凡妊娠至五六月其胎萎不長者由妊母稟賦虛羸氣血虧弱而然但當培補中州使飲食日進氣化有自血因以生更當大補氣血則胎自長而不萎矣
若脾胃又虛飲食不進者六君子湯 氣血既虧

者八珍湯

六君子湯見經前頁五

八珍湯 月月經前二三

子瘡二十

妊娠至九月，穀音細啞者，謂之子瘡。蓋足少陰之脈繫舌本，因胎形長大，阻遏其脈，不能上至於喉，故發言不亮，非絕然無聲也。不必治療，俟十月子生，其絡復通，則能言矣。岐伯有言曰：無治也。當十月復。

子啼二一

孕婦腹內有鐘聲，或嬰兒在內啼哭者，名曰子啼。蓋兒在腹中，口含臍帶，上血餅，因妊母登高舉臂。

既出其口故兒作聲令妊婦曲腰如拾物狀仍入
兒口則聲即止古書雖載其證然不經見設偶有
之者惟黃連煎主之

黃連煎本門四十一

臟燥二二

孕婦無故時刻悲傷哀痛象若神靈依憑者名曰
臟燥夫悲者肺情之所主燥者金氣之所化因氣
血壅塞胎元津液不能上奉故肺燥而悲也甘麥
大棗湯主之

甘麥大麥湯本門四二

鬼胎二三

邪思情感鬼胎因生夫鬼者偽也凡畫之所思為
夜之所見婦女之情心淫而動則肝腎相火翕然
而起淫精異位凝聚胞中其形漸長腹因漸大儼
若懷子非實有鬼神交接而後始成也經所謂思
想無窮所願不得化為白淫者是也法當攻積破
血則經通而腹消矣宜於後石瘕腸覃條互參

腸覃石瘕二四

經曰。寒氣客於腸外。與衛氣相搏。氣不得榮。因有所繫。癰而內著。惡氣乃起。瘕肉乃生。其始生也。大如雞卵。稍以益大。至其成。如懷子狀。按之則堅。推之則移。月事以時下。石瘕生於胞中。寒氣客於子門。子門閉塞。氣不得通。惡血當寫不寫。飢以留止。日以益大。狀如懷子。月事不以時下。皆生於女子。可導而下。由此觀之。雖皆如懷子狀。腸覃氣病而血不病。故月事以時下。石瘕先氣病而後血病。故月事不來也。

石瘕宜吳茱萸湯主之
腸覃宜香椽丸主之

吳茱萸湯見日經門三一

香椽丸本門四三

母子盛衰二五

娠母強壯胎元盛實則胎前產後坦然無虞倘母氣萎弱者則胎前病必多母氣衰羸者則產後疾迭見以此察之可預知也

胎孕變常記二六

李時珍曰女子二七天癸至七七天癸絕此其常

也有女年十二十三而生子如褚記室所載平江
蘇達卿之女年十二受原有婦人年五十六而
生子如遼史所載亟善妻年六十生二男一女此
又異常之尤者也

胎前門彙方

保生湯一

人參

甘草 各二錢半

白朮 五炒

香附子

烏藥 炒

橘紅 各五錢

右劉每服三錢薑五片煎服

加味六君湯二

人參

白木土炒

茯苓

陳皮

半夏各一錢五分

甘草五分

藿香葉

枇杷葉各一錢

縮砂仁炒

枳殼各八分

右劉生薑煎服

加味溫膽湯三

陳皮

半夏製

茯苓 各一錢

甘草 五分

枳實

竹茹

黃芩 各一錢

黃連 八分

麥冬 二錢
去心

蘆根 一錢

右剉薑棗煎服

參橘飲 四

人參

橘皮

茯苓

麥冬 去心

厚朴 薑汁炒

白木 各一錢

甘草 五分

竹茹 一團

右剉加生薑煎服

加味平胃散五

厚樸 薑汁炒

蒼朮 米泔浸炒

陳皮

甘草 炙

人參 各一錢

右為末每服三錢加薑煎服大便秘結加大

黃倍甘草

加味芎歸湯六

當歸酒洗錢

川芎二錢

吳茱萸

八分
甘草水製

蘼艾酒炒錢

甘草

六分

阿膠二錢
蛤粉炒

人參

一錢
去芦

水煎溫服

導赤散七

生地三錢

木通二錢

甘草梢一錢

燈心一團煎服

五苓散八

白木五片

茯苓

猪苓

澤瀉各二錢半

桂三分

右剉作一服水煎服

癭消煎九

蜂蜜

芒消

右煎溶化服

延胡四物湯十

延胡索 三錢 酒煮透

川芎 一錢五分

白芍 二錢 酒炒

右剉水煎服

加味膠艾四物湯十一

當歸 酒洗

阿膠

杜仲 錢五分 菴水炒

當歸 二錢 酒洗

熟地 二錢

熟地

白芍 各二錢 酒炒

新艾 各八分

君加蔥白三寸大豆淋酒煎服

若因外感之邪加羌活一錢或獨活以散之

全生白朮散 十二

白朮

土二錢半

茯苓皮

一錢半

陳皮

生薑皮

大腹皮

桑白皮

各一錢

若剉水煎服或為細末每服三錢米飲調下

亦可

天仙藤散 十三

天仙藤洗晒炒

香附子炒

陳皮

甘草

烏藥

木香各等分

若剉每服五錢加生薑三片紫蘇五葉水煎

日三服腫消止藥

茯苓導水湯十四

茯苓

檳榔

豬苓

縮仁

木香

陳皮

澤瀉

白朮

木瓜

大腹皮

桑白皮

蘆梗 各等分

石加生薑煎服

脹加枳殼

喘加苦葶藶子

腿脚腫加防己

知母飲十五

知母

夏冬

甘草 各五钱

黄耆

子苓

赤苓 各七钱五分

若以咀 每服四钱水一盞煎至七分去滓入

竹瀝 一合温服

犀角散 十六

犀角尖

磨汁 脂投入

地骨皮

赤茯苓

麦冬 去心

條苓 各二钱

甘草 五分

若剉水煎入竹瀝一合温服

紫蘇飲 十七

當歸

川芎

白芍 各二兩

陳皮

蘇莖葉

大腹皮 各一兩

甘草 炙

人參 量虛實用

若咳嗽每服五錢水二盞生薑五片煎至一

盞去滓服日進二服

有熱加黃芩竹茹

心煩加羚羊角

有食加神麴山查

羚羊角散 十八

羚羊角 獨活

酸棗仁 五加皮

防風 薏苡仁

杏仁 當歸 酒浸

川芎 茯神 各五分

甘草 木香 各二分

若以咀加生薑五片水煎服

釣藤湯 十九

釣藤釣

當歸

茯神

人參 各一兩

善栝棟

一兩五錢 桑寄生 五錢

右為粗末每服五六錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時忌豬肉菘菜

煩熱加石膏二兩五錢

臨產月加桂心一兩

栝棟湯 二十

天冬 去心

赤苓

桑皮

桔梗

紫菀

各五分

麻黃

三分

貝母

人參

甘草

各二分

右剉加生薑水煎服

一方有杏仁無貝母

枳殼二陳湯二一

陳皮

半夏

茯苓 各二錢

甘草 五分

枳殼

梧梗 各一錢

右剉薑水煎服

加味五淋散 二二

赤苓 二錢

山梔 一錢

當歸 一錢

白芍 二錢

子芩 八分

甘草 五分

生地 二錢

澤瀉 一錢

車前 一錢

木通 一錢

石水煎服

安榮散 二三

當歸

白芍 各二錢

麦冬

一錢 五分

通草 一錢

滑石 六分

人參 一錢

水煎服此方如石斛山桅其効尤擅

補中益氣合四苓散 二四

人參 一錢

黃耆 各二錢

白朮 土炒

當歸 各二錢

升麻

柴胡 各五分

陳皮 八分

甘草 六分

赤苓

澤瀉

猪苓 各一錢

者加魯東煎溫服

舉胎四物湯 二五

當歸 酒洗

白芍 酒炒

熟地

川芎

人參

白朮 各二錢
土炒

陳皮

升麻 各一錢

右刺水煎服

阿膠五錢散

澤瀉 各二錢

阿膠

猪苓

白朮

茯苓

各一錢半

肉桂 三分

右剉水煎溫服

黃耆湯 二七

黃耆

糯米

川芎

者剉細末水二大盞煎至一盞溫服一方無

川芎

銀芎酒 二八

芎麻根 二兩

紋銀

清酒 一盞

右以水二大盞煎至一大盞去渣分溫二服

阿膠湯 二九

阿膠 炙燥

熬地 煨

艾葉 微炒

川芎

當歸 煨

杜仲 去粗皮炙制

白朮 各一兩

右以咀每服四錢水一盞半棗三枚擘破同

煎至八分去滓食前溫服

血餘四物湯 三十

血餘 淨一錢
煨 灰

生地 三錢

白芍 二錢

當歸 一錢半

川芎 一錢

白朮 根一錢

右水煎溫服或加山梔仁更妙

清胃飲三一

哇地四錢

丹皮二錢

黃芩一錢半

升麻六分

加味聖愈湯三二

人參一錢

黃耆二錢

熟地三錢

當歸三錢

川芎一錢半

白芍一錢半

杜仲二錢

續斷一錢半

鹽水炒

縮砂仁 一錢
炒

右加薑朮水煎服

加味佛手散 三三

當歸 五錢

川芎 二錢

阿膠 二錢
蒲黃 炒
珠

蘼艾 一錢
醋 炒

杜仲 二錢
益水 炒

續斷 錢五分

白朮 二錢
土 炒

條芩 一錢

右水煎溫服

十聖散 三四

人參

黃耆

白朮

熟地

砂仁 各五分

甘草 炙

當歸

川芎

白芍

各一錢

川續斷 八分

石剉水煎服

芎藭湯 三五

當歸 一兩

川芎 五錢

石水煎服

益母丸 三六

益母草

五月五日或六月六日採陰乾忌鉄器

右一味以石器碾為細末煉蜜丸彈子大每

用一丸童便好酒研化服之

地黃飲 三七

熟地 四錢

山藥 二錢

山萸 二錢

白朮 一錢五分

阿膠 一錢五分

五味 五分

杜仲 二錢

續斷 一錢五分

酒蒸去淨核

蛤粉炒珠

鹽水炒

製

蜜酒浸炒

水煎服

慣於小產滑胎者將上分兩一倍作十加魚
鱉二兩兔絲子二兩蜜丸梧子大每服三錢
空心淡薑湯送服一料即愈

獨參湯三八

用好人參二兩
或四兩

水煎徐徐服

千金保胎丸三九

治婦人受孕經三月而胎墮者維氣血不足乃

中衝脈有傷中衝脈即陽明胃經供應胎孕
至此時必須節飲食絕慾戒怒庶免小產之
患服此可以保全

白朮

土炒

熟地

薑汁炒

杜仲

各四兩
薑汁炒

當歸

酒洗

續斷

酒洗

阿膠

炒

香附

米四兩
製

益母草

條芩

各二兩
炒

陳皮

川芎

艾葉

各一兩
醋炙

砂仁 五錢

者為細末枣肉為丸如桐子大每服百丸空

心朱瀉下

平胃散 四十

厚朴 三錢

蒼朮 一錢五分

陳皮 一錢五分

甘草 六分

下死胎加芒消一二錢水煎溫服

黃連 四一

川黃連

右一味煎湯調空房中鼠穴內之服

甘麥大麥湯四二

甘草 三兩
小麥 一升

大麥 十枚

右以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

香椽丸四三

木香
丁香 各半兩

枳殼 麩炒
三椽 酒浸一夕
去殼同炒待

義棧
細剉每一兩用巴豆三十粒去殼同炒待
巴豆黃色去巴豆不用

青皮

川棟子肉

藜香

炒各等分

君為末醋煮麴糊丸如桐子大硃砂為衣每
服三十九丸鹽湯送下或溫酒下無時

禮學十六卷 卷之六 天運 四下 五節

禮學卷之六 天運 四下 五節

新書 卷之六

禮學

禮學卷之六

禮學卷之六 天運 四下 五節

婦科水鑑卷六

生育門目錄

臨產 一

產室 二

穩婆 三

驚生 四

試胎弄月 五

坐草 六

臨盆 七

交骨不開 八

盤腸產 九

橫生 十

倒產 十一

偏產 十二

礙產 十三

難產 十四

催生 十五

斷擠法 十六

二音門彙方目錄

開骨散 一

催生如意散 二

三退散 三

滑胎散 四

保產萬全湯 五

烙臍餅子 六

胡粉散 七

救兒捧母心方 八

一、漢書卷之五

二、漢書卷之六

三、漢書卷之七

四、漢書卷之八

五、漢書卷之九

六、漢書卷之十

七、漢書卷之十一

八、漢書卷之十二

九、漢書卷之十三

十、漢書卷之十四

婦科水鑑卷六

生育門

臨產一

妊娠十月已足腹內如覺動轉疼痛者須舒體仰臥或時時緩步使兒身正靜以待之至其生育之時自然順下倘一慌忙寢必他出

產室二

產室之內四時務要寒溫適中若太熱太寒均不相宜夏月必須清涼勿令炎熱致產母中暑暈迷

倘有其事不妨少與凉水以解之後隨證調理冬
月必須溫暖勿令寒冷以致血凝難產當多備火
爐使產母腰背下身就火烘之其產自易

穩婆三

臨產之家必用穩婆須預擇老成經驗明白之人
無故切莫令其先使手法如試水探漿等事但令
嚼寬心寧耐以待生時如用狡猾之婦前已應張
後復許李草率了事希圖微謝其情莫測嘗有之
矣

驚生 四

產房之內不可多人蓋人多則語聲喧譁產母之心必驚驚則心虛膽怯及至產時多致困乏弱曰驚生有如此者須急急搦出只留老成服役一二入使寂靜而無嘈雜之聲則母心始安安則其胎亦寧靜矣

試胎弄胎 五

妊娠八九個月時或腹中痛肩定依然如常者此名試胎宜養血以安其胎若月數已足腹痛或作

或止腰不痛者此名弄胎二者均非正產之時切勿躁操疑惑惟宜寧靜以待其時

坐草六

凡產婦坐草最要及時不可太早若兒身未順寧可遲遲寬心以待倘坐草太早非正產之時妄使產母用力兒身猶未轉順因力逼迫難存遂至橫生逆產難悔及矣

臨盆七

凡兒之生自有其時時至則兒身轉順頭頂正當

產門胞漿大來腰重腹痛穀道挺逆產母中指中
節或本節跳動者乃為正產之時也方可臨盆用
力一送兒自順生矣

交骨不開八

交骨不開陰氣虛也又有因初次胎產骨縫緊狹
者均宜通其陰氣直達至陰之所惟開骨散為最

良

開骨散 本行一

盤腸產 九

盤腸產者臨產之時其腸先拖出及兒已生腸復
收入有不能收者須以革麻仁搗爛貼於兩心內
服升補之劑如補中益氣湯或八珍十全大補等
湯加升麻以升舉之其腸自收矣

補中益氣湯見月經門四八

八珍湯見月經門二三

十全大補湯見月經門二四

橫產 十

兒身未順用力太早逼其身橫遂先露手或先露

臂不能生下者切莫喧惶宜令產母安然仰臥命
穩婆剪去指甲香油塗手先推其手臂直上漸漸
遍身以中指摩其肩或以指攀其耳務使兒身順
正為妙後用助氣養血之劑一服可催而生矣

倒產 十一

產母用力太早致兒不能迴轉便直下先露其足
者不可驚恐當令產母仰臥命看生之人推其足
入上安然聽候兒自順生矣

偏產 十二

兒身未正用力早逼致兒頭偏在左腿或偏於右
腿故不能生下當令產母仰臥次令穩婆以手正
其頭令兒頭頂端正產母用力一送便即生下至
兒頭後骨偏在教道只露其額當令穩婆以綿衣
夾溫裹手於穀道外方輕輕推兒頭正令產母用
力一送兒即生也

礙產 十三

兒身已順正頂露而不能生下者因兒身轉時臍
帶攀其肩也當令產母仰臥命穩婆款款推兒近

上徐徐引手以中指按兒脊下撥其臍帶仍須候
兒身正順方令產母用力兒即生矣

難產十四

難產之由非只一端或安逸貪睡則氣滯不行或
奉養過甚則胞肥太厚或臨產驚恐則氣怯或用
力太早則困乏或胞傷血出則血壅產路或胞漿
破早則液乾道枯皆致難產之由也臨證之工宜
當詳審

催生十五

胎兒十月滿足產母氣血盛實如瓜熟蒂落果熟
香飄生育自然奚待催也倘產母形氣羸弱或臨
盆坐草太早以致母力困乏者此不容不催也第
催之之法亦各有宜如因力逼致有橫倒或誤破
胞漿產路乾澀者咸以潤滑為主羸弱困乏者惟
助氣血為要也

若見橫生逆產者推正之後宜催生如意散或三
逆散 胞漿破而產路乾澀者滑胎散或佛手
散加冬葵子一合尤妙 形體羸弱氣血虧乏

者惟保產萬全湯為最此產婦常宜之劑誠拯
萬全之功也

催生如意散 本門二

三退散 本門三

備胎散 本門四

佛手散 見月經門

保產萬全湯 本門五

斷臍法 十六

嬰兒初生先用剪刀向火烘熱剪斷臍帶次用火

器繞臍帶烙之當以六寸為度不可過為短長短
則傷藏長則損肌斷訖又用烙臍餅子安於臍上
以防風邪外入隨用胡粉散敷臍帶間用軟絹新
綿封裹之以避尿濕風邪如藥不備即以細熟艾
一塊照依前法封裹如斷臍時胞衣未下斷臍後
急以物墜繫於帶下不但免其風邪乘入且無胞
衣難下之患

烙臍餅子 本門六

胡粉散 本門七

生骨門彙方

開骨散一

當歸 五錢

川芎 二錢

水煎服

常用催生多無產後諸患

催生如意散二

治橫生倒產

人參

乳香 各一錢
去油

辰砂 五錢
水飛

龜板 三錢
醋炙研

婦人髮一團
用生髮過者煨存性

若為末臨產時急用鷄子清一個調藥末再

用薑汁調開冷服即時順生子母無恙

三退散 三 治橫生難產子死腹中

蛇退 一條 禪退 十四个

人退 鷄蛋大一團
即男子頭髮

右俱燒灰為末分三服酒調下

滑胎散 四 催生如抽

蓋元散 一兩 蛇退 一條
燒灰存性

禪退 全者五斤 穿山甲 燒灰存性

男子亂髮

一團香油蒸化

若為細末用蜜水一碗和藥煎二沸入髮灰
拌勻冷定服之立下

保產萬全湯

五

人參三錢

當歸三錢

洗

川芎一錢

枳仁十三粒

不去皮

乾薑

一錢
此魚黃色

甘草

六分

牛膝

二錢

紅花

三錢
酒炒

肉桂

八分
刮去粗皮

加膠棗一枚水煎食前溫服如產婦壯實及
無力服人參者去參用之其效尚倍於佛手
散多矣

烙臍餅子六

豆豉

黃蠟等分

麝香少許

若以豆豉麝香研勻鎔蠟量臍大小捻為餅

茶用

胡粉散七

胡粉

離帶灰

乾薑

白石脂

棉灰 各等分

麝香 少許

右共為細末 每用一錢 敷臍上 封之

救兒捧母心方

臨產時久不見兒下 產婦暈絕 將死者 羞心中
有熱氣 必是兒捧住母心 致令產婦暈憤暴死
急以引入心經之藥 分解兒手 方得下也 蓋兒
手捉一物 最緊 藥力一到 兒手自軟 解脫也

出

功

醫學心鏡錄

卷之十一 經良平自神精

乳香

五錢

油

麝香

十

分

子

不

出

官桂

一錢

粗

皮

林

封

心

合

氣

散

石

為

細

末

作

一

服

法

橫

拍

婦與對女云云

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...