

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

581.943

H15e

1974
1974

NATURAL

HISTORY





ENUMERATIO
PLANTARUM

HORTI REGII ET AGRI GOTTINGENSIS
AUCTA ET EMENDATA

AB
Albrecht von
ALBERTO DE HALLER


HORTI PRAEFECTUS.

CVRARVM DULCE LENTIMEN



GOTTINGAE

APUD VIDUAM ABRAMI VANDENHOECKII
MDCCLIII.



VIRO ILLUSTRISSIMO

581.943

H 15e

FRIDERICO CAROLO

L.B. AB HARDENBERG

REGI. MAGNAE. BRIT. ET ELECT. BR. LUN

A. CONSILII. INTIMIS

AEDIUM. HORTORUMQUE. REGIORUM

PRAEFECTO. SUMMO


SOC. REG. SCIENT. GOTTING. SODALI

HONORARIO

BONARUM. ARTIUM. PATRONO

S U O Q U E.

Jan. 27 Dec. 42 Kortenay





Non unice, quia antiquissima nobilitas TE
super plerosque evexit, VIR ILLU-
STRISSIME, has TIBI pagellas dedico, ne-
que ideo, quod nihil eorum ignoras, quae uti-
liter a veteribus relictā, aut a recentioribus in-
geniose inventa sunt, neque solum ad splen-
dorem respexi, qui nostrae societati a TAN-
TO SODALI accessit. Etsi omnia in TE con-
juncta reperiuntur, quae etiam singula magnos
viros faciunt, propiora tamen jura TUA in
hunc libellum sunt. Hortos enim agrosque
& universas ruris delicias ita coluisti, ut sole-
bant ii antiqui viri, qui magnis legionibus
cum imperitarent, cultum tamen agri ita non

habuerunt inter dedecora, ut inter laudes suas
numerarent. Horti adeo, qui plurima ornamen-
ta TIBI debet, catalogum TIBI inscripsi, PA-
TRONORUM OPTIME, venerationis meae
& gratitudinis documentum ; & testimonio
futurum, tanta gratia innocentissimas lite-
ras apud TE valuisse, ut me etiam, solo
earum amore commendabilem, in TUO grege
numerasse volueris. Ita porro perge praecesse
musis nostris, easque non favore solum & li-
beralitate, sed exemplo inprimis, ut soles, &
docentes docendo adjuva. Gottingae d. VI.
Dec. MDCCLII.

PRAE-

P R A E F A T I O.

Duodecimum annum agimus, ex quo *hortus no-*
ster Academicus primum conditus est. Desi-
derant studiosi *catalogum*, quo memoria discéntium
adjuvetur, dum ipsas plantas praesentes démon-
stramus. Obsequi voluntati sodalium visum est,
etiamsi labor iste me ab alio opere revocat, quod
invitus dimitto, *Physiologia* mea majori. Dèbeimus
autem plurimum discipulis, quoruin gratia Profes-
sores sumus. Avulsi adeo de otio meo tres menses,
quos huic catalogo conscribendo dedi. Utinam
plus otii mihi aliorum officiorum imperiosa néces-
sitas concessisset! Designaveram animo *Floram Ger-*
manicam, omnium nempe stirpium ennumeratio-
nem, quae in *Germania* certa fide sponta-
neae leæae fuissent. Multa jam eum in finem
ex optimis fontibus excerpseram, aliqua varii ami-
ci mecum communicaverant, aliqua ex propriis
itineribus, stirpium causa suscep̄tis addideram. Ve-
rum huic meae voluntati obstitit temporis angustia,
quod inter varios labores ita dividere cogor, ne
eorum aliquis penitus intercidat. Itaque stringere
vela, & in angustiores carceres cursum reducere
eoactus sum.

Habes ergo, Amice Lector, hic *Enumerationem stirpium*, quae in horto nostro aut nunc vivunt, aut aliquando floruerunt. Has, si quando perierunt, *litera r* signavi, neque enim divitias hic ostentare animus est, cum praecipitus mihi finis sit, amicis ostendere, quam valde multa nobis desint. Multa enim hortulanorum incuria & perfidia destruxit, & ego, dum mille curis distrahor, hieme in primis, non potui ea fide piar-
tas custodire, quam adgnosco a me requiri. Fru-
tices in primis, & quae plantae ex semine prodire recusant, parciores nobis sunt, & ea parte hortus pauper est.

Deinde adjeci plantis *hortensis* eas, quae in agro Gottingensi atque in Hercynia sylva proveniunt, & a me ipso lectae sunt in itineribus, quae annis 1738, 1739, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, & 1747 varias in partes hujus regionis suscep-
pi. Neque potui mihi temperare, quin adderem praecipuas stirpes, quas ipse in his per Germaniam discursionibus reperi, nullam tamen, quam ipse non decerpisseim. Hortenses *litera H.* distinxii, Germanicas absque nota reliqui.

Descriptiones aliquas *floris* in primis & *fructus* adjeci, maxime quando fusius genus, vel novitas plantae, vel aliorum botanicorum diversa descrip-
tio id petere videbatur. Contentus dixisse, quae vera mihi visa sunt, refutavi neminem.

Methodum meam secutus sum, eaque utcunque passim emendavi. Proportio certe numero longe constantior est, & plures classes suppeditat, quam situs. Neque tamen proportioni adeo faveo, quin potius omnem rei herbariae perfectionem in naturalium classium numero ponam. Nullum certe signum alicujus momenti mihi videtur, quoties classem turbat, neque aliter sentiunt alii Botanici, quotquot ex ipsa natura edocti sunt.

*Nomina LINNAEANA plerumque recepi, aliquando non potui, aut quod alia generum mihi nomina forent, aut quod ea nomina, sincerus addo, non viderentur mihi satis clara, aut satis efficacia esse. Non ignoro, plerosque Botanicos Celeberrimi Viri recepisse, neque sectam aveo condere, quam LINNAEO opponam. Verum, quod unicus mihi finis fuit, secutus, discriminum notas certas, breves, inilique perspectas pro nominibus adhibere conatus sum. Ita folia & petala divisioni umbellae in *Euphorbiis* praetuli, siliquam stipulis & calyci in *Papilionaceis*, & in omnibus classibus ab ea parte nomina sumsi, quae mihi videretur profundius essentiam characteris ingredi. In generibus TOURNEFORTIANA, quantum potui, retinui, quae mihi saepe videntur in deteriora mutata esse. Malo certe *Moschatellinam*, quae notam propriam retinet, quam *Aadoxam*, *Lapathum* perinde antiquum, quam *Rumicem*, veterum *Polygonatum*, quam novam *Convallariam*, & alia id genus.*

X

P R A E F A T I O.

Denique in generibus constituendis timidus fui, neque valde curavi, ut ubique nomina scientifica adjicerem. Nam genera quidem arbitraria fere sunt, eorumque limites unice ab hominibus ponuntur. Species curavi, ut definirem; nomina neque ob otii defectum ubique emendare potui, neque id studium fere exitum invenit, nisi accurate species unius generis omnes teneas.

Synonyma pauca dedi, *icones* nullas, *locos natales* non satis plenos, hoc quidem invitus, sed exclusus spatio & otio.

Rejeci denique *Muscos*, *Fungosque*, non quod nulli mihi essent, sed quod plerique studiosi nolint his minutis innorari, & quod nihil habereim, quod priori meae *Enumerationi*, in *Helveticarum Stirpium historia propositae*, aut *Ruppio* subjectae, valde noviter addeiem.

Tabulam generum secundum classes dispositorum pro tironibus adjeci, a Cl. E V E R S, diligente auditore, paratam. Gottingae d. VI. Dec. MDCCLII.

ORDO

ORDO CLASSIUM ET GENERUM PLANTARUM.

A. APETALAE.

CLASSIS I. Plantae flore, staminibus & petalis conspicuis destitutae; semine solo donatae,

Conferua, *Byssus*, *Coralloides*, *Peziza*,
Boletus, *Fungus*, *Agaricus* &c. *Enum. Helv.*
p. 1. seqq.

CLASSIS II. Plantae staminibus conspicuis destitutae; flore aliquo & semine donatae,

1. staminibus omnino nullis, sed florum & seminum analogis corpusculis praeditae,

Linkia, *Lichen* &c. *Enum. Helv.* p. 62. seqq.

2. staminum & seminum analogis corpusculis praeditae,

a. foliis a caule diversis. MUSCI
Enum. Helv. p. 92. seqq.

Lycopodium, *Hypnum*, *Polytrichum*,
Bryum &c.

b. foliis a caule non diversis. MUSCIS
ADFINES *Enum. Helv.* p. 120. seq.

Jungermannia, *Muscoides*, *Marsilea*, *Anthoceros* &c.

XII ORDO CLASSIUM

g. Seminiferae, floribus & epicibus conspi-
cuis destitutae. DORSIFERAЕ, s. EPI-
PHYLLOSPERMAЕ,

Ophioglossum I. p. 1.

Osmunda III.

Struthiopteris II. 1, 2.

Filix I.

g. *Acrostichum* I.

Asplenium III. 2, 3.

Polyodium X. 3, 4.

Equisetum V.

CLASSIS III. Plantae petalis nullis, vel obscu-
rissimis; semine, flore et veris stamin-
ibus donatae,

i. staminibus a fructu remotis,

a. coalitis. CONIFERAЕ,

Salicornia I. 5.

Ephedra I. 6.

Taxus I.

Iuniperus III.

g. *Abies* III.

Pinus III. 6, 7.

Cupressus I.

Thuya II.

b. non coalitis. IULIFERAЕ.

Saururus I. 7.

Salix

ET GENERUM PLANTARUM. XIII

Salix IX. 8, 9.

Populus III.

Alnus I. 10.

5. *Betula* II.

Carpinus I.

Quercus I.

Corylus I.

Fagus I.

10. *Castanea* I.

Xanthium II. 11.

Ambrosia II.

Hysterophorus I.

2. quarum ratio aequalis & staminum & segmentorum floris est. ISOSTEMONES,

Gnaphalodes I. 12.

Empetrum I.

Lentiscus I.

Liquidambar I.

5. *Fraxinus* I.

Myrica II.

Viscum I.

Buxus I. 13.

Rhamnus II.

10. *Frangula* (*Alaternus.*) III.

Morus II. 14.

Ficus

Ficus II.

Menispermum I.

15. *Celtis* I.

Bosca I.

Ulmus I.

Lupulus I.

Cannabis I.

20. *Ceratonia* I. 15.

Laurus II.

Rheum II.

Lapathum XIII. 16-18.

Atriplex VI. 18, 19.

25. *Chenopodium* XIV. 20, 21.

Lerchia II. 21, 22.

Salicornia I.

Beta II.

Spinacia III.

30. *Amaranthus* VIII. 23, 24.

Celosia II. 24, 25.

Chenopodiumorsus II.

Triclis II. 25, 26.

Axyris I.

35. *Corispermum* I.

Ceratospermum I. 27.

Parietaria II.

Urtica

Urtica VI.*Eistorta* II. 28.40. *Fersicaria* VII. 28, 29.*Fagopyrum* III.*Polygonum* II. 30.*Herniaria* II. 30, 31.*Illecebrum* I.45. *Thesum* I.

3. quibus pauciora stamina, quam segmenta floris. MEIOSTEMONES,

Alchimilla II.

4. quibus dupla ratio staminum, quam segmentorum floris est. DIPLOSTEMONES,

Knawel II. 32.*Chrysosplenium* I.

5. quibus tripla, quadrupla &c. ratio staminum, quam segmentorum floris. POLY-STEMONES,

Euphorbium II.*Tithymalus* XIX. 33-36.*Clutia* I.*Phyllica* I.5. *Chamelaes* I.*Iatropha* I.*Ricinus* II. 37.*Acalypha* I.*Mercurialis* III.

10. The-

10. *Thelygonum* I. 38.

Asarum I.

6. quarum flores successiva degeneratione a simplicitate iam perfectiores fiunt.

AQUATICAE VARIAE,

Chara I.

Limnophyllum I.

Zanicheilia I.

Stellaria III. 39.

5. *Potamogeton* IX. 39, 40:

Pentapteris II.

Ceratophyllum I. 41.

7. tribus staminibus, flore pleruinque bifolio.

TRISTEMONES s. GRAMINA,

a. folliculo biglumi,

α calyce nullo,

1. locusta monantha, *Nardus* I.

2. - - - triflora, aristis sub folliculo positis, *Hordeum* IV. 41, 42.

β calyce uniglumi,

1. locusta monantha,

a. arista ex basi glumae, *Alopecurus* II.

b. - - - dorso glumae prodeunte, *Ischaemum* I.

2. locusta polyantha, *Lolium* III. 42, 43.

γ calyce biglumi,

I. mu-

i. mutico, l. non aristato,

a folliculo aristam emittente ex spīce glumae, *Triticum* XI. 43, 44.

b folliculo mutico, *Poa* XIX. 44, 46.

c folliculo obeso, *Milium* IV.

d locusta papposissima, *Arundo* V.

e folliculo aristato,

α arista flexa, l. articulata, l. geniculata ex dorso, *Avena* X. 47, 48.

β arista recta, aut minus evidenter geniculata, infra apicem prodeunte, *Bromus* VI. 48, 49.

f folliculis fertilibus aristatis, sterilibus muticis, *Gramen aureum* I.

g arista altera folliculi longissima, *Festuca* II.

aristato,

a folliculo aristato, framinibus tenuum duobus, *Anthoxanthon* III. 50.

b calyce bicorni, *Typhoides (Phleum)* IV.

ð calyce duplice, *Cynosurus* II. 51.

b. folliculo triglochi, *Panicum* V.

c. aliæ adhuc, *Poularis* II.

Mays II. 52.

*Lacruma Jobi (Coix) II.**Aegilops I.*

g. semine vel unico, unica gluma protecto,
vel unico cum calyce triglumi, vel demum
uno pluribusve cum flore apetalo, hexa-
phyllo. GRAMINIBUS ADFINES,
a staminibus tribus. TRISTEMONES,

ꝝ una gluma, semine unico, folliculo
involuto & tuba bicorni. UNIGLU-
MES,

*Carex (Cyperoides) XXVI. 53-55.**Cyperus I.**Scirpus VI. 55, 56.**Linagrostis II.*

ꝝ calyce floris sexfido. SEXGLUMES,

ꝝ *Schoenus II. 57.*

Mariscus I.

b staminibus sex, calyce hexaphyllo. HE-
XASTEMONES SEXGLUMES,

*Juncus X. 58, 59.**Triglochin II.**Acorus I.*

c staminibus tribus, calyce triphylllo.
TRISTEMONES TRIGLUMES,

*Sparganium I.**Typha I.*

B. PETALODEAE.

CLASSIS IV. Plantae semine, flore, staminibus
& petalis donatae,

I. quae uno foliolo, eodemque cavo e terra
propullulant. MONOCOTYLEDONES,

1. spatham referentes. SPATHACEAE,

Arum (Colocasia) IV. 60.

Palma I.

Musa I.

2. tuba destitutae. ORCHIDEAE,

Orchis XV. 61. 64.

Helleborine V. 64, 65.

Calceolus I.

Ophrys II.

3. tuba praeditae, fructu triloculari. LI-

LIACEAE,

a fructu sub flore posito,

ꝝ flore tristemone,

Cannacorus II. 66.

Gladiolus I.

Commelina III.

Iris VI. 67, 68.

5. *Bermudiana* II.

Crocus I.

β flore hexastemone,

Colchicum I.

Leucojum I. 69.

Narcissus III.

10 *Amaryllis (Lilionarcissus)* IV.

Aloe XXIX. 69 - 76.

\flat fructu infra florem posito, s. floribus
fructui circumpositis,

α flore monopetalo,

Hyacinthus IV.

Polyanthes II.

Polygonatum IV. 77.

15 *Unifolium* I.

β flore hexapetalo,

i. solitariis nudis floribus,

Asparagus II.

Ruscus III. 77, 78.

Smilax II. 78, 79.

Dens Canis I.

Lilium III.

20 *Fritillaria (Corona Imperialis)* III.

79, 80.

Tulipa I.

Yucca I.

He.

ET GENERUM PLANTARUM. XXI

Hemerocallis (Lilium) Asphodelus II.

Asphodelus II.

25 *Phalangium* VI. 80, 81.

Ornithogalum III. 81, 82.

2. *conglomeratis*, l. *aggregatis* foliis,
vagina communi exceptis,

Allium XXI. 82 - 86.

Ananas I.

Haemanthus II.

3: flore tripetalo.

30 *Ephemerum* I.

II. quae, dum e terra proveniunt, duobus foliis
lis conspiciuntur. Dicotyledo-
NES,

A. quarum triple; sextupla; duodecupla &c. ra-
tio staminum, quam eut petalorum est.
POLYSTEMONES,

aa staminibus & petalis liberis

ꝝ conceptaculis seminis tribus pluribusve.

MULTISILIQUAE, (plurimque),

* *Veratrum* L. 87.

Buxomus I.

Damasonium L.

Sagittaria I.

5 *Hydrocharis* I.

Nym

ORDO CLASSIUM.

Nymphaea II.*Papaver* VI. 88.*Argemone* II. 89.*Glaucium* II.10 *Chelidonium* I.*Christophorianum* I.*Filipendula* III. 90.*Thalictrum* IV. 90, 91.*Spiraea* I.15 *Aquilegia* I.*Paeonia* I.*Fraxinella* II.*Aconitum* IV. 92.*Delphinium* VII. 92-94.20 *Luteola* I.*Reseda* III. 94, 95.*Parnassia* I.* *Nigella* V. 95, 96.* *Garidella* I.25 *Helleborus* V. 96, 97.*Populago* I.

β seminibus numerosis, nudis; siliculis
 monospermis, nunquam hiscentibus,
 sed

ET GENERUM PLANTARUM. XXIII
sed integre decidentibus. GYMNOPOLY-
SPERMAE ,

1. petalis ex ambitu placentae l. circa ova-
rium ortis ;

Tulipifera I. 98.

Adonis III.

Myosurus I.

Trinitas I. 99.

5 *Ficaria* I.

Ranunculus XV. 99 - 102.

Anemone VII. 103 , 104.

Clematis III.

2. petalis ex calyce ortis. CALYCIFLO-
RAE.

Caryophyllata IV. 104 , 105.

10 *Comarum* I.

Potentilla XV. 105 - 108.

Fragaria I.

Rubus III. 109.

γ semintim conceptaculis pulpo tectis PO-
MIFERAЕ (*Icosandriae LINN.*)

1. parte calycis monophylla; cava , cum
ovario inseparabiliter connexa , ut
grandescens fructus expansa calycis seg-
menta ex apice praef'erat. UMBI-
LICATAE ,

Ro-

Rosa IV. 109, 110.

Myrtus II.

Sorbus (Crataegus, Mespilus) V. 110,

Pirus III.

(III.

5 *Malus* I.

Cydonia (Cotonia) I. 112.

2. calyce a fructu cavitate intermedia separato, quae frequenter pigmento balsamico plena esse solet. NON UMBILICATAE,

Punica I.

Guajava I.

Prunus II.

Cerasus II.

5 *Padus* II.

Persica I. 113.

Capparis I.

Citrus (Limon, Aurantium) III.

fructus loculis multis MULTILOCULA.
RES,

Tilia I.

Tetragonocarpos (Syringa) II. 113, 114.

Cistus (Helianthemum) VI. 114, 115.

Hypericum VIII. 115, 116.

§ *Harmala* I. 117.

Corchorus I.

bb, petalis & staminibus coalitis. COLUMNI-
FERAE, I. MALVACEAE,

Hibiscus VI. 117-119.

Althea IV.

Malva (Lavatera) XV. 120-122.

Abutilon (Malvinda) X. 122, 123.

§ *Napea* I. 124.

Hermannia I.

Gossypium I.

cc, foliis & caulis succi plenis. SUCCULEN-
TAE,

Portulaca I. 125.

Cactus (Cereus Peircicia) XI. 125.
126.

Ficoidea II.

§ *Mesembryanthemum* XXVII. 127-131.

Crassula IV. 132.

E quarum dupla ratio staminum, quam folio-
rum calycis & petalorum, duobus plerum-
que staminum ordinibus, quorum unus al-
tero longior est. DIPLOSTEMONES,

Cotyledon V. 133.

Sedum XIV. 133-135.

Saxifragia VII. 135 - 137.

Geranium XXXVI. 137 - 145.

5 *Oxys* IV.

Fabago I.

Fagonia I. 146.

Tribulus I.

* *Linum* VII. 146, 147.

* 10 *Rorella* II.

Cucubalus I.

Viseago (*Silene*) XXI. 147 - 152.

Lychnis V. 153.

Saponaria (*Spergula*) VI. 154, 155.

15 *Tunica* (*Caryophyllus*) X. 155, 156.

Myosotis VI. 156, 157.

Alsine XIV. 157 - 159.

Corrigiola I.

Elatine I. 160.

20 *Salicaria* II.

Peplis I.

Agrimonia II. 161.

Melia I.

Epilobium V. 161, 162.

25 *Onagra* III.

Ruta I.

Hypopitys I. 163.*Moschatellina.**Paris* I.30 *Oxycoccum* I.*Vaccinium* III.*Arbutus* II. 164.*Erica* I.*Tetralix* I.35 *Andromeda* I.*Pirola* IV. 165, 166.*Thymelaea* II.*Aristolochia* II.*Cardamindum* III. 167.40 *Cardiospermum* I.*Hippocastanum* I.*Acer* III. 167, 168.

C quarum ratiosegmentorum calycis petalorumque
 & staminum aequalis est. ISOSTE
 MONES,

X POLYPETALAE REGULARES VARIAE

Evonymus I. 169.*Celastrus* (*Alaternoides*) II.*Staphylodendron* I.*Tamariscus* I.

5 *Cotinus* I.

Rhus II. 169, 170.

Hedera I.

Vitis II.

Ribes IV. 170, 171.

10 *Berberis* I.

Telephium I.

Tribulus aquaticus I.

X seminibus binis nudis, flore coronatis. GYM-NODISPERMAE.

αα petalis quinque. UMBELLIFERAE,

1. obscuriori umbella. PAUCIFLORAE,

Phyllis I.

Hydrocotyle I.

2. manifesta umbella;

aa absque communi placenta seminum;

Δ seminibus striatis,

I gibbis,

a involucro nullo,

α petalis aequalibus,

Foeniculum I. 172.

Apium III.

β petalis inaequalibus,

Smyrnium I.*Podagraria* I.**5** *Carum* I.*Seseli* I.*Tragoselinum (Pimpinella)* III. 173.**b** involucro utroque aut alterutro praeditae,**a** petalis inaequalibus,*Anisum* I.*Ammioselinum (Ammi)* II.**10** *Oenanthe* IV. 173, 174.*Phellandrium* I.*Coriandrum* II.*Cynapium* I.*Cicuta* I. 175.**B** petalis aequalibus,**15** *Ligusticum* II.*Sison* I.*Sium* V. 175, 176,*Meum* I.*Bupleurum* III.*Crithmum*, I.**II** gibbis, & alatis**a** alis in uno semine quaternis & ultra,20 *Astran-*

20. *Astrantia* I. 177.

Lasserpitium III.

b alis duabus lateralibus,

Peucedanum II. 178.

Selinum (Oreoselinum) V. 178, 179.

25 *Angelica* III.

Imperatoria I.

III planis, in margine alatis,

Ferula I.

Anethium II. 180.

Pastinaca I.

30 *Sphondylium* II.

Tordylium II.

IV asperis, l. aculeatis,

Caucalis IX. 181, 182.

Sanicula I. 183.

Δ seminibus

1. hirsutis non rostratis,

Daucus III.

35 *Libanotis* II.

2. rostratis,

Chaerophyllum II. 183, 184.

Myrrhis V. 184, 185.

Scandix I.

ET GENERUM PLANTARUM. XXXI

hb. seminibus ad placentam communem
conjunctis, sive placenta communi praeditae,

Eryngium III,

$\beta\beta$ petalis duobus. DIPETALAE,

Circaea II.

$\gamma\gamma$ unico petalo. MONOPETALAE,

i quadrifido, caule quadrangulo, foliorum
verticillis quaternorum & ultra. STEL-
LATAE.

Asperula VII. 186, 187.

Galium XVII. 187 - 189.

Rubia I. 190.

Anthospermum I.

2. BACCIFERAЕ,

Cornus II.

Opulus I;

Viburnum I. 191.

Tinus I.

5 *Sambucus* III.

Caprifolium VI. 191, 192.

X. flore fructui sicco innato,

Campanula XII. 193 - 195.

Rapunculus II.

Jasione I. 196.

Eri-

ORDO CLASSIUM.

Erinus (Campanula) II.

§ *Rapuntium I.*

Trachelium I.

Samolus I.

Pimpinella V.

X. flore monopetalo uniformi circa fructum
unicum vasculosum posito,

α quadrifido,

Aquifolium I. 198.

Cuscuta I.

Bajella I.

Psyllium (Plantago) XI. 198, 199.

β quinquefido (plerumque),

§ *Gentiana Vlll. 199-201.*

Lysimachia V. 201, 202.

Anagallis II. vel III.

Primula IV. 202, 203.

Alsinanthemum I.

¶ *Androsace II.*

Glaux I.

Hottonia I.

Menoanthes I. 204.

Plumbago I.

ET GENERUM PLANTARUM. XXXIII

15 *Quamoclit* II.

Convolvulus IX. 204-206.

Stramonium V. 206, 207.

Polemonium I.

Maurocena I.

20 *Coffea* I.

Lycium (Iasminoides) II.

X floribus ex calyce ortis, rotatis aut campanulatis, androgynis : maribus majoribus, tribus staminibus, quinque crassos & succulentos apices sustinentibus ; femininis minoribus, fructui carnosio, polyspermo insidentibus, tuba trifido apice. CU.
CURBITACEAE,

Bryonia IV. 208.

Sicyoides I.

Melo II.

Cucurbita I. 209.

5 *Cucumis* I.

Luffa II.

Colocynthis I.

Momordica II.

Elaterium I.

10 *Passiflora (Granadilla)* V. 210, 211.

X foliis alternis, flore monopetalo vel uniformi, vel leviter inaequali, fructu aut biloculari

eoque

XXXIV ORDO CLASSIUM

eoque vel sicco, vel succulento, aut multiloculari succulento, tuba unica. SOLANACEAE,

Ialappa I.

Phytolacca II. 211, 212.

Belladonna I.

Solanum (Lycopersicon) XIII. 212-214

5 *Alkekengi* V. 214, 215.

Capicum VIII. 215, 216.

Verbascum VII. 216, 217.

Hyoscyamus IV. 217, 218.

Nicotiana VI. 218, 219.

X. foliis alternis, pene perpetuo asperis, flore monopetalo, semiquinquefido, staminibus quinque, tuba unica, simplici. ASPERIFOLIAE,

Echium II.

Cerinthe II. 220.

Sympytum I.

Pulmonaria I.

5 *Lithospermum* III. 221.

Scorpiurus II.

Heliotropium III. 222.

Cynoglossum IV. 222, 223.

Omphalodes II.

10 *Asperugo* I.

Ly-

ET GENERUM PLANTARUM. XXXV

Lycopsis III. 224.

Buglossum (Borago) V. 224, 225.

Tournefortia I.

X. binos oblongos & acutos fructus post quem
vis florem ferentes. DICARPAE,

Periploca I.

Apocynum VI. 226, 227.

Stapelia II. 227, 228.

Asclepias III. 228, 229..

§ *Nerium* II.

Pervincia II.

X floribus difformibus,

Melianthus II.

Hypecoum I,

Viola VIII, 230, 231.

Impatiens II.

D. quibus pauciora stamina quam segmenta
floris. MEIOSTEMONES,

Ligustrum I. 233.

Olea I.

Syringa II.

Nyctanthes I.

§ *Lasminum (Gelsemium)* IV. 233, 234.

Veronica XIX. 234-237.

Capraria I.

XXXVI ORDO CLASSIUM

E. quarum ratio staminum major, quam segmentorum floris & petalorum; siliqua bivalvi, seminibus ad valvarum conjunctionem propriis petiolis affixis & in cavitates valvarum receptis. MEIZOSTEMONES,

aa. staminibus ad petala sesquialteris, calyce quadrifolio, petalis quatuor fere perpetuo aequalibus, ex ungue longo plerumque bracteam reflectentibus, tuba ex apice simplici. NASTURCI-NAE, TETRAPETALAE SILIQUOSAE I. CRUCIATAE, (*Tetradynamiae LINN.*),

α siliqua breviori. SILICULOSAE,
1. uniloculari. MONOSPERMAE,

Crambe I. 238.

Rapistrum I.

Isatis III.

Vella I.

5 *Anastatica* I.

Erucago I. 239.

Myagrum III.

2. biloculari,

a. septo valvis parallelo,

Clypeola I.

Alysson V. 240, 241.

ET GENERUM PLANTARUM. XXXVII

10 *Draba* I.

Lunaria III.

b. septo ad valvas normali

Thlaspidium II. 241, 242.

Coronopus I.

Cochlearia III.

15 *Iberis* VI. 243, 244.

Nasturtium IX. 244, 245.

Lepidium II. 245, 246.

β siliqua longiori,

Sisymbrium (*Erysimum*) XIV. 246-249

Sinapi (*Eruca*) VIII. 249. 250.

20 *Raphanus* III. 251.

Dentaria I.

Brassica VI. 251, 252.

Rapum II.

Cardamine V. 252, 253.

25 *Turritis* (*Brassica*) IV.

Arabis III. 254.

Cheiranthus III. 255.

Hesperis (*Leucojum*) VIII. 255-257.

Sinapisirum (*Cleome*) III. 257, 258.

30 *Petiveria* I.

bb. staminibus ad petala duplis sesquitertiis,
PAPILIONACEAE, (*Leguminosae* B.
Diadelphiae L.),

XXXVIII ORDO CLASSIUM

α siliqua biloculari, septo medio divisa,

Astragalus XIV. 259, 260.

β siliqua uniloculari,

Pelecinus I.

Apios I. 261.

Psoralea I.

γ *Vulneraria* V.

Dorycnium I. 262.

Lotus XI. 262-264.

Ornithopodium IV.

Ferrum equinum II. 265.

γ *Scorpioides* V.

Deschynomene I.

Hedysarum IV. 266.

Onobrychis II. 266. 267.

Glycyrrhiza I.

γ *Sophora* I.

Corallodendron I.

Galega I. 268.

Coronilla VI. 268, 269.

Colutea III.

γ *Securidaca* I.

Pseudoacacia I.

Lupinus V. 270.

Phaseolus V. 270, 271.

ET GENERUM PLANTARUM. XXXIX

Dolichos IV. 272, 273.

25 *Foenum graecum* V. 274.

Medicago (*Medica*) XXV. 275-279:

Melilotus VIII. 280, 281.

Trifolium XVI. 281-284.

Anonis IV.

30 *Crotalaria* I. 285.

Cytisus I.

Aspalathus III.

Genista VIII. 285-287.

Arachidnoides I.

35 *Pisum* II. 287, 288.

Lathyrus (*Clymenum*) XVII. 288-291

Vicia XXIV. 291-296.

Lens II. 297.

Faba I.

40 *Cicer* I.

Eruvum I.

Orobus III. 297, 298.

cc. PAPILIONACEIS ADFINES,

Siliquastrum I.

Cassia V. 298, 299.

Mimosa V. 299, 300.

Parkinsonia I.

5 *Amorpha* I.

F. quae successiva degeneratione a Papilionaceis
ad Didynamias accedunt. MEDIAE PA-
PILIONACEAS INTER ET DIDYNA-
MIAS,

Fumaria (Capnoides) IX. 301 - 303.

Polygala II.

G. quarum ratio staminum duplo major, quam
segmentorum floris & petalorum; flore mo-
nopetalo, tubulofo, staminibus quatuor in-
aequalibus. DYMELONES (*Didynamiae L.*),
a seminibus tectis. ANGIOSPERMAE,

α fructu seu capsula uniloculari,

Montia I.

Browallia I.

Ruellia II.

Limosella I. 305.

5 *Squamaria* I.

Orobanche I.

Lentibularia I.

β capsula biloculari,

Antirrhinum (Linaria) XVI. 305-308

Acanthus II. 309.

10 *Adhatoda* I.

Digitalis III.

Gratiola I. 310.

Scrophularia VIII. 310, 311.

Pedi-

Pedicularis II. 312.

5 *Alectrolophus* II.

Melampyrum V. 312, 313.

Odontites II.

Euphrasia I.

Vitex I. 314.

20 *Lantana* I.

b seminibus quatuor nudis. VERTICILLATAE

f. GYMNOTETRASPERMAE,

α flore galea destituto, f. labio superiori
nullo, hujus vero loco stamina ex flore
erumpunt, in arcum flexa,

Chamaedrys (Marium) VIII. 314-316

Bugula IV.

β flore galea praedito,

1 trifida,

Ocimum I. 317.

Cassida VII. 317-319.

2 simplici, integra, l. tantum fissa
segmentis non divergentibus,

5 *Salvia (Horminum, Sclareo)* XVII.

Rosmarinus I. (319-323)

Monarda II. 324.

Ziziphora II.

Brunella III. 325.

10 *Leonurus* II.

Cardiaca V. 325, 326.

Lamium III.

Stachys (*Pseudostachys*) VIII. 327, 328

Phlomis III. 328, 329.

15 *Galeopsis* III. 329, 330.

Betonica IV. 330, 331.

3. *bifida*,

a. manifeste, segmentis discedentibus,

Moldavica VII. 331-333.

Dracocephalon III. 334.

Cunila IV. 334, 335.

20 *Ballote* I.

Marrubium V. 335, 336.

Cataria VII. 337, 338.

Prasium I.

Melissa (*Calamintha*) VI. 338,

25 *Chamaeclema* II. 340. (339.

Hyssopus I.

Satureja I.

Clinopodium IV. 340, 341.

Thymus III.

30 *Lavendula* V. 342.

Origanum II. 342, 343.

Majorana I.

Dictamnus I.

b. obscu-

ET GENERUM PLANTARUM. XLIII

b. obscurius bilabiata,

Mentha VII. 343, 344.

35 *Pulegium* I. 345.

Lycopus I.

Amethystina I.

Verbena VII. 345 - 347.

H. floribus semini unico innatis, adgregatis, deciduis, monopetalis quinquefidis, raro quadrifidis, tuba unica, flore longiori. GYM.
NOMONOSPERMAE,

a staminibus liberis, foliis semper conjugatis.
DIPSACEAE,

α placenta & calyce communi destitutae,
Gomphrena I. 348.

Limonium (Statice) V. 348, 349.

Valeriana VI. 349, 350.

Valerianella VI. 350, 351.

β placenta & calyce communi praeditae,

5 *Boerhaavia* I. 352.

Cuminoides I.

Asteroccephalus (Scabiosa) V. 352, 353.

Scabiosa I.

Knautia I. 354.

10 *Succisa* III.

Dipsacus IV. 355.

b staminibus quinque coalescentibus, placentae
praeditae,

αα flosculis omnibus fistulosis,



Δ tubo flosculorum longissimo, campanula
pariter longa, uno plerumque
dente profundius a reliquis separato;
squamis calycis multis ordinibus,
diametro capituli perpendiculari
plerumque longiori quam horizon-
tali. CAPITATAE,

a calyce communi nullo,

Echinopus III. 356.

b calyce communi praeditae,

α flosculis omnibus androgynis,

i squamis calycis simplicibus,

a placenta alveolata, absque pilis,

Onopordon (Carduus) IV. 356, 357

b placenta pilosa,

Cinara III.

Lappa II. 357, 358.

5 *Carduus* VIII. 358, 359.

Cirsium XIV. 359-362.

α squamis calycis ramosis, l. semipin-
natis, placenta pilosa,

Silybum I.

Atractylis II. 362, 363.

Carthamus I.

10 *Cnicus* I.

Carlina II.

β flosculis in ambitu sterilibus, semine a.
bortivo, staminibus & tuba destitutis,

i foua-

ET GENERUM PLANTARUM. XLV

1 squamis calycis simplicibus,

(*Rhaponticum* Vill. 363-365.

2 iisdein ramosis; aut pinnatis,

(*Calcicrapa* Vi. 365-367.

Cyanus XII. 367-370.

E. flocculis ut in Capitatis multis & in unum &
multifidum calycem sese colligentibus,
sed brevioribus; hinc capite latiori, pla-
niori & minus ventricoso, aut globoso.
CORYMBIFERAЕ, f. DISCOIDEAE,

a semine nudo,

Tanacetum IV. 370, 371.

Absinthium (*Artemisia*) III. 371, 372.

Artemisia (*Absinthium*, *Abrotanum*)
VIII. 372, 373.

Cotula II. 374.

5 *Santolina* VII. 374, 375.

b semine pappo coronato, placenta nuda,

• 5 *Filago* (*Elichrysum*, *Gnaphalium*) XV.

Erigeron VI. 379, 380. (37-6378

Chrysocome I.

Eupatorium II. 380, 381.

5 *Cacalia* I.

Kleinia (*Cacalianthemum*, *Conyzza*)

V. 381, 382.

Petasites III.

c semi-

XLVI ORDO CLASSIUM

c semine aristis coronato,

Ageratum (Eupatorium) II. 383.

Xeranthemum I.

Bidens V. 383, 384.

Verbesina I.

ββ flosculis in centro fistulosis; in ambitu planis,
disco radiato. RADIATAE,

i semine non papposo,

a placenta foliosa, s. squamifera,

Siegesbeckia I. 385.

Coreopsis II. 385, 386.

Rudbekia II.

Helianthus III. 386, 387.

5 *Buphthalmum* VII. 387 - 389.

Achillea VI. 389, 390.

Chamaemelum V. 391.

b placenta nuda,

Matricaria VII. 392, 393.

Pyrethrum III.

Calendula IV. 394.

Osteospermum II.

5 *Eriophyllum* I. 395.

Bellis I.

2 semine pappo coronato, placenta nuda,

Bellidastrum (Bellis) II.

ET GENERUM PLANTARUM. XLVII

Aster XIII. 396-398.

Solidago (*Virga aurea*) X. 399, 400.

Senecio (*Iacobaea*) XXI. 401-405.

§ *Arnica* I.

- *Doronicum* I. 406.

3 semine foliolis coronato,

Tagetes II.

Arctotheca II. 406, 407.

Helenia I.

yy flosculis omnibus planis. PLANIPETALAE,
f. CICHORACEAE,

1 semine pappo coronato,

a placenta nudā,

Taraxacum II. 408.

Hieracium XI. 408-410.

Crepis (*Hieracioides*) IX. 410-413.

Picris I.

§ *Helminthotheca* I.

Sonchus V. 414.

Prenanthes I.

Chondrilla II. 415.

Lactuca V. 415, 416.

10 *Scorzonera* VII. 416, 417.

Tragopogon VII. 417-419.

b pla-

XLVIII ORD. CLASS. ET GEN. PLANT.

b placenta alveolata,

Intybus III. 419, 420.

c placenta pilosa,

Andryala I.

d placenta squamis distincta,

Hypochceris III. 420, 421.

2 semine foliis cotonato,

Catananche I.

3 seminibus partim nudis, partim coronatis,

Rhagadiolus (*Hypochoeris*) IV. 421,


4 seminibus nudis, (422,

Lampsana III. 423.

Hyoseris I.

Cichorium II. 423, 424.

Scolymos I.



NOMINA SCRIPTORUM ET LIBRORUM,
QUIBUS IN HAC ENUMERATIONE
USUS SUM

A.

Act. Hafn.

THOMAE BARTHOLINI Acta Hafniensis ab anno
1671 ad 1680. 4. Vol. V.

ALD. H. Farnes.

TOBIÆ ALDINI Exactissima descriptio rariorum
plantarum, quae continentur Romae in horto Farnesiano.
Romae 1625. fol.

ALDROV.

ULYSSIS ALDROVANDI Dendrologiae naturalis Li-
bri II. Bonon 1668. fol.

AMM. Act. l. Mus. l. Comm. Petr.

IOH. AMMANNUS in Actis Petropolitanis.

AMM. Ruthen.

EIUSDEM Icones & descriptiones stirpium rariorum
Ruthenicarum Petrop. Acad. 1739. 4.

AMM. hort. Bos.

PAULI AMMANNI Hortus Bosianus, quoad exotica
solum descriptus. Lipsiae, typis Krugorianis 1686. 4.

ASTRUC.

IOH. ASTRUC Histoire naturelle du Languedoc
Paris. 1737. 4.

BARK.

L NOMINA SCRIPTORUM

B.

BARR. ic.

JAC. BARRELLIER Plantae per Hispaniam, Italiam & Galliam observatae. Edidit ANTON. de IUSSIEU. Paris apud Ganeau 1714 fol. cum iconibus.

BARRERE hist. natur.

PIERRE BARRERE Essai sur l' histoire naturelle de la France Equinoxiale. Parisis. 1741. 12.

JOHN BARTRAM.

Semina colligit in America septentrionali.

SECMAN. plant. march.

IOH. CHRISTOPH. & BERNHARDI LUDOV. BEKMANNI Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg Berlin apud Voss. 1751. fol.

BELLON.

PETR. BELLONIUS De arboribus coniferis, resiniferis, aliis quoque nonnullis, semipetra fronde virentibus. Parisis 1553. 4. cum iconibus & EIUSDEM itinera apud CLUSIUM.

BERGEN. flor. fr.

CAROLI AUGUSTI a BERGEN Flora Francofurtana. Francofurti ad Viadrum apud Kleyb. 1750. 8.

BLAIR. bot. Eff.

PATRICII BLAIR Botanical Essays. London apud Innys 1720. 8.

BLAKSTONE.

Fasciculus plantarum circa Harefield. Londini 1737. 8.

BLAKW.

ELISAB. BLAKWELL Curious herbal. London apud Nourse 1739. fol. Vol. II.

BOCC.

ET LIBRORUM.

LI

BOCC. *Museo. vel Mus. di piant.*

PAOLO BOCCONE *Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania. Venez. apud Zuccato 1697. 4.*

BOCC. *rar. vel pl. rar. vel pl. rar. Sic.*

EIUSDEM *Icones & descriptiones rariorū plantarū Siciliæ, Melitæ, Galliæ & Italiae. Oxon. in Theatr. Sheldon. 1674. 4.*

BOCC. *recherches de physique.*

EIUSDEM *Recherches & observations naturelles touchant le Corail, la pierre étoilée, & l'embrasement du Mont Etna. Paris apud Baloin. 1672. 12.*

BOEHMER *flor. Lips.*

GEORG RUDOLPH. BOEHMERI *Flora Lipsiae indigena, Lipsiae apud Dyckium 1750. 8.*

BOERH. *Ind.*

HERMAN. BOERHAAVE *Index alter plantarum Horti Lugduno Batavi. Leidae sumtibus Auctoris 1720. 4.*

BONT.

IACOBI BONTII *In majori Java nova Medici, Tractatus VI & adnotaciones in GUILIELMI PISONIS historiam de plantis & animalibus, quae existant in PISONIS Historiae naturalis Brasiliæ editione altera. Amstelodami apud Elzevirios 1658. fol.*

BORRICH.

OLAI BORRICHII *In actis Hafniensibus observationes botanicae multae existant.*

BRADLEY *Succ.*

RICHARD BRADLEY *History of succulent plants. London apud Mears 1717-1727. 4.*

LII NOMINA SCRIPTORUM

BREYN. Cent.

IAC. BREYNII Exoticarum stirpium Centuria I. Gedani, sumtibus Auctoris 1678. fol.

BREYN. Prodr.

EIUSDEM Prodromus I & II. Fasciculi ratiorn planarum. Gedani sumtibus Auctoris 1680. 4. altera editio 1739.

BREYN. de Cocco rad.

IOH. PHIL. BREYNII Historia Coccii radicum tintoriorum Gedani apud Auctorem 1731. 4. maj.

BROSSE.

GUI de la BROSSE Icones posthumae, quarum volumen apud me est. Mentionem alicubi injecit TOURNEFORTIUS.

BRUKM. Epist. itiner.

FRANCISCI ERNESTI BRUKMANN Epistolae itinerariae.

BRUNFELS.

OTHONIS BRUNFELSI Novi herbarii Tom. I. 1532. T. II. 1536. T. III. 1540. Argentorati.

BRY.

IOH. THEODOR. de BRY Florilegium novum. Oppenheim, 1612. fol.

BURM. Afr. vel Dec. Afr.

IOH. BURMANNI Rariorum Africanarum plantarum Decades IV. Amstelodami 1738. 4. aliae Decades VI. 1739. ibidem.

EURM. thes. vel Ceylan.

EIUSDEM Thesaurus Zeylanicus, plantas in hac insula nascentes exhibens. Amstelodami 1737. 4. cum iconibus.

BUXE.

ET LIBRORUM.

LII

BUXB. Cat. Hall.

IOH. CHRIST. BUXBAUM Enumeratio plantarum
agri Halensis adcuratior; Hælae 1721. 8.

BUXB. Cent.

EIUSDEM Plantarum minus cognitarum Centuria I:
II. III. IV. V. Petrop. Acad. 1728. & seqq. 4. maj.

C.

CAESALP.

ANDREAE CAESALPINI De plantis Libri XVI. Flo-
rentiae 1583. 4.

CAM. Ep.

JOACHIMI CÄMERARII De Plantis Epitome PETRI
ANDR. MATTHIOLI &c. Francof. apud Feyerabend 1586.
4. cum figuris.

CAM. hort.

EIUSDEM Hortus medicus & philosophicus &c. ibidem
apud eundem. 1588. 4.

CARDAN.

HIERONYMI CARDANI Operum Collectio. Lugdani
1663. fol. tum in varietatibus & singularibus.

Catalog. of trees.

ANONYMI Catalogue of trees, shrubs, plants and
flowers both exotic and domestic &c. Londini 1730. fol.
maj.

CATESBY.

MARCI CATESBY The natural history of Carolina;
Florida &c. London apud Frys 1731. fol.

CAUSE Kon. hoven:

H. CAUSE De Koninglycke Hovenier aanwyzendē de
middelen om boomen en kruyden te zaayen; planten,
*** 3 aenquees-

LIV NOMINA Scriptorum

aenqueeken en voortteelen, met konstige planten vercier:
te Amsterdam 1676. fol.

C. B. Prodr.

CASPARI BAUHINI Προστόμος Theatri Eotanici.
Francof. apud Treudel 1620. 4. &c denuo Bas. 1671. 4.

C. B. Th.

EIUSDEM Theatri Botanici Liber I. a filio IOH.
CASPARE B. editus. Basileae, typis Koenig 1658. folio.

CHARLEVOIX.

EIUS Histoire de la Nouvelle France. Parisis 1744. 4.
Vol. III.

CHOMEL.

IOH. BAPTIST. CHOMEL Abregé de l' histoire des
plantes usuelles. Deux Tomes. Amstelodami 1736. 12.

CHOUL. Pilat.

IOH. du CHOUL De varia Quercus historia : accessit
montis Filati descriptio. Lugduni apud Rovillium 1555. 8.

CLAVEN.

NICOLAI CLAVENAE Clavis aperiens naturae the-
safrum &c. Tarvisii apud Righettinum 1648. fol.

CLAYTON.

IOH. CLAYTON Flora Virginica , quam edidit
GRONOVIUS Leidae, apud Haak 1739. 8 maj. T.I.II.

C. lit. vel Comm. lit. vel Comm. lit. Nor.

Commercium literarium Physico - Technicum Norim-
bergense 1732 ad 1745. 4.

CLUS. ad MONARDUM.

NICOLAI MONARDI Libri III, medicinae secreta &
varia experimenta continentes , a CAR. CLUSIO latio
donati &c.

CLUS.

CLUS. cur. post.

CAROLI CLUSII Curae posteriores &c. Antw. apud Raphelengium 1611 fol. & 4. cum iconibus.

CLUS. bisp.

EIUSDEM Rariorum stirpium per Hispaniam observatarum Libri II. Antverpiæ apud Plantinum 1576. 8. cum figuris.

CLUS. Hist.

EIUSDEM Historia plantarum exoticarum Antw. 1601. fol.

CLUS. hist. app. alt.

EIUSDEM Appendix altera ad rariorum plantarum historiam, cum auctuario &c.

CLUS. Pann.

EIUSDEM Rariorum aliquot stirpium per Pannonias, Austriam &c. observatarum Libri IV. Antverpiæ apud Plantinum 1583. 8. cum figuris.

COL. ad RECCHIUM.

FABII COLUMNAE ad RECCHIUM Notae & FREDERICI CAESII Tabulae Phytoscopicae. Exstant cum opere Mexicano FR. HERNANDEZ. Romæ typis Mascardii 1651. fol.

COL. Ecphr.

EIUSDEM Ecphantis I & II minus cognitarum nostro coelo orientium stirpium. Romæ apud Mascardum 1616. 4.

COL. Phytob.

EIUSDEM Φυτοβιογραφίας sive Plantarum aliquot historiae. Neapoli apud Carlinum & Pacem 1592. 4. cum iconibus.

LVI NOMINA SCRIP'TORUM

Comm. Gott. vel Comm. Soc. Reg.

Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Tom. I. 1751 & T. II. 1752. Gottingae 4. cum fig.

COMM. hort. vel H. AMST.

IOH. & CASPARIS COMMELINI Horti medici Amstelodamensis Descriptio & Icones rariorum plantarum T. II. Amstelodami apud Blaen 1697 & 1701. fol.

COMM. Prael.

CASPARI COMMELINI Praeludia botanica &c. Lugduni Batavorum apud eundem 1703. 4.

COMM. rar. vel plant. rar.

EIUSDEM Plantae rariores & exoticae Horti Amstelodamensis. Lugduni Batavorum apud Haring 1706. 4.

CORD. hist.

VALERII CORDI Opera postuma cura CONR. GESNERI edita, Argentor. apud Richel. 1561. fol.

CORNUT.

JACOBI CORNUTI Canadensium plantarum historia; & Enchiridion botanicum Parisiense. Parisiis apud le Moyne 1635. 4.

COWEL. curious gardener.

IOH. COWEL The curious and profitable gardener &c. London apud Bickerton 1730. 8.

D.

DALIBARD. flor. Par.

DALIBARDI Flora Parisinae prodromus. Paris. 1750. 8.

DAL. Lugd.

JACOBI DALECHAMPII Historia generalis plantarum in Libros XVIII. digesta, Lugduni apud Rouille 1587. fol. Vol. II. DAM-

DAMPIER.

GUILIELMI DAMPIER De plantis Americae meridionalis agit, in his Voyage round the world. London 1729. 8. Vol. IV.

DILL. Elth. vel H. Eltb.

IOH. IAC. DILLENII Hortus Elthamensis IACOBI SHERARD. Londini sumtibus Auctoris 1732. fol. maximo Vol. II.

DILL. Giess. vel Cat. Giess.

EIUSDEM Catalogus plantarum circa Giessam nascientium. Francof. apud a Sande 1718. 8.

DILL. nov. spec.

EIUSDEM Dissertatio epistolaris de plantarum propagatione, cum iconibus & descriptionibus herbarum aliquot novarum. In Ephemeridibus Naturae Curiosorum, in appendice Cent. V & VI.

DILL. E. N. C. app. ad Cent. vel DILL. nov. gen.

EIUSDEM De plantarum propagatione Dissertatio epistolaris altera, qua duo genera plantarum nova designantur. In iisdem, eodem loco

DILL. Synops. vel DILL. ad RAI Syn.

IOH. RAI Synopsis methodica Stirpium Britannicarum a DILLENIO auctior edita. London 1724. 8.

DOD. Cereal.

REMBERTI DODONAEI De frugum Historia L. I. Antwerp. apud Loens 1552. 8.

DOD. Coron.

EIUSDEM Historia plantarum coronatiarum. Ibidem apud Plantinos 1569. cum iconibus.

DOD. Pempt.

EIUSDEM Stirpium historiae Pemptades VI. sive Libri XXX. Ibidem apud Moraeos 1616. fol. cum iconibus.

LVIII NOMINA SCRIPTORUM

DOD. Purg.

EIUSDEM De herbis purgantibus & deleteriis Libri
IV. *Ibidem apud Plantin.* 1574. 8. cum iconibus.

DONAT.

ANTONII DONATI Tratt. de semplici che nascono
nel lido de Venetia. *Venet. apud Bertano* 1631. 4.

DORSTEN.

THEODORICI DORSTENII Botanicon. *Francof.*
1540. fol.

DOUGL.

JAMES DOUGLAS *Lilium Sarniense. Londin* 1725. fol.

E.

EDWARDS of birds.

GEORGE EDWARDS Natural history of birds, Part.
IV. *Londin* 4. max.

EGEDE *descript. Groenland.*

HANS EGEDE gamle Groenlands nye perlustration.
Hafniae 1742. 4.

EHRET.

GEORGII DIONYSII EHRET Plantae & papilioes
rariores *Londin* 1749. fol. max.

BALTH. EHRHARD. *Syll. plant. & contin. syllabi plantar.*
Sunt catalogi in folio editi stirpium rariorum.

ELLIS.

HENRICI ELLIS Voyage to Hudsons Bay. *London*
1748. & *Gottingae germanice* 1750. 8.

Ennum. Helv.

ALBERTI HALLER *Enumeratio methodica stirpium*
Helvetiarum T. I. & II. Gottingae 1742. fol.

Ennum.

Enum. Hort. Gott.

EIUSDEM *Enumeratio stirpium Horti Gottingensis.*
Gottingae 1743. 8.

ERNDL.

CHRISTIANI HENRICI ERNDTEL *Iter in thermas*
Toeplienses in E. N. C. exstat.

F.

FABRIC *Butisb. vel flor. butisb.*

PHIL. CONRADI FABRICII *Primitiae Florae Butisba-*
censis. Wetzlar 1743. 8.

FAIRCHILD *in BLAIR. bot. eff.*

FAIRCHILDUS *in PATRICII BLAIR botanical Essays,*
FEHR.

IOH. MICH. FEHRII *Anchora sacra vel Scorzonera*
ad normam N. C. Jen. 1666. 8.

FERRAR. *flor.*

IOH. BAPTISTAE FERRARII *De florum cultura L.*
IV. Romae 1633. 4.

FERRAR *hesper.*

EIUSDEM *Hesperides sive de malorum aureorum cul-*
tura & usu L. IV. Romae 1646. fol.

FEUILL.

LUDOVICI FEUILLEÉ *Histoire des plantes medicina-*
les du Peru &c. Exstat in Torno I. du Journal des observa-
tions physiques, botaniques &c. Paris apud Giffart. 1714. 4.
& in suite du journal Paris. 1725. 4.

FIER. *Coen.*

BAPTISTAE FIERAE *Coena, notis illustrata a CARO-*
LO AVANTIO, additis Epistolis M. A. SEVERINI Pata-
vii apud Sardi 1649. 4.

FRE-

LX NOMINA SCRIPTORUM

FREZIER.

Voyage de la mer du sud *Paris 1717. 4°.*

FRYER.

JOHN FRYER New account of India and Persia being
nine years travels. *London 1698. fol.*

FUCHS.

LEONHARDI FUCHSII Historia plantarum, *Basil. apud Isingrin 1542. fol. cum iconibus.*

FUIREN *apud BARTH. cist. med.*

GEORGII FUIREN Plantae itineris Gothici Bleckin-
gensis & Norvegiæ apud BARTHOLINUM in *Cista Me-
dica. Hafniae apud Haubold 1662. 8. edita exstant.*

G.

GAGE.

THOMAE GAGE Iter or a new Survey of the west In-
dias. *Londini 1648. fol.*

GAGN.

PETRUS GAGNEBIN egregius stirpium collector, cui
plurima loca natalia rariorū helveticarū debemus.

GAR.

PIERRE GARIDEL Histoire des plantes, qui naissent
aux environs d'Aix. *Aix apud David 1715. fol.*

GERBER.

TRAUGOTT GERBER in variis fasciculis seminum
ad nos missis.

GESNER. *Hort.*

CONRADI GESNERI De hortis Germaniae liber. *Ar-
gentinae 1561. fol. cum VAL. CORDI operibus post-
humis.*

GMEL.

GMEL. flor.

IOH. GEORGII GMELINI Flora Sibirica &c. Petropoli
in typographia Acad. Scient. Tom. I. 1747. & T. II. 1749. 4.

GRANGER.

GRANGER Relation du voyage d'Egypce. Paris 1745. fol.

GRISLEY Viridarium.

GABRIEL. GRISLEY Viridarium Lusitanicum &c. Ulys-
sipone apud Craesbeeck 1661. 12.

GRONOVI. flor.

IOH. FRED. GRONOVI Flora Virginica exhibens
plantas a JOH. CLAYTON lectas. Leidae apud Haak
1739. 8 maj. T. I. II.

GUETTARD. Acad. Paris.

D. GUETTARDUS in Memoire de l' Academie des
Sciences, & in observations sur les plantes. Paris 1749. 12.

H.

H. AICHST. vel H. AYST. vel H. AIST. Vern.
vel Aest. vel Aut. Ord.

BASILII RESLERI Hortus Aichstettenfis. Norimbergae
1613 fol. atlant. & denuo ibidem 1640.

H. Carolsrb.

JOSUAE RISLERI Hortus Carolshuanus. Loeraci typis
de la Carriere 1747. 8.

HEINZE.

IOH. GEORG. HEINZIUS Physicus Scheppenstedensis
plantas rariores circa Langensalze collegit.

HEISTER ad Epist. Burkhard.

JO HENR. BURKHARD Epistola ad GODOFR. GUIL.
LEIBNITIUM, qua characterem naturalem plantarum ostendit,
cum Praefatione LAURENTII HEISTERI. Helmstadii
ex officina Weygandiana 1750. 8.

HELL-

LXII NOMINA SCRIPTORUM

HELLWING. flor.

GEORGII ANDR. HELWINGII Flora Prussica quasi-modogenita cum Praefatione J. P. BREYNII. Gedani 1712. 4.

HELLWING supplem.

EIUSDEM Supplementum Florae Prussicae quasimodogenitae IOH. LOESELIL. Ibidem typis Stellii 1726. 4.

HERM. H. L. B. vel HERM. hort. vel HERM.
Hort: Lugd. Bat.

PAULI HERMANNI Catalogus Horti Academicus Lugduno Batavi. Leidae apud Bontenstein 1687. 8. maj. c. icon.

HERM. Par. vel Par. Bat.

EIUSDEM Paradisus Batavus. Leidae apud Elzevier. 1698. 4. cum icon.

HERNANDEZ.

GONCALEZ HERNANDEZ Historia general y natural de las Indias, islas, y tierra ferme del mar Oceano. Salamanca, typis de Junta 1546. fol.

HILL. nat. hist.

JOHN HILL History of plants 1751. fol. apud Osborne.

H. MAL.

Horti Malabarici Vol. XII. Amstelodami a 1678 ad 1703 fol. a variis autoribus conscripta, cura HENR. RHEEDE van Draakenstein edita.

HOFMANN.

MAURITII HOEMANNI Florilegium Altorfinum. Altorfi apud Meyerum 1672. 4.

H. OX. vel MORIS.

ROBERTI MORISON Plantarum historiae universalis Oxoniensis Tom. I, II & III. Oxon. in Theatro Sheldon 1680. H. R.

H. R. Paris.

Hortus Regius Parisiensis. Paris 1665. fol,
HUGHES.

GUILIELMUS HUGHES the American physician, or
a Treatise of the roots, plants, trees, shrubs, fruits herbs
&c, London apud Crook 1672. 12.

I.

I. B. I. vel II. vel III.

IOH. BAUHINI & IOH. HENR. CHERLERI Historiae plantarum absolutissimae Prodromus. Ebrodii, apud Soc. Calderonianam 1619. 4.

IMPERAT.

FERRANTIS IMPERATI Historiae naturalis Libri XXVIII. Bremae 1695. 4. Sed vera editio est Neapoli 1599. fol.

ISNARD. Mem. de l' Acad.

ANTONIUS DANF Y d' ISNARD Plantarum varia genera descriptio in Memoire de l' Academie des Sciences.

IUSS. Mem. de l' Acad.

ANTOINE de IUSIEU Descriptiones plantarum in Memoire de l' Academie Royale des Sciences dedit.

K.

KAEMPFER.

ENGELBERTI KAEMPFERI Amoenitatum exotica-
rum politico - physico - medicarum Fasciculi V. Lemgoviae
apud Meyerum 1712. 4.

KALM.

PEHR KALM Wältgötha ock Bahuslandska Resa,
Stockholm. 1746. 8.

KLEIN.

LXIV NOMINA SCRIPTORUM

KLEIN. *Diss.*

IOH. HENR. KLEINII *Dissertatio inauguralis de Junipero, in Acad. Altorfina propugnata. Altorfii typis Kohlesii 1719. 4.*

KOENIG. *Disp. propr.*

EMANUEL KOENIGII de Lamie Plinii. *Diss. Argentorati 1742. 4 cum icone.*

KYLLING.

PETRI KYLLINGII *Viridarium Danicum. Hafniae Argentor. 1688. 4.*

L.

LABAT.

IOH. BAPTIST. LABAT *Voyage aux isles de l' Amerique, contenant l' histoire naturelle de ce pays &c. Paris apud Cavelier 1722. 12 Vol. VII.*

L·ADMIRAL.

Icones pulcherrimae papilionum cum stirpibus, quibus eorum Erucae pascuntur.

LANCISIUS.

IOH. MARIA LANCISIUS *De herbis & fruticibus in recens aggetto littore Tiberis suborientibus. Exstat ad calcem Physiologicarum animadversionum in Plinii villam. Romae in officina Gonzagae 1714 fol. & in ejusdem Autoris operum collectione Genevae 1717.*

ANGLEY *pomon.*

BATTY ANGLEY *Pomona, or the fruit garden illustrated &c. London apud Strabam 1729 fol. cum iconibus.*

LEOP.

IOH. DIETRICH LEOPOLDI *Deliciae sylvestres florae Ulmensis. Ulm apud Wahler 1728. 8.*

LERCHE.

LERCHE.

*Medicus exercitus Russici ad Academiam Petropolitanam
multa plantarum semina misit.*

LIGON.

RICHARDUS LIGON A true and exact history of the
island of Barbados &c. London apud Mosely 1657. fol.
cum iconibus.

LIND. *hort. Alsat. vel Tourn.*

FRANCISCI BALTHAS. von LINDERN Tournefortius
Alsaticus, cis & trans Rhenanus. Argentorati apud
Stein 1728. 8. & 1748. 8. sub nomine Horti Alsatici.

LINN. H. *Cliff.*

CAROLI LINNAEI Hortus Cliffortianus Amstelodami
1737. fol.

LINN. *Lap.*

EIUSDEM Flora Lapponica. Ibidem apud Schouten
1737. 8. maj.

LINN. *Mus. Cliff.*

EIUSDEM Musa Cliffortiana florens Hartecampi, Leidae
1736. 4.

LINN. *Phil. bot.*

EIUSDEM Philosophia Botanica. Stockholmiae apud
Kiesewetter 1751. 8.

LINN. *Ups.*

EIUSDEM Hortus Upsaliensis. Ibidem literis Salvii
1748. 8.

LINN.

LXVI NOMINA SCRIPTORUM

LINN. *Wästgöta Resa.*

EIUSDEM *Wästgöta Resa. Ibidem 1746. 8.*

LOB. *adv.*

MATTHIAE de L'OBEL *Stirpium Adversaria nova &c.*
Antwerp. apud Plantinos 1576 folio minori.

LOB. *ic.*

EIUSDEM *Plantarum sive Stirpium icones. Antwerp.*
1581. fol. long.

LOCHNER, E. N. C.

MICH. FRID. LOCHNERUS in *Ephemeridibus Na-*
turae Curiosorum.

LOES *ic vel flor.*

IOH. LOESELII *Flora Prussica, descriptionibus, iconi-*
bis & historiis aucta a IOH. GOTTSCHED. Regiomont.
apud Georgi 1703. 4.

M.

MAGN. *Bot. Monsp.*

PETRI MAGNOL *Botanicum Monspeliense cum ap-*
pendice. Monspelii, apud Pech 1686. 8.

MAGN. *hort. vel hort. reg. Monsp.*

EIUSDEM *Hortus Regius Monspeliensis. Ibidem apud*
eundem 1697. 8.

MANETT. *Virid. flor.*

XAVERII MANETTI *Viridarium Florentinum. Floren-*
tiae, apud Paperini 1751. 8.

MANGET.

ET LIBRORUM. LXVII

MANGET. *pharm.* vel. *dict.* *pharm.*

IOH. IAC. MANGETI *Bibliotheca pharmaceutico-medica &c. Coloniae Allobrogum, apud Chouet & de Tournes 1703. fol. Vol. II.*

MAPP. *Alsat.*

MARCI MAPPI *Historia plantarum Alsaticarum posthum, opera & studio IOH. CHRIST. EHRMANNI. Argentorati 1742. 4. cum figuris.*

MARCGRAV.

GEORGII MARCGRAVII *Historiae rerum naturalium Brasiliae Libri VIII. Exstant cum GUIL. PISONIS Historia Brasiliae.*

MARCHANT.

IOH. MARCHANT *Description des plantes données par l'Academie. Paris 1676. fol.*

MARSIGL.

LUDOV. FERDINANDI MARSIGLI *Danubius Pannonicus Mytius Hag Vol. VI. fol.*

MART. *Georg.*

JOH. MARTYNII *Commentarius botanicus in Georgica VIRGILII London 1745. 8.*

MATTH. *Comp. Ital.*

PETRI ANDREAE MATTHIOLI *Compendium de plantis Venet. 1571. 4. cum iconibus.*

LXVIII NOMINA SCRIBTORUM

MENZEL. *Pugill.*

CHRISTIANI MENZELII *Pugillus plantarum rario-*
rum. Berlin. 1682. fol.

MERIAN. *Surin.*

MARIAE SYBILLAE MERIAN *Metamorphosis inse-*
ctorum Surinamenium. Amstelodami, apud Walk. 1705 &
1709. fol.

MESSERSCHMID.

Collector stirpium sibiricarum.

MICH. *hort. flor.*

PETRI ANTONII MICHELII *Catalogus horti floren-*
tini a I. TARGIONI editus. Florent. 1748. fol.

MICH. *nov. gen.*

EIUSDEM *Nova plantarum genera, juxta TOURNE-*
FORTII methodum disposita. Florentiae, typis Paperini
1729. fol. minori.

MISSA.

Med. Lic Par. *floræ cultor industrius.*

MOEHRING. *Comm. Nor.*

PAULUS HENRICUS GERARDUS MOEHRING in
Commercio literario Norimbergensi.

MOEHRING. *hort.*

EIUSDEM *Primae lineae horti privati. Oldenburg, apud*
Gotjen 1737. 8°.

MONCONIS.

ET LIBRORUM. LXIX

MONCONIS.

EIUS Voyages. Lyon 1665. 4. Vol. II. Parisis 1695. 12°
Vol. IV.

MONTALBAN. hort.

OVIDII MONTALBANI Hortus Botanographicus &c:
Bononiae, typis Montii. 1660. 12:

MOR. Prael.

ROBERTI MORISONI Praeludiorum botanicorum P:
I & II. Londini, typis Roycroft 1669. 12.

MOR. Umbell.

EIUSDEM Plantarum umbelliferaum distributio nova
per classes adfinitatis P.I,II,III. Oxonii, apud Sheldon 1672:
fol. maj.

MUNT. Brit. vel hort. brit.

ABRAHAM MUNTING De vera herba britannica
Amsterd. 1698. 4.

MUNT. hist.

EIUSDEM Phytographia curiosa. Amsterd. 1727. fol.

Mus. Petrop:

Museum Imperiale Petropolitanum Vol. I. Petrop:
1745. 8.

N.

NISSOLE Mem: de l' Acad:

GUILIELMUS NISSOLE In Memoire de l' Academie
Royale des Sciences.

LXX. NOMINA SCRIPTORUM

O.

ŒLHAF. *Elench.*

NICOLAI ŒLHAFII *Elenchus plantarum circa Dantiscum sponte nascentium. Dantisc. apud Rhetium 1643.* 4.

Opusc. bot.

ALBERTI HALLER *Opuscula botanica &c. Göttingae, apud Schmidt 1749.* 8.

P.

P. ALP. *Aegypt.*

PROSPERI ALPINI *De plantis Aegypti Liber. Venetiis, apud Franciscum de Franciscis 1633.* 4.

P. ALP. *Exot.*

EIUSDEM *De plantis exoticis Libri 11. Edidit PROSPERI Filius. Venet. apud Guerilium.*

PANCOV.

THOMAE PANCOVII *Herbarium a BARTH. ZORNIO auctum. Coloniae ad Spream 1673. cum iconibus.*

PARK. *Theatr.*

JOHN PARKINSON *Theatrum Botanicum London, apud Cotes 1649. fol.*

PASS ic. P. alt. vel PASS. part. alt.

CRISPINI PASSAEI *Horti Floridi pars altera. Arnhem, apud Janssonium. Pars Verna 1614. P. autumnalis & biemalis 1616. P. aestiva 1617 4.* PASS.

PASS. *Vern.* vel *Aest.* vel *Aut.* vel *biem.*

EIUSDEM Hortus floridus, in quo rariorū florum icones ad vivam formam accuratissime delineatae, & secundum quatuor anni tempora divisae exhibentur. *Ibidem* 1607. 4.

PEIRESC. *Vit.*

Vita PEIRESCII a PETRO GASSENDO scripta. *Quedlinburg* 1707. 8.

PETIT. *Epiſt.*

FRANCISCI PETIT Trois Lettres d'un Médecin des hospitaux du Roy à un autre Médecin de ses amis &c. *Namur, apud Gerard Albert* 1710. 4.

PETIVER. *herb.*

JAMES PETIVER Herbarii Britannici Catalogus *London* 1713. fol. cum iconibus.

PETIVÉR H. B. vel *hort. brit.*

EIUSDEM Herbarium Britannicum, quinquaginta tabulis aeneis expressum. *In operibus omnibus.*

PIS. *hist. nat. Ind.*

GUILIELMI PISONIS Historia naturalis Indiae. *Amst.* 1658. fol.

PLOT. *Oxford Shire.*

ROBERTI PLOT Natural history of Oxford Shire, being an essay towards the natural history of England, with additions by M. BURMANN. *Oxford apud Lichfield* 1705. fol.

LXXII NOMINA Scriptorum

PLOT. *Starfford Shire.*

EIUSDEM Natural history of Starfford Shire. *Ibidem* 1686. fol.

PLUKN. *Almag.*

LEONHARDI PLUKNETI Almagestum Botanicum,
sive Phytographiae Pluknetianae Onomasticum. *Londini,*
sumtibus Auctoris 1696. 4. maj.

PLUKN. *Amalb.*

EIUSDEM Amaltheum Botanicum stirpes novas tradens
1200. *Londini* 1705. fol.

PLUM. *fouger.*

CHARLES PLUMIER Traite des Fougères de l'Amérique,
en Latin & en François. *Parisiis*, imprimerie Ro-
yale 1705. fol.

PLUM. *Nov. gen.*

EIUSDEM Nova plantarum Americanarum genera.
Parisiis, apud Boudot 1703. 4.

PLUM. *pl. de l' Amer.*

EIUSDEM Description des plantes de l' Amerique avec
leurs figures. *Paris*, imprimerie Royale 1693 fol.

POCOCK.

RICHARD POCOCKE Description of the East Vol. II
London 1743 & 1745 fol.

PON.

ET LIBRORUM.

LXXIII

PON. Bald.

IOH. PONAE Iter M. Baldi. *Easel* 1608. 4.

PONTED.

JULII PONTEDERAE Compendium tabularum beta-
nicarum, *Patavii*, typis *Seminarii* 1718. 4 maj.

R.

RAI. Cat. plant. Angl.

JOH. RAI Catalogus plantarum Angliae & insularum
adjacentium, *Londinii*, apud Clark 1677. 8.

RAI. Syn.

EIUSDĒM Synopsis methodica stirpium Britannicarum,
Editio III. quingentis plantis auctior. *Londini* apud
Innys 1724. 8

RAND.

ISAACI RANDII Hortus Medicus Chelsejanus &c.
Londini 1739. 8.

RAUWOLF.

LEONARDI RAUWOLFI Itinerarium Orientis in P.
VI. distinctum, additis variis plantarum iconibus. *Fran-
cofurti* 1582. 4.

RENEAULME.

PAULI RENEAULME Specimen, historiae stirpium.
Paris. 1611. 4.

LXXIV NOMINA SCRIPTORUM

RITTER.

IOH. IAC. RITTER olim Auditor noster in ea parte
Hassiae, quae ad *Riedeselios* pertinet plantas collegit.

RIV. mon. irreg.

AUG. QUIRINI RIVINI Ordo plantarum flore mono-
petalo irregulari, *Lipsiae*, typis *Fleischeri* 1690 fol. cum
iconibus.

RIV. tetr.

EIUSDEM Ordo plantarum, quae sunt flore irregulari
tetrapetalo. *Ibidem* 1691 eadem forma.

ROBERT. ic. vel IC. REG.

NICOLAI ROBERTI & aliorum virorum Icones plan-
tarum, quarum prototypi in Bibliotheca Regia Parisis
adservantur.

ROLOF. hort. *Craus.*

CHRIST. LUDOV. ROLOFF Index plantarum, quae
in horto *Krausiano* aluntur. *Berolini* literis *Kunstii* 8.

ROYEN.

ADRIANI van ROYEN Florae Leidensis Prodromus,
Leidae, apud *Luchtmann* 1740. 8

ROYER.

IOH. ROYERII Beschreibung des fürstl. Gartens zu
Hessen, *Braunschweig*, apud *Muller* 1653. 4

RÜDBECK Elys.

OLAI RÜDBECKII Campi Elysi Libri I & II. *Upsa-
liae*, apud *Delen* 1701, 1702. fol.

RUMPF

RUMPF.

GEORGII EVERHARDI RUMPFII Herbarium Amboinense. Amstelodami Tom. I. 1741. Tom. II. 1743. fol.

RUPP.

HENRICI BERNHARDI RUPPII Flora Jenensis, quarta vice auctior & emendatior edita ab ALBERTO HALLER. Jenae, apud Cunonem 1745. 8.

S.

SABBAT. *plant. Roman.*

LIBERATI SABBATI Synopsis plantarum, quae in solo Romano luxuriantur. Romae 1745. 4

SCH.

IOH SCHEUCHZERI Prodromus agrostographiae Helveticae &c. Tiguri 1708 fol.

SCHREIBER. *Act. Erud.*

IOH. FRIED. SCHREIBER in *Actis Eruditorum.*

SCHREIBER. *icon.*

IDEM Cacalianthemi iconem in *Act. Erud.* edidit.

SEBA.

ALBERTI SEBÆ Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio & iconibus expressio per universam

LXXVI NOMINA Scriptorum

versam physices historiam &c. *Amstelodami*, apud *Wetstein*
& *Smith* 1735 fol.

SEG. *Veron.*

IOH. FRANCISCI SEGUIERII *Plantae Veronenses &c.*
Veronae, typis Seminarii 1745. 8

SHAW. *travels.*

THOMAE SHAW *Travels or Observations relating
to several parts of Barbary and the Levant.* Oxford
1738. fol.

SIEGESBECK *propri. lib.*

IOH. GEORGII SIEGESBECK *Propemti de Majar-
hemo. Petropoli* 1736. 8

SLOANE *Hist. vel Jamaic.*

HANS SLOANE *Catalogus plantarum, quae in Insula
Jamaica sponte proveniunt, seu Prodromus Historiae
naturalis Jamaicæ P. I. Londini*, impensis Brown
1696. 12

SLOANE *Journ. to Jamaic.*

EIUSDEM *Journey to Jamaica &c. London* 1707 fol.
1725. fol.

STAHELIN.

BENEDICTUS STAHELINUS olim noster, multas
fulchas stirpes in agro Basileensi legit,

SWEERT:

SWEERT.

EMANUEL SWEERTII Florilegium. *Francfurti,*
apud Kempner P. I. 1612. P. II. 1614. fol.

T.

TAB.

JACOBI THEODORI TABERNAEMONTANI Eicones
 plantarum omnis generis, curante BASSAEO. *Francof.*
 1590 *fol.*

TARGION.

IOH. ANTONII TARGIONII Theses de praestantia &
 usu plantarum in Medicinæ. *Pisæ. 1734. fol.*

THAL.

IOH. THALII Sylva hercynica cum iconibus XIV. ex
 GESNERO.

THEVENOT.

MELCHISEDECH THEVENOT Relation de divers
 Voyages curieux. *Paris 1666. & auctius 1696. fol. Tom. III.*

TILLI.

MICHAELIS ANGELI TILLII Hortus Pisanus. *Flo-*
rentiae, apud Tartini & Franchi 1723. fol.

LXXVIII NOMINA SCRIPTORUM

T. I. R. H.

JOSEPHI PITTON de TOURNEFORT *Institutiones rei herbariae* *Lugd.* 1719. 4. *Vol. III.* sed prior editio prodiit *Parisiis* 1700.

T. Coroll.

EIUSDEM *Corollarium institutionum rei herbariae* 1703. 4.

T. Mat. Med.

EIUSDEM *Traité de la matiere medicale* par BERNIER. *Paris*, apud Houry 1717. 8.

TOURN. *Voyag.*

EIUSDEM *Voyages du Levant &c.* enrichies de descriptions d'un grand nombre de plantes rares. *Lyon* 1717. 8. *Vol. III.*

T. Par. vel T. aut de Par.

EIUSDEM *Histoire des plantes, qui naissent aux environs de Paris.* *Paris*, de l' imprimerie Royale 1698. 12.

TRAG.

HIERONYMI TRAGI *Historia stirpium, Argentin,* 1552. 4.

TREW. *Dec. plant. var.*

CHRISTOPHORI IACOBI TREWII *Plantarum selectarum Decuria I* 1750 & II. 1751. fol.

TRIUMPH.

TRIUMPH. Obs.

IOH. BAFTISTAE TRIUMPHETTI Observationes
de ortu & vegetatione plantarum. Romae, apud Herculem
1685. 4 maj.

TRIUMPH. Prael.

EIUSDEM Praelusio publica ad publicas herbarum
ostensiones habita in horto medico. Romae 1700. 4.

TURNER.

WILLIAM TURNER A new herball, wherein are
contayned the names of herbes in Greecke, Latin, Englysh,
Duch, Frenche, and in the Potecaries and herbaries La-
tin &c. London, apud Mierdman. 1551 fol. cum iconibus.

VAILL.

SEBASTIANI VAILLANT Botanicon Parisiense. Lei-
dae & Amsterdam 1727. fol.

VALLET.

PIERRE VALLET le jardin de Louis XIII. Paris
1623. 4.

VESLING. Obs.

IOH. VESLINGII Observationes & notae ad PROS-
PERI ALPINI librum de plantis Aegypti &c. Patavii,
apud Frambottum 1638. 4.

VOLC. flor.

IOH. GEORGII VOLCKAMERI Flora Noribergensis.
Noribergae, apud Michael 1700. 4.

VOLC. hesp. vel app. hesp.

IOH. CHRISTOPHORI VOLCKAMERI Hesperides
Noribergenses. Norimbergae, apud Endterum 1713. fol. Vol.
II. cum iconibus. WALTH.

LXXX NOM. SCRIPT. ET LIBRORUM.

W.

WALTH. *hort.*

AUGUSTINI FRID. WALTHERI Designatio plantarum horti sui. *Lipsiae*, apud Gleditsch. 1735. 8. maj.

WEINM.

IOH. WILH. WEINMANNI Phytanthozaiconographiae Tom. I. 1737. T. II. 1740. *Ratisbonae*, apud Lenz. fol.

WEFFER.

IOH. IAC. WEPFERUS De cicuta aquatica *Basil.* 1679. 4.

WIGAND.

IOH. WIGANDI Historia de plantis, in Borussia nascentibus. *Regiomonti* 1655. 4.

WILLIG *Obs. bot. vel Diff.*

CHRIST. LUDEW. WILLIGII Dissertatio inauguralis Observationes botanico - medicas sistens. *Gottingae*, apud Vandenhoeck 1747. 4.

Z.

ZANICHELL.

GIOVAN GIROLAMO ZANICHELLI Istoria dell piante de' lidi veneti: Accresciuta da'l - - - figliolo GIAN IACOBO. *Venet.* apud Bartoli 1735. fol.

ZANON. *istor.*

IACOBI ZANONI Istoria Botanica &c. *Bologna* 1675. fol.

ZANON. *istor. ed. nov.*

EIUSDEM Operis nova editio. *Bonon*, 1742. fol.



ENUMER.

ENVMERATIO

PLANTARVM HORTI ET AGRI

GOTTINGENGIS

D O R S I F E R A E.

Ophioglossum omn. aust. conf. RUMPF. L. XI.
T. 68. In prato ad sinistra villaे *Hessendreisch*
in valle irrigua.

Osmunda foliis lunatis I. R. H. aut de Par. p. 512.
Am berge bey lütte Lengen raro, raro etiam circa die Lith,
abunde super Jenam versus Raubenthal.

Osmunda ramosa foliis pinnatis, pinnis oblongis nervosis, racemis ramosiss. *Filix floribus insignis* I. B. III. p. 736.
Abunde in sylvis ultra Hannoveram versus Cellam.

H. Osmunda quae Polypodium sensibile MUNTING
f. 85. r.

Struthiopteris capsulis semeniferis cylindricis gemellis.
Filicarium septentrionale & palmifre AMMAN. plant.
Ruthen. n. 252. Tom. X. Comm. Petr. T. XVIII. bon. ic.
Folia in orbem disposita, ramis oppositis: ad ramos pin-

DORSIFERAE.

nae integræ vel leviter serratae, longe confluentes. Scapi florigeri carinati, foliis semeniferis oppositis nervosis convexis. Ea per maturitatem curvata abeunt in capsulas, per intervalla contractiores. Binatae eae capsulae, nervo distinctæ, cylindricæ, polline plenæ sunt. In vallecula, quæ rivo perfluitur, Zeijiggrund, haud longe a Roda Thuringiae.

Stuhiopteris soliis seminalibus planis. *Polypodium angustifolium* folio vario T. Bey Waaeke in Wäldern und bey Hardgseu. Etiam in calidis, in Toscana.

Filix pinnis ramorum pinnatis, pinnulis non dentatis Enum. Helv. p. 133. *Filix ramosa minor* pinnulis oltus non dentatis C. B. Locis sylvosis & asperis.

Acrostichum fronde linearie lanceolata Linn. Enum. Helv. p. 129. *Filicula saxatilis corniculata* L. R. H. ad rupes grandiores sub Wacken.

Asplenium frondibus linearibus integris basi cordatis inflexis, petiolis hirsutis Cliff. 474. Helv. 134. *Lingua cervina* officin. Alpes montesque umbrosas Helvetiae amat. Adultior findit folia (CAUSE kon. boven, p. 182.), & in varietates polylobidas abit.

Asplenium fronde pinnata, foliolis subrotundis crenatis Cliff. 474. Helv. 137. *Trichomanes* f. *Polytrichum* officinum. Ad rupes prope W'aaken Reinkhausen &c.

Aspe-

Asplenium ramis duplicato ramosis, pinnis ferratis, laxe dispositis Helv. 137. *Ruta muraria* C. B. *Iisdem locis.*

Polypodium pinnatum pinnis lanceolatis integris Fl. Lap. 380. Helv. p. 137. *Polypodium vulgare* C. B. *Passim locis asperis & saxosis, uti circa Waaken ubique.*

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis integerrimis. *Filix minor non ramosa* L. B. III. p. 740. MAPP. *Alsat. ic. VII.* In stagno Denkerhusano, & lacu Seeburgensi. Aceri seminales primo distincti, inde in fuscam superficiem confluunt.

Polypodium pinnis pinnatis, imis reflexis, pinnulis cum nervo confluentibus *Filix saxatilis non ramosa* aliis reflexis RUPP. *Filix minor Britannica pediculo pallidiore* DILL. *Synops. III. p. 172. n. 8.* *Filix non ramosa minor sylvestris* PETIT *Epist. III. p. 50. ic. Phyllitis minor hirsuta pinnis variis* AMM. Petrop. Tom. X. T. XXI. Ad rupes inter Besigekauen & Waaken cum Polypadio, tum in hercynia sylva, & prope Rode Thuringiae. Pallor peculiaris foliorum, & pediculorum, & primarum pinnularum cum nervo confluens natura pro nota est.

Polypodium pinnis ramorum pinnatis pinnulis conjunctis oblongis integerimis Enum Helv. p. 130. *Filix ramosa minor pinnulis dentatis.* C. B. AMM. Tom. X. Act. petr. T. XXII. f. 2. Passim in sylvis & rupibus circa Waaken, Reinhausen, Dreisch, inter Lüttge Lengen & Keschendorfesfelde &c.

Polypodium fronde duplicato pinnata, foliolis obtusis crenulatis, petiolo strigoso Cliff. 475. Helv. p. 137. *Filix mas*

4 DOKSIFERA E.

non ramosa dentata C. B. Vulgatissima ad sepes inque
sylvis.

Polypodium ramorum pinnis obtusis ellipticis, crenis
imis pinnarum bifidis Helv. 139. *Filix mollis f. glabra vul-*
geri mari non ramosae accedens. I. B. Annon *Thelypteris*
minor pinnulis argute dentatis, molliter spinosis AMMAN.
Act. Petrop. X. Tab. 23: In sylvis non infrequens.

Polypodium pinnis ramorum auriculatis, oris ciliari-
bus Ennem. Helv. p. 142. *Filix mas pinnis latis auricula-*
tis spinosis H. OXON. III. p. 580. T. 3. f. 15. In sylvis
hercynicis.

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis semipinnatis obtu-
sioribus. *Filicula saxatilis regia fumariae pinnalis* VALL.
T. IX. f. 1. Copiose ad grandia saxa sub Kuaken, cum
Acrosticho. Circa Walkenried & ultra Herzberg.

Polypodium pinnis duplicato pinnatis, pinnulis acute
dentatis. *Filix sumila saxatilis altera* CLUS. PLUKNET.
T. 179. f. 5. pro varietate foliis brevioribus. *Filix ramo-*
sa dentata ramulis & pinnulis longius ab invicem distantibus
MAPP. *Alsat.* ic. IV. pro eadem varietate. Circa Rode
Thuringiae, circa Ilfeld magna copia, & in alpibus.
Acuta & laxa divisione facile a-priori dissidet. Acervuli
distincti nigricant, unde nomen C. BAUHINI.

Polypodium pinnis ramorum pinnatis, pinnulis laxis
acute scolis spinulosis. Ennem. Helv. p. 141. *Filix mas*
ramosa pinnulis dentatis PLUKNET. T. 181. f. 2. Aufm
Harze in Wüldern. Im Zeiflegmaud, in helvetia passim.

Equi-

Equisetum caule simplicissimo aspero vaginis integerimis Enum. pl. helv. p. 143. Equisetum juvaceum RAI. Syn. III. p. 131. In insulis Rheni asperimum & aptum auri-fabris.

Equisetum multiflorum caule tetragonon verticillis rario-ribus. Helv. 149. Equisetum palustre minus polystachion. C. B. In agris uidis.

Equisetum caulis fulcis plurimis, verticillis densissimis. Helv. 142. Equisetum pratense longissimis setis. C. B. Ultra Dorsten versus Osterode. In Helvetia vulgare, facile est adgnitu caulis digitum latis, non sulcatis, solum inter omnia equiseta.

Equisetum caulinibus floriferis a foliosis diversis. Helv. 144. Equisetum arvense longioribus setis. C. B. Ubique in pratis. Folia similia polystachyo, unice numerosiora, sed caules aphylli facile separant a reliquis.

Equisetum soliis ramosissimis. Equisetum sylvaticum TABERN. p. 253. Passim in sylvis & agris sterilibus v. g. ad dextra villae Hessendreisch.

C O N I F E R A E.

Salicornia Blanchette Narbon. f. Kali minus LOB.
advers. p. 170. Circa Sulze lacumque salsum, tum
ubique, ubi aquae saluae sunt, etiam in Helvetia, Transyl-
vania, & in ipsa Malabarria reperitur.

C O N I F E R A E.

H. Ephedra maritima minor: *Tragum s. Uva marina circa Monspelium* CAMERAR. hort. n. XLVI. In Valesia inter reliquias arcis *Tourbillon*. In Hispania CLUS. in Syria RAUWOLF.

Taxus omn. auct. In sylvis circa Pless abunde.

Juniperus foliis sessilibus patentibus ROY. p. 39. Helv. p. 146. Goettingae raro, aliquot tamen plantulas in declivi- bus M. Heimberg ad sinistra viae Rohringensis receri.

H. *Juniperus Virginiana* foliis inferioribus juniperinis, superioribus Sabinam referentibus BOERH. hort. Junior arbor non satis adgnoscitur.

H. *juniperus* foliis inferioribus adnatis oppositionibus concatenatis LINN. *Sebina mas & semina* C. B. In Hibernia, Sitiria.

Abies foliis apice acuminatis Lap. 342. Helv. 147. *Abies tenuiori* folio, fructu deorsum inflexo I. R. H. Hac tota sylva hercynia constat.

H. *Abies* foliis apice emarginatis LINN. In Helvetia passim, hic nondum visa

H. *Abies* foliis fasciculatis obrusis LINN. *Larix* CAMER. epit. p. 46. & omnium auctorum. In Helvetia alpina, Polonia, Sibiria ubique.

Pinus foliis geminis, cono pendulo, nucleis striulis Enn. helv., *Pinus sylvestris montana* CAMLR. Ep. p. 40. Ubique in arenosis Germaniae. H.

C O N I F E R A E. 7

H. *Pinus* COLLINSON. *Annon Abies piceae foliis brevioribus conis parvis biuncizibus* CHARLEVOIX n. 90.
Catalog. of trees T. I. De juniori arbuscula vix judico.

H. *Pinus Americana* foliis quinque. *Lord weymouths Pine.*
Catalogue of Trees T. 17.

H. *Cupressus meta* in fastigium convoluta quae semina
Plinii I. R. H.

H. *Thuya Theophrasti* I. R. H. *Arbor vitae* CLUS. hisp.
p. 95. *Thuya strobilis levibus squamis obtusis* LINN. In Armenia, M. Tauri, BELLON. In Polonia: in America septentrionali BARTRAM, in Sibiria GMELIN. In Hudsonbay ELLIS.

H. *Thuya strobilis squamosis*, squamis reflexo acuminate LINN. hort. Upsal. Ex america septentrionali. Nondum floruit.

J U L I F E R A E.

Saururus foliis profunde cordatis ovato lanceolatis spicis
solitariis propendentibus folio brevioribus ROYEN.
Serpentaria repeus floribus flamineis spicatis *Bryoniae nigrae*
folio ampliore pingui virgin. PLUKNET. T. 117. f. 3. 4.
Julus squamis fit simplicibus, oblongis, ad quarum quamlibet stamina sex apicibus bilocularibus pertinent. Baccæ

JULIFERAE.

tetrasperma cum quatuor tubis, conf. *Comment. Lit. Nor.* 1742. *hebd.* 52. T. V. f. 9. 10. & 1745. p. 414. seqq.

Salix persicae folio auriculato Helv. p. 151. *Salix folio amygdalino utrinque aurito* C. B. Folia lucida, rami fragiles, auriculae exiguae. Passim ad rivos.

Salix foliis elliptico lanceolatis, utrinque glabris serratis appendiculatis Helv. 152. *Salix folio auriculato splendente, flexilis* RAI. Folia multo duriora, minora, breviora, minute serrata, cum minimis auriculis. Rami flexiles, arbor praeculta. Passim circa pagos v. g. *Herperhusum*.

Salix alba arborescens C. B. A proxime sequente parum differt, si omnino alia est, fuscis ramis, vimine fragiliori, forte sibi permissa, neque putata arbor, cuius culta varietas vitellina fit.

Salix lento vimine & squama florali flavis, foliis elliptico lanceolatis, subtus sericeis Helv 152. *Salix sativa lutea folio crenato* C. B. Ubique seritur & putatur. Vimen flavum, aurantium, fuscum, flexilissimum. Juli odorati.

H. *Salix orientalis* flagellis deorsum pulchre pendentibus, I. R H. Cor. BRUKMAN. *Epist. itiner* 71. r.

Salix foliis utrinque levibus, inferne glaucis, squamis & capsulis tomentosis. Helv. p. 153. *Salix humilior* foliis angustis subcoeruleis, ut plurimum binis sibi oppositis RAY. In pratis.

Salix procumbens foliis ovato lanceolatis subtus sericeis *Salix humilis repens* LOBEL. adv. p. 130. In pratis uidis & torfaceis ducatus Cellensis. Sa-

Salix foliis ovatis sericeis julis crassissimis. In hanc speciem plurimas nunc salices veterum conGrego, quae adeo variabili natura sit. Juniorum & florentium folia integra ovata sunt, & tenera. Juli mares ovales, crassi, flavique. Capsulae, lanuginosae. Adultae plantae ampliora folia & subtus rugosa, & evidenter crenata, & binis auriculis ferratis tanquam adpendicibus aucta sunt. In Bructero M. longioribus foliis & rugosis reperi. Ubique in dumetis & sylvis.

Salix angustis & longissimis foliis, subtus albicantibus. I. B. Helv. 155. Ad sepes ubique. Alia varietas repeatitur foliis brevioribus & latioribus, quam non audeo separare. *Salix folio oblongo incano.* C B. Gegen Herperhausen.

Ad has paucas, sed certiores, species malui reducere nostrates salices, quam incertas species venditare. Summam difficultatem facit diversitas, quae inter juniorem plantam eamdemque adultam est, & etiam sexus saepius molestiam auget.

Populus foliis subrotundis dentato angulatis, utrinque levibus. Cliff. 760. Helv. p. 156. *Populus tremula* C. B. In sylvis.

Populus foliis deltoidibus acuminatis serratis. Helv. p. 156. Ad aquas.

Populus foliis subrotundis dentato angulosis subtus tomentosis LINN. *Populus alba* Matth. p. 136. An der Ufer & in Rheni insulis.

10 JULIFERA E.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. C. B. Helv. 157.
Circa molendinum chartaceum *Weendense*, inque palude
ad Landolfshausen.

Betula foliis acuminatis ferratis Cliff. Helv. 158. Ve-
tulæ rami penduli sunt Neque diversa est *Betula tumila*
bononiensis ZANONI istor. ed. nov. p. 47. T. 31.

Betula foliis orbiculatis crenatis LINN. flor. Lap. T.
6. f. 4 GAGNEB. N. Act. helv. 1. p. 60. AMMAN Act.
Petrop. IX. T. 14 Utique in paludosis circa Bructerum,
& circa Chaudefonds Helvetiae.

Carpinus Enum Helv. p. 158.

Quercus foliis annuis oblongis, superne latioribus,
subtus auminatis, angulis obtusis Cliff. Helv. 159.
Quercus cum longo pediculo. C. B. *Quercus* PASS. ic. P. alt
T. 99.

Corylus stipulis ovatis obtusis Cliff. 448. Helv. p. 159
Corylus sylvestris C. B.

Fagus C. B. Helv. 160. *Hêtre* Spect. de la Nat. II.
p. 466.

H. *Castanea sativa*, hic infructifera. *Castanea* PASS. P.
alt. ic. 113.

Xanthi-

JULIFERA E.

ii

Xanthium caule inermi LINN. *Xanthium s. Lappa minor* Matth. p. 1209. In horto, & circa lacum salsum Hermundurorum, & circa Allendorf.

H. Xanthium Lusitanicum laciniatum validissimis aculeis munitum MAGN. hort. reg. monsp. *Xanthium Lusitanicum spinosum* HERM. par. p. 247. VOLC. flor. p. ult.

H. Ambrosia maritima C. B. *Ambrosia marina nostra peregrina* DONAT. p. 18. *Ambrosia maritima artemisiae folio inodoris elatior* H. L. B. p. 35. nostrae propior. Ad ripas maris mediterranei.

H. Ambrosia Canadensis altissima hirsuta Platani folio. In Canada & Virginia. Flores mares rariusculi in petiolis solitariis: calyx communis totius fasciculi semiquinquefidus: flosculi viginti, petiolo lato, campanula cylindrica quinquedentata, intus apicibus quinque connatis in vaginam s. tubum, ex quo stylus fine cavo dilatato prodit. Feminae flores ad basin marium in alis foliorum positi. Involucrum semenis octaedron ex duobus copis factum, in circulo maximo coeuntibus, in quo ipso circulo aliquot aculei obtusi nascentur. Ex cono secundo eminet tuba, dnoibus recurvis corniculis fissâ. Semen ovato gigantinum.

H. Hysterophorus Ambrosiae folio VAILL. r. In America.

ISOSTE-

I S O S T E M O N E S.

H. *Gnaphalodes Lusitanica* I. R. H. *Gnaphalio di*
Dioscoride PONA Baldo p. 6. Micropus LINN.
Gnaphalium supinatum echinato semine PLUKNET. Almag.
T. 187. f. 6. non bene. Ad ripas maris mediterranei.

Empetrum procumbens. In M. Bructero abunde.

H. *Lentiscus Lob. II. p. 9.* In Italia, Gallia, Hispania,
Palaestina, Asia minore, &c.

H. *Liquidambar. Styrox arbor virginiana Aceris folio*
H. AMST. I. ic. 98. *Liquidambari &c. CATESBY T. 65.*
In America septentrionali r.

Fraxinus excelsior C.E. Ubique in sylvis.

Myrica foliis lanceolatis fructu sicco LINN. Chamelae-
agnus DODON. pempt. add. In ducatu Cellensi passim, ut
ad lacum versus Escheden.

H. *Myrica - - quae Laurus Africana minor folio Quercus*
COMMELYN. hort. T. II. p. 161. T. 81. BURMAN Dec.
Afr. T. 98.

Viscum Hely. p. 162. In malis, pīris, &c.

H. Eu-

H. *Buxus* foliis rotundioribus C. B. Basileae sponte, & passim in Germania meridionali.

Rhamnus spinosus foliis ovatis acuminatis ferratis Helv. Helv. 163. *Rhamnus catharticus* vulgo. In adscensu in M. *Hengst*, ad M. *Pless*, & ad patibulum *Eovendense*.

H. *Rhamnus inermis* Comment. Soc. Gott. T. II. ic. *Frangula altera polycarpos* C. B. Prodr. p. 160. In Helvetia supra *Dornach*; in M. *Grandvi*; circa *Ferrieres d' Erguel*. Plantae sexus femina & androgyna, illi bacca tetrapyrena cum tuba quadrifida, hujus sexus nondum satis notus. Cortex interior aurantius, folia ovata argute ferrata, nervis parallelis eleganter distincta, levissima.

Frangula era folii integra Helv. 164. *Alnus nigra baccifera* C. B. Passim in *humidis & aquosis*, circa *Landolfskansen*.

H. *Alaternus* II. CLUS. hisp. p. 56. In Syria, Hispania Minorca. Calyx campaniformis, in quinque acuta segmenta fissus; stamina quinque introrsum conversa, fructus subrotundus, & tuba in tres spongiolas divisa.

H. *Jujuba sylvestris* I. R. H. SHAW. travels p. 47. *Ziziphus rutilus* CLUS. hisp. p. 50. *Letus VIRGILII MARTYN* Georg. L. II. p. 155. In Syria, & Africa. Ex fructu a Cl. COLLINSONO missa nata arbor, iterum perire, absque flore.

14 ISOSTEMONES.

H. *Morus alba* &c.

H. *Morus nigra*. &c.

H. *Ficus communis* C. B. *femina*.

H. *Ficus Bengalensis* folio subrotundo fructu orbiculato
COMM. hort. Amst. I. p. 119.

H. *Menispermum canadense* scandens umbilicato folio.
T. Mem. de l' Acad. des Scienc. 1705. p. 2. *Hedera monophyllos convolvuli foliis Virginiana* PLUKNET. T. 36. f. 2.
ut cunque.

H. *Celtis fructu nigricante* I. R. H. *Lotus arbor* LOBEL.
& II. p. 186. In Helvetia transalpina prope Clavenam
TURNERUS : in Languedocia copiose ASTRUC.

H. *Bosea arbor*. *Frutex peregrinus horti* *Boseani gerva*
Mora WALTHER hort. p. 24. T. X.

Ulmus fructu membranaceo Cliff. Helv. 167. Ejus
varietates.

- α *Ulmus campestris* & Theophrasti C. B.
- β *Ulmus montana*. In sylvis sponte.

Lupulus Helv. 166. &c. Ad sepes.

Cannabis vulgaris mas & femina *Kelenji* *Ausjava*
H. MAL.

H. MAL. T. X. t. 16. Videtur, et si florem feminam faciunt. bifolium.

H. Ceratonia. *Ceratia siliqua* LOB. ic. II. p. 104. In Toscana, Languedocia.

H. *Laurus vulgaris* C. B. Antiochiae & in M. Tauro. Folia calycis quatuor alba, evata : staminia tria abique duabus glandulis ad basin positis : sex alia, & alias octo, cum duabus glandulis sub anthera sitis : fructus rotundus cum tuba simplici, & stigmate lato, cavo. Haec sepe conjuncta florem fecerunt androgynum, alias seorsim posita, dioicum.

H. *Laurus indica* ALDINI b. *farnes.* p. 60. Calyx trifolius, foliis semicartilagineis nitentibus. Petala tria pulposa sericea. Staminum ordo externus sex simplicium breviter petiolatarum antherarum. Ordo alter trium staminum cum duabus glandulis adfidentibus Tertius trium staminum simplicium: omnium vero antheiae bilocularis. Fruktus subrotundus, tuba apice oblique truncato. Character adeo a Lauro valde diversus.

H. *Rheum* foliis glabris cordiformibus *Rhaponticum* P. ALP. ex p. 187. BLAKWEL. T. 363. *Rhabarbarum rotundifolium* verum MUNT. hist. f. 197. Utrumque in Tartaria Chinensi, hoc etiam in Mont'dor.

H. *Rheum* foliis acutis crispis subhirsutis. *Rhabarbarum folio criso flagellis rarioribus & minoribus* AMM. Mus. petrop.

16 I S O S T E M O N E S.

petrop. p. 206. folio longiori hirsuto crispo florum thyrsō longiori hirsuto & tenuiori AMMAN. n. 9. Huic folia longiora plicata, hirsutiora, flores subvirides minores, reliqua similia.

Lapathum acetosum sexu distinctum, foliorum sagittatorum hamis longis & divergentibus. Helv. 168. *Acetosa arvensis lanceolata* C. B. In rupibus, muris, areis carbonariis.

Lapathum acetosum sexu distinctum, foliorum sagittatorum hamis brevibus Helv. 168. *Acetosa pratensis* C. B. Varietas hujus est *Acetosa montana maxima* I. R. H. Ad *Bruceum* M. ROYER. p. 127.

H. Lapathum acetosum sexu distinctum foliis planis cordiformibus. *Acetosa montana lato ari rotundo folio* BOCCONE museo T. 125. diversa a vulgari, foliis latis brevibus, hamis brevissimis. Ex alpibus Helv.

H. Lapachum acetosum androgynum calycibus triphyllis. *Acetosa arborescens subrotundo folio ex insulis fortunatis* PLUKNET. T. 252. f. 3. 4. Calyx huic trifidus.

H. Lapathum acetosum valvis exterioribus amplissimis strepentes. *Acetosa Americana longissimis pedunculis donata*. MORIS. Sect. V. T. 28.

H. Lapathum acetosum androgynum pedunculis incrassatis, bicornibus. *Acetosa ocimifolio βουκεταληγος* COLUMN. Ephras. p 150. Nempe pedunculus caput bubulum refert, incurvum, cum duabus valvis exterioribus

bus patentibus, tertia contra petiolum reflexa. Valvae interiores serratae sunt, & semen continent. Prope Altersberg M. HOFMAN. In Neapolitano regno COL. r.

Lapatha aegre separabilia seminalibus integris.

H. *Lapathum* foliis cordatis paniculis aphyllis. L. *Alpinum* folio rotundo C. B. *Lapathum majus*. f. *Rhabararium monachorum* J. B. II. p. 985. a. Ex alpibus helveticae, ex montibus Polonicis. Huic folia circa pedunculum excisa, flores superiores in spicis androgyni, inferiores feminini, si recte notavi.

Lapathum foliis oblongis, paniculis aphyllis. *Lapathum longifolium*, *crispum* MUNTING h. brit. p. 104. *Lapathum sylvestre*, folio subrotundo, involucro seminis recto seu plano MORIS. Huic frequentes in calycis exterioribus foliis verrucae, folia in universum oblonga, lata, acuta, ferrata, paniculae absque majoribus foliis intermisstis. A priori aegre persuadeor diversum esse. Ejus varietates sunt folio acuto criso C. B. quo *Lapathum* foliis hastatis ex Sibiria missum, & *Lapathum aquaticum* folio cubitali C. B. in fossis urbanis, omnium longissimis foliis nascens, & *Lapathum kortense* folio oblongo C. B. parum a priori diversum refero, & denique *Lapathum venis* foliorum sanguineis sive *Lapathum* folio acuto rubente MORIS. S. V. T. 27

Lapathum foliis acutis verticillatum. *Lapathum aquaticum minus* C. B. *Hydrolapathum minus* LOBEL. ic. p. 286. & *Lapathum acutum minus* LOBEL. ic. p. 284. cui folia imma obtusa, superiora longa, acuta, ferrata, undulata, flo-

18 ISOSTEMONES.

res in raros verticillos inter longiora folia positi, a quibus notis forte separari ineretur. Ubique in fossis.

Lapatha seminis valvis dentatis.

Lapathum foliis obtusis, ora crispa, calycis valvis interioribus serratis. *Lapathum vulgare* folio obtuso C. B. *Lapathum vulgare* album folio subrotundo MUNTING. Brit. p. 68. Ad vias.

H. *Lapathum arvense* subhirsutum, folio retuso, caule longius brachiato, capsula seminis crenata TILLI hort. Pisani T. 37. f. 2. Valvae seminis multo acutiores & profundius dentatae, quam in vulgari, semina etiam majora.

Lapathum perenne, foliis longissimis, calycibus ciliatis Burgold Dock PETIVER hort. brit. T. 2. *Lapathoides fistuloso* caule, angusto, salicis folio, semine in calyculis echinatis latente AMMAN. n. 228. Anthoxanthon I. B. II. p. 987. *Lapathum aquaticum*, luteolae folio BOCC. Mus. di piant. T. 104. Passim inter Holtenzen & Bovenden in via publica, gramine tenui vestita. Circa Seeburg & Sülbeck. Circa Potsdam ROLOF.

H. *Lapathum annuum*, foliis lingulatis, verticillis densissimis, ciliis calycis longissimis. *Lapathum aegyptiacum annuum*, parietariae folio, capsula seminis longius barbata TILLI T. 37. Tres valvae simplices extus, tres interius longissimae, quinque ad septem ciliis pinnatae.

H. *Atriplex* caule erecto, annuo, foliis triangularibus. Cliff. 469. *hortensis alba* sive *pallide virens* C. B. *Atriplex* BLAKW. T. 99. H. Atri-

H. Atriplex fruticosa, foliis ovato triangularibus, incanis.
A latifolia, sive halimus fruticosus latifoliis MOR. *Halimus*
 I. CLUS. *bisp.* p. 53. *Halimus* LOB. ic. p. 393. Ulyssippone
 ad mare, Hispali ad sepes.

H. Atriplex fruticosa, foliis lingulatis, incanis. *Atriplex maritima, angustissimo folio* I. R. H. *Halimus* II. CLUS. p. 54. *Portulaca marina s. crithmum* DONAT. p. 74. Ad mare mediterraneum. Flores mares concavi, foliis quinque, & quinque antheris fiunt, flores feminini quinque foliis, verrucosa eminentia notatis. Ea quinque folia in duos erectos mucrones procurrunt. Tubae duae & tres.

Atriplex foliis incanis, serratis, capsulis quadrangularibus, dentatis. *A. sylvestris fructu roseo, compresso* C. B. Prodr. p. 58. RUPP. p. 341. Ad muros *Langensalzae* vorm *Mühlhäuserthor*. In pago *Ermsteben*, & *Burgau*, in Thuringia.

Atriplex foliis triangulis, rariter dentatis. *Atriplex folio hastato s. deltoide*. MORIS. *Delt Orrach, & Deltsea Orrach* PETIVER. H. B. T. VII. Ad fossas circa Holten-sen: circa fontem salsum *Harstensem*, & circa *Salzderhelden*, pulposior, ubi in salsis nascitur.

Atriplex annua, foliis imis sagittatis, superioribus lingulatis, valvis feminis dentatis. *Atriplex vulgaris angustifolia cum folliculis* I. B. II. p. 973. *Spear Orrach, & Graff-sea Orrach*. PETIVER. H. B. T. 7. In hortis sponte, adque vias fossaque & simeta. A priori proxime abest.

H. *Chenopodium* foliis sinuatis, subhirsutis. *Botrys*. In alveo fluvii Broye Helvetiae. In Hungaria, comitatu Goeritensi, ducatu Mediolanensi, Toscana.

Chenopodium foliis sinuatis, subtus incanis. *Chenopodium angustifolium laciniatum minus* I. R. H. *Rands Oak Elite PETIVER.* T. 8. Circa aquas salsas ubique, & Jenae auf der Insul.

H. *Chenopodium* foliis subhirsutis, oblongis, dentatis. *Botrys mexicana odorata MUNTING* f. 118. *Botrys Americana ZANON*, ed. nov. p. 75. T. 50.

Chenopodium foliis levibus, difformiter dentatis, calycibus rubris. *Chenopodium* folio laciniato, coma purpurascente VAILL. *Thik Shining Elite PETIVER.* H. B. T. 8. *Atriplex sylvestris latifolia* C. B. Ad vias auf der Allee &c.

Chenopodium foliis levibus, viridibus, septangulis. *Chenopodium stramonii* folio VAILL. T. 7. f. 3. *Maple Elite PETIVER* l. c. Faetet & venenatum est. In hortis.

Chenopodium foliis subtus farinosis, rhomboideis, dentatis Enum. *Helv.* p. 175. *Chenopodium opuli folio* VAILL. T. VII. f. 1. *Frostelite* &c. PETIVER. H. B. T. 8.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis, acutis, summis, linearie lanceolatis Cliff. Enum. *Helv.* p. 175. *Chenopodium* folio sinuato candidante I. R. H. Valde vereor, ut a priori aliter, quam aetate differat, ut illud junius, hoc adultius sit.

Chenopodium foliis triangularibus, sagittatis, margine integrimis Cliff. Enum. *Helv.* p. 174. *Chenopodium* folio triangulo I. R. H. *Lapathum unctuosum MUNTING* brit. Ubique ad summa & ruderosa. Cheno-

Chenopodium ex alis racemosum, foliis glabris, rhomboideis, ferratis. Chenopodium latifolium minus ramosum, florum petiolis longissimis, ex foliorum alis confertim nascentibus BUXBAUM Cat. Hall. p. 69. cum ic. Ad lacum salsum in arundinitibus & ad ripas. Circa Schiltigheim LIND.

Chenopodium faetidum, foliis farinosis, glaucis, obtuse rhomboideis. Enum. helv. *Garosinus* DOD: p. 616. *Chenopodium foetidum* BLAKWEL T. 100. Circa Jenam, Langensalzam, Basilcam, Biennam, Genevam.

Chenopodium foliis ovato lanceolatis, integerrimis Helv. p. 176. *Chenopodium betae folio* T. Par. p. 187. *Blitum sylvestre* CAMER. epit. p. 237. All seed Blite PETIVER. T. 7. In agris & hortis sponte nascitur.

H. *Chenopodium foliis linearis lanceolatis, recurvis, dichotome ramosis, setis terminatis* GMELIN: Comment. Gott. 1752.

H. *Chenopodium foliis subulatis, planis, subitus convexis* LINN. *Chenopodium sedi folio, minimo, facie Kali, semine splendente* BOERH: *Kali minus* LOB. ic. p. 394. Ad ripas maris mediterranei, Monspelii &c.

H. *Chenopodium foliis linearibus, hirsutis, adscendentibus.* C. *villosum lini folio* I. R. H. In China & Japonia.

H. *Lerchia foliis obtusis* Comment. Gott. 1751. p. 223. Shrub Stone Crop. PETIVER T. 8. *Chenopodium sedi folio minimo, frutescens, perenne* BOERH. nam habitus erectus non sinit esse *Chenopodium* BUXBAUM p. 21. T. 31. f. 1. etsi nomen convenit. Folia glauca, punctata;

hinc convexa, inde plana. In Persia ad mare hyrcanicum: ad mare Britannicum.

H. Lerchia foliis filiformibus acutis. *Chenopodium altissimum*, *foliis succulentis* BUXB. Cent. I. p. 21. T. 31.f. 2. (videtur) Utrique harum plantarum fructus columnae similis, oblongus, non depresso, membranaceus, tubae tres, ad quinque.

H. Salsola foliis pungentibus LINN. I. R. H. *Tragum* MATTH. p. 1035. LOB. ic. p. 797. Passim ad mare mediterraneum, Monspelii &c.

Beta alba I. R. H.

H. Beta sylvestris maritima C. B. similis omnino vulgari toto charactere. In ripa maris Britannici, Hibernici.

H. Spinachia vulgaris, capsula seminis aculeata, mas & femina.

H. Spinachia vulgaris, capsula seminis non aculeata. *Spinacia* BLAKW. T. 42.

H. Spinachia foliis angulosis, caule ramosissimo. Mares flores calyce quadrifido tetrastemones. Feminis capsulae echinatae, foliolo terminatae, continent semen ovale unicum. Ex Sibiria.

Amaranthus procumbens, foliis ovatis, emarginatis Cliff. *Helv.* p. 176. *Blitum album minus* CAMER. epit. p. 236. *Small garden Blite* PETIVER T. 7. Monoecia est, calyce triglumi, staminibus & tubis terciatis, semine simplici. In hortis, & in arenosis ad Rhenum.

H. *Amaranthus erectus*, foliis emarginatis. *Blitum pulchrum*, *magnum*, *rectum*, *rubrum* I. B. Monoecium: flores mares triglumes, tristemones, feminae triglumes, capsula monosperma cum tribus tubis.

H. *Amaranthus racemis cylindraceis*, pendulis, longissimis LINN. *Amaranthus maximus*. C. B. Monoecius: calyce quinquefolio, staminibus quinque. Sub flore angustum folium riget. Feminis calyx similis; fructus monospermos, bicornis: sub flore etiam gluma aristata.

Reperitur $\alpha.$ viridis.
 $\beta.$ maculatus,
 $\gamma.$ ruber. &c.

H. *Amaranthus racemis cylindraceis erectis*, aliis spinosis Cliff. EUMPF. L. VIII. c. 44. *Amaranthus indicus spinosus*, *spica herbacea* HERM. H. L. B. p. 333. Monoecius: calyce quinquefolio, staminibus quinque, fructu monospermo, tricorni. r.

H. *Amaranthus capitulis subrotundis*, lateralibus foliis lanceolatis acuminatis. Cliff. *Tricolor vulgo*. Calycis squamae tres & stamina tria in ratis, feminis calyx similis, fructus monospermos, tricornis.

H. Amaranthus spicis lateralibus conjunctis Cliff.
Amaranthus sylvestris maximus novae Angliae totus viridis
 I. R. H. Monoecius est: calyx quinquefolius, ovarium monospermum, cum tubis tribus, stamina maribus quinque, & sub flore gluma aristata.

H. Amaranthus Virginianus latifolius, spicis purpureis tenuituis. A Cl. SIBTHORPIO semen habui. Planta a vulgatis mihiique notis diversa est: foliis ovato lanceolatis, spicis ex summis ramis strigosis, quasi hispidis, ob longitudinem squamarum floribus subjetarum. Monoecius est: flore mare quinquefolio, glumis aristatis, pentastemone; feminae fructus monospermos, tubae tres.

H. Amaranthus foliis ellipticis, racemis in alis sessilibus: *A. frutescens angustifolius*, *Ceylanicus* ac *Gangticus* Randi. Folia angusta, ovato lingulata. flores virides in racemis ad foliorum alas. Monoecius est, flaminibus & foliis calycis tribus, & fructu perinde tricorni monospermo.

H. Celosia foliis lanceolatis ovatis Cliff. Est autem Amaranthus *a.* Spicatus I. ruber

2. ruber & flavus M O R. S. V.

T. 31.

3. fla-

3. flavus.

4. ruber pallens

5. flavus pallens

$\beta.$ cristatus

Androgynus est, staminibus quinque connatis, fructu polyspermo, tuba simplici, apice breviter trifido. Calyx quinquefolius, cum squamis ad basin accessoriis, ut in aliis amaranthis.

H. *Celosia* floribus rigidis retroversis. *Scheru cadelarii* H. MALAB. T. X. tab. 79. *Amaranthus spicatus ceylanicus*, foliis obtusis BURM. thes. T. 3. f. 3. *Amaranthus spicatus perennis siccus* BOCC. T. 9. In Japonia &c. Calyx primus trifolius, alter quinquefolius rigens, stamina conata quinque, quorum antherae cum plunulis purpureis alternant. Tuba recta simplex. Semen unicum lenticulare. Flos maturus contra caulem reflectitur.

H. *Chenopodiomorus* foliis rariter ferratis. *Atriplex sylvestris lappulas habens*. C. B. *Spinacia fragifera* ALDIN. p. 84. In Rhaetia, Anglia.

H. *Chenopodiomorus* foliis argute dentatis. *Chenopodiomorus major Tartarica*. An n. 3. Randii? *Blitum fragiferum maximum polyspermum* AMMAN. n. 239.

'*Trichis tristemoni*, foliis conjugatis. *Marina incisa* *anthyllis* &c. LOBEL. ic. p. 468. Flos pentagonius: calycis folia quinque, alis albis, acuta, cava, plicata, super cavita-

26 ISOSTEMONES.

tem in spiculum coeunt; Stamina tria: Fru^{ct}us conicus polyspermos, Tricapsularem facit LINNAEUS *Philos. bot.* p. 258. Tubae tres. Folia ovata conjugata: in summis caulinibus paniculae nudae: Sub divisionibus petiolorum squamæ splendentes lanceolatae. Circa Monspelium, Veronam.

H. Triclis pentastemon foliis umbellatis. *Comment.* Gatt. 1752. Cauliculi umbellis florum pendulorum terminati, quæ ex rosulis foliorum linearium obtusorum prodeunt. Calycis foliola quinque, albo viridia, stamina totidem, tubæ tres, fructus ovato conicus, trilocularis, polyspermos, semina nitida lenticulata. In Sibiria; Africa.

H. Axyris herbacea amentis masculis corymbosis pendulatis MARTINI *Comm. Gott.* 1752. Folia pallida, ovato lanceolata, obtusa, integerima. Flores mares ramos terrinant, spicati, gluma oblonga, hirsuta & stamine unico facti; Feminini sub maribus primo bifolio calyce, deinde involucro tenero, plumoso, quadrifido recti, feminæ margaritiformi. Tubæ duæ filiformes. In Sibiria.

H. Corispernum hyssopifolium IUSSIEU *Mem. de l' Acad. des Scienc.* 1712. cum ic. Spicae masculae, ut in Axyri, ramos terminant, sunt autem uno, duobus, tribusve faminibus. Inferiori loco semen solitarium nudum, compressum, cum duabus tubis. In Tartaria, Sibiria. H.

H. Ceratospermum GERBERI *Ceratocarpus* BUXB. *Act. Petrop.* T. I. p. 241. In arenosis Tartariae Russicae.

Parietaria foliis ellipticis. *Parietaria officinarum* & *Dioscoridis*. C. B. Circa Northeim.

Parietaria foliis ovatis. *Parietaria minor* *ocimi folio* MUNTING T. 227. *Parietaria Ocimi folio* TRAG. BOCC. p. 47. & *Alsines folio sicula* ib. Sponte nascebatur in horti Gottingensis area, antequam coleretur. Nunc evanuit. Etiam in Asia minori FOCOK.

H. *Urtica* racemifera maxima finarum, foliis glaucis, subtus lanuginosis PLUKNET. *Amaltheia*. 212.

Urtica foliis oblonge cordatis Helv. 177. Cliff. *urens maxima* C. B. BLAKWELL. T. 12. Dioicia: Ubique locis ruderiosis nascitur.

H. *Urtica* pilulifera, foliis cordatis, circumferratis. *Urtica urens prior* DOD. MALCHANT. p. 323, Schorigenans H. MAL. II. ic. 39. In Anglia PETIVER: inque Gallia, Italia, Oriente. Moguntiae TURNER. Monoecia.

H. *Urtica* pilulifera, foliis ovatis integris: *Urtica altera pilulifera parietariae foliis* I. R. H. MALCHANT. p. 323.

H. *Urtica* foliis profunde laciniatis, feminine lini AMMAN. n. 249. T. XXV. Ex Sibiria.

Urtica androgyna, foliis ovatis, amentis cylindraceis LINN. Helv. 178. *Urtica urens minor* C. B. Ubique ad sepes.

Bistorta foliis imis appendiculatis, feminine triquetro. Helv. 178. *Bistorta* CAM. Epit. p. 683. Folio magis & minus rugoso ludit. Ubique in pratis uidis.

Bistorta foliis ad oram nervosis, imis ovalibus, superioribus linearibus Enum. Helv. p. 179. *Bistorta minor* f. *alpina* CAMER. epit. p. 684. Small *Bistort*. PETIVER. T. V. Semen compressum gigartinum: Alpina est.

Persicaria foliis ferratis, spica densa cylindrica. *Potamogeton salicis* folio C.B. *Fontalis* f. *Potamogeton* DODON. Cereal. p. 227. Passim in fossis & in stagnis. Eadem in siccioribus fossis hirsuta, erecta, reperitur, & paulo rarius, floret tamen: Segmenta floris in ortu macula saturatori vel glandula ornata, tuba bicornis est, staminis. Est *Amphibious Arsmart* PETIVER herb. brit. T. 3.

Persicaria vaginis florum ciliaribus spicis interruptis densioribus Helv. p. 190. *Persicaria mitis* BLAKWELL. *herbal.* T. 118. In hortis ubique & ad vias. Tuba bicorins. Stamina quinque ad osto, plerumque tamen sex. Pleraque vaginæ ciliatae sunt. Nonne varietates alba & rubra sunt *Velutta Mudela Muccu* H. MAL. XII. T. 36. & *Schoranæ mudela Muccu* T. 77. & *Belutta Modela Muccu* X. T. 80. quod idein nomen cum primo esse videtur. Adeoque fere toto in orbe nascitur.

Persicaria foliis subtus tomentosis Helv. 181. DALIBARD flor. Paris. p. 119. *Silver Arsmart* PETIVER herb. brit. T. 3. Gottingae reperta, varietas insignis prioris est, Per-

Persicaria foliis angustissimis, pene glabris, spicis interrumpitis rarissimis, vaginis ciliaribus. Helv. 181. *angustifolia* C. B. Prodr. p. 43. *In der Lith.*, sylva inter Lenglern & Bovenden. Etiam varietas est mitis speciei.

Persicaria acris, spicis longis strigosis, vaginis non ciliatis. Helv. 181. *P. Urens*, f. *hydropiper* I. R. H. In fossis vulgo: Stamina etiam sex & tuba profunda bifida.

H. *Persicaria orientalis* Nicotianae folio, calyce florum purpureo T. Cor. Comm. rar. f. 43. Tuba bicornis, stamina octo; in principio segmentrum floris octo glandulæ. Semen triquetrum.

H. *Persicaria montana*, latifolia, racemosa AMM. n. 240. In Sibiria passim. Huic stamina septem, octo. Semen triquetrum. Tubæ tres, glandulae obscuræ.

Fagopyrum erectum, fructu ex calyce eminente levi Enum Helv. p. 172. *Frumentum Saracenicum*. MATTH. p. 394. Stamina octo, glandulae octo, tubae tres. Colitur in Saxonia inferiori.

Fagopyrum erectum, fructu ex calyce eminente ferrato: *Fagopyrum* erectum fructu aspero AMM. n. 242. In Sibiria, Finnia. Flos viridis, semen triquetrum ferratum, tuba tripartita, glandulae obscuræ.

Fagopyrum vulgare scandens. I. R. H. Stamina octo, glandulae nullae, tuba tripartita. In agris ubique.

30 . I S O S T E M O N E S.

Polygonum vulgare latifolium C. B. *Polygonum mas* MATTH. p. 951. *Stamina octo, semen triquetrum, tubae tres.* Multas varietates habet PETIVER T. 13.

II. *Polygonum perenne, vaginis amplissimis Polygonum marinum* PETIVER T. 10. *Stamina octo. Semen triquetrum. Tubae tres. Ad ripas maris mediterranei, Monspelii &c.*

De generibus harum plantarum multum nuper disputatum est. Ex staminibus oporteret unire *Polygonum* cum *Persicaria amphibia*: deinde *Persicarias* reliquas, *Bistortas* & *Fagopyra*. Ex glandulis, secundum CL. BOEHMERUM, cum *Persicaria amphibia*, & *Nicotianae* folio, *fagopyrum* erectum unum genus efficerent, *Persicariae* reliquae *Fagopyrum scandens* & *Polygonum* genus alterum. Ex semine triquetro *Persicaria Sibirica*, *Fagopyra tria*, *Polygonum* & *Bistorta prior*, deinde *Persicariae* reliquae, & *Bistorta* altera genera peculiaria efficerent. Ex feminibus, glandulis & staminibus compositis plura genera nascerentur, & tot fere quot species sunt. An omnes conjungendae, ut nuper LINNAEUS in *Mat. med.*? Et quomodo *Polygonum* tunc ab *Herniaria* separabitur, si semen nihil valet, neque stamina, neque glandulae?

Herniaria calycibus bractea nudis LINN. *Herba Turca* LOB. ic. p. 421. *Um Northeim, Herzberg, Schartsfeld, Jena.*

Hernia-

I S O S T E M O N E S. 31

H. Herniaria bracteis nitidis, flores superantibus
LINNAEI. *Paronychia hispanica* CLUS. *hisp.* p. 473.
Polygonum argenteum angustifolium & *latifolium* MUNT.
hisp. f. 231. Circum Salmanticam, Monspeliuni, Massiliam, in
Palæstina.


Illecebrum LINN. *Polygonum parvum*, fiore albo, verticillato VAILL. T. 15. f. 7. Abunde in arenosis Celle-sibus.

Thesium LINN. *Anonymos Lini folio* CLUS. *Pann.* p. 312. In montibus Germaniae, ut in M. Weisner Hassiae, Altenstolberg & circa Jenam passim.

M E I Q S T E M O N E S.

Alchimilla foliis integris stellatis polygoniis Helv. 184.
Alchimilla BLAKWELL T.12. *Stellaria* CAMER. Ep. p. 908.
In nemoribus abunde.

Alchimilla foliis mollibus, semitrilobis, lobis incisis.
Parsley Pier PETIVER. T. 9. *Percheper vulgo.* Etiam
quatuor minora segmenta intermedia in flore habere, & ex
basi tubam monet Vir Cl. P. C. FAERICIUS flor. luzz. p.
41. In agris nostris passim.



D I P L O S T E M O N E S.

Knawel annum majus, flore minori Helv. p. 186. *Polygonum minus polycarpon* TAB. p. 834. In agris passim; tum procumbens, tum erectum.

Knawel incanum, flore majori perenne RAI. *Synops. III.* *T. V. f. 1.* Upright Knawel. PETIVER. *T. 9.* *Polygonum polonicum cocciferum* BREYNE de coco rad. f. 1. In arenosis cellensibus circa Engesen & alibi. Penitus a priori diversum, erectum, humilius, floribus majoribus, ora laciniarum alba.

Chrysosplenium foliis alternis Helv. p. 189. amplioribus auriculis I. R. H. Copiosissime am Geismar Baechlein im Walde. Calyx patulus quadrifolius, stamina octo, fructus unilocularis, in duas valvas revolutus. Petala nulla. Longe plus differt a Saxifraga, quam Celosia ab Amarantho.

P O L Y S T E M O N E S.

H. *Euphorbium tetragonum* & *pentagonum spinosum* Canarinum BOERH. *Tithymalus aizoides fruticosus aphylllos quadrangularis* & *quinquangularis*, *spinis geminis atroviridibus armatus* H. Amst. T. II. p. 270. Ex Africa calidiori.

H. *Euphorbium afrum* caule squamoso tuberoso minus BOERH. *Euphorbium erectum aphyllum ramis rectundis tuberculis quadragonis* BURMAN. Afric T. 8.

H. Ti-

H. Tithymalus aizoides africanus, simplici squamoso caule
COMMEL, prael. p. 57.

H. Tithymalus, qui *Euphorbium polygonum spinosum*
cerci effigie ISNARD. Mem. de l' Acad. 1720. p. 385.
Tithymalus aizoides arborescens spinosus, caudice angulari
Nerii folio COMM. b. Amst. T. I. c. 13. Flores quinque
vel sex in summo caule. Calyx campaniformis in quin-
que squamas crassas transversim latus divisus, intus balsa-
mo plenus. Tuba simplex.

H. Tithymalus aphyilos mauritanicus DILL. Elth. p. 384.
T. 289.

H. Tithymalus indicus frutescens COMMEL. H. Amst. I. f.
14. *Tiru Calli H. MAL. T. II. f. 44?*

H. Tithymalus foliis cruciatis, sub floribus cordatis,
longe acuminatis, scutis bicornibus, obtusis Helv. 189. *La-*
thyris DOD. p. 375. In calidis partibus Europae, Hetru-
ria, Helvetia transalpina.

Tithymalus foliis subhirsutis, ad caulem ellipticis, cym.
bis florum perfoliatis, levissime bifidis, petalis lunatis,
acutis. Helv. 190. *Tithymalus sylvaticus*, lunato flore COL.
Ecphras. p. 55. In sylvis circa Gottingam abunde.

H. Tithymalus - - *Annon Tithymalus Characias legitimus* I. CLUS. bisp. p. 436. ubi umbella nimis ramosa pin-
gitur. Arborescit, caule & foliis hirsutis, ictis ellipticis
confertis, firmulis. Radii sub umbella vix evidentes, ova-
ti,

ti, breves. Involucrum proximum triflorum fit ovatis foliolis, per quartam sui partem connexis: scuta atropurpurea, obtusa,

Tithymalus laticaulis, radiis ternis cordatis, ramis umbellam superantibus. *Ejula palustris* RIV. in tetrap. irreg. *Ejula major* DOD. purg. p. 185. In pratis uidis prope Lauche, in loco, ubi olim fuit pagus Oberndorf & in Hetruria, Helvetia, &c. Involucrum ex tribus foliis obtusis, serratis fit. Petala flava, obtusa. Capsulae verrucosae.

Tithymalus fruticosus, foliis levibus integerrimis obtusis, involucris cordatis, bifoliis *Enum. Helv.* p. 192. *Tithymalus Characias rubens Germanicus* C. B. In iusulis Rheni prope Schreck, Marggraviatus Badensis.

Tithymalus foliis glabris, serratis, acuminatis, involucris bifoliis, cordatis, fructu toto verrucoso *Helv.* p. 191. *Tithymalus arvensis latifolius germanicus* C. B. Ubique in arvis.

Tithymalus foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, umbellae involucro quinquefolio. *Ejula Solisequa* RIV. tetrap. In Helvetia, & Northingae, in sylvis legi. Habitu umbellae sessili, in involucro quinque radiorum luteo, se prodit, & foliis non serratis ab arvensi differt. Involucra secunda cordata, fructus verrucosus, in commissura levis.

H. *Tithymalus* foliis ovatis, spina terminatis, petalis longe bicornibus. Perennis & ramosus est, foliis ovatis, glabris, in spinulam terminatis, caule brachiatō. Sub prima divisione folia tria ovato lanceolata, sub altera bi-

na cordato rhomboidea, & ita sub reliquis. Scuta rotunda convexa emittunt praelongas spinas erectas. Synonymum non reperi.

H. *Tithymalus* foliis ellipticis, spinula terminatis, petalis lunatis, serratis. *Tithymalus* foliis brevibus aculeatis SEGUIER Veron. T. I. p. 154. T. 3, Adfinis paralio, sed folia ovatis angustiora, in spinulam terminata, conferata. Sub umbella folia quina ovata latiora. Umbella flava, involucrum secundum bifolium fere cordiforme, tertium simile: Scuta flava, lunata, undique ferrata.

Tithymalus foliis linearibus spinula terminatis radiis umbellae plurimis reflexis. *Tithymalus paralius ex hortis* DOD. p. 570. Circa Seeburg, ad vias etiam remotas a lacu falso, & in Alsacia ubique. Folia pene linearia, conferata, in aculeum terminata. Involucrum universale octo & decem foliis fit, reflexis, peculiaria ex duobus foliolis cordiformibus: icuta obtusa, emarginata. Fructus levis.

Tithymalus foliis linearibus, obtusis, petalis emarginatis. *Tithymalus amygdalooides, angustifolius* ap. RUPPIUM p. 273. *Peplis annua, foliis acutis, flore muscoso* BOCC. pl. sic. T. 13. f. 1: Circa Langensalze & Tilleda in agris: Adfinis paralio, facie & umbella universali, diversus tamen foliis minus firmis paucioribus, latescentibus ad 10 usque lineas, obtusis, etsi spinulam producunt. Involucra secunda cordiformia cum arista. Scuta etiam obtusa, emarginata.

Tithymalus foliis linearibus obtusis, confertis, petalis lunatis. *Helv.* p. 193. *Tithymalus cyparissias* FUCHS. p. 812. *Gottingae non vulgaris.* *Unterm Boksbühl,* & circa Friedland, Grossenschnellen &c.

Tithymalus foliis linearibus obtusis, petalis argute bicornibus *Helv.* p. 193. *Ejula exigua* TRAGI p. 296. Ubique in hortis.

Tithymalus foliis subrotundis ferratis, radiis umbellæ quinis, latissimis. *Helv.* p. 194. *Tithymalus helioscopius* CAM. *Epit.* p. 963. Laetè dulci, foliis ferratis, petalis subrotundis adgnoscitur.

Tithymalus foliis ovatis, involucris bifoliis cordatis obtusissimis *Helv.* p. 193. *Ejula folio rotundo* RIVINI *Tetrap.*

H. Clutia foliis petiolatis. *Frutex aethiopiae portulacæ-folio, flore ex albido virescente* COMMEL. *hort.* Amst. T. I. p. 177.

H. Phylica foliis ovato linearibus LINN. *Alaternus africanius* ERICAEFOLIO, floribus albicantibus muscosis. *Hort.* Amst. T. II. c. I.

H. Chamelaea tricoccos. *Chamelaea* CLUS. *bisp.* p. 170. DOD. *purg.* p. 125. In Gallia calidiori.

H. Jatropha foliis cordatis angulatis LINN. *Cassava* MERIAN. *Surin.* F. 5.

H. Ricin.

H. *Ricinus* foliis peltatis, palmatis, serratis, petiolis glanduliferis LINN. *Ricinus vulgaris* MOR. S. X. T. 3; *Avanacu* H. MAL. T. II. f. 32. Ic. MERIAN. sur. 30. Hispania, Africa, Asia calidior.

Varietas caule rubro. *Ricinus americanus major rubicundus* MUNTING. hist. f. 234.

H. *Ricinus americanus* CLUS. ad MONARD. p. 8. ALDIN. p. 86. fructu glabro r.

H. *Acalypha* LINN. *Mercurialis tricoccos hermaphroditica* ad foliorum juncturas ex foliolis cristatis julifera semper & fructum ferens BANISTER ap. PLUKNET. T. 99. f. 4; In Virginia. Facile apud nos consuevit, & quasi sponte provenit.

Mercurialis caule brachiatō, foliis glabris Cliff. Helv. p. 194. *Mercurialis* CAM. ep. p. 996. *Spicata* & *testiculata* officinarum. Passim in hortis, videtur ex regionibus calidis paulatim irrepisse. TURNERUS enim observat incipere in Anglia adparere. L. II. p. 56.

Mercurialis caule simplicissimo, foliis scabris Cliff. Helv. p. 194. *Mercurialis montana*, *spicata* & *testiculata* C. B. *Cynocrambe femina* CAM. Epit. p. 999. & mas p 998. In sylvis frequens.

H. *Mercurialis fruticosa*, foliis ovatis lanuginosis. *Phyllum mariscum* CLUS. hisp. p. 398. & *seminificum* p. 399. In Hispania & Gallia Narbonensi & Monspelii r.

H. Thelygynum LINN. *Alpine COL. pbytobas.* p. 30.
Neapoli. Flores mares in summa planta bifolii : inter ea duo
 folia stamina tredecim quatuordecimve, antheris bilocularibus.
Feminae flores inferioribus foliis insident, in vaginis
 albis siccisque petiolorum. *Fructus* petiolatus, globosus, cum
 semine simili. *Tuba* simplex. *Folia* ovato lanceolata con-
 jugata.

Asarum *Helv.* p. 195. *CAM.* *Epit.* p. 19. In sylvis
 ubique.

AQUATICAE.

Chara vulgaris factida *VAILL.* *Mem. de l' Acad. de
 Scienc.* 1719. T. III. f. 1. *Equisetum granulosum* sub aquis
repens *Flor.* *quasimodogen.* p. 31. ic.

Linnopeuce *CORD.* *Helv.* 197. *bist.* p. 50. *VAILL.*
l. c. *Planta Equisetorum faciem referens* *SEGUIER.* *fl.*
Veron. *V.* I. p. 102. T. I. In rivo, qui a *Rasenmühle* de-
 scendit ad *Rosdorf*. Copiose in lacu *Seeburgenfi*. In pratis
 ad *Salz der helden*.

Zanichellia tubae ligula integra *Helv.* 198. *Zanichellia*
palustris major, *foliis gramineis acutis*, *flore cum apice*
quadricapsulari, *embryonis clypeolis integris*, *& vasculo non*
barbato, *capsulis seminalibus ad costam dentatis* *MICHEL.*
not. *gen. plant.* p. 70. T. 34. f. 1, optime. In rivo ad
Rasenmühle. Stel-

Stellaria foliis omnibus angustis apice resecpto Helv.
p. 198. PETIVER H. B. T. V.

Stellaria foliis ad caulem angustis, in summitate subrotundis. Helv. p. 198.

Stellaria foliis omnibus subrotundis. Helv. p. 199. In summa parte plantae inter rosulas foliosas flores mares, facti duobus petalis lunatis, ad se invicem conversis, & uno stamine praelongo, & anthera gemina. Feminis fructus bicollis, qualibet parte iterum linea divisa, duas tubas producens, inferiori loco positus. Ita reperio, aliter quam VAILL.

Potamogeton foliis oblongo ovatis petiolatis Cliff. Helv.
p. 199. Potamogeton FUCHS. p. 651.

Potamogeton foliis ovatis longissime petiolatis. Helv.
199. *Fontinalis lucens major*. I. B. III. p. 177. Long.
Pondweed PETIVER. herb. brit. T. V. Im Lichten meere
aufm Heimberge. Folia longa, amplissima, ovata aut
utrinque ovato lanceolata, nervis & ipsis ellipticis, oris
plicatis. Spicae cylindricae, densae & longae.

Potamogeton foliis cordatis amplexicaulibus LINN.
Potamogeton rotundifolium alterum LOESEL. ic. 65, In
lacu ad Bürenshausen.

Potamogeton foliorum oris plicatis, molliter spinosis
Helv. p. 220. *Fontinalis crispa* I. B. In Leina & rivo am
Schützenhof.

Potamogeton foliis lanceolatis, oppositis acuminatis
ROY. Helv. p. 200. *Fontalis media lucens* I. B. Passim in
 aquis lente fluentibus.

Potamogeton foliis planis longissimis, spicis crassioribus
 Helv. p. 200. *Potamogeton racemosum angustifolium* C. B.
 In rivo am Schützenhause & alibi.

Potamogeton gramineum latifolium LOESEL. ic. 66.
Broad Grasspondweed PETIVER. *herb brit.* T. V. In Leina.

Potamogeton foliis gramineis, undulatis, spicis exiguis.
 Helv. p. 201. *Potamogeton gramineum tenuifolium* LOESEL.
 ic. 67. Folia breviora priori & undulata.

Potamogeton pediculis florigeris longissimis, glomerulis
 storum remotis Helv. p. 201. *Potamogeton pusillum* BOC-
 CONE Plant. rar. Sicil. T. 20. f. 5. *Narrow Grass Pond
 Weed* PETIVER. H. B. T. V. parvitate adgnoscitur &
 interruptis spicis; quas satis longa intervalla separant.

Pentapteris floriferus in alis sessilibus Helv. p. 202.
Knotted pond Weed PETIVER. H. B. T. V. *Myriophyllum
 aquaticum minus* VAILL. Mem. de l' Acad.
 1719. (sed potius longius est) In rivo an der bleiche, ubi
 cum Leina confluit.

Pentapteris scapis florigeris nudis Ennem. Helv. p. 201.
Myriophyllum aquaticum majus VAILL. Mem. de l' Acad.
 1719. p. 30. *Feather pondweed & Milfoil Pondweed*
 PETIVER. H. B. T. V. Jenae in Sala proxime Kamisdorf-
 sursum versus die Schniedemühle. Supremi flores masculi

li foliis constant calycinis ovatis quatuor, staminibus octo pene sessilibus. Feminae inferiores sunt fructus quadranguli in quatuor mucrones educti, terrasperni, quibus a Potamogetone differt, cui quatuor semina nuda sunt.

Ceratophyllum foliis asperis bis bifurcatis Helv. p. 202.
Equisetum sub aqua repens, foliis bifurcatis LOESEL flor. p. 67. ic. n. 12. Ubique in fossis circa urbem.

G R A M I N A.

NARDUS. Calyx nullus, folliculus biglumis, locusta uniflora.

Gramen sparteum juncifolium SCH. Um die Oderbrücke.

HORDEUM Char. Locusta triflora, aristis sub folliculis positis, calyx nullus.

Hordeum flosculis lateralibus masculis aristatis Cliff.
Gramen hordeaceum minus & vulgare C. B. Ubique ad sepes.

Hordeum distichum, hexastichum & polystichon seritur. Sponte hordeum in Atholia scotiae provincia nasci CARDANUS auctor est varietat p. 109.

Gramen secalinum DILLENII. An der Leine & alibi locis aquosis.

Gramen hordeaceum montanum, spica strigosiore, brevius aristata SCH. p. 16. *Prodr T. I Ueber Herperhausen in sylvis. Flosculi laterales mihi potius imperfecti, & meris tribus aristis constantes visi sunt.*

ALOPECURUS. Folliculus biglumis, calyx unifolius, locusta simplex uniflora, aristam ex basi glumae producens.

Gramen aquaticum, geniculatum, spicatum. C. B. *Gramen fluvatile album TAB. p. 217. In fossis natatile.*

Gramen spicatum, spica cylindracea longiore, tenuissima SCHEUCHZER. p. 69. *Gramen Alopecuroides spica longa tenuiori H. OX. III. p. 192. T. 4. f. 12. Auf dem Rosdorferwiese.*

ISCHAEMVM. Calyx uniglumis, folliculus biglumis locusta uniflora.

Gramen daCtylon spicis villosis C. B. *Th. In regione Rhenana Germaniae, & Helvetia.*

LOLIUM. Folliculus biglumis, calyx uniglumis, locusta composita, dorso axi spicae obversa.

Gramen loliaceum angustiore folio & spica C. B. *Theatr. p. 127. ad vias.*

Gramen loliaceum, spica lata, ex pluribus spicis, duplice fere vertu dispositis composita *Helv. p. 206. Gramen loliaceum spic-*

spicis brevibus & latioribus compressis. H. OX. III. p. 182.
S. Vlll. T. 2. f. 2. Ad vias.

Gramen loliaeum, spica longiore, sive *Lolium*
DIOSCOR. *Lolium CAM.* Epit. p. 198. In segetibus uidis
abunde.

TRIHICUM. A *Lolio* differt media parte locustae axin
respiciente. Arista semper ex summo dorso glumae.

Scritur vulgo *Triticum* spica mutica & rarius *Zea*.

Gramen latifolium spicae tritica compacta C. B. Prodr.
n. 53. amplissimis foliis & altissimum ad rivos nascitur.

Gramen latifolium spica triticea divulsa C. B. Prodr.
n. 54.

Gramen caninum arvense sive Gramen *DIOSCORIDIS*
C. B. Ad sepes & in hortis. *Queken.*

Idem longius aristatum Helv. p. 208. VAILL.
T. 17. f. 2.

Gramen spica triticea, compacta, hirsutum, aristatum
SCH. p. 9. Circa Rode Thuringiae & locis aquosis.

Gramen loliaceum corniculatum T. aut. de Paris p. 35.
In sylvis & dumis.

Gramen loliaceum corniculatum, spicis glabris I. R. H,
In pratis, im Paradiexe.

Gramen bromoides segetum, latiore panicula Helv. p.
209. *Festuca graminea effusa juba* C. B. Prodr. n. 65. In
sylvis.

Gramen panicula multiplici minus C. B. SCH. *Um grossen Vahuern* abunde, & circa Bürgel.

Gramen pratense, panicula duriore laxa, unam partem spectante RAI. Syn. III. p. 413. T. 19. f. 1. In pratis.

Gramen foliolis juncis brevibus, majus, radice nigra. C. B. Prodr. n. 34. In locis siccis.

POA. A Tritico differt locusta mutica.

Gramen loliaceum panicula multiplici & spicata SCHEUCHZER p. 200, T. 4. f. 6. Ad vias.

Gramen aquaticum fluitans multiplici spica C. B. Th. p. 41. f. *αγρωτις ποταμις*. In fossis aqua plenis. Hoc est Gramen mannae verum BECMAN. plant. march. p. 702. 719.

H. Gramen tremulum maximum MOR. S. VIII. T. 6. Veronae, Monspelii.

Gramen tremulum majus C. B. Gramen leporinum Gramen Tremulum. TAB. p. 131. In pratis.

Gramen palustre paniculatum altissimum C. B. Theatr. Gramen paniculatum aquaticum latifolium MORIS. III. p. 201. T. 6. f. 25. Circa Lauche, Jenae aufm Paradies & versus Kunitz. Im Dänkerhäuser teich.

Gramen paniculatum, radice repente, loculis distichis pulchellis SCHEUCHZ. p. 198. In muris.

H. Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus & magis crispis SCHEUCHZ: T. 4. f. 14. r.

Gramen pratense paniculatum minus. C. B.

Gramen pratense paniculatum medium. SCH.

Gramen pratense paniculatum majus SCH. Vulgatissima omnia.

Gramen paniculatum majus angustiori folio C. B. P. odr. n. 10. H. OX. III. p. 201. T. 5. f. 19. bcn. ic. Versus Herperhausen.

Gramen palustre paniculatum minus SCHEUCHZ. C. B. Panicula ex viridi & argenteo varia, non amplissima. Calycis glumae duae acuminatae muticae. Folliculi fere duo, basi villosa. Gluma exterior latiuscula five emarginata, exque ejus basi subtilis arista, inflexa. Interior gluma gracilior. Jenae versus Kunitz.

Gramen locutis rubris I. B. II. p. 434. zu Pleß häufig, & in M. benöt.

Gramen montanum avenaceum, locutis muticis tumentibus, pilosum SCH. p. 170. In sylvis circa Schelplan.

Gramen spica cristata subhirsutum H. OX. III. p. 194. T. 4. f. 7. An Steinen gegen den Heynholtze.

Gramen avenaceum lanuginosum, glumis minoribus C. B. Theatr. p. 157. Aufm Fuchsberge, & alibi circa Jenam.

Gramen paniculatum, angustifolium, alpinum, locutis rarioribus, angustioribus, non aristatis SCHEUCHZ.

β. Gramen cirrhosis & villosis spongiolis ad singulos nodos donatum BOCCON. Mus. T. 69. Cum spongiolis reperi in vallecula super Edigebansen, qua in sylvam adscenditur.

Gramen paniculatum aquaticum miliaceum VAILL. p. 89. T. 17. f. 7. In via, quae dicit *Geismar*, aquosis & alibi in udis.

Gramen montanum, panicula spadicea delicatiore SCHEUCHZ. p. 129 locis siccis.

MILIUM Glumae seminales latiusculae, semen obesius, splendens, reliqua prioris.

H Milium semine luteo. C. B.

H Milium semine nigro. C. B. In Africa seri solet.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa C. B. Gramen miliaceum vulgare. H. OX. III. p. 197. T. 5. f. 10.

Gramen dactylon, folio latiore. C. B. Theatr. p. 119. In segetibus aufm Hagen.

ARUNDO Folliculus biglumis, calyx biglumis, muticus, loculis papposissimis.

H. Arundo panicula diffusa, calycibus trifloris ROYEN. *Arundo sativa* quae *Dorax* *Diosc.* & *Theophrast.* C. B.

H. Arundo americana striata MUNT. f. 108. Varietas lineis picta prioris.

Gramen serotinum arvense, panicula contracta pyramidali SCHEUCHZ. p. 148. Aufm Auersberg bey Stolberg.

Arundo vulgaris Phragmites. In fossis

Gramen aquaticum paniculatum phalaridis semine SCHEUCHZ. p. 126.

β Gramen striatum album LOBEL. ic. & adv.
Sponte in allobrogum montosis.

AVENA. Folliculus biglumis, calyx biglumis, muticus, folliculus aristatus, arista ex dorso prodeunte, articulata vel inflexa.

Gramen pratense paniculatum molle. H. OX. III. p. 202. T. 6. f. 34. locis uidis.

Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente. H. OX. III. p. 214. T. 7. f. 17. In lapidosis versus Herperhausen.

Gramen paniculatum minimum molle SCHEUCHZ. p. 215. Gramen paniculatum purpuro-argenteum, loculis parvis, annum H. OX. III. p. 200. T. 5. f. 11. In arenosis Jenensis. Um die neue Schenke. Um den Regenstein.

Gramen avenaceum, capillaceum, minoribus glumis RAI. p. 1288. Gramen avenaceum paniculatum alpinum &c. SCHEUCHZ. Prodr. T. IV. Abunde in sylvis super Hardesgen. Um den Regenstein.

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente, loculis parvis RAI. SCHEUCHZ. p. 223. versus Edigebausen in sepitus & circa Reinhansen.

Gramen avenaceum loculis lanugine flavescentibus SCHEUCHZER. p. 239. Aegilops DOD. Cereal. p. 143. In segetibus e. g. versus Heimberg.

Gramen avenaceum panicula purpuro - argentea splendente SCHEUCHZ. p. 226. In pratis.

Gramen nodosum avenacea panicula C. B. In M. Anstersberg &c.

Gramen avenaceum loculis viridi spadiceis loliaceis brevius aristatis SCHEUCHZ. p. 266. Auf der Welm se prope Jenam.

Gramen avenaceum montanum spica simplici aristis recurvis RAI. Syn. III. p. 485. T. 20. f. 1. In siccis ad vias v. g. versus Rohringen.

BROMUS. Ab avena differt aista infra apicem glumae prodeunte, recta.

Gramen avenaceum loculis villosis crassioribus I. R. H. Gramen avenaceum, loculis majoribus squamatis, seget. le majus. H. OX. III. p. 212. T. 7. f. 16. In segetibus.

Gramen avenaceum villosum loculis canticibus & aristatis. I. R. H. Gramen avenaceum pratense panicula squamata & pilosa. H. OX. III. p. 213. T. 7. f. 18. In agris.

Gramen avenaceum panicula sparsa loculis majoribus & aristatis I. R. H. SCHEUCHZ. Bromus herba DOD, Cereal. p. 141. Ad vias.

Gramen typhoides molle SCHEUCHZ. Gramen typhoides medium folio lanuginoso HiST. OX. III. p. 191. T. 5. f. 8. Ad ripas Leinae abunde.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa SCHEUCH-ZER p. 144. In agris.

Gramen segetum, panicula arundinacea SCHEUCHZ. p. 244. Simili loco.

H. Gramen panicula pendula, aurea I. R. H. *Gramen aureum* DAL. Lugd. p. 431. Valde peculiare est. Floribus fertilibus duae glumae graciles albæ, aristatae, folliculus uniflorus: ad basin glumæ muticæ solitaria longissima aristata. Altera gluma aristam ex apice producit, ipsa gluma longiorem. Stamina tria. Aliae numerosæ locustæ multorum ordinum steriles & muticæ. Peculiaris ergo generis est.

FESTUCA. *Folliculus biglumis, calyx biglumis, in folliculi altera gluma aristata longissima.*

Festuca junceo folio C. B. Prodr. p. 19. SCH. Circa Quedlinburg ad vias abunde.

Gramen sparteum, pennatum. *Gramen plumbeum* MUNTING. f. 173. In ruderibus arcis Kunitz & in M. Fuchsberg. In Marchia BECMANN. ROYER in M. Secberg. In Hungaria, Veronæ, Monspelii. Spica quadriflora, quinqueflora, rara. Calyx perangustus, ejus gluma altera longior, utraque mutica, mucronata. Folliculi gluma exterior emittit aristam triquetram, unde longissima plumula exit, altera tenerior & mutica est.

ANTHOXANTHON. *Folliculus biglumis, aristatus, calyx
biglumis, aristatus.*

Gramen pratense, spica flavescente C. B. *Theatr.* p. 44.
Ubique in siccis.

Gramen glumis variis C. B. *Theatr.* p. 153. In M.
Plesse praeruptis rupibus.

Gramen spicatum folio aspero C. B. ad vias.

TYPHOIDES. *Phleum LINN.* Calycis duae glumae
aequales, cavae, superne latae, ex angulo exteriori aristatae,
unde habitus bicornis. Folliculi ginmae aequales
semiovatae.

Gramen typhoides asperum alterum C. B. *Theatr.*
p. 52.

β. Gramen typhoides, culmo reclinato C. B.

Gramen typhoides maximum, spica longissima.
H. OX. III. p. 188. T. 4. f. 1. In pratis & agris. Ab
hoc parum differt *timothygraff* ex Virginia.

Gramen typhoides asperum primum. C. B.

H. Gramen alopecuron minus, spica rotundiore MOR.
S. Vlll. T. 4. *Alopecurus altera* DOD. *Cereal.* p. 148.
LOBEL. ic. 45. Monspelii. Calycis duae glumae papposae.
Folliculus unicus, cui altera gluma breviter aristata est, altera duas aristas ex apice educit, e dorso suo vero
longissimam aristam, tota gluma longiorem producit.
Adfinis Typhodi, separari tamen potest.

CYNOSURUS. Folliculus biglumis, calyx duplex.

Gramen pratense cristatum, sive spica cristata levi

C. B. Gramen cristatum *C.* Bauhini LOBEL. Adv.

II. p. 467.

H. Gramen daëylon indicum, spicis longioribus I.R.H.

Tijiti pulla H. MAL. T. XII. p. 149. Cum nomine Curcum ex Barbados accepi.

PANICUM a Milio differt folliculo triglumi. Aristae ad folliculum adsunt aut absunt, penitus hic incertae.

H. Panicum germanicum C.B. BROSSE T. 41.

H. Panicum Italicum, panicula majori MORIS. S. VIII. T. 3. numerosioribus floribus, aristis longioribus.

Gramen paniceum, sive Panicum sylvestre, spica simplici. *Panici effigie gramen, simplici spica* LOBEL. ic. p. 13.

Gramen paniceum, spica aspera SCH. *Gramen geniculatum* TAB. p. 200.

Gramen paniceum, spica divisa C. B. *Herbariorum Panicum sylvestre* LOB. ic. p. 42.

H. Phalaris major, semine albo MOR. T.V. 31. 8.

Phalaris LOB. ic. p. 43. DOD Cereal. p. 76. In Minorca.

H. Gramen spicatum perenne, semine miliaceo, fibrosa radice MICH, Minus, caetera Philaridi simile.

H. Mays granis aureis, conf. MOR. S. VIII. T. 13.

H. Mays granis rubentibus &c. Varietatem in Mays vidi, cum loco florum marium meri feminini essent imperfecti, granis rotundis, tubis brevissimis.

*H. Lacrumā Jobi H. AICHST. Aest. O. 13. T. 6. f. 1.
CLUS. hisp. p. 501. WOLF. Pollicit. *Cafri Conda* H.
MAL. T. 70. L. 12. *Sesamo annuo* ZANONI T. 101.*

*H. Coix seminibus angulatis L NN. Gramen daetylon
americanum maximum PLUKNET almag. T. 190. f. 1.
Sesamo Indico perpetuo ZANONI nov. T. 66. Habet duo
lata vera petala. In BROSSEI Tabb. pingitur.*

*H. Aegilops DODON Cereal. p 143. secunda MATTH.
Festuca graminea annua, sive Aegilops capitulis duris
MOR. S. VIII. T. 7. Spica brevis pauciflora. Calyx
communis fit duabus semiovatis squamis, in quatuor vel
quinque valentes semifoliaceas aristas, in una linea posi-
tas, contiguatis. Intra ejusmodi calycem flosculi quatuor.
Cuius gluma exterior apice tridentato est. In extremo
maximo flosculo dens unus brevis, medius est, & arista
uncialis, tertius mediocri mole sequitur, reliquis arista
successive minor est. Interior gluma cava, simplex, alba.
Intra eam semen magnum, hirsutulum, hinc concavum,
inde convexum, & petala duo plumosa brevia, & stami-
na tria. Tubae duas plumosae. Aliqui flosculi solent
abortire.*

CAREX spicis duorum sexuum distinctis.

Gramen caryophyllum, montanum, spica varia C. B.
Cyperoides MICHEL. p. 65. n. 77. T. 32. f. 9.

Gramen caryophyllum, nemorosum, spica multiplici
C. B. A priori parum differt. Est *Cyperoides* MICHEL. p.
65. n. 78. T. 32. f. 14. Versus *Pless* in sylva.

Gramen palustre, aculeatum, Germanicum, sive minus
C. B. *Theatr.* p. 109. In pratis inter *Hessendreisch* & *Besi-*
gehausen.

Cyperoides spicis parvis, longe distantibus SCH. *Gram-*
men cyperoides, gracile, alterum, glomeratis torulis, spatio
distantibus. H OX. III. p. 243. T. 12. f. 18. Ibidem.

Gramen cyperoides polystachyon flavicans, spicis brevi-
bus, prope summitatem caulis H. OX. III. p. 243. T. 12.
f. 16.

Cyperoides minus, spicis densioribus I. R. H. Bey
Rohringen & ad montem ad *Lütjelengen*.

Gramen cyperoides, tenuius spicatum H. OX. III. p. 243.
S. 8. T. 12. f. 9. *Im Lütjelenger Walde*

Gramen cyperoides, spica pendula, longiore & angu-
stiore C. B. In udis.

Cyperoides spica pendula, breviore SCH. Aculeata spi-
ca adgnoscitur. *An der Leine.*

Gramen cyperoides, latifolium, spica rufa, sive caule
triangulo C. B. H. OX. III. p. 242. T. 12. f. 1. In udis.

Gramen nigro luteum, vernum I. B. II. p. 494. Locis
ficcis gramineis.

GRAMINA.

Gramen cyperoides, caryophyllaeum, elatius, granis tumidioribus, spicis pediculis tenuissimis appensis MOR. III. p. 243. n. 13. *Im Hessendreischer Walde.*

Cyperoides palustre, spicis purpuro spadiceis, tenuibus pediculis insidentibus SCHEUCHZ. p. 467. Gramen cyperoides &c. H. OX. S. VIII. T. 12. f. 14. In udis.

Cyperoides spicis sessilibus, erectis, e seminibus conferatis, compositis RAI. In paludibus versus sylvam supra Geismar.

Cyperoides vesicarium, spicis viiidantibus, aut subfuscis SCH. *Im Stadtgraben beym Grohnder Thor, und im Rasemühlenbach*

Cyperoides majus, praecox, spicis turgidis, teretibus, flavescens H. OX. III. p. 242. T. 12. f. 6. bene.

Cyperoides polystachion, lanuginosum SCHEUCHZ. & I. R. H. In udis.

CAREX androgynus.

Gramen cyperoides, palustre, spica longiore, laxa. *Am Herperhäuser Teiche, und am Teiche der Rasemühle. Ad Landolfshausen, Seeburg &c.*

Carex spicis alternis, latis, laxius in spicam dispositis Enum. Helv. p. 244. Circa Oderbrücke.

Gramen cyperoides elegans, spica composita, asperiore MORIS. III. p. 245. In sylva hercynia.

Gramen cyperoides ex M. Ballon, spica divisa I. B. II. p. 497. *Um Oderbrücke, & prope Gottingam in M. Hagen versus Lengelern.*

*Gramini cyperoidi ex M. Ballon simile, spica tota
e pluribus spicis composita PLUKN. p. 178. T. 34. f. 7.
Auf dem Masch in pratis udis.*

*Gramen cyperoides majus, spica compacta C. B. Ubique
ad sepes udas.*

*Carex spicis brevibus, echinatis, sessilibus, distinctis
Enum. Helv. p. 245. Gramen nemorosum, spicis parvis,
asperis C. B. Theatr. Im Eulenloche, circa Walkenried.*

*Carex spicis minimis, in alis sessilibus Enum. Helv. p.
p. 243. Gramen cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in
florum alis H. OX. III. p. 243. T. 12. f. 17. bene. In
sylva bercynica.*

CAREX dioicus.

*Carex sexu distinctus. Gramen cyperoides spica simplici
crassa SCHEUCHZ. In udis circa M. Brüsterum*

*Cyperus minimus, panicula sparsa, flavescente
SCHEUCHZER p. 497. In udis non ratus.*

*Scirpus planifolius, spicis obesis, foliis insidentibus.
Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus C. B. Verus Scir-
pus est, aristा spicae longitudine sub qualibet spica.
Um Harste, Saltz der helden & circa Cellam.*

G R A M I N A

56 Scirpus planifolius, spica disticha. Carex montanus,
spica compressa, disticha RUPP. Um den Fürstenbrunnen
bey Zena.

Scirpus planifolius, panicula ramosa, foliis insidente.
Enum. Helv. p. 247. Gramen arundinaceum, foliis acutissi-
mis, panicula multiplici, Cyperi facie LOESEL. ic. 33.
Gramen cyperoides miliaceum C. B. Am Rasemählen Waffer.

Scirpus culmo unifolio, spica bivalvi, brevissima Enum.
Helv. p. 249. Juncus parvus, montanus, cum parvis capi-
tulis, luteis H. OX. III. p. 233. T. 10. f. 35. Circa
Oderbrücke abunde.

Scirpus teres, panicula ex summo culmo ramosa Enum.
Helv. p. 247. Juncus palustris, maximus, sive Schoenos
C. B. In stagnis.

Scirpus caule aphylo, spica inbricata, terete Enum.
Helv. p. 248. Juncus capitulis Equiseti, major C. B. Jun-
cellus cyperoides, capitulo simplici LOESEL. ic. 36. In pra-
tis udis ubique.

Linagrostis foliis teretibus, spica subrotunda, unica.
Juncus Alpinus, capitulo tannginofo, sive Schoenolaguros
SCHEUCHZ. p. 302. C. B. Prodr. T. VII. In sylva her-
cynia, udisque Cellensis.

Linagrostis foliis planis, spicis multiplicibus Enum.
Helv. p. 250. Gramen tomentosum, pratense, panicula
sparsa C. B. In den Herperhäuser Wiesen.

Schoenus

Schoenus locustis albicantibus, erectis. Gramen cyperoides palustre, leucanthemon. SCHEUCHZER p. 503. In Cellensi ducatu.

Schoenus spicis gemellis, obesis. Nova ni fallor planta, lecta circa Engesen ducatus Cellensis. Habitus prioris Schoeni, duro striato caule, folio ex vagina semilineam lata prodeunte, quae longa gracilis & nuda est. Spicae fere duae. Inferior prodit ex sinu folii triuncialis petiolo fulti, cui parva foliacea squama subest. Superior, quae terminatrix est, nascitur ex sinu folii penè biuncialis. Spica aliquid distichi sed inordinati habet. Locusta in una spica duodecim & ultra, teretes, conicae, acutae, barbulis efflorescentibus, biflorae. Folliculus quilibet habet squamam exteriorem spadiceam fere ovalem, & interiorem longam, acute conicam, convolutam. Semen lenticulare, collo longo in tubam producto, sedet inter tria stamina & tria filamenta. Ipso charactere a Schoeno diversa planta videtur, quam ob adfinitatem habitus cum priori reliqui.

Mariscus. Enn. Helv. p. 251. *Cyperus longus inodorus major, foliis & carina serratis H.* OX. III. p. 237. T. II. f. 24. Locusta teretes, acutae, fasciculatae. Calyx universalis bifolius, ovalis, ejus glumis succedunt duae alias squamae, longae siccaeque. Locusta biflora, stamina duo, tuba bicornis. Cuilibet folliculo suo oblonga gluma. Alia certe a Schoeno & Scirpo plauta. In Denkerhäuser Teich:

Juncus culmo aphyllo, durior, panicula magis sparsa.

Enum. Helv. p. 252, Juncus levis, panicula sparsa major.

C. B.

Juncus culmo aphyllo, mollior, panicula compactiori.

Enum. Helv. p. 252. Juncus levis panicula non sparsa

C. B. Uterque locis subudis & ad rivos frequens.

Juncus foliis caule trichotomo, floribus solitariis sessili

ibus ROY. Enum. Helv. p. 254. Gramen juncum bufo-

nium. TAB. p. 225. Ubique in viis uidis.

Juncus foliis mollioribus, carinatis, panicula multiplici
& ramosa Enum. Helv. p. 254. Juncus partus, cum peri-
carpiis rotundis I. B. Ad Leinam ubique. In ipsa Sibiria.

Juncus foliis duris, carinatis, floribus cartil=ginosis
Enum. Helv. p. 254. Gramen juncum foliis & spica jun-
ci C. B. Theatr. Gramen juncum, semine acuminato
LOESEL. ic. 29. Versus Cellam circa Bolwerk Thuringiae & circa Oderbrück in torfaceis.

Juncus foliis articulosis, ramosae paniculae, ramis se-
mel ramosis. Enum. Helv. p. 255. Gramen juncum, folio
articulato, aquaticum. C. B.

B. cum utriculis. *Auf den Herperhäuser Wiesen,* post fornisinum.

Juncus foliolis planis, pilosis, panicula in spicas conge-
sta. Enum. Helv. p. 256. Gramen hirsutum, capitalis
Psyllii. C. B. In sylvis.

Juncus foliis planis, latis, panicula ramosa, sparsa.
Enum. Helv. p. 256. Gramen hirsutum, latifolium, minus.
C. B. In sylvis. Jun-

Juncus foliis planis, latissimis, panicula sparsa, duplicito ramosa. *Enum. Helv.* p. 257. *Gramen luzulae maximum* I. B. II. p. 439. In sylvis montosis gegen die Oderbrücke.

Juncus foliis planis, latioribus, panicula umbellata, floribus minimis. *Enum. Helv.* p. 258. *Gramen hirsutum angustifolium majus*, C. B. In sylvis.

Triglochin fructu tenui, triloculari LINN. *Enum. Helv.* p. 258. *Gramen junceum spicatum* sive *Triglochin*, C. B. *Theatr.* p. 80. 81. In pratis uidis ubique.

Triglochin fructu ovato, sexloculari. *Gramen spicatum maritimum alternum* LOB. ic. p. 17. In omnibus pratis inter Harste & Barenzen.

Acorus AICHST. *Vern.* Ord. VIII. T. 9. f. 1. *Provenzalia* PETIT. Ep. III. p. 44. In fossis ducatus Cellensis, & Eimbeccae, tum in stagnis zu Bürgel, Bolwerk &c.

Sparganium culmo eretto, foliis triquetris. *Enum. Helv.* p. 259. *ramosum* & *non ramosum* C. B. In Gräben nach Bovenden.

Typha clava crassissima, cylindrica. *Typha palustris major*. H. OX. III. p. 246. T. 13. f. 1. Ad Denkerhausen & in fossis suburbanis.



PLANTAE PETALODEAE, MONOCOTYLEDONES, SPATHACEAE.

*A*rum foliis sagittatis, cucullo recto *Enum. Helv.* p. 261.

*A*rum *vulgare maculatum* & *non maculatum* C. B. *Arum.*

CAM. *Epit.* p. 365. 366. In sylvis frequens.

H. *Colocasia CLUS bisp.* p. 300. In Hispania. India, Aegypto.

H. *Arum maximum Aegyptiacum*, caulinis nigricantibus, *Ceylanicum* H. L. B. *Colocasia strongylorrhiza Zevanica*, *pediculis & limbis florum atropurpureis* HERM. *Parad.* p. 85.

H. *Arum Aethiopicum*, flore albo, odorato COMM. H. AMST. f. 50.

H. *Palma hortensis* f. *dactylifera*, *Palma LOB.* Sc. II; p. 234.

H. *Musa MERIAN.* f. 12. *Bala* H. MAL. T. I. T. 12. 13. 14. In Syria, Palaestina, Arabia, India, America. Ad characterem vide LINNAEUM in *Musa Cliff.* BREYNE E. N. C. Vol. VIII. I. C. TREW. *Dec. II. plant. rar.* & in C. LITT. 1739. h. 7. 1741. h. 49. 1740. h. 6. ACT. ETUD. 1734.

ORCHIDEAE, TUBA DESTITUTAE.

Orchis radicibus subrotundis, cucullo purpureo, maculato, labello bifido. *Orchis militaris major* C. B. SEGUYER II. p. 122. T. 15. In M. Hengst super L. Lengen. Calcar curvum, maculatum. Labellum bifidum, in duas partes quadrangulares fissum, absque media spinula, inter hiis labello brevioribus. Id pallidum purpura maculatum est. Tria petala cuculli exteriora purpurea, duo intermedia pallida, maculata omnia. Ovarium longum. Stipulae vix ullaæ.

Orchis radicibus subrotundis, brachiolis labelli brevioribus, spinula ex divisione medii trunculi eminente Ennem. Helv. p. 262. Stendelwurtz BRUNE. L. I. p. 103. *Orchis latifolia*, hirsute cucullo, major C. B. In adscensu ad montem super Borenden semel reperi, vulgarem in Helvetia, etiam in Suavia. Adgnositetur galea extus pura, cinerea splendente. Calcar ut in sequentibus cis finem latecens. Duo ex cuculli petalis interius purpureis lineis lineata. Labellum album, lineis parallelis, & maculis pilosis purpureis pictum. Crura & brachia purpurea. Ista valde gracilia, longiora corpore, haec breviora & latiora. Spina inter cruscula exit.

Orchis radicibus subrotundis, spica brevissima, labello punctato, ferrato, mutico. *Orchis militaris minor*. RUPP. III. p. 295. T. VI. In pratis siccis passim, in primis ad sinistra viae Rohringensis.

Orchis

Orchis radicibus subrotundis, labello divaricato.
Orchis militaris pratensis I. R. H. SEGUIER, T. XV. n. 4.
Pannonica IV. CLUS. *Tubingae* frequens in pratis uidis.

Orchis radicibus subrotundis, bracteis ovario longioribus, albo flore, *Orchis foetida, sylvatica, olba, praecox,*
barba luteola RUPP. III. p. 297. *Im Raubenthale und auf*
der Wellmese. Etiam in horto floruit. Folia ovalia, ob-
tusa. Spica rara, bracteae albae, cucullus ochroleucus
non lineatus, calcar ovario aequale, labellum luteo-
lum trifidum, medio segmento cordato, inciso, apices
albi.

Orchis radicibus subrotundis, floribus obsoletis, cimicem
olentibus, labello retro reflexo Enn. Helv. p. 264. *Or-*
chis hirci odore, minor C. B. In pratis inter Dorsten &
Osterode abunde, & circa Hardegsen.

Orchis radicibus subrotundis, cucullo sparso, labello
ampliter trifido, crenato, emarginato Enn. Helv. p. 265.
Orchis morio mas. C. B. *Satyrium mas.* BLAKWELL T. 53.
SEG. n. 5. Ubique in sylvis.

Orchis radicibus subrotundis, cucullo clauso, lineato,
labello ampliter trifido, crenato Enn. Helv. p. 266.
Triorchis serapias mas FUCHS, SEG. n. VII. *Orchis*
morio femina C. B. Frequens in pratis siccis. Flore albo
& elatiorem etiam reperi.

Orchis radicibus conicis, labello lingulato, longissimo,
Enn. Helv. p. 266. Testiculi quinta species CAMER.
Epit. p. 625, SEGUIER ic, floris l. c. n. X. In syl-
vis

vis, in primis tempore vespertino gratum odorem spargit.

Orchis radicibus subrotundis, calcare nullo, labello latiusculo, bisulco, brachiolis brevibus Enn. Helv. p. 268. *Orchis muscam referens minor* C. B. *Orchis Serapias III.* DOD. Cereal. p. 218. *Um Gescheröder felde, im Göttinger Walde, bey der Brück, recens an der Anhühe, circa Pless in sylvis, ubique rarius.* Splendor in vivente planta in flore caeruleus, in mortua degenerat in fuscum colorem feuille morte.

Orchis radicibus subrotundis, calcare nullo, labello trifido. Enn. Helv. p. 269, *Orchis trifolia, floribus spicatis, herbaceis.* SEGUIER. l. c. T. 16. f. 15. *Monorchis montana minima, flore obsoleto, vix conspicuo* MICH. p. 30. T. 26. In pratis versus Csterodam. Cuculli petala tria, ovato lanceolata, duo alia sub subula sua modo cordata, modo unice latiora. Labellum trisidum, medio segmento longiori.

Orchis radicibus palmatis, calcare ovario longiore, labello aequaliter trifido, unicolo. Enn. Helv. p. 271. *Orchis palmata minor, calcaribus oblongis* C. B. Ueber der Papier Muhle, auch bey Plesse, & passim in sylvis.

Orchis radicibus palmatis, calcare crasso, foliis maculosis, caule fistuloso. *Orchis palmata pratensis latifolia* C. B. &c. Ubique in pratis uidis. Medium segmentum labelli parvum, spica cylindrica. Varietates flore albo puro, albo & roseo venoso, & aliae occurunt.

Orchis

Orchis radicibus palmatis, calcare crasso, labello profunde trifido, serrato, caule solido. Orchis palmata, montana, maculata. C. B. Um Gescheröder feld und Hardegsen. Caulis altior. Medium segmentum labii inferioris angustius, oblongum, spica magis conica.

Orchis radicibus multis cylindricis, calcare brevissimo Enn. Helv. p. 270. Pseudorchis alpina, flore herbaceo. MICH. p. 30. T. 26. In summo Brüctero M. non frequens, copiosus circa Carolinas thermas, ab HAENELIO mihi missa.

Helleborine floribus obsolete carneis, raris, labello obtuso. Enn. Helv. p. 275. Helleborine palmistris nostras RAI. Auf der Herperhäuser Wiese. Im Landolfshäuser Morast. In pratis circa Seeburg.

Helleborine amplexicaulis, multiflora Enn. Helv. p. 275. Helleborine latifolia montana. C. B. flore pallido & atropurpureo im Göttinger Walde circa Pless &c. in sylvis frequens.

Helleborine latifolia, floribus magnis, paucis, albisque. Enn. Helv. p. 276. Helleborine latifolia vel Damasonium montanum, latifolium. C. B. Helleborine albo flore. TAB. p. 724. Im Göttinger Walde zwischen dem Hengst und Gescheröder feld, auf dem Lütjelänger Berg, rechts: auf der Brück, auf Pless. Passim ergo in nemoribus.

β. Helleborine longifolia, floribus magnis, paucis & albis. Enn. Helv. p. 275. Damasonium alpinum, floribus leteis. I. B. Aufm Eoksbühl. Helle-

Helleborine lengifolia, paucis, purpureis floribus.
Enum. Helv. p. 274. *Helleborine angustifolia* TAB. p. 725.
 Non est varietas albae prioris, cum multo longioribus &
 acutioribus petalis, & labello acuto non emarginato sit.
 In sylvis nostris passim circa Pless & alibi.

Helleborine bifolia, radice ovali, cucullo sparso *Comm.*
Gotting. 1751. p. 215. T. XIV. *Orchis liliifolius minor fabule-*
torum Zeelandiae I. B. II. p. 770. Circa Detersen reperta
 in horto fioruit.

Calceolus *Enum. Helv.* p. 276. & GMELIN *flor. Sibir.*
 T. I. T. I. *Elleborine recentiorum* I. CLUS. *hist.* Cum
 priori Helleborine reperta & in horto. Differt ab Hel-
 leborine cucullo tantum tetrapetalo, machina staminum.
 Huic pars prima est squama ovalis, sursum cava, linea
 divisa, deorsum gibba, innixa secundae, quae antrosum
 latecit, & crassa est, sursum gibba, deorsum cava, & pot-
 est pro tuba haber. Porro duae aliae partes ovato lan-
 ceolatae ab ea cylindro divergunt, quae singulae inferne
 adhaerentem habent antheram transversam, ovalem, unilocu-
 larem, ut duo stamina sint, non unum.

Ophrys foliis ovatis LINN. *Enum. Helv.* p. 277. *Ophrys*
CAMER. *Epit.* p. 943. Abunde in pratis, etiam futurba-
 nis, & sylvis. v. g. *Hessendreisch*, & super *Elligehansen*.

Ophrys aphylla. *Pseudoleimodoren.* CLUS. *hist.* p. 270.
 ic. In sylvis passim, im *Göttinger Wald*, *Hessendreisch*.



LILIACEAE TRILOCULARES.

H. *Cannacorus* flore luteo punctato I. R. H. RIV. T. III,
Canna indica lutea, maculis rufis punctata AICHST. aut
O. 2. T. 2. *Arnudo indica* florida PASS. autumn. T. IV,
Canna indica, flore luteo, punctato VALLET. T. 83.

H. Cannacorus flore coccineo splendente. *Canna indica* CLUS. hisp. p. 329. VALLET. T. 82. RIV. T. 110,
Canna indica rubra. AYST. aut. Ord. 2. T. 1. Icon.
BROSSEI. T. 30. *Katubala* H. MAL. XI. T. 43. ubi fusco
rubens dicitur. In Barbados insula, in Amboina Japonia. De
Charactere conf. Comm. Lit. Nov. 1743. p. 290. T. II. f. 3,
4. 5. 6. 7. 8. 9. & 1741. kebd. 50.

H. Gladiolus VALLET. T. 54. RIV. T. 109. *floribus*
uno versu dispositis, major & pricerior. I. R. H. *Viciorialis*
mas CORD. hyst. I. c. 32. Sponte in Borussia, Marchia,
Helvetia, Hibernia, Minorca, Languedocia.

H. Commelina radice anacampserotis ELTH. T. 79.

H. Commelina procumbens annua, saponariae folio H. ELTH. T. 78. *Carim gola* H. MAL. XI. T. 44. aut h. ec,
aut alia caerulea : alia etiam species est *Vetl acaitu* T.
VII. T. 58.

H. Commelina procumbens, flore luteo ROYEN.
Hanc, cum nova sit, liceat descripsisse. Perennis est, foliis
gracilioribus & solidioribus, quam reliquae. Flores in

sinum

sinum cavi folii recepti de more. Calyx trifolius, duobus foliis latioribus, uno angustiore, ad petala majora posito. Petala tria, imum minus, cavum, rotundum, duo majora reniformia, petiolata, flava. Tria stamina ex sede petali minoris, bilocularia, curva, tria alia sex crusculis flavis facta, quorum media minora, quatuor majora curva sunt. Ovarium & reliqua, ut in tota gente.

H. Iris vulgaris Germanica s. sylvestris C. B. petalis reflexis, violaceis, erectis aquate caeruleis. *Iris vulgaris latifolia caerulea.* AIST. Vern. O. 8. T. 5. f. 3. Arcus rotundus sub divisione petalorum tubarium. In Ecclisia, Helvetiae rupibus.

B. Iris eadem, sed petalis reflexis, caeruleis, erectis, albidis.

γ. Iris petalis reflexis fusco pictis, erectis luteis. *Iris Intea variegata.* LOB. AIST. vern. O. 8. T. 7. f. 2. Arcus ovalis sub divisione petalorum.

Iris inberbis, lutea, nervo folii eminente *Ennem. Helv.* p. 281. *Pseudo Iris painèris* H. AICHST. *Vern. Ord.* 8. T. 7. f. 3. Abunde in rivo defluente a *Lengelern* &c in pratis versus *Bovenden*. Arcus sub divisione petalorum tubaricrum bifidus, margine lacero.

fl. Iris humilis latifolia minor, flore purpureo. Ad Selengam fl. GMELIN. Arcus etiam rotundus. Varietas ex floris colore plurimae sunt.

Iris foliis linearibus, corollis in herbibus, fructu trigono, caule tereti LINN. *Enum. Helv.* p. 280. GMEL. p. 28. *Iris angustifolia* II. CLUS. p. 229. Circa Bubek & Waldek in pratis uidis. Acutangula ornamenta sub divisione segmentorum, arista unica.

B. *Iris sylvestris* peramoena LOB. ic. p. 69. Varietas prioris.

H. *Iris* foliis linearibus, corollis in herbibus, fructu hexagono, caule ancipiti LINN. *Iris graminea*, cui pereunt quotannis folia I. B. Ornamenta bifida & duae aristae sub divisione segmentorum.

H. *Iris foetidissima* f. *xyrus* I. R. H. In Hibernia, Anglia, Gallia, Veronae, Monpelii. r.

H. *Bermudiana* *Iridis* folio, radice fil' rosa, ELTH. p. 48. f. 43. T. 41. *Sisyrinchium Indicum* CORNUT. p. 165. In Virginia.

H. *Bermudiana* flore aurantio maculato. *Bermudiana* radice carnosa, floribus maculatis, seminibus pulpa obductis AMMAN. Petrop. XI, p. 308. T. 7. *Bermudiana* *Iridis* folio majori flore croceo, elegantissime punctato. ROLOF. hort. Crans p. 25. ic.

H. *Crocus vernus* variorum colorum. Ex alp. Helveticis.

Colchicum commune. *Enum. Helv.* p. 282. Aufm Mafse. Flore pleno & albo etiam repertum est. Idem est *Hermodactylus* PASS. ant. T. 18. Leuco-

Leucojum petalis aequalibus LINN. Emm. Helv. p. 294.
Narcissolencoicum vulgare I. R. H. Narcissus VII. CAMER.
Epit. p. 957. Im Busche über Geismar, im Eulenlocke,
Göttinger Walde &c.

H. Narcissi varii, Narcissus albus circulo croceo vel lu-
teo I. R. H., Narcissus medio lutens du PAS. T. 19.
 β IDEM flore pleno *Narcissus plenus LUS. p. 160.* In Mi-
norca, Monspelii &c.

H. Narcissus medio purpureus DOD. Coron. p. 189.
VALLÉT. T. 26. du PAS. T. 19. In Helvetia, Gallia.

H. Narcissus juncifolius major & minor du PAS. T. 41.
Monspelii omnes proveniunt.

H. Amaryllis f. Lilionarcissus indicus, flore albo, exte-
rius rubente I. R. H. Narcissus flore albo, exterius rubente,
SWEERTII.

H. Lilionarcissus Jacobeus, flore sanguineo nutante H.
ELTH. T. 162. EDWARDS of birds T. III. p. 132.

H. Lilionarcissus Japonicus, flore rutilo I. R. H. Thè
Guernseylilly DOUGL in proprio libro. Ex Japonia in
insulam Guernsey delatus, nunc sponte ibi nascitur.

H. Lilionarcissus africanus, pumilus, polyanthos I.R.H.
Iste nondum floruit.

H. Aloë americana AIST. O. 4. T. 2. folio in longum
aculeum exenante BRADLEY Succ. II. n. 1. Aloë Americana

florida ALDIN. 94. seqq. Flos subviridis, ut notissimum, fructui innatus, triquetre campaniformis, ad duas tertias sexfidus. Filamenta longa ex flore erumpunt, antheris bilocularibus. Tuba praelonga, fine tumido, tribus sulcis. fisso. Plurimus in cavitate floris succus, aquose dulcis. Ovarium ex rotundo triquetrum. Proprium libellum de ea Aloe edidit ILL. TREWIUS, & characterem depinxit Comm. Lit. 1744. T. 3. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

H. *Aloe americana*, folio longissimo & angustissimo, valde spinoso EOERH. Ind. alt. si diversa est p. 129.

H. *Aloe africana* caulescens, foliis brevioribus COMM. Prael. ic. 21.

H. *Aloe africana*, foliis glaucis, brevissimis COMM. Prael. 22. Folia glauca, aculeata, in summo altoque caule congesta.

H. *Aloe africana*, foliis glaucis, caulem amplexantibus COMM. b. amst. II. f. 14. TREW, Comm. Lit. 1744. p. 322. T. 2. f. 10. 11. In alto satis caule habet folia longa conjugata, etiam reflexa, oris spinosis, angustiora quam priora, spica speciosa. Flos triangularis, hexapetalos, in tubum unitis petalis, corallinus; segmenta tria angustiora, tria latiora, medio virentia, ovata, acuminiata. Stamina circa receptaculum nata, floris longitudine, inaequlia. Fructus cylindricus. Tuba simplex, fine simplici flore brevior. Hieme floret & saepe abortit. Succus acriter facet.

H. *Aloe*

H. Aloe africana eretta triangularis & triangulari folio viscosa TREW. l. c. T. II. f. 22. 23. 24. 25. 26. 27. COMM. *Prael.* f. 31. *H. ELTH.* f. 13. Flos difformis, tubulo angusto. Segmenta superiora tria alba, linea purpurea divisa, unum a duabus reliquis distinctum, tria inferiora ovata. Stamina tria longiora, tria breviora, ex receptaculo nata. Tuba finis crassior.

H. Aloe humilis africana arachnoidea COMM. *Prael.* f. 27. TREW. l. c. T. II. f. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Planta BOERHAAVII, quam dicemus, cum arachnoideae nomine, diversissima, minor & solidior est, spinulis brevioribus & atrovirens: haec glauca, major, mollior, spinis magis herbaceis.

H. Aloe africana, foliis glaucis, margine & dorso integro spinosis COMM. *Prael.* ic. 20. *H. Amst.* II. ic. 13. Flos tubulosus, rotundo triquetrus, ventricosus, ultra duas tertias contractus, segmentis paulum revolutis, haec tenus aurorae colore, reliqua tertia parte alba, mediis striis virentibus. Segmenta ad duas tertias secundunt, externa acuta, lanceolata, interna latiora & ovata. Stamina ex basi segmentorum, ex quo ipso exemplo GLEITSCHIANA methodus exceptionem patitur. Fructus ex tereti triquetrus Tuba curva filiformis, simplex, flore brevior.

H. Aloe africana, foliis glaucis, margine & dorso pare superiore spinosis, flore rubro. COMM. *Prael.* ic. 24. *H. Amst.* II. T. 12.

H. Aloe - - - similis, sed caulescens, folio longiori, in apice dorsi etiam spinoso. Flos trigono cylindricus, basi corallina, limbo pallido, segmentis tribus obtusis, tribus crassioribus reflexis, triangularibus, herbaceo pallidis, linea viridi divisus. Flos ad duas tertias divisus. Fructus ex cylindrico hexagonus, tuba staminibus brevior, truncata simplex.

H. Aloe caulescens, foliis minus glaucis, caulem amplexantibus. COMM. Prael. T. 18. an *Aloe africana mitrae forma spinosa* ELTH. T. 17. viridis.

H. Aloe africana, caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte sibicantibus notata. H. Amst. T. II. f. 5. Spica speciosa, flos circa pediculum excavatus, tubo incurvo, hinc convexo, inde cavo, ex corallino flavus: limbus contractus. Segmenta exteriora angustiora, interiora latiora, rotundiora. Stamina circa basin fructus nata, filamentis in basi recurvis latisque, anthesiae de more biloculares. Fructus cylindricus sex lineis divisus, tuba simplex staminum longitudine.

H. Aloe africana maculata spinosa minor ELTH. T. 15?

H. Aloe africana humilis, spinis & verrucis obsita COMM. Prael. ic. 26. plant. rar. ic. 46.

H. Aloe africana minima, spinis herbaceis, numerosis ornata BOERII, T. II. p. 131. Spica rara. Flos difformis. Tria petala superiora gracilia, reflexa, obtusiora, alba cum linea fusca, propiora, tria inferiora distantia
hinc-

hiatu aliquo, deorsum pendula, diffusa, ut unum superius, duo inferiora sint. Alba sunt, mucrone acuto, viridi, linea virente divisa. Petala fere tota distincta sunt. Stamina de more ex receptaculo nascuntur. Fruktus ovato cylindricus. Tuba brevis, crassa, trifido stigmate;

H. *Aloe Americana*, brevissimo & crassissimo folio, flore subviridi. H. *Amst.* II. f. 6. *Aloe africana*, brevissimo & crassissimo folio, flore candido. TILL. T. V. Charakterem dedit TREW. l. c. p. 323. T. 2. f. 19. 20. 21. Folium sa-
tis bene pinxit FAIRCHILD in Blair, bot. eff.

H. *Aloe africana* erecta, folio rotundo, acuminato; COMM. *Prael.* ic. 32. TREW. l. c. f. 28. 29. 30. 31. 32. folio parvo & in mucronem rigidissimum exente ELTH. f. 14. bene. Flos maxima parte cylindricus, sex lineis cris-
pis, granulatis, obductus. Ultra eam cylindrum, viri-
dem, granis altis, contrahitur flos, iterumque reflectit
tria segmenta flava, obtusa, ovata, linea media viridi.
Tria flava introrsum connivent. Stamina ex receptaculo.
Fruktus cylindricus, tuba breviter tricornis.

H. *Aloe africana*, humilis, folio triangulari, rigido, al-
bicante. COMM. *Prael.* ic. 30. *plant. rar.* f. 48. Folium
planius, ora alba.

H. *Aloe africana*, humilis, foliis ex albo & viridi va-
riegatis COMM. *Prael.* ic. 28. *plant. rar.* f. 47.
WEINMAN T. 68. 69. & TILL. T. 8. Floris tubus cylin-
dricus, obliquus, lineis pictus viridibus, reliqua parte co-
rallinus & pallens. Segmenta brevia, ovato lanceolata,

lineata. Fructus cylindrico trigonus. Tuba staminibus brevior, fine oblique truncato.

H. Aloe africana sessilis, foliis carinatis, verrucosis
ELTH. T. 16. Nonne *Aloe americana* flore rubro, foliis
triangulari & verrucis ab utraque parte albicantibus nectato?
H. Amst. II. f. 9?

H. Aloe africana margaritifera minima TREW. T. II.
p. 34 ad 43. ELTH f. 18. Flos tubulosus sub divisione
segmentorum angustior, possit pro hexapetalo haberi,
petalis conglutinatis. Segmenta brevia, ovata, repanda, duo-
rum ordinum, viridia, oris albis. Tuba crassa, apice spon-
giosa, obscure triheda. Fructus ovato cylindricus, tribus
lineis notatus.

H. Aloe africana margaritifera minor. H. ELTH. f. 17.
H. Amst. II. f. XI. Huic verrucae minores, folia
breviores.

H. Aloe africana, foliis planis, conjugatis, carinatis,
verrucosis, caule & flore corallii colore BOPRH. T. II.
p. 131. WEINM. T. 52. Huic folia longissima, verrucae
pulcherrimae. Tubus floris curvus, basi crassa corallina,
inde virens, pallidis segmentis, alterne majoribus brevi-
bus. Fructus triquetro cylindricus, sex lineis notatus,
trilocularis, aperitur oris replicatis, cordiformibus. Semina
attra triquetra, maturescunt.

H. Aloe Ceylanica pumila, foliis variegatis. H. Amst.
II. f. 21. foliis quam sequens angustioribus.

H. *Aloe*

H. Aloe Guineensis, radice geniculata, folio variegato.
COMM. *Præcl.* f. 33. & *H. Amst.* II. f. 20. TREW. T. III.
f. 44. 45.

H. Aloe africana, flore rubro, folio triangulari, maculis ab utraque parte albicantibus notato *H. Amst.* T. II. f. 8. TREW. T. III. f. 24 ad 33. Flos curvus, cylindricus, fundo ventricoso, corallino, reliqua parte graciliori pallida: segmenta floris albo viridia, tria exteriora acutiora, tria interiora ovata latiora, omnia ad basin divisa, sed conglutinata. Stamina ex receptaculo, floris longitudine. Fructus prismaticus, sex sulcis distinctus. Tuba longa, simplex, curvula.

H. Aloe - - - maculis obscurioribus quam praecedens
BOERII. *Ind. alt.* Huic flores similes, multo minores.

H. Aloe africana, arborescens, montana, non spinosa, folio longissimo, plicatili, flore rubro *H. Amst.* II. f. 3. TREW. p. 324. T. II. f. 35. 36. T. III. f. 1; 14. 15. 16. 17.

H. Aloe africana, folio triangulari, longissimo & angustissimo, floribus luteis foetidis *H. Amst.* T. II. f. 15. Ob florem tubulosum ex petalis conglutinatis & fructum pyramidalem separat ab *Aloe Cl.* TREWIUS Comm. Lit. 1744. p. 375. T. 2. f. 8. 9.

His ex florum definitionibus, & ex collata specie Guineensi, quae nobis nondum floruit, adparet, nihil esse in Aloes floribus, quod cohaereat, & tria ad minimum quatuorve genera facienda esse, si separasse expedit, diversa ob situm floris cum fructu, ob florem curvum, disformem

ob florem simplicem tubulosum, ob florem ex longo tubo sexfidum.

H. Hyacinthus oblongo flore, caeruleus, major C. B. *Hyacinthus anglicus*. ALST. vern. O. 2. T. 8. &c. & *beigicus*. LOB. ic. 103. Varietates flore albo, pleno &c aliae dantur. Sponte nascitur in Anglia, Hybernia, Helvetia meridionali.

H. Hyacinthus orientalis DOD. *Coron.* p. 173. qui vulgo plenus in hortis habetur, flore latiori, breviori, magis campanulato.

H. Hyacinthus, racemosus moschatus *Muscari* flore obsoletō. CLUS. *bifp.* p. 519. de BRY II. 51. In Syria.

H. Hyacinthus maximus botryoides, coma c. erulea I. B. *Hyacinthus* CAMER. ep. p. 798. Dicunt circa Feniam nasci: Monspelii provenit.

H. S. Hyacinthus Sanesiensis, paniculata coma COL. Ecpbras. II. p. 12. Monstrosa planta.

H. Polyanthes, qui *Hyacinthus tuberosus* indicus, flore hyacinthi orientalis. *Tuberosa vulgo*. In BROSSEI tabb. *Hyac. ind. tuberosa radice* VALLET. T. 32.

H. Polyanthes floribus umbellatis LINN. EHRET. T. 10. *Hyacinthus africanus*, *tuberosus*, *flore caeruleo*, *umbellato*, COMM. II. Amst. II. ic. 67.

H. Poly-

Polygonatum bifolium, scapo florigero aphylo *Enum.*
Helv. p. 286. *Lilium convallium* CAM. Ep. p. 618.
 BLAKWEL. T. 70. *Majanthemum* SIEGESBECK. *propr.*
lib. cum varietatib. Ubique in sylvis.

Polygonatum caule cernuo longiori, alis multifloris
Enum. *Helv.* p. 287. *Polygonatum vulgare latifolium*, C. B.
 Ubique in dumetis.

Polygonatum caule cernuo, angulofo, breviori, alis uni-
floris *Enum.* *Helv.* p. 287. *Polygonatum flore odo-ro.*
 CLUS *Pann.* p. 263. *Sweet Salomons Seal* PETIVER *herb.*
brit. T. 44. In praecipitiis montis, qua ad arcem Plessam
 adscenditur.

Polygonatum foliis verticillatis *Enum.* *Helv.* p. 288.
Polygonatum angustifolium non ramosum. C. B. *Im Eulen-*
koch, Rohringer Walde, Heymberge, ubique in sylvis nostris
 & in sylva hercynia.

Unifolium. Lilium convallium minus. C. B. *Grauen-*
Parnassi. CAM. ep. p. 744. In omnibus sylvis.

Asparagus domesticus AIST. *Vern.* O. 9. T. 9. Circa
 Moguntiam, inque Rhodani insulis.

H. *Asparagus aculeatus spinis horridus* I. R. H. *Corru-*
da tertia CLUS. *bisp.* p. 461.

H. *Ruscus latifolius*, fructu folio innascente. I. R. H.
Laurus alexandrina, Chamaedaphne. COL. *Eccbras.* l. p.

165. ic. Foliolum ex medio nervo nascitur, & ex ejus axilla petiolus floriger teres; petala sex lingulata, albo viridia, tria interiora minora. Bacca viola ea, ovata, cylindrica, tuba simplici, fine crassiori. In Italia, Hispania.

H. *Ruscus angustifolius*, fructu summis ramulis innascente I. R. H. *Laurus Alexandrina ramosa*, fructu e summitate crenium prodeente H. R. Paris. & H. L. Bat. p. 681, ic. Penitus diverso modo floruit. Flos globosus, ore quinquesido, breviter dentato clauso. In tubi floris interiori parte quinque squamæ breves obtusæ. Fructus rotundo triquetrus, mollis, monospermos, in quo semen rotundum. Chara^rter ergo a reliquis speciebus Ruscⁱ diversissimus.

H. *Ruscus myrtifolius aculeatus*. I. R. H. *Ruscus* I. B. I. p. 579. In Anglia, Gallia, Hibernia, Veronae. Folii nervo haud longe a basi insidet flos sessilis hexapetalos, foliis tribus amplioribus, ovato acuminatis, tribus angustioribus, acuminatis, interioribus. Bacca violacea in centro. Folium florem suscipiens nullum adest.

H. *Smilax aspera* fructu rubente. I. R. H. *Smilax aspera* VESLING obs. p. 78. *rutilo fructu* CLUS. *bisp.* p. 219. Flos clausus, cylindricus. Petala tria, longa, cava, obtusa, viridia, pallida, tria minima, erecta, paulum cava, breviora, acuta. Bacca nitida, cum tribus tubis recurvis, repandis, plumosis, pene cohaerentibus. In Hispania, Gallia calidiori, Aegypto.

H. Smi-

H. *Smilax orientalis*, aculeatis farmentis, foliis non spinosis TOURN. *Ceroll*. Flos connivens purpureus: tria petala majora, cava, tria minora erecta angustiora, tubae tres spongiosae. Baca ovato conica, purpurea, polyspermos. In Palaestina POCOCK.

H. *Dens Canis* latiore & rotundiore folio. In Sibiria ad fontes *Tomii fl.* In agro Veronensi.

Lilium foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis Cliff. *Enum. Helv.* p. 289. *Martagon* CAM. *Epit.* p. 571. *Lilium montanum*, *floribus reflexis*. I. R. H. In sylvis passim. Multae varietates sunt, quales habet VALLET T. 10. seqq.

H. *Lilium* foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris. Cliff. *Lilium album vulgare, flore erecto* MORISON. IV. T. 21. *Lilium album* LOB, ic. p. 162. AIST. *Vern.* O. 5. T. 9. f. 1. PASS. ic. 102. *Lilium* CAM. *Epit.* p. 570. In Tartaria circa *Kirin-Hotun*.

H. *Lilium purpureo croceum majus* C. B. *Hemerocal-*
lis CAM. *Epit.* p. 616. *Lilium rubrum bulbiferum* du
PASS. ic. In Helvetiae montosis non satis certo. In
Sibiria frequens circa Fl. *Kan*.

H. *Fritillaria* radice depressa ROY. *Fritillaria vulgaris*-
VALLET. T. 15. *Fritillaria* flore purpureo du PASS II. T.
33. *Fritillaria praecox purpurea variegata*. C. B. In pa-
ludosis circa *Gondeba Helyetiae*. Budae. In Anglia rarius, in
Palaestina POCOCK. Tubae tres, nectarium obscurius. H.

H. Fritillaria flore albo du PASS. T. 33.

H. Corona Imperialis I. R. H. VALLET. T. I. MOR. S. W. T. 19. AIST. Vern. Ord. 5. T. 2. Tuba unica, extremo trifido, nectario nitidissimo.

H. Tulipa praecox &c. Sponte in Palaestina, Schirvan &c.

H. Yucca foliis aloes. *Hyucca Canadenis* ALDIN. p. 32. seqq. *Yucca* VALLET. T. 72.

H. Hemerocallis radice tuberosa, corollis monopetalis ROY. *Lilioasphodelus phoenicens.* LOB. ic. p. 93. GARIDEL. T. 61.

H. Lilioasphodelus luteus VALLET. T. 16. *latifolius* LOB. ic. 92. *Lilium luteum, asphodeli radice.* MOR. T. 16. In Sibiria fere tota. In agro Veronensi.

H. Asphodelus caule simplici, folioso, foliis trigonis, fistulosis Cliff. *Asphodelus lutes* LOB. coron. p. 143. fiore & radice. C. B. MORIS. S. IV. T. I. Stamina basi villosa, tuba fine simplici, flos expansus.

H. Asphodelus minor, folio fistuloso. MOR. 16. *Asphodelus minor.* III. CLUS. p. 296. Stamina tria, filamentis latis, barbata, tria angustis: flos patulus: tuba tribus globulis spongiosis terminata. In Syria, Minorca.

H. Phalangium capense sessile, foliis aloiformibus, pulposis DILL. Eltb. p. 312. f. 299. Stamina plumosa, petala ex viridi lutea, tuba simplex, filiformis.

H. Phalan-

H. Phalangium africanum, foliis cępaceis, floribus spicatis, aureis BOERH. Stamina barbata, tut a fine triquetro.

Phalangium radicibus teretibus, caule nudo, foliis gramineis, petiolis florū non ramosis Enn. Helv. p. 292. *Phalangium, parvo flore, non ramosum* I. B. Liliago, CORDI p. 150. b. In asperis lapidosis ad viam in arcem Pless. Filamenta glabra, flos patulus, petala virente linea distincta, folia solida, ad terram ordinata, caulis simplex.

Phalangium radicibus teretibus, foliis gramineis, caule nudo, petiolis florū ramosis. Enn. Helv. p. 292. *Phalangium, parvo flore, ramosum* C. B. *Phalangium CAM. Epit.* p. 580. In sylvis circa Jenam, inter Lancha & Freyberg. In Altenstolberg. Habitus multo priori mollior, & sparsus magis, & flores minores. Flos patulus, viridibus lineis, stamina glabra, tuba simplex, fine globoso.

H. Phalangium - - - valde simile proxime priori, flora toto albo, neque macula virente sub apice petali notato, foliis mollioribus, reflexis; stamina huic glabra, & tuba fine globoso. Est *Ornithogalum*, spicis florū longissimis, ramosis Gmel. Hor. Sibir. T. I. T. 8.

Phalangium radice subrotunda, foliis & floribus umbellatis. Enn. Helv. p. 293. *Ornithogalum luteum*. TAB. p. 633. In pratis & agtis circa Gottingam frequens.

Asphodelos & Phalangia nulla vera nota video separari posse, neque facile Ornithogalum.

H. Ornithogalum arabicum AIST. Vern. Ord. S. T. 12. Flores grandes, albi, linea virente, fructu nigro, stamina connata.

H. *Ornithogalum Lusitanicum*, latifolium. I. R. H.
Hyacinthus Indicus, bulbosus, stellatus. C. B.

H. *Ornithogalum*, pediculis florum imis supremos superantitius. *Emm. Helv.* p. 294. *Orrithogalum umbellatum medium*, *angustifolium*. C. B. *Ornithogalum niviosum appos* RENEAULM. p. 88. *ic.* p. 87. *Ornitogalum minus* du PAS. T. 35. In Helvetia ad vias, ad agros vineasque.

ALLIUM. Primus Ordo staminibus simplicibus. *Allium* Tourn. quando folia plana sunt; *Cepae* quando fistulosa.

Allium inodorum, umbella bulbifera, vagina bicornis, foliis carinatis, in libello meo de *Allio* p. 391. *Allium sylvestre*, bicornis, flore ex herbaceo albicante, cum triplici in furgulis petalis stria atropurpurea RAI. *Syn. III.* p. 370. pro varietate *vulgari*, flore fuliginoso; & *Allium sive Moly montanum* II. CLUS. *Pann.* p. 213. pro varietate *suave purpurea*. Passim circa Gottingam, ad viam Plessensem proxime castrum: Ad dextra prati *Herperhusensis*: Copiose circa Freyburg in vineis & vallibus: In sylvis M. Altenstolberg.

H. *Allium* foliis teretibus, vagina bicorni, umbella pendula, suave purpurea Opusc. bot. de *Allio* p. 386. cum icono. *Allium montanum*, bicornis, floribus triquetris, purpureis, pediculis longis & reflexis insidentibus. In sylva del Mantico prope Veronam SEGUIER, ut ex planta sicca transmissa didici.

H. *Allium* foliis radicalibus sessilibus, lanceolatis, floribus umbellatis ROY. Opusc. bot. de *Allio* p. 383. *Allium montan-*

montanum, latifolium, flore flavo CLUS. *bifl. app. alt.*
Moly montanum, latifolium, flore flavo PASSAEI f. 7.
 In Pyrenaeis M.

H. Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex alis bulbiferum Opusc. bot. de Allio p. 382. n. 22.
Moly indicum, flore purpureo SWEERT. T. 61.

H. Allium umbellatum, foliis fistulosis, compressis, radice obducta reticulo Comm. Cott. T. II. cum ic. Radix bulbosa, reticulatis membris ranis obnupta: folia hinc convexa, inde concava, intus fistulosa. Caulis cubitalis & ultra, vagina brevis. Flos speciosus, albopurpureus. Stamina connata. A GERBERO accepi.

Allium foliis radicalibus latissimis, petiolatis, floribus umbellatis ROYEN, Op. bot. de Allio p. 379. *Allium ursinum, latifolium* LOBEL. ic. p. 159. Abunde in sylvis super *Lutjelengen* & circa *Plessj.*

H. Allium foliis latissimis, radice oblonga, obducta reticulo Opusc. bot. de Allio p. 375. *Allium montanum, latifolium, maculatum* C. B. In alpibus helveticis rokten Horn &c. In fileiae montibus in *Apen Grund*, *Schneegrube*. &c.

Allium radice senescente, lignosa, transversa Opusc. bot. de Allio p. 370. *Allium* sive *Moly Narcissinis* foliis II. CLUS. Pann. p. 221. 222. In monte *Altenstölberg*, & in sylva *Welmese*. Hujus paulo grandior varietas est *Allium scapo ancipiti, teretiusculo; foliis ensiformibus; hinc paulo convexioribus* GMEL. flor. Sibir. I. p. 53: T. XI. f. 2.

H. Allium foliis gramineis, umbella sphaerica, bicolore Opusc. bot. de Allio p. 365. n. 15. Comment. Soc. Gott T. II. cum ic. *Porrum angustifolium, gramineis foliis, caule alto &c.* EHRHARD. continuat. Syll. plant. n. 298. Bulbus cepae, tunicatus, folia plana, duas lineas lata, vagina brevis. Petala exteriora pene tota purpurea, interiora alba cum linea rubente. In ried prope Memmingen.

H. Allium umbellatum, foliis teretibus radicalibus, scapi longitudine, floribus tubulosis Opusc. bot. de Allio p. 361. n. 14. *Cepa sectilis* TAB. ic, p. 486. Alpina planta.

H. Allium staminibus simplicibus, caule medio ventricoso. Opusc. bot. de Allio p. 360. n. 13. *Cepa oblonga* C. B. A DILLENIO cum nomine cepae Cambricae accepi.

Alter ordo Allierum est staminibus alterne trifidis, *Porra* T. & auctorum.

H. Allium staminibus saepe alterne trifidis, caule ad terram ventricoso. Op. bot. de Allio p. 356. n. 12. *Cepa rubra* TAB. ic. p. 483.

H. Allium staminibus alterne trifidis, praelongis, capite sphaericō, atropurpureo Opusc. bot. de Allio p. 355. n. 11. *Moly atropurpureum* SWEERT. T. 60.

Allium staminibus alterne trifidis, spica sphaerica, foliis gramineis, radice multiplici Opusc. bot. de Allio p. 350. n. 8. *Allium montanum, capite rotundo* C. B., Circa Erfort & Tiefenthal, & circa Sulz in segetibus & vineis.

H. Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis floribus sphaericē congestis, radice tunicata, cauli circumnata. *Opusc. bot. de Allio* p. 348. n. 7. *Porrum communne* MATTH. p. 551.

H. Allium staminibus alterne trifidis, foliis latissimis, capite sphaerico, caule ancipiti *Opusc. bot. de Allio* p. 347. n. 6. *Porrum scapo nudo, ancipiti, antequam floruerit nutante, follis ensiformibus, hinc paulo convexioribus* GMELIN. *fior. Sibir.* T. I. p. 55, T. 12. A *Scorodopraso* differt caule incurvo, compresso, ancipite, florum colore carneo, radice unica absque propaginibus. In montosis ad fl. *Jeniseam, Tomum & Kanum.*

H. Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaericē congestis, radice sobolifera *Opusc. bot. de Allio* p. 344. n. 5. *Allium sphaerico capite, folio latiore* RUDBEK *Camp. Elys.* II. p. 151. In insula Holms, quae in aestuario Sabrinæ est. In ins. *Minotica.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite sphaerico, bulbifero, radice multiplici *Opusc. bot. de Allio* p. 338. n. 4. *Cepa juncifolia, minor, purpurascens.* C. B. In agris circa *Gottingam* minus quam olim frequens.

Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis ciliatis *Opusc. bot. de Allio* p. 336. n. 3. *Allium montanum, bicorne, latifolium, flore dilute purpurascente* RUDBEK. *Elys.* II. p. 155. & RUPP. III. p. 153. cum ic. T. II. *Moly montanum, angustifolium,* du PASS. T.

T. 7. Legi in dumetis, circa montis Kifhäuser arcem.

H. Allium staminibus alterne trifidis, capite bulbifero, scapo ante maturitatem contorto Opusc. bot. de Allio p. 334. n. 2. *Allii genus*, *Ophioscorodon dictum* quibusdam I. B. II. p. 539.

H. Allium staminibus alterne trifidis., foliis gramineis, capite bulbifero, nucleis in bulbum conjunctis Opusc. bot. de Allio p. 331. n. 1. *Allium sativum*.

H. Ananas aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea. *Ananas* H. A. I. p. 109. MERIAN. Surin. f. 1. 2. BROSS. tab. I. 31. VOLCAMER besp. contin. app.

H. Ephemerum *Phalangium Virginianum* MUNT. T. 228. In BROSSEI tabb. *Phalangium americanum*, flore violaceo VALLET. T. 53.

H. Haemanthus foliis linguiformibus ROY. *Haemanthus africanus* H. Amst. f. 64 r.

H. Haemanthus foliis lanceolatis ROY. *Haemanthus colchici* folio, perianthiis herbaceis. DILL. Elih. p. 167, f. 140,

POLYSTERMONES MULTILOCULARES

Veratrum flore atrorubente. Conf. Comm. lit. Nov. 1743.
ibid. 9. BLAKW. TELL. 74. Utique flores androgyni. Sta-
mina sex, siliquae tres, basi connatae. Tuba totidem.
Veronae. In Sibiria ad Turam fl. In Alsatiæ montosis.

Bucomus. *Fucus floridus* MATTH. p. 1057. *Gladiolus*
palustris PASS. T. 84. In Gräben gegen Bovenden zu,
auf dem Maserh.

Damasonium siliquis brevissimis *Plantago aquatica*
CAM, Epit. p. 264. Ubique in fossis.

Sagittaria, soliis sagittatis. *Sagitta major* DOD. p. 538.
In Seeburger See bey Bürenshausen. Circa Cellam. In Ja-
ponia: Prima folia simplicia sunt & graminea, inde varietas
Graff arrowhead PETIVER. T. 43. reliqua sagittata, va-
ria latitudine, unde varietates illae, quarum tres depingit
PETIVER ibid. folio lato, angusto, & minor tertia.

Hydrocharis. Ranae morsus DOD. Cereal. p. 228. Circa
Bürenshausen. Cellae ubique.

Nymphaea calyce magno, pentaphyllo, fructu pirifor-
mi. *Enum. Helv.* p. 302. *Nymphaea lutea* CAM. Epit.
p. 635. In fossis suburbanis.

Nymphaea calyce tetraphyllo, fructu rotundo *Enum.*
Helv. p. 302. *Nymphaea alba* CAM. Epit. p. 634. In lacu
Seeburgensi, & in ipsa Japonia. Papa-

Papaver foliis simplicibus, glabris, incisis. *Enum. Helv.* p. 303. *Papaver spontaneum, sylvestre & hortense* C. B. cum varietatibus, etiam magno capite. Ex *Papavere* isto opium simillimum orientali paravi.

Papaver foliis pinnatifidis, hispidis, fructu subrotundo LINN. *Enum. Helv.* p. 303. *Papaver rhoeas.* PASS. ic. 64. *Papaver erraticum* MATTH. p. 1057. Albo flore sponte inter *Levershausen & Cattlenburg.* Aliae varietates hortenses plurimae sunt, & quotannis plures nascuntur.

Papaver foliis pinnatifidis, hispidis, fructu elliptico, hispido. *Papaver capitulo longiori, hispido* C. B. Häufig auf *Aekern unterm Leynberg.*

Papaver foliis pinnatifidis, hispidis, fructu elliptico, glabro. *Argemone capitulis longis, glabris.* MOR. S. III. T. 14. Passim, etiam sponte in horto. Circa *Walkerried.* In agris *Sulzensibus.* Haec duo differunt a vulgari pilis cauli appressis fortioribus, quae vaga & mollia sunt in vulgari Rhocade.

H. *Papaver erraticum nudicaule, flore flavo, odorato.* H, Elth T. 224. *Argemone giallo* FONA Bald. p. 100. *Papaver alpinum* SEGUIER. T. I. T. 4. n. 4. Et flore albo varietas nobis est, & flore pallido. Perennat, foliis ut Rhoeados, sed caule non ramoso, unifloro. In M. *Baldo* In *Sibiria.* In *Wallia.*

H. *Papaver perenne, foliis pinnatis, fructu globoſo.* *Papaver orientale hirsutissimum, flore magno* TOURN. it. III. T. 127. COMM. rar. T. 34.

H. Ar-

H. Argemone mexicana MERIAN. ic. 24. *Papaver spinosum* CLUS. XCIII.

H. Argemone flore albo, saepe tripetalo. Omnino tripetala fuit, cum tribus tubis. Caeterum minimum est, quo a Papavere Rhoeade Argemone differt.

H. Glaucium foliis tomentosis, imis pinnatis, superioribus serratis, amplexicaulibus. *Ennem. Helv.* p. 304. *Papaver cornutum* MATTH. p. 1050. *Glaucium* flore luteo I. R. H. Septum in fructu evidens ejusque longitudo separat Glaucium a Chelidonio. In Helvetia ad lacum Neocomensem prope Ebrodunum. In Moravia inter Fragam & Viennam, Patavii, in Anglia, Palaestina, Minorca, Hetruria. Varietatem foliis tenuiter divisis habet MICHELI *hort. flor.* p. 41.

H. Glaucium hirsutum, flore phoeniceo I. R. H. *Papaver corniculatum* alterum CLUS *bisp.* p. 407. *Papaver corniculatum rubrum* DOD. *Purg.* p. 339. Circa Vindobonam. In Hungaria, Hispania, Monspelii.

Chelidonium foliis subrotundis. *Czelidonium majus* I. R. H. BLAKW. T. 91, Ubique in muris, etiam Japoniae.

Christophoriana DOD. *Purg.* p. 237. Passim in sylvis & Herperbusac ad sepes, in pomario D. SEGNERI. Varietatem duobus foliis calycis viridiusculis, tribus cucullatis candidis habet MICHELI *hort. flor.* p. 128. Fi-

*Filipendula sexibus tota planta divisus. Barba caprac,
floribus oblongis I. R. H.* Passim in sylvis Germaniae &
Hercyniae, cuius locus mihi excidit: in Helvetia frequens.

*Filipendula foliis ex ovatis acutis, extremo trilobato,
minimis pinnulis intermixtis. Enum. Helv. p. 306. Ulma-
ria floribus compactis I. R. H.* In omnibus pratis.

*Filipendula foliis longis angustis, extremo triloba-
to, minimis pinnulis intermixtis. Enum. Helv. p. 307. Fi-
lipendula vulgaris sive Molon Plinii C. B. Super Werthe-
rade in pratis. Circa Jenam, a Closewitz versus Cospida
in sylvis humidis.*

*Thalictrum caule folioso, striato panicula multiplici,
terminatrice Cliff. Enum. Helv. p. 308. Thalictrum majus,
filiqua angulosa vel striata I. R. H. Thalictrum magnum
DOD. Pempt. p. 58. Lanchae in pratis uidis, & in Alsatia,
Helvetia, Anglia.*

H. *Thalictrum seminibus triangularibus, pendulis, sti-
pulis ad subdivisiones petiolorum Cliff. Enum. Helv. p.
309. Thalictrum flore incarnato, & fiore albo AICHST.
Vern. Ord. I. T. XI, f. 1. 2. In Helvetia, in Borussiae
erectis. Flore purpurascente praecocius, albo serius
floret.*

*Thalictrum foliis latis, rotunde tridentatis, caule nudo.
laxissime paniculato. Enum. Helv. p. 303. Thalictrum mi-
nus DOD, Pempt. p. 58. Jenae in M. Fuchsberg su-
pra Sulze &c. An differt Thalictrum alpinum mi-
nus*

nus saxatile, rutae folio, staminibus luteis SEGUIER
T. XI.

H. Thalictrum floribus pentapetalis, radice tuberosa
LINN. *Thalictrum minus, grumosa radice, floribus majori-*
bust, BOERII.

H. Spiraea salicis folio I. R. H. In Sibiria.

Aquilegia foliis rotunde lobatis, flore simplici C. B.
Enum. Helv. p. 310. Isopyron COLUMN. phytobas. init.
Varietates plurimae nascuntur flore pleno, ex repetitis
nectariis, & flore stellato ex repetitis ovatis petalis.

H. Paeonia foliis difformiter lobatis, flore pleno.
Paeonia flore pleno, incarnato AICHST. *Vern. Ord. VI.*
T. 7. f. i. Veronae, in Minorca insula, montibus Galliae
australis & Vivaraeis. In Gargano; M. Vulture MARAN-
TA. Monspelii. &c.

Fraxinella VALLET. T. 86. GARIDEL. T. 36. *Di-*
ctamnus albus BLAKWELL T. 75. *Aufm Hue* ROYER,
circa *Wendelsheim & Ebsbuditheim* *Alzeyensis*, dioecesis
GEYER. *Jenae in M. Kunizberg.* In Hungaria POCOCK.
In Podolia RZASCZYNSK, In M. *Apolline Calabriae*, in
M. *Costa bella Veronensem.*

H. Fraxinella minor, flore albo. RIV. T. 133.

POLYSTERMONES.

Aconitum casside longissima. Aconitum II. CAM. Epit. p. 827. Aconitum lycocanthum luteum C. B. Häufig aufm Bocksbühl unter Lütjelängen. Circa Jenam &c.

H. Aconitum foliis multipartitis, laciinis linearibus incumbentibus LINN. Hort. Upsal. p. 152. An satis diversa a priori? foliis equidem tenuius divisis, sed flore codeni.

H. Aconitum foliis lineatis, multifidis, casside brevi Napellus CAM. Epit. p. 836. PASS. ic. II. T. 55. In alpibus & montibus Helvetiae, & in Virginia.

β. Flore variegato ex albo & caeruleo Napellus flore mixto RIV. T. 131.

H. Aconitum radice bulbosa, foliis tenuissime divisis Cliff. Enn. Helv. p. 313. Anthora sive Antithora CAM. Epit. p. 837. In monte Thoiry prope Genavam.

Delphinium flore unifiliquo, foliis tenuissime divisis. Enn. Helv. p. 314. Delphinium Segetum I. R. H. Delphinium PASSAEI II. T. 66. Consolida regalis CAM. Epit. p. 521. VALLET T. 73. BLAKWELL T. 26. In segetibus Germaniae, Syriae.

H. Delphinium sativum RIV. T. 123. Rectius est & caule firiori.

Varietates plurimae in colore & plenitudine in hortis aluntur.

H. Del-

H. Delphinium orientale, platani folio. *Staphisagria* RIV. T. 125. BLAKWELL T. 265. CAM. Epit. p. 947. Petala interiora quatuor, caerulea, bis bina, longa & angusta. Superiora duo calcaria totidem adnatae habent, quae calcar externum replent, & bracteam sursum versam ovalem, eorumque petiolus conjunctioni calcariis & bracteae inseritur. Inferiora sursum cava, deorsum repanda, fine cavo, principio semifistuloso sunt. Tres siliquae latae, hirsutulae. Calcar breve. In Libano M. AVICENNA. In *Minorca*, *Monspelii*.

H. Delphinium perenne, Aconiti folio ampliori, floribus caeruleis, longioribus pediculis insidentibus, minus villosum AMM. n. 174. *Aconitum Lycocionum* I. CLUS. Pannon. p. 404. neque enim credo a Sibirico differre. Folia semiquinqueloba, acuta & acute secta, lobis dentatis. Spica pulcherrima. Flores sature caerulei, calcare externo rugoso. Calcar internum fit quatuor petalis, quod in vulgari fit uno. Ejus duo petala superiora, anterius complicata, fiunt lamina fuliginosa, oblonge quadrata, posterius in calcar semicavum exente, quae duo similia calcaria sibi adaptata calcar exteriorus replent. Alia interiora duo petala petiolo sunt lato, sursum cavo, & bractea ovato quadrangulari, emarginata, fuliginosa, penicillo luteo viridium pilorum ornantur. Siliquae tres. In Borussia, Helvetia alpina, Silesia, Sibiria.

β Varietas aut alia species, foliis trifidis, non quinquefidis. Alia

γ Alia petalis internis pallide virentibus.

H. *Delphinium* siliquis ternis, foliis semiquinquelobis, lobis semitrilobis. Charactere cum priori convenit, & forte varietas est. Foliis glabris, tenuius divisis, floribus cacestis coloris effert.

H. *Delphinium* foliis semiquinquelobis, lobis obtusis. *Thora Italica* CLUS. *Pannen.* p. 414. *Lycoctonum caeruleum parvum* DOD. *Purg.* p. 326. Circa Nenburg Austriae. Character idem & siliquae ternae.

H. *Delphinium* perenne, foliis tenuissime divisis, siliquis villosis. *Delphinium elatius*, *subincanum*, perenne, floribus amplis azureis AMMAN. n. 175. *Delphinium III.* LINN. *hort. Ups.* p. 150. Accedit *Lycoctonum flore Delphinii* DOD. *Purg.* p. 315. Eadem iterum fabrica, siliquae ternae, tomentosae, qua nota facile adgnoscitur. Barba petalorum internorum superiorum flava, flos laete caeruleus, spica rarer & brevior.

Luteola herba Salicis folio. *Antirrhinum* TRAG. p. 362. Auf der Plesse und um den Bozender Galzen.

Reseda foliis rariter pinnatis, undulatis. *Reseda vulgaris lutea* LOB. ic. REG. In fabulosis circa Jenam, Langensalze, Stempeda &c. Circa Alepum RAUWOLF. In Aegypto POCOCK. Calyx sexfolius. Petala duo suprema duabus magnis & una parva lacinia instructa; inferiora quatuor minora imperfecta. Sub supremis petalis aliud semicirculare speciosum. H. Re-

H. Reseda foliis pinnatis, pl. nis, floribus speciosis.
Reseda maxima, perperam *Pignocomon Anguillarae* LOB.
 ic. p. 222. *Reseda candida* LUGD. p. 1199. Calyx sex-
 folius, petala sex, omnia trifida, pene aequalia Petalum se-
 micirculare supremis subiectum, exiguum. In Gallia calidiori.

H. Reseda foliis integris, floribus odoratis, qua nota
 facillime dignoscitur. *Reseda aegyptiaca odoratissima*.
 GRANGER. Calycis folia sex, distantia. Petala duo supre-
 ma fimbriata, fere ut seminarum umbraculum. Sub iis
 petalum semicirculare, simplex. Petala lateralia duo,
 ungue viridi, laciniis albis paucioribus. Petala duo im-
 simplicia, alba. Folia nostris omnia integra, aliis subinje
 trifida.

Parnassia. *Hepatica alba* CORD. bist. p. 153. Copiose
 im Paradiese.

Nigella flore foliis nudo, pistillis corollam aequanti-
 bus Cliff. Enn. Helv. p. 316. *Nigella arvensis cornuta*
 I. R. H. *Melanthium sylvestre alterum* CAM. Epit. p. 553.
 UmLütjelengen, Oppenheim.

H. Nigella floribus involucro folioso exceptis LINN,
Melanthium sylvestre LOB. ic. 740. CAM. Epit. p. 552.
Melanthium Damascenum DOD. Purg. p. 503. VALLET.
 T. 76.

B. Flore pleno MUNTING. hist. f. 215.
AICHST. l. c. MORISON. l. c. Nectaria & stamina in
petala abeunt.

H. Nigella capite & folio minore I. B. III. 1. p. 208.
In Palaestina. Pinxit VALLET T. 76.

H. Nigella pistillis decem corolla longioribus Cliff.
Nigella orientalis, flore flavo, sentine alato plano. T.
Coroll. Flos nudus. Calycis folia, sive petala potius ex
analogia Parnassiae, ex rotundo lanceolata, lutea, lineata.
Petala interiora, sive nectaria, octo, patentia, rhomboidea
extrorsum cava, ortu crassulo, duabus lineis rufis picta,
cavitate viridi, etiam emarginata. In origine cujusque
nectarii bractea firma, introrsum cava, pene cordata,
duabus lineis percursa, quae ad foveam nectarii applica-
tur. Siliquae octo vel novem.

H. Nigella ex Astrachan Tschernuschja dicta. Floruit
Anno 1747. Aliquantum a vulgari minori diversa fuit.
Characterem in meis chartis non reperio.

H. Garidella GAR. ic. 29. *Melanthis peregrina* overo
di Candia FON. Bald 46. *Nigellastrum rarissimum* soeniu-
laceis foliis MAGNOL. hort. 229. In Provincia,
Creta.

Helleborus vaginis pallidis, vix serratis, flore viren-
te. Enum, Helv. p. 317. *Helleboraster* BLAKWELL T. 57.
In Alsatia, Hibernia, Helvetia, Virginia.

Helle-

Helleborus vaginis foliaceis, digitatis, flore vidente.
Enum. Helv. p. 317. Pseudohelleborus niger PASS. biemal.
T. 3. Elleborum nigrum alterum CAM. Epit. p. 941. In
sylva circa Grubenhagen. In Carniola.


H. Helleborus niger, flore roseo. C. B. Enum. Helv. p.
318. Veratrum nigrum primum DOD. Purg. 189. Ellebo-
rum nigrum legitimum CLUS. Pann. p. 576. In Au-
stria circa Linz. In Italia, Veronae, in Carniola, Del-
phinatu.

Helleborus caule plerumque unifloro, petalis & siliquis
plurimis. Enum. Helv. p. 218. Ranunculus glomeratus
VALLET. T. 62. *Ranunculus flore globose DOD. Purg.*
p. 287. Ranunculus flore maximo PASSAEI Ver. T. 29.
Circa Jenau passim. Inter Dedeleben & Pabstorp
ROYER. In Alsatia, Marchia, Arvernia, Silesia, Wirten-
bergia, Helvetia.

H. Helleborus foliis repetito multifidis, neptariis pla-
nis, Isopyrum &c. LINN. Upsal. p. 157. Helleborus folio
fumariae AMMAN. ruthen. f. 12. Ad fluvios Sibiriae.
Petala quinque, tubuli octo bilabiati, utroque labio inte-
gro. Stamina duodecim vel tredecim. Siliquae octo, uni-
valves, polyspermac. Aequo ac Trollius ad Helleborum
pertinet.

Populago I. R. H. Caltha palustris DOD. p. 598. In
udis ubique.

β. Flore pleno, Varietates habet MICH. hort. flor.
p. 76. G GYMNO-



G Y M N O P O L Y S P E R M A E.

H. Tulipifera arbor HERM. H. L. B. p. 613. CA
TESBY T. 48. cum flore. *Bresl. Saml.* 1724. M. Jul.
Characterem emendavit BUTTNERUS noster. Calyx
trifolius. Petala sex. Staminia viginti quatuor. In sinu
squamae semen unum vel duo. Stigma parvum, globo-
sum. In Virginia.

Adonis annua octopetalos. *Enum. Helv.* p. 320. *Anemone*
flore pallido. CAM. *Epit.* p. 648. *flore citrino & flo-*
re phoeniceo. Passim in agris.

Hortensis aut species, aut varietas, petalis rotundiori-
bus, semper rubris, in regionibus calidis nascitur, Ve-
ronae, Monspelii. Pinxit PASSAEUS ver. T. 18.

H. Adonis pereunnis dodecapetalos *Enum. Helv.* p. 319
Buphtalmum PASS. Ver. T. 18. *Helleborus niger verus*
TRAG. p. 406. Circa Halberstadt, & Piagam. In Lan-
guedocia.

Myosurus. *Cauda muris* LOBEL. ic. 40. Ubi-
que in agris M. Hagen. Calycis folia quinque gnomo-
nica. Una pars in caudam acutam producitur, quae cum
caule descendit. Altera elliptica, obtusa, patula. Petala
quinque valde caduca, gracili ungue, bractea lingulata, ad
angulum rectum repanda, ut in caryophyllis, vii idis: sta-
mina uno ordine, septem ad duodecim.

Trinitas MATTH. *Trifolium hepaticum*, *flore caeruleo*, *simplici* C. B. *Hepatica nobilis* BLAKWELL T. 207. In omnibus sylvis, **Ovarium petiolatum**.

β . *Flore pleno albo, rubro, caeruleo* VALLET. T. 91. PASSAEUS *Vern.* T. 1. *hyemal.* T. 6.

Ficaria BRUNFELS. *Chelidonium minus* AICHST. *Vern.* Ord. IX. T. 1. f. 2. BLAKWELL T. 51. Ubique in sepibus. Calyce trifolio, & petalis octo separari potest. Ornatae enim Ranunculi pentapetali sunt. Varietates habet CAR. AUG. A BERGEN *flor. francof.* MICH. *hort. flor.*

Ranunculus caule erecto, foliis ellipticis, sessilibus. *Ranunculus lanceatus major* TAB. p. 48. In stagnis Deneckershausen & Seeburg, & prope Walkenried.

Ranunculus foliis ovato lanceolatis, petiolatis, caule declinato Cliff. *Enum. Helv.* p. 322. *Flammula ranunculus* DOD. *Purg.* p. 272. In uidis ubique.

Ranunculus fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis Cliff. *Enum. Helv.* p. 323. *Ranunculus palustris, apii folio, levis.* I. R. H. *Ranunculus* I. CAM. *Epit.* p. 380. *Smallage Crowfoot* PETIVER T. 38. Frequens in viis uidis.

H. *Ranunculus* ramis unifloris, foliis trifidis, siliquis incurvis. *Perpusillum melampyrum*, *lutenum* LOB. ic. p. 37. non bene. *Ranunculus alopecuroides, ajngae foliis* BOCC.

GYMNOPOLYSPERMAE.

Sic. p. 28. melius. *Ranunculus ceratophyllum*, *seminibus falcatis*, *in spicam adactis* MORIS. S. IV. T. 28. *Crataegonum pumilum*, *luteum*, *absinthii folio*, *hispanicum* BARR. ic. 375. Calycis foliola persistentia, absque cauda, quae Myosuro vero caudata sunt, & caduca: Petala quinque elliptica, quae Myosuro petiolata, subulata, eademque squamam erectam, acuminatam pro necessario habent, uti *Ranunculus aconiti folio*, albus. Semina a Myosuro diversissima, falcata, maxima. Solis staminibus convenit, quae perinde, ut Myosuros, pauca habet, a quinque ad decem. In regionibus calidis, Gallia in primis.

Ranunculus seminibus aculeatis, foliis decompositis, linearibus Enn. Helv. p. 323. Cliff. *Ranunculus sylvestris* III. DOD. Purg. p. 280, *Gottingae in agris*,

H. *Ranunculus creticus*, *echinatus*, *latifolius* P. Alp. Exot. 262.

Ranunculus radice simplici, subglobosa Cliff. Enn. Helv. p. 323. *Ranunculus* radice verticilli forma rotunda I. R. H. *Ranunculus tuberosus* DOD. Purg. p. 431. Hujus adultior facies, quando radices in tuber collectae dissoluerunt, & terra se adplicuerunt, ut recte nobiscum ostendit Cl. WILlich obseruat. bot. p. 7. sit omnino *Ranunculus caule ex geniculis radicato, foliorum lobis petiolatis* Enn. Helv. p. 324 Creeping Crowfoot PETIVER T. 38. *Ranunculus hortensis* I. DOD. Purg. p. 274. Varietas habet Hortus FLOR. p. 79. Huc etiam T. 31. BLAKWELL.

β. Flore pleno.

Ranunculus caule erecto; multifloro; folio pentagono, lobis sessilibus, serratis *Enum. Helv.* p. 324. *Ranunculus pratensis, erectus, acris* I, R. H. *Ranunculus hortensis* II, DOD, *Purg.* p. 275. Ubique.

β. *Ranunculus magnus, valde hirsutus, flore luteo* I. B, In sylvis. Varietas prioris.

γ. *Ranunculus caule erecto; multifloro, foliorum lobis sessilibus, laciinati.* *Ranunculus polyanthemos simplex* VAILL. *Ranunculus PASS.* T. 74. *Ranunculus sylvestris* II. DOD. *Purg.* p. 279. In sylvis. Varietas prioris, ut videatur, acutioribus lobis, & acutius crenatis.

Ranunculus foliis quinatis. lanceolatis, inciso serratis Cliff. *Enum. Helv.* p. 325. *Ranunculus montanus aconiti folio, albus, flore minore* C. B. *Ranunculus quartus CAM.* Epit. p. 383. In summo M: Bructero. In sylvis in quibus pagus Schirke dispersus jacet.

β. Flore pleno PASSAEUS *Vern.* T. 39.

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus, crenatis, caulinis digitatis, sessilibus *Enum. Helv.* p. 327. *Ranunculus nemorosus vel sylvaticus, folio rotundo* I. R. H. *Ranunculus dulcis sive pratensis* TRAG. p. 97. Frequens in sylvis. Huc ranunculi figurae d. e. BLAKWELL T. 31. Varietatem reperio, calyce ad petala connato, sive flore apetalo.

Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis LINN. *Enum. Helv.* p. 328. *Ranunculus aquaticus,*

folio rotundo & capillaceo I. R. H. *Ranunculus aquatilis* DOD *Purg.* p. 387. *Water Crowfoot with various leaves* PETIVER *Hort. Brit.* T. 29. In stagnis inter Walkenried & Ilfeld magna copia, locis semiudis & semisiccis, ex terra cum aqua mistis. Auf dem Pfingstanger bey Harste.

Ranunculus foliis capillaceis, circumscriptione vaga, brevioribus ENUM. HELV. p. 328. *Foeniculum aquaticum tertium* TAB. p. 71. *Ranunculus aquaticus, capillaceus* I. R. H. *Im Rasemühlen Wasser & alibi abunde, in aquis parum velocitus.*

Ranunculus foliis capillaceis, circumscriptione circulari. *Ranunculoides folio circinato, tenuissime diviso* VAILL. *mem. 1719.* In aquis penitus quietis & palustribus. *Beym Schützenhofe.*

Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumscriptione oblonga ROY. ENUM. HELV. p. 329. *Ranunculus aquaticus albus, fluitans, Peucedani folio* I. R. H. In aquis rapidioribus, in rivo die alte Leine. Hae ultimae quatuor species ranunculi sibi proximae, forte ejusdem speciei varietates sunt. Conjungit cum LUDWIGIO Cl. BOEHMERUS *flor. Lips.* p. 181.

Ranunculus foliis linearibus, brevissime bifurcatis app. RUPP. p. 104. *Ranunculus aquatilis, albus, Peucedani folio, serotinus, foliis binis latioribus, incurvatis, subrotundis in extremitate caulinum hinc inde instructus* MAPP. *Alsat.* p. 263. ic. In arenosis ad Salam Jenae.

Ane-

Anemone semine levi, petalis quinis, subrotundis, luteis Enum. Helv. p. 329. *Ranunculus nemorosus luteus* C. B. Ubique in sylvis.

Anemone semine levi, petalis senis, ellipticis Enum. Helv. p. 330. *Ranunculus phragmites, verus, albus*. L. R. H. In sylvis.

Anemone seminibus seta plumosa terminatis CLIFF. *Anemone sylvestris, alba, major* C. B. Prope Lützelengen, sed copiosissime in sylva, quae ad sinistram est villaer der Dreisch.

H. *Anemone caule ramoso, petalis lanceolatis* ROY. *Anemone virginiana, tertiae* MATTH. *similis, flore parvo* HERM. Parad. T. 18. Facies prioris: Flos multo minor. Senien ex Pensylvania accepimus.

Anemone tubis caudatis, imis foliis duplicato pinnatis, multifidis, superioribus angustissimis Enum. Helv. p. 333. *Pulsatilla* CAMER. Epit. p. 392. *Anemone tenuifolia, violaceo flore* PASS. Vern. T. 13. *Pulsatilla folio crassiori, & majori flore* C. B. Circa Jenam passim, in M. Fuchsberg, supra Sulze: in sylvis supra Nördlingen. In Suecia, Hungaria, Helvetia.

Anemone tubis caudatis, foliis tenuissime divisis, flore connivente nutante HELWING flor. p. 66. ic. 12. & clauso obsoleto flore ic. 11. *Pulsatilla flore minori, nigri cante* C. B. Circa Lubecam abunde, & in Borussia, & Marchia. A foliis, anulum in caule facientibus, nota generica sumi non debuit in ea methodo, quae sola fru-

Etificatione nititur. Et ea desunt in Pulsatilla Anemones secundae folio CAR. AUG. a BERGEN flor. p. 156. & in Pulsatilla flore obsoleto, caule nudo HELWING ic. 4.

Anemone tubis caudatis, foliorum pinnis pinnatis, pin-nulis remotis. *Enum. Helv.* p. 331. *Anemone sylvestris* II. CLUS. *Pann.* p. 382. In M. *Bruëteri* pene summa parte abunde. Habet ibi lectam jam FISCHERUS. In Montibus Arverniae, Silesiae, Helvetiae.

Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis, inaequaliter incisis, serratis Cliff. *Enum. Helv.* p. 334. *Clematis sylvestris, latifolia* C. B. *Clematis tertia* CAM. *Epit.* p. 697. In sepibus abunde.

H. Clematis caerulea, erecta. *Clematis caerulea, Pannonica* CLUS. *Pann.* p. 293. In Hungaria, circa Posonium.

H. Clematis sive Flammula surrecta alba I. B. II. p. 127. *Flammula Matth.* CLUS. *Pann.* p. 297. altera DOD. *Purg.* p. 244. Veronae; in Hungaria POCOCK, in Austria CLUSIUS.

Caryophyllata pinnis paucioribus, rhomboideis, tubarum fine uncinato *Enum. Helv.* p. 335. *Caryophyllata vulgaris* I. R. H. *Bey der Rasenüble &c.* ad sepes.

H. Caryophyllata Canadensis, foliis acutioribus, flore luteo, majori, IUSSIEU. Aegre diversa a priori, etsi divisio foliorum paulum acutior est. Neque credo eam varia-

tēm differre quam *Great flowerd Avens* Angli nominant ap. PETIVER T. 40.

Caryophyllata pinnis frequentioribus, extrema semitrifida, flore coṇnivente nutante Enn. Helv. p. 336. *Caryophyllata alpina*, nutante flore CLUS. Pannon. p. 434. *Caryophyllata aquatica*, flore nutante I. R. H. Auf dem Heymberge ad rivum, qui sub specula defuit.

β. Flore pleno, & flore prolifico, in horto ludit.

H. *Caryophyllata Virginiana*, albo flore minore, radice inodora HERM. Par. Bat. p. III. v.

Comarum. *Pentaphyllum palustre* CORD. hisp. p. 95. In Suevia circa Moeskirch, & alibi in uidis abunde.

H. *Potentilla* foliis pinnatis, pinnis perangustis, quinquefidis. *Pentaphylloides repens*, foliis pinnatis BUXBAUM T. 49. f. 1. In Cappadociae glareolis. Ex Sibiria. Caules ramosi & multifolii. Folia subtus incana, umbelliferarum foliis similia, longe petiolata, pinnata, pinnae paribus quatuer, quarum primae trifidae & quinquefidae sunt, laciniis angustis, linearibus, integris. Calyx segmenta exteriora ovato lanceolata, interiora gracilia. Petala lutea, acutius incisa.

Potentilla repens, scapo nudo unifloro, pinnis plurimis confertis, minoribus intermisstis Enn. Helv. p. 338. *Pentaphylloides argenteum*, alatum seu *Potentilla* I. R. H. Po-

106. GYMNOPOLYSPERMÆ.

tentilla CAMER. *Epit.* p. 758. *Anserina* BLAKW. T. 6.
Ubique ad vias.

H. *Potentilla* foliis pinnatis, hirsutis, pinnis tredecim ovatis, crenatis, decurrentibus. Ex *Sibiria*. Folia hirsuta, ampla, paria pinnarum sex, extremo inpare, singulae vero primae ovatae, undique obtuse circumserratae sunt. Petala lutea, acute incisa. Stamina viginti & quinque.

H. *Potentilla* foliis pinnatis, pinnis septenis, subrotundis, crenatis, albo flore. *Pentaphylloides erectum* I. B. II. p. 398. d. In montibus *Hundsrück*, in *Marchia*, & *Schweinfurti*. Segmenta calycis exteriora bidentata & tridentata, minora, ovato lanceloata.

H. *Potentilla fruticosa*, foliis ternatis, medio trifido. *Pentaphylloides fruticosum* RAI Cat. plant. Angl. p. 22^o. *Pentaphyllum rectum frutescens* WALThER T. 17. Folia proprie ternata, sed medium folium iterum trifidum, cuius duo laterales lobi confluunt. Frutex duriusculus, multiflorus. Petala subrotunda, lutea. Ovarium pappo plenum, stamina plura. In *Hibernia*, *Anglia septentrionali*, *Suecia*, *Sibiria*.

H. *Potentilla* foliis novenis palmatis, in apice serratis. Ex *Sibiria*. Caules eretti, ramosi. Folia glabra septena, novena, in solo apice tribus quatuorve dentibus incisa. Vaginae amplissimae, digitatae. Flos conspicuus. Petala cordata, flava, absque macula.

H. *Potentilla* foliis digitato incisis, caule recto *Cliff.*
Icon. AICHST. aej. ord. X. T. 9. f. 2. *Quinquefolium*
montanum, *erectum*, *hirsutum*, *luteum* *GARDEL* T. 83.
 In M. *Kickerlikik*, prope *Lipham*.

Potentilla foliis quinatis, palmatis, serratis, sericeis.
Pentaphyllum *TRAGI*. Circa *Tenam* in sylva prope *Cospida*, & in *Marchia Brandenburgensis* abunde. A *Quinquefolio* albo alpino nunc iterum separo, quod flores ex radice proferat, & caule sit humillimo, non ramoso, neque umbellifero, ut illud, quod in montosis *Helvetiae*, in M. *Leitern* & *Agami* provenit.

Potentilla foliis quinatis, longe petiolatis, caule repente. *Enum. Helv.* p. 340. *Quinquefolium majus repens* C. E. *Pentaphyllum majus repeans* DOD. p. 214. Frequens in muris & ad vias.

Potentilla foliis quinatis, obtuse in apice serratis, petalis cordatis *Enum. Helv.* p. 340. *Quinquefolium minus*, *repens luteum* I. R. H. *Pentaphyllum* sive *Quinquefolium minus* TAB. p. 123. Locis siccis primo vere frequens.

Potentilla foliis quinatis, angustissimis, subtus tomentosis, caule recto *Enum. Helv.* p. 341. *Quinquefolium* *folio argenteo* C, B. *Quinquefolium petraeum majus* TAB. p. 122. In muris & locis siccis.

Potentilla foliis quinatis, flore tetrapetalo, caule recto *Enum. Helv.* p. 341. *Tormentilla officinalis* & CAM. *Epit.* p. 685. Abunde in sylvis, in primis uidis, totius septentrionis.

H. *Potentilla* foliis ternatis, hirsutis, caule erecto, umbellifero. *Pentaphylloides fragariae* folio crenis obtusioribus RANDII. Caulis erectus, cum foliis hirsutus, pedalis, in apice umbellatos congestos flores profert. Folia ovalia, medium majus, omnia obtuse serrata. Flores parvi, fere inter folia latentes.

H. *Potentilla procumbens*, foliis ternatis, hirsutis. *Potentilla foliis ternatis, caule diffuso* LINN. Caulis procumbens. Folia profunde & acute in apice serrata, utrinque hirsuta, sed inferius maxime. Petala lutea absque macula, emarginata.

H. *Potentilla* foliis ternatis, ampliter crenatis, subtus tomentosis. *Fragaria sterilis procumbens, foliis Betonicae instar serratis* AMMAN plant. ruth. T. XIV. Folia oblonga, ovata, subtus albo tomento obsita, crenis numerosis, granibusque. Rami florigeri nudi. Petala quinque cordata, macula flava notata. Placenta absque pilis.

Fragaria BLAKW. T. 77. *Fragaria flagellis reptans* Cliff. *Enum. Helv.* p. 343. *Fragaria* & *Fraga* LOB. ic. p. 697. Varietates pingit LANGLEY *pomon* T. 55. sylvestrem, scariatinam & *Hautboy* Strawberry. In toto orbe antiquo ad Chinam usque nascitur.

β. Varietas, an species diversa *Fragariae*. Jenae frequens & in Saxoniae montibus, & in Borussia, cum nomine *Breitlinge*, frequentibus in placenta pilis & pediculis lanuginosis.

Rubus

Rubus caule aculeato, foliis ternatis Cliff. *Enum. Helv.* p. 344. *Rubus repens, fructu caesio* C. B. *Rubus minor* DOD. p. 742. In agris v. g. circa Gräzelii fabricas.

Rubus foliis ternatis & quinatis, subtus tomentosis, fructu rubro, villoso *Enum. Helv.* p. 344. PASS. T. 8. *Fructus idaeus spinosus* I. R. H. In sylvis circa Plesse, Gleichen &c. Varietates habet LANGLEY *Pomm.* T. 56. f. 5. fructu rubro, albo, purpureo. Iconem florentem dat Flate 26.

Rubus foliis ternatis & quinatis, costa spinosa, fructu nigro & levi *Enum. Helv.* p. 345. *Rubus vulgaris, fructu nigro* I. R. H. *Rubus CAM.* Epit. p. 751. BLAKWELL T. 45. In Germania ubique, & ipsa Japonia.

β. Varietas flore pleno TILLI T. 47.

POMIFERAE UMBILICATAE.

Has & vicinas alias pomiferas Icosandrias vocat LINNAEUS. Staminum autem numerus inconstans est, inter XVI. & XL. pro specierum varietate.

Rosa fructu levi, calycis foliolis divisis *Enum. Helv.* p. 349. *Rosa canina, sylvestris* BLAKW. T. 8. *Rosa sylvestris, flore incarnato* ALCHST. Vern. Ord. VI, T. 6. f. 1. Ubique ad sepes.

β. Varietas flore albo du PASS, T. 115.

Rosa

110 POMIFERAE UMBILICATAE.

Rosa foliis subtus ruiginosis, odoratis *Enum. Helv.* p. 350. *Rosa sylvestris*, foliis odoratis DOD. *Pempt.* p. 187. Passim in sterilibus.

β. Eadem flore pleno de BRY II. T. 126.

& γ. Flore flavo. *Rosa lutea* LOB. II. 209. *Catal of Trees* T. 18.

Rosa foliis utrinque villosis, fructu spinoso *Enum. Helv.* p. 350. *Rosa sylvestris pomifera*, major C. B. Passim in epibus, maxime inter *Bovenden* & ejus vici *patibulum*. Diversas autem has Rosas esse satis adparet foliis fructuque.

H. *Rosa centifolia* &c.

H. *Myrtus minor vulgaris* C. B. LOB. ic. II. p. 127 GARDEN. T. 71. *Myrtus Tarentina* AICHST. Aest. ord. fr. T. 12. f. 2. Varietates pinxit MUNTING. T. 25 ad 30. Flore pleno *Myrtum PEIRESCIUS* ex sylvis Provinciae primus in hortum aduluit *Vit.* p. 85.

H. *Myrtus baetica*, domestica, latifolia LOB. ic. II. p. 127. In regionibus calidis, Syria, Japonia.

Sorbus foliis pinnatis, glabris, fructu glabro, ineduli *Enum. Helv.* p. 350. *Sorbus aucuparia* I. R. H. *Sorbus sylvestris* CAM. Epit. p. 161. Nuclei ad quatuor usque. Ubique in sylvis.

Sorbus (*Crataegus*) folio septangulo, subtus hirsuto *Enum. Helv.* p. 354. *Sorbus terminalis* C. B. ALDROV. p. 441. Treilly arbor du CHOUL. Pilat. p. 75. In sylvis

POMIFERAE UMBILICATAE. III

vis passim, id Germania & Anglia. Tubae duae. Fruktus bilocularis.

Sorbus spinosa, foliis obtusis, faepe trifidis. *Enum.* *Helv.* p. 354. *Mespilus sylvestris*, apii folio, spinoso C. B. *Spina alba* BLAKWELL. T. 149. Ad sepes. Tubae duae (& tres) semina duo (& tria)

Sorbus foliis ovatis, inaequaliter serratis, subtus tomentosis *Enum.* *Helv.* p. 353. *Crataegus* folio subrotundo, serrato, subtus incano I. R. H. In Helvetiae & Arverniae montibus. In sylvis inter Hildburghausen & Meiningen reperi. POCOCK circa Jerusalem. In Toscana. Etiam huic tubae duae (& nonnunquam tres)

Sorbus, (*Mespilus*), foliis ovatis, integerrimis LINN. *Chamaemespilus Gesneri* CLUS. *Pann.* p. 83. In M. Fuchsberg prope Jenam, in Helvetiae vero & Alsatiae montosis passim. Tubae duae & tres. Stamina viginti. Semina tria

Tubarum & seminum numerus nimis variabilis est, quam ut genera constituant.

Pirus foliis serratis, pomis basi productis *Enum.* *Helv.* p. 351. *Cliff.* *Pirus Sylvestris* I. R. H.

H. *Piri domesticae variae species*

Pirus foliis serratis, basi concavis *Enum.* *Helv.* p. 351. *Cliff.* *Malus sylvestris* I. R. H.

H. *Mali domesticae species*.

Cydo-

112 POMIFERÆ UMBILICATAE.

H. *Cydonia* & *Cotonia mala* LOB. ic. II. p. 152. Calyx ferrato a Malo differt. In insulis Graeciae, vineis ad Danubium, Hungaria.

POMIFERAE NON UMBILICATAE.

H. *Punica* flore pleno, majore. *Balanistium* AICHSTr aest. ord. fr. 4. T. 8. f. 1. In insulis orientis RUMPF. T. II. c. 33.

H. *Guajava americana*, alba, dulcis.

Prunus spinosa, foliis lanceolatis *Enum. Helv.* p. 355. *Prunus sylvestris* C. B. MATTH. p. 266. In vallo urbis frequens.

H. *Pruni domesticæ* species variae.

Cerasus foliis ovatis, lanceolatis IROY. *Enum. Helv.* p. 356. *Cerasus major ac sylvestris*, fructu nigro colore insicente C. B. In sylvis passim, etiam circa *Cerasum*. Stamina quadraginta.

H. *Cerasi sativæ*.

H. *Padus sempervirens*, foliis solidis, *Laurocerasus* CLUS. 4. CAMER. *hort. ic. 23.*

Padus foliis deciduis, floribus racemosis *Enum. Helv.* p. 357. *Cerasus racemosa, sylvestris* I. R. H. *Pseudolligustrum*

POMIFERAE NON UMBILICATAE. 113

frum DOD. p. 777. Circa Northeim & in *Helvetia* abunde ad sepes. In *Silesia*, *Syria* POCOCK.

H. *Persica*: Varietates sponte in America septentrionali, & *Georgia* nascentur.

H. *Capparis spinosa* fructu majori I. R. H. *Duc* petala superiora distincta, duo inferiora conglutinata. In *Persia* FRYER. In *Syria*, *Palæstina* POCOCK.

H. *Citrus petiolis* alatis LINN. *Aurantium dulci medulla*, *vulgare* I. R. H. *Aurantiae flores* FERRAR. p. 369. & *Aur. Olyssiponense* p. 427.

H. *Limon vulgaris* FERRAR. *hesperid.* p. 193. & *Limoniae flores* p. 189.

H. *Citrus petiolis* gracilibus. *Citrum vulgare* I. R. H. *Malum citreum vulgare* FERRAR. *hesperid.* p. 61. & *Citri flores* p. 59. In insulis indicis KAEMPFER. In Mexico GAGE.

M U L T I L O C U L A R E S.

Tilia femina, folio minore C. B. *Enum. Helv.* p. 358. In sylvis ubique.

β. Tilia femina, folio majore C. B. *Enum. Helv.* p. 358.

H. *Tetragonocarpos africana*, fruticans, foliis longis & angustis *Hort. Amst.* T. II. f. 103.

H

Syrin.

Syringa major, sive *Philadelphus Athenaei*, I. R. H. *Syringa flore albo* CLUS. h[ab]sp. p. 125. Ad sepes quasi spontanea,

H. *Cistus mas*, folio subrotundo, hirsutissimo C. B. *Cistus major* CLUS. h[ab]sp. p. 135? Duo folia calycis caudata, tria integra. Flos purpureus, flaccidus. In *Toscana*, *Hispania*.

H. *Cistus ledon quartus* CLUS. h[ab]sp. p. 79. *flore candido* I. B. II. p. 10. Ob folia nigricantia utrimque hirsuta, si accurate examinentur, inferne non altentia, florem album, ungue flavescente, non purpureo, huc referto; quibus notis a primo CLUS. differt. Caeterum viscidus & odoratus est. Tuba crassa, rotunda, folia calycis externe majora tria, interna minora duo.

H. *Helianthemum folio ampliori, flore roseo* SHERARD Pkil. Trans. n. 383. Ipso colore floris te satis prodit, habitu caeterum vulgaris *Helianthemi*, erectiori. Segmenta calycis tria crassa, lineata, duo minimia.

Helianthemum foliis subhirsutis, longe ellipticis Enn. Helv. p. 358. *Helianthemum vulgare*, flore luteo C. B. *Hyssopus campestris* TRAG. p. 221. An Steinen bey Herrenhausen, versus Rohringen &c.

Helianthemum majori folio & flore luteo DILL. ex semine ab ipso viro illustri accepto.

Helian-

A. *Helianthemum Salicis folio I. R. H. Cistus annuus L.*
 CLUS. p. 76. *Calycis segmenta longa, acuta, duo minora, petala pallidissima.* In *Syria, Mesopotamia, Salman-*
ticae, & in agro Granadensi.

Hypericum glabrum, erectum, annuum, foliis punctatis,
obtusis Euxm. Helv. p. 360. Hypericum DOD. p. 76.
Ubique in agris & sylvis. Calyx acutus, glaber, folia per-
forata, passim punctis nigris notata, tum caulis alae. Peta-
la & antherae punctatae.

Hypericum humifusum, foliis glabris, perforatis, pun-
ctis in margine nigris notatis Enum. Helv. p. 360. Hy-
pericum supimum, minimum, septentrionale LOB. ic. p. 400.
Copiose jenseit Rheinhauen im Walde, & in agris
M. Hagen. Circa Cellam abunde. Calyx serratus, absque
ampullis petiolatis. Petali extremum maculis nigris pun-
ctatum. Stamina & tubae purae.

Hypericum foliorum ora punctata, calyce serrato.
Enum. Helv. p. 361. Ascyron, sive Hypericum bifolium,
glabrum, non perfoliatum C. B. Androsaemum campoclaren-
se COLUMN. Ecphr. p. 73. Iconem etiam dedit HILL T.
H. T. 14. In Marchia. Auf jener Seite von Rheinhauen
und beym Boveunder Galgen, zu Plesse unten am Fahrwege,
aufm Kishäuser und Altenstolberg. Antherae punctatae, peta-
la raro & in apice punctata, calycis ora ciliata, punctis
nigris notata, qualia etiam in ora folii sunt. Ora folii
purpurea. Conf. etiam Cl. WILLICH disp. cit. p. 5.

Hypericum villosum, calyce serrato, foliis perforatis
Enum. *Helv.* p. 361. *Androsaemum alterum* COLUMN.
 p. 75. Globuli terebinthinati calycis sessiles in ferris ca-
 lycis, petala uno puncto notata, stamina pura, tubae
 apex purpureus vel niger.

Hypericum calyce serrato, foliis connatis. *Hypericum pulchrum* TRAGI Copiose in sylva super Hardegzen.
 Etiam passim in sylva die Lith. In Anglia, Alsatia M.
 Ballon. Folia perforata, absque maculis, cordiformia,
 glauca, connata: calyx ferratus, nigris bullis ornatus: pe-
 tala saturati coloris aurantii, apice punctata: stamina mi-
 niata & tuba pura.

Hypericum caule quadrangulo, foliis perforatis *Enum.*
Helv. p. 362. *Ascyrum MATTH.* p. 937. *Hypericum As-
 cyron dictum*, caule quadrangulo C. B. In fossis vorm Geis-
 mer thor. Functum in petalo aut nullum, aut unum
 duove, antherae punctatae, in foliorum ora subinde pun-
 cta nigra.

H. *Hypericum faetidum*, frutescens I.R.H. *Androsaemum*
faetidum sive *Tragodes* AICHST. aest. ord. X. T. 2. Petala
 punctata, tum apices tubae, calyx purus, acutus. Sta-
 mina longissima. Varietates duas minori & majori flore
 habet DILL. Elth. T. 151. In Palaestina, Creta.

H. *Hypericum bacciferum* BLAKWELL T. 94. DOD.
Purg. p. 424. *Androsaemum maximum*, frutescens C. B. In
 Anglia, in Biturigibus, circa Veronam: Bargam:ue Hetruriae.
 Calycis folia inaequalia, nullae macuiac vel bullae.

H. Har-

MULTILOCULARES.

117

H. Harmala DCD. *Purg.* p. 420. *syriaca* LOBELII p. 55. In *Syria, Palæstina, Mesopotamia Arabia.*

H. Corchorus foliorum infimis ferraturis setaceis, maximis, reflexis. LINN. Siliqua quadrangularis, cylindrico-conica, calyx quinquefolius, lanceolatus: petala quinque petiolata, serrata, ovalia. Stamina numerosa. Tuba crassa, simplex. r.

C O L U M N I F E R A E.

H. *Hibiscus* foliis palmatis, septempartitis LINN. *Ketmia* folio *manihot* serrato, flore ampio, sulphureo DILL. Elth. f. 189. T. 156. *Ketmia Brasilensis*, folio *Ficus*, fructu pyramidato, sulcato MERIAN. Surinam p. 37. Calyx exterior sexfidus & quinquefidus, latus, interior quinque & sexfidus cum flore caduco.

H. *Hibiscus aculeatus*, foliis trilobis, & quinquelobis, inaequaliter serratis. *Narinam Fulli* H. MAL. Tom. VI. f. 44. *Alcea Bengalensis*, spinosissima, acetoso sapore, flore luteo, pallido, umbilico purpureo H. Amst. I. p. 35. *Ketmia indica*, aculeata, foliis digitatis I. R. H. *Acetosa* BONTII. T. VI. p. 114. *Ketmia indica*, foliis digitatis, flore magno, sulphureo, umbone atropurpureo, petiolis florum spinosis EHRET. T. 8. Calycis externi segmenta octo, triangula, interior calyx asper, bullatus, campaniformis,

quinquepartitus. Flos pallens, umbilico purpureo, segmentis lineatis, adrosis, angustis: Aculei ad ortum ramosum & in petiolis floriferis. Folia biloba & quinqueloba, acuta, dentibus alterne majoribus serrata. In synonymis facile fuerit errasse.

H. Hibiscus, foliis palmatis, serratis, fructu pyramidali, longissimo. Folia imma integra, superiora quinquefida. Calyx exterior octofidus, interior spathiformis, lacer. Flos sulphureus unguibus purpurcis, fere ut in priori, & similes rubae, sed fructus praelongus, incurvus. r.

H. Hibiscus foliis imis cordatolanceolatis, superioribus pentagoniis, serratis. *Ketmia americana peludosa*, *folio scabro Ulmi acutiore* BOERH. II. *Althea* PIS. *list. nat. Ind. L. IV. p. 222.* Annon eadem est *Ketmia frutescens*, *glaucia*, *Aceris majoris folio longiore*, *serrato*, *flore carneo*, CATESBY T. 77. cuius folia certe ad nostram valde accedunt. Calyx exterior 10 & 12 fidus. Flos rosaceus, petalis circumfisis, ungue flavo, semine reniformi, fusco : folia imma cordato lanceolata, superiora pentagonia, media lacinia productiore

H. Hibiscus foliis ovato lanceolatis, superne inciso, serratis Cliff. *Alcea Syriaca* AICHST. aest. ord. fr. T. X. f. 1. *Alcea arborescens* CAM. hort. n.3. Varietates multae existant in Catalogue of Trees T. 10. In BROSSAEI talulis exprimitur.

Hibiscus calyce inflato, Alcea vesicaria DOD. *Purg.* p. 460. Radii exteiiores 10. 11. 12. Calyx inflatus linearis. Styli quinque vel sex, Circa Veronam.

B. *Ketmia vesicaria, africana, foliis minus divisis, glabrioribus non videtur differre.*

Althea foliis simplicibus, tomentosis Cliff. *Althea* *Dioscoridis & Plinii C.B.* *Althea* BLAKWELL T. 90. Passim in aquosis Germaniae ad Rhenum ad fl. *Unstrut* prope *Lanche*.

H. *Althea* foliis scabris, acutis, semitrilobis. *Althea Cannabina.* I. R. H. Calyx exterior semioctofidus, interior de more semiquinquefidus. Petala purpurea, adrosa, tubae sedecim: capsulae sunt cunei sphaerici, reniformes, venulis crassi. Folia ima triloba, latiora, lobis primis semibifidis: superiora penitus triloba, lobis primis unice paulum acutius ad orium dentatis.

H. *Althea* foliis sinuato angulosis. *Malva rosea, folio subrotundo* C. B. floribus variis coloris. Circa Budam MARSIGLI. In *Palaestina* POCOCK.

H. *Althea* foliis palmatis, digitatis *Malva arborea* BLAKWELL T. 54. *Malva rosea, hortensis, maximis, folio Ficus.* I. R. H. floribus variis coloris.

Alceam cum *Althea* conjungi posse videtur, tum ob florem, tum ob fructum, neque calyx dissentit. Calyx est Hibisci, fructus Malvae.

H. Malva caule arboreo, foliis palmatis, obtusis, plicatis. *Althea maritima, arborea, veneta* C. B. *Malva arboreascens* AICHST. aest. ord. VI, T. 6. Ad ripas maris mediterranei.

H. Malva (*Lavatera*) foliis quinqueangularibus, acutis, crenatis, lacinia media productiore Cliff. *Althea frutetrix* CLUS. bisp. p. 91. *Althea frutescens, folio acuto, molli, vircente, flore specioso* PLUKN. T. 8. f. 1. Ad ripas maris mediterranei. Circa *Monspelium*.

H. Malva caule arboreo, foliis tomentosis, obtusissimis, micantibus Cliff. *Althea frutescens Lusitanica, folio ampliore, minus incano* I. R. H. ad solem micante, moschato. Huic calyx exterior rotunde cordatis amplis foliis fit, ut in *Althea olbiae*, & in *maritima*, sed penitus divisus, atque adeo *Lavateras* a *Malvis* separare vetat, mediaque genera unit.

H. Malva (*Lavatera*) foliis inferioribus cordato subrotundis, superioribus lobatis crenatis &c. ROY. *Althea Thuringiaca* CAMFR. h. ic. 6. Copiose in Thuringia ad fl. *Unstrut* inter *Wibe* & *Artern*, & inter *Karstett* & *Tilleda* legi.

H. Malva foliis subrotundis, capsulis scuto subpositis. *Lavatera Altheae folio & facie, flore rubro* I. R. H. IC. BROSS. T. IV.

β. Flore albo.

H. Malva rotundifolia, Italica, flore ampio. *Malva perennis Hispanica, carneo amplio fiore* MOR. S. 5. T. 17.

Flore

H. β. Flore albo.

Malva caule erecto, foliis pene palmatis, obsolete serratis Enum. Helv. p. 362. *Malva vulgaris* BLAKW. §. 22. *Malva sylvestris* PASS. L. II. ic. 11. *Malva sylvestris,* *folio sinuato* C. B. *Malva sylvestris, recta* CORD. hist. p. p. 114. Ubique ad vias.

Malva caule repente, foliis cordato orbicularibus, obsolete quinquefidis Cliff. Enum. Helv. p. 363. *Malva sylvestris, folio rotundo* C. B. *Malva sylvestris, pumila* FUCHS. 508. Ad vias.

H. Malva floribus albis, parvis, conglomeratis. Malva Syriaca, pumila, flosculis albidis, caulinis adhaerentibus BOERH. p. 268. *Malva di Ragusa* ZANON. T. 113.

H. Malva foliis crispis MOR. S. V. T. 15. *Malva crispa* PASS. aut. T. 9.

H. Malva humifusa, minima SHERARDI TILLI hort. Pis. T. 35. A priori habitu procumbente & parvitate florula distinguitur. r.

H. Malva Capensis, frutescens, Grossulariae folio, majori, hirsuto. DILL. hort. elth. T. 169. p. 209. Ex Africa. r.

Malva caule erecto, foliis multipartitis Cliff. Enum. Helv. p. 363. *Alcea vulgaris major* I.R.H. Am Bovender Wege in den Büschchen, am Lengeler Dach & in primis ad viam versus Hertzberg.

H. Malva foliis palmatis, scabris, caule tomentoso, fructuoso RÖY. *Alcea vulgaris, procerior, folio Bryoniae* BOERH. p. 268.

H. *Malva* caule erecto, foliis imis subrotundis, superioribus tenuiter divisis *Eum. Helv.* p. 363. *Alcea* folio rotundo & laciniato LIDERN. *hort.* ad p. 109. *Malva montana* sive *Alcea rotundifolia*, *laciniata* COLUMN. Ecphr. p. 147. Capsulae hirsutie sua dignoscuntur. Folia ima semper subrotunda, superiora modo unice quinqueloba, graciliora, modo tenuiter divisa. Circa Bernam, in Suntgovia, Alsatia & ad Rhenum, & in Sicilia, Italia.

H. *Abutilon* foliis subrotundo cordatis, acuminatis, crenatis. *Abutilon Avicennae* ALCHST. Aest. Ord. VI. T. 16. f. 1. An diversum *Abutilon* POCOCK I. T. 14?

H. *Abutilon indicum* CAM. H. ic. 1. *Abutilon hirsutum* RUMPF L. VI. c. 13. Beloere H. MAL. T. VI. ic. 45. An vere differt?

H. *Abutilon americanum*, flore caeruleo *Althea indica*, flore caeruleo, minimo BROSS. Calyx unicus. Tubae fere septem; sub semine quolibet iquama perforata, ejusdem figurae, a loculo diversa. Capsula monosperma, in crassius cornu extrêmo fine prominens.

H. *Abutilon Lavaterae* folio, fructu cristato H. Elth. T. 2. f. 2. In Mexico. Calyx etiam unicus, flos priore multo major, purpureus, cornu exterius fructus longius, capsulae fulvo pilo hirtae, tubae viginti.

H. *Abutilon periplocae* folio acutiori, fructu stellato DILL. Elth. Calyx unicus, flos profunde divisus, albus, ungue

COLUMNIFERA.

123

ungue roseo, capsulae quatuor vel quinque cum totidem curvis tubis, semina triangularia cum tuba nitida. r.

H. Abutilon vesicarium, crispum, floribus melinis parvis DILL. H. Elth. Capsulae splendidae ampliae, margine undulato, linea elevata divisae, extremo fine in speciem planam conflexae. Calyx unicus, per maturitatem reflexus, flos albus, subflavus; pedunculi florigeri finis pendulus, geniculatus. r.

H. Abutilon Carolinianum incanum repens, Alceae folio, flore helvolo H. Elth. T. 4. f. 4. Capsulae in flexione duas aristas habent. Calycis exteriora folia tria. Semen unum vel duo. Flos coloris rubri obscurioris.

H. Abutilon f. Malvinda Americana, Ulmifolia, floribus congregatis ad foliorum alas, Niruren H. MAL. F. X. T. 35. In BROSSAEI tabulis icon extat. Calyx exterior tribus latis cordatis segmentis fit. Capsulae duodecim & ultra, monospermae, pilosae, tricornes, duobus cornubus pilosis ex flexione sua armatae, tertio cornu ex media capsula prope axin erecto; semina reniformia.

H. Abutilon f. Malvinda Ulmifolia, semine rostrato. *Althea carpini folio, flore luteo* BOCC. Sicul. p. 11. *Malva annua di Pernambuco* ZANONI nov. edit. T. 174. In BROSSAEI tabulis etiam pictum est. Calyx unicus semi-quinquedidus, cuius gratia LINNAEUS hanc malvindam a reliquis separat. Capsulae ex medio axi aristatae.

H. Abutilon f. Malvinda bicornis, Sanguisorbae folio, glabro H. Elth. p. 214. T. 171. *Abutilon f. Malvinda rostrata*

COLUMNIFERAE.

strata, Coromandeliensis, majori folio, subrotundo PLUKNET T. 9. f. 6. Spinae trigeminæ ad ramorum ortum. Tubæ tantum quatuor & quinque. Calyx unicus.

Summa similitudo harum plantarum ostendit, a calyce characterem sumi non posse. Cornua siliquarum eas uniunt cum Abutilo, neque sola seminum in loculo multitudine eas separare potest.

H. Napea. Abutilon folio profunde dissecto, pedunculis multifloris, femina EHRET T. 7. & mas T. 8. Plerique flores pleni, staminibus saepe imperfectis, tubis tamen 18 praediti, pro feminis procul dubio EHRETIO habitu, sed unice steriles sunt. Calyx unicus, flos albus rotatus, ut in Hermannia, petalis rotundis. Ex America septentrionali.

H. Hermannia frutescens, folio oblongo, ferrato BOERH. Althea Africana, frutescens, floribus aureis, cochlatis, pendulis minoribus, VOLC. flor. p. 24. In Africa.

H. Gossypium caule erecto Cliff. Gossypium arboreum ALP. aegypt. p. 71. caule levi C. B. RUMPF. L. VI, c. 15. In Graecia, Asia &c.

S U C C U L E N T A E.

Portulaca foliis cuneiformibus, sessilibus LINN.
Kara Tsjira H. MAL. X. T. 36. *Portulaca Sylvestris*
 ÇAM. Epit. p. 258. In ripa *Rhem* ubique. In utraque
 India, *Madagascar*, *Tunkin*, & in tota *Zona torrida*.

α caule viridi.

β. caule rubro.

H. *Cactus subrotundus*, *rectus* *tuberculis ovatis*,
barbatis Cliff. *Ficoides* *sive Melocactus manillaris*, *gla-*
bra, *fulcis carens* PLUKN. T. 29. f. I. *Ficoides*
Africanum, *sphaericum*, *tuberculatum*, *lactescens*, *al-*
bo fructu, *pyramidalis*, *rubro* BRADLEY Dec. III. p. II. In
America calidiori omnes hae plantae nascuntur.

H. *Cactus sexangularis*, *longus*, *rectus Cliff.* *Cereus al-*
tissimus, *Surinamensis*, *spinis fuscis Par.* Bat. *Cereus maxi-*
mus, *Americanus*, *sexangularis*, *flore albo*, *radiato* BRADLEY
Dec. I. T. I. Historiam florentis plantae dat COWEL
curious gardiner II. p. 38. & VOLC. app. *hesper.* p. 38.
 TREW E. N. C. Vol. III. obs. 129. &c.

H. *Cactus scandens*, *angulis quinque pluribusve obtusis*
 ROY, VOLCAM. *hesp.* Vol. I. ic. *Cereus scandens*, *minor*,
articulatus. PAR. BAT. p. 113. BRADLEY I. p. 2. E.N.C.
 Vol. I. obs. 141. TREW. Vol. IX. app. II.

H. *Cactus minimus*, *scandens*, *polygonus*, *spinosissimus*,
flore purpureo EHRET. T. 2.

H. Cactus quadrangularis, longus, eretus, angulis compressis *Cliff.*

H. Cactus triangularis, scandens, articulatus *Cliff.*
BRADLEY Dec. I. ic. 3. cum nomine transposito. Iconem & characterem dat ILL. TREWIUS E. N. C. Vol. IX. app.

H. Cactus teres, compressus, articulatus, ramosus *Cliff.*
Ficus Indica sive *Opuntia Curaçavica*, minima Hort. Amst. I. p. 56. BRADLEY Dec. I. ic. 4. cum nomine transposito.

H. Cactus compressus, articulatus, ramosus, articulis ovato oblongis, spinis subulatis *Cliff.* *Opuntia major*, *validissimis spinis munita (slavis)*. In BROSSAEI tabulis exprimitur. Est *Tuna major*, *spinis validis, flavicantibus, flore sulphureo* Hort. Elth. T. 296.

H. Cactus compressus, articulatus, ramosissimus, articulis ovatis, spinis setaceis *Cliff.* *Opuntia vulgo herbariorum.* In BROSSAEI tab. Etiam in *Virginia* provenit.

H. Cactus compressus, articulatus, ramosus, articulis ovato oblongis, spinis setaceis *Cliff.* *Opuntia maxima*, *folio spinoso longissimo & latissimo* I. R. H.

H. Cactus foliis ensiformibus, obtuse serratis *Cliff.*
Cereus Scolopendrii folio brachiato Elth. T. 64. *Phyllanthos Americana*, *sinuosis foliis, longis, crassis, carnosis, Opuntine in modum florigera* PLUKN. T. 241. f. 2. *Cactus Indicus, Scolopendrii folio, piano, glabro, brachiato* ROLOF hort. Crans. p. 41. *Canambaya* MARGGRAF p. 78. 79.

H. Peireskia aculeata, flore albo, fructu flavescente
 DILL H. Elth. T. 227. *Malus Americana, spinosa, Portulacae folio, fructu folioso, semine reniformi, splendente Hort. Amst. l. f. 70.*

Ceteri characterem atque descriptiones nuper accuratas, ut solet, dedit ILL. TKEWIUS E. N. C. Vol. IX. opp. & sulcato ovali fructu a Tuna conico glabro & umbilicato fructu praedita separat.

H. Ficoidea Hispanica, annua, folio longiore Elth. T. 117. f. 143.

H. Ficoidea Canariensis, procumbens, Portulacae folio Mem. de l' Acad. 1711. *Kali aizoides Canariense, procumbens, Portulacae pallescentibus succulentis foliis, aspergine rorida perpetuo madidis VOLC. flor. p. 236.*

H. MESEMBRYANTHEMUM crystallinum, Plantaginis folio, undulato H. Elth. T. 180. *Ficoides Africana, Plantaginis undulato folio, micis argenteis adsperso* BRADLEY n. 48. Dec. V. p. 15. Calyx quinquefolius inaequalis, tubae & loculi quinque.

H. Mesembryanthemum folio linguiformi, latiore H. Elth. p. 238. T. 185. *Ficoides folio triangulari, lucido, obtuso, flore aureo, magno* VOLC. flor. p. 165. *Ficoides Africana acanlos, foliis crassissimis, lucidis, conjugatis* BOERH. & BRADLEY Dec. III. p. 8. Calyx quadrifolius,

lius, alterne alatus & alis membranaceis dentitutus. Petala aurea. Tubae connatae, fere ut in Papavere, operculum faciunt octo & decem radiorum.

H. Mesembryanthemum falcatum, majus, flore ample, luteo H. *Elth.* p. 238. T. 155.

H. Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo. H. *Elth.* p. 282. T. 211. f. 271.

H. Mesembryanthemum rostrum ardeae referens H. *Elth.* p. 240. T. 186.

H. Mesembryanthemum foliis corniculatis, longioribus H. *Elth.* T. 199. f. 202. Sed nostro folla viridia fuerunt. r.

H. An Mesembryanthemum pugioniforme, flore ampio, stramineo H. *Elth.* T. 211.

H. Mesembryanthemum foliis veruculiformibus, floribus melinis H. *Elth.* p. 268. T. 203.

H. Mesembryanthemum calamiforme H. *Elth.* f. 228. Nostrum habet folia calycis quinque, alterne alata, petalum argenteum vel pallide stramineum, angustis laciniis. Tubae octo & octo loculi fructus.

H. Mesembryanthemum folio dolabraesformi H. *Elth.* f. 237. Non omnia folia processum habent. Calyx alterne, ut aliis Mesembryanthemis, alatus & non alatus, quinquefolius. Nempe duo folia viridia sunt, & duas appendices albas habent, duo nullas, unum in altero latere unam. Flos intus aureus micans, extus aurantius.

H. Mesem-

Serrata *embryanthemum* *scabrum*, *flore sulphureo convexo* H. *Elth.* p. 248. f. 196. *Calycis segmenta alterne alata*, & non alata: *petala extus pallida*, *intus laete flava* *Tubae quatuor crassis stigmatibus.*

H. *Mesembryanthemum Bellidiflorum* H. *Elth.* f. 233. T. 189. *Mesembryanthemum folio triangulari, glauco, saepe reflexo & aculeato Bellidiflorum* BURMAN. Afric. T. 75, foliis ad apicem aculeatis.

H. *Mesembryanthemum* - - - *caule albo*, *ramoso*, *fruticoso*, *foliis conjugatis*, *virentibus*, *non punctatis*, *rugosis triquetris*, *superne cavis*, *paulum curvis*, *mucrone brevi*. Nondum floruit.

H. *Mesembryanthemum deltoides*, *non dorso*, *sed lateribus muricatis* H. *Elth.* p. 253. T. 195. *Ficoides aizoidea erecta*, *Africana*, *folio triangulari*, *breviusculo*, *floribus roseis*, *odoratis* VOLC. besp. I. app. f. 5. *Ficoides Africana*, *perfoliata*, *foliis triangularibus*, *glaucis*, *punctatis*, *corticis lignoso*, *candido*, *tenui* BRADLEY Dec. III. p. 8.

H. *Mesembryanthemum folio deltoide*, *dorso & lateribus muricatis*, *minus* H. *Elth.* f. 246. T. 195. *Calyx alterne alatus*, & non alatus, *quinquefolius*; *petala distincta*, *non cohaerentia*, ut in reliquis speciebus, *suave purpurea*, *obtusa*; *tubae quinque*, & *loculi totidem*.

H. *Mesembryanthemum foliis confertis*, *splendentibus*, *flore pallido*. H. *Elth.* T. 204. f. 260. *Tubae sex & segmenta calycis*. *Petala alba*, *rubore in apice perfusa*; *calycis folia quinque* ut solent, *duo alis albis utrinquo aucta*, *unum ab uno latere alatum*, *duo nuda*

H. Mesembryanthemum tortuosum, foliis sempervivi, expansis *H. Elth.* T. 182. Calycis folia quinque, alterne alata, fructus bullatus, fructus quinqueularis lotubae quinque.

H. Mesembryanthemum tortuosum, foliis sempervivi, congestis *H. Elth.* T. Calycis folia tria reflexa, duo aristata, quasi calcare praedita & alis. Petala sulphurca.

H. Mesembryanthemum persfoliatum, foliis majoribus triacanthis *H. Elth.* f. 240. T. 193. Calycis folia quinque, alterne alata. Petala gracilia, suave purpurea. Tubae ad septem usque.

H. Mesembryanthemum noctu olens, flore intus candido, extus stramineo, odoratissimo *H. Elth.* Fructus pustulatus, quadrilocularis; calyx quadrifolius, & duo folia utrinque alata, duo neutiquam; flos albus, subochroleucus, petalorum ulteriori parte subpurpurea. Tubae & loculi quatuer.

H. Mesembryanthemum pilosum, micans, flore sature purpureo *H. Elth.* p. 288. T. 214. Calycis segmenta quinque, alterne alata & non alata. Petala obtusa, purpurea, splendida. Tubae & loculi quinque.

H. Mesembryanthemum radiatum, humile, floribus minoribus *H. Elth.* p. 246. T. 190.

H. Mesembryanthemum radiatum, ramiculis prolixis, decumbentibus *H. Elth.* T. 190. f. 234. Calycis folia quinque,

tere-

teretia, stellata, alterne alata & non alata. Petala extus alba, intus laete purpurea. Tubae quinque & loculi quinque.

H. *Mesembryanthemum radiatum*, humile, foliis majoribus H. *Elth.* p. 248. T. 190. An *Ficoides capensis*, *humilis*, *folio tereti*, *pilis in extremitate stellatis*, *flore purpureo* BRADLEY Dec. II. p. 6.: Videtur.

H. *Mesembryanthemum capense*, geniculiflorum, Neapolitanum creditum. H. *Elth.* f. 261. *Ficoides Africana*, *caulescens*, *tenuifolium*, *floribus albis*, *umbellatum*. BRADLEY. Calycis quatuor foliola, quorum duo minorata sunt. Flos monopetalos stramineus, pallens. Fructus tetragonus. Tubae quatuor & loculi.

H. *Mesembryanthemum tenuifolium*, frutescens, flore croceo H. *Elth.* f. 253. Calyx tuberosus, foliis alterne alatis. Petala flava, extus subrubella, ad solem fulgida. Tubae quinque.

H. *Mesembryanthemum tenuifolium*, procumbens, flore coccineo H. *Elth.* p. 284. f. 256. Calyx alterne alatis & non alatis foliis, ut priora. Flos ignei coloris in aurantium tendentis.

H. *Mesembryanthemum falcatum*, minimum, flore purpureo, parvo H. *Elth.* p. 213. Calyx campaniformis, alternis segmentis alatis & non alatis. Petala suave purpurea, emarginata. Tubae quinque & loculi.

Adparet, variabiliter numero tubas esse, quatuor, quinque, sex, octo, & decem, loculorum perinde incertus numerum.

152 SUCCULENTAE.

petala vero conjuncta vel divisa, ut in primis ab habitu & a staminum numero insigni uniantur.

H. Crassula foliis planis, margine cartilagineo, ciliatis, basi in vaginam connatis Cliff. *Cotyledon Africana*, frutescens, flore umbellato, coccineo COMM. rqr. ic. 24. *Crassula orbicularia*, repens, foliis sempervivi H. Eltb. T. 100.

H. Crassula foliis lanceolato subulatis, sessilibus, connatis, subtus convexis, superne excavatis, ROY. *Aloe Africana*, perfoliata, glauca & non spinosa COMM. prael. T. 23. BOERH. qui jam olim monuit, Aloen non esse, floremque sedi similem gerere.

H. Crassula Anacampserotis folio H. Eltb. T. 97. f. 114.

H. Crassula altissima, perforata COMM. Lit. Nov. 1752, lebd. 52. cum ic.

Crassulæ isotheunes sunt, ob habitum hic reliqua,

D I P L O S T E M O N E S.

H. *Cotyledon Africana*um, frutescens, folio longo & angusto COMM. pl. rar. T. 23.

H. Alia species paulum diversa, foliis lanceolatis, magis patulis, excavatis. Videtur esse *Cotyledon Africana*; foliis depresso, cruciatis WALTHER hort. p. 16. ic.

H. *Cotyledon* foliis laciniatis LINN. *Cotyledon Africana*um, folio lato, crasse, laciniatō, flosculo aureo BOERH. *Telephii* species BONT. L. VI. c. 41. *Planta anatis* RÜMPF L. VIII. c. 63. In Sibiria, India.

H. *Cotyledon* foliis semiglobosis. LINN. *Cotyledon capensis*, folio semiglobato H. Elth. T. 95. f. III. an *Sedum Africana*um, frutescens, incanum, orbiculatis foliis H. L. B. p. 517. MOR. S. XII. T. 7.

H. *Cotyledon Africana*um, frutescens; foliis orbiculatis; limbo purpureo cinctis I: R. H.

H. *Sedum* caule ramoso; rosulis foliorum ciliatis obsoito. *Sedum majus* CLUS. bisp: p. 123: *Sedum arboreum* radicabile MUNT. f. 179. *Sedum majus*; arborescens C. B. BRADLEY Dec. IV. p. 1. In America calidiori.

Sedum rosulis sessilibus, liberis; conniventibus, foliis ciliatis; in apice purpureis: *Entom.* *Helv.* p. 392. *Sedum majus* PASS. T. 33: *Sedum majus vulgare* C. B. MANGET. pharm: II. p. 803: *Sempervivum majus* CAM: Epit: p. 854. In rupibus zu Rheinhausen. Varietatem vidi, staminibus in lata quasi scuta mutatis;

H. *Sedum rosulis acaulis*, foliis ciliatis, conniventibus, viridibus. *Sedum* 2. *Enum.* *Helv.* p. 393. *Sedum minus*, *flore rubente* AICHST, *Vern. Ord.* VI. T. 2. f. 2. *Semper-vivo di più cauli alpino* ZANONI *nov.* T. 153. Petala decem, basibus connata, pallide purpurea, lanceolata, linea divisa. Stamina bis tot quot petala. Spica aphylla, sessilis: rosulae foliorum ciliatorum totae virides. In alpibus helveticis *Getthardo & Gemmio*.

H. *Sedum rosulis foliorum tomento conjunctis* *Enum.* *Helv.* p. 393. In alpibus helveticis, maxime valle Ursaria Circa Cisteron Galliae.

H. *Sedum sexu distinctum* *Enum.* *Helv.* p. 394. n. 4. *Radix rhodia* CLUS. *Pann.* p. 484. In septentrionalibus insulis, montibus borcalibus, alpibus Helveticis pallidus. In *Capatho & Silesiae* montibus.

Sedum foliis confertis, ferratis, ellipticis, umbella caulem terminante, densissima *Enum.* *Helv.* p. 394. *Anacampseros vulgo sola crassa* I. B. *Telephium album* FUCHS p. 300. In agris versus Lengelern rarius. Bernae in sepibus fastis frequens.

Sedum foliis ovalibus, ferratis, conjugatis, ex aliis foliorum umbelliferum *Enum.* *Helv.* p. 395. *Telephium* I. DOD. p. 130. *Anacampseros maxima* I. B. *Telephium Hispanicum* CLUS. hisp. p. 331. *Rheinhausen*.

H. *Sedum* foliis ad radicem conglobatis, subrotundis, integerrimis. *Telephium minus*, *semper virens* Lugl. LOB. 340.

H. *Sedum* foliis ovato lanceolatis, acute terminatis floribus flavis, umbellatis. *Anacampseros flore flavo* AMMAN.

AMMAN. n. 96. T. XI. In Sibiria. Petala ovato lanceolata, flava, quinque, etiam sex, siliquae & stamina decem, semen compressum, acuminatum, non scobiforme.

H. Sedum foliis emarginatis, late terminatis, floribus sessilibus Enn. Helv. p. 395. *Aizoon peregrinum* CAM. Hort. ic. 2. *Sedum echinatum vel stellatum, flore albo* I.B. *Sempervivum tertium* COL. *Phytobas.* p. 40. Petala quinque, linea divisa. Stamina bis tot. Siliquae quinque. r.

Sedum acre, foliis conicis, confertissimis, floribus inserviatis aliis sessilibus, luteis Enn. Helv. p. 396. *Sedum parvum, acre, flore luteo* I. B. *Sedi tertium genus* FUCHS. p. 36. In agris, pratis sterilibus & muris.

Sedum foliis teretibus, in spinulam terminatis, umbella sparsa Enn. Helv. p. 397. *Sedum minus, luteum, folio acuto.* C. B. Circa Blankenburg & Kelbra abunde.

Sedum foliis cylindricis obtusis, sessilibus, patentibus, panicula ramosa Cliff. Enn. Helv. p. 398. *Sedum minus* I. CLUS. p. LIX. *Sedum minus, teretifolium, album* C. B. Auf der Wehnder Kirchmauer, um Rheinhausen.

H. *Sedum Africanum, flore caeruleo, hexapetalo & heptapetalo.* Petala caerulea, ungue albo, stamna bis tot quot petala r.

H. *Saxifragia foliis petiolatis, retusis, ora cartilaginea, serrata, caule nudo* Enn. Helv. p. 400. *Genus folio subrotundo, minus, pistillo floris rubro* MAGNOL. hort. reg. Monsp. ic. In M. Gotthardo. Hibernia.

B. Pistillo pallido.

H. *Saxifragia* foliis reniformibus, acute crenatis, caule ramoso, folioso Cliff. Enum. Helv. p. 400. *Sanicula alpina sive guttata* quibusdam CAM. Epit. p. 764. *Geum rotundifolium*, majus I. R. H. In montosis Helvetiae.

Saxifragia foliis reniformibus, lobatis, caule ramoso, radicibus granulatis Cliff. Enum. Helv. p. 401. *Saxifragia rotundijolia*, alba I. R. H. radicibus granulosis ICON. REG. Ueber Edigehausen rechts gegen den Berg, sed copiosius circa Rheinhausen, &c ad patibulum Bovendense.

H. *Saxifragia* ora foliorum cartilaginea, acuta, crenata Enum. Helv. p. 402. *Cotyledon altera* Matth. CLUS. Pann. p. 483. *Saxifragia Sedi* foliis, subrotundis, serratis I. R. H. In montosis Helvetiae.

H. *Saxifragia Sedi* foliis, angustioribus, serratis I. R. H. SEG. T. IX. f. 1. *Aizoon serratum* CORD. p. 92. *Cotyledon minima* AICHST. Aest. Ord. V. T. 10. f. 1. In montosis Helvetiae.

H. *Saxifragia rosulis* sessilibus, foliis palmatis, hirsutis. *Saxifragia alba*, *petraea*, PONAE p. 183. Ex M. Baldo. Diversissima a sequente, quae rosulas non efficit, foliorum petiolo praelato, dilatato, in dentes sex & ultra ovato lanceolatos diviso. Calyx semiquinquefidus. Petala ovata, brevia, alba, ungue viridi. Filamenta triangularia in uno circulo decem, quinque ex origine cujusque petali, quinque ex intervallis. Tubae duas primum convergentes, senescendo repandae, de more. In Montibus Ruscinonensis le Monnier.

Saxi-

Saxifragia foliis late petiolatis, trifidis, ad caulem palmatis Enn. Helv. p. 404. *Paronychia altera* DOD. p. 112. *Saxifragia verna, annua, humilior* 1, R. H. In muris passim, v. g. ad portam Albanam.

Geranium pediculis unifloris, foliis palmatis Enn. Helv. p. 365, *Geranium sanguineum*, maximo flore H. OX. S. 5. T. 16. f. 17. Copiose in sylvis circa Jenam, Altenstolberg. Circa specum Baumannianam &c.

H. *Geranium* petiolis unifloris, foliis triangularibus, quinquelobis, ferratis Comment. Gott. T. I. p. 225. *Geranium pedunculis unifloris, bijloris, trifloris.* Cum hoc nomine ex *Sibiria* adlatum est. Calyx aristatus, flos exiguis, petalis carnei coloris, emarginatis. Stamina decem.

Geranium foliis reniformibus, semiquinquelobis, lobis trifidis, obtusis Enn. Helv. p. 365. *Geranium* folio Malvae, rotundo ZANICHELLII ic. 291. Surculosum, procumbens, foliis reniformibus, semiseptifidis, lobis rotunde lanceolatis, trifidis: ut tamen in superioribus foliis lobii extremi & proximi connati sint. Flos lacte purpureus, petalis emarginatis; calyx non aristatus. Parum differt nisi minutie a *Columbino majori* villoso.

Geranium foliis reniformibus, semiseptilobis, lobis semitrifidis Enn. Helv. p. 366. *Geranium columbinum, majus, flore minori, caeruleo* RAI. VAILL. T. 15. f. 1. Ad vias. Quinque stamina haberi observavit ILL. FABRICIUS.

Geranium foliis mollibus, reniformibus, semiquinquefidis, lobis semitrifidis, obtusis Enn. Helv. p. 366. *Geranium* folio Malvae, rotundo, majus MOR. *Geranium columbinum*, villosum, petalis bifidis, purpureis VAILL. T. 15. f. 3. Ad vias &c in agris.

Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculis brevioribus, caule erecto Enn. Helv. p. 366. *Geranium columbinum*, maximum, foliis dissectis I. R. H. PLOT oxfordshire p. 148. T. 9. f. 4. *Geranium columbinum*, majus, foliis imis longis, ad usque pediculum divisis VAILL. T. 15. f. 2. In agris.

Geranium foliis ad nervum usque quinquefidis, petiolo longissimo, prostrato caule Enn. Helv. p. 367. *Geranium columbinum*, foliis dissectis, pediculis florum longissimis VAILL. T. 15. f. 4. Um Herperhausen, die Rajenüsse &c.

Geranium foliis quinquelobis, lobis trilobis, semipinnatis, subtus rugosis. *Geranium batrachoides*, majus. CLUS. Jenne abunde in pratis uidis, & in comitatu Hohenstein.

β. Flore albo & caeruleo striato. *Geranium anglicanum*, variegatum AICHST. Vern. Ord. I. T. 9. f. 1. Albo flore habet VALLET. T. 75.

Geranium foliis rugosis, semitrilobis, lobis dentatis, lateralibus bipartitis, floribus purpureis Enn. Helv. p. 367. *Geranium batrachoides*, folio Acut., nostras RAL. *Geranium batrachoides*, minus VALLET. T. 79. *Geranium* f. 15. 2

sanguinarium, majus. AICHST. Vern. Ord. I. T. 9. f. 2.
Pallidum in aquosis v. g. Am Lengeler bach. In Helvetia, Anglia,

H. *Geranium* foliis trilobis, lobiis dentatis, lateralibus
semibifidis, flore venoso. *Geranium Romanum*, *versicolor*
sive striatum C. B. Venis fioris purpureis facile dignoscitur

H. *Geranium* foliis superioribus trilobis, lobis ferratis
Geranium nodosum C. E.

H. *Geranium* foliis quinquelobis, sericeis, floribus pa-
niculatis, atropurpureis Enum. *Helv.* p. 368. *Geranium*
phaeum, *sive fuscum*, *petalis reflexis* I. R. H. *Geranium*
fuscum VALLET. T. 74. In *Helvetiae montosis* frequetiss.,
In *Alsacia*.

H. *Geranium* pediculis bifloris, calycibus inflatis, pi-
stillo longissimo LINN. *Geranium batrachoides*, *odoran-*
tum I. R. H. *Geranium manropogon* AICHST. Vern. Ord.
I. T. 16. f. 2.

H. *Geranium* foliis septilobis, lobis obtusis, dentatis,
capsulis hirsutissimis. *Geranium batrachoides*, *Bohemicum*,
capsulis nigris, *hirsutis* H. Elth. p. 159. ic. 160. *Geranium*
annuum, *batrachoides*, *Bohemicum*, *purpuro violaceum*
MOR. V. T. 15.

Geranium foliis pilosis, tripartitis, lobis pinnatis, pin-
nulis dentatis Enum. *Helv.* p. 369. n. 12. *Geranium*, *Ro-*
bertianum vulgo,

H. *Granium Robertianum*, *autumnale*, flore parvo,
purpureo PONTLD. Exigua omnino a priori diversi-
tas est.

Gera-

Geranium procumbens; pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, dentatis Cliff. Enum. Helv. p. 369. *Geranium Cicutae folio, majus, inodorum* C. B. *Geranium minus, Geraniini arvense* TAB. p. 57. Calyx aristatus, duo petala latiora, ovata, tria longiora, angustiora; distantia. In superioribus petalis nonnunquam maculae duas virescentes. Stamina decem.

β *Geranium Pimpinellae folio* DILL.

H. *Geranium procumbens*, foliis pinnatis, pinnis incisis, dentatis. *Geranium Cicutae folio, moschatum*. C. B. *Geranium moschatum* RIV. Stamina decem. Calyx aristatus; petala duo breviora, latiora, tria longiora, & angustiora. Stamina decem.

H. *Geranium annuum*, pétolis multifloris, foliis ovato cordiformibus, incisis. *Geranium malvaceum* L. B. *Geranium folio Altheae* RIV. T. 102. Calyx aristatus, inaequalis: pétala duó superiora paulo latiora, tria inferiora paulo longiora. In Graecia, Italia.

H. *Geranium Chiium, vernum. Caryophyllatae folio* TOURN. Calyx aristatus, petala superiora modice majora, breviora, inferiora longiora. Stamina decem. Priori valde vicinum est.

Geranium pentastemon, foliis duplicato pinnatis, pinnulis incisis. *Geranium latifolium, acu longissima* C. B. *Geranium creticum* RIV. T. III. Calyx aristatus, petala caduca, caerulea, aequalia, venosa. Stamina quinque, trianguläribus filamentis, & quinque unguis imperfecti. Capsulae dispermae, Monspelii:

β. Varie-

β. Varietas ejus foliis latioribus, minus divisis, semitrilobis, ampliter dentatis.

H. *Geranium* folijs hirsutis, duplicato pinnatis, pinnulis incisis, floribus maculosis. *Geranium triste* CORNUT p. 110. RIV. T. 104. *Geranium calycibus monophyllis*, tubis longissimis, subsessilibus, radice subrotunda, foliis pinnatifidis ROY. In BROSSEI tabb. Duo petala superiora breviora, latiora, inferiora longiora, virentia omnia, macula fusca notata. Stamina connata, caudae plumosae.

H. *Geranium tetrapetalon*, foliis duplicato pinnatis. *Geranium Africanum*, *Coriandri folio*, floribus incarnatis, majus HERM. H. L. B. T. 286. *Geranium foliis Coriandri* RIV. T. 106. Tetrapetalon revera, petalis duobus superioribus majoribus, venosis, inferioribus parvis. *Calycis foliolum supremum amplius*, duo proxima minima, inferiora majora. Stamina quinque ad octo. r.

H. *Geranium* petiolis multifloris, foliis duplicato pinnatis, pinnulis laxe multifidis. *Geranium Aethiopicum*, *tertium Myrrhidis folio*, flore magno striato BREYNE Cent. I. p. 129. T. 59. Calyx tubulosus, uno segmento latiori, reliquis angustioribus. Flores bini, ternive, petala duo superiora majora, emarginata, lineis saturatius purpureis percursa, tria inferiora pallida puraque. Stamina sex & ultra.

H. *Geranium* foliis dentatis, trifidis, medio lobo semi-trilobo, lateralibus minoribus incisis. *Geranium Africanum*, *Alceaæ folia*, flore coccineo, fulgidissimo, H. Elth. *Geranium*

ranium Surianense, *Chelidonii folio*, *fore coccineo*, *petalis inaequalibus TILLI* T. 26. Segmentum calycis superius latum & rectum, quatuor minora, reflexa. Petala duo superiora, latiora, nigris venis picta, totus vero flos fulget coccineo, saturato, & pulcherrimo colore. Stamina connata.

H. *Geranium petiolis multifloris*, caule nodoso, foliis glaucis, sinuatis. *Geranium Africanum*, noctu olens, tuberosum & nodosum, *Aquilegiae folio* H. L. B. T. 285. *Geranium Africanum*, foliis *Aquilegiae* RIV. T. 99. Calyx reflexus, excepto superiori segmento. Petala duo superiore latiora, tria inferiora angustiora, distantia, sublutea, cum aliqua rubidine, noctu suaveolentia, interdiu inodora. Caudae plumosae. Stamina connata.

H. *Geranium procumbens*, petiolis multifloris, foliis cordatis, glabris, obtusis, serratis. *Geranium Africanum*, *folio Grossulariae* RIV. T. 107. Flores tantum bini ternique; Calycis unum folium supremum latius, quatuor angustiora. Petala inferiora tria angustiora.

H. *Geranium foliis hirsutissimis*, oblongis, semiquinquelobis, plicatis. *Geranium Africanum*, *folio Malvae* RIV. T. 98. *Geranium Africanum*, *Malvae folio*, laci- niato, odorato HERM. Hort. Lugd. Bat. p. 277. 278.

H. *Geranium petiolis multifloris*, foliis oblongis, semi- septifidis, serratis, mellissimis. *Geranium Africanum*, *Betonicæ folio*, laci- niato, floribus incarnatis H. L. B. p.

27^o. COMM. ic. *Geranium Africanum*; folio Betonicae RIV.
T. 100.

H. *Geranium petiolis multifloris*, foliis cordiformibus, semitrilobis, serratis, hirsutis. *Geranium Africanum*, *arborescens*, *Vitis folio*, odore *Melissae* H. Elth. T. 126. Calycis supremum folium distans, latius. Petala duo superiora latiora, ovata, venis ramosis pectinis. Stamina connata, caudae plumosae.

H. *Geranium petiolis multifloris*, foliis cordiformibus, obtusis, serratis, molliissimis. *Geranium Africanum*, folio *Malvae*, *crasso*, *odoratissimo*, flosculo pentapetalo, atbo EOERH. *Geranium Africanum*, *bamile*, folio *fragrantissimo*, *mollis* DILL. H. Elth. Calycis folium unum latius, transversum, basi vero coalescunt. Petala alba, lenissime rubicunda, longe elliptica, obtusa, superiora duo reflexa, sibi propiora, tria reliqua remota, longiora. Stamina septem & octo, connata.

H. *Geranium petiolis multifloris*, foliis pinguibus, reniformibus, obtuse crenatis. *Geranium Africanum*, *arborescens*, *Malvae folio*, *pinguis*, flore *coccineo* DILL. H. Elth. T. 125. *Geranium Africanum*, *maximum* RIV. T. 97. Calycis segmentum superius amplius, initia reflexa. Petala laete coccinea, duo petala superiora erecta, tria inferiora descendentia, distantia. Stamina connata, ad octo. Caudae pluinosae.

H. *Geranium petiolis multifloris*, foliis reniformibus, semiquinquelobis, album circulum inscriptis. *Geranium Africa-*

Africanum, arborescens, Alchimillae folio, hirsuto, eleganter, vario, floribus rubicundis BOERH. *Geranium Africanum, folio Alchimillae, maculato* RIV. T. 102. *Sequenti simile est calyce, flore bilabiato, colore purpureo, venisque saturatis, staminibus coalitis septem, octove.*

H. *Geranium petiolis multifloris, foliis reniformibus obtuse dentatis, nigrum circulum inscriptis. Geranium Africanum, arborescens, Alchimille folio, flore rubro* COMM. *Prael. I. Calycis folium supremum remotum, quatuor minora. Petala duo erecta, emarginata, rosea, venosa; distantia a reliquis longioribus petalis. Stamina decem connata, alterne longiora, ut in plerisque speciebus, Caudae valvarum plumosae.*

H. *Geranium petiolis multifloris, foliis hirsutis, reniformibus, quinquelobis, lobis tridentatis* Cliff. *Geranium Africanum, Alchimillae, hirsuto folio, flosculis albidis* Hort. *Lugd. Batav. p. 283.* *Geranium Africanum, folio Alchimillae* RIV. T. 101. *Calyx aequalis, quinquefolius. Petala duo superiora latiora, breviora, cordata, magis rubra, inferiora longiora, minus cordata. Caudae vaginarum plumosae.*

H. *Geranium foliis subrotundis dentatis, glaberrimis. Geranium Africanum, frutescens, folio glanco, acetosae sapore* COMM. *Praelud. p. 54. f. 4. Calycis primum segmentum subrectum, reliqua recurvata. Petala duo superiora spatio aliquo distincta, carnea, lineata, emarginata. Reliqua pura, caeterum similia. Stamina decem connata, quorum quinque abortiuntur. Caudae plumosae.* H. Ge-

H. *Geranium petiolis multifloris, foliis umbilicatis, pentagoniis, glabris. Geranium Africanum, foliis inferioribus Asari, superioribus Staphidis agriae, maculatis, splendentibus, & acerosae sapore* COMM. *Prael. T. 2.* Segmentum calycis superius latius, reliqua reflexa. Petala duo superiora distincta, erecta, emarginata, carnea, venis nigris picta, inferiora ovata, pene minora. Stamina decem connata. Caudae plumosae.

Oxys scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamosa articulata Cliff. Enn. Helv. p. 364. *Oxys flore albo.* I. R. H. In sylvis ubique.

H. *Oxys lutea* I. B. II. p. 388. RUMPF. L. VIII. c. 64. *Oxys flore luteo* DOD. Purg. p. 414. In Japonia. Circa Collioure, Monspelii. Ad montem leonis in Capite bonae spei. r.

H. *Oxys bulbosa, Africana, rotundifolia, caule & floribus purpureis, amplis* Hort. Amst. I. f. 21. *Oxalis scapo unifloro, foliis ternatis, radice bulbosa* LINN. EHRET. T. 10. *Oxalidi adfinais planta, bulbosa, Africana, flore purpureo, magno* BREYN. Cereal. I. T. 46.

H. *Oxys bulbosa, Aethiopica, minor, folio cordato* Hort. Amst. I. ic. 22.

H. *Fabago belgarum* I. R. H. *Telephium Di scor.* COL Ecpr: p. 131. In Syria, Arabia POCOCK. Calyx semia, pertus, foliis ovatis. Petala ovata. Quinque longae

squamæ, ex origine petalorum natae, fine laciniato, bifido,
Stamina decem. Tuba simplex.

H. Fagonia spinosa Cliff. *Trifoliuum spinosum*, *creticum*
CLUS. p. CCXLII. C. B. Prodr. 142. In Syria, Mesopotamia
FOCOCK.

H. Tribulus foliolis sex parium pinnatis Cliff. *Tribu-*
lus terrestris LOB. ic. II. p. 841 DOD. *Cereal.* 223. I. B. II.
p. 352. Circa Rupellam, Veronam &c.

Linum ramis foliisque alternis, linearis lanceolatis, radi-
ce annua Cliff. *Linum sativum* omn. auctt.

H. Linum sativum, latifolium, Africanum, fructu majo-
re I. R. H. Varietas altior prioris; ut videtur.

H. Linum perenne, foliis lanceolatis calyce mutico
Enum. Helv. p. 371. *Linum sylvestre* CAMER. Epit. p.
302. Ex Sibiria, Anglia, Hibernia, Helvetia.

Linum perenne foliis angustissimis, calyce aristato
Enum. Helv. p. 371. *Linum sylvestre*, *angusti'olium* IV.
CLUS. Pann. p. 303. 304. Am Wege nach Rohringen, auch
über der Papiermühle copiose, &c unter Niclausberg.

H. Linum Africanum, luteum, foliis conjugatis BOERH.
H. L. B.

Linum foliis conjugatis, petalis albis, acutis Enum.
Helv. p. 372. *Linum carthaginum* BLAKWELL. T. 268.
Spergula bifolia, *lini capitulis* LOESEL. p. 80. In siccis col-
libus passim provenit.

Linum ramosissimum, flore tetrapetalō. *Radiola* DILLEN. Cent. VI. app. T. IX. *Chamaelinum vulgare* VAILL. T. 4. f. 6. Copiosissime in *Cellensi* ducatu. In *Anglia*, *Gallia*, *Hibernia*, locis arenosis.

Rorella caule simplici, foliis ellipticis. *Enum. Helv.* p. 372. *Ros Solis*. DOD. p. 474.

Rorella caule simplici, foliis rotundis, retusis *Enum. Helv.* p. 372. *Salsifora sive Ros Solis* THAL. ic. IX. n. 1. Utraque in *Brucleri* montis aquosis abunde.

H. *Cucubalus* Plinii, *Alsine repens* CLUS. *bisp.* p. 414. In agro *Salmanticensi*. *Jenae* abunde, *Swinfurti*. In *Mesopotamia* &c,

Viscago calyce inflato, ovali, petalis ferratis, bifidis *Enum. Helv.* p. 373. *Been album vulgo*. In capsula initium divisionis in tres loculos adparet. In *sylva Hercynia* cōpiose nascitur ad acervos lapidum, & circa *Gettingam*.

β H. *Viscago veficaria*, *Cretica*, flore parvo, purpurascente, H. Elth. T. 317. *Aegre* a priori differt, flore in aliis lessili, purpurascente.

γ *Lychnis maritima*, *repens*. Parum omnino diversa a *Been albo*.

H. *Viscago calyce duplo petalis longiore*, floribus umbellatis *Enum. Helv.* p. 374. *Lychnis sylvestris*

*floris II. CLUS. hisp. p. 337. In Hispania, Valesia:
Monspelii.*

β Varietas flore pallido.

*Viscago fructu quinqueloculari. Viscaria RIVINI.
Lychnis sylvestris, flore incarnato AICHST. Vern. Ord.
frut. T. 5. f. 2. Lychnis sylvestris I. CLUS. Pann. p. 339.
Abunde circa Noribergam, & in pratis inter Elbingeroode
& Blankenburg.*

β Eadem flore pleno.

H. *Viscago hirta sicula, Lychnidis Creticae facie, supina*
DILL. hort. Elth. p. 402. Calyx tubulosus, decem lineis
undulatis, virentibus percursus, ovario longior. Petala
cordiformia, segmentis parallelograminis, roseis, & auricu-
lae bifidae, albantes: fructus conicus nitens, sexvalvis.
Semina ovato reniformia, exasperata.

H. *Viscago Lusitanica, flore rubro, vix conspicuo*
DILL. hort. Elth. f. 405. Lychnis sylvestris, flosculo rubro,
vix conspicuo. GRISLEY Viridar. Calyx viridis, glaber,
tumidus, segmentis conniventibus, convexis, ovario lon-
gior. Petala minima, rubella, bifida, stamina bifida, semina
magna reniformia, asperula.

H. *Viscago maritima, plerumque non viscosa, atrovi-*
rens, Bellidis folio DILL. r.

H. *Lychnis noctiflora C.B. Ocymoides noctiflorum CAMER.*
hort. ic. 34. Calyx virentibus lineis percursus, sulcatus,
ovario longior, ampliorque, modice quinquedentatus.
Petalorum unguis longi, aures serratae, bractea gracilis,
serra-

ferrata, non incisa, extus flava; intus purpureo-scens. Ovarium ex rotundo conicum, tribus sulcis divisum, rostratum. Fructus tribus septorum initiis divisus. Semina compressa, reniformia, aspera, maculata.

H. Viscago calycibus inflatis, triginta lineis percurssis. *Lychnis sylvestris*, *latifolia*, *calyculis turgidis*, *striatis*: C. B: *Lychnis sylvestris* III. CLUS. hisp. p. 339. *Monspelii*, *Bastiae*. Calyx triginta & ultra lineis striatus, connivens. Petala rubella, non bifida, mucronata, serrata. Auriculae profunde serratae rosulam faciunt: Ad latus auriculae appendix ex ungue educitur. Fructus ventricosus, superne contractus, sexvalvis, cartilagineus.

H. Lychnis Graeca, Sedi arborescentis folio & facie, flore albo. T. Cor. WALTHER hort: Calyx ovario longior, decem lineis percursus, breviter quinquedentatus. Petala bifida, intus alba; extus virentibus & rufis lineis picta, absque auriculis. Ovarium ex ovato contractum; triloculare, tubis tribus. Semina obesa; reniformia; minute exasperata.

H. Lychnis Ocymastrum facie, flore viridi Par. Bot. ic: p. 199.

H. Viscago, quaæ Lychnis frutescens, Myrtifolia; Been albo similis I. R. H. *Ocymastrum fruticosum* CAM. hort. ic: XXXI. Calyx ovario longior, sulcatus. Petala utique longo, auriculis binis, acutis, fine bifido, segmentis ovatis, divergentibus, roseo colore. Fructus trilocularis, cartilagineus, inferne ventricosus, superne contractus: In Graecia & Crete.

Lychnis foliis imis petiolatis, ovatis, petalis bifidis, se convolventibus Enn. Helv. p. 374. *Lychnis viscosa*, foliis Otididis. LOESEL. p. 150. ic. 40. *Monspelii*. In saxosis circa Gottingam vulgo.

H. *Lychnis septentrionalis*, floribus uno verso dispositis, albis. Missa est a Cl. GERBERO. Habitus Hyssopi; caulis cubitalis & bicubitalis, ab imo ad summum ramosus; folia brevissime scabra, lingulata, acuta; flores in raram spicam ordinati; calyce tubulofo, ovario longiori. Petala ex albo viridia, bicornia, ungue lato. Fructus cylindricus; tubae tres.

H. *Viscago* foliis imis petiolatis, ovatis, floribus paniculatis, petalis emarginatis Enn. hort. Gotting. I. cum ic. Ex semine Russico enata floruit a 1742. a solsticio aestivo, in ultimam brumam usque, indeque multis postea annis. Folia ad terram numerosa, tota scabra hirsutie subaspera, duriuscula, petiolata, ex petiolo in ovalem, sed acuminatam latitudinem paulatim aucta. Color pallide viridis est. Quae vero ad caulem, paulatim, ut fieri solet, angustiora, magis graminea, longe acuminata, & denique non nisi ligulae sunt, quarum origo latior instar vaginæ albicat. Caulis erectus, vix ramosus, tripedalis; ad foliorum ortum intumescit, in summis vero partibus totus viscidus est, & longe foliis nudus. Imma pars lanugine pubescit, superne levis est. Florum panicula spicata, petiolis conjugatis, ramosis, secundis ramulis unifloris. In tota panicula nullum folium,

lium, nisi albae aliquae, & breves, in origine foliorum glumiformes vaginae.

Flores exigui, pro ratione plantae, quales icon exhibet. Calyx glaber, ali us, lineis pictus virentius, sursum eundo latescit, & quinque denticulis breviter incisus petala continet.

Petala quinque, expansa, gracilia, emarginata, absque auriculis, tota albâ.

Stamina de more, quorum quinque, ut saepe fit, corollam in expansione floris efficiunt.

Ovarium in juniori cylindricum, per aetatem pitifor me. Tubæ tres. Intus in tribus loculis semina per maturitatem reniformia, sed conplanata in cuncorum morem superficie vermiculata.

An fuerit *Lychnis viscosa*, foliis in longo petiolo angustis & minoribus, ad radicem cōpiosis, flore mūscoso albo MESSERSCHMIDI apud AMMANUM pl. rutken p. 94. n. 124. Non repugnat.

Viscago foliis imis petiolatis, floribus verticillatim spicatis, petalis indivisis, sexu distincta. Enn. Helv. p. 375. *Lychnis sylvestris*, flore mūscoso C. B. Otites *Lychnidis sylvestris* genus TABERN. p. 830. Unterm Regenstein. In Marchia abunde, & in Helvetia, Gallia.

H. *Viscago* foliis imis petiolatis, floribus verticillatim spicatis, petalis indivisis, androgyna. A priori

priori differt altitudine, qua superat, sexibus conjunctis.

H. *Lychnis sylvestris*, alba, floribus reflexis BOT. MONSP. p. 171. Calyx lineatus, viridibus venuis pictus, glaber, ovario longior. Petala noctu expansa, sordida, alba, auriculis binis, acute tripartita, Fructus cylindricus sex valvis. Semina sunt cunei sphaerici, reniformes glauci.

H. *Lychnis noctiflora*, angustifolia, odorata. *Lychnis viscosa*, *peregrina*, *noctiflora*, *odorata* ZANONI T. 109. Veronae. Calyx cylindricus, angustus subovario, ubi hoc amplectitur latus. Petala ungue latescente, brevissima, incisa, auricula bractea cordiformi, ochroleuca. Fructus conici, cartilaginei. r.

H. *Viscago Lusitanica*, hirsuta, stellato flore DILL. Hort. Elth. f. 401. Calyx decem lineis viridibus percursus, striatus, quinquedentatus. Petala quinque, ex albo & roseis lineis varia, auriculis duabus acutis, fine bifido & trifido, serrato. Fructus trilocularis.

H. *Lychnis hirta minor*, flore variegato MARCHANT p. 291. *Lychnis sylvestris*, *lanuginosa*, *minor* MOR. S. 5. T. 21.

H. *Viscago* foliis inferioribus Bellidis, superioribus Tunicae DILL. hort. Elth. f. 405. Non distinguo, qua turgido & quae gracili caule est.

H. Lych-

H. *Lychnis* foliis ovatis, tomentosis, petalis emarginatis *Enum. Helv.* p. 376. *Lychnis coronaria*, flore rubro PASS. T. 16.

β Flore albo PASS. aest. T. 16. umbilico roseo.
In *Helvetia transalpina*.

H. *Lychnis* floribus umbellatis, petalis breviter quadrifidis. *Lychnis hirsuta*, flore coccineo, major C. B. *Flos Constantinopolitanus* DOD. *Coron.* p. 75.

β Flore coccineo, pleno.

γ Flore pallente, & flore incarnato AICHST.

I. c.

Lychnis petalis quadrifidis, longissimis *Enum. Helv.* p. 378. *Lychnis pratensis*, fiore laciniato, simplici I. R. H. *Armeria sylvestris* DOD. *Coron.* p. 74. In pratis udis.

β Flore albo. Um Hardeggen.

Lychnis calycis laciniis petaloruin longitudinem superantibus *Enum. Helv.* p. 376. *Lychnis segetum*, major C. B. *Nigella sibirum* DOD. *Coron.* p. 49. In omnibus agris.

Lychnis sexu distincta, foliis ovatis, acutis *Enum. Helv.* p. 377. *Lychnis sylvestris* PASS. II. T. 43. *Ocymoides purpureo flore* CAMER. *Epit.* p. 739. *Ocymastrum rubrum* TAB. p. 299.

β . Flore pleno. *Ocymoides flore pleno* CAMER. *Epit.* p. 740.

DIPLOSTEMONES.

γ. *Lychnis sylvestris*, alba, simplex I. R. H.
Ocymastrum sive *Ocymoides* TAEERN. p. 299. Circa pa-
guin Rosdorf ad sepes & circa Cellam abunde. Perinde
ut prior (a qua non differt) utique sexu distincta est.
Ejus varietas est *sylvestris multiplex* PASS. aest. T. 17.

Saponaria foliis trinerviis, floribus umbellatis *Enum.*
Helv. p. 378. *Lychnis sylvestris*, quae *Saponaria vulgo*
I. R. H. *Saponaria* DOD. *Coron.* p. 78. PASS. II. T. 89.
In vallis urbis.

β. Flore pleno.

Saponaria caule brachiato, calyce pentagono, turgidō
Enum. *Helv.* p. 379. *Lychnis segetum*, folio *Perfoliatæ*
I. R. H. *Thamaecnemon* CORD. *hist.* p. 104. In segetibus
vulgaris.

H. Spergula multiflora, foliis inferioribus *Saponariae*,
superioribus *Been* similibus. DILL. *hort. Elth.* T. 276.

Saponaria foliis glaucis, pulposis, petalis ovatis
apud. RUPP. III. p. 117. cum icon. *Sympytum petraeum*
THAL. p. 115. In gypseis & spatheis rupibus montis
Altenstolberg die Bärenköpfe. In Marchia abunde. In
faxosis circa Uzenhofen Hofm. Radix multiplex, lignosa,
maxima. Folia glauca, pulposa, linearia. Rami termi-
nati umbellis florigeris. Calyx semiquinquefidus, lanceo-
latis segmentis, fuscus. Petala ovata, rosea. Valvae fru-
ctus quatuor: Semina nigra, lenticulata.

Sapo

Saponaria caule brachiatō, capillaceis foliis, calyce campanulato, floribus sparsis lanceolatis Enum. Helv. p. 380. *Lychnis annua, minima, flore carneo, lineis purpureis distincto* I. R. H. *Lychnis parva, palustris, foliis acutis, lanceolatis, flosculis purpureis* MENZEL. Pugill. T. 7.

H. Saponaria caule dichotomo, foliis lanceolatis, petiolatis, floribus solitariis, pedunculatis ROY. *Lycchnis annua, orientalis, supina, Antirrhini folio, flore minimo, purpurascente* DILL. hort. Elth. T. 166. f. 204.

H. Tunica quae *Caryophyllus barbatus*, hortensis, latifolius C. B. *Flos Armerius* AICHST. Aest. Ord. IX. T. 4. *Armeria flos primus*. DOD. Coron. p. 71.

Tunica squamis ad basin calycis longe mucronatis, flori aequalibus Enum. Helv. p. 381. *Caryophyllus barbatus*. SEGVIER T. VII. f. 3. *Caryophyllus barbatus, sylvestris* C.B. *Armeria sylvestris, altera* LOBEL. ic. p. 448. Am Boevender Galgen. In M. Heymberg.

H. *Caryophyllus Sinensis, supinus, Leucoji folio, flore vario.*

Tunica calyce universali aristato, floribus breviori Enum. Helv. p. 382. *Caryophyllus sylvestris, vulgaris* I. R. H. *Caryophyllus arvensis, calyculo florum numeroso* LOESEL. ic. 7. In Thuringia ad vias.

Caryophyllus simplex, supinus, latifolius C. B. *Caryophyllus minor, pulchellus, supinus, maculis aureis, argenteisve adsperso-*

adspersus LOB. ic. 499. Beym Eichenkrüge, zu Rheinhausen, & alibi in arenosis: *Francofurti*. Calycis exteriores squamæ mucrone oblongo. Petala amoene purpurea, nigro circulo inscripta, ultra eum albis maculis punctata. In horto erigitur, & magis concolor redditur, & viridior.

H. *Tunica ramosior*; flore candido, cum corolla purpurea. DILL. *hort. Elth.* T. 298. Calycis folia exteriora mucronata. Petala lactea, corolla ferrata, kermesina pita, ungue viridi. r.

H. *Caryophyllus rupestris*, floribus profunde fimbriatis, lacteis, foliis tenuissimis GMEL. Folia pungentia. Rami uniflori. Calyx exterior muticus. Petala lactea, profundius quam in vulgari laciniata.

Tunica petalis profundissime laciniatis ENUM. HELV. p. 382. *Caryophyllus sylvestris* VI. CLUS. PANN. p. 323. In Anhaltina ditione circa Hartzgerode. Circa Bernam passim, & in Helvetia ad vias siccias. In H. Leitersberg, Uzberg ROYER: in Suntgavia, Alsatia. Varietates habet CAUSE p. 367.

Tunica calyce universali peculiaribus majori, cartilagineo, mutico ENUM. HELV. p. 381. *Caryophyllus sylvestris, prolifer* SEG. T. VII. f. 1. Am Bovender Galgen.

H. *Caryophylli hortenses* BLAKWELL. T. 85.

Myosotis foliis oblongis, obtusis, petalis calyce majoribus ENUM. HELV. p. 384. *Myosotis arvensis, hirsuta, flore major*

majori I. R. H. *Holostium Caryphyllaeum* TAB. p. 233.
bene. Ad vias ubique.

Myosotis foliis ovatis, acuminatis, flore calyce aequali
Enum. Helv. p. 384. *Myosotis arvensis, hirsuta, parvo*
flore, albo. I. R. H. VAILL. T. 30. f. 1.

β. Varietas apetala in horto nata est.

Myosotis exigua, pentastemon *Enum. Helv.* p. 384.
Myosotis arvensis, hirsuta, minor VAILL. T. 30. f. 2. Am
fahrt wege von der Maschmühle auf den Berg. Stamina tan-
tum quinque, tubae tres.

H. *Myosotis Hispanica, segetum* I. R. H. *Alsine cor-*
niculata CLUS. *bisp.* p. 415. LOB. ic. p. 460. *Circa Sal-*
manticam.

Myosotis viscosa, foliis ovatis *Enum. Helv.* p. 385.
Myosotis hirsuta, altera, viscosa I. R. H. VAILL.
T. 30. f. 3.

H. *Myosotis orientalis, perfoliata, Lychnidis folia*
DILL. *hort, Elth.* T. 217.

Alsine foliis gramineis, asperis, petalis semibifidis
Enum. Helv. p. 386. *Alsine pratensis, gramineo folio, am-*
pliore I. R. H. *Gramen alterum* CAM. *Epit.* p. 743. In
sylvis & dumetis.

Alsine foliis gramineis, petalis bipartitis *Enum. Helv.* p.
385, *Gramen floridum, minus* TAB. p. 232. Frequens in
agris & in palustribus inter Juncos,

— *Alpine foliis cordatis, petalis bipartitis Enum. Helv. p. 386. Alpine major* DOD. p. 29. *Stamina decem, tubae quinque.* In fossis circa Gottingam.

Alpine pentastemon, petalis bipartitis Enum. Helv. p. 386. Alpine media I. R. H. *Alpine BLAKWELL.* T. 145. *Stamina tria, quatuor, neque unquam supra quinque, tubae tres.* Ubique in hortis.

Alpine foliis ovato lanceolatis, petalis bipartitis Enum. Helv. p. 385. Alpine longifolia, uliginosis locis proveniens. I. B. III. p. 365. In sylvis super Bürgel: Super Hardegsen & in palude inter Harste & Barense.

Alpine foliis lanceolatis, trinerviis, petalis integris Enum, Helv. p. 390. Alpine Plantaginis folio I. B. III. p. 363. In sylvis passim super Hardegsen & alibi.

Alpine foliis lanceolatis, petalis integris, calycis magnitudine Enum. Helv. p. 389. Alpine minor, multicaulis I. R. H. Vidi petalis etiam bifidis fuisse.

Alpine foliis perangustis, ad basin latescentibus Enum. Helv. p. 389. Alpine tenuifolia I. B. SEGUIER. T. VI. f. 2. VAILL. T. 31. f. 1. Aufm Heymberge.

Alpine foliis fasciculatis, petiolis simplicibus, petalis integris Enum. Helv. p. 388. Polygonum foliis gramineis, alterum LOESEL. p. 204. ic. 64. In pratis uidis circa Cellam, circa Seeburg.

Alpine saxatilis, multiflora, capillacea folio VAILL. T. 2. f. 3. Maxima copia prope Herzberg & in sylva Hercynia ad vias.

Alpine

Alpine foliis verticillatis, petiolis ramosis, peralis integris *Enum. Helv.* p. 387. *Spergula* DOD. *Cereal.* p. 139.

Alpine pentastemon, petalis serratis, umbellifera *Enum. Helv.* p. 387. *Holosteinum* DILL. *Nov. gen.* p. 130. *Holosteinum caryophyllatum*, *arvense* TAB. p. 233. In vallo urbis.

Alpine pentastemon, vaginis ad foliorum ortum squalentibus *Enum. Helv.* p. 387. *Spergula purpurea* I. B. III. p. 722. *Polygonum* foliis gramineis, alterum LOESEL. ic. 64. In agris passim auctu Hagen.

β. Eadem pulposior & altior, locis falso, *Spergula marina* LUGD. p. 1385.

Alpine tetrapetala, foliis angustis, in origine latescentibus *Enum. Helv.* p. 390. *Alpine pusilla*, graminea, flore tetrapetalo SEGUILR. T. 5. f. 3. LIND. *hort. Alsat.* T. 8. *Hyssopus Salomonis* MONTALBANI *hort.* p. 47. *Saxifraga* *Anglica*, *annua*, *Alpine* *folio* PLOT *oxfordshire* T.IX. f. 9. p. 149. *Alpine minima*, flore fugaci I. R. H. Ubique in agris & in area *Academica*.

Corrigiola LINN. *Enum. Helv.* p. 391. *Polygonifolia* DILL. E. N. C. app. ad *Cent.* VI. T. 9. f. 20. *Nov. Gen.* p. 95. T. III. Copiosissime circa *Cellam*, ad vias arenosas.

Elatine foliis oppositis LINN. *Alfinastrum Serpyllifolium*, flore albo, tetrapetalo VAILL. T. 2, f. 2. Paulum ultra Engesen versus Cellam.

Salicaria floribus spicatis, foliis conjugatis Enum. Helv p. 405. Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis I. R. H. Lysimachia altera CAMER. Epit. p. 637. In aquofis.

Salicaria foliis alternis Enum. Helv. p. 406. Hyssopifolia C. B. & in RUPP. T. II. Ueberall wo es brach ist, gerade von Graetzels Mühle nach dem Berge hin. Etiam ad ripam Sulzae prope Langensalze Cl. HEINZE. Calyx longus, tubulosus, eundo latior, quinque vel sex gracilibus reflexis segmentis, & totidem triangularibus & rectis dentibus terminatur. Petala ex calycis summa ora orta, ovato lanceolata, sex aut quinque, rosea: Stamina totidem, qua sola nota a Salicaria differt, tubo floris breviora. Fructus longus, compressus, petiolatus, ut in multis Lychnidibus. Tuba simplex, globulo terminata. Fructus maturior ex cylindrico compressus. In utroque loculo semina multa. Ambigit inter Salicariam & Peplin, & utrumque forte genus conjungit.

Peplis foliis conjugatis Enum. Helv. p. 406. Glaux palustris, flore striato, clauso, foliis Portulacae VAILL. T. 15. f. 3. Glaux aquatica, folio subrotundo LOESEL. p. 156. c. 20. Glaucoides palustre, Portulacae folio, purpureo flore MICHEL. nov. gen. p. 21. T. 18. Ubique in uidis circa Cel-

Gellani. Gottingae in paludibus montis *Hagen.* In *Suntgavia* I. B. Nobis semper apetala visa est.

Agrimonia foliis pinnatis, fructibus hispidis *Euum.* *Helv.* p. 407. Cliff. *Eupatorium* MATTH. p. 1014. Ad vias siccas.

H. *Agrimonia odorata* CAM. *hort.* Odore & siccitate a priori differt. In *Santonibus.* r.

H. *Melia* foliis decempartitis. *Azedarach* DOD. p. 848. POCOCK. T. II. p. 83. Calyx fit quinque vel sex foliis, ovato lanceolatis, obtusis. Petala quinque vel sex eiusdem figurae, suaverubentia. Tubus staminum violaceus, decem vel duodecim intus insculptus antheris, ad tubam convergentibus. Super eas filamenta numerosa. Tuba columnaris maxima, obtuse trifida. Fructus quinquelocularis. In *Palæstina.*

Epilobium spicatum, flore difformi, foliorum nervo eminenti, ora leviter serrata *Euum.* *Helv.* p. 408. *Chamaenerium vulgare*, *latifolium* C. B. *Chamaenerium*. Gesneri de BRY T. 42. VALLET. T. 70. In sylvis ubique.

Epilobium foliis ovato lanceolatis, serratis, levissime hirsutis *Euum.* *Helv.* p. 409. *Chamaenerium glabrum*, *majus*. I. R. H. *Pseudolysimachium purpureum*, *primum* DOD. p. 85. In umbrosis ubique.

Epilobium foliis ellipticis, obtuse lanceolatis, totum leve Enn. *Helv.* p. 408. *Chamaenerium glabrum*, *angustifolium* DILL. *Cat. Giess.* In palude inter Barenzen & Gladebeck, & circa Walkenried. Diversa omnino planta a sequente, glabra, foliis vix dentatis, longis & angustioribus, albis, cum lineis subrubellis: calycis initium, quod in sequente linea circulari a progressu folii distinguitur, hic nihil simile habet.

Epilobium foliis longis, dentatis, villosis, flore minore, Enn. *Helv.* p. 410. *Chamaenerium villosum*, *majus*, *parvo flore* I. R. H. In fossis.

Epilobium foliis longis, dentatis, villosis, flore majore Enn. *Helv.* p. 410. *Chamaenerium villosum*, *flore magno, purpureo* I. R. H. *An der Leine*, *passim & ad rivos.*

H. *Onagra* foliis ovato lanceolatis, planis Enn. *Helv.* p. 410. *Onagra latifolia* I. R. H. *Lysimachia Americana* COLUMN. ad RECCHUM p. 882. In *Borussia*, *Helvetia*, *Virginia*.

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minori. Varietas prioris, ut videtur, aut proxima species.

H. *Onagra* foliis glabris, flore suave purpureo Comment. Soc. Reg. 1751. p. 224. Ex *Virginia*.

H. *Onagra Bonariensis*, villosa, flore mutabili DILL. hort. Elth. T. 219.

H. *Ruta hortensis*, *latifolia* I. R. H. *Ruta CAMER.* Epit. p. 494. *Ruta muraria* PASS. ic, alt. T. 88. In *Palæstina* IOSEPHUS. Hypopi-

H. Hypopitys spica nutante Enum. *Helv.* p. 411.
Orobanchoides nostras, flore oblongo, flavescente T. Memoir.
 de l' Acad. 1706. p. 104. *Im Heynholze am Herperhäuser
 Wege.*

Moschatellina CORD. *hist.* p. 172. b. Ad viam ultra
Eichenkrug & ad dumeta ubique ad rivum, qui defluit sub
M. Hengst. In *Helvetia vulgaris*.

Paris foliis quaternis *Cliff.* *Enum.* *Helv.* p. 412. *Paris*
MANGET. *pharm.* T. II. p. 113. *Uva versa DORSTEN*
 p. 304. b. In umbrosis sylvis passim,

Oxycoccum CORD. *hist.* p. 140. b. *Atocha CHARLE-*
VOIX. n. 68. 69, | In paludosis turfaceis, ad radices *M.*
Bructeri abunde, & similibus locis in toto septentrione.

Vaccinium foliis perennantibus, obverse ovatis *Cliff.*
Enum. *Helv.* p. 414. *Vitis idaea, rubra CAM.* *Epit.* p. 136.
Vitis idaea, sempervirens, fructu rubro I. B. Tota *sylva*
hercynia hac specie plena est.

Vaccinium foliis annuis, exalbidis. *LINN.* *Enum.* *Helv.*
 p. 414. *Vitis idaea II. CLUS.* *Pann.* p. 77. 79. In *sylva*
hercynia & torfaceis *Cellensibus.*

Vaccinium caule angulato, foliis serratis, annuis *Cliff.*
Enum. *Helv.* p. 415. *Vitis idaea, foliis oblongis, crenatis.*

fræ-

fructu nigricante I. R. H. Myrtillus MATTH, p. 231. In sylvis circa Rheinkauen.

Omnia haec genera, facto a Ruta initio, flore quadrifido & quinquefido ludunt, semper tamen staminum dupla ratione ad petala sunt.

Arbutus procumbens, foliis ovatis, solidis Enn. Helv. p. 415. *Uva urfi* CLUS. hisp. p. 79. *Petit Suis de Canada* CHARLEVOIX n. 96. In Cellensi ducatu, abundissime versus Schelplan. Ad Hudsonsbay.

H. *Arbutus* CLUS. hisp. p. 77. VOLC. besperid. p. 240. In Hibernia, Hispania, Graecia, Toscana. r.

Erica foliis imbricatis Enn. Helv. p. 419. *Erica prior* DOD. Pemp. p. 767. Flore albo passim ludit.

Tetralix foliis hirsutis, quaternis. *Erica* XIII. CLUS. hisp. p. 46. Copiose in Cellenium torfaceis, & trans Genam bey Bolwerk. Ludit albo flore & purpureo. Calycis foliola quatuor distincta, flos dolii forma, segmentis quatuor brevibus repandis. Stamina octo, duabus aristis, connata. Tuba longa, stigmate crasso.

Andromeda foliis alternis, lanceolatis, margine reflexo. LINN. Lap. T. I. f. 2. Enn. Helv. p. 416. *Cistus Ledon* foliis, *Rorismarini* folio, aranti flore RAI Syn. I. 1690. id. Pinxit etiam EG EDE in descriptione Greenlandiae. In toto aede septentrione provenit. Piro-

Pirola foliis ovatis acuminatis, serratis, spica unilate
rali LINN. *Enum. Helv.* p. 420. *Pirola* II. *tenuior* CLUS.
Pann. p. 505. 506. *Pirola* folio innervatō, serrato I. R. H.
Pirola mindr. MANGET *diff. pharm.* II. p. 691. In sylvis
paucim.

Pirola racemosa, staminibus & pistillo rectis *Enum.*
Helv. p. 420. Haec species, de qua in literis suis du-
bitabat Egregius LINNAEUS, omnino diversa est a
priori, circa Bernam vulgatior, quam altera, neque rara
in sylvis, quae ab Hercynicis jugis versus occidentem
solem declinant, circa Illefeld & alibi. Flores huic in
densiorem racemum, penduli congeruntur. Calyx semi-
quinquesfidus, segmentis acutis. Petala in campanulae
formam ordinata, ovalia, lacteola. Stamina decem, ae-
quabiliter disposita, quinque circa convexitatem loculo-
rum fructus, totidem alia in sulcis, qui loculos distin-
guunt: apices biloculares, loculis semiovalibus, ultra
filamentum in flavum obtusum corniculum producti.
Ovarium fit ex quinque ovalibus coalitis loculis. Tuba
recta, flore paulo longior, fine crasso, stellato, qui se-
quenti exiguis est, & obsecure inciditur.

Pirola staminibus & pistillo declinatis *Enum.* *Helv.* p.
420. *Pirola major* MANG. I. c. *Pirola rotundifolia, major*
T. Mat. Med. II. p. 140. *Beyde über den Eichenkrug, um*
Rheinhausen magna copia, & super Hardeggen. Diver-
sissimae sunt, adgnoscente nunc LINNAEO. Eam
enim, cui tuba recta est, hybridam vetat esse, quod sola,
abs-

absque ea, quae pistillo declinato est, plurima circa Bernam nascatur.

Pirola flore singulari RIVIN. T. 95. Pirola IV. CLUS. Pann. p. 508. 509. Abunde in sylva hercynia ad radices abietum. In Sileiae montanis.

Thymelaea spica foliis levibus, mollibus, lanceolatis subiecta Enum. Helv. p. 188. Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina C. B. Ubique in sylvis Gottingae.

H. Thymelaea foliis duris levibusque, floribus intermixtis Enum. Helv. p. 188. Laureola semper virens, flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B. Laureola DOD. p. 365. BLAKWELL T. 62. Passim in Helvetiae montosis, Munchenstein, Wasserfall, Dolaz. In Hibernia, Anglia, Veronensi agro, circa Heidelberg.

H. Aristolochia caule simplicissimo erecto, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis Cliff. Enum. Helv. p. 196. Aristolochia Clematitidis vulgaris CLUS. hist. p. LXXI. multiflora RIV. T. 115. In vineis Alsatiæ, Helvetiae. In Syria.

H. Aristolochia caule infirme, ramoso, foliis cordatis, obsolete dentatis, floribus solitariis erectis LINN. Aristolochia Pistolochia dicta I. R. H. Pistolochia DOD. p. 325.

H. Cardamindum majus RIV. T. 96. *Cardamindum ampliori folio & majori FEUILLEE* T. II. T. VIII. *Nasturtium indicum* CAM. hort. f. 31.

H. Cardamindum RIV. T. 95. *flore sulphureo simplici. Cardamindum minus & vulgare FEUILLEE* T. II. T. 8.

H. Cardamindum maximum, odoratum, flore pleno. *Catal. of Trees* T. 3. Varietates habet LOCHNER. E. N. C. Cent. VIII. app.

H. Cardiospermum LINN. *Vesicaria* RIV. *tetrap. irreg* T. 119. *Corindum ampliore folio fructu majore* I. R. H. *Ulinja* H. MAL. T. VIII. T. 28. In Asia calidiori.

H. Hippocastanum T. ZANICHELL. *Castanea equina* CLUS. 8. LOB. II. p. 161. CAMER. Epit. p. 119. In Thracia.

Acer foliis semitrilobis, lobis obtuse incisis *Enum. Helv.* p. 421. Acer TAB. p. 973. *Acer major* PASS. alt. T. 75. Ubique ad sepes.

Acer foliis quinquangulis, undique ferratis *Enum. Helv.* p. 421. *Acer montanum, candidum* C. B. LADURAL T. XI. *Platanus* TRAG. p. 1125. In sylvis.

Acer foliis quinquangulis, acutissime & rarer dentatis. *Epnm. Helv.* p. 422. *Acer major* CAM. *Epit.* p. 63. In M. *Hengst.* Ex communi principio calycis foliola quinque ovata, obtusa, sensim decrescentia. Petala quinque, bractea ovali, brevi, ex albo virentia, petiolata, orta ex orbiculo balsamico viridi, nitente, carnoso. Ex eodem flamina octo apicibus gemellis. Inter flamina totidem rotundi tumores. In cavitate media anuli ovarium parvum, *Thlaspi* simile, educens tubam bicornem. Per maturitatem sunt duae nuces monospermae alatae.



I S O S T E M O N E S
V A R I A E P O L Y P E T A L A E.

Evonymus foliis oblonge ovatis *Enum. Helv.* p. 423.
Evonymus DOD. p. 783. In *Europa, Japonia, locis aquosis*
& ad sepes.

H. *Celastrus* rāmis teretibus, spinis nudis, foliis acutis
LINN. *Lycium Aethiopicum*, *pýracanthae* folio COMMEL.
hort. I. p. 163.

H. *Alaternoides Africana*, *Lauri ferrato* folio. COMM.
Prael. p. 61, ic. II.

H. *Staphylodendron* *Enum. Helv.* p. 423. CAM. Epit.
p. 171. In hortis, sed in *Helvetia* passim ad sepes,
& in *Alsacia, in Hungaria* POCOCK.

Tamariscus PASS. T. 96. *Myrica Pannonica* CLUS.
Pann. p. 27. Ad *Rhenum, Danubium, Isarim, Nilum, Jordānum, Gamroni in Persia,*

Cotinus. Coccigria Theophrasti LOBEL. ic. II. p. 99.
In *Servia & circa Vindobonam,*

H. *Rhus* cortice hirsutissimo, foliis pinnatis, ferratis,
Sumach arbōr MUNTING T. 18. *Rhus oksoniorum & co-*
riariorum LOBEL, ic. II. p. 98. In *Palæstina, Syria,*
Japonia. N 5 H. *Rhus*

H. *Rhus* foliis ternatis, foliolis petiolatis, acutis, integris *Hort. Cliff.* p. 110. *Edera trifolia*, *Canadensis* CORNUT. p. 97.

Hedera foliis lobatis & ovatis *Cliff.* 74. *Enum. Helv.* p. 165. floret circa *Pless* & *Bovenden*.

H. *Vitis vinifera*. *Vallia-Vera-Petica* H. MAL. II. p. 7. Sponte in *Hungariae* & *Helvetiae* dumosis & sepibus, & in tota *America septentrionali*, (RIBALD p. 124.) & in oriente, etiam in *Japonia*.

H. *Vitis quinquefolia* *Canadensis* CHARLETON. *Edera quinquefolia* *Canadensis* CORNUT. p. 100, *Vitis Canadensis* MUNT f. 60. bene. r.

Ribes ramis aculeatis, erectis, fructu glabro *Cliff. Enum. Helv.* p. 346. *Grossularia spinosa*, *sylvestris* C. B. *Uva spina* MATTH. p. 167. Varietates habet LANGLEY T. 55. Ad sepes rarer. In *Helvetia* frequens ad sepes.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis erectioribus *Cliff. Enum. Helv.* p. 346 *Ribes alpinus*, *dulcis* I. B. II. p. 98. Copiose in sylvis super Stolberg, eundo ad Auerberz.

H. *Ribes* inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis *Enum. Helv.* p. 346. *Ribes acidus*, *vulgaris* LINN. In sylvis circa Bernam, Altdorfium. In Suecia, Polonia, Canada, Hudsonsbay. Ad montes fabulosos Belgii.

Ribes inerme, foliis & nigro fructu maximis, olenibus
Enum. Helv. p. 347. Grossularia non spinosa, fructu nigro
C. B. Ribes nigra TAB. p. 1083. Icon L' ADMIRAL T.
23. Zu Rosdorf am Baehe abunde. In Alsatia, Borus-
fia &c.

Berberis PASS. ic. alt. n. 2. Langley Pomona T. 13.
Oxyacantha Galeni TAB. p. 1035. Abunde in dumetis in-
ter Bovenden & Barenzen.

H. Telephium Dioscoridis IMPERATI p. 662, Monspelii,
In Italia &c.

Tribulus aquaticus CAMER. Epit. p. 715. Panovar
tiaana Hort. MAL. T. XI. tab. 33. Copiose in stagnis
Alsatiae inferioris reperi. Wittebergae frequentissimus est, &
Berolini. In Macedoniae fl. Strymone.

U M B E L L I F E R A E.

H. Phyllis LINN. Valerianella Canariensis, frutescens,
simplicia nobla dicta DILL, hort. Elth. T. 299.

Hydrocotyle LIND. hort. Alsat. T. 12. Marsh pennywort
PETIVER Hort. Brit. T. V. In ducatu Cellei, & ultra
Engesen, passim ad vias fossasque. Circa Gernsheim etiam
reperi.

H. Foe-

H. Foeniculum Ennum. Helv. p. 425. BLAKWEL.
T. 288.

Apium foliis semitrisidis, ora loborum circumferrata
Ennum. Helv. p. 427. *Apium palustre* CAM. Epit. p. 527.
Japonia, & in Germania nonnunquam ad fossas, etiam in
Georgia.

H. *Apium sativum* RIV. T. 87. & *crispum* T. 89.

H. *Apium Russicum* Thysselini folio. Aliquot annis
vixit, & sine flore periit.

H. *Smyrnium* Matth. RIV. T. 68. *Alexanders*
PETIVER. H. E. T. 24. Ad vias maritimae & rupes
Angliae occidentalis, & in sepibus, tum in *Provincia*, &
insula Texel.

Podagraria Ennum. Helv. p. 427. RIV. T. 46. *Angelica*
sylvestris minor sive *erratica*. C. B. Ubique ad sepes.

Carum Ennum. Helv. p. 428. CAMER. Epit. p. 516. In
pratis non rarum.

H. *Seseli* radice praelonga, foliis glaucis, seminibus
subhirsutis, *Sibiricum*, pro *Oenanthe striata*, *rigida* habi-
tuim, miliique missum, cuius icon & descriptio dabitur in
T. III. Comment. Soc. Reg. Scient.

Tragofelinum pinnis semibilobis, circumferratis Enum.
Helv. p. 428 Pimpinella saxifraga CAMER. Epit. p. 775.
Small broad Saxifrage & great broad Saxifrage PETIVER.
T. 26. Im Lütjelänger Walde &c.

Tragofelinum pinnis laciniatis, superioribus tenuissime
divisis Enum. Helv. p. 429. Tragofelinum minus. I. R. H.
Saxifraga parva DOD. Purg. p. 495.

Pimpinella tenuifolia RIVIN T. 82. An Foeniculum
sylvestre, clavis ferulae folio longiori I. R. H. In sylva
die Welmese prope Jenam.

H. Anisum RIV. T. 72. vulgare FIERAE Coen. p. 107.

H. Ammioselinum RIV. T. 84. Ammi vulgare, majus,
folio latiori, semine minus odorato. I. B. III. p. 127. In
Gallia calidiori.

H. Ammi parvum, Foeniculi folio MORIS. T. III. p. 295.
S. 9. T. 8. f. 7. Umbella universalis nuda, peculiaris
quinque foliolis inaequalibus succincta. Petala alba,
inaequalia, cordata, incisa. Semen ex ovato contractum,
hinc album & leve, inde quatuor eminentibus lineis di-
stinctum.

Oenanthe foliis caulinis fistulosis Enum.. Helv. p. 432.
Oenanthe RIVIN. Oenanthe aquatica C. B. Nach Boven-
den in einem Sumpfe. Flores laterales mares, magis dif-
formes,

formes, centrales androgyni, magis regulares, calyce uniformi. Semen aculeis calycis coronatum.

H. *Oenanthe Apii* folio, caule firmiori C. B. MOR. III. p. 288. S. 9. T. 7. f. 3. *Monspelii.*

H. *Oenanthe folio Chaerophylli*, succo viroso Comm. Lit. 1740. hebdom. 49. Etiam absque flore interiit. In *Anglia, Hibernia, Belgio.*

H. *Oenanthe Lusitanica*, semine crassiori, globoso. I. R. H. Nondum floruit.

Phellandrium foliis ad angulos obtusos ramosis Enum. Helv. p. 432. *Phellandrium* DOD. Cereal. p. 244. RIVIN. T. 64. Am Schützenhauswasser, auf dem Heymberge.

H. *Coriandrum fructibus globosis*. *Coriandrum majus*. RIV. T. 69 & *majus* RIV. T. 70.

H. *Coriandrum sylvestre*, foetidissimum C. B. Sponte aufm ried bey Ulm LEOP. Plurique flores mares absque calyce sunt. Androgyni vero habent calycem duobus magnis, tribus exiguis foliis factum. In fructu duo semina includuntur, septo distincta.

Cynapium Enum. Helv. p. 433. RIVIN. T. 75. *Cicuta minor*, *Petroselino similis* I. R. H. *Cicuta terrestris*, *minor* TREW. Comm. Lit. 1740. hebdom. 47. Ubique in hortis.

Cicuta *Emu*. *Helv.* p. 434. DOD. *Pempt.* p. 461.
Cicuta vulgaris, major MORIS. III. p. 290. *Cicuta ter-*
restris, major TREW. *Comm. Lit.* 1740. *hebd.* 43. *In*
vallo urbis *passim & ad sepes.*

H. *Ligusticum* *foliis multiplicibus, foliolis superne in-*
cisis *Cliff.* *Ligusticum vulgare, foliis Apii* I. B. In *Liguria*
Languedocia, Japonia, Palaestina POCOCK.

H. *Ligusticum* *Scoticum, Apii folio* I. R. H. *Seseli*
Scoticum RIVIN. T. 68. In *Scotia, Orcadibus insulis,*
Bahusia, Virginia. *Umbellae generalis radius unus & alter,*
peculiaris radii sex, septem, latiusculi. *Petala rubella, fere*
aequalia, margine acuto introflexo. r.

H. *Sison* *foliis ternatis.* *Myrrhis Canadensis* RIV. T.
 53. *Calyx uterque abest.* *Umbella utraque rara,*
flores albi, apice introflexo, regulares. In *Virginia,*
Canada.

Sium *foliis pinnatis, inferioribus simplicibus, superio-*
ribus trifidis, argute dissectis *Emu.* *Helv.* p. 435. *Sium*
geniculata umbellatis VAILL. p. 187. In *fossis & aquosis*
ubique.

Sium *foliis omnibus pinnatis, serratis.* *Sium majus,*
latifolium MORIS. *Broad Water Parsnip* PETIVER T. 26.
In fossis auf der Pfingstwiese, bey Harste. Um Saltzder-
helden.

H. *Sium*

H. Sium foliis pinnatis, floralibus ternatis LINN. *Sifarium* RIV. T. 55. Universale involucrum uno foliolo fit, peculiare tribus quatuorve reflexis.

Sium foliis serratis, tripartitis. *Enum. Helv.* p. 436. *Cicuta aquatica* WEPFERI. TREW. l. c. hebd. 48. Am Seeburger und Deuckerhäuser Teiche.

Sium pinnis multifidis, serratis, nervo folioso *Enum. Helv.* p. 436. *Falcaria* RIV. T. 47. Ad viam inter Papiermühle & Edigehausen abunde.

Meum *Enum. Helv.* p. 426. DOD. *Purg.* p. 473. Cospicissime circa Andreasberg, rarius in Brüderero M. In Pilato Gallico, in Jurae nonnullis jugis.

Bupleurum foliis ovatis, perfoliatis LINN. *Enum. Helv.* p. 437. *Perfoliata* II. TAB. p. 759. In agris. Involucrum generale nullum.

Bupleurum foliis petiolatis, falcato ellipticis, acutis *Enum. Helv.* p. 439. *Herba vulneraria* TRAG. p. 431. Rarius über der Papiermühle. In M. Altenstolberg abunde.

Bupleurum foliis imis petiolatis, superioribus ovatis, perfoliatis *Enum. Helv.* p. 437. *Perfoliata montana* CAMER. hort. p. 120. ic. XXXVIII. *Bupleurum montanum*, *latifolium* I. R. H. Im Walde zwischen Wehnde und Plesse, auch am Fahrwege nach Plesse häufig, und am Plessberge rechts. Involucrum generale quinquefolium.

Astran-

Astrantia foliis quinquelobatis, lobis tripartitis *Enum.*
Helv. p. 439. *Astrantia* RIV. T. 67. *Astrantia major,*
corona floris purpurascente I. R. H. *Ausm Altenstolberg.*

Laserpitium foliis cordatim incisis LINN. *Enum. Helv.*
 p. 440. *Seseli Aethiopicum* herba DOD. *Purg.* p. 482. *Laserpitium* foliis latioribus, lobatis I. R. H. In M. *Altenstolberg*, & super *Wernigerode.*

H. *Laserpitium* pinnis petiolatis, tripartitis, ellipticis
Enum. Helv. p. 441. *Siler montanum* DOD. *Purg.* p. 310.
Semen pinxit PARSONS *theatr.* T. III. f. 12. 13. 14. 15.
Veronae, & in *Alpium* declivibus v. g. supra *Interlachen.*

Laserpitium minus RIV. T. 23. *Laserpitium Prutenicum*, *viscosa semine* BREYN. Cent. I. c. 84. In *Bornisia*,
 circa *Jenam*, & *Berolinum*. Involucrum universale & pecu-
 liare octo & ultra foliorum latorum; alba membrana cin-
 etorum. Petala florum extremorum paulum irregularia,
 caeterum cordata, inflexa, lineata, quasi alba; tubae lon-
 gae, diu persistentes; semina hirsuta, tribus alis brevibus
 percursa, praeter quas duas magnae plicatae, albae, siccae
 aliae adsunt. Sed etiam parvae alae nonnunquam gran-
 diores fiunt, & numerus adeo alarum a 2 ad 8 in uno
 fructu varius est.

H. *Cribrum* foliis linearibus, carnosum LINN. *Foeni-*
culum marinum LOB. ic. p. 392. Ad *mare mediterraneum* in M. *Cete* & *alibi*: etiam ad *mare Britannicum*

Umbella utraque octifolio involucro suscepta; petala integra inflexa, cordata, extremum maximum. r.

Peucedanum foliis quinques tripartitis, linearibus, subulatis, integerrimis LINN. *Peucedanum* I. B. III. part. 2. p. 56. Abunde in pratis inter Nördlingen & Oettingen. Jenae, in sylva prope Cospida.

Peucedanum pinnis duplicito pinnatis, pinnulis latiusculis, trifidis Enn. Helv. p. 442. *Siler* alterum, pratense DOD p. 310. Abunde ad lacum Seeburgensem in ripa dextra; Infra Lauche. Super Wernigerode. Jenae im Paradiese.

Selinum pinnis pinnatis, pinnulis appendiculatis, circumferratis, triangularibus Enn. Helv. p. 444. *Cervaria* RIV. T. 12. *Oreoselinum majus*, Apii folio I. R. H. Ans Plessberge in praecipiis,

Selinum pinnis ad angulos obtusos pinnatis, pinnulis incisis, non serratis Enn. Helv. p. 444. *Oreoselinum* sive *Vielgutta* DOD p. 696. Circa Oppenheim & Güntersblum legi.

H. *Oreoselinum* Apii folio, minus, ad singulos nodos ramosum, in summitate caulis plures umbellas in praelongis pediculis ferens TILLI kort. Pis. Non dum floruit.

Selinum leviter lactescens, radice unica Enn. Helv. p. 443. *Thysselinum angustifolium* RIV. T. 20. Radix ramosa, teres, lac in petiolis ramorum modicum: Umbellae utriusque involucra latifolia, reflexa. Petala aequalia, cordata, inflexa. Semina fiunt ala magna, alba & nucleo tribus alis elevatis percurso. In Landolfshäuser Sumpfe. In Cellensi ducatu ubique. Seli-

Selinum altissimum, foliis triplicato divisis, pinnulis trilobatis, obtusis. *Umbellifera Alsatica*, magna I. B. III. p. 306. In ruderosis arcis Oppenheimensis magna copia. Descriptam dedi in *Opuscul. Botan.* pag. 318. seqq. & pho XCIV.

Angelica foliolis aequalibus, ovato lanceolatis, serratis Cliff. *Enn. Helv.* p. 445. *Angelica sylvestris* TRAG. p. 422. Ubique in uidis pratis. Foliis rotundioribus & acutioribus ludit.

H. *Angelica foliorum inpari lobato* LINN. *Angelica sativa* DOD. p. 497. *Angelica RIV.* T. 15. In *Laponia*, *Grönlandia*, *Silesiae alpibus*.

H. *Angelica foliolis aequalibus*, ovatis, inciso serratis Cliff. *Angelica Incida*, *Canadensis* CORNUT. p. 197. BARR. ic. 1320. MORIS. S. IX. T. 3. *Angelica Canadensis* RIV. T. 16. *Angelique a fleur blanche du Canada* CHARLEVOIX ic. 29. *Umbellae universalis* radii vagi, exigui, peculiaris involucrum oclifolium, gracile. Petala elliptica, lanceolata, fine reflexo, placenta convexa. Semen ovale, alis lateralibus magnis, nucleo tribus crassis fulcis percurso. r.

H. *Imperatoria Ennu. Helv.* p. 445. *Astrantia* DOD. *Purg.* p. 500. In alpibus v. g. um die *Tenfelsbrück*, & in montibus *Arverniae* & *Tridentinorum*.

H. *Ferula RIV. T. 9.* Nondum floruit.

H. Anethum RIV. T. 13.

H. Anethum Fernambucense Hort. Legd. Bat. Differentiam nullam in meis reperio.

Pastinaca foliis simpliciter pinnatis. Cliff. Enum. Helv. p. 446. Pastinaca RIV. T. 6. Pastinaca sylvestris, latifolia C. B. Wild Parsnip PETIVER. T. 24. Ad ruderosa & vias.

Sphondylium RIV. T. 4. S. pinnatum, pinnis semiquinquefidis, hirsutis Enum. Helv. p. 447.

H. Sphondylium foliis angustioribus RIV. T. 5. an jagged Cow Parsnip PETIVER Hort. Brit. T. 24? Huic radii sex, septem, octove sub umbella peculiari. Flores virides, omnes uniformes, regulares, petalis inflexis, cordatis, linea eminentia divisis: placenta convexa, tubae breves. Semen simile: odor virulentus orchidis. Circa Harefield BLAKSTONE. r.

H. Tordylium involucris umbella longioribus Cliff. Tordylium Syriacum RIV. T. 3. Tordylium MOR. Umbellif. T. 9. 6.

H. Tordylium umbella conferta, foliolis lanceolatis, inciso serratis Cliff. Tordylium RIV. T. 1. Tordylium magus, limbo seminis minus granulato MOR. IX, T. 16. r.

Caucalis involucris latifoliis, petalo extremo maximo
Enum. Helv. p. 448. Πυκνονόρτος *Echinophora an-*
Dioscoridis Gingidium C. O. L. Ecphras. p. 94. *Caucal-*
arvensis, echinata, magno flore C. B. In agris passim
Ueber der Papiermühle abunde.

H. Caucalis seminibus cylindricis, asperis. *Anthriscus*
Creticus RIV. T. 38. Semina magna, longa, striata, aspe-
 ra, spinosa, rostrata, hinc convexa, inde plana. Umbel-
 la universalis nuda, ex paucis umbellulis composita. Calyx
 umbellae peculiaris quatuor lanceolatis, hirsutis foliolis
 fit Ea umbella pauciflora est. Petala inflexa, cordata,
 extreimum majus, interiora minora. Tubae breves, cras-
 saeque. Circa Argentinam & in Anglia. Veronae.

Caucalis involucro generali unifolio, laciinis foliorum
 perangustis *Enum. Helv.* p. 448. *Echinophora tertia*
 $\lambda\varepsilon\pi\tau\circ\varphi\bar{\alpha}\lambda\sigma\nu$ *purpurea COLUMN.* p. 96. *Caucalis ar-*
vensis, echinata, parvo flore & fructu I. R. H. In agris fre-
 quens. Peculiare involucrum quatuor vel quinque foliorum.

Caucalis umbella universalis trifida, partialibus penta-
 spermis, foliis pinnatis, pinnis serratis *Cliff. Caucalis echi-*
nata, arvensis, latifolia C. B. G \ RIDEL T. 22. Broad
Bur Parsley & Jagged Broad Bur Parsley PETIVER T. 27.
 In agris frequens.

Caucalis seminibus hispidis, foliis hirsutis, obtuse lobat-
 is *Enum. Helv.* p. 449. *Caucalis semine aspero, flosculis*
rubentibus C. B. Prodri. p. 80. In sylvis & ad sepes.

H. Caucalis umbellis sessilibus Cliff. *Caucalis nodosa*, *echinata* semine C. B. *Megsp* li. Petoli umbellae universalis breves, robusti. Fae umbellae tantum ex duabus tribusve umbellis peculiaribus sunt. Calyx praelongus, quinque ad octo foliis fit. Semen spinulis al. is rectis hirsutum, calyce brevi coronatur. Petala cordata, apice inflexo, aequalia, alba. Tucae breves.

Caucalis folio Chaercolii RIVIN. T. 34. *Myribis sylvestris*, *nova aequicolorum* COLUMN. Ecplras. p. 112. *Fine rough Parsley* PETIVER. T. 27. In pagis circa Genam v. g. Burgau. Hannoverae, in Anglia.

H. Caucalis Africana, folio minoris Ruta BOERH. p. 63. ic. Umbella rara ex tribus quatuorve umbellalis facta. Involucra trifolia, breviuscula & rigidiuscula: Semen semiovale, tribus lineis modice aculeatis percursum. Petala alba apice inflexo, medio linea eminenti divisa, pene aequalia, extremo maximo. Tucae duae persistentes longae. r.

H. Caucalis major daucoides Tingitana Par. Bat. p. 111, ic. MOR. IX. 14. *Echinophora Tingitana* RIV. T. 26. Calyx universalis ex foliis laciniatis pinnatis factus, sursum cavus. Umbellae particulares inaequales, altera parte breviores, earumque involucra alias laciniata, alias simplicia. Exteriores flores difformes. Petala alba aut rubella, ungue virente, incisa, in partes inaequales, extimum maximum, media mediocria, intima minima. Interiores flores vix difformes, omnes autem androgyni. Tu-

Tubae breves crassaeque. Semen ovale, hinc planum, inde convexum, percursum quatuor alis profundissime serratis, albis, succisque, calyce coronatum. Inter Caucalidem & Daicum ambigit. r.

Sanicula *Enn.* *Helv.* p. 449. RIV. T. 30. In omnibus nemoribus.

Daucus *seminibus hispidis* *Enn.* *Helv.* p. 450. In agris &c ad ripas.

H. *Daucus sativus*, radice atrorubente, aut flava.

H. *Daucus maritimus lucidus* I. R. H. *Staphylinus folio latiore* RIV. T. 29. r.

Libanotis *pinnulis circa costam decussatis* *Enn.* *Helv.* p. 450. *Athemantha* *foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, radicalibus circa costas decussatis* GMELIN. *Sibir.* p. 186. *Daucus montanus*, *Pimpinellae saxifragae minoris* *folio, Dubriensis* PLUKNET. *Almag.* T. 173. *Auf dem Altenstolberg.*

H. *Libanotis* *foliis multifidis, planis*. *Dauco con foglie di Sophia Siciliana* ZANONI T. 48. nov. Ab alpino Dauco sive cretico differt foliis glabrioribus, non teretibus, laxioribus, semine potius majori.

Chaerophyllum *seminibus nitidis, nervis foliorum hirsutis* *Enn.* *Helv.* p. 452. *Chaerophyllum* *sylvestre*,

perenne, Cicuta folio I. R. H. Cerefolium sylvestre RIVIN.

T. 43. In pratis ubique, verna planta.

H. *Chaerophyllum sativum.*

Myrrhis radice lignosa, perenni, foliis hirsutis, seminibus flavis, obscure striatis. Myrrhis minor LOBEL. Myrrhis perennis, alba, minor, foliis hirsutis MORIS. III. p. 301. RUPP. T. V. p. 282. Umbella universalis nuda, sub peculiari folia septem lata, lanceolata. Flores exteriores difformes, petalis semibifidis, tubae persistentes. Semina flava, longa, conica, obscure striata, tribus lineis glabrioribus percursa. Solia profundius & acutius incisa, quam Chaerophyllo sylvestri. Ueber Wernigerode in pratis.

Myrrhis perennis, seminibus strictis, longissimis Enn. Helv. p. 453. Myrrhis palustris RIV. T. 50.

B. *rubra. In sylvis & pratis hercynicis, etiam in urbe Clausthal. Glabris & hirsutis foliis ludit.*

Myrrhis caule inferius hirto, superne glabro, radice verna globosa. Myrrhis tuberosa, nodosa, coniophyllum I.R.H. Myrrhis foetens RIV. T. 49. Abunde ad viam versus Edigebausen. Factet, ut Cicuta minor. Semina obesa, elliptica, fusca, lineis pallentibus tribus percursa, reliquis tubarum coronata.

Myrrhis pinnulis semipinnatis, obtusis, ordinatim decrescentibus Enn. Helv. p. 453. Myrrhis annua, semine striato, levi I. R. H. Cerefolium sylvestre, Onoselinum TAB. p. 94. Wild Chervil PETIVER. T. 25. bene. Myrrhis RIVINI T. 48, Ubique ad sepes & in lapidosis. H

H. Myrrhis seminibus profunde sulcatis, maximis Odotata. RIV. T. 56. Veronae; Cassellis, si fides GILLENIO.

Scandix foliis omnibus tenuissime divisis *Enum.* *Helv.* p. 454. *Scandix* RIV. T. 37. *Scandix, Pecten veneris*, DOD. *Purg.* p. 502. In agris ubique.

Eryngium ramosissimum, pinnis foliorum pinnatis, alatis *Enum.* *Helv.* p. 455. *Eryngium campestre* DOD. p. 730 Bey Bovenden am Wege. Circa Eisleben.

H. *Eryngium* foliis radicalibus ovalibus, planis, crenatis, floribus pedunculatis *Cliff.* *Eryngium Pannonicum*, *latifolium* CLUS. *Pann.* p. 669. In pratis ad Danubium.

H. *Eryngium marinum* MATTH. p. 1459. DONAT. p. 41. Ad mare Balthicum & mediterraneum. r.

D I P E T A L A E.

Circaeæ major foliis longioribus, obiter crenatis *Enum.* *Helv.* p. 456. *Herba [Divi Stephani TAB.* p. 730. Bey Pless im Grunde, an den Gleichen abunde: in sylva supra Hardeggen.

Circaeæ minima; foliis brevioribus, dentatis *Enum.* *Helv.* p. 456. *Circaeæ minima* COLUMN. Ecphras. II. p. 80. In sylvis supra Hardeggen &c in sylvis hercynicis ubique. Vereor, ut diversa sit, nam etiam in majori calycis purpureos reperi.

STELLATAE.

Asperula seminibus coronatis. *Sherardia* DILL. nov. gen. p. 96. *Cliff. Enum. Helv.* p. 457. In agris ubique.

H. Asperula umbellis pilosis, foliis senis, longis, & obtusis *Enum. Helv.* p. 457. *Asperula caerulea* DOD. p. 355. In *Anglia, Helvetia, Belgio, Alsatia.*

Asperula foliis octonis, seminibus hispidis, ex summo caule paniculata *Enum. Helv.* p. 457. *Asperula oiorata*, flore albo DOD. Pempt. p. 355. In sylvis atunde.

H. Asperula foliis quaternis, ovato lanceolatis, ramis alternis *Cliff. Enum. Helv.* p. 457. *Rubia levis Taurinensis* LOBEL. ic. p. 800. In *Helvetia* circa *Interlachen* r.

Asperula foliis quaternis, linearibus, floribus paniculatis. *Enum. Helv.* p. 458. *Rubeola quadrisolia*, *levis*, floribus purpurascensibus I. R. H. *Gallium tetraphyllum*, *montanum*, *cruciatum* COLUMN. I. p. 297. Circa Jenam ubique, &c in *Helvetia*.

Asperula foliis quaternis, linearibus, floribus trifidis Ex M. Altenstolberg in hoitum adulii, vigentem ibi & florentem. Est *Asperula* foliis linearibus, quaternis, summis oppositis LINN. Stockholm. Handling 1742. n. 20. non vero synonyma. *Gallium triphyllum* in *sylvis Gothie* FUIREN apud BARTH. cist. med. p. 285. Tota viridissima est, caule cubitali, foliis rarissimis, quaternis, quinisque obtusis, flore albo, ita longe tubulato, ut ad *Asperulas* referre necesse sit, semper trifido.

H. Asperula spicata, glumis floralibus maximis. *Rubella angustifolia*, *spicata* C. B. *Pseuderubia spicata*, *angustifolia* MOR. IX. T. 27. *Monspelii* &c. Quatuor ordines locistarum, ut videntur ad graminum similitudinem dici posse. Cuilibet locustae tria foliola cava, lineata, pliata, glumarum similia. In eorum sinu semina duo conjuncta, coronata, gracillimo flore, luteo, quadrifido, coronata. Tubae duae apice globoso. Semen naviculae simile, hinc convexum, inde profunde sulcatum.

H. Galium foliis quaternis, floribus ternatis, mediis crassè petiolatis, lateralibus masculis. *Cruciata muralis*, *minima*, *montana* COLLUMN. Ecphras. p. 297. Romae &c in regionibus calidis. Coniunctos tres flosculos producit, quorum medius androgynus, pediculo crasso, ciliato, inflexo est, cum semina ovata sint, & flosculus quadrifidus, tetraestemon, tuba eque apicibus globosis. Laterales flosculi trifidi, mares, tristemones.

H. Galium flosculis inter folia ovata, amplissima, reflexa positis. *Cruciata Orientalis*, *glabra*, - *breviflora* TOURN. Coroll. Icon BUXBAUM II Cent. V, app. n. 40. vix potest nostram plantam exprimere. Inter folia ampla, ovata, reflexa sedent pediculi reflexi, gerentes semina gemella, rotunda, hirsuta. Super ea flores sunt in petiolis ramosis, trifidi, quadrifidi, quorum multi abortiunt. Quare omnibus pensitatis Valantium, ut ipse malebat VAILLANTIUS, solis floribus sterilibus admisit diversam, Galiis reliquis restituo. H.

H. *Galium seminibus exasperatis*, flosculis lateralibus masculis. *Aparine semine Coriandri saccharati* PARKINS *Monspelii*. Flosculus fertilis, quadrifidus, androgynus, sedet inter duos flosculos mares trifidos & tristemones.

Galium caulis alis, foliique ora & nervo serratis, fructu hispido. *Enum. Helv.* p. 459. *Aparine vulgaris* C. L. Ad sepes ubique.

Galium caulis alis foliorumque ora nervoque serrato, fructu subaspero *Enum. Helv.* p. 459. *Aparine semin*, *levi* VAILL. T. 4. f. 3. *Gottingae in agris*. Semina tu-
berculosa, non adhaerentia.

Galium caulis alis, foliorum ora nervoque serratis, fru-
ctu levi *Enum. Helv.* p. 459. *Ap. semine minore* VAILL. T.
4. f. 4. Semen penitus leve, ovale. In *Helvetia*.

H. *Galium procumbens*, foliis senis, gracilissimis, con-
fertis, seminibus subhirsutis. Ex *Sibiria*. Folia, quam vulgari
luteo longiora, nigriora, caulis procumbens, semina
subhirsuta, quae evidentior a vulgari luteo diversitas est.

Galium foliis quaternis, flosculis in alis confertis *Cliff.*
Enum. Helv. p. 462. *Cruciata hirsuta* C. B. Ad vias: Ha-
bet flosculos mares steriles, mixtos fertilibus.

Galium caule erecto, foliis quaternis, lanceolatis, trinerviis
Enum. Helv. p. 459. *Rubia erecta*, quadrifolia I. S. III. p.
716. Abunde in sylvis circa Jenam, in Altenstolberg, &c
supra Elbingerode, inque monte Kishäuser.

Galium caule ramosissimo, foliis quinis, obverse ova-
tis *Cliff. Enum. Helv.* p. 460. *Gallium saxatile*, supinum,
molliori folio IUSSIEU *Memoir de l'Acad.* 1714. p. 490.

In

In sylva hercynia frequens, statim super Herzberg, & versus Engesen.

Galium foliis senis & novenis, subasperis, spinula terminatis Enn. Helv. p. 460. *Gallium album*, minus VAILL. p. 78. Abunde ad vias, locis lapidosis v. g. in M. Heynberg versus Herperlusen.

Galium caule subaspero, foliis quaternis & senis, spinula terminatis Enn. Helv. p. 460. *Aparine palustris*, minor *larijensium*, flore albo I. R. H. Abunde locis uidis.

Galium altissimum, foliis quaternis, obtusis Enn. Helv. p. 461. In aquosis pratis. Vereor, ut satis diversa planta sit.

Galium caule qua rangulo, foliis octonis, glabris, acuminate Enn. Helv. p. 461. *Gallium album*, *vulgare* I.R.H. *Rubia sylvestris* TAB. p. 789. Ad vias &c.

Galium caule recto, foliis senis, inferne canaliculatis. *Gallium montanum*, *altissimum*, foliis angustis, albicanibus RUPP. p. 5. In sylvis circa Jenam & Altenfelberg. Diversum a vulgari, durius, erectius, foliis longioribus, subtus alatis, linea divisis, sursum rigidibus.

Galium caule tereti, fulcrato, foliis octonis, glaucis, & obtusis Enn. Helv. p. 461. *Gallium montanum*, *latifolium*, *ramosum* C. B. *Mollugo montana* DOD. p. 354. In sylvis frequens.

Galium foliis octonis, gracilissimis, confertis, spica flava caulem terminante Enn. Helv. p. 461. *Gallium* BLAKWELL. T. 435. Am Bovender Galgen. Ludit florae pallente, ochroleuco.

H. Rubia foliis senis, superficie annua. *Rubia sylvestris*, *Monspellana*, major I. E. III. p. 715. Folia quaterna. quina, sena. Flos quinquefidus & sexfidus. Radix perennat, folia & caules anni sunt. In *Valesia*, *Gallia* calidiori, etiam circa *Francosurtum* ad *Viadrum*, *Argentinam*. r.

H. Anthospermum Hort. Cliff. T. 27. *Prutex Africamus*, *Ambra spirans* WALTHER hort. T. 9. Semen ignoratur. r.

FLORE FRUCTUI INNATO BACCIFERAЕ.

Cornus umbellis, involucrum acquantibus Cliff. *Cornus mas vulgo*. *Cornus* CAM. Epit. 153. bene. In Macedonia & Europa calidiori, etiam in M. Hengst prope Gottingam abunde.

Cornus umbellis involucro destitutis *Cornus semina* I. R. H. In Europa, Japonia &c. ad scipes.

Opulus Enum. Helv. p. 463. *Sambucus aquatica* CAM. Epit. p. 977. In aquosis Europae, Japoniae.

β. Varietas staminibus & tubis abortivis, floribus omnibus amplioribus. *Sambucus arbor rosea* AICHST. Vern. Ord. Frut. T. X. f. 1.

Viburnum MATTH. p. 217. Eey Lauche & Jenae.
Floribus uniformibus ab Opulo differt.

H. Tinus CLUS. II. hisp. p. 82. In Hispania, Italia.

Sambucus arborea, floribus umbellatis Enum. Helv. p. 456. Sambucus fructu in umbella nigro C. B. In Japonia, & Germania tota.

Sambucus herbacea, floribus umbellatis Enum. Helv. p. 466. Ebulus CAMER. Epit. p. 979. Rarius circa Göttingam.

Sambucus arborea, floribus spicatis. Enum. Helv. p. 467. Sambucus cervina TAB. p. 1039. Sambucus montana, racemosa C. B. Im Entenloch, & in Sylva vetus Bestie gehausen,

Caprifolium floribus geminis, foliis ovatis, lanuginosis, integrerrimis Enum. Helv. p. 464. Chamaecerasus dumetorum, fructu gemino, rubro I. R. H. Xylosteum RIVINI monop. irreg. T. 119. Ubique ad sepes.

H. Caprifolium floribus geminis, foliis ovatis ciliatis Enum. Helv. p. 465. n. 3. Periclymenum rectum, fructu caeruleo CLUS. Pannon. p. 85. Folia nervis conspicuis picta, oris ciliatis, inferne subhirsuta. Baccae geminae, corona obscuriori, brevi, resecta, orbiculata. Germinus uni baccae insidet flos subhirsutus, albus, brevis, uno latere tubi longiori, calcar quasi ordiente. Segmenta ejus quinque,

quinque, superiora duo rectiora, breviora, inferiora tria ovata, lanceolata, magis distantia, longiora. Stamina quinque, quorum unum brevius est. Tuba longa apice magno, difformi. Fructus non maturuit. In *Germania*, *Austria*, *Rhaetia*, *Helvetia*.

Caprifolium floribus racemosis, foliis distinctis Ennem. Helv. p. 465. *Periclymenum Germanicum, non persoliatum* C. B. *Caprifolium* PASS. ic. part. alt. n. 7. Multae varietates pictae sunt in Catalogue of Trees. Abunde in dumetis & sylvis. Bey Siboldshausen, in M. Hube &c.

H. *Caprifolium* foliis supremis coalescentibus, floribus bilabiatis. *Caprifolium Italicum* DOD. Purg. p. 262. GARDINELL. T. 20. *persoliatum* VAILLET. T. 87. *Periclymenum persoliatum calidarum regionum* LOB. ic. 652. *Periclymenum Italicum* RIV. T. 122. *Monspelii* &c.

H. *Caprifolium* fructu gemino, rubro, foliis glabris, cordatis AMMAN. Ruthen n. 262. *Fructus* gemelli, coronati calyce quinquefido, cujus dentes superiores breviores sunt. *Flos amoene carneus*, bilabiatus, uno segmento parum majori, omnibus ovatis. In *Sibiria*.

H. *Caprifolium* foliis connatis, floribus tubulosis. *Periclymenum persoliatum*, *Virginianum*, *semper virens* & *florens* HERM. Hort. Lugd. Bat. p. 485. Catalogue of Trees. *Periclymenum Virginianum* RIV. T. 122.

FLORE FRUCTUI INNATO
SICCO MULTILOCULARI.

Campanula foliis asperis, cordatis, serratis, calycibus hirtis, ala multiflora *Enum. Helv.* p. 490. *Campanula vulgarior*, *Urticae folio, major & asperior* C. B. *Cervicaria major* DOD. *Coron.* p. 31. In sylvis vulgaris.

β. Flore albo. . .

Campanula foliis tubasperis, longius cordatis, serratis, ala uniflora *Enum. Helv.* p. 491. *Campanula hortensis*, *Ranunculi radice* C. B. *Cervicaria major, sylvestris* AICHST. *Aest.* *Ord. I. T. 6. f. 1.* Ad vias sylvarum.

β. Flore pleno.

γ. *Campanula monstrosa*, floribus abortientibus, inque folia degenerantibus. Ex *Sibiria* & in horto.

H. *Campanula pyramidalis*, altissima I. R. H. In *Borussia*, si fides HELWINGIO in supplemento.

H. *Campanula capsulis quinquelocularibus*, calycis sinibus reflexis rectis ROY. *Campanula hortensis, folio & flore oblongo* MOR. S. V. T. III. GARIDEL. T. 13. *Viola mariana* DOD. *Coron.* p. 28. bene. VAIL. T. 20.

β. Varietas flore albo & γ. flore pleno.

H. *Campanula calycibus calcaratis, floribus maculosis*. *Campanula calycibus a tergo quinque lamellis notatis, caulis unifloris* GMEL. Calyx hirsutus, asper, plicis inter duo quaeque segmenta & calcaribus retroeuntibus donatus.

Flos unicus, grandis, albus, puniceis maculis notatus. In Sibiria.

Campanula floribus sessilibus, congestis, latioribus foliis insidentibus ENN. HELV. p. 492. *Rapunculus sylvestris, caeruleus, umbellatus* 2. THAL. IC. VIII. n. 2. *Campanula pratensis, flore conglomerato* C. B. *Vor Geismar, & jenseits Herperhansen.*

3. Floribus singularibus.

Campanula foliis lingulatis, asperis, spicis subrotundis, terminatricibus ENN. HELV. p. 492. n. 5. *Rapunculus sylvestris, caeruleus, umbellatus, major* THAL. IC. VIII. n. 1. Ultra Gibbeldehausen in sylva: in sylva versus Duderstatt: in sylva prope Elgerode, in M. Auerberg: ultra Rheinkaußen &c.

Campanula foliis undulatis, subhispidis, caule brachiato ENN. HELV. p. 494. *Rapum sylvestre* FUCHS, p. 214. *Campanula radice esculenta, flore caeruleo* I. R. H. Am Bozender Galgen.

β. Varietas flore albo.

Campanula foliis linearibus, serratis, floribus dissipatis, amplissimis ENN. HELV. p. 494. *Campanula angustifolia, caerulea* I. B. II. p. 803. *Campanula media* DOD. CORON. p. 37. In dumetis frequens.

β. Flore albo PASSAEI IC. aest. 14. VALLET, T. 68. *Campanula alba Persicifolia* AICHST. Aest. Ord I. T. 8.

γ. Flore pleno.

Campanula foliis radicalibus cordatis, serratis, caulinis linearibus, integris Enn. Helv. p. 495. *Campanula rotundifolia, minor, vulgaris* C. B. *Campanula sylvestris, minima* DOD. Pempt. p. 167. In pratis, & ad vias.

β. Flore albo prope Edigehausen.

Campanula fructu longissimo, flore rotato Enn. Helv. p. 496. *Pentagonion, Viola pentagonia* TAB. p. 316. *Campanula arvensis, erecta* I. R. H. Auf dem Heymberge in segetibus.

H. *Campanula* foliis perfoliatis, floribus inferioribus apetalis. *Campanula pentagonia, perfoliata* MOR. S. V. T. 2. Inferiores flores apetali, calycibus trifidis, quadrifidis, supremi petalodei, majores, quinquefidi, pentastemones, inferiores tamen etiam absque staminibus fertiles. In *Virginia*.

Rapunculus foliis imis cordatis, superioribus angustis, spica cylindrica, longissima Enn. Helv. p. 498. *Rapunculus spicatus, flore flavescente* I. R. H. *Rapunculus corniculatus, spica longiore* RIVIN. Monop. irreg. In omnibus sylvis.

Rapunculus foliis imis cordatis, superioribus oblongis, spica ovali Enn. Helv. p. 498. *Rapuntium montanum, rarius, corniculatum* COLUMN. p. 224. In pratis inter Blankenburg & Elbingerode. In Hassia prope Blizerot RITTER.

Jasione LINN. *Eurum. Helv.* p. 496. *Rapuntium alterum,*
leptophyllum, capitatum COLUMN. Ecphras. p. 227. Ad
vias versus Seeburg, & circa paribulum Bovendense, Gege-
Rheinhausen.

H. *Erinus COLUMN.* Phytob. p. 31. *Monspelii*, inque-
Italia. Calycis pars minor campanulata, segmenta quin-
que ovata, expansa, inaequalia: Flos connivens, pen-
cylindricus, segmenta quinque ovato lanceolata, pallide
caerulea, superiora duo modice ab inferioribus separata;
Stamina quinque, filamentis triangularibus, apice praecon-
go. Tuba apice clavata. r.

H. *Campanula Africana*, Erini facie, caulis procum-
bentibus Hort. Lugd. Bat. p. 109. ic. 52. *Rapuntium*
Aethiopicum, caeruleo, falcato flore, foliolis dentatis
BREYNE Cent. I. ic. 39. In Capite bonae spei. Calycis
tubus brevis, conicus, segmenta quinque acuta, subulata;
Flos pulchellus, caeruleus, tubo sensim gracilente. Ejus
duo segmenta ovato lanceolata, acuta, ad angulum cum
tubo floris acutum excurrent: tria vero inferiora majora
descendunt, ovata, spinula terminata, lateralia majora, me-
dium minus. In principio segmentorum macula alba
caeruleis guttis maculata. Tubus autem adeo longe fin-
ditur in duas partes, superiorem & inferiorem trifidam, ut
superne aperitus sit, & pro tribus petalis haberi queat.
Staminum cylindrus fit ex quinque filamentis, apice con-
fluentibus. Tuba fine recto plumoso. Ovarium intra ca-
lycem. H. Ra-

FLORE FRUCT. INN. SICCO MULTIL. 197

H. Rapuntium coccineum. *Cardinalis* BROSSE T. XV.
RIVIN. *Monop.*, *irregul.* T. 107.

H. Trachelium foliis ovatis, serratis, corymbis compo-
tis LINN. *Trachelium azureum, umbelliferum* I. R. H. PON-
bald. p. 44. *Valeriana Urticae folio, flore violaceo* CORNUT.
T. 23. r.

H. Samolus Africana, folio rotundiore WALTHER.
T. 23.


Pimpinella polystemon, pinnis ovatis, serratis, spica bre-
vi Enam. Helv. p. 470. *Sanguisorba minor* TAB. p. 110. In siccis.

H. Pimpinella sanguisorba minor, semine majori & crassio-
ri, *Monspelii*.

Pimpinella tetrastemon spica brevissima Enam. Helv. p.
469. P. sive sanguisorba major MATTH. p. 103.
Great Burnet PETIVER H. B. T. IV. In pra-
tis passim v. g. ad Lanum, ubi trajicitur prope Mar-
burgum. Inter Elbingerode & Blankenburg.

H. Pimpinella tetrastemon, spica ovata, foliis ovatis,
serratis. *Pimpinella Canadensis, major, spica breviora;* rhiz-
bra, foliis levibus MORIS. S. VIII. T. 18. *Pimpinella ininore*
di Candia ZANONI T. 138.

H. Pimpinella ramosa, spinosa, *Poterion spinis ramosif-*
LINN. *Poterium* LOB. II. p. 26,



I S O S T E M O N E S.
F L O R E U N I F O R M I F R U C T U I C I R-
C U M N A T O.

Aquifolium *Enum. Helv.* p. 467. *MATTH.* p. 161.
PASS. ic. 24. In *Cellensium arenosis*.

Cuscuta aphyllos *Enum. Helv.* p. 469. *Cuscuta GUET-*
TARD. Acad. Paris. 1744. *Cuscuta major* C.B. *Acatsjavallë*
H. MAL. T. VII. T. 44. *Ad sepes in der Kaspühle.*

β Cuscuta minor. *Cellae ad Ericas.*

H. Basella H. MAL. T. VII. T. 24.

H. Psyllium perenne, angustifolium & supinum I. R. H.
Psyllium CAM. Epit. 8 11. Monspelii, Minorcae.

H. Psyllium majus, erectum I. B. III. p. 513. *Veronae,*
Monspelii, in Provincia, Ferrariae.

H. Psyllium Indicum vel Dioscoridis, foliis crenatis
I. R. H. Psyllium laciniatis foliis BOCC. plant. rar. 8. Va-
rietas prioris. Monspelii.

Plantago foliis linearibus, pinnato dentatis LINN.
Plantago foliis laciniatis, Coronopus dicta RAY. Icon
PLUKNETI T. 103. f. 5. pro Plantagine maritima, brevi,
lato, dentato folio, piloso data maxime accedit. Seaplantain
PETIVER Herb. Brit. T. IV. Folia nostrae ferrata & non
serrata sunt. Ad lacum salsum prope Seeburg, bey Rülsdorf.

Plantago maritima, minima, gramineo folio, rigido I.R.H.
Folia pulposa, solida, ut marinae solent, linearia, integra.
An gefälzenen See bey Rülsdorf. Plan-

Plantago foliis lanceolatis, spica subovata. *Enum. Helv.* p. 471. *Plantago angustifolia*, major C. B. *Plantago angustifolia*, quinquenervia BLAKWELL. T. 14. Ubique ad vias.

H. *Plantago media*, incana, *Virginiiana*, ferratis foliis, annua MORIS. P. III. S. VIII. T. 15. f. 8 *Plantago foliis lanceolato acutis pubescens*, vix denticulatis, spicis laxis, pubescentibus GRONOV. *fior.* p. 16. Folia rarer dentata, cum scapis hirsuta. Florum spica cylindrica, qua nota a lanceolata satis simili differt. Folia caly ina oblonga, hirsuta. Petala quatuor argutissima, ut in reliquis speciebus.

Plantago foliis ovato lanceolatis, pubescentibus Cliff. *Enum. Helv.* p. 472. *Plantago latifolia*, incana C. B. *Plantago major* MATTH. p. 484. Ad vias.

H. *Plantago maxima*, foliis latissimis, dentatis, rigidioribus, spica brevi, densa. AMMAN. n. 23. In Sibiria. Folia ovata, brevia & amplissima.

Plantago foliis ovatis, glabris *Enum. Helv.* p. 472. *Plantago latifolia*, sinuata C. B. *Plantago rubra* BRUNFELS. I. p. 25.

H. *Plantago rosea*. *Rose plantain* PETIVER herb. brit. T. IV. Foliis inter flores longioribus ludit.

Gentiana floribus verticillatis, umbellatis, brevissime quadrifidis. *Ciliata* DOD. *Purg.* p. 71. Auf der Herperhusen Wiese non frequens, & im Göttingerwald.

Gentiana floribus quadrifidis, ciliatis. *Gentianella caerulea*, *simbriata*, *autumnalis*, *angustifolia* COLUMN. Ecphras.

p. 222. *Gentianella caerulea*, oris pilosis RAY. In sylvis
passim, im Göttinger Wald, unter Plesse &c,

Gentiana foliis amplexicaulibus, floris fauce barbata
Enum. Helv. p. 473. *Gentianella purpurea*, minima
COLUMN. p. 222 *Gentiana autumnalis*, ramosa C. B. In
sylvarum marginibus &c. g. aufm Helmberge. Reperitur
hic *Gottingae* semiquinquefido, campaniformi calyce; circa
Dorsten vero calyce bivalvi, ob duorum segmentorum
calycis molem multo majorem, quam stirpem DILLENI-
US peculiari iconē designaverat, quae cum reliquis in ejus
posthumis latet.

H. *Gentiana* caule unifloro, flore campanulato, caulis
longitudine *Enum. Helv.* p. 477. *Gentianella Helvetia*
LOBEL. p. 310. In montibus *Helvetiae*.

Gentiana foliis linearibus, floribus in aliis sessilibus
Enum. Helv. p. 477. *Gentiana autumnalis*, major I. R. H.
Kvavn RENEAULME p. 69. ic. p. 68. In ducatis Cellensis
locis aquosis passim.

Gentiana foliis ovatis, caule unifloro, flore ferrato.
Gentianella elegansissima *Bavarica* CAMER. hort. ic. XV. n.
I. In pratis uidis *Sueviae* legi, inter Stokach & Meskirch, &
in horto colui. Sub calyce duo folia ovata. Calycis an-
guli elevati in arcum extenuati. Floris segmenta subro-
tunda, ferrata, eleganter caerulea, conjuncta, auriculis bi-
fidis concoloribus. Stamina ex imo flore nata, apici-
bus filiformibus. Tuba gracilis, infundibulo piloso ter-
minata.

Gentia-

Gentiana foliis trinerviis, ovatis, floribus umbellatis,
tubo strictissimo Enn. Helv. p. 475. *Centaurium minus*
CAM. Epit. p. 428. PASS. p. 23.

β. Flore albo. *In Eulenloche.*

γ. *Centaurium minus*, palustre, ramosissimum,
flore purpureo VAILL. p. 32. T. 6. f. 1. *Aufm. Pa-*
radiese.

Gentiana caule brachiato, floribus flavis, quadrifidis,
Centauroides MOEHRING *hort.* p. 109. *Centaureum* palu-
stre, *luteum minimum* VAILL. T. 6. f. 3. Circa Engesen ver-
sus Cellam abunde. Calyx campaniformis, quadrifidus.
Flos flavus semiquadrifidus, segmentis ovatis, vix patenti-
bus. Fructus ovalis, unilocularis.

Lysimachia foliis ovato lanceolatis, floribus ad summos
ramos spicatis Enn. Helv. p. 480. *Lysimachia* BLAKWELL.
T. 278. *Lysimachia lutea, major, quae* *Dioscoridis* I. R. H.
Um Diemern & circa Landolfshausen. Foliis binis, ternis;
quaternis, quinis ludit.

H. *Lysimachia Canadensis*, lutea, folio Jalapae WAL-
THER. *hort.* T. 12.

H. *Lysimachia lutea, minor*, floribus nigris punctis no-
tatis v. ROYEN. p. 416. In *Brandenburgica ditione*. Flores
ex alis foliorum solitarii, vulgari speciei similes, extus ma-
culis fulvis punctati : calyx molliter hirsutus.

Lysimachia foliis ovato lanceolatis, floribus solitariis,
caule procumbente Enn. Helv. p. 481. *Anagallis lutea*

flore CLUS. Pann. p. 493. Super. Hardeggen & Münden.

Lysimachia foliis subrotundis, solitariis, caule procumbente Enum. Helv. p. 481. Cliff. Nummularia CAMER. Epit. p. 755. In uidis sylvisque.

Anagallis flore phoeniceo Enum. Helv. p. 481. I. R. H. Anagallis mas CAMER. Epit. p. 394.

Anagallis flore caeruleo Enum. Helv. p. 482. I. R. H. Anagallis femina CAMER. Epit. p. 395. Häufig über der Papiermühle & alibi.

*Eadem, aut certe obscure diversa, *Anagallis caerulea* Monelli CLUS.*

Primula foliis rugosis, hirsutis, scapo unifloro Enum. Helv. p. 482. Primula veris, floribus ex singularibus pediculis C. B. Βραχυστεγονος RENEAULME p. 116. PASS. T. 27.

*β. Calyce florali, *Primula veris* Anglica, flore gemino PASS. Vern. T. VII.*

*Primula foliis rugosis, hirsutis, spica inclinata, flore pallido, inodoro Enum. Helv. p. 483. *Primula veris*, pallido flore, elatior I. R. H. *Primula veris*, altera CAMER. Epit. p. 884. In sylvis.*

Primula foliis rugosis, hirsutis, spica inclinata, flore flavo, odoro Enum. Helv. p. 483. Paralysis PASS. P. alt. ic. 73. Ανωσημαν RENEAULME p. 113. In pratibus. Vere divisa est a priori WILLICH obs. bot. p. 10. H.

H Primula foliis serratis, carnosis, glabris Enum. Helv. p. 484. Cliff. *Auricula ursi* flore luteo I. R. H. Αλισμα COLUMN. *Phytobas.* p. 17.

Varietates flore purpureo & aliorum colorum pinxit PASSAEUS T. 8. Vern. & in hesperidibus VOLCamerus c. I. n. 65. & VALLET. T. 85. Patria in Alpibus est.

Alsinanthemum OELHAFEN Elench. p. 10. ic. AMMAN. Comm. Petr. T. X. T. 13. Abunde in sylvis super Hardegen. In sylva die Sprake & alibi in ducatu Celensi. Sub pago Waaken in rupi ad dextra viae regiae. In sylva hercynia ubique.

H. Androsace vulgaris, latifolia; annua I. R. H: Androsace altera CAMER. Epit. p. 639. MATTH. CLUS CXXXIV. Circa Moguntiam.

H. Androsace Coronopi folio, glabra, flosculis ex verticilli foliosi umbilico plurimis albis AMMAN. Ruthen. n. 22. Androsace montana, minor BUXBAUM II. T. 23. f. 2. Corolla ex quinque glandulis virentibus in fauce floris. In Sibiria.

Glaux maritima LOB. ic. p. 415. Maxima copia prope Harste aufm Pfingstanger.

Hottonia BOERH. Myriophyllum alterum CAMER. Epit. P. 879. In uidis Cellensisibus.

Meno.

Menoanthes foliis ternatis Enam. Heiv. pl. 487. *Acova*
Dioscoridis H. OX. III. S. XV. T. 2. In pratis circa
Diemern. Abunde circa *Seeburg* & *Laudolfshausen*, & inter
Harste & *Barenzen*. Ad Idam Cretae.

H. *Plumbago Ceylanica*, folio splendente, *Ocymastrum*
flore luteo BOERHAAVE *Hort. Lugd. Bat.* *Lycnis Indica*, *spicato fructu*, *majori*, *flavescente* H. AMST. I. f. 54.
Tumboco-diveli H. MAL. L. X. T. 8. *Accar Biuessa* RUMPF.
In Amboina.

H. *Quamoclit Americanum*, foliis *Hederae*, flore coccineo COMMEL. ic. 21. *Convolvulus flore coccineo*, *calyce anguloso* PLUM. fonger. 103.

H. *Quamoclit CAM.* *hort. f. 40.* *Gelsemium Indianum*
pennato FON. Bald. p. 71. *Convolvulus Indicus pennatus*
MUNTING. ic. f. 239. *Tsjuria Cranti* H. MAL. XI. T.
60. r.

H. *Convolvulus calycibus tuberculatis*, *pilosus* LINN.
Convolvulus Indicus, *flore violaceo* ALCHST. Aest. Ord:
 XIII. T. 8. f. 2. *Haylala Riru* RUMPF. L. IX. 57.
 In Amboina pro sapone in usu est. Tubae finis obtuse
 trifidus, non, ut in aliis *Convolvulis*, bifidus.

β. ♂. Flore roseo, albo.

H. *Convolvulus caeruleus*, *hederaceo*, *anguloso* folio
Hort. Elth. T. 69. *Campana caerulea* DOD. *Purg.* p. 223.

In

In BROSSAEI tabulis pingitur. Tuba simplex, sine crasso fungoso finita, non bifida. Conjugit adeo & haec & prior Quamolit cum Convolvulo. In *Virginia*.

Convolvulus foliis sagittatis, angulosis, petiolis unifloris Enn. *Helv.* p. 488. *Convolvulus major*, *albus* C. B. *Smilax levis*, *major*. DOD. *Purg.* p. 210. In sepibus ubiqui.

Convolvulus foliis sagittatis, petiolis unifloris, biflorisque Enn. *Helv.* p. 489. *Volubilis minor* PASS. ic. 77. In agris & hortis.

H. *Convolvulus* foliis ovato lanceolatis, duobus foliis aori substratis *Convolvulus siculus minor*, flore parvo, aunculato BOCC. sic. 82. *Convolvulus siculus*, flore caeruleo, minimo MUNTING ic. 138.

H. *Convolvulus* foliis sagittatis, postice truncatis, pendulis ramosis, bifloris ROY. *Scammonium* DOD. *Purg.* p. 206. *Convolvulus Syriacus* vel *Scammonea Syriaca* MCR. II. S. I. T. 3. f. 5. Calyx quinque foliis imbricatis fit, aristatis; flos exiguis, pallide roseus, stella notatus, de more; tuba bifida; staminum filamenta basi lata. r.

H. *Convolvulus minor*, pentaphyllos MUNTING. ic. 137. r.

H. *Convolvulus* foliis lanceolato ovatis, glabris, caule declinato, floribus solitariis LINN. *Campanula exotica* ALD. 88. *Convolvulus Hispanicus* MUNT. f. 136.

β. Flore albo,

H.

H. *Convolvulus minimus*, *Spicæ folio*, vel *Stoechadis citrinae*, aut *Linariae* LOB. ic. p. 622. *Convolvulus Spicæ folio, radice repente, argenteus* I. R. H. *Monspelii, Veronae.*

Stramonium fructu erecto, calyce pentagono Enum.
Helv. p. 489. Solanum manicum Dioscoridis COLUMN.
Phytobas. p. 47, Solanum foetidum, pomo spinoso, oblongo
C. B. Hummatu H. MAL. T. II. f. 28.

H. β. Flore & caule violaceo. *Stramonium majus, purpureum* PARK. Varietas prioris, ex cuius semine exemptum de feminæ ventriculos quam occiderat, non adeo dudum mihi missum est.

H. *Stramonium calyce pentagono, fructu pendulo, spinis rigidis aculeato*; *Stramonium ferox* BOCC. sic. p. 5. *Datura di coccino spinosissimo* ZANONI T. 162. Calyx pentagonus. Flos luteolus, segmentis in mucrones eductis: fructus sphaericus, pendulus, aculeis longis, validis armatus.

H. *Stramonium fructu pendulo, calyce campaniformi.*
Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici I. R. H. *Nux metella* CAMER. Epit. p. 173.

H. *Stramonium fructu papillato*. *Stramonium folio Hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo iunoxiis spinis armato* BOERH. sed nostro flos extus violaceus est. Calyx teres, ut in praecedente. Flos albus, extus violaceus, praegrandis, polygonius, decem etiam aculeis terminatus. [Stamina quinque ad octo. Fru-
 ctus

Exus delapso calyce rotundus, papillis teretibus obsitus, absque aculeis.

H. *Stramonium Aegyptiacum*, flore pleno, intus albo, extus violaceo I. R. H. *Datura overo stramo-neo d'Egitto confior pieno* PON. Bald. p. 61. *Datura contarena* P. ALF. exot. 167. *Datura Aegyptiaca* VESLING. p. 53. r.

H. *Polemonium LINN.* *Enum. Helv.* p. 490. *Vale-riana Graeca* DOD. p. 352. flore caeruleo. In *Helvetia*, *Laponia*, *Hægia*, quae ad *Riedeselios* pertinet, prope *Rokenrein*, In *Hibernia*, *Borussia* WIGAND.

β. Flore albo.

H. *Maurocena LINN.* *Frangula semper virens*, folio rigido, subrotundo H. Elth. T. 121. In capite bonæ spei.

H. *Coffea BLAKWELL.* T. 337. TREW *Comm. Nor.* 1745. hebd. 52. IUSSIEU *Mem.* 1713. p. 388. Sponte in *Insula Bourbon*.

H. *Lycium foliis cuneiformibus Cliff.* *Rhamnus* I. CLUS, hisp. p. 67. *Monspelii*, & in *Italia*, *Palaestina*.

H. *Jasminoides aculeatum*, *humile*, *Halimi minoris* folio, flore majori, violaceo, fructu crassiore, per maturitatem flavescente MICHELI T. 105. f. 2. In *Italia*. Utramque in rarioribus suis depictam dedit, & discriminem expressit TREWIUS.

C U-

CUCURBITACEAE.

Bryonia foliis quinquangulis, scabris *Enum. Helv.* p. *Bryonia baccis nigris CORD. Northemii*, inde in hortum adlata.

H. *Bryonia Africana*, laciñiata, tuberosa radice, floribus herbaceis *Hort. Lugd. Bat.* T. 108.

H. *Bryonia Ceylanica*, fructu rubro, majori, striis albis variegato. Picta est in H. MAL. T. VIII. Tab. 19. r.

H. *Bryonia floribus androgynis*. *Melothria LINN.* *Cucumis minima*, fructu ovato, minimo SLOANE *Jamaic.* I. p. 227. T. 142. f. 1. bene. Omnibus floribus subjicitur bacca ovalis, trispermos, ut *Bryonae*. Calyx minimus, florali tubo adhaerens. Flos campaniformis, segmentis quinque ellipticis, transversim latioribus. Stamina in tubo florali pene sessilia, duo duplia, unum simplex. Tuba apice pyramidali, triquetra. Sexus solus genus non facit. In *Virginia*. r.

H. *Sicyoides Tourn.* *Cucumis Canadensis*, monospermos, fructu echinato HERM. *Parad.* p. 132. Fruetus monospermos, compressus, ovato conicus r.

H. *Melo minimus*, pomo non major, sphaericus. Ex *Persia*. Flores mares & androgyni.

H. *Melonis vulgaris edulis varietates*.

H. Cucurbita falcata figura, folio molli, flore albo
I. R. H,

H. Cucumis foliorum angulis rectis Cliff. *Cucumis sativus* BLAKWELL. T. 4. *Mullen Bellerr H. MAL.* T. VIII. T. 6. aut hic, aut proxima planta est.

H. Luffa. *Piurina* H. MAL. T. VIII. T. 7. *Luffa Aratum* VESLING. p. 52. t,

H. Luffa pomis oblongis, angulatis, angulis acutis.
Ex Persia. Durior paulum priori & minus sericea r.

H. Colocynthis LOB. ic. p. 644. *Caipa Schua* H. MAL. T. VIII. T. 9. In Palaestina, Barbados, America, Malabar, Arabia MONCONIS.

H. Momordica vulgaris I. R. H. *Balsamine major, fructu puniceo* AICHST. Aut. Ord. I. T. 4. Flos mas campaniformis, venosus, profunde quinquesfidus, vel omnino distincta quinque minora petala. Stamina de more tria, quorum duo duplices antheras ferunt. Inter stamina fo- vea balsamo plena. Flori feminae tria stamina abortiva, & tuba tripartita, duabus de more partibus duplicibus. Ovarium coronatum aculeis aliquot serierum.

H. Momordica Ceylanica VOLCAM. besp. p. 244. *Balsamine cucumerina, Indica, fructu majore, flavescente* H.

AMST. T. I. f. 54. *Herba amara* RUMPF. L. IX. c.
46. *Pandipavet* H. MAI. T. VIII. T. 9. *Fruſtus* in
quatuor partes diſſilit, & ſemina continent ad duodecim. r.

H. Elaterium. *Cucumis sylvestris* DOD. *Purg.* p. 179.

H. Passiflora foliis palmatis, quinquepartitis, integer-
timis, involucris cordatis, triphyllis LINN. *Clematitidis*
Indica, *polyphylla*, *major*, flore clavato, fructu *Colocynthi-*
dis PLUMIER pl. de l'Amer. T. 79. Ordo primus pa-
tulus albo caeruleorum solidorum cylindrorum, non ne-
teriorum. Alter brevis ordo albo fuscus, eretus; ter-
tius albo purpureus ad tubam convergens. Petala albida,
subviridia. Calyx exterior trifoliis. ovalis.

β. Varictas. *Clematitidis passiflora pentaphyllos*, *an-*
gustifolia MUNTING. T. 165. Flos minor, albus cum
pallido virore, & radii dilutiſſime caerulei.

H. Passiflora foliis crenatis, tripartito divisis PLUKN.
Granadilla flos passionis HERNANDEZ. *Clematitidis passiflora*
trifolia, *purpurea* MUNTING. T. 166. In *Virginia*. Pe-
tala alba, calyx vitidis, intus albus. Radii exterioreſ al-
bi, fine purpureo; interiores breviores, intimus circulus
albus membranaceus, petiolum ambiens.

H. Passiflora (*Granadilla*) folio tricuspidate flore parvo,
ſlavescente I. R. H. *Clematis passiflora*, *flore luteo* MUN-
TING T. 161. Calyx ad basin quinquefidus, continuus,
virescens. Petala quinque albicantia, lanceolata, calyce
brevi-

breviora. Filamenta prima patula, alba ex viridi, reliqua erecta, magis alba. Odor floris gratus.

H. Passiflora florum involucris triphyllis, multifidis, capillaribus LINN. *Clematitidis Indica*, *hirsuta*, *foetida* PLUMIER plant. de l'Amer. T. 86. *Flos passionis albus* HERMANN. *Parad. Bat.* p. 173. Folia sub flore pinnata, pinnis pinnatis, pinnulis rectis, acutis. Flos semi-patulus, calycis foliis aculeo terminatis, albis, tribus lineis virentibus percursis. Petala alba absque unco, linea viridi percursa. Filamenta duorum ordinum alba, patula, paucō violaceo, intus picta.

H. Passiflora. Habitus & teneritas prioris, sed folia inferiora ternata, superiora simplicia, omnia ovato lanceolata. Nondum floruit.

SOLANACEAE.

H. Jalapa minor, purpurea. MUNT. ic. 67. &c. *Jasminum Indicum*, sive *Flos mirabilis Peruvianus* AICHST. Aut. Ord. II. T. 4. *Andi Malleri* H. MAL. T. X. T. 75. In BROSSAEI tabulis n. X.

H. Phytolacca fructu petiolato decemfido. *Blitum Americanum* MUNTING. ic. 112. conf. H. Elth. p. 310. *Amaranthus baccifer*, *Circeae foliis* H. AMST. I. f. 66.

Sponte nunc in *Italia* ad *Arnum* fluy. & circa *Mediolanum* provenit, *Virginiae* indigena.

H. *Phytolacca Mexicana*, baccis sessilibus H. Elth. *Sjoriku S. Janma Gobo* KAEMPFER p. 828. Diversa flore viridi, fructu paucioribus, octo fere striis diviso, patulo brevissimo. Diplostemon & pentapetala, ob adfinitatem habitus cum *Solanis* relinquuntur.

Belladonna Enn. Helv. p. 509. *Solanum lethale* DOD. Purg. p. 360. In M. *Hengst. sylva Göttinger Wald* &c.

Solanum foliis aliis trifidis, aliis simplicibus Enn. Helv. p. 507. *Dulcamara* DOD. Purg. p. 239. *Solanum scandens*, sive *Dulcamara* C. B.

α. *Solanum lignosum* variegatum MUNTING. f. 156.

β. Flore albo prope *Walkenried* ad stagnum.

Solanum foliis angulosis, undulatis, caule levi Enn. Helv. p. 507. *Solanum hortense* DOD. Purg. p. 352. *Solanum officinale*, acinis nigricantibus C. B. *Aguara Luipa* MARCGRAF p. 55. Ubique in hortis & ad vias.

H. *Solanum Guineense*, fructu magno, instar *Cerasi*, nigerrimo, umbellato H. Elth. T. 274. *Icon BROSSEI* T. 13. Flos a quinque ad octo usque segmenta habet, extus violaceus. Parum utique differt a vulgari.

H. *Solanum annuum*, hirsutius, baccis luteis Elth. T. 274. f. 358. Multo tenerius, & hirsutius priori. Circa *Argentinam*

β. Bac-

$\beta.$ Baccis puniceis. *Nelensjunda* H. MAL. T. X:
T. 73. r.

H. *Solanum frutescens*, villosum, foliis undulatis, molibus, subtus incanis, spinis flavescensibus ornatum
BURMAN Ceylan. T. 102. *Solanum Indicum*; *frutescens*,
foliis sinuatis, incanis & tomentosis, solo caule spinoso, baccis
rubris, minoribus H. Carolsrb. n. 487. Videtur. An
Cherua hunda H. MAL. T. II. f. 36. Non recedit, nec
Chunda f. 37. In BROSSAEI tabulis pingitur n. 12. An
Solatru pomifero spinoso ZANONI T. 157. Videtur.

H. *Solanum spinosissimum*, arborescens; Aethiopicum
MUNTING. f. 212. *Solanum spinosum*, *frutescens*, *A-*
friticum, *nigricans*, *folio profunde laciniato* H. L. B.
p. 575:

H. *Solanum caule inermi*, *fruticoso*, *foliis ovato lanceolatis*; *integerrimis*, *floribus solitariis* Cliff. *Solanum*
fruticosum, *bacciferum*. *Amomum Plinii* I. R. H. *Pseu-*
ilocapsicum DOD. *Purg.* p. 462.

H. *Solanum lignosum*, *Africanum*, *semperfurens*, *Lau-*
tinis *foliis* H. AMST: II. f. 96. p. 191. r.

H. *Solanum* *foliis ovato lanceolatis*, *fructu calloso*;
striato. *Lycopersicon* *fructu striato*, *duro*, *cum quo nominem*
acepsi. *Habitus Capsici & Solani*, *foliis ovato lanceola-*
tis; *non pinnatis*. *Flos rotarius*; *semiquinquefidus*, *seg-*
mentis acutis, *albis*: *Apices in longum cornu educti*; *cir-*
ca tubam conjuncti. *Tuba simplex*, *cylindrica*. *Fructus*
rotundius, *inaequaliter striatus*, *callosus*, *magnus*:

H. Solanum caule inermi, herbaeo, foliis pinnatis, incisis *Cliff Poma amoris*, fructu luteo AICHST. Aut. Ord. I. T. I. f. 1. *Aurea mala*. DOD. Purg. p. 965.

H. Lycopersicon fructu rubro, non striato I. R. H. *Poma amoris, fructu rubro, non striato* AICHST. Aut. Ord. I. f. 2.

H. Solanum caule inermi, herbaceo, foliis pinnatis, integerrimis *Cliff. Papas Peruviorum* AICHST. Aut. Ord. III. T. I. f. 1.

H. Solanum foliis ovatis, integerrimis, calycibus aculeatis LINN. *Mala insana* DOD. Purg. p. 367. *Melongena fructu oblongo, luteo*.

B. Fructu rubro, longissimo &c Icon H. MAL. X. T. 74. huc pertinet, & *Melanurga VOLCAM. hesperid.* p. 244. Reperi flore frequenter octofido cum octo staminibus.

Alkekengi foliis cordatis, calyce rubente Enn. Helv. p. 508. *Solanum vesicarium* DOD. Purg. p. 355. C. B. Ubi ad montem super Edigehausen per semitam umbrosam adscenditur.

H. Alkekengi Indicum CAMER. *Halicacabum sive Solanum Indicum* CAMER. hort. ic. 17. *Alkekengi Indicum, glabrum, Chenopodii folio* ELTH. 13. T. 12. Exstat in H. MAL. X. T. 70. *Halicacabus* BONT. L. VI. c. 13. Nostrum a sequente non differt, et si elatius videatur, & minori folio, minusque brachiato caule.

H. Alke-

H. Alkekengi Virginianum, fructu luteo. *Capuli* FEUILL. T. III. T. I. *Solanum vesicarium*, annuum, procumbens, folio launginofo MORIS. S. XIII. T. 8. f. 24. *Solanum annum*, *vesicarium*, *procumbens* BARR. 152. Non procumbit, sed caule est patulo. Parum omnino diversum a priori.

H. Alkekengi Indicum, glabrum, Capsici folio Elb. 12. T. II. An *Solanum vesicarium minus*, *bacca lutea* BARR. 1129. Videtur. Huic maculae in ortu segmentorum floris flavae.

H. Alkekengi fruticosum, floribus verticillatis. *Solanum verticillatum* I. B. III. 610. Peevetti H. MAL. T. IV. T. 55. In *Syria* POCOCK.

H. Capsicum siliquis longis, propendentibus, purpureis. *Piper Indicum* CAM. Epit. p. 347. Varietates sunt fructu longiore & breviore.

H. Capsicum fructu flavo, pyramidali; oblongo. I.R.H.

H. Capsicum siliqua latiore & rotundiore I. R. H. an fructu orbiculari CAM. Epit. p. 348. an *Piper Indicum*, aureum, latum AICHST. Aut. Ord. IX. T. 2. r.

H. Capsicum fructu parvo, rotundo, acerrimo. an *Piper Indicum*, maximum, rotundum, erectum AICHST. Aut. Ord. I. T. XI. *Capsicum siliquis surrectis, rotundis* I. R. H.

H. Capsicum Americanum, fructu luteo, minimo, Hujusmodi est *Capo molago* H. MAL. II. f. 56. r.

H. Capsicum Americanum, perenne, erectum, minus
LIND. fructu parvo, conico. An Piper Indicum, minimum
erectum AICHST. Aut. Ord. I. T. 8. Capsicum siliquis sur-
rectis, oblongis I. R. H.

H. Capsicum fructu cordiformi, eretto. Icon est in
CAMER. Epit. p. 348. an Piper Indicum, cordatum AICHST.
Aut. Ord. I. T. 13.

H. Capsicum Canariense - - . Cum hoc nomine mis-
sum videtur diversum, tenerius, flore quam reliquae
species minori, rotato. Capsicorum caeterum varietates
vide apud CLUSIUM in app. & apud de BRY. II.
T. 146.

Verbascum foliis ovato lanceolatis, utrinque to-
mentosis, floribus densissime spicatis, sessilibus Emin.
Helv. p. 509. Verbascum PASS. ie. 34. Verbascum mas, la-
tifolium, luteum C. E. Ubique ad vias. Stigma simplex.

β. Flore majori, stigmate bicolli WILlich. p. 10
Verbascum mas, latifolium, luteum C. B. Verbascum I
CAM. Epit. p. 878. Cellae in arenosis.

Verbascum foliis serratis, superne rugosis, petiolis ra-
mosis Emin. Helv. p. 510. Verbascum album II. TAB. p
864. Verbascum flore albo, parvo C. E. Non valde fre-
quens.

Verbascum foliis viridibus, annuum, floribus luteis
Hort. Lugd. Bat. Folia subhirsuta, virentia: calyx to-
mentosus: caulis non alatus: flos luteus, sessilis. Seg-
menta

menta duo superiora parva, inde duo mediocria, inum maximum. Stamen supremum minimum, reliqua successiva majora, sursum recurva, filamentis pallidis, barbata. Tuba sursum flexa. r.

Verbascum foliis serratis, superne rugosis, inferne subhirsutis, petiolis ramosis, staminum barba purpurascente Enam. Helv. p. 511. *Verbascum nigrum* TRAG. p. 217. *Verbascum nigrum*, flore ex luteo purpurascente C. B. Ultra Wehude ad viam versus Papiermühle.

Verbascum foliis glabris, serrato dentatis, radicalibus sinuatis ROY. Enam. Helv. p. 511. *Blattaria lutea* CAMER. Epit. p. 881. *Blattaria lutea*, folio oblongo, lucinato C. B. Ad Rhenum passim, ut circa Drusenheim Alsatiae, etiam in Helvetia calidiori & Belgio, Anglia, Cornwallia.

H. *Verbascum* foliis glabris, indivisis ROY. *Blattaria* flore albo. In Ungaria.

B. *Blattaria* flore violaceo. *Blattaria perennis*, *purpurea* MORIS. S. V. T. 10. In Hungaria POCOCK. In Hetruria TARGIONI, in M. Klozberg ROYER. & Seeberg ID, si fides haberi potest.

H. *Verbascum tetraitemon*. *Celsia* LINN. *Blattaria* di Dalmatia annua ZANONI T. 34. Ob solum staminum numerum separare vetat natura, exemplo *Alsinis*, *Geranii*. &c.

Hyoscyamus foliis amplexicaulibus Cliff. Enam. Helv. p. 512. *Hyoscyamus vulgaris vel niger* C. B. *Hyoscyamus flavus* FUCHS. p. 833. Ad vias. H. *Hyos-*

ISOSTEMONES

H. *Hyoscyamus albus* I. B. CAMER. Epit. p. 808.
AICHST. Aest. Ord. VIII. T. 8. f. 2. *Monspelii*, & in
Hetruria.

H. *Hyoscyamus* foliis crispis, cordatis, circumferratis,
floribus petiolatis. *Hyoscyamus Creticus*, *luteus*, *minor*
I. R. H. *Hyoscyamus aureus* P. ALPIN. exot. p. 98.
Hyoscyamus flore luteo RIV. T. 102. In *Creta*.
Arabia, *Monspelii*. Tubus calycis longus, villosus, quinque
dentibus triangularibus incisus; tubus floris perinde
longus, croceus, segmenta quinque inaequalia. In con-
vexitate tubi floris tria segmenta flava, in origine sua sa-
tnrate purpurea, duo inferiora pallentia, subovata, lace-
ra. Folia valde crispa, inodora.

H. *Hyoscyamus annuus*, calycibus spinosis. Ex *Persia*
GMELIN. Calycis campaniformis segmenta quinque inae-
qualiter disposita, argute aristata. Flos profunde divisus,
flavus, unguibus purpureis. r.

H. *Nicotiana* foliis lanceolatis Cliff. *Nicotiana major*,
latifolia C. B. *Hyoscyamus Peruvianus* CAMER. Epit. p.
810. DOD. Purg. p. 349. In BROSSAEI tabb. pingitur
VIII. In *Virginia*.

H. *Nicotiana* foliis ovatis Cliff. *Nicotiana minor*
AICHST. Aut. Ord. IX. T. 3. C. B. *Hyoscyamus luteus*
DOD. Purg. p. 346.

H. *Nicotiana Virginiana*, angustifolia.

H. *Nicotiana perennis sinica*? an satis diversae? Non-
dum mihi videtur. H. Ni-

H. Nicotiana minor, folio cordiformi (*obtuso*) tubo floris praelongo FEUILLEE T. I. Tab. X. Calyx tubulosus, segmentis quinque acutis. Flos praelongus & valde gracilis, viridis, pene cylindricus, additamento florali pentagonio ornatus, quinque locis plicato, fere ut *Quamoclit*. Tuba crassa, obiter divisa. Habitus humilis & planta multum a reliquis speciebus diversa.

H. Nicotiana foliis rotundis, majoribus, rugosis. Non dum floruit.

A S P E R I F O L I A E.

Echium foliis lingulatis, hispidis, ex singulis alis florens Enn. Helv. p. 513. *Echium* MATTH. p. 995. RIV. mon irreg. T. 7. Varietates,

β. Flore rubro in *Valllo urbis*.

γ. Flore albo circa *Rauschenwasser* reperi.

H. Echium foliis ovatis, caule brachiato, *Echium latifolizm, rubrum, Creticum* I. B. *Echium Creticum* I. CLUS. hyst. CLXIV. Monspelii. Calyx difformis, segmento supremo minimo. Flos quasi bilabiatus, oblique retrorsum truncatus, superne longus, inferne brevis. Segmenta duo superiora parva, lateralia duo longiora, imum ovato acuminatum. Stamina inaequalia. Tuba fine bicorni. Semen incurvum, acuminatum, hinc convexum, inde acute planis inclinatis coenus, basi quadrangulari.

H. Ce-

H. Cerinthe foliis caulem amplexantibus, dentibus floris revolutis, brevissimis *Enum. Helv.* p. 515. *Cerinthe quorumdam CLUS. hisp.* p. 410.

a Cerinthe quorumdam major, flore ex rubro purpurascente I. B. III. p. 603. In *Alpibus Helveticis; Hispania, Lusitania.*

b. Cerinthe quorumdam major, spinoso folio flore flavo I. B. III. p. 602. *Cerinthe MARTIN Georg.* p. 408. *ic.* In *Italia:*

y. Cerinthe quorumdam minor, flore flavo I. B. III. p. 603. *Veronae. In Hungaria POCOCK.*

Cerinthe floribus semiquinquefidis. *Glaesium montanum* *Lugd.* p. 1204. Abunde circa Jenam ad radicem M. Künitzberg. *Ulmæ LEOPOLD.* Segmenta angusta, triangularia; non revoluta, ad tertiam partem florem dividunt, qui totus ochroleucus est.

Symphytum foliis ovato lanceolatis, caule alato *Enum. Helv.* p. 514. *Symphytum sive Consolida major, flore albo vel pallido* I. R. H. *Wällwurz weiblein ERUNFELS* I. p. 76. In omnibus pratis.

b. Flore purpureo. *Wällwurz männlein BRUNFELS* p. 75. In *Helvetia* frequens, in *Halberstadiensi Episcopatu ROYER.*

Pulmonaria foliis radicalibus ovato cordatis *Enum. Helv.* p. 516. *Pulmonaria altera CAMER. Epit.* p. 784. In sylvis passum. Litho-

Lithospermum seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus LINN. *Enum. Helv.* p. 518. *Euglossum arvense, annuum, Lithospermii folio* I. R. H. *Anchusa arvensis, minor, facie Milii solis TAB.* p. 849. Ubique in agris.

H. *Lithospermum* foliis nervosis, rigidis, floribus in aliis sessilibus *Enum. Helv.* p. 518. In *Helvetia* ubique fere sponte, abunde circa *Gäbrisäerf, Mathod, &c.*

Lithospermum caulis sterilibus procumbentibus radicatis, floriferis erectis *Enum. Helv.* p. 417. *Lithospermum minus, repens, latifolium* I. R. H. *Lithospermum majus* DOD. *hist.* p. 83. *Blue Gromill PETIVER.* T. 29. Cospicissime im Walde, jenseit Grossen Schneen, &c in M. *Hengst* supra viam regiam. Calycis segmenta ad basin divisa, gracillima. Flos longe eminens, tubo cylindrico, segmentis quinque ovato lanceolatis. Plicae coronam faciunt, concolores, extrorsum recedentes, infra quas altera corona est, ex tumoribus lateralibus se contingentibus facta. Tuba simplicissima. Semina similia.

Scorpiurus annuus, flore parvo *Enum. Helv.* p. 519. *Lithospermum arvense, minus* TOURN. *Auricula muris, caerulea* TABERN. p. 197. Specimina minora fere tota lutea sunt. In agris, pratisque &c.

Scorpiurus perennis, floribus majoribus *Enum. Helv.* p. 520 *Lithospermum palustre minus* TOURN. *Anagallis aquatica* PASS. P. alt. ic. 49. *Scorpiurus palustris, perennis, minor*

Gr. huc.

& humilior ZANONI T. 152. Flore rubro & albo ludit.

β. Varietas in siccis, asperior. *Myosotis scorpioides*, *birjuta* DILL. apud RAI. Syn. III. p. 229. T. 9. f. 2.

H. *Heliotropium* foliis ovatis, integerrimis, spicis conjunctis Enum. *Helv.* p. 520. *Heliotropium majus* CLUS. p. XLVI. In *Helvetia*: in *Syria* RAUWOLF.

β. Flore majori odorato. *Heliotropium siculum*, *majus*, *fiore ampio*, *odorato* BOCCONE Sic. p. 91. Circa Mathod abunde.

H. *Heliotropium* foliis ovatis, acutis, spicis solitariis LINN. *Heliotropium Americanum*, *caeruleum*, *folio Homini* PLUKN. *Almag* T. 255. f. 4. *Heliotropium Americanum* *folio Hormini* MARCHANT p. 275. *Faura Acanga* PISONIS p. 229. Semina duo biloculari, ut in *Cerinthe*.

H. *Heliotropium* foliis lanceolatis, linearibus, glabris spicis conjunctis LINN. *Heliotropium maritimum*, *minus*, *folio glauco*, *flore albo* SLOANE Hist. I. p. 213. T. 152. f. 3.

Cynoglossum glanduliflorum glabris, seminibus nudis, hispidis Enum. *Helv.* p. 521. *Cynoglossa montana*, *minor*, *altera*, *serotina* COLUMN. Ecphras p. 180. *Guettardia MANETTI* Virid. flor. p. 36. *Buglossum angustifolium*, *semine echinato* I. R. H. Circa Pless ad viam. Auf der Gartenmauer

maner an Azenbeims Garten &c. Flos exiguus, calyce comprehensus, pallide caeruleus,

Cynoglossum foliis mollibus, hirsutis, glandulis villosis, capsulis echinatis *Enum.* *Helv.* p. 521. Cynoglossa BLAKWELL. T. 249. Ad vias frequens.

β. Flore albo.

H. Cynoglossum foliis sericeis, palis hirsutis, cylindricis Cynoglossum Creticum, argenteo, angusto folio GARID. ic. 27. MOR. S. XI. T. 30. Cynoglossum Creticum CLUS. p. CLXII. Monspelii. Pali in tota classe longissimi.

Cynoglossum foliis asperis, capsulis echinatis *Enum.* *Helv.* p. 522. Cynoglossum montanum, flore minore, folio virenti I. R. H. In M. Herzberg super Illefeldam ad rupes. Pali longiores, quam vulgari, & emarginati.

H. Omphalodes verna, Symphyti folio *Symphytum pubescens*, repens, Borraginis facie LOB. ic. p. 577.

H. Omphalodes Lusitanica, Lini folio. Cynoglossum minus, glaucum, flore albo, semine umbilicato MORIS. S.XI. T. 30.

Asperugo RUPP. *Enum.* *Helv.* p. 522. *Borago minor*, *sylvestris* καρπογνωτος COLUMN. p. 181. *Buglossum sylvestre*, *caulibus procumbentibus* C. B. In vallo urbis aufm. Wehnder Thor.

Lycopsis foliis lingulatis, sinuatis, asperis, caeruleo flore
Enum. Helv. p. 523. *Echioides* RIV. T. 7. *Buglossum syl-*
vestre, minus C. B. *Auf Aekern zwischen Bovenden und*
Edigebäusen.

H. *Lycopsis* foliis hispidis, verrucosis, flore variegato.
Buglossoides Cretica RIV. T. 9. *Buglossoides verrucosa, mi-*
nor MUNTING. f. 116. *Borragine minrale con fior pâcra-*
to ZANONI T. 37.

Lycopsis flore pullo, calycibus amplis. *Echioides* flore
pullo RIV. in icon. T. 8. *Echium* I. CLUS. p. 679. *Bu-*
glossum alterum, flore nigro MATTHIOL. p. 1188. *Borra-*
gine sylvestre annua di Candia ZANONI T. 38. *Circa Vien-*
nam, Copiose in Thuringia versus Sulze, circa Eisleben,
inde in via versus Querfurt, Bebra, Laucha, Wiebe indeque
versus Artern, Jenae circa Borstendorf &c. In Pannonia.
Calyx paulum difformis, duobus dentibus latioribus.
Floris tubus rectus, altero latere ventricosus, limbo ta-
men perpendiculari, segmento uno solitario minori, duo-
bus imis majoribus. Ornamenta quinque pilosa in fauce.
Tuba calyce brevior, fine leviter bifido.

Buglossum floribus longe spicatis *Enum. Helv.* p. 523.
Buglossum vulgare CAM. Epit. p. 915. Circa Jenam in
omnibus pratis. Hannoverae.

H. *Borago sempervirens, major* MUNTING f. 117.
Verum Buglossum, unice foliis asperis utcunque Borragini
adfine.

H. Bor.

Borago calycibus patentibus Enn. Helv. p. 524.
LINN. *Borago* BLAKWELL T. 36. PASS. ic. alt. n. 79.
Sponte nunc in hortis.

β . Floribus albis.

H. Borago radice perenni, flore reflexo. Differt a vulgari defectu unguium & longiori rubore floris. r.

H. Borago calycinis foliis sagittatis, erectis Cliff. 45.
Berraginoides angustifolia, flore caeruleo, pallidente BOERH.-I. p. 188. *Cynoglossoides folio caulem amplexante*, Mem de l' Acad. des Scienc. 1718. p. 333. In Creta. Flos unicus maculis in ortu segmentorum notatus, absque unguibus aut palis. r.

H. Tournefortia LINN. *Pittonia arborescens*, *Chamaedryfolia*, major PLUMIER Nov. gen. T. 3.

D I C A R P A E.

H. Periploca foliis oblongis I. R. H. *Scammonei Monspeliensis varietas* LOBEL. ic. p. 621. *Scammonia Monspeliensis*, *longifolia* MUNTING. f. 141. Calyx hirsutulus, ad basin pene quinquefidus. Petala quinque, basi connata, acuminata, rosei coloris. Nectarium, si ita placet vocare, simile fere *Narcissi* calyci, cavum, breviter decemfidum. Quinque particulae acutae reflectuntur, quinque interme-

ISOSTEMONES

diae serratae breves sunt. In superficie interiori totidem sunt lingulae acuminatae, quae ex basi ornamenti adscendunt, & quinque aliae cum apicibus bifidis se tubae adplicant. Apicum filamenta fortissima, loculi graciles, paralleli. Ornamentum crassum, fungosum, cui tubae inseruntur. Semina paleacea, corona papposa.

H. *Apocynum Syriacum* CLUS p. LXXXIII. *Apocynum majus*, *Syriacum*, *rectum* CORNUTI p. 90. *Apocynum Syriacum*, *flore glomeroso* MUNTING. f. 104. *Beidel Sar* VESELING. obs. p. 29. In *Syria, Virginia*. In hac aliisque speciebus duae tubae spongiosae se inmittunt in propria foramina ornamenti quinquangularis.

H. *Apocynum minus*, *rectum*, *Canadense* CORNUTI p. 93. In *Canada, Virginia*. Folia calycis purpurea, reflexa. Nectararia rosei coloris, ovata, de quibus unguis albidus exit. Petala reflexa, purpurea. Vita annua.

H. *Apocynum Corassavicum* sive *Americanum*, fibrosa radice, floribus aurantiis, *Chamaenerii* foliis latioribus HERM. *Hort. Lugd. Bat.* p. 36, ic. Calyx reflexus, segmentis quinque acutis. Flos monopetalos, profunde quinquefidus, in segmenta lanceolata, aurantii & miniati coloris fissus. Machina staminum pentagonia, ita facta, ut dicam. Ex uno circulo fert quinque folia flava, cava, carinata, ex quorum quolibet incurvus unguis exit, & interiora respicit. Intra haec quinque filamenta unguibus

gra-

gracilibus, & in eodem ordine quinque squamae erectae,
quasi biloculares, septo divise, ad tubam cavae sunt.
Tubae de more duae, insertae crassissimo ornamento pen-
tagonio, quinque obtusis eminentiis ornato. Semina
ovata, basi truncata, hinc convexa, inde cava, alata. Radix
crassa, perennis.

H. Apocynum Africanum, erectum, villoso fructu, Sali-
cis folio, lato, glabro H. AMST. II. f. 25. *Apocynum Sa-*
licis folio, angusto. HERM. Par. Bat. p. 24. In Syria
FOCOCK.

H. Apo ynum erectum, folio hirsuto, lato, floris um-
bellati petalis reflexis, ruberrimis BOERH. Nondum flo-
ruit, ut ignorem, an proptia species sit.

H. An Apocynum Africanum, scandens, Pervincae folio
subinicanum COMMEL. plant. rar. f. 18? Nondum
floruit.

Genera ista ita divido, ut Asclepias absque nectario sit,
Apocynum quinque nectaria habeat, cui Stapelia utique
potest accenseri. denique Periplocae sua peculiaris fa-
brica est.

H. Stapelia caulis aculeatis, flore levi. *Asclepias*
Africana aizoides I. R. H. BRADLEY Dec. III. S. 3. *aphylla*,
flore Fritillariae MOR. S. XV. T. 3. In titulo BLAIRII
bot. eff. pingitur. Compositae fabricae descriptionem ad-
dere visum est. Calyx quinque foliis fit, ovato lanceola-

ISOSTEMONES

tis. Flos rotatus, crassulus, semiquinquefidus, extus pallens, glaber, intus rugosus, rugis & valleculis ex flavo & fusco varius. Cum flore continuatur cyathus cavus, pentagonius, circularis, rugosus & maculosus. Intra eum machina staminifera, stellata. In ea primo quinque extroversi bifurcati, parallelogrammi radii, maculosi. Inde his adnati alii quinque, bipartiti. Forum unum cornu gracile, erectum, maculosum, alterum introrsum connivet oblongum, globulo terminatum, qualia quina corollam conponunt. Horum interiori lateri adhaerent quinque stamina bilocularia. His defractis adparet basis totius stellatae machinae, quae cylindrum effert pentagonum, quinque radiis percursum, quinque foveolis exaratum, quae stamina recipiunt. In cavitatem hujus cylindri duae tubae acuminatae se innittant.

H. *Stapelia* caulis quadrangulis, flore pubescente. *Asclepias Africana aizoides*, flore pulchre fimbriato COMM. rar. T. 19. BRADL. Dec. III. p. 5. BLAIR. ibid.

Asclepias foliis ovato lanceolatis, glabris, floribus racemosis, albis Enn. Helv. p. 525. *Vincetoxicum* DOD. Purg. p. 211. *Asclepias* albo flore C. B. Passim in sylvis lapidosis Plesse, Hengst.

H. *Asclepias* floribus campaniformibus. *Apocynum Canadense*, folio Androsaemi majoris BOCC. Sic. p. 32. *Apocynum Americanum*, folio Androsaemi majoris MARCHANT. p. 251. pulcherrime.

H. *Ascle-*

H. *Asclepias* foliis linearibus, radice repente MARTIN.
Nondum floruit.

H. *Nerium* foliis lineari lanceolatis LINN. *Rhododendron* DOD. p. 851. In Syria &c.

H. *Nerium Indicum*, flore pleno HERMAN. Hort. *Lugd.*
Batav. p. 549. *Tsjoeranna Aleri* H. MAL, IX. c. 1.

Pervinca foliis ovato lanceolatis Enam. *Helv.* p. 526.
Clematis Daphnoides DOD. *Purg.* p. 246. *Pervinca vulgaris, angustifolia* C. B. Super *Herperhusen* versus *Rohringen*.
Super *Eligehusen*.

H. *Pervinca* foliis ovatis surrectior LINN. *Pervinca latifolia*, flore caeruleo GARID. T. 81. In *Gallia Narbonensi*, inque *Anglia* PLOT.

F L O R E D I F F O R M I:

H. *Melianthus stipulis solitariis*, petiolo adnato LINN:
Melianthus Africanus HERMAN hort. p. 415. ic.

H. *Melianthus Africanus*; minor; faetidus COMM;
far. f. 4.

H. *Hypecoum tenuifolium*, siliquis erectis, terretibus
AMMAN. T. 9. Calycis duo folia lanceolata, brevia: duo
praemagna, petiolata, ovata; intus colorata; subflava: Pe-

tala flava, duo bicornia, in duas partes ovatas fissa, inter quas media scapha est, in principio cava, ad similitudinem sulci vomeris, inde vero explanata & revoluta. Stamina quatuor erecta, longa, apicibus siliquae applicatis. Tubaæ duæ simplices, recurvæ. Siliqua longa, articulis æqualibus, per transversas lineas divisa. In carnosò articulo semen fere hemisphaericum. In *Sibiria*.

Viola acaulis, stolonibus teretibus, reptatricibus, pendunculis radicatis LINN. *Enum. Helv.* p. 500. *Viola martia* BLAKWELL. T. 55. *Viola martia, purpurea, fiore simplici odoro* I. R. H.

β. Flore albo.

Viola caulinus adscendentibus, floriferis, foliis cordatis Cliff. *Enum. Helv.* p. 501. *Viola inodora* RIVIN. In sylvis.

Viola foliis reniformibus, caulinus foliosis. floriferis. *Enum. Helv.* p. 503. *Viola Alpina, rotundifolia, minor,* Intea PLUKNET. T. 233. f. 7. *Yellow Rokviolet* PELL-VER Hort. Brit. T. 37. In rupibus *Helvetiae alpinae*. In *Groenlandia* EGEDE cum icono.

H. *Viola montana, latisolia, flores ex radice, semina ex cacumine ferens.* Hort. Elth. T. 303. f. 390. *Viola flore albo* RIV. T. 118. *Viola martia, montana* ZANON. T. 76. In horto, sed Cl. WEDEMEYER abunde reperit in *Marchia*, DILLENIUS Giessae.

Viola stipulis crenatis, foliis ovato lanceolatis. An Viola palustris, foliis Trachelii, glabris RUPP. p. 289? BOEHMER. flor. Lips. p. 190. In pratis Sueviae inter Nürdlingen & Oettingen. Radices ligneae, asperae, perennes. Caules subrecti, pedales & semipedales. Stipulae sive folia ad ortum raimorum oblonga, acuta, margine argute serrato: folia vero ima longe petiolata, ovato lanceolata, obtusiuscule circumferrata. Flores longe petiolati, aquose caerulei, caeterum de martiarum genere, cum tuba in uncum facta sit. An satis a priori diversa.

Viola caule erecto, foliis sub ramis laciniatis, reliquis longe ellipticis Enn. Helv. p. 503. Viola martia, arborescens, purpurea C. B. GARIDEL T. 99. In pratis hercynicis frequens.

Viola annua, caule procumbente, foliis sub ramis laciniatis, flore magno, tricolore Enn. Helv. p. 504. Viola tricolor PASS. ic. 94. P. alt. Jacea sive Flos trinitatis CAMER. Epit. p. 912. 1^o ADMIRAL. T. 19. Sponte ubique in Cellensi ducatu, in viis arenosis, & in ipsa Japania.

Viola annua, caule procumbente, foliis sub ramis laciniatis, flore exiguo, bicolore Enn. Helv. p. 504. Jacea altera CAMER. Epit. p. 913.

β. Varietas colore toto caeruleo,
In agris & hortis sponte frequens.

232 ISOSTEMONES FLORE DIFFORMI.

Impatiens pedunculis solitariis, multifloris LINN.
Eum. Helv. p. 505. Balsamine altera, noli me tangere
COLUMN. Ecprras. p. 150. In ipsa urbe inter vicum
& aream ante domum, in qua cerevisia coquuntur. In sylvis
super Hardegsen, circa Gleichen &c.

H. Impatiens pedunculis confertis, unifloris LINN.
Balsamina semina C. B. Tilo Onapu H. MAL. IX. T. 52.
Balsamine RIV. T. 120. Flore albo.

β. Flore roseo.

γ. Flore violaceo.



MEIO

M E I O S T E M O N E S.

Ligustrum *Enum.* *Helv.* p. 527. MATTH. p. 170. Ad
sepes.

H. *Olea* CLUS. *bisp.* p. 46. *Oliva* VOLC. *hesperid.* p.
236.

H. *Syringa* foliis ovato cordatis LINN. *Syringa* caeruleo
flore CLUS. *bifl.* p. 56. Passim ad sepes quasi sponte-
ranea. In *Perisia*, *Walachia*.

H. *Syringa* foliis lanceolatis, integris & laciniatis LINN.
Aegrelilac Persarum CORNUT. p. 189. In *Asia minori*.

H. *Nyctanthes* foliis inferioribus cordatis, superioribus
ovatis, acutis H. Ups. *Nalla* *Malla* H. MAL. T. VI. ic.
50. *Sambach Jasmin Arabum* ALP. Aeg. p. 73. *Jasminum*,
sive *Sambach Arabum*, folio acuminato, flore stellato, ma-
jore TILLI. T. 31.

H. *Jasminum* foliis oppositis, pinnatis LINN. *Pitsjégam*
Malla H. MAL. T. XI, ic. 52. *Jasminum vulgare*, flore albo
. R. H.

H. *Jasminum* foliis alternis ternatis, pinnatisque, ra-
mis teretibus LINN. *Jasminum Indicum*, *flavum*, *odora-*
tissimum FERRAR. flor. p. 39.

H. *Jasminum* sive *Gelsemium luteum* I. B. II. p. 102,
Jasminum foliis alternis ternatis, pinnatisque, ramis angula-
tis. Ups. P 5 H. Jas-

H. Jasminum foliis alternis ternatis, simplicibusque, ramis angulatis Ups. *Jasminum luteum* I. R. H. Vulgo dicitur *bacciferum* C. B. *Trifolium fruticans* DOD. *Cereal p. 197. Monspelii.*

H. *Veronica Virginiana*, procerior, foliis ternis, quaternis & quinquefoliis, caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis PLUKN. T. 70. f. 1. *Veronica foliis quaternis, quinquefoliis* Cliff. 71. In America & Asia septentrionali.

H. *Veronica foliis ternis*, ovato lanceolatis, serratis, floribus spicatis. *Veronica spicata*, recta, profunde serrata J. B. III. p. 284. Huic & reliquis spicatis tubus floris longior, breviter quadrisfidus, ut tamen unum segmentum minus sit, & fructus pariter longior, bicollis.

H. *Veronica foliis ternis*, rarer dentatis, spica rariori. *Veronica angustifolia*, floribus paniculatis AMMAN. Ruthen. n. 52.

H. *Veronica spicata*, lanuginosa & incana, floribus caeruleis AMMAN. Ruthen. n. 30.

Veronica caule simplici, nudo, spicato, foliis scabris, ovatis, dentatis. *Veronica spicata minor* VAILL. T. 33. f. 4. Ad arcem Regenstein.

Veronica foliis siccis, oratis, serratis, caule procumbente, ex aliis racemosa Ennem. Helv. p. 530. *Veronica mas*, supina & vulgarissima C. B. In omnibus sylvis.

Veronica foliis imis cordatis, superioribus angustioribus, ellipticis, ex alis racemosa *Enum. Helv.* p. 529. *Veronica montana* RIV. T. 94. *Veronica supina*, facie Teneris pratensis I. R. H. Ad vias versus *Bovenden, Herperhusen* &c. Vidi staminibus tribus, segmentis sex, tubis duabus.

Veronica foliis cordatis, superioribus majoribus, ex alis racemosa. *Enum. Helv.* p. 529. *Veronica minor*, foliis imis rotundioribus C. B. *Veronica pratensis*, latifolia RIV. T. 93. Vulgatissima.

H. *Veronica* foliis cordatis, longe mucronatis, ex alis racemosa *Enum. Helv.* p. 529. *Veronica pratensis*, omnium maxima BUXBAUM. *Cent. I.* T. 34. In *Helvetiae* montosis & sylvosis. r.

Veronica procumbens RIV. T. 92. *Veronica* procumbens, *biscutata*, *Hederae* folio MORIS. S. III. T. 23. *Alysson* montanum COL. p. 288. Maxima copia ad rivum, qui defluuit versus *Geismar*, dum obscuro loco per sylvam descendit. Caulis procumbens. Folia petiolata, ovata, obtusa, crenata, hirsuta, subtus rubra. Florum racemi pauciflori, calyx hirsutus, petalum subcaeruleum, imo segmento albo; fructus planissimus, ex duobus compressis circulis fit. Uterque loculus tetraspermus, semina plana, ovata cum hilo.

Veronica aquatica, foliis ovatis, ex alis racemosa *Enum. Helv.* p. 528. *Beccabunga*, RIV. T. 99. *Veronica aquatica*, major, folio subrotundo I. R. H. Perinde vulgaris.

Veronica aquatica, foliis ovato acuminatis, ex alis racemoso*Enum. Helv.* p. 528. *Berula major* TAB. p. 719; *Veronica aquatica, major, folio oblongo* MOR. In omnibus aquis.

Veronica aquatica, foliis linearibus, rariter dentatis *Enum. Helv.* p. 527. *Anagallis aquatica, angustifolia* L.B.III. p. 791; *Myosotis Scorpioides palustris, repens* ERNDL; E.N.C. Vol. III. app. Ad lacum circa Seeburg, & Westerhof; in ducatu Cellensi circa Eschede, albis ibi floribus. Vereor, omnibus computatis, ob folia ovata & angustiora, ne sit praecedentis varietas.

Veronica foliis subrotundis, crenatis, hirsutis, petiolis calyce brevioribus *Enum. Helv.* p. 533. *Alysson COLUMN. phytobas.* p. 26. In pratis & hortis.

Veronica foliis glabris, ovatis, floribus rarius spicatis, sessilibus *Enum. Helv.* p. 533. *Veronica pratensis* DOD. Pempt. p. 41. *Veronica pratensis, Serpyllifolia* C.B.

Veronica foliis cordatis, crenatis, floribus solitariis pendulatis *Enum. Helv.* p. 534; *Veronica Chamaedrys folio RIVIN. monop. irreg.* T. 96. Ubique in muris, agris & hortis.

β. Flore albo.


Veronica foliis cordatis, quinquelobis, calycis segmentis sagittatis *Enum. Helv.* p. 534. *Veronica Hederae folio RIVIN. T. 96.* In agris & hortis.

H. *Veronica Chia, verna, Cymbalariae folio. Veronica Orientalis, Hederae terrestris folio, flore albo* BUXBAUM Cent.

Cent. I. T. 40. Parum diversa a priori. Petioli longi uniflori, calycis quatuor segmenta obtusa, flos albus, uno segmento de more exiguo, reliquis latis, rotundis. Semina perinde sunt scaphae hemisphaericae cavae, ut *Peziæ* lincata, & sulcata.

Veronica foliis trifidis & quinquefidis *Emm.*, *Helv.* p. 534. *Veronica folio Rutaæ* RIV. T. 95. Abunde in agris ultra portam *Wehndensem* & *Albanam*.

H. *Capraria* foliis ternatis corollis quadripartitis LINN.
Phytenoides Americanum, *stroe albo*, *tetrapetalo* PLUKNET T. 215. f. 1. *Veronica fruticosa*, *erecta*, *dulcis*, *caule hexangulari*, *stroe dilute caeruleo* BARRERE hist. natur. p. 112. In *Guiana*. r.





T E T R A P E T A L A E S I L I Q U O S A E.
N A S T U R C I N A E.

H. *Crambe Orientalis*, *Dentis leonis folio*, *Erucaginis facie* L. R. H. *Crambe foliis petiolatis, rotundis, hirsutis, fructu sphaericō*. L.

H. *Rapistrum maximum, monospermum CORNUT.* p. 148. *Calyces flavi, petala alba*, hinc antequam floreat flavo flore esse videtur, quando floret, albo. r.

Isatis sylvestris CAMER. *Epit.* p. 410. *Circa Jenam an der hohen Saale, Basileae &c. in M. Clozberg ROYER.*

H. *Isatis sativa*. Vide *icones* Cl. SCHREBERI.

H. *Isatis sylvestris, minor, Lusitanica* DILL. *Parum diversa.*

H. *Velia LINN.* *Nasturtium sylvestre, Valentinum CLUS.* CXXX. *bis p. 422. Nasturtium sylvestre, Erucae affine* MORIS. S. III. T9.

H. *Anastatica LINN.* *Rosa Hierichuntina* CAM. *hort. f. 41. Miagro digli Antichi* ZANON. T. 125. *Huic fructus rotundus, bilocularis, divisus septo, valvis parallelo, coronatus duabus auriculis semiovalibus. Tuba inter aures eminet, fine globoso. Calycis folia ovalia, petala alba &c.* In arenosis *Palaestinae, Arabiae, Cairi*, POCOCK. r. H.

TETRAPETALAE SILIQUOSAE. 239

H. Erucago segetum. *Eruca Monspeliaca*, siliqua quadrangula, echinata MORIS. S. III. T. 6. C. B. Prodr. p. 61. *Sinapi echinatum* L. B. II. p. 856. *Veronae, Monspelii.*

Myagrum siliquae primo nodo strictiori, altero globoso, striato Enum. Helv. p. 536. *Rapistrum monospermum* C. B. Prodr. p. 37. Abunde in Thuringia circa Eisleben, versus Kelbra, versus Querfurt &c. Petiolus latior capsulam efficit, in qua semen ovale. Huic insidet fructus globosus, striatus, coronatus cornu solidio, semine intus unico, simili. Calycis folia duo recta, duo deorsum gibba. Petala petiolata, emarginata, flava. Tubae loco finis spongiosus. Glandulae quatuor circa ovarii basin. Saepe alterutrum semen abortit.

H. *Myagrum* siliculis utrinque gibbosis, monospermis. *Myagrum monospermum*, *latifolium* C. B. Prodr. p. 52 MAPP. p. 206. In segetibus *Helvetiae* rarius. Capsula dura, bivalvis, dilatata, spinula exente, monosperma, in qua semen ovale. Petiolus cavus. Semen ovato cylindricum, sulco notatum, in petiolo crasso, coronato duobus loculis inanibus gemellis, inter quos tuba exit. Flos fere & habitus prioris

Myagrum siliquis globosis, compressis, scabris LINN. Enum. Helv. p. 536. *Myagrum monospermum*, *birsutum*, *siliquis rotundis* LOESEL. n. 56. Jenae magna copia in agris, Ann Brenets *Helvetiae* GAGN.

H. *Clypeola* siliculis unilocularibus & monospermis LINN. *Jonthlaspi minimum*, *spicatum*, *lunatum*. COLUMN.

Ephras.

240 TETRAPETALAE SILIQUOSAE.

Ecpbras. p. 284. GARIDELL. T. 56. *Thlaspi alterum, minus, clypeatum, Serpylli folio* LOB. ic. p. 214

Alysson calycis flore persistente. Alysson incanum, luteum, Serpylli folio, majus I. R. H. Alysson minimum CLUS. Pann. p. 473. LINDER. hort. T. 15. In aridis agris & muris.

H. Alysson perenne, calyce caduco, siliquis compressis, tetraspermis Enum. Helv. p. 540. Jonthlaspi luteo flore, incanum, discoides, umbellatum, montanum COLUMN. p. 281. In arenosis secundum Rhenum, infra Basileam legit STAEHELINUS, in Alsatia LINDER. Multo durius, album magis, majoribus foliis, calyce inprimis caduco, flore majori. Reliqua similia, & loculi perinde dispermi.

Alysson foliis scabris, sagittatis, leviter dentatis Enum. Helv. p. 537. Alysson segetum, foliis auriculatis, acutis TOURN. Camelina, sive Myagrion DOD. Cereal. p. 130. In Lino abundo.

B. Alysson foliis auriculatis, glabris, profunde dentatis Enum. Helv. p. 537. Myagrum faetidum C. B. LIND. TOURN. p. 94. ic. i. Ad fossas.

Alysson fruticosum, incanum I. R. H. *Thlaspi incanum, Meckliniense* LOB. ic. p. 216. *Thlaspi Meckliniense* CLUS. Pann. p. 470. Maxima copia circa Cellam, tum in Rhenana ditione.

H. Alysson

H. Alysson siliquis inflatis, foliis tomentosis. *Alyssoides fruticosum*, *Lencoji folio, incano* I. R. H. *Eruca peregrina* CLUS. *bisp.* p. 421. In *Castella*. Folia calycis hirtula, duo recta, duo deorsum gibba. Petala acute satis bifida, flava. Stamina duo, reliquis insigniter minora. Siliqua inflata, bilocularis. In quovis loculo semina plurima dupli ordine. Septum perpendiculare. Tuba recta, siliquae longitudine, fine crassulo.

Draba caulis nudis, foliis incisis LINN. *Enum. Helv.* p. 538. *Alysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo* I. R. H. *Alsine minima* TABERN. p. 118. Verno tempore in mai silentis.

Lunaria major, siliqua longiore I. R. H. *Lunaria Graeca*, *pereennis* AICHST. *Vern. Ord. I. T. 7. f. 2.* In *sylva Hercynia*, in *M. Herzberg, Illefeldae*.

H. Lunaria major, siliqua rotundiore I. R. H. r.

H. Lunaria Leucoji folio, siliqua oblonga, majori I. R. H. *Alysson Dioscoridis putatum*. LOB. *ic.* p. 323. In *Graecia, Gallia calidiori*.

H. Thlaspidium apulum spicatum I. R. H. *Zondraba apula, Alyssoides, spicata* COLUMN. *Ecphras.* p. 285. *Thlaspi clypeatum* CLUS. *Pann.* p. 471. *Veronae, Mons-pelii.* Ab alpina specie flore & fructu minori differt.

H. *Thlaspidium siliculis asperis.* *Leucojum internum*, *utriculato semine.* F. ALPIN. Exot. p. 116. Calycis duo foliola insigniter deorsum gibba, flos pallide sulphureus, petalis ovatis. Tuba prae longa, siliquarum cortex asper. In Creta, Toscana.

Coronopus Ruellii BLAKWELL. T. 120. *Pseudoambrosia* CAM. Epit. p. 596. Circa Allendorf, Sulze & alibi ad fontes salsos, etiam circa Jenam in pagis passim. Fructus transversim latus, compressus, tuberculis verrucosus. Semen in quolibet loculo unicum. Qui adeo sufficiat generi separando seminum numerus in Thlaspi & Nasturtio, hic non sufficiat, cum figura conjunctus?

H. *Cochlearia* foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis, sinuatis LINN. *Cochlearia* folio subrotundo α Foliis integris. *Cochlearia* CAM. Epit. p. 271. β . Foliis serratis. *Cochlearia Britannica* LOBEL, p. 294. Ad ripas maris septentrionalis, in Groenlandia etiam & Spizbergia.

H. *Cochlearia* foliis caulinis cordato sagittatis, amplexicaulibus LINN. *Cochlearia altissima*, *Glastifolia* I. R. H. *Thlaspi* I. CLUS. Pann. p. 466. In monte ad thermas Badenses.

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis, crenatis, incisis LINN. *Cochlearia* folio cubitali I. R. H. Auf der Herperkäuser Wiese. Circa Argentoratum LINDER. In Nordhollandia. Iberis

Iberis foliis sursum latescentibus, dentatis *Enum. Helv.* p. 543. *Thlaspi amarum* TABERN. p. 462. In segetibus *Alsatiae.*

H. Iberis foliis lanceolatis, acuminatis, inferioribus serratis, superioribus integerrimis. *Thlaspi Creticum*, *umbellatum* L. R. H. *Thlaspidium Creticum* RIV. T. III. Calycis folia duo deorsum gibba. Petala violacea vel alba, duo longiora, duo breviora. Semina solitaria pendula.

H. Iberis foliis linearibus, versus apicem dentatis, serratis LINN. *Thlaspi parvum* IV *odorato flore* CLUS. p. CXXXII. Differt calycis foliis ovatis, deorsum gibbis, flore minori.

H. Iberis foliis cuneiformibus, obtusis, integerrimis LINN. *Thlaspi Persicum* RIV. T. 110. *Thlaspi fruticoso di Persia con foglie di Keiri* ZANON. T. 165. *Thlaspi semper virens & florens* MARCHANT. p. 309.

Iberis foliis imis cordatis, superioribus amplexicaulibus *Enum. Helv.* p. 546. *Thlaspi Badense* CLUS. Pann. p. 465. Circa Jenam aufm Fuchsberg und Künitzberg. In montosis *Helvetiae*. Petala vel leviter inaequalia, vel nihil quidquam; priori autem modo in extremis floribus umbellae se habere video, & tunc interiora petala minora sunt, caeterum ovata omnia. Filamenta breviora de more respondent convexitati fructus. Tuba ovarii longitudine. Loculi monospermi. Semen planum, ovale. Calycis foliola ovata, viridia, oris albis.

Iberis foliis pinnatis, pinnis ovatis, ultimis confluentibus *Enum. Helv.* p. 542. *Pastoria bursa minor.* DOD. p. 103. MAGNOL bot. *Monsp.* p. 187. *Nasturtium petracum*, foliis *Bursae pastoris* C. B. Ad viam in rupibus sub *Waaken*. In arenosis *Marchiae* & circa *Noribergam* ubique. Petala duo majora reliqui, omnia integra, non incisa.

Nasturtium siliquis subrotundis, foliis sagittatis, dentatis, incanis *Enum. Helv.* p. 544. *Thlaspi II.* TAB, p. 458.

β. *Varietas glabra.* *Thlaspi vulgare* BLAKWELL. T. 87. In muris hirutie mollis, frequenter dentata varietas, in agris integrifolia, glabra reperitur.

Nasturtium foliis imis ovatis, reliquis amplexicaulibus, cordatis *Enum. Helv.* p. 544. *Thlaspi montanum, minus* CLUS. *Pann.* p. 458. In vallo urbis.

Nasturtium siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris LINN. *Enum. Helv.* p. 545. *Thlaspi arvense, siliquis latis* I.R.H. *Thlaspi II.* MATTH. p. 567. In agris.

H. *Nasturtium foliis pulposis, ovatis, serratis.* *Lepidium latifolium* I. R. H. *Lepidium CAMER.* Epit. p. 378, 379. In muris & ruderosis circa *Spiram, Harlemum, in Hibernia, Anglia.* Tuba brevis, fine globoso.

H. *Nasturtium foliis imis duplicato pinnatis, superioribus amplexicaulibus, ovatis.* *Thlaspi vero di Dioscoride primo ZANON.* T. 129. *Nasturtium Orientale*; foliis inferioribus

rioribus Millefolii, superioribus Perfoliatae I. R. H. Calycis folia ovata, acuminata, cava. Petala luteola, ex petiolo sursum dilatata, sive obtusa. Stamina sex de more. Tuba brevis, simplex. Capsulae seminales septo normali distinctae. Semen cavum, incisum, marginatum. In Syria, Persia.

H. Nasturtium hortense BLAKWELL. T. 23. *Nasturtium*: CAM. Epit. p. 355. bene

β. *Varietas crispa*

Nasturtium siliquis verticaliter cordatis Enum. Helv. p. 545. *Bursa Pastoris major*, folio sinuato C. B. *Bursa Pastoris* CAM. Epit. p. 340. Ubique verno tempore.

Nasturtium foliis imis multifidis, superioribus integris, perangustis Enum. Helv. p. 543. *Iberis* MATTH. p. 293. Jenae ubique & ditione Rhenana. Dystemon est, ex observatione Cl. MISSAE.

H. *Nasturtium* foliis dentatis, floribus minutissimis. *Iberis humilior*, annua, ramosier, *Virginiana* MORIS. S. III. T. 21. Ab Iberide differt foliis latis, unice dentatis, caeterum etiam dystemon est, & flore minimo. Ludit foliis integris, ovatis, foliis dentatis, pinnatis & semipinnatis.

H. *Lepidium* foliis pulposis, subrotundis, antheris lateribus. *Lithospermum parvum*, *roseum*, *semperfurens* COLUMN. Facies Telephii Imperati. Folia calycis duo recta, duo longiora, paulum deorsum gibba. Petala petiolo lato, fine emarginato, replicato, alba, lineis roseis

pieta. Stamina duo brevissima, reliqua lata, firma, anthera singulari plane modo lateraliter adnata. Siliqua ova- ta, tuba simplici, longa & crassescente, ut de genere Lepidii sit. Semina compressa, Amygdalae figura. r.

H. *Lepidium* foliis lanceolatis, amplexicaulibus, dentatis LINN. *Lepidium humile*, *minus*, *incanum*, *Alpinum* I.R.H. Nondum floruit.

Sisymbrium foliis simplicibus, dentatis, serratis LINN. Enum. Helv. p. 548. *Raphanus aquaticus*, alter C. B. Prodr. p. 37.

β. Sisymbrium foliis imis integris, ovatis, serratis, superioribus pinnatis Enum. Helv. p. 548. *Rapistrum aquaticum* TABERN. p. 108.

γ. Sisymbrium foliis pinnatis, pinnis serratis, siliqua brevissima. Enum. Helv. p. 548. *Raphanus aquaticus*, foliis in profundas lacinias divisis C. B. Prodr. p. 38. Zu Holtensen und an der alten Leine.

Sisymbrium pinnis profunde serratis, dissitis Enum. Helv. p. 548. *Sisymbrium palustre repens*, *Nasturtii folio* I. R. H. *Eruca sylvestris* FUCHS. p. 263. Ad vias & fossas abunde.

Sisymbrium foliis pinnatis, angulosis, floribus super folia vix elatis Enum. Helv. p. 549. *Nasturtium aquaticum* BLAKWELL. T. 260. Bey der Raase und Papiermühle, und um Harste in fossis.

Sisymbrium foliis pinnatis; pinna extrema amplissima, subrotunda *Enum. Helv.* p. 549. *Sisymbrium Erucae folio, glabro; flore luteo* I. R. H. *Barbarea femina TABERN.* p. 452. Ad fossas. Calycis folia paulum deorsum gibba.

Sisymbrium foliis imis *Barbareae*, superioribus integris, dentatis *Opusc. bot. P. III. Iter Hercyn.* p. 100. n. XI. cum ic. Ad rivos hercynicos, supra *Herzberg* &c;

Sisymbrium foliis glaucis, pinnatis, pinnis longis, rarer ferratis *Enum. Helv.* p. 551. *Eruca sativa* FUCHS. p. 262. Ad *Rhenum Mankemii, Wormatiae, Spirae* &c.

H. *Sisymbrium* foliis pinnatis, extrema pinna amplissima, siliquis praelongis. *Hesperis* flore albo, minimo, siliqua longa, folio profunde dentato BOERH. DILL. *Hort. Elth.* f. 177. Calyx tubulosus, obscure deorsum gibbus, ut ab *Hesperide* & *Leucojo* differat. Petala longo ungue, bractea lata, non emarginata sibi inposita, alba. Stamina duo insigniter breviora. Siliqua longissima, terminata stylo crasso, capitato, fine globoso. Semina ovata, angulosa, compressa, marginata. Calyce a *Leucojo* differt. r.

Sisymbrium pinnis foliorum pinnatis, pinnulis subhirutis, linearibus *Enum. Helv.* p. 550. *Sisymbrium annuum, Nasturtii minoris folio* I. R. H. *Descuren GUETTARD.* II. p. 165. qui ob minorem calycem & emarginata petala separat. Similes fere rationes fecerunt, ut *RIVINUS Accipitrinam* vocaverit. Mihi *sisymbria* sunt, quotquot calyce non gibbo, siliqua non elastica, ejusque cornu

brevi, absque glandulis sunt. In coemeteriis & ad muros.

Sisymbrium foliis pinnatis, extremo lobo triangulo-
filiquis cauli adpressis *Enum.* *Helv.* p. 551. *Erysimum*, *Irio*
I. TAB. p. 448. Ubique ad vias.

Sisymbrium foliis pinnatis, extrema pinna triangula,
dentata, petiolis longis, hirsutis. *Erysimum* II. TAB. p.
449. bene. *Erysimum minus*, foliis lanceolatis BUXBAUM.
Cent. V. T. 56. n. 1. nostrum satis refert. In tellinis stramineis
suburbanis *Eislebiae* magna copia. Caulis annuus cubita-
lis, ramosus, hirsutus. Folia glabra, pinnata, pinnarum
paribus tribus, quatuorve, eundo majoribus, extrema ma-
xima, acuta, confluente cum proximis, & dentata. Petio-
li pene unciales, amplio angulo ex caule exstantes, in ju-
nioribus ramis hirsuti. Calycis foliola gracilia, non gib-
bosa. Petala flava, ovata, absque glandulis. Stamina pe-
ne aequalia. Siliquae longae, strictae, teretes, stylo soli-
do, brevi. Habitus tener & succulentus.

H. *Erysimum Monspessulanum*, *Sinapi* folio WAL-
THER T. 22. *Sinapi sylvestre*, *Monspessulanum*, *latifolium*,
fiore luteo, *minimo*, *siliqua longissima* MORIS. S. III. T. 3.
Annon Irion apulus alter, *lezi folio Erucac* COL. Ecphr. p.
26 §: *Annon Erysimum Dioscoridis ZANONI*. T. 75: *Erysimum*
latifolium, majus, glabrum MAGNOL. p. 93.

H. *Erysimum Orientale*, folio Sonchi, sulphureo, sili-
quis longissimis BOERH. Ind. alt. Calyx tubulosus. Fo-
lia

lia duo deorsum paulum gibba, duo recta lengiora. Petala ovata, sulphurea. Tuba rotunda, brevissime bifida. Siliqua longa, teres, crassula, paulum nodosa, fine bicolii. Semina pene subrotunda, hilo incisa.

Sisymbrium foliis cordatis, retusis *Enum. Helv.* p. 553. *Hesperis Allium redolens* I. R. H. *Alliaria CAM. Epit.* p. 589.

Sisymbrium foliis integris, oblongis, subasperis *Enum. Helv.* p. 550. *Turritis* folio *Leucoji* I. R. H. *Camelina, Myagrum alterum, Thlaspi effigie LOBEL.* ic. p. 225. *An den Gräben gegen Bovenden.*

Sinapi siliquis glabris, tetragonis LINN. *Enum. Helv.* p. 554. *Sinapi Rapi* folio C. B. *Sinapi siliqua latinscula, glabra, semine ruffo, sive vulgaris* I. B. II. p. 855. Rarior in ruderosis.

H. *Sinapi* foliis pinnatis, serratis, extrema maxima, siliquis longissimis. *Eruca sylvestris, minor, lutea, Bursae Pastoris folio, Italica BARREL.* ic. 1016. Annon *Eruca sicula, Bursae Pastoris folio BOCC.* Sic. p. 19. T. 102 Calyx deorsum non gibbus, ut hujus loci sit. Petala Caryophyllaea, ungue longo, bractea sulphurea, ovali. Stamina duo insigniter breviora. Particulae quatuor virides, obscurae, ad basin staminum positae. Siliqua teres, polysperma, longa, articulata. Tuba tertiae vel quartae partis siliquae aequalis, fine crasso, solido. Semina ad usque duodecima rotunda, flava. Est ergo de Sinapios genere.

Sinapi siliquis hispidis, rostro longissimo LINN. Enum. Helv. p. 554. Sinapi album, siliqua hirsuta, semine albo & rufo I. B. II. p. 856. Hortorum & agrorum vitium.

H. *Sinapi Orientale*, maximum, Rapi folio I. R. H., Calycis folia cava, gracilia, sublutea. Petala petiolata bractea cordiformi, flava, Glandulae quatuor. Stamina duo notabiliter breviora. Siliqua subhirsuta, brevior suo cornu, tuba bicolli. Semen fuscum pene sphaericum; simillimum priori, si non idem.

Sinapi siliquis multangulis, toro so turgidis; nostro proprio longioribus LINN. Enum. Helv. p. 554. Sinapi arvensis, praecox, semine nigro I. R. H. Irion FUCHS. p. 256. In agris & hortis.

H. *Sinapi siliquis tetragonis, floribus venosis Eruca sativa alba*, *Diosc. POCOCK. I. p. 282. Sinapi alterum genus FUCHS. p. 539.* Variat flore albo & luteo, utroque venoso. Calycis folia duo deorsum modice gibba, duo magis. Petala inverse cordata, venosa. Glandulae quartuor, sive squamae virides ad basin staminum. Fructus tetragonius, duobus angulis obsoletis. Tuba fructu longior, plane triangula, lata. Stigma bicolle, exiguum. Ad vias in Valesia nascitur, inter Siders & S. Leonhard.

H. *Eruca folio Bellidis.* Cum hoc nomine missa, nondum floruit.

H. *Sinapi Chinense, Acanthi folio.* Nondum floruit.

H. Raphanus hortensis BLAKWELL. T. SI. *Rapbanus longus* CAMER. Epit. p. 224. bene. In hortis multae varietates coluntur.

Raphanus siliquis teretibus, articulatis, unilocularibus LINN. Enn. Helv. p. 555. *Raphanistrum arvense*, flore puto I. R. H. Auf Aekern gegen Lengeler.

β. Flore albo striato, & flore venis purpureis picto, denique caeruleo. *Lampsana apula* Plinii & Dioscoridis COLUMN. Ecphras. I. p. 261. In agris aufm Hagen.

H. Raphanus siliquis ovatis, angulatis, monospermis Cliff. *Cakile sive Eruca maritima, latifolia* C. B. *Cakile Serapionis Erucae folio, Napi flore* DONAT. p. 133. Ad littora Maris Baltici, Mouspelii, Harvici, nascitur in arenis, quas nuper mare recedens nudavit, LANCISIO observante.

Dentaria foliis inferioribus pinnatis, superioribus simplicibus LINN. Enn. Helv. p. 557. *Dentaria septifolia* TAE. p. 114. Copiosissime olim an den Hügeln im Drescher Walde, tuin in tota sylva hercynica.

Brassica foliis ovatis, integerrimis, amplexicaulibus LINN. *Brassica arvensis, perfoliata* I. R. H. In omibus agris.

H. Brassica radice caulescente, fusiformi LINN. *Napus sylvestris vulgo*. Plurimum feritur in agris.

β Flo-

TETRAPETALAE

β Flore melino.

H. Brassicae hortenses variae.

H. Brassica cauliflora CAM. Epit. p. 252.

H. Brassica capitata CAM. Epit. p. 250.

H. Brassica crispa, &c.

H. Rapum CAMER. Epit. p. 218.

H. Rapum longum CAM. Epit. p. 219.

Cardamine foliis pinnatis, pinnis subrotundis, angulosis Enum. Helv. p. 558. *Nasturtium aquaticum*, *majus* & *amarum* C. B. Prodr. p. 45. Accedit icon ZANONI nov. p. 66. T. 45. In valle ultra Hessendreisch.

Cardamine foliis pinnatis, imorum pinnis subrotundis angulosis, superiorum oblongis & strictis Enum. Helv. p. 559. *Cardamine pratensis*, *flore magno*, *purpurascente* L.R.H. Ubique in pratis uidis.

Cardamine caule foliisque hirsutis. Enum. Helv. p. 558. *Sisymbrium aquaticum*, alterum CAMER. Epit. p. 270. Passim in sylva Hercynia, in primis inter Schlüft & Andreasberg ad viam. Apetalam esse, aut quatuor stamina habere, non reperio. Nostra petala habet, & stamina sex.

H. Cardamine foliis pinnatis, foliolis aequalibus, lobatis, petiolatis ROY. *Cardamine ficula*, *Fumarine folio*. *Sium* sive *Cardamine latis siliquis* BOCC. Sic. p. 83. & 84. cum nomine *Sio minimo affinis*, *siliquis latis*.

*Cardamine foliis pinnatis, pinnis laciniatis LINN.
Enum. Helv. p. 557. Sium minimum P. ALF. exot. p. 331.
Im Dreischwalde, und jenseit Herperhausen, im Göttinger
Wulde, & in sylva hercynica ad vias frequens.*

*Turritis foliis radicalibus dentatis, hispidis, caulinis
integerrimis, amplexicaulibus, glabris Enum. Helv. p. 562.
Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, cacteris Perfoliatae
I. R. H. Passim in sylvosis asperis, M. Hengst in primis.*

*Turritis foliis omnibus asperis, dentatis Enum. Helv.
p. 561. Barbarea muralis I. B. II. p. 869. Turritis minor
I. R. H. Abunde in lapidosis gegen Herperhausen & in M.
Hengst.*

H. *Turritis latifolia, hirsuta, siliquis pendulis AMMAN.
n. 79. Calyx tubulosus, deorsum non gibbus. Petala un-
gue paulatim dilatato, alba, emarginata. Stamina latera-
lia breviora, absque nectario. Tuba obiter bifida, spon-
giosa. Siliqua cernua, fuscuncialis, lata, angulis laterali-
bus acutis, media facie convexa. Septi alveoli non pro-
fundi. Semina plana, marginata, foliacea. Cum non
possim conferre stirpem emortuam cum tertia Arabi, an
eadem, an diversa sit, non possum pronunciare.*

*Brassica Alpina perennis. Jenae nata in rupibus inter
Fuchsberg & Priesnitz, & in Alfatiæ montibus su-
per Haslach, non satis cognita planta, foliis ovatis
glabris.*

Arabis foliis radicalibus ovatis, scabris, caule nudo
Enum. Helv. p. 562. *Turritis vulgaris*, ramosa **LINDERN.**
Hort. Alsat. T. I. *Pilosella siliquata*, *minor* **THAL.** ic.
 VII. D. Passim in agris sterilibus v. g. in vallecula inter
Besigehausen & Waaken abunde. In M. *Hagen* agris.

H. *Arabis* foliis scabris, pinnatis, pinnis rectangulis,
 non dentatis. *Eruca caerulea*, in arenosis crescens I. R. H.
Hesperis petraea, vel *saxatilis* **LINDERN.** *Tourn.* p. 132.
 T. III. d. ic. In arenosis ad *Birsam Helvetiae*. Calycis
 duo foliola exteriora deorsum gibba, duo plana. Petala
 obscure emarginata, dilute carnea. Glandulae quatuor
 satis evidentes. Siliqua latiuscula, compressa, cum stylo
 crasso, brevique. Semina ex ovatis compressa, marginata.

H. *Arabis* foliis ovatis, scabris, siliquis recurvis, *Enum.*
Helv. p. 562. *Leucojum* flore albo, siliquis uno versu dispo-
 sitis & reflexis H. **OXON.** *Hesperis Alpina*, *Murariae* ad-
 finis, *surrecta*, *magna* I. B. II. p. 881. Proxima *Turritidi*
Ammanni & forte eadem. Hae notae in adversariis meis
 sunt: Folia circiter ovata, sed acuta & acute dentata, in-
 cana, scabra. Caulis cubitalis, siliquae corneae. Calyx
 ex albo pallens, deorsum non gibbus, segmentis cavulis.
 Petala caryophyllea, levissime emarginata, subpallida.
 Stamina duo valde breviora. Siliqua lata, compressa,
 mucrone pro tuba ornata, fine obtuso. Glandulae duas
 ad sedem staminum breviorum. Ex semine *Dilleniano*
 provenit, & olim a STAEHELINO ex mentibus *Helve-*
ticis missa est. H. Chei-

H. Cheiranthus foliis lanceolatis, acutis glabris, LINN.
Enum. Helv. p. 563. *Leucojum luteum vulgare* I. R. H.
Leucojum aureum MATTH. p. 877. In muris Basileae, Ge-
 neva, in *Hibernia*, *Anglia* BLAKSTONE.

β. Flore pleno AICHST. *Aest. Ord. II. T. 4. f. 2.*

H. Cheiranthus foliis lanceolatis, integerrimis, obtusis,
 incanis LINN. *Leucojum aestivum*, flore albo, purpureo,
 roseo I. B. II. p. 874. *Leucojum candidum*, majus DOD.
Coron. p. 20. *Icones* varias dat VALLET. T. 90. Calyx
 adhuc deorsum gibbus magis quam priori.

β. *Leucojum* flore rubro, pleno AICHST. *Aest.*
Ord. II. T. 1. f. 1.

H. Cheiranthus foliis obverse ovatis, lanceolatis, obtu-
 sis, scabris, vix serratis Cliff. *Leucojum marinum* aliud,
 folio virente, *crassuscule* I. B. II. p. 877. *Hesperis mariti-
 ma*, *angustifolia*, *exigua* I. R. H. Folia eundo dilatata,
 ovata, scabra. Flores grandes, uncia paulo breviores,
 qua nota facile secedit a sequente. Calyx subasper, deor-
 sum gibbus, tubulosus, petala emarginata, purpurea.

H. *Hesperis* siliquis parvis, hirsutis, flore parvo rubel-
 lo BOERH. DILL. *Hort. Eltb.* f. 178. Flore minori in-
 primis a priori differt. Folia scabra, ovalia, obscure
 dentata. Flores minuti. Calyx albidis pilis hirsutus, de-
 orsum valde gibbus. Siliquae fuscunciales, terminatae acu-
 to spiculo solido. Flos purpureus, petalis emarginatis.

H Leucojum maritimum, latifolium, flore caeruleo, purpurascente I. B. II. p. 880. *Leucojum marinum*, alterum, purpuro violaceum LOBEL. *ic.* p. 333. Folia scabra, ovato acuminata, dentata, caulis ramosus, nudus. Flores exigui, violacei. Siliquae scabiae, acuminatae.

H. Hesperis maritima, latifolia, siliqua tricuspidate. *Leucojum marinum* CAM. *hort.* *ic.* 29. *Leucojum majus* CLUS. p. 298.

Hesperis inodora, sylvestris. I. R. H. RUPP. T. I. p. 78. *Hesperis pannonica* II. CLUS. *Pann.* p. 335. 336. et si nostra odorata est. *Viola matronalis*, flore purpureo, simplici KYLLING. p. 170. In sylva circa arcem Grubenhagen maxima copia, & ad arcem Plesse. Erigitur utique caulis in spontanea planta, & parum ramosus est, flos vero dilute purpureus. In hortensibus caulis ramosior, flos albus, aut sature purpureus. Neque enim alia est *Viola matronalis vulgi*.

H. *Hesperis hortensis*, flore albo. *Hesperis* III. CLUS. p. 266. *Viola matronalis* DOD. *Coron.* p. 24.

$\beta.$ Flore purpureo pleno.

$\gamma.$ Flore albo pleno.

H. *Hesperis peregrina*, siliquis articulatis I. R. H. *Hesperis Syriaca* CAMER. *hort.* *ic.* 19. I. B. II. p. 379.

H. *Hesperis exigua* lutea, folio dentato, angusto BOERH. *Monspelii.* Caulis nostrae humilis, vix pedalis. Folia longa, profunde dentata, & pene semipinnata, glabra. Calyx tubulosus, cuius duo folia deorsum gibba sunt.

Peta-

Petala longo ungue, bractea ovali, lutea. Stamina duo valde breviora. Siliqua gracilis, cylindrica, cornu solidio, lineam longo, fungosa spongiola coronato. Semen flavum, compressum, ovale.

Hespetis angustifolia, incana, floribus amplis, luteis, siliquis longioribus AMM. n. 76. *Leuceji lutei sylvestris species* THAL. p. 69. *Leucojum sylvestre* CLUS. Pannon. p. 338. Neglecta nuperis planta, caule recto, vix ramoso, foliis lingulatis, asperis, diversissima a planta, quam in *Emm. Stirp. Helv.* p. 563. descripsi, a qua aliquot synonyma removere oportet. Legi in M. Altenstolberg, in rupibus seleniticis, & in saxis ad Hohenstein M. HOFMANNUS.

H. *Sinapistrum Indicum*, pentaphyllum, flore carneo, spinosum HERM. *Lupinus Arabicus* PON. Bald. p. 102. *Cleome floribus gynandris* LINN. Hort. Cliff. *Sinapistrum RIV.* T. 75. Calyx quadrifolius, acutus. Petala quatuor ochroleuca, aut pallidissime carnea, ovata, petiolata. Siliqua in longo petiolo, ex quo ad unciam super petala nascuntur sex stamina, praelongis filamentis. Siliqua quadrangula terminatur disco fungiformi. Etiam super stamina non ovarium, sed petiolus est, ut stamina infra imum ortum siliquae nascantur. r.

H. *Cleome floribus dodecandris* LINN. *Sinapistrum Lusitanicum, triphyllum, siliqua maxima, flore albo* I. R. H. Flos

Flos difformis. Calycis foliola tria, ovato lanceolata, cava, minora, ut tamen majus sit, quod opponitur maximo, imum vero quartum maximum, purpurascens. Petala etiam minora sunt ad minus foliolum, majora ad majus, omnia petiolata, alba, emarginata, ferrata. Siliqua & stamna ex intervallo petalorum minorum, decem, orta ex basi siliquae, apicibus compressis, ovatis. Siliqua teres, hirsuta, compressa, stylo linearis, obtuse bifido. Semina numerosissima. r.

H. Cleome floribus hexandriis, genitalibus declinatis siliquis subulatis LINN. *Sinapistrum Lusitanicum, triphyllum, flore rubro, siliquis corniculatis* I. R. H. Calyx quadrifolius, foliis lateralibus minoribus. Petala quatuor in inferiori semicirculo grandem hiatum relinquunt. Duo erecta extus rufofusca, intus flaventia, duo horizontalia sunt, latiora etiam, intus purpurea. Ad originem petalorum superiorum tres globuli spongiosi, virides. Stamina sex, a basi siliquae orta. Ea exit per intervallum interiorius inter stamina. Tuba subrotunda.

H. Petiveria PLUM. LINN. Calycis folium unicum, latum, triangulare, cum duabus lateralibus spinulis. Flores petala quatuor, alba, elliptica, oblonga, in parte inferiori posita. ut superne nullum sit. Stamina sex, apicibus sagittatis. Fructus nobis nondum maturuit.

PAPILIONACEAE.

Astragalus ex alis spicifer, siliqua ovali, turgida, styli-
fera Enum. Helv. p. 568. *Astragalus lutens*, perennis, sili-
qua gemella, rotunda, vesicam referente I. R. H. Glaux
RIV. T. 108. Circa Jenam & in M. Fuchsberg abunde.
Etiam ex Sibiria.

H. *Astragalus Hispanica*, siliquis epiglottidis forma ma-
jori Hort. Lugd. Bat. p. 75. bene. *Glaux Hispanica* RIV.
T. 109.

H. *Astragalus annuus*, angustifolius, flosculis subcaeruleis,
cauliculis adhaerentibus GARIDEL ic. 12. *Vicia se-
samacea, apula* COL. p. 301. *Monspelii*.

H. *Astragalus procerior*, non repens, flore ex viridi
flavescente H. Elth. p. 46. f. 45. *Astragalus Canadensis*
RIV. T. 104. *Astragalus Canadensis*, flore viridi flavescente
MARCHANT. p. 257. aut idem, aut proximus. In Cana-
da, *Virginia*. r.

H. *Astragalus caule eretto*, ex alis spicifero, siliquis
teretibus, hirsutis Comment. Gott. 1752. *Astragalus villo-
sus, erectus, floribus flavescensibus* AMMAN. n. 166. Folia
elliptica, lanceolata, hirsuta. Florum spica densa. Calyx
albus, hirsutus. Petala ochroleuca. Siliqua hirsutie in-
cana, teres, angusta. Semina inaequaliter reniformia. Ex
Sibiria.

Astragalus caule ramoso, procumbente, foliis ovatis
Enum. Helv. p. 565. *Astragalus* RIV. T. 103. *Astragalus*

PAPILIONACEAE.

luteus, perennis, procumbens, vulgaris sive sylvestris I. R. H.
In pratis & sylvis abunde.

H. Astragalus triangularis MUNT. ic. p. 110. bene.
Astragalus Baeticus RIV. T. 105. Securidaca di Salamanca
ZANONI T. 25. n. 34.

H. Astragalus siliquis recurvis, depressis, hirsutis
Comment. Gott. 1752. Ex Persico semine. Parum erectus
foliis acute emarginatis, hirsutis, florum spica brevi, al-
bida, subpurpurea, siliqua in se ipsam recurva, linea divi-
sa, nigra, hirsuta, grandi pro floris portione.

H. Astragalus luteus, annuus, Monspeliacus, procum-
bens I.R.H. *Astragalus siliqua curva* RIV. T. 107. *Hedysarum*
alterum DOD. Cereal. p. 160. *Monspelii.*

H. Astragalus fruticosus, Viciae folio BUXBAUM
Cent. III.

H. Astragalus pedunculis radicatis, hirsutissimis, folio-
lis ex ovato acutis, saepe imbricatis MARTINI.

H. Astragalus pedunculis folio supparibus, floribus pen-
dulis, siliquis erectis & longis, parum compressis
MARTINI.

H. Astragalus hirsutus, caule erecto, pedunculis folio
longioribus MARTINI.

H. Astragalus caulis erectis, ramosissimis, pedunculis
folio longioribus, floribus laxis MARTINI. Hi quinque
hoc anno provenerunt, & nondum flores explicuerunt.

H. Pelecinus I. R. H. *Utrinque serrata* RIV. T. 101.
In Gallia calidiori, Italia.

H. Api-

H. Apios Americana CORNUT p. 201. RIV. T. 165:
Glans terrestris, Americana MUNTING ic. 107. In *Virginia, Canada.*

H. Psoralea foliis pinnatis, foliolis linearibus, acuminatis ROYEN. *Genistae affinis arbor Africana*, monospermos, flore caeruleo, foliis pinnatis HERM. Hort. Lugd. Bat. *Spartium Africanum* RIVIN. tetravp. irreg. T. 5. r.

Valnetaria foliis ad terram simplicibus, ovatis, ad caulem pinnatis Ennem. Helv. p. 570. *Vulneraria rustică* GESN. Hort. p. 227. In M: Heymberg aridis &c.

β. Flore flavo.

H. *Vulneraria* supinas flore coccineo DILL. Hort. Elb. T. 320. In agrō Berrienſi, in *Alpibus Valesiacis*. Flos albidus, rostro purpureo. Varietas prioris.

H. *Vulneraria* pentaphylloides. *Anthyllis Hispanica* RIV. T. 18. *Anthyllis vesicaria, Hispanica* MUNTING. f. 101. *Trifolium halicacabum* CAMER. Hort. ic. 47.

H. *Vulneraria* foliis ternatis, floribus umbellatis. *Trifolium bituminosum* RIV. T. 14. *Trifolium bituminosum, inodorum* AICHST. Aest. Ord. X. T. 11. f. 2. *Trifolium asphaltites* CAMER. Epit. p. 581. In *Hetruria, Minorca, Italia.* Sub umbella folia tria digitata.

H. *Vulneraria* foliis pinnatis, sericeis, nitentibus Barba Jovis RIVIN. T. 4. irreg. tetravp. Barba Jovis retentior MUNT. f. 53. Convenit silicula monosperma. Stamina omnia decimū connata sunt.

H. Dorycnium Hispanicum CLUS. *bis p. 202*, *Enum. Helv. p. 570.* In agro Veronensi, Provincia, Rhactia, Hispania, Minorca, Monspelii.

H. Lotus tetragonolobos, flore rubro RIV. T. 80. *Lotus pulcherrima, tetragonolobos* CAMER. *ic. 26.*

Lotus scapo unifloro, procumbente, siliquis quadrangleulis, alatis. *Enum. Helv. p. 571.* *Lotus tetragonolobos* RIV. T. 39. Circa Langensalze, circa Altenbergen Thuringiae. In *Helvetiae* pratis uidis frequens

Lotus siliqua gemina, peregrinus. BOERH. Flos unus vel duo. Calycis duo segmenta superiora longa, separata a tribus inferioribus. Flos flavus. Vexillum angustum, petiolatum, plicatum, ovata bractea, intus fuscis lineis pictam. Alae carina longiores, argutis auriculis, bractea oblique ovali. Carina bipes, rostro argutissimo, caeruleo. Siliqua ad utramque valvae commissuram duabus membranulis percursa. Tuba sub fine latescens. Semina ovato compressa.

H. *Lotus villosus*, flore altissimo, glomerato I. R. H. *Lotus Libyca* RIVIN. T. 73. In Palaestina. Flores minimi, albo purpurei. Calyx ex purpura pallet.

H. *Lotus pentaphyllos*, siliquosus, villosus I. R. H. *Lotus haemorrhoidalis*, flore albo & suave rubente BARR. *ic. 1033.* *Lotus incana* RIV. T. 77. Monspelii. Calyx villosus, denticulis quatuor sursum curvis, imo rectiori, longiori. Flores calyce parum longiores. Vexillum stria-

tum

tum, plicatum, ungue lato, cavo, flore albo subrubello; alae auriculatae, bractea ovali. Carina bipes, alis brevior, rostro fusco. Tuba globulo terminata. Siliqua inflata, teres, erecta, spadicea. Semina octo & ultra, breviter reniformia

Lotus floribus umbellatis, siliquis pendulis, caule erecto
Enum. Helv. p. 571. Lotus RIV. T. 76. In sylvis und an
Sträuchen unter der Papiermühle, am Kowender Galgen. A
sequente diversum esse, non satis adfirmo.

Lotus floribus umbellatis, siliquis pendulis, caule pro-
cumbente Enum. Helv. p. 572. Lotus sive Melilotus pen-
taphyllos, minor, glabra C. B. Ad vias ubique.

H. *Lotus oligoceratos*, Cretica, lutea, siliquis longis, erectis MORIS. *Loto sylvestre di Dioscoride PONA Bald.* p. 153. Calyx tubulosus. Duo segmenta superiora recurva, tria inferiora recta, medium longissimum. Flos flavus. Petalum superius gracili petiolo, orbiculatum, intus fuscis striis pictum. Alae carina longiores, auriculis brevibus obtusis. Carina bipes, argutissima, ut in omnibus Lotis. Siliqua teres, gracilis, septis cellulosis numerosis distincta. Semina lenticulata.

H. *Lotus polyceratos*, fruticosa, Cretica, argentea, siliquis longissimis, propendentibus, rectis H. OX. II. p. 177. r.

H. *Lotus angustifolia*, flore luteo, purpurascente, Insulae S. Jacobi H. Amst. II. c. 83.

H. *Lotus Ornithopodii siliquis* I. R. H. *Lotus peculiaris*,
siliquis Ornithopodii CAMER. *bort. ic. XXV. Lotus, siliqua*
arcuata RIV. T. 76.

Ornithopodium foliis pinnatis, siliquis articulatis,
 levioribus Enüm. *Helv.* p. 572. *Ornithopodium*, *Polygala*
Dioscoridis LOEEL. ie. II. p. 81. In arenosis versus *Cel-*
lam abunde. Minima foliola, siliquae distinctis & paucioribus ovatis, rugosis, articulis factae, in unguem brevem
 terminatae.

H. *Ornithopodium scorpioides*, *siliqua compressa* I. R. H.
Ornithopodium atyonepteron MORIS. p. 125. S. II. T. 10.
 f. 15. *Scorpioides leguminosa* LOB. II. p. 95. I. B. II. p.
 349. In *Italia. Monspelii.* Folia mollia, pinnata. Flores
 flavi. Siliquae longae, incurvae, articulis minus distinctis,
 venosis, hirsutulis, pene ovatis, fine in uncum longum
 exente.

H. *Ornithopodium* siliquis semicircularibus, levissimis.
 Siliqua penitus absque articulis, semicircularis, curva, ae-
 quabilis, cinerea, longis articulis, & duris striatisque.
 Folia pinnata. Vexillum bicorne, flavum, lineis aurantiis
 varium. Calycis dens superior valde brevis, profunde in-
 cisis, a reliquis non valde separatus. Alae & carina ob-
 tusa, fissilis ista & bipes. Tubae apex globosus.

H. *Ornithopodium Portulacae folio* I. R. H.

Ferrum equinum, siliquis umbellatis, utrinque emarginatis *Enum.* *Helv.* p. 573. *Ferrum equinum*, *Germanicum*, siliquis in summitate C. B. *Ferrum equinum*, capitatum **COLUMN.** p. 301. Passim in aridis, ut in monte, qui ad sinistra viae *Rohringensis* est, & prope *Pleisse*.

H. *Ferrum equinum*, siliquis solitariis, utrinque exscisis. *Ferrum equinum* RIV. T. 97. *Ferrum equinum vulgare* **COLUMN.** *Ecpbras.* p. 300. *Ferrum equinum*, siliqua singulari **GARIDELL.** T. 114. In *Italia*.

H. *Scorpioides* siliqua crassa. *Campoides* RIV. T. 96.

H. *Scorpioides* *Bupleuri* folio, corniculis asperis, magis in se contortis **MOR.** **GARIDELL.** T. 20. *Clymenum* **COLUMN.** *Ecpbras.* p. 656.

H. *Scorpioides* *Bupleuri* folio, corniculis asperis, minus contortis I. R. H. *Campoides* siliqua *hispida* RIV. T. 96.

H. *Scorpioides* *Bupleuri* folio, siliquis lenibus. r.

H. *Scorpioides* siliqua *cochleata* & *striata*, *Olyssippo-*
nensis I. R. H.

H. *Aeschynomene* caule *hispido*, foliis acuminatis, leguminum articulis suborbicularibus ROY. *Hedysarum*, caule *hirsuto*, *Mimosae* foliis, alatis, pinnis acutis, minimis, gramineis **SLOANE** *Journ.* to *Jamaic* I. p. 186. T. 112. f. 3. Sub flore duo foliola ovato lanceolata, serrata. Calyx bivalvis. Valva superior bifida, pallens, inferior trifida, dente medio minore. Vexilli petiolus brevis & incurvus,

caeterum alis aquale est, pallerque, lineis in dorso rubris pictum. Alae petiolo brevi, auriculis retrorsum euntibus, longis, bractea ovata, linea purpurea majori distincta. Carina breviter bipes, appendicibus proximis, mucrone longo, acuto. Vagina staminum fissilis in duos petiolos, singulum pentastemonem. Stamina quinque longiora, quinque breviora. Siliqua nunc inflexa, hirsuta, mucrone simplici, matura articulata, articulis sex septemve reniformibus, crassis, Semen magnum, reniforme, virescens. r.

H. *Hedysarum spinosum*, foliis ellipticis, solitariis.
Alkagi Maurorum TOURN. Cor. RAUWOLF. p. 94.

H. *Hedysarum Hispanicum*, supinum, annuum, angustifolium, floribus parvis, ex albo purpurascens SALVADORE apud BOERH.

H. *Hedysarum clypeatum*, flore suaviter rubente AICHST. Aest. Ord. XIII. T. 2. f. 1. *Hedysarum* RIV. T. 93. Icon exstat Bresl, Samml. 1718. M. Sept. In Italia, Toscana &c.

β Flore albo.

H. *Hedysarum annum*, siliqua aspera, undulata, intorta TOURN. *Hedysarum siliquis undulatis* RIV. T. 99. *Hedysarum clypeatum, minus, saeva rubens* BARR. ic. 1180. In Italia.

Onobrychis spicis densioribus, siliquis asperis. Ennunt. Helv. p. 577. *Onobrychis* RIV. T. 2. DOD. Cereal. p. 166. Onobry-

Onobrychis foliis *Viciae*, fructu echinato, major C. B. In *Alpibus Helveticis, Rhaeticis*. Passim ad vias aridas, apri-
cas Germaniae, circa Jenam, Wormatiam.

H. *Onobrychis* spicis rarioribus, siliquis aculeatis. *O-*
nobrychis Cretica, foliis *Viciae*, fructu magno, cri-
stato & aculeato Tourn. Caput gallinaceum,
minus C. B. Prodr. p. 149. In *Gallia calidio-*
ri. Spica florens brevis. Calycis segmenta arguta,
latiuscula, Flos parvus, purpureus. Vexillum plicatum,
lineatum. Alae carina breviores, obtusae, longis auricu-
lis. Carina obtuso rostro. Siliqua longe major, quam
priori, articulo unico, non solum per externum marginem
denticulato, sed in tota superficie alveolato, alveolorum
areis in spinam exeuntibus.

H. *Glycyrrhiza* RIV. tetrap. irreg. T. 64. *Glycyrrhiza*
vulgaris DOD. Coron. p. 66. In *Tartaria, Persia ad Ti-*
grim, circa Astracan, Damasci, in Podolia.

H. *Sephora* LINN. *Ervum Aiopecuroides*, perennē, *O-*
rientale, fructu longissimo DILL. Hort. Eltb. T. 112. In-
digo Georgiae & Carolinae, quod ajunt vera Indigo me-
lius esse (KALM.)

H. *Corallodendron*. *Arbor Coral Americana* H. AMST.
I. n. 108.. *Muricu* H. MAL. T. VI, tab. 7. *Arbuscula Co-*
rallii FERRAR. flor. p. 381. In *America, Amboina*
RUMPF L. III, c. 33.

H. Galega BLAKWELL. T. 92. MATTH. p. 739. Flore albo.

β. Flore subcaeruleo.

In Rhaetia, Italia, Hibernia, Palaestina; ad Euphratem
RAUWOLF.

H. Coronilla frutescens; siliquis longissimis, obscure
articulatis ENUM. HELV. p. 575. Coronilla major RIVIN.
T. 95. Emerus I. R. H. Veronae, Monspelii. In Hel-
vetiae montosis.

H. Coronilla Hispanica, frutescens, major BOERH.
Polygala Valentina I. CLUS. hip. p. 197. Coronilla RIV.
T. 92. Monspelii. Stipulae magnae ad ortum ramorunt.
Habitus glaucus, flores flavi, faetentas.

H. Coronilla - - - Diversa stipularum defecru, caule
nudo - - Non floruit.

Coronilla montana RIV. T. 93. Colutea scorpiois
des altera CLUS. Pannov. p. 96. In Helvetia au roc Mille
deux, au rocher du Corbeau entre Boisbau & la Sagne. In
M. Klinzberg, in collibus Austriae: Folia novem & un-
decim, ovata, nervo in spinulam exente, emarginata
vel retusa, glabra & glauca. Caulis erectus, cubitalis. Umbel-
lae in summo florum quatuordecim. Calyx campaniformis,
diformis. Superiora duo segmenta sibi vicina, inferiora
triangulata, imum longissimum. Vexillum a reliquis
petalis separatum; reflexum. Alae loco aurum habent
appendicem obtusam; carina longiores. Ista arguta &
longa. Siliqua articulata, articulis angulosis, distinetis,
non semper monospermis. Semen ovato triquetram.

Cor-

Coronilla herbacea, flore vario Enn. *Helv.* p. 574.
C. B. supplm. flor. Pruss. T. I. Securidaca altera I. CLUS.
Pann. p. 478. In segetibus *Tbingiae*. Siliquae plerumque imperfectae, unico & duobus articulis

H. Coronilla Cretica, herbacea, flore parvo, purpureo-ascente I. R. *H. Siliquae longae*, articulatae. Flores Priori longe minores. r.

H. Colutea Ennum *Helv.* p. 575. MATTH. p. 783.
Colutea vesicaria I. B. I. R. H. SABBATI plant. Roman. Veronae, Neocomi in *Helvetia*, in *Palæstina*.

H. Colutea Aethiopica, Barbae Joyis folio, flore phoeniceo I. R. H. *Colutea Aethiopica*. RIV. T. 21. *Colutea Aethiopicas* flore purpureo BREYN. Cent. p. 29, *Colutea vesicaria*, *Aethiopica* MUNTING. f. 44.

H. Colutea Africana, annua, vesiculis compressis, foliis parvis, mucronatis & cordatis COMM. H. Amst. II. p. 44. *Colutea Africana*, *vesicaria*, *vesiculis compressis*, *floribus atrorubentibus* VOLC. flor. p. 118.

H. Securidaca RIV. T. 83. *Ennum*. *Helv.* p. 576. *Securidaca lutea*, major C. B. *Hedysarum* I. DOD. *Cereal.* p. 159. In *Italia*.

H. Pseudoacacia RIV. T. 63. *Pseudoacacia vulgaris* SE. BA T. XV. f. 1. *Acacia Americana Robini* CORNUT. p. 173. *Robinia aculeis geminatis* CLIFF. *Acacia de l'Amerique*

CHAB.

CHARLEVOIX n. 18. 9. In *Virginia*, & nunc passim
in areis ante domos,

H. *Lupinus* flore caeruleo, vel rubro RIV. T. 27. *Lupinus exoticus*, *hirsutissimus* L. B. II. p. 89.

H. *Lupinus sativus*, major, flore purpureo AICHST.
I. c. f. I. *Monspelii*. Calycis duo superiora segmenta ad
se invicem conversa, accessoria duo,imum acutum, tri-
dentatum. Stamina decem connata, quinque longiora
& totidem breviora.

H. *Lupinus* flore albo CLUS. CCXXIIX. RIVIN. T.
25. *Lupinus sativus* DOD. Cereal. p. 123. Calycis seg-
menta duo, superius breviter incisum, inferius tridenta-
tum. Stamina decem connata.

H. *Lupinus* flore caeruleo, minore RIV. T. 28. *Lupinus sylvestris*, foliis angustioribus CAMER. Epit. p. 217.
Lupinus Indicus CORNUT. p. 207. Calycis segmenta
duo superiora & inferius tridentatum. Semen scabrum.

H. *Lupinus sylvestris*, flore luteo RIVIN. T. 26. CA-
MER. Epit. p. 217. *Monspelii*. Calycis folia superiora duo
distincta, inferius tridentatum, lateralia accessoria. Stami-
na connata.

H. *Phaseolus* puniceo flore CORNUT. p. 185. CHAR-
LEVOIX n. 87.

H. Phaseolus vulgaris. *Phaseolus* DOD. *Cereal* p. 99.
CAMER. *Epit.* Mire ludit colore seiminis & mole, se-
mine luteo, rufo, nigro, maculato majori, albo & caeru-
leo, albo & variegato, nigro & rubro.

H. Phaseolus flore subrubello, semine caeruleo nigre-
scente. Distincta planta a priori, Duo foliola ad
calycem accessoria minora, quam phaseolis vulgaribus. Ca-
lyx campaniformis, superiori segmento inciso, inferiori-
bus triangulis. Vexillum viride, reflexum, incisum, un-
gue perbrevi. Alae brevissimo filamento, & arcu, albae,
amplae, ovatae, rectae, etiam unius coloris. Carina coch-
leata, sessilis. Stamen decimum distinctum. Vagina
curva. Tuba simplex. Fruktus latus, incurvus, granulis
in superiori linea notatus. Semen cervine rubellum, striis
non distinctis varium, hortensibus latius.

H. Phaseolus - - - In *Virginia* ad ripas maris. Caly-
cis segmentum superius simplex, magnum, triangulare,
accessoria duo. Flos colore isabelle. Vexillum amplum,
absque tumoribus, reliqua petala comprehendens. Alae
parvae. Carinae principium aniplum, bipes, finis falca-
tus, violaceus, sensim in cochleam contortus. Semen ci-
nereo varium, basi plana, hilo albo, cylindri portioni
simile.

H. Phaseolus Americanus, flore cochleato, odorato,
vulgo Caracalla. *Phaseolus Indicus*, flore cochleato
TRIUMPH.

TRIUMPH. Observ. 92. 93. Calyx tubulosus, cylindricus, dentibus brevibus, latis, pelluentibus. Vexillum aliquoties repetito in cochleam flexum reliqua petala continet, & album est, violae colore adspersum. r.

H. Dolichos siliquis latissimis, superne verrucosis. *Phaseolus Aegyptiacus*, semine nigro I.R.H. *Phaseolus niger lablab* P. Alp. Aeg. p. 75. Calycis segmentum supremum crassum, breviter incisum, firmissimum, remotum a tribus inferioribus rectis. Folia duo accessoria calycis, ut in Lupinis. Flos durus/firmusque. Bractea vexilli lata, plicata, cordiformis, subrecta, validissimis tumoribus reliqua petala comprehendit, ibique duabus maculis inscribitur. Alae pene quadratae, amplae, carina longiores, purpureae. Carina tipes, longissimo mucrone, obtuso violaceo tumore notata. Siliqua lata, in commissura superiori latior, granulosa. Semen latum, magnum, nigrum, albo arcu pictum, compressum.

β *Phaseolus Aegyptiacus*, semine rufo C. B. flore albo.

H. Dolichos siliquis angustis, sursum rigentibus. *Phaseolus orthocarpos* RIVIN. T. 32. Calycis dentes quinque, superiores duo ad se invicem conversi, inferiores rectiores. Tubus cylindricus, compressus. Vexillum amplum, plicatum, extus sublateum, intus violaceum. Alae carinae aequales, hamis brevibus, magnae, violaceae. Carina profunde rostrata, fine

fine semibipes. Tuba sub apice lato & barbata. Siliqua erecta, rigens, teres. Semina reniformia, longiora. Variat semine flavescente & semine violaceo.

H. Dolichos caule perenni, lignoso *Hort. Cliff.* T. 20. Calycis foliola duo accessoria. Verus calyx superius excisus, inferius tribus latiusculis dentibus divisus. Vexillum latum, emarginatum, reliqua petala suis tumoribus castigat, inter quos peculiaris sulcus est. Color roseus & unguis cordiformis, albus. Alae carinae aequales, petiolatae, fine ovali, hamis rectangulis. Carina lata, hamis brevibus & in principio latis, rostro acutiusculo, violaceo. Vagina firma. Siliqua longa, polysperma, paucim curva. Tuba erecta, sub apice barbata. Semen ex ovato compressum, hilo albo, nigro & cinereo maculatum. r.

H. Dolichos volubilis annuus. *Bona vista* LIGON. HUGHES p. 216. *Phaseolus maximus*, perennis, floribus spicatis, albis, speciosis, siliquis levibus. latis, semen album, hilo albido fere circumdante SLOANE *Jamaic.* I. p. 177. T. 133. f. 1. 2. 3. Flos albus. Calycis segmentum superius argute bicorne, inferiora triangula, accessoria duo. Vexillum latum, emarginatum, magnis tumoribus reliqua petala comprehendit. Alae amplae, carina longiores, brevibus hamis. Carina angusta, ad angulum rectum flexa, fine acuminato. Stamen unum latissimum & novem connata. Tuba sub finem latescens.

compressa. Siliqua lata, absque alis. Semen amplum, ovatuir, album, hilo albo.

H. *Foenum graecum*, siliquis ensiformibus. *Foenum graecum* RIV. T. 81. CAM. Epit. p. 199. bene.

H. *Foenum graecum*, siliquis linis, angustis, obtuse flexis. *Foenum graecum*, *sylvestre*, alterum DODON. Pempt. p. 547. Siliqua longa, venosa, gracilis, paulum curva. Semina ovata, lata. Siliquae geminae uno ex loco prodeunt, vix plures.

H. *Foenum graecum*, siliquis quinisis, longis, semicircularibus. *Foenum graecum*, *sylvestre*, *polyceration*, *minus*, *Cræticum* BREYNE Cent. I. T. 33. *Hedysarum minus*, *torosa* siliqua BARR. ic. 257. Siliqua venosa, semicircularis, lauior quam primae speciei. Semina cylindrica, grandiora. Siliquae quatuor, aut quinque ex uno loco.

H. *Foenum graecum*, siliquis numerosis, sessilibus, incurvis. *Foenum graecum*, *polyceration* RIV. T. 82. *Securidaceae genus triphyllum* I. B. II. p. 373. *Foenum graecum*, *sylvestre*, *minus*, *Monspeliacum* BREYNE T. 33. Centur. I. Siliquae multae ex uno loco, radiatae, sessiles, breviores inter reliquas, venosae, curvae, robustae.

H. *Foenum graecum*, siliquis spicatis, incurvis. *Melilotus corniculis reflexis*, *major* I. R. H., *Melilotus Italica*, *folliculis recurvis* I. B. II. p. 322.

)

H. Me-

H. *Medicago trifolia*, frutescens, incana I. R. H. *Falcata incana* RIV. T. 85. *Cytisus Maranthae* LOB. II. p. 46. MARTYN. *Georg.* p. 232, qui pro vero *Cytiso* veterum habet. In regno Neapolitana, alibique in calidis regionibus. Siliqua venosa, dura, orbicularis, sed hilo rotundo excisa. A reliquis Medicis etiam calyce lato, latisque triangularibus segmentis inciso differt.

H. *Medica* foliis pinnatis, extrema pinna maxima. *Medicago Vulnerariae* facie, *Hispanica* I. R. H. *Annicula muris* CAMER. *hort.* ic. 8. *Falcata* foliis *Anthyllidis* RIV. T. 87. Siliqua ovata, reniformis, semel flexa, per oram brevissime radiata.

H. *Medica* siliqua reniformi, ciliata, amplissima I. R. H. *Lunaria radiata Italorum* LOB. II. p. 39.

Medica floribus racemosis, siliquis incurvis, monospermis *Enum. Helv.* p. 579. *Melilotus minima* RIVIN. T. 8.

Medica caule procumbente, siliqua semel inflexa, floribus racemosis *Enum. Helv.* p. 579. *Falcata* RIV. T. 84. Ubique in pratis, in ipsa urbe in coemiteriis. Siliquae parum curvae, longo filo terminatae.

H. *Medica* fructu orbiculato, conpresso, piano RIV. T. 88. *Trifolium cochleatum* DOD. *Cereal.* p. 206. *Medica cochleata*, *major*, *dicarpos*, *capsula fructus* *conpressa*, *nigra*, *plana*, *oris crispis* MOR. II. p. 152. & n. 1. Gyri tres magni, duo mediocres, duo minimi, omnes lati, compressi, & totus fructus minime crassus. Semina in

centro fructus, multo suis valvulis minora. *Monspelii.*

H. *Medica caule erecto, floribus spicatis, siliquis repetito intortis, glabris* *Enum. Helv.* p. 578. *Medica* DOD. *Cereal.* p. 209. *Luserne SPECT. de la Natur.* III. p. 26. Flore violaceo & flavo variat, & in *Helvetiae calidioribus*, in agro *Veronensi* nascitur, & prope *Wormatiem*.

H. *Medica fructu tornatili* RIV. T. 88. Fructus cylindricus, gyros perfecte aequales leves habet ad quinque usque, cum uno minori.

H. *Medica fructu scutellato* RIV. T. 88. MOR. T. 15, f. 3. *Monspelii.* Gyri sex & ultra, in speciem coni contorti, medio maximo, ut extremos comprehendat, a primis, ut glans in cupula, receptus Flores solitarii.

H. *Medica fructu turbinato* RIV. T. 88. Fructus ova-
tus, gyris sibi vicinissimis, nigris, extremis minoribus,
mediis instar dolii paulo latioribus, circiter sex. Flores
solitarii.

H. *Medica fructu rugoso* RIV. T. 88. *Medica cochleata*, major, dicarpos, fructus capsula compressa, orbiculata, rugosa, alba MORIS. p. 552. n. & f. 3. Elegans planta, fructu cervini coloris, cylindrico, sed brevi, tribus tantum spiris aut quatuor, filo percursis, ex quo obliquae lineae spirae adhaerentes utrinque exeunt. Totae etiam venulis percurruntur. Flores racemosi.

H. *Medica cochleata*, dicarpos, fructus capsula turbi-
nata, rugosa MOR. T. 15, f. 6. *Medica magna, turbinata*

I. B. II. p. 384. *Fructus ex cylindrico ovalis, trium vel quatuor spirarum, filamento percursarum; ad cujus superiora & inferiora unus utique ordo tuberculorum obtusorum est. Siliquae congestae, habitus glaber. Monspelii.*

H. Medica echinata minor. Cochleata fructu echinato, minori, RIV. T. 88. Hic minimi fructus, spirae duas cum dimidia, planae, venosae; spinulae brevissimae ex medio funiculo, sursum deorsumque directae.

H. Medica coronata, priori similis, sed spiris distantibus, spinis lineam pene longis, sursum & deorsum ad angulos rectilis majoribus emissis. Habitus glaber.

H. Medica coronata, a priori diversissima, spiris tribus in cylindrum dense adunatis, absque intervallis, non venosis, spinis brevibus, rectis & conicis, foliis hirsutis. A Cherleriana etiam differt. Folia hirsuta, rhomboidea, flores gemelli & singuli.

H. Medica frutescens, incana, siliquis cochleatis. Medica lutea, guafalitea marina, nostra e litore Veneto DONAT. p. 63. Medica marina CLUS. hisp. p. 472. Cochleata incana RIV. T. 91. In Hispania & Gallia Narbonensi, & Monspelii, & in Hetruria maritimis. Fructus cylindricus. Spirae tres adunatae; spinis brevibus duorum ordinuntur.

H. Medica fructu turbinato, breviori, brevissime echinato. Videtur Medica cochleata, diarpos, capsula spinosa, rotunda, minore, rarius spinis crassioribus & brevioribus

armata MORIS. p. 153. n. 11. f. 18. *Cochleata fructu echinato, rotundo* RIV. T. 88. *Fructus ovatus, bicuspidatus, subhirsutus, echinatus, spinis alternis, brevibus, argutis. Gyri quinque, praeter imperfectos. Folia hirsuta. Flores solitarii.*

H. *Medica* - - - *Gyri tres maiores, duo minores, ex polygono multilatero tacti, potius quam ex circuli arcubus. Spinae paucae, distantes, breves.*

H. *Medica turbinata, echinata* RIV. T. 88. *Fructus ovato cylindricus, spiris proximis, spinis linea brevioribus, gyris quinque praeter imperfectos.*

H. *Medica fructu turbinato, echinato, rigidior. Cochleata fructu durius echinato* RIV. T. 88, r.

H. *Medica* quae *Cochleata fructu longius echinata* RIV. T. 88. *Trifolium cochleatum* II. DOD. *Fructus ex rotundis compressi, trium gyrorum ad quinque, praeter imperfectos. Spinae linea longiores, perfecte existentes & patulae. Monspelii.*

H. *Medica* foliis oblongis, argute dentatis, fructu globoso, spinoso. *Medica cochleata, dicarpos, capsula spinosa, crassiore, spinulis brevibus & rarius dispositis* MORIS. l. c. n. 13. 14. f. 20. 21. *Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissectis* MAGNOL Bot. monop. p. 271. *Trifolium echinato capite* MARCHANT. p. 313. *Cochleata Syriaca* RIV. T. 91. *Trifolium cochleatum, spinosum, Syriacum, laciniatis foliis* BREYN. Centur. p. 34. *Fructus pene sphaericus, quatuor vel quinque gyrorum, praeter imperfectos,*

feſtos, spinis linea longioribus, patentibus ad angulos obtusos.

H. Medica spinosa, fructu conico truncato, spiris diffi-
tis, quinque ad oculo, praeter duas imperfectas, spinis ex
utroque gyri margine sursum & deorsum euntibus, diuidia
linea brevioribus

H. Medica fructu ovato, angustiori, hirsuto. Siliqua ovalis,
hirsuta, spinis distinctis, post priorem maxima, octo &
ultra gyrorum praeter minores. Spinae ad angulos semi-
rectos extant, & se decussant, rectae, lineam longae. Fo-
lia rhomboidea, non maculata.

H. Medica cochleata, spinosa, major, dicarpos, capsula
seu spinis longioribus, sursum & deorsum tendentibus
MORIS. f. 2. p. 123. n. 8. ic b. 9. a priori diversa fo-
liorum figura rhomboide absque maculis. *Medica fructu*
echinato, maximo RIVIN. T. 88. Fructus ovalis, spinis
curvis, bilinearibus, totus testus, ut spirae abscondantur:
gyri pene octo, conferti, praeter minores. Semina
Phaseoli forma, nigra, maxima. Folia maculosa, sed ma-
culae per aetatem evanescunt. In Anglia passim.

Medicas cochleatas omnes conjungit Cl. LINNAEUS,
diversissimas foliorum figura, serris, glabritie & hirsutie,
fructu, colore demum floris, ut omnino hic ab ejus in-
stituto, caeterum utili, varietates amputandi, nobis re-
cedendum sit. Meterentur propriae disputationi materi-
em praebere. Pleraque autem nascuntur in regionum
calidaruin segetibus, in primis in Sicilia.

H. *Melilotus supina*, latifolia, siliqua lata, compressa
 AMMAN. *Act. Petrop.* Vol. VIII. p. 209. *Comment.*
Gotting. 1751. p. 214. T. 13. *Trigonella LINN.* *Cliff.*
Ex Sibiria.

H. *Melilotus Cretica*, fructu orbiculari, piano, maximo
 I. R. H.

Melilotus foliis erectis, crenatis, spicis reflexis, siliculis
rugosis, *Enum.* *Helv.* p. 587. *Trifolium odoratum*, alterum
 DODON. *Cereal.* p. 200. Flore luteo.

β. Flore albo. *Suendadi nulla* H. MAL. IX. T. 45.
 In agavis passim.

H. *Melilotus* foliis hirsutis, rariter dentatis, scapo paucifloro
Comm. *Gotting.* T. 11. *Meliletus pusilla*, *capsula monosperma* GMEL. Folia longiora quam vulgari *Meliloti*, in apice rariter dentata. Spica rara florum pendulorum. Semina duo in siliqua latiori quam vulgaris *Meliloti*. In *Sibiria*,

H. *Melilotus Italica* RIV. T. 7. CAMER. *bort.* ic. 29.
Melilotus magno semine, *rotundo*, *rugoso* I.B.H. p. 37.

H. *Melilotus* siliquis & floribus minimis, dense spicatis.
Melilotus lutea, *minor*, *floribus* & *siliculis minoribus*, *spicatis* & *dense dispositis* MORIS. II. p. 167. Siliquae minime rugosae, monospermae, flores exigui, in densam spiram conferti.

H. *Melilotus minima*, recta, lutea, siliquis crassis, curvis, in capitulum congestis, semine Focni graeci H. OX. II p. 162, T. 17. f. 9. T. 15. f. 9. *Trifolium fructu racemofo*
 BOC-

BOCCONE Mus. plant. T. 124. Accedit etiam ad Melilotum ejusdem auctoris n. 6. Siliquae majusculæ, rugosæ, hinc convexæ, inde concavæ, semine unico, ovato, hilo exciso.

H. *Melilotus major*, sativa, violacea. *Lotus urbana* AICHST. Aest. Ord. X. T. 10. f. 1. *Melilotus caerulea* RIV. T. 9. *Melilotus di specie singulare* PON. Bald. p. 53. *Trifolium odoratum*; alterum DOD, Cereal, p. 200. In Bohemia, Campania.

Trifolium racemis ovatis, strepentibus, caule diffuso Enn. Helv. p. 580. *Lupulinum* RIV. tetrapt. irreg. T. 10.

Trifolium racemis rarioribus, strepentibus, caule eretto Enn. Helv. p. 581. *Trifolium lupulinum*, alterum, minus RAI. Syn. III. p. 330. T. 14. f. 3. Abunde in pratis um den Westerhofteich, bey Endigehausen.

Trifolium racemis ovatis, strepentibus, maximis, caule eretto Enn. Helv. p. 581. *Trifolium lupulinum*, montanum C. B. Prödr. p. 140. In sylvis, v. g. inter Wehnde & Plesse.

Trifolium caule procumbente, & florigeris & foliosis petiolis longissimis Enn. Helv. p. 581. *Trifolium pratense*, flore albo, minus, & feminâ glabrum I. R. H. *Trifolium repens* RIVIN: T. 13. Varietates innumerabiles MICHELIUS habet, varias foliorum figura & maculis, & seminum numero, & foliis quaternis, & capite viviparo.

Trifolium spicis ovatis, calycibus sericeis, inflatis Enn.
Helv. p. 582. Trifolium nostras, purpureum, folio oblongo
VAILL. T. 22. t. 2. In prato Paradies & ad Leinam ge-
gen die Maschmühle. Etiam inmatrūm roseo capitulo,
compacto, & calycibus sericeis, nitentibus adgnoscitur.
Mature calyx inflatur, pars superior fit globosa, maxima,
reticulata, tenera, inferiori interim vix excrescente.

H. *Trifolium pratense, folliculatum I. R. H. Trifoli-*
xm Salmanticum CLUS. hisp. p. 73. Monspelii, in His-
pania.

H. *Trifolium spicis ovatis, calycibus inflatis, glabris,*
quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis
Cliff. non vero synonyma. Trifolium enim capite spinoso,
levi, flore luteo est. Circa Harwich. Capitulum sessile.
Calyx glaber, superne lineatus, segmentis glabiis, longis,
acutis, per maturitatem ampulosus. Flos monopetalos,
longus striatusque, ut solent, pallide rubellus.

H. *Trifolium spicis ovatis, lacinia caly. is infima ma-*
xima, foliis petiolatis ROYEN. Trifolium clypeatum, ar-
genteum. P. ALP. exot. p. 306. MORIS. S. II. T. 24.
Calycis figura singularis. Dentes superiores breves, duo
mediocres, imus vomeri similis, cavus, longissimus, ovato
Janceolatus, perpendicularis. Flos monopetalos.

Trifolium spicis villosis, foliis insidentibus, vaginarum
caudis capillaceis Enn. Helv. p. 585. Trifolium pratense
DOD. Cereal. p. 186.

β. Varietas ejus est fistulosis caulis, mollior, quae passim ob pululum seritur. Autre espece de trefle SPECT. de la Nature III. p. 26. Conf. DALIBARD flor. Par. p. 226.

Trifolium spicis villosis, foliis insidentibus, vaginarum caudis latioribus Enum. Helv. p. 585. Trifolium montanum, purpureum C. B. Folia longiora, firmiora, vaginae caudae non capillaceae. In sylvis.

H. Trifolium spicis ovatis, pilosis, dentibus calycinis lanceolatis, patulis LINN. Trifolium stellatum C. B. Trifolium stellatum, purpureum I. B. II. p. 376. Monspelii. In Hetruria ad M. Lustum. Calycis omnes dentes plumosi, praelongi. Flos monopetalos. Folliculus ovalis, monospermus, calyce reconditur.

Trifolium spicis villosis, calyce ejusque denticulis plumbosis Enum. Helv. p. 583. Trifolium arvense, humile, spicatum, sive Lagopus C. B. Lagopus angustifolia, minor, erectior BARRELIER ic. 901. Ubique in agris,

H. Trifolium foliis subrotundis, spicis villosis, calyce tomentoso Enum. Helv. p. 584. Trifolium spica subrotunda, rubra I. R. H. Lagopus latifolius RIVIN. T. 17. Monspelii & in regionibus calidis.

Trifolium spicis villosis, calyce glabro, denticulis villosis, imo longissimo. Enum. Helv. p. 584. Cytisus TRAG. p. 601. Trifolium montanum, spica longissima, rubente C. B. In agro Veronensi, Monspelii. In Helvetia. Jenae passim v. g. inter Cospida & Mühlenthal.

Trifoli-

Trifolium caule erecto, spicis albis brevibusque terminato, foliis nervosis, inferne subhirsutis Enum. Helv. p. 583. n. 8. Trifolium flore albo RIVIN. T. II. In pratibus, im Hessendreisch.

H. *Trifolium foliis quinis, ciliatis. Lupinaster floribus purpureis, siliquis mindribus MART. n. 107. In Sibiria.*

β. IDEM flore albo,

Anonis floribus pené sessilibus, vaginis foliorum amplissimis, ramis spina terminatis Enum. Helv. p. 589. Anonis, Ononis, Resta bovis TAB. p. 528.

β. Flore albo. *An der Leine.*

γ. Spinis destituta; junior.

H. *Anonis alopecuroides, sacula I. R. H. Folia ex vaginis amplissima, rotundiora, brevioribus ferris quam in vulgaris speciei varietate absque spinis. Spicae densiores, ovaiae, foliosae. Calyx profunde quinquefidus, segmentis divergentibus, plumosus, imo longissimo. Vesillum plicatum, emarginatum, alas non comprehendens. Ala strictae, hamis conjunctis. Carina bipes, rostrum pene rectangulum, acutum. Stamina omnia connata. Siliqua teres, hirsuta, turgida. Semen unicum, cordiforme.*

H. *Anonis petiolis longis, unifloris, siliquis pendulis teretibus, hirsutis Enum. Helv. p. 590. Ononis latens CAMER. Epit. p. 444. In agro Veronensi, Stampensi; Valesia, Palaestina POCOCK.*

H. *Anonis petiolis longis, unifloris, siliquis pendulis articulatis, compressis. Anonis siliquis Ornithopodii L. E. H.*

Petioli

Petoli nonnunquam biflori, plerumque uniflori, articulati inflexi, ut in priori.

H. *Crotalaria* foliis ternatis, petiolis nudis LINN,
Crotalaria trifolia RIVIN. T. 22. *Nellia tandala* Cotti
H. MAL. IX. 27. r.

Cytisus foliolis ovato oblongis, racemis simplicibus,
pendulis LINN. *Enum. Helv.* p. 591. *Trifolia arbor*
CORD. p. 187. Circa arcem Grubenhagen aliquot arbo-
res nascuntur, unde nostrae in horto provenerunt.

H. *Aspalathus frutescens*, major, latifolia, cortice au-
reo, annuo AMMAN. n. 283.

H. *Aspalathus* alia *rotundifolia*. Folia perinde qua-
terna, sed latiora & breviora. Nondum floruit.

H. *Aspalathus arborescens*, pinnulis feliorum crebris
oblongis AMMAN, n. 285. Omnes in Sibiria.

Genista inermis, foliis confertis, ellipticis, acutis, flo-
ribus sessilibus, spicatis *Enum. Helv.* p. 592. *Genista*
tinctoria, *Germanica* I. R. H. In agris sterilibus sylvis-
que.

H. *Genista tinctoria*, frutescens, foliis incanis I. R. H.
Genista tinctoria, *Hispanica* CLUS. hist. p. 101. In reg-
no Murciano r.

H. Ge-

H. *Genista inermis*, caulis teretibus, rariter foliosis. *Genista Hispanica* RIV. T. 66. *Genista transalpina* CAMER. hort. ic. 14. *Monspelii*, in *Toscana*. Circa *Volteram* TARGIONI.

Genista foliorum parte prima cauli adnata, elliptica, altera patente, lanceolata Enum. *Helv.* p. 593. *Chamaegenista altera* CLUS. *Pann.* p. 51. In *sylvis Sueviae*, prope *Scaphusiam*.

Genista inermis, foliis solitariis, hirsutis, spicis foliosis Enum. *Helv.* p. 592. n. 2. *Chamaegenista prima* CLUS. *Pann.* p. 50. Magna copia in *sylva hercynica*, in primis inter *Andreasberg* & *Oderbrücke* & *Schierke*.

Genista foliis ovato lanceolatis, hirsutis, spinis ramosis, in ramis senescentibus Enum. *Helv.* p. 593. *Genista spartium minus Germanicum* I. R. H. *Genistella spinosa* RIV. T. 67. In *sylva ultra Rheinhausen* ad *collem*, indeque in *horto*.

Genista foliis levibus, lanceolatis, solitariis, spinis simplicibus in ramis florigeris. *Genista minor*, *Aspalathoides* C. B. Prodr. p. 157. In *arenosis Cellensibus* versus *Schelplau*. Folia dura, glabra, elliptico lanceolata, arguta, solitaria. Flores sessiles in parte superiori ramosum, quorum inferior pars, dum planta floret, spinas simplices, ad basin foliosas, unciales educit. Flores lutei, hiantes, exigui, rariores quam in priori. Calycis segmenta duo inferiora ad se invicem conversa, inferne recta. Vexillum amplius, reflexum. Alae separatae finibus

nibus adtraetis ad catinam dimidio alis longiorem, ovatam, obtusam. Siliquam non vidi.

Genista inermis, foliis crenatis, ovatis, hirsutis, *Genista* RIVIN. T. 65. Abunde in arenosis *Hassiae* ubique, & circa Blankenburg &c.

Genistas coniunctas reliqui, quarum character difficilimus & diversissime definitus sit. Mihi habitus floris hi-ans, & existentes a reliquis petalis alae, vexillumque reflexum, sufficere videntur.

H. Arachidnoides Americana NISSOLE Memoir de la Acad. des Scienc. 1727. *Four leaved earth nuts* DAMPIER III. p. 449. *Mundubi* PISON. hist. Nat. Ind. L. IV. p. 256. *Katjang Jappon.* RUMPF. L. IX. c. 54. In *Japonia*, *Peruvia* & *Africa* seritur. Flos ad terram solitarius, ex longo petiolo. Calyx breviter tridentatus, in parte superiori medio dente paulum eminente: inferius unica portione longa, perangusta. Vexillum reliqua petala comprehendens, emarginatum. Alae breviter hamatae, fine rotundo. Carina brevis, ad angulum rectum flexa, fine modice acuminato. Siliqua crassa, fungosa, lineis, tuberculis & fossulis distincta, articulata. Intus duo semina, grandia, ovato acuminata. Siliqua simplex, inflexa.

P. Pisum stipulis crenatis LINN. *Pisum* BLAKWELL T. 89. *Pisum majus* DOD. Cereal. p. 102. Varietates flore albo, purpureo, vario RIV. T. 36, 37, 38. B.

β . *Pisum nanum* RIV. T. 39. *Pisum minus*
DOD. Cereal. p. 104.

H. *Pisum petiolis membranaceis, diphyllis* LINN,
Ochrus folio integro, capreolum emitte C. B. *Aracus*
niger MATTH. p. 1424. *Monspelii.*

β . *Varietas nigro semine.*

H. *Lathyrus paribus foliorum quinque, floribus race-*
mosis, siliquis incurvis Comment. Gott. 1752. *Clymen-*
num floribus purpureis, siliquis congestis, articulatis, incur-
vis GERBERI.

H. *Clymenum Hispanicum, folio vario, siliqua articu-*
lata I. R. H. *Lathyrus foliis pinnatis* RIVIN. T. 48.

H. *Clymenum Hispanicum, flore vario, siliqua plana*
DILL. *Folia quaterna.*

Lathyrus foliis senis, linearibus. Clymenum Parisiense,
flore caeruleo. In pratis udis Oberndorfensibus bey Lauche.
In Alsacia supra Blotsheim. LIND.

Lathyrus foliis binatis, acutis, capreolis non ramosis
Enum. Helv. p. 597. *Lathyrus sylvestris, luteus, foliis*
Viciae C. B. *Lathyrus pratensis* RIVIN. T. 43. *In sylvis*
& pratis.

H. *Lathyrus foliis gramineis, binatis, siliquis latis,*
superne alatis Enum. Helv. p. 594. *Lathyrus sativus, flo-*
re frumentique albo I. R. H. *Lathyrus siliqua latiore* RIV.
T. 47. *Seritur in Helvetia, Thuringia & nonnunquam*
Göttingae. β . *Flore*

β. Flore caeruleo. *Lathyrus Aegyptius*, sive *Arenarius Hispanicus* MOR. p. 56. n. 3. *Cicerula Aegyptia* CLUS. CCXXXVI.

γ. ex caeruleo & albo varius.

H. *Lathyrus Hispanicus* RIV. T. 44. *Monspelii* & in *Hispania*. Flos luteus. Semina exasperata.

H. *Lathyrus* flore miniato, siliquis & seminibus maculatis. Flores solitarii. Calyx campaniformis, latis segmentis, maxime supremis. Vexillum breviter petiolatum, emarginatum, crenatum, extus purpuro caeruleum, intus coccineum. Alae carina longiores, coccineae, rugosae, magnis hamis. Carina unipes, lata, brevis, rostro obtuso, ferrugineo. Siliqua lata, plana, superna commissura latiori. Tuba clavata. Semina duabus hedris planis, una convexa, macula angulosa picta.

H. *Lathyrus Orientalis*, flore vix conspicuo BOERH. Flos solitarius sessilis. Calyx tubulosus, segmentis acutis, superioribus brevioribus, distinctis. Flos non longior duabus lineis, pallens, vexillo longo, plicato, striato. Alae carina paulo breviores, hamatae. Carina sessilis, bipes, non rostrata. Tuba sub fine dilatata. Fructus latus, quinque vel sex seminibus ovatis, fuscis plenus. A *Lathyro* flore recedit, sed ab habitu retinetur.

H. *Lathyrus Tingitanus*, siliquis Orobi, flore ampio, ruberrimo MORISON. T. II. p. 55. In *Aegypto* PO-COCK. I. p. 283.

H. *Lathyrus* foliis binatis, elliptico lanceolatis, petiolis bifloris, siliquis hirsutissimis *Enum. Helv.* p. 595. *Lathyrus angustifolius*, siliqua hirsuta I. R. H. *Lathyrus* siliqua hirsuta *RIVIN.* T. 41. In *Helveticae* agris v. g. um Kirchlindach. In Alsacia.

Lathyrus foliis binatis, ellipticis, floribus racemosis *Enum. Helv.* p. 595. *Lathyrus sylvaticus* *RIVIN.* T. 45. In nemore Papenbusch ultra Geismar. In acclivibus M. Lengelerburg. Perennat. Dentes calycis duo superiores recti, intervallo a duobus inferioribus distincti, qui curvi sunt, imusque longissimus. Flores pauciores, minores quam Narbonensi. Vexillum latum, cordiforme, roseum, venosum, extus aurorae colore. Alae ovatae, magnis hamis, purpureae. Carina decolor, unipes, rostro obtuso, plicato, disformi. Siliqua levis, acinacis forma, longa. Semina numerosa, ovato cylindrica, exasperata. Foliis quaternis etiam reperi.

Lathyrus foliis ovatis, binatis, floribus racemosis *Enum. Helv.* p. 596. *Lathyrus latifolius* *GARIDEL* p. 271, icon. 108. Monspelii.

B. Ejus Varietas *angustifolia*. *Lathyrus Narbonensis* *RIVIN.* T. 40. Prope Blankenburg & Wernigerodam. In sylva Welmesē prope Jenam. Calycis duæ foliola inferiora ad se invicem conversa, curva, inferiora recta, imum longissimum. Vexillum amplissimum, emarginatum. Alae carina longiores, auriculatae. Haec rosa, amoena. Flos quam priori major, & plures in ramo.

La-

Lathyrus foliis binatis, ovatis, radice glandulosa
Ennem. Helv. p. 596. *Lathyrus arvensis* RIV. T. 42. *Terae glandes* DOD. *Cereal.* p. 168. *Circa Diemern & ad acclivia M. Heimberg.* Ultra Ermsleben.

H. *Lathyrus distoplatyphyllos*, hirsutus, mollis & odoratus H. A. II. f. 80.

β. Flore ex albo & roseo vario. In Sicilia.

H. *Lathyrus* foliis singularibus. *Nissolia* LIND. *hort.* ad p. 73. *Nissolia minor* BUXBAUM *Cent. III.* n. 45. *Circa Argentoratum & Stampas.* In Anglia.

H. *Lathyrus cirrhosus* aphyllis LINN. *Ennem. Helv.* p. 597. *Aphace* DOD. *Cereal.* p. 157. In *Helvetia, Viennae, Monspelii.*

H. *Vicia* foliis quaternis, ovatis, floribus solitariis, petiolatis. *Clymenum Bithynicum*, *siliqua singulari*, *flore minore* TOURNEF. A reliquis *Lathyris* differt flore striato, calycis segmentis superioribus ad se invicem magis conversis, & siccâ siliquâ. *Lathyro enim calyx amplius*, latis quinque dentibus divisus, vexillum amplum, erectum, flos brevior & latior est. *Stipulae* huic serratae.

H. *Vicia* petiolis inferioribus diphyllis, superioribus hexaphyllis, foliolis ovatis, cirriferis ROYEN. *Vicia Narbonensis* RIV. T. 57. *Bona sylvestris* DOD. *Cereal.* p. 92. In agro Veroneus, in Toscana, Monspelii. *Stipulae* ovatae, aristatae, folia primo bina, inde quaterna, tunc sena, ex ovatis decrescentia.

H. *Vicia luteo flore, sylvestris* I. B. II. p. 313. Foliorum paria septem, hirsuta, ovata, emarginata, cum spinula. Stipulae minimae, hastatae. Flos solitarius, sessilis. Calyx supinus, emarginatus, subhirsutus. Galea longa, striata, plicata, ochroleuca, villosa, fine emarginato, venis obscuris picta. Alae concolores, connatae, carina breviores. Ea obtusa, hamata, bipes. Tuba fine crasso, plumoso. Siliqua tetrasperma, brevis. Semina maculosa, sphaerica.

H. *Vicia sylvestris, lutea, cum galea fusca* I. B. II. p. 314. Flos striatus, hirsutus. Vexillum villosum, emarginatum, flavum, cis finem fusca macula notatum. Alae virescentes, hamatae, fine ovali. Carina obtusa, pede fissili. Tuba fine infundibuliformi, cavo. Siliqua polysperma. Semina varia, ex cinereo & rubro fusca. *Vicia* *viciae luteo flore sylvestri* mihi quidem videtur.

H. *Vicia Orientalis, carina & alis albis, vexillo reflexo, subfuscō DILL. pro N. D.* Flos solitarius, magnus. Calyx compressus. Denticuli superiores brevissimi, inferiores tres maiores, duo curvi, unus rectus. Vexillum linea eminentiē divisum, emarginatum, flavum, subviride, lineis virentibus pictum, alis brevius. Eae carina longiores, auriculatae, albae. Carina bipes, hamata, obtusa, luteo virens. Tuba fine plumoso. Semina ex fuscō, rufo & cinereo maculosa. Et ipsam hanc viciam a prioribus non credo differre.

Vicia siliquis sessilibus, foliis retusis, latescentibus
Enum. Helv. p. 598. Vicia vulgaris, sativa C. B. Vicia
CAMER. Epit. p. 320.

β. Varietas flore albo, venis roseis.

γ. Semine albo.

Vicia siliquis sessilibus, erectis, foliis imis ovatis, su-
perioribus linearibus Enum. Helv. p. 598. Vicia angu-
stifolia RIV. T. 55. In Feldern gegen Lengelern, aufm
Hagen.

H. Vicia angustifolia, semine parvo rotundo, murino,
variegato, Pensylvanica DILL. Angustifoliae valde
similis.

H. Vicia fiore purpureo, singulati, siliqua terete, gla-
bra But. Monsp. p. 276. Paria foliorum quatuor & quin-
que, nervosa, glabra, emarginata, spinula ex nervo pro-
deunte. Stipulae hastatae, aristatae. Flores solitarii,
sessiles. Calyx compressus, segmentis superioribus ad se
invicem conversis. Vexillum violaceum, late petiolatum,
plicatum, emarginatum. Alae pallide caeruleae, carina
duplo longiores, hamatae, fine ovali. Carina perbrevis,
rostro simo, fine violaceo. Siliqua lata, glabra, quasi
nodosa. Semina sphaerica, ex cinereo & obtuso subtili-
ter varia.

H. Vicia purpurea, siliquis nodosis, seminibus lenti-
formibus DILL. Siliqua sessilis, solitaria. Calycis seg-
menta longa, acuta, superiora distantia. Vexillum lon-
gum, striatum, pallens. Alae longissimae, hamatae,

bractea brevi. Carina bipes, ovalis, obtusa, auriculata, apice cacrulo. Tuba plumosa. Siliqua glabra, nodosa, semina quinque, angulosa, subfuscata.

Vicia siliquis erectis, foliis ex ovatis obtuse decrescentibus *Enum. Helv.* p. 599. *Vicia sepium* RIV. T. 56. Ad sepes ubique & in sylvis.

H. *Vicia multiflora*, cum siliquis latis I. B. II. p. 314. Foliorum paria septem, octo, glabra, quasi resepta, cum spinula ex nervo eminente. Stipulae hastatae, minimae. Calyx cylindricus, dentibus superioribus ad se invicem conversis, inferioribus rectis, imo longissimo. Flos ex albo viridis, pallens. Vexillum ungue lato, plicatum, emarginatum. Alae striatae, auriculatae, carina longiores. Ea obtusa, pede fissili. Tubae finis plumbosus. Siliqua brevis, turgida, filis hirta. Semina quatuor, ex dilutiori & saturatori fusco varia. Siliqua scabra, valde pilosa.

H. *Vicia* - - - - Prope Peribazar & Enseby LER-CHE. Flos longus, striatus. Calyx tubulosus: dentes quatuor superiores angusti, lanceolati, acuti, imus triangulis acutior. Flos ex violaceo purpureus. Vexilli latus petiolus, finis strictus, de more. Alae hamatae, bractea ovata, purpurea. Carina brevis, apice violaceo, obtuso, pede fissili. Tuba brevis, fine plumosa. Siliqua - - - Flores pauci, congesti.

Vicia foliis octonis, ovatis, amplissimis, floribus racemosis *Enum. Helv.* p. 600. *Cracca flore ochrolenco* RIV. T. 52. *Pisum sylvestre* CLUS. *Pannonicum*: p. 734. An der Lenge-

Lengelerburg versus *Makenrode*. Folia sena, octona, omnium maxima, ovata, cum vertice minori. Stipulae minutissimae, hastatae.

H. *Vicia pedunculis multifloris, foliolis ovatis, stipulis maximis* MART. Nondum floruit.

Vicia foliis ex ovatis obtuse decrescentibus, siliquis racematis pendulis Enn. Helv. p. 599. *Cracca sylvatica* RIVIN. T. 50. Häufig an den Herperhäuser Wiesen, auch im Eulenloch, an der Lengelerburg. Folia ex ovatis decrescentia, glabra, parium quinque: stipulae serratae.

Vicia foliis ovatis, siliquis racemosis, pendulis Enn. Helv. p. 599. n. 6. *Viciae pulchrum genus, multifolium, Galega quibusdam* I. B. II. p. 316. In Eulenloche und an der Herperhäuser Wiese. Folia in icona Enn. Stirp. Helv. T. XIV. male acuta pinguntur, quae perfecte ovata sint. Stipulae profunde multifidae.

Vicia foliis linearibus, subtus sericeis, siliquis glabris, dense spicatis, pendulis Enn. Helv. p. 600. *Vicia multiflora* C. B. *Cracca* RIVIN. T. 49. In pratis in primis uidis.

Vicia Bengalen sis, hirsuta, incana, siliquis Pilz HERM. *Cracca Bengalensis*. RIV. T. 51.

Vicia foliis linearibus, obtusis, siliquis gemellis, polyspermis Enn. Helv. p. 601. *Vicia minima*, cum siliquis glabris I. R. H. *Cracca minor*, siliquis gemellis RIVIN. T. 53. In agris & hortis.

Vicia siliquis hirsutis, pendulis, dispermis Enn. Helv., p. 601. Vicia segetum, cum siliquis plurimis hirsutis C. B. Cracca minor TABERN. p. 507. RIVIN. T. 53. In agris & hortis.

H. *Vicia multiflora, cum siliquis latis, Pensylvanica, Minutissima omnium, foliis linearibus, retusis, spinula ex nervo, parium octo, capreolo trifido, petiolis bifloris. Calycis segmenta praelonga, angusta. Flos minutus, dilute violaceus. Vexillum ovatum, reliqua petala comprehendens. Alae ovatae, carina longiores, quae ovata, obtusa est. Siliqua - - - - -*

H. *Vicia angustifolia, semine parvo, rotundo, variegato DILL. ex Pennsylvania. Semina sphaerica, parva, hilo magno, albo, caeterum variegata ex virescente & fusco. Calyx tubulosus, strictus, segmentis acutis. Flos angustus, caerulescens. Carina obtusa, alis brevioribus. Tubae fine plumoso. Siliqua nigra, teres.*

H. *Vicia floribus solitariis, seminibus compressis. Lens Monanthos vulgo. Ob calycem tubulosum, non profunde sectum, & florem strictum ad Vicias pertinet. Vexillum vix ungue latius, obtusum, album, sub apice caeruleum. Alae carinae aequales, hamatae. Carina bipes, obtusa, violacea. Tubae finis globosus. Siliqua tetraspermos, oblonga. Semina lenticularia, varia ex pallente & sature fusco.*

Lens Fuchsii Ennum. *Helv.* p. 601. RIVIN. T. 35.

H. *Lens major* RIVIN. T. 35. DILL. nov. spec. p. 49.
FABRIC. *Eutisb.* p. 18. Omnino Lentis species est, ob
calycem profunde quinquefidum, fructumque.

H. *Faba RIVINI* T. 23. *Faba major* BLAKWELL. T.
19. *Faba sativa* PASS. ic. 65.

β. *Faba rotunda, oblonga, minor.*

γ. *Faba equina, minor, nigra.*

δ. *Faba minima.*

ε. *Faba floribus atro - purpureis* SIEGES-
BECKII.

H. *Cicer RIVIN.* T. 19. CAMER. *Epit.* p. 204. *Cicer*
arietinum DOD. *Cereal.* p. 114.

β. *Semine fusco, flore rubro.* A *Viciis minimis*,
quibus calyce utcunque convenit, valde differt siliqua in-
flata, seminis figura, caput arietinum exquisite referente.
In regionibus calidis, & ipsa *Hispania* seritur.

H. *Ervum leguminibus pendulis* Ennum. *Helv.* p. 602.
LINN. *Ervum RIVIN.* T. 61. *Ervum verum* I. R. H. In
horto, nam in agris vix colitur, *Helvetis* familiare.

Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis,
acutis Ennum. *Helv.* p. 602. LINN. *Orobus sylvaticus, pur-*
pureus, vernus I. R. H. *Orobus pannonicus* I. CLUS. *Pann.*
p. 736. In sylvis frequens primo vere. Cro-

Orobus caule simplici, foliis imis ovatis, superne ellipticis, acutis Enam. Helv. p. 603. Astragalus sylvaticus THAL ic. I. Orobus sylvaticus, foliis oblongis, glabris I. R. H. Lathyrus angustifolius, radice tuberosa LOES. ic. 37. Orobus caule simplicissimo, foliis pluribus lanceolatis, oblongis LINN. Um' Blankenburg, Elbingerode, Kishäuser. In sylvis M. Altenstolberg & in sylva Hercynia.

Orobus caule ramoso Enam. Helv. p. 603. LINN. Orobus foliis Viciae RIV. T. 60. Orobas sylvestris nostras CHOMEL. 1706. p. 87. In sylvis circa Jenam ubique, & jenseits Rheinhausen.

PAPILIONACEIS ADFINES.

H. *Siliquastrum RIV. T. 114. Arbor Iudee vulgo. Morrisii pelii, in Aegypto, Palæstina, Toscana.*

H. *Cassia Americana, faetida, foliis subrotundis, acuminate MERIAN. Surin. f. 32.*

H. *Cassia - - - - . Senna Occidentalis, odore Opium viroso, Ebuli foliis, acutis, glabris BOERHAAVII.*

H. *Cassia - - - - Senna Italica, flore rubello, caule & siliquis hirsutis ROYEN. Calycis folia tria angustiora, duo latiora, omnia cava, glumarum similia. Petala quinque ovata, flava; duo supra sessilia, macula purpurea, cordiformi inscripta, duo mediocria, imum petiolatum;*

Stami-

Stamina decem, confuse deorsum versa, longis, bilocularibus antheris. Tuba simplex, recta, gracilis. Semina ovato rhomboidea.

H. *Cassia floribus pentandris, calycibus acutis LINN.*
Hort. Cliff. T. 36. Senna spuria, Virginiana, Mimosae
foliis, floribus parvis, nictitantibus FLUKNET. T. 314. f. 3.
Calycis foliola quinque, Petala quinque, flava : duo pa-
tria lateralia, ovata, brevia ; imum inpar, majus, emarginat-
um, petiolatum. Stamina quinque, circa fructum conflu-
xa, longis antheris. Siliqua septis distincta, cum semini-
bis septem ad octo, nitidis, quadrangularibus. Tuba
simplex, curva. Glandula ad ortum petioli nitens, paria
foliorum duodecim.

H. *Cassia foliolis quinque parium, ovato lanceolatis,*
glabris, glandulae super basin petiolorum ROYEN. Folia
ovata, parium quatuor & quinque. Glandula in dorso
petioli. Flos flavus, grandis, perpendicularis. Calycis
folia quinque, viridia, ovata, quorum duo minora. Pe-
tala ovata, rugosa, ima distantia. Stamina tria superiora,
tria inferiora, sursum recurva, quatuor alia super siliquam
collecta. Apices biloculares, fovea non penetrante notata.
Siliqua longa, apice curvo.

H. *Mimosa spinosa, tertia, sive foliolis Acaciae angu-*
floribus, siliquis parvis, echinatis BREYNE Centur. c. 18.
ic. Caareo I. PIS. hist. nat. Ind. p. 304, In Brasilia,
America calidiori.

300. PAPILIONACEIS ADFINES:

H. *Mimosa inermis*, foliis duplicato pinnatis, siliquis linearibus, glabris LINN. *Hort. Cliff.* *Mimosa spuria*, de *Fernambouque*, dicta *Mimosa Italica* ZANONI nov. p. 151. ic. 123.

H. *Mimosa floribus superioribus pentapetalis decandris, inferioribus decapetalis sterilibus.* *Mimosa tertia* H. *Upsal.* Flores superiores habent calycem, quinque lanceolatis foliis factum, petala quinque, angusta, viridia, de more, stamina decem, tubam incurvam, simplicem, fine emarginato, siliquam acuminatam, valvis parallelis, seminibus nigris, lucidis, ovato acutis. Flores inferiores spicati, steriles, absque staminibus & fructu, petalis denis, flavis, longioribus. Folii totalis pinnae parium quatuor & quinque absque impare: pinnae singulae foliolorum paria ad XXVII adhaerent, & prima pinna nonnunquam & ipsa ad quatuor usque pinnulas habet. Tarde movetur tacta, spinisque caret. Synonyma non reperi. Ergo neque numerus, neque sexus in hoc genere ad constituendum characterem valet.

H. *Mimosa* - - - - *Acacia Indica* ALDIN. init.

H. *Mimosa spinis geminatis, foliis duplicato pinnatis, partialibus utrinque quinis* ROYEN. *Acacia vera* I. E. BLAKWELL, T. 245. In *Aegypto*. r.

H. *Parkinsonia* WALTHER. T. 13. r.

H. *Amorpha* LINN. H. *Cliff.* T. 19. *Bastard Indigo.* *Trensaß.* Phil. n. 407. *Nihne Mollera* H. MAL. T. VI. T. 6. r.

MEDIAE

MEDIAE PAPILIONACEAS INTER ET
DIDYNAMIAS.

Fumaria caule simplici, bisolio, radice cava, foliis inter flores integris Enum. *Helv.* p. 604. *Fumaria bulbosa*, radice cava, major C. B. flore albo purpureo &c. *Fumaria altera* CAMER. *Epit.* p. 891. Passim in sepibus.

Fumaria caule simplici, multifolio, radice bulbosa, solida, foliis inter flores palmatis Enum. *Helv.* p. 605. *Fumaria bulbosa*, radice non cava, major. C. B. In non-nullis hortis reperta est. Tumores laterales vexilli minores, corpusculum in calcar redeuns unicum, in mucronem liberum, neque adhaerentem, porrectum. Bracteae digittatae, habitus minor, radix solida, proventus rarius.

H. *Fumaria* siliquis longis, polyspermis. *Capnoides* I. R. H. *Fumaria siliquosa*, perennis, (nobis annua) CORNUT. p. 58. *Pseudofumaria Indica* RIVIN. in tetrab. T. 74. *Fumaria siliquosa*, *Canadensis*, flore carneo & aureo BARREL. ic. 128.

H. *Capnoides* floribus albis SIEGESBEK. Calyx nullus, petalum supremum calcar habet longum, obtusum, & labii superioris medium gibber eminet. In calcar clava globulo terminata redit, ex centro floris nata. Alae duae hamis cis rotam habent subrotundos, extantes, tum rotam tribus alis factam. Carina fine latiori, carinato, linea eminente, deorsum tendente, acuta. Siliqua oblonga, tuba rotunda terminata. Semen lucidum, lenticulare.

H. Fuma-

302 MEDIAE PAPILIONACEAS INTER

H. *Fumaria calyce donata*, siliquis oblongis, latiusculis. *Pseudofumaria flore luteo* RIV. I. c. T. 74. In montibus Neapolitanis, agro Veronensi, Illyrico. Folia calycis duo lanceolata. Flos vulgari similis. Vexillum calcar retrorsum remittit, succi plenum, in quod duo ungues incurvi, conglutinati redeunt. Pars ejus anterior margine contracta, media linea elevata. Alae de more habent rotam trium eminentium quasi alarum. Carina similis, ut in aliis speciebus, sursum cava & staminis. Fructus latiusculus, brevis, incrispatus. Semina magna, nigra, geniformia.

H. *Fumaria siliquis ovatis, inflatis, polyspermis*. *Cysticapnos Africana, scandens* BOERH. I. p. 310.

Fumaria pericarpiis monospermis, foliorum lobis subrotundis Enn. Helv. p. 605. *Fumaria* RIVIN. monop. irreg. T. I.

H. *Fumaria pericarpiis monospermis, foliorum lobis capillaribus*. *Fumaria minor, folio longo, capillaceo* C. B. *Capnos tenuifolia* CLUS. hisp. p. 375. *Fumaria minor, sive tenuifolia, surrecta* I. B. III. I. p. 203. In Hispania & Gallia Narbenensi: in agro Veronensi, Monspelii. Omnia a vulgari diversa est, foliis tenuibus, flore ventricosiori, ejusque aliis coloribus, galea rosea, apice obtuso, vitidi, alis albis, fine purpureo, carina rubra, cochleari fuscq.

β. Varietas flore albo, in roseum languente.

H. Fu.

H. *Fumaria siliquis monospermis*, caulis se convolvens. *Fumaria claviculis donata*, foliis angustioribus I. R. H. *Monspelii*, in *Hibernia*. Capreolos non habet, unice caule scandens. Calycis folia duo cordiformia, serrata. Petalum supremum abit retrorsum quidem in calcar, anterius vero in acutam, viridemque ligulam. Alae auriculatae, sine trifido, purpureo. Carina parva, acuta. In calcare nectarium cylindricum. Fructus & stamina, ut in vulgari.

Polygala foliis omnibus acutis *Enum. Helv.* p. 606.
Polygala vulgaris, major VAILL. T. 32. f. 1. flore albido,
caeruleo, purpureo.

*Polygala foliis imis subrotundis, superioribus angustis,
acutis* *Enum. Helv.* p. 606. *Polygala minor*, foliis imis rotundioribus HELWING. *Flor. quasimodogenit:* p. 40. ic.
Polygala Buxi minoris folio, flore caeruleo VAILL. T. 32.
f. 2. flore albo, caeruleo, purpureo. *Annon* varietas ju-
nior prioris.



D I D Y N A M I A E.

A N G I O S P E R M A E.

Montia *Enum. Helv.* p. 608. LINN. *Montia aquatica, major*, MICHEL. T. 3. f. 1. Magna copia in pratis uidis super Hardegsen, qua fontium tubuli ducuntur.

β. *Varietas minor* MICHELI T. 13. f. 2. *Alsinoides annua, verna* VAILL. T. 3. f. 4. *Blinks* PETIVER l. c. T. 10. In arenosis circa Herzberg.

H. Browallia LINN. *Hort. Cliff.* T. 17. r.

H. Ruellia foliis petiolatis, fructu sessili, conferto LINN. *Ruellia strepens, capitulis cōmosis* DILL. *Hort. Elth.* p. 330. f. 321. In *Virginia*. Calyx brevis, ad basin usque acute quinquefidus. Flos infundibuliformis, deorsum ventricosus, limbo paulum irregulari, segmentis inferioribus a superioribus declinantibus, violaceo purpureis. Tuba bifida, siliqua brevis, utrinque acuta.

- **H.** Ruellia *capsulis teretibus* DILL. *Hort. Elth.* p. 323. T. 248. f. 320. Fructus etiam absque flore perficiuntur. Calycis folia quinque subulata, praelonga. Flos tubulosus, tubo incurvo, limbo quinquefido, caerulecente, parum difformi. Segmenta ima ovata. Stamina utique duo longiora, duo breviora. Tuba bicornis. Fructus teres.

Limo-

Limosella ENUM. HELV. p. 609. LINN. *Plantaginella palustris* C. B. Iconem apud RUPPIUM dedi T. VI. Abunde ultra Diemarn in fossis aqua plenis, & in via publica inter portam Albanam & Geismariensem, & prope pontem Leinae veteris versus Rasemühle.

Squamaria RIVIN. T. 88. ENUM. HELV. p. 611. *Anblatum* CORDI p. 89. b. In sylvis versus Eulenloch &c. BRUKMANN inter Blankenburg & Ilfeld.

Orobanche caule simplici, fulvo, foliis sub floribus longioribus ENUM. HELV. p. 610. *Orobanche* RIVIN. monop. irreg. T. 88. Abunde in sylvis Altenstolberg, & in ruderalibus des Kishäuser Schlosses.

Lentibularia ENUM. HELV. p. 612. LIND. hort. T. XI. RIVIN. T. 78. In fossis circa Wormatiam abunde.

Antirrhinum foliis alternis, quinquelobis ENUM. HELV. p. 613. *Cymbalaria* MATTH. p. 1124. RIVIN. T. 85. Abunde Jenae ad muros urbis, ex Italia paulatim propagatum.

Antirrhinum foliis ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis ENUM. HELV. p. 613. n. 2. *Elatine* RIVIN. T. 85. *Elatine* folio subrotundo C. B. Bey der Papiermühle.

Antirrhinum foliis hamatis, imis conjugatis, superioribus alternis ENUM. HELV. p. 613. n. 3. *Elatine* CAMER.

Epit. p. 754. Elatine sive Veronica femina BLAKWELL. T. 170. In horto & in agris v. g. an der Ecke der Lith gegen Lengeler und Harste über.

Antirrhinum foliis linearibus, adscendentibus, congestis, ramis spica florali densa terminatis *Enum. Helv.* p. 614. n. 6. *Linaria* PASS. ic. 97. *Linaria lutea, vulgaris* BLAKWELL. T. 115. Ad omnes fossas & in hortis.

H. *Linaria* foliis confertis, linearibus, carnosis MART. *Linaria maritima, foliis succulentis* BUXBAUM. Cent. IV. Flos pallidus, inferius lineis purpureis pictus, excurrentibus in calcar longuin, acutumque.

H. *Linaria* foliis Psyllii RIVIN. Valde similis vulgari, flos tamen pallide ochroleucus, ut palatum inferius unice flavum sit.

H. *Linaria* sicula, Molluginis folio BOCCONE *Sicul.* p. 38. quae mala icon est. Folia quaterna, crassula. Habitus erectus. Calycis segmenta cis finem dilatata, inferius pro calcare discedunt. Labium superius breve, reflexum, barba intensius flava, segmentis tribus subrotundis, medio minimo. Semina parva, nigra, difformia, aspera.

Linaria arvensis, caerulea DILL. *Hort. Elth.* T. 163. p. 198. Folia quaterna, glauca, obtusa. Flores parvi, calyce hirsutulo, segmentis longis, acutis. Flos subcaeruleus, lineis saturatis striatus, palato albo. Fabrica solita. Segmenta barbae pene aequalia, calcar curvum, argutum.

Semi-

Semina foliacea. Jenae verius Neue Schencke in agitis arenosis, tum circa Altdorf.

H. *Linaria arvensis*, flosculis luteis ~ SIEGESBEKII.
Calyx de more. Flos minimus calcare curvo; segmenta labii inferioris fere aequalia, lutea; ovata: superius subrectum, recta linea fissum, lineis obscurioribus pictum. Stamina gracilia, penè aequalia, tubae finis curvulus. Semina foliacea, plana. Valde similis priori, excepto colore, & forte varietas. r.

H. *Linaria purpurea*, major, odorata I. R. H. *Linaria altera*, flore purpureo DODONI. *Linaria flore purpureo*, minore RIVIN. T. 84. *Blue Sweet Toadflax* PETIVER T. 35. In *Cornubia, Gallia calidiori*.

H. *Linaria Valentina* CLUS. *bisp.* p. 351. MUNTING. ic. 207: *Linaria caerulea, apula* COLUMN. Ecphras. p. 78. ic. Variat flore luteo; aut luteo & caeruleo mixto.

H. *Linaria Americana*, maxima, flore purpureo HERMANN. H. L. B. p. 377. *Linaria flore purpureo, Americana*. RIV. T. 83. r.

H. *Linaria fruticosa*, di Ragusa, odorata ZANON. T. 106. *Linaria maxima, foliis Lauri*; *Dalmatica* BUXBAUM Cent. I. T. 24. Calyx profundissime quinquefidus, tribus superioribus segmentis hiatu ab inferioribus separatis. Flos praegrandis, uncialis, flavus; fabrica solita, medio segmento barbae etiam minore. Cálcar curvum, conicum. Fructus exiguis, penè ovalis. Tuba

longa, filiformis, fine flexo, spongioso, crassescente. Semina subaspera, variae figurae. r.

Antirrhinum foliis obtusis, viscidis, caule erecto, ramoso *Enum. Helv.* p. 615. *Linaria arvensis*, *nimima* RIVIN. T. 84. *Calcar curvum*. Ueber der Papiermühle, gegen Herperhausen & alibi.

Antirrhinum floribus sparsis, sessilibus, calyce brevioribus, calcare destitutis *Enum. Helv.* p. 615. *Antirrhinum arvense* RIVIN. T. 81. *Antirrhinum sylvestre* Phytema DOD. *Pempt.* p. 182. Calyx profundissime quinquedidus: supremum segmentum maximum, duo ima minima, rectiora. Tubus floris infra foramen retrosum gibbus, calcar quasi moliens, inde rugosus, fissus in galeam latam, semierectam, lateribus replicatis, bifidam, segmentis lemarginatis, palato, sive eminentia obtuse coeunte praedita: inque barbam mento tumido, tribus ovatis segmentis descendantibus, quorum medium minus est, & eminentia simili. Fructus ovatus, anterius tribus foraminibus aperitus. Tuba fine curvo, globulo terminata. Stamina duo longiora, duo breviora, apicibus exiguis.

H. *Antirrhinum calycis* foliolis brevibus, ovatis, floribus spicatis, calcare destitutis *Enum. Helv.* p. 616. *Antirrhinum* DOD. *Coron.* p. 85. PASSAEI ic. 14. RIVIN. T. 81. *Antirrhinum vulgare* VALLET. T. 71. GARIDEL. ic. 7. Initium calcaris in imo tubo est.

β. Flore albo VALLET. l. c.

γ. Flore sature rubro.

H. Acan-

H. *Acanthus* BLAKWELL. T. 89. *Acanthus levis* AICHSTETT *Aest.* Ord. XI. T. 2. f. 1. *Acanthus mollis* RIVINI T. 86. In *Graecia, Monspelii.*

H. *Acanthus medijs, rarioribus & brevioribus aculeis donatus* TILLI T. 2.

H. *Adhatoda Ceylanensium* Hort. *Lugduni Batav.* p. 643. *Eckolium* RIVINI T. 87.

Digitalis foliis calycinis ovatis *Enum. Helv.* p. 616. *Digitalis* RIVIN. T. 103. BLAKWELL. T. 16. PASSAEI ic. 54. Ubique in *sylvis hercynicis*, etiam super *Hardegen.* & circa *Mantelbek.*

B. Varietas flore albo. Inter *Lugdunum* & *Gratianopolin* BORRICH. Pinxit eam VALLET. T. 180. A frigore seraque satione alborem deduxit PLOT. *Staffordshire* p. 203.

Digitalis foliis calycinis linearibus, acutis, flore venoso *Enum. Helv.* p. 617. *Digitalis lutea* TABERN. p. 567. VALLET. T. 81. *Digitalis lutea, magno flore* C. B. In *sylvis hercynicis* v. g. inter *Wendefort* & *Stige*, & circa *Herzberg*, & in *M. Auerberg.*

H. *Digitalis spica conica, aphylla.* *Digitalis flore ferrugineo* RIVIN. T. 104. Calycis folia obtusa, alata, inaequalia, maximum, mediocria & minima. Flos luteus, maculis obscuris varius, segmento superiori paulum reflexo, lateralibus acutis; imo longiori ovali, rufo tincto,

venoso. Sedes angusta tubi floris brevis. Fructus conicus. Tuba recta.

H. Gratiola latiore folio, vulgo *Hulgua FEUILLEE* T. 17. *Euphrasia PLUKNET.* T. 393. f. 3. Valde parum a Gratiola nostrate differt. Stamina utique quatuor, duo longiora, duo breviora. Longiora gracilia sunt, quasi abortiva, globulo coronata. Breviorum apices magni, gemelli, albi, capsulis ovatis.

Scrophularia foliis conjugatis, ovato lanceolatis, ramis paniculatis, aphyllis, spicis terminatis *Enum. Helv.* p. 618. *Scrophularia aquatica BLAKWELL.* T. 86. *Scrophularia aquatica, major* C. B. *Ad Leijicim,*

Scrophularia foliis cordatis, conjugatis, ramis spica nuda, paniculata terminatis *Enum. Helv.* p. 619. *Scrophularia RIVINI* T. 106. *Scrophularia nodosa, faetida* C. B. Ad fossas, viasque. Etsi alis caulis brevioribus & radicis nodis differt, valde tamen suspicor EAGONII conjecturam veram esse (apud BOCCONE *recherches de physique* p. 100.) vere nodosam, autumno fibrotam radicem esse.

H. *Scrophularia Scorodoniae* folio MORIS. S. V. T. 35. Circa s. *Fves Cornwalliae Philosoph. transact.* p. 336. In *Lusitania GRISLEY.* *Flos de vulgaris genere, cum squama galeae solita.*

H. *Scrophularia peregrina, frutescens, foliis Teucrii crassioribus BREYNII.* *Hort. Lugd. Batav.* p. 547. *Annon Scrophu-*

Scrophularia flore rubro I. B. III. p. 422? Calyx pene ad basin quinquefidus, segmentis acutis, pene aequalibus. Flos vulgari similis, galea lata, segmentis duobus rotundis, venosis, cum squama in tubo floris, faucibus semiovatis. Barba lata, reflexa. Color ruboris sanguinei.

H. *Scrophularia* foliis cordatis, acuminatis, floribus globosis *Enum. Helv.* p. 619. *Scrophularia flore luteo* RIV. T. 106. *Lamium pannonicum* II. CLUS. p. 595. In *Helvetia*, *Hungaria*, *Veronae*. Posset, si ab habitu recesseris, aliud genus constituere. Calycis foliola quinque obtusa, in origine connata. Flos inflatus, campaniformis, fauce contracta, ut in *Muscari*. Unum segmentum superius subrectum, ovale, duo lateralia, duo imma transversim lata, viridia: floris tubus pallens, squama accessoria nulla. Stamina diversae longitudinis. Tuba apice paulum crassescente. Fructus ut in reliquis.

H. *Scrophularia Sambuci* folio MUNTING *histor.* f. 238. bene. *Sideritis Sambuci* folio F. ALP. *exot.* p. 202. Flos omnium maximus in hac gente. Calyx profunde in quinque rotunda segmenta incisus, ala alba cincta. Flos viridis, superne rufus. Galeae partes duas breves, emarginatae, duas laterales perpendiculares, imma reflexa, obtusa: retro fissuram galeae squama ovalis, rufa.

H. *Scrophularia Orientalis*, foliis Cannabinis, Non-dum floruit.

H. *Scrophularia* foliis pinnatis, pinnis ferratis, confluentibus, floribus paniculatis *Enum. Helv.* p. 620. *Ruta*

canina TAB. p. 136. *Veronae & in Helvetia* passim, ut
Basileae ad Wiesam, & circa lacum Lac de Joux.

Pedicularis caule ramoso, procumbente, floribus spar-
sis, obtusis Enn. Helv. p. 622. *Pedicularis minor* RIVIN.
T. 91. *Beym. Gescheröder Felde, gleich am Walde; Jen-
seits Rheinhausen.* Super Hardeggen in sylva.

Pedicularis caule erecto, ramoso, calyce bifido Enn.
Helv. p. 621. *Pedicularis* RIVIN. T. 91. Abunde ad sini-
stra lacus Seeburg verius Bärenhausen. In Sæviae pratis
udis. Ultra Cellam.

Alectrolophus calycibus glabris Enn. Helv. p. 624.
Pedicularis pratincola, lutea, vel *Crisia Galli* C. B. flore
pure luteo.

β. Flore ex violaceo vario.

Alectrolophus calycibus hirsutis Enn. Helv. p. 624.
Pedicularia lutea TABERN. p. 791. Circa Jenam passim
v. g. circa Clusewitz. Utraque ab *Elephante* toto chara-
ctere differt, cui labium superius brevissimum, inferius
amplissimum, fructus obtusus, bicolore est TOURNEFORT
Voyag. III. p. 15.

Melampyrum spica densa; longiori, foliis inter flores
laciiniatis, adscendentibus Enn. Helv. p. 626. *Melampy-
rum coma* purpurascente C. B. *Melampyrum arvense* RIVIN.
T. 79. In segetibus abunde.

Melam-

Melampyrum spica densa, brevi, foliis inter flores cristatis, reflexis. *Melampyrum cristatum* RIVIN. T. 80. Circa Jenam passim & in M. Altenstolberg, sylva Welmeise inter Lauche & Scheipliz.

Melampyrum spica laxissima, foliis inter flores lacinatis, patentibus Enn. Helv. p. 626. *Melampyrum coma caerulea* C. B. *Melampyrum sylvaticum* RIVIN, T. 80. Ad oras nemorum.

Melampyrum floribus sparsis, sessilibus, binatis, foliis superioribus incisis Enn. Helv. p. 626. *Melampyrum luteum*, *latifolium* C. B. In Wäldern jenseit grossen Schneen, & super Hardegsen.

Melampyrum floribus sparsis, sessilibus, binatis, hiantibus, foliis omnibus indivisis Enn. Helv. p. 627. In sylva hercynia ubique.

Odontites foliis inter flores ferratis Enn. Helv. p. 627. *Odontites* RIV. T. 89. In agris requietis & stipulis humidis.

Odontites foliis inter flores integris Enn. Helv. p. 627. *Euphrasia sylvestris*, *major*, *lutea*, *angustifolia* COLUMN. p. 203. ic. Jenae in pratis super Ziegenbayn.

Euphrasia foliis ovatis, acute dentatis Enn. Helv. p. 628. *Euphrasia* TABERN p. 862. In pratis.

β. Flore minori. In sylvis, locisque siccioribus.

314 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

H. Vitex RIVINI. T. 117. *Vitex* foliis angustioribus
Cannabis modo dispositis GARID. T. 100. In Armenia
THEVENOT.

H. Lantana foliis oppositis, petiolatis, floribus capi-
tatis LINN. *Camara* MARCGRAF. p. 6. In Chili &c.

DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,
SEMINIBUS QUATUOR NUDIS.

Chamaedrys foliis angustis, integris, ellipticis, subtus
incanis Enn. Helv: p. 632. Polium majus CORD. p.
124. b. Ajuga folio integro RIVIN. T: 15. Jenae passim,
v. g. aufm Fuchsberg, & in horto nostro.

H. Marum Syriacum BLAKWELL. T. 47. Pseudoma-
rum RIVIN. T. 13. Marum Cortusi I. B. III. p. 11. 243.

H. Marum Hispanicum, nigrum, flore purpureo. Pi-
parella Hispanica BOCCONE Mus. II. p. 166. T. 117.
Calyx tubulosus, subhirsutus, segmentum superius trian-
gulare, majus, quatuor reliqua minora & ima sibi vicina.
Flos absque galea. Segmenia ejus prima longa, acuta,
subrecta, secunda auriculata, perpendicularia, ad eorum
originem pilorum penicillus, retrorsum euns. Medium
segmentum cochleari simile, purpureum.

H. Cha-

H. Chamaedrys frutescens, Teuctrium vulgo I. R. H. Teucrion RIV. T. 10. Teucrion verum AICHST. Aest. Ord. VII. T. II. f. 1. Monspelii. In M. Agnano, Bargae Hetruriae.

Chamaedrys foliis ellipticis, serratis, mollibus, verticillatis inter folia paucifloris. Enum. Helv. p. 631. Scordium RIVIN. T. II. BLAKWELL. T. 475. An der Unstrut bey Lauche. Etiam prope Gottingam inter portam Grohndensem & Wehndensem circa fabricam olim nascebatur. Prope Philippo BELLONIUS, & in Lemno. In Hibernia, Monspelii &c.

Chamaedrys procumbens, foliis solidis, ovatis, rotunde crenatis. Enum. Helv. p. 630. Chamaedrys RIVIN. T. 10. Chamaedrys minor, repens C. B. Hortensis, Jenae passim & in Helvetia spontanea.

H. Chamaedrys, sive Teucrion, foliis cordatis, crenatis, petiolatis, spicis oblongis, densissimis ex Hircaia MARTINI Comment. Gotting. 1752. cum iconē. Folia Betonicae, cordato elliptica, rugosa, serrata. Ramus quilibet longa & densa spica terminatur. Calyx deorsum gibbus, uno segmento sursum verso, cordiformi, majori, mucronato, lateralibus obtusis, imis acutis & rectis. Galeae nullum vestigium. Barba quinquefida. Par segmentorum posterius porrectum, acutum, versus par alterum semicirculari ambitu terminatum. Par alterum ovato lanceolatum. Medium segmentum cavum, cochleari simile, circumserratum, extus hirsutum, violaceum, cum reliquo flos purpureus

316 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

pureus sit. Stamina bis bina. Semina rotunda; exasperata germinis, sedē circulari.

Chamaedrys foliis pinnatis, pinnis obtusis, trifidis Enn. Helv. p. 633. *Chamaedrys tertia* DODON. Pürg. p. 431. *Iva moschata* folio multifido RIVIN. T. 14. Am Plessberg gantz oben beym Schloss.

Bugula foliis ovatis, inter flores stipatis, flagellis reptans Enn. Helv. p. 634. *Bugula* RIVINI T. 75. flore rubro.

B. Flore albo.

C. Flore roseo. In Göttingerwald.

Bugula foliis anguloſe dentatis, caule simplici Enn. Helv. p. 535. *Bugula montana* RIVIN. T. 75. Um Gescheröder Felde &c in sylvis. Labrum superius multo brevius, & minus conspicuum, quam in priori specie.

H. *Bugula Orientalis*, villosa, flore inverso caeruleo, alba macula notato DILL. Hort. Elth. T. 53. Verticilli densissimi & mollissimi. Calyx tubulosus, productus in quinque segmenta triangularia, quorumimum latius est. Flos obliquus, ut batba potius superior sit, & magis tamén ad latus ponatur, extus villosus, intus tature caeruleus. Galea cordiformis, profunde incisa. Barbae segmenta lateralia ovalia, medium cordiforme, emarginatum.

Bugula foliis trifidis, floribus per alas sparsis Enn. Helv. p. 634. *Chamaepitys* RIVIN. T. 14. *Chamaepitys* pri-

prima DOD. Purg. p. 429. Jence abunde ad radices M. Kunitzberg, versus Borstendorf. In Madagascar, Virginia.

Bugula a Chamaedry sive Teucrio, differt labello unice trifido, medio segmento emarginato, galea evidenti, bicorni, calycis parte superiori minori.

H. Ocimum foliis ovatis, glabris. Ocimum odore Faeniculi &c. Ocimum RIV. T. 16. IDOD. Coron. p. 287.

β. Ocimum medium. Ocimum minus RIVIN. T. 19.

γ. Ocimum medium, vulgaris & nigrum I.B.III. 2. p. 247. Ocimum medium, rubrum BARR. ic. 1057. MORIS. S. XI. T. 20.

δ. H. Ocimum minimum RIVINI T. 19.I.B.III. 2. p. 247. MORIS. l. c.

ε. H. Idem totum rubrum. Ocimum rotundifolium, rubrum BARR. ic. 1068. In insula Ceylon.

Cassida foliis cordatis, longe decrescentibus, serratis, floribus gemellis Enum. Helv. p. 635. Cassida palustris, vulgarior, flore caeruleo I. R. H. Judaicae herbae atia species DOD. p. 93. Scutellaria RIVIN. T. 76. In aquosis passim, adque ipsas urbis fossas.

H. Cassida Americana, procerior I. R. H. Cassida peregrina, foliis Urticae latifoliae, rugosis, flore caeruleo BOERH. Cassida latifolia, flore minore RIVIN. mon. irregular. T. 77. Flores parvi, gemelli in ramis spicatis, caerulei.

318 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

rulei. Calycis crista brevior, quam in aliis speciebus. Flos caeruleus, galea quadrifida, & fabrica ea, quae in reliquis. Semen angulosum, exasperatum, flavum. A vulgari floribus minoribus, & foliis latioribus separatur.

H. Cassida Alpina, supina, flore magno I. R. H. In alpibus Helveticis ajunt nasci. Flores dense spicati. Calyx ut in aliis Cassidis. Flos tubo incurvo, in fine eretto, purpureo. Labii fabrica solita, sed alae aculeum emitunt. Barba bifida, pallens, linea saturationi divisa. Semina glauco polline adspersa, hinc convexa, inde planis inclinatis terminata.

H. Cassida COLUMN. Ecphras. p. 189. flore albo, pallente. Calyx, ut in vulgari specie, fuscus vero nitensque. Flos ochroleucus. Fabrica consueta. Tuba sine simplici, non bifido, quod rarum. Semina reniformia, subaspera.

H. Cassida Orientalis, albissima, Urticae folio I. R. H. Coroll. Malum nomen. Flores gemelli exigui, in spica foliolis ovatis exiguis interrupta, galea purpurascente, barba alba, fabrica consueta, ut alas possis galeae accensere, & labium inferius latius, in medio eminens, aegre emarginatum. Tuba bifida. Calycis fabrica solita.

H. Cassida spicis foliosis GMELIN. Ex Sibiria. Folia inter flores magna, pallida, ovato lanceolata. Calycis foliolum superius revolutum, inferius quasi resectum, absque calcare, de more gentis. Flos speciosus, uncia major.

major. Labium superius pallidum, rectum, simplex, cava-
vum, compressum. Alae ovatae, caeruleae, in principio
labii superioris erectae, ut ad id labium pertinere vide-
antur. Barba amplissima, cordiformis, emarginata, pal-
lida. Semina glauca, villosa, subrotunda, excavata.

H. *Cassida Orientalis*, foliis laciniatis COMMEL.
rar. f. 30. *Cassida folio Chamaedryos* RIV. T. 77. Non-
dum floruit.

H. *Salvia minor* CAMER. Epit. p. 476. BLAKWELL.
T. 71. RIV. T. 70. *Salvia minor*, auriculata I. B. III.
p. 105. In *Sibiria ultra Schelefsinsk* GMELIN. Apices pul-
verulenti quatuor, nempe cuivis pedunculo oblique insi-
det petiolus semi circularis: ejus pars superior gerit api-
cem unilocularem, longum, pulverulentum, inferior in
tumorem terminatur, in quo perinde pollen albus,
sed ea anthera brevior est.

Horminum sylvestre III. CLUS. p. 582, 583. Circa
Eisleben. Inter *Erfurt & Tiefenthal*. Etiam ex *Tartaria*
missum est. Folia inter flores colorata, violacea. Calyx
superius brevissime tridentatus, inferius bifidus, aristatus.
Flos violaceus. Galea brevis, fissa, fornicata, pustulis
albis notata. Alae ovales recta procurrunt. Labellum cavum,
transversim ovatum. Ponduscula duo, & apices unilo-
culares.

H. *Salvia Africana*, frutescens, folio subrotundo, glau-
co, flore magno, aureo COMMEL. hort. II. T. 92. Non-
dum floruit. H, Hor-

H. Horminum coma violacea. *Horminum* DOD. p. 292. Calyx tomentosus, bilabiatus, segmentum superius spinulas laterales duas, mediumque brevissimam habet. Inferiores dentes majores, ovato lanceolati, cristati. Flos violaceus, fauce alba. Galea falcata, brevis, superne villosa. Alae plicatae, ovatae. Medium segmentum emarginatum, amplum. Stamina pondera appensa habent.

H. Horminum coma viridi I. R. H.

H. Sclarea Mexicana, altissima, facie Heliotropii DILL: Hort. Elth. T. 254. *Fungia HEISTERI* ad Epist. Burkhardtianam. — Calycis dens superior major, triangularis, inferiores duo minores. Flos sature caeruleus, hirsutus, tubulosus. Labium superius cavum, parum emarginatum, inferius breviter trifidum, lateralia segmenta ovata, medium emarginatum, per aetatem sursum reflexum. Stamina cum ponderibus foliaceis conglutinatis. Tuba hamata, altero aculeo longissimo. In Sibiria.

H. Sclarea Indica, floribus variegatis I. R. H. Calyx viscidus, bifidus, fauce ampla. Segmentum superius brevissime tridentatum, inferius bisidum, dentibus omnibus aristatis, supremo brevissimo. Galea falcata, violacea, cava, per lineae longitudinem incisa, per quam incisuram tuba incurvis finibus exit. Alae ovales, violaceae. Medium segmentum cavum, instar cochlearis, albidum, maculis violaceis pictum. Stamina de more ponderibus appensis, & apice longo, uniloculari. Semina magna, nigra, ovata, compressa.

H. Sal-

H. *Salvia* foliis cordato sagittatis, serratis, acutis *Enn.*
Helv. p. 639. *Horminum* flore luteo RIV. T. 35. In
 subalpinis *Helvetiae*. Stamina omnino quatuor, duo ma-
 jora hyoidea, duo sagittata alia.

H. *Salvia* caule nudo, spica florente pendula *Comm.*
Gotting. 1751. T. XI. *Salvia* foliis cordatis, obtuse crenat-
 is, spicis florum nutantibus *Act. Petrop.* Nov. T. XI. Fo-
 lia unice ad terram, cordatis longiora, acutiora, rugosa.
 Caules longi, nudi, spica densa, dum floret pendula,
 dum semina fert erigitur. Calyx de more *Salviae*. Flos
 valde hians. Galea erecta, aut cum spica pendula. Alae
 ovatae, medio segmento emarginato, cavo. Stamina ha-
 bent pondus, & apicem longum unilocularem.

B. Varietas flore albo in horto nata.

H. *Horminum Canariense*, hastato folio, caule tomen-
 toso *PLUKNET.* T. 301. f. 2. Stamina duo parva, retro
 stamina majora, capitata. Calyx bipartitus, fauce lates-
 cente, villosa. Segmentum superius simplex, acute plica-
 tum, ad latus duobus denticulis brevissimis accendentibus;
 inferiora segmenta ovato lanceolata. Floris labium supe-
 rius falcatum, cavum, incisum, violaceum; labium infe-
 rius violaceum, partibus lateralibus recta procurrentibus,
 medio segmento lato, emarginato, violaceo. Staminum
 pondera hamata, violacea. Semina brevia, rotundo tri-
 quetra, linea eminentia, utrinque acuminata.

322 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE

H. *Sclarea vulgaris*, lanuginosa, amplissimo folio I.R.H.
Aethiopis multis L. B. Stamina duo falcata, cum ponderibus
appensis & apice uniloculari,

H. *Horminum sylvestre*, latifolium, verticillatum.
Horminum spurium RIVIN. monop. irreg. T. 38. *Horminum sylvestre*, latifolium, alterum CLUS. Pann. p. 578. In agro Veronensi, Austria. Calycis dentes tres superiores, duo inferiores, recti. Flos saturate caeruleus. Galea cava, cochlear referens, integra. Alae oblongae, medium segmentum profunde excisum. Stamina habent ponduscula, & apices uniloculares. Semina ovata, triquetra, fusca.

H. *Horminum Virginianum*, Blattariae folio DILL. Calyx superne brevissime trifidus, cyaneus, denticulo in incisura eminentia; inferiores duo dentes aristati. Galea brevis, incisa. Alae parvae, ovatae. Medium segmentum emarginatum, sursum cavum, Ponduscula de more, apice imperfecto. Flos cyaneus saturus,

Salvia foliis ovato lanceolatis, serratis, verticillis raris & dissitis Enum. Helv. p. 638. *Sclarea pratensis*, foliis serratis, flore caeruleo I. R. H. *Horminum sylvestre* CAM. Epit. p. 629. Bey der Rasenküble um Rosdorf.

β. Flore minori. Jenae auf der Insel.

H. *Horminum Verbenae laciniis*, angustifolium TRIUMPH. p. 65. *Horminum sylvestre*, inciso folio, flore caesio, *Italicum* BARR. ic. 218. Spica nuda, verticilli sex-flori. Calyx bilabiatus, segmentum superius breviter tridentatum,

dentatum, dentes inferiores in spinulam educti, profundius divisi. Flos totus cyaneus. Galea emarginata, falcata. Alae elliptico acutae. Barba orbicularis, ora integra, ad fauces maculosa, tumoribus duobus ornata. Stamina ex pondere facta, & ex apice uniloculari, longo. Semen fuscum, ovato conicum.

H. Horminum minus, folio sinuato, flore minori, caeruleo DILL. Farum a priori differt, sed flos major, aquate caeruleus.

H. Salvia foliis simplicibus, dentato pinnatis, asperis LINN. *Horminum rugoso*, *verrucosoque folio* PAR. BAT. ic. p. 186. *Horminum annuum*, *ceratophyllum*, *rugosum*, *flore sulphureo* MORIS. S. XI. T. 13. Calyx bilabiatus, segmentis tribus superioribus ab inferioribus distinctis. Flos brevis, ventricosus, albus. Galea falcata, apice fisso. Alae ampliae. Barba media, cochlearis instar excavata. Staminis singuli petiolus unicus, posterius pondus appensum, anterior proboscis fert antheram longam, curvam, unilocularem, albo polline. Tuba bifida. Semina fusca, ex sphaerico acuminata, hilo albo. r.

H. Rosmarinus RIVIN. T. 39. *Rosmarinus hortensis*, *angustiore folio* MORIS. S. XI. T. 16. In *Helvetia calidiori*, *Gallia Narbonensi*, *Africa*, *Galilea*. Huic raro in hac gente exemplo, tuba simplex, non bifida.

H. Monar-

324 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

H. Monarda floribus capitatis, caule obtuso. *Origanum fistulosum*, Caradense CORNUTI p. 14. *Menthastrum Virginianum* *Origanites fistulosum* MUNTING. f. 121. *Origanum spurium*, *fistulosum* RIVIN. T. 61.

H. Monarda floribus verticillatis LINN. *Clinopodium Virginianum*, *angustifolium*, *floribus amplis*, *luteo maculatis*, *eius caulis sub quovis verticillo decem & duodecim foliolis patentibus est cinctus* PLUKNET Almagese p. III. T. 24. f. I.

H. Ziziphora foliis lanceolatis, floribus terminatricibus LINN. *Clinopodium fistulosum*, *pumilum*, *Indiae Occidentalis*, *summo caule floridum* PLUKNET. T. 164. f. 4. Character fere idem, qui sequenti. Barba pene aequaliter trifida, segmentis ovalibus. *Galea ovata*, *brevis*. Flores inter lata folia in summo caule congesti.

H. Ziziphora foliis lanceolatis, floribus in alis LINN. *Acinus Syriaca*, *folio mucronato*, *capsulis hirsutis* MORIS. T. III. S. XI. T. 19. f. 3. Calyx hispidus, longissimus, tubulosus, convergens. Denticuli tres superiores recti, exigui, duo inferiores majores. Flos paulo calyce longior. Galea recta, cava, ovalis. Barba tripartita, medio segmento emarginato. Purpurascit media barba, & fauci bus albis, maculosis est. Tubus longus, strictissimus. Stamina duo eminentia. Tubae apex crassus. Semina elliptico acuminata, subtiliter exasperata.

H. Brue

H. Brunella foliis imis integris, superioribus laciniatis
Enum. Helv. p. 637. *Brunella folio laciniato RIVIN.* T.
 30. Flore albo, minori. Passim in *Helvetia*.

Brunella foliis dentatis, spica foliis minore *Enum. Helv.*
 p. 636. *Brunella major, foliis non dissectis C. B. Brunella*
minor RIV. T. 29.

B. Flore carneo.

Brunella foliis vix dentatis, spica foliis majore *Enum. Helv.*
 p. 637. *Brunella flore majore RIVIN.* T. 29. In
 montosis um *Keschener Feld.* Differt omnino a priori
 folius in spica glabris, qua plicantur, tum calyce & flore
WILLICH *dissert.* p. 121.

H. *Leonurus* RIV. in mon. T. 19. & VOLC. flor. ic. 8.
Leonurus Capitis Bonae Spei BREYNÉ Cent. I. *Leonurus*
Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, majore I.
BREYNE Prodr. 2: Sideritis Africana flore aureo, oblongo
Act. Hafn. T. II. Obs. 24.

H. *Leonurus Americanus*, annuus, *Nepetae folio, flore*
phaeniceo, minore. r.

Cardiaca foliis trilobatis *Enum. Helv.* p. 639. *Cardiaca*
RIVINI T. 20.

H. *Cardiaca Orientalis*, canescens, folio *Ranunculi*
pratensis; flore purpureo; calyce molli I. R. H. *Coroll.*
 Fere calyce hirsuto & foliis mollibus & hirsutis a priori
 differt.

H. Cardiaca Tartarica, foliis tenuius & profundius incisis, glabra AMMAN. Flos vulgari simillimus, folia differunt.

H. Cardiaca Chinensis, albis calycibus, aculeatis, semine nigro MARTIN.

Cardiaca foliis cordiformibus *Enum. Helv.* p. 640: *Lamium* folio oblongo, luteo C. B. *Urtica iners*, *tertia*, sive *Lamium luteo* flore DOD. *Pempt.* p. 153.

Lamium foliis dissitis, cordatis, acutis *Enum. Helv.* p. 640. *Lamium purpureum*, non faetens, folio oblongo C. B. *Galeopsis* CAMER. *Epit.* p. 865. Um die Papiermühle ad sepes.

β. Flore albo, hic frequentius. *Archangelica alba* BLAKWELL. T. 33.

Lamium foliis cordatis, obtusis, in summo caule congestis *Enum. Helv.* p. 641. *Lamium purpureum*, faetidum, folio subrotundo sive *Galeopsis* *Dioscoridis* C. B. *Urtica iners*, altera DOD. p. 153. Vulgatissima in hortis.

Lamium foliis superioribus amplexicaulibus, incisis *Enum. Helv.* p. 641. *Lamium minus*, folio caulem ambiente C. B. *Alfines species* TABERN. p. 214. In hortis frequens. Character valde diversus a reliquis Lamiis. Neque enim alae, ut in reliquis, aculeatae sunt, neque labium inferius serratum. Deinde superius etiam integrum est, non bifidum, & calyx non aristatus. Solo ergo bisulco labii inferioris medio segmento accedit.

H. Sta-

H. Stachys foliis oblongis, acutis, amplexicaulibus, serratis, floralibus cordatis, acutis, integrerrimis ROY. *Sideritis Orientalis*, *Phlomidis* folio I. R. H. In Syria POCOCK. Folia inter flores cordata, acuminata. Calyx cylindricus, non angulosus, subhirsutus, ad sedem barbare hians. Labium superius exiguum, ad acutum angulum erectum, bifidum, ochroleucum, utraque portione linea purpurea divisa. Barba trifida, alis ovatis, linea rubra media divisa: medium segmentum paulum cavum, transversim latum, emarginatum, linea una media & aliis minoribus percursum. Stamina in tubo floris recondita. Tuba non bifida.

H. Stachys Graeca, Hormini folio, flore sordide lutescente, maculis spadiceis, variegato NISSOLE. Calyx mollis, tubulosus, dentes quinque aristati, superior maximus, imus minimus. Flores teneri, flavi, adulti rubeescunt. Labium superius forniciatum incisum, fere cordiforme; inferius recta porrectum, trifidum, alis ovatis, segmento medio emarginato, maculato, Orchidum more: tuba breviter bifida.

H. Stachys Canariensis; frutescens, Verbasci foliis Hort. Amst. II. f. 99. Calyx brevis, tubulosus, paulum curvus, difformisque, segmentis aristatis. Flo(s) paulo calyce longior. Galea simplex, ovalis, acuminata, non cava, reflexa, acutâ. Alae ovatae. Barba pendula, transversim lata, emarginata. Color albidus, facile decoloratur. Habitus solus est Stachyos, flos potius Matrubi astrî.

328 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

Stachys foliis tomentosis, basi excisis, ovato decrescentibus, verticillis densissimis *Enum. Helv.* p. 643. *Stachys montana* RIVIN. T. 27. Jenae in pede M. Künitzberg, & in horto.

H. *Stachys* foliis hirsutis, spicam distinguentibus, imis cordiformibus *Enum. Helv.* p. 642. *Stachys Alpina*, *folio Betonicae* IC. REG. *Stachys* folio obscure virente, flore purpurascente WALTHER. T. XIX. p. 108. In montis *Helvetiae*.

H. *Pseudostachys montana*, maxima, nigra, folio amplissimo, flore atropurpureo MANETTI. Nondum floruit.

Stachys verticillis spicatis, foliis subhirsutis, ellipticis *Enum. Helv.* p. 643. *Stachys palustris* RIVIN. T. 26. In agbris humectis frequens.

Stachys foliis cordatis, acuminatis, petiolatis, floribus laxe spicatis *Enum. Helv.* p. 642. *Stachys sylvatica* RIVIN. T. 26. In sylvis & ad sepes.

H. *Phlomis* involuci radiis, lanceolatis, tomentosis LINN. *Phlomis fruticosa*, *Salviae* folio, longiore I. R. H. *Salvia sativa*, flore luteo RIVIN. T. 71. *Phlomis Lychneia* CLUS. hisp. p. 348. In *Hispania* & *Narbonensi Gallia*, *Monspelii*.

H. *Phlomis* radicibus nodosis, foliis cordiformibus, galea lacera Comment. Gott. 1751. T. XII. *Phlomis Hormini*, *feliis*, *floribus parvis*, *sauvaventibus*, *villofissimis* AMMAN.

SEMINIBUS QUATUOR NUDIS. 329

AMMAN. n. 28. In *Sibiria* inter *Taram* & *Zamischewsk.* Radix plena subrotundis nodis, carnosis, interque ipsos gracilia fila. Folia excisa, cordiformia; serrata. Verticilli densissimi. Calyx Phlomidis tubulosus, incurvus, pentagonius, & semina similia; sed flos aliter se habet, qui pallide purpureus est, superne hirsutus. Galea incisa, segmentis iterum acute bifidis & trifidis, totis dentatis. Barbae segmenta lateralia ovata, medium latius, sursu*m* cavum, emarginatum. Semina iterum Phlomidis. In *descriptione Commentariorum radicis nondum effossae tubera omisi.*

H. Phloinis foliis multifidis MARTINI. *Ballote inodora*, foliis *Cerciopi* AMMAN. T. 8. Folia glabra, quinqueloba, lobis semipinnatis, profunde incisis. Calyx Phlomidis, pentagonius, quinque denticulis, imo longissimo. Tubus floris calycis longitudine, colore purpureo. Labium superius ovale, excavatum, superne hirsutum, recta protensa. Filamenta staminum maculata. Labium inferius Stachyos, lineatum, alis ovatis, recta procurrentibus, medio segmento emarginato, partibus divergentibus, ut in Phlomide. Semina tetraedra, basi minori, obliqua, variegata ex fusco & cinerco. Verticilli densi, sessiles.

Galeopsis foliis & caule fulcrato, hispidis, flore calyce duplo longiore Enn. Helv. p. 644. *Canthabis spuria* RIV.

T. 31.

330 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

T. 31. *Galeopsis procerior*, calyculis aculeatis I. R. H. In sylvis caeduis & in ruderibus.

β. Flore albo.

γ. Flore magno varicolore. *Cannabis spuria*, flore majore RIV. T. 32. In dumetis um den Landolfshäuser Teich.

Galeopsis foliis ovato lanceolatis, molliissimis & tomentosis Enum. Helv. p. 645. *Cannabis sylvestris*, *spuria*, *tertia* LÖBEL. p. 28. flore ochroleuco.

β. Flore purpureo. Abunde in arenosis agris *Cellensisibus* versus *Schelplan*. Utraque varietas, & tota purpureo, & ochroleuco flore barba violacea, ibi nascuntur. Diversitatem a parviflora ostendit Cl. WILLICH. disputat. p. 11. 12.

Galeopsis foliis longe ellipticis, subhirsutis Enum. Helv. p. 645. *Galeopsis patula*, segetum, flore purpurascente I. R. H. *Ladanum segetum* RIVIN. T. 24. *Narrow Ironwort* PETIVER. T. 33. In segetibus frequens.

Betonica foliis ovatis, glabris, crenatis, calycibus hirsutis, aristatis Enum. Helv. p. 645. *Sideritis arvensis*, *latifolia*, *glabra* C. B., *Alyssum majus* TABERN. p. 541. In segetibus.

Betonica foliis inter verticillos dissitos aristatis, integris Enum. Helv. p. 646. *Sideritis* flore luteolo RIVIN. T. 10. *Jenae*, & in Comitatu Hohenstein ad vias,

Betonica

Betohi a foliis inter verticillos in vertice congestis, brevissimis, integris *Enum. Helv.* p. 646. *Betonica CAMER.* Epit. p. 681. *RIVIN.* T. 28. Copiose im Lutje Lünger Holze und gegen Geismar. Anno 1750 in *Betonica vulgari* vidi flores monstrosos, labio superiori cordato, inciso, alarum paribus duobus, pro uno, medio trifido, staminibus duabus latis, in quoru[m] quolibet tres antherae. Adparet, passim monstra *Peloriae*, hactenus analoga nasci, quod a consueta fabrica floris deflectant.

H. *Betonica Alpina*, latifolia, villosa, major, flore luteo. Non tam floruit.

J. V. E. S. 1750 *J. V. E. S. 1750*

H. *Moldavica* foliis ternatis; *Moldavica Americana*, trifoliis, odore gravi L. R. H. *Cedronella Canariensis*, viscosa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis H. AMST. II. p. 144. *Dracocephalo affinis Americana*, trifoliata, *Terebinthinae* odore VOLC. flor. p. 144. Flores in breves crassasque spicas dispositi. Calyx tubulosus paulum curvus, segmentis parum inaequalibus, aristatis. Tubus floris gracilis, flavus, deorsum ventricosus. Galea bifida, segmentis reflexis. Alae deorsum plicatae, dabellum tumens, ex quo segmentum circumserratum descendit. Semina hinc convexa, inde piano inclinato fiunt.

H. *Moldavica* foliis ellipticis, profunde crenatis. *Moldavica Betonicae folia*, flore caeruleo I. R. H. *Pseudomelissa* RIV. T. 72.

B. H. Flore albo ALCHST. Aest, Ord. VII. T. I.

f. 2.

H. Moldavica foliis ovatis, crenatis, floralibus orbiculatis, creberrime ciliatis, per amplis. *Moldavica Orientalis, Salicis folio, flore caeruleo* I. R. H. Cor. Folia rotunda, ciliata, inter flores. Flores bini, ternive in brevibus petiolis. Calyx tubulosus, incurvus, segmento superiori majoti, ovato, acuto, distincto. Tubus floris angustus. Galea cordata, plicata, caerulea, barba trifida, alis ovatis, labello albo bifido, ora caerulea, serrata, Faux deorsum tumens. Semen album, corde inscriptum.

H. Moldavica foliis ovatis, glabris, crenatis, floralibus ciliatis, exiguis. *Moldavica Orientalis, Betonicae folio, flore magno, violaceo* COMMEL. ic. 28. Calyx tubulosus, parum dilatatus, incurvus, dente supremo latiori. Galea magna, angusta, profunde divisa, segmentis reflexis, serratis. Fauces ampliae. Alae ovatae, absconsae medio amplissimo segmento transversim lato, emarginato, serrato. Folia inter flores brevia, ciliata. Semen pene ovale, hinc tamen plano inclinato fit & albo corde inscribitur. r.

H. Moldavica foliis ovatis, floribus calycem vix superantibus. *Moldavica Orientalis, minima, Ocimi folio* COMM. ic. rar. plant. 29. Ex Sibiria. Folia ciliata nuk. la. Spica longa, rara. Flores exigui, bini, ternive ex uno petiolo, colore obsolete purpureo. Calyx lineatus caeruleus. segmento superiori ovali, aristato, duobus proximis latioribus, imis aristatis. Galea parva, incisa, reflexa:

flexa. Alae penie ovatae, labelli origo maculosa, finis bisulcus, fere ut in Lamio.

H. Moldavica foliis glabris, ovatis, floralibus lanceolatis, floribus calyce duplo longioribus. *Moldavica Betonicae folio, floribus minoribus, pendulis, caeruleis* AMMAN. Ex *Sibiria*. Calyx tubulosus, paulum incurvus, segmento supremo latiori, omnibus aristatis. Flos speciosus, uncialis, pulchre caeruleus, tubo gracili, fauce ampla, galea cava, profunde incisa, alis parvis, labello bisulco, obiter ferrato, in origine maculoso. Semen corculo exiguum inscriptum.

H. Moldavica foliis cordato triangularibus, serratis *Comment. Gotting. 1752. Cataria montana, foliis Veronicæ pratensis* BUXBAUM Centur III. p. 27. T. 50. Folia circa pedunculum exserta, longiora & acutiora cordiformibus, argute dentata. Rami gemelli, multiflori. Flores magni, uncialibus majores. Calyx glandulis odoratis notatus, tubulosus, segmentis tribus superioribus triangularibus, duabus inferioribus longioribus, profunde incisis. Flos saturate caeruleus, tubo gracili, fauce ampla, quae Moldavicae characterem absolvit. Labium superius breviter incisum. Alae ovatae. Labellum amplum, purpureis maculis, villis albis in medio hirsutum, bipartitum, portionibus serratis, reflexis, qua altera nota a Nepeta diffidet. Semina subtriquetra, hinc convexa, inde planis obtuse coeuntibus, albis mucronibus.

334 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

-Dracocephalon RIVIN. monop. irreg. T. 25. *Digitalis Americana, purpurea, folio ferrato* MARCHANT p. 271.

Dracocephalon foliis. ex lanceolato linearibus, rarius dentatis, spinulosis, floribus gemellis MARTINI Nondum floruit.

Dracocephalon, quod Ruyschiana glabra, foliis integris AMMANN. *Chamaepitys major, caerulea* MUNTING, f. 171. Nondum floruit.

Cunila foliis ovatis, dentatis, hirsutis. *Stachys minima* RIVIN. mon. irreg. T. 27. *Round Ironwort* PETIVER. T. 33. *Um Längeler und aufm Hagen in segetibus.* Verticilli quatuor & quinque florum. Flos carneus, parvus, galea breviori, quam barba, obtusa, parum subrecta. Barba recta, protensa, alis ovatis, medio segmento subrotundo, in principio maculosum. Semina pene cordiformia, opere vermiculato inscripta.

H. Cunila foliis ovatis, dentatis, verticillis multifloris. *Marrubiastrum angustifolium Cardiacae folio, viridi* BOCC-Mus. H. Plant. p. 136. T. 98. bene. Circa Stampas Veronae & circa Wittebergam RUPP. Verticilli iessiles. Calyx quinquedentatus, longe aristatus: Flos exiguus, rubellus, tubo curvulo. Galea paulum subrecta integra, rotunda. Barbae alae ovatae, medium segmentum multo majus, emarginatum, Stamina tubum floris non excedunt.

H. Cu-

H. Cunila calycibus patulis, aristatis. *Sideritis montana*, parvo flore, nigro purpureo, capite medio croceo CO UIN. I. p 196. Calyx tubulosus, bilabiatus. Ejus pars superior trifida, dentibus triangulis, aristatis & quasi spinosis, inferioribus similibus. Flos calyce minor, flavus, omnibus oris fuscis. Galea brevis, erecta, superne angustior, in spinulam terminata, barba recta, protensa, alis parvis, medio segmento magno, in arcum flexo. Semina ovata, acuminata.

H. Cunila foliis ovatis, tomentosis. *Sideritis Cretica*, tomentosa, candidissimo flore luteo I. R. H. Coroll. aut certe hoc nomine missa. Calyx campaniformis, quinque segmentis mollibus, tomentosis, aristatis, quorum duo inferiora rectiora sibi propiora sunt. Flos galea alba, oris nigris, caeterum erecta, brevis, pene quadrangularis, ferrata, pene trifida. Alae quadrangulae, ferratae. Barba longior, difformiter emarginata, ferrata, cum aliis nigra. Tuba sub apice ramum emittit.

Ballote *Enum. Helv.* p. 648. I. R. H. FUCHS, p. 154. p. 154. *Marrubiastrum* RIVIN. T, 65. Ad macerias & sepes.

Marrubium foliis rotundis, serratis, calycis denticulis decem *Enum. Helv.* p. 684. LINN. *Marrubium* MATTH. Comp. Ital. p. 512. *Marrubium album, vulgare* C. B. An der alten Leine zwischen der Brücke & in arce Plesse.

H. Marrub.

336 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

H. *Marrubium* foliis cordatis, serratis, tomentosis. *Marrubium album*, *inodorum* RIVIN. T. 70. *Marrubium album*, *rotundifolium*, *Hispanicum* HERMANN Parad. p. 201. ic. *Marrubium subrotundo folio* BOCCONE T. 122. *Mus-*
Calyx tubulosus, decem dentibus aristatis terminatus. *Flos* longus, striatusque. *Galea alba*, pilosa, fine bifido, segmentis denuo incisis. *Barba purpurea*, striata, descendens, alis brevibus ovatis, segmento medio diviso, ferrato.

H. *Marrubium* foliis ovatis, tomentosis, integerrimis. *Pseudodictamnus* RIVIN. T. 74. DOD. p. 281. *Calycis campaniformis* segmenta quinque rotunda, quinque minimis denticulis intermisstis: faux lanugine clausa. *Flos* purpureus. *Labium superius* parum cavum, subrectum, bidentatum, ciliatum, segmentis incisis; *inferius* longum, descendens, alis ovatis descendantibus, medio segmento infurcato.

Marrubium foliis ellipticis, serratis, venosis, calycibus quinquedentatis. *Marrubium Creticum* TABERN. p. 539. In ipso pago *Erdeborn* formosa planta sponte nascitur. *Calyx* dentibus quinque rectis, imo longiori. *Flos* albus, *galea* incisa, segmentis divisus, alis patulis, medio segmento lato, subrotundo. *Folia alba*, *venosa*, *dura*, breviter dentata. *Caulis ramosissimus*.

H. *Marrubium* foliis cordatis, retusis, serratis, calycibus quinquedentatis. *Alysson Galeni* CLUS. hisp. p. 386. RIV. T. 69. Ad *Eldam* pagum *Regni Valentiae*. *Calyx* stellatus,

stellatus, pentagonius, rigidus, dentibus superioribus duobus minoribus. Flos purpureus, galea incisa, barbae partibus lateralibus acuminatis, medio segmento cordiformi.

Cataria foliis cordatis, petiolatis, verticillis spicatis *Enum. Helv.* p. 649. *Herba Cataria* MATTH. p. 719. *Nepetha* RIV. T. 52. In ruderofis.

H. *Cataria* foliis argute dentatis, caule laxe paniculato. *Enum. Helv.* p. 652. *Cataria angustifolia*, major I. R. H. *Calamintha montana*, praealta, *Pulegii* odore BOCC. *Mus.* II. p. 45. 58. 59. ic. 38. In *Helvetia* circa *Wesen*. Vera omni dote *Cataria*, calyce curvo in origine sua latiori, galea cordata, alis magnis acute terminatis, medio segmento barbae rotundo, circumferrato. Flos violaceus.

H. *Cataria* foliis ovatis, serratis, hirsutis. *Cataria peregrina*, *latifolia* LOBEL, p. 511. Calyx brevis, quinque segmentis angustis, superioribus majoribus. Galea cordiformis, barba circumferrata, repanda, in medio mucronata. Flos albus.

H. *Cataria* foliis ovatis, petiolatis, glabris, verticillis dissite spicatis *Enum. Helv.* p. 649. *Cattaria Hispanica*, *Betonicae* folio, angustiori, flore caeruleo & albo I. R. H. In *Hispania*, *Helvetia* inter *Bex* & *S. Mauriz.*

H. *Cataria* spicis foliosis, coloratis. *Nepetha tuberosa*, *spicata*, *purpurea*, *Hispanica* BOCC. *Mus. plant.* T. 36. non bene. *Cataria spicata*, *caerulea*, *radice tuberosa* MUNTING. f. 120.

338 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

H. Cataria caule quadrangulo, spicis densissimis, nudis.
Cataria (*Betonica*) *maxima*, *Scrophulariae* folio, floribus
incarnatis HERMAN N. *Parad.* p. 106. cum icone. In
Canada, *Virginia*.

H. Cataria floribus inversis *Comment.* Gotting. 1752.
Radix perennis. Caules cubitales. Folia ex ovatis cordi-
formia, obtusa, rugosa, circumferrata. Rami florigeri,
gemelli, oboviflori. Calyx cylindricus, tribus superne den-
tibus incisus. Flos longe tubulosus, obliquus, tubo lon-
go, latescente, sede staminum potius inferiori, labio,
quod superius esse solet & stamina continet, inferius po-
sito. Hoc incisum est & fit duabus portionibus ovatis. Alae
ovatae. Barba hic superior, emarginata, transversim
lata, crenata & lacera. Color floris caeruleus.
Semina alba, macula cordiformi notata. Odor Catariae.
Ex Sinarum regione.

H. Praesium foliis ovato oblongis, serratis *Cliff.* *Tenuri-*
um, *fruticans*, *amplo* & *albo* *flore*, *Italicum* BARR. *ic.* p.
895. *Lamio fruticoso senza maccchia di Candia* ZANON.
T. 80. Unica inter omnes plantas verticillatas fructum
mollem profert.

H. *Melissa* *Fuchsii* *Enum.* *Helv.* p. 650. CAMER. *Epit.* p.
99. *Lamium Plinii* KOENIG *disp. propr.* Sponte in *Hel-*
vetiae *dumetis*; *Auf der Aſſeburg* ROYER. Varietas etiam
alba

SEMINIBUS QUATUOR NUDIS. 339

alba galea, labello purpureo datur. Calyx irregularis, incisionibus, obscuris.

H. *Melissa floribus ex valis inferioribus subsessilibus* LINN. *Melissa RIVIN.* T. 45. BLAKWELL. T. 27. *Melissa officinarum AICHST.* Aest. Ord. VII. T. I. f. 3. *Veronae & in Helvetia calidiori.* Circa *Generam,* Circa *Ingentiatt,* & in *Colchide.*

H. *Melissa foliis ovatis, obtusis, caule procumbente* Enn. *Helv.* p. 651. n. 2. *Calamintha Pulegii odore C. B.* *Calamintha folio incano RIV.* T. 47. In *Anglia, Belgio per* agros. Petioli multiflori, non dichotomi.

H. *Melissa (Calamintha) Pulegii odore flore minori,* erecta, *Virginiana COLLINS.* Habitus prioris. Odor fortior. Folia magis dentata. Flos multoties minor, Calyx similis, labio superiori tridentato, sursum reflexo, inferioribus duobus rectis, angustis. Flos caerulescens, vix calyce longior. Galea emarginata. Alae ovatae, medium segmentum subovatum, sursum reflexum. Semina parva.

H. *Melissa Moluccana spinosa DOD.* *Purg.* p. 164. *Molucca RIVIN.* T. 64. In *Syria.* Calyx amplissimus, conice patulus, ex brevi tubo emittens, segmentum superius, inferiora quatuor, aristata omnia & spinosa.

H. *Melissa levis Moluccana MUNT.* hif. f. 217. In *Syria POCOCK.* Calyx amplissimus quinque brevibus aristis inermibus terminatus,

Chamaelema cāulibus procumbentibus, radicatis, foliis cordiformibus, petiolatis *Enum.* *Helv.* p. 652. *Calamintha humilior*, folio rotundiori I. R. H. *Hedera terrestris* DOD. p. 394. BLAKWELL. T. 225. Ad sepes frequens & sub arboribus.

Chamaelema flore magno. *Hedera terrestris*, *montana* C. B. *Chamaelema majus*, *hirsutius* VAILL. p. 33. Passim y. g. in vallo suburbano.

H. *Hyssopus officinarum*, *caerulea*, *spicata* C. B. *Hyssopus* RIVIN. T. 65. In rupibus arcis Salzderhelden, quasi sponte.

β. Flore albo.

H. *Satureja pedunculis bifloris* LINN. *Satureja* RIVIN. T. 44. *Satureja sativa* L. B. III. p. 272. In Italia, Gallia.

Clinopodium verticillis densissimis, dissitis, foliis tomentosis, ovatis, acuminatis *Enum.* *Helv.* p. 653. *Clinopodium* RIVIN. T. 43. *Clinopodium* *Origano simile*, *elatius*, *majori* flore I. R. H. Gegen Lüttjelängen.

Clinopodium verticillis paucifloris, ab imo ad summum dispersis *Enum.* *Helv.* p. 654. *Small wild Basil* PETIVER. T. 32. *Clinopodium arvense*, *Ocimi folio* I. R. H. *Acinos* RIVIN. T. 47. Passim in agris & muris. Ex faucium amplitudine ad Moldavicam referri potest, cum cuius speciebus habitus consentit.

β. Flo-

β. Flore albo.

H. Clinopodium perenniē; Palegii odore; Majoranae folio; Pataviūm BOCCONE. Calyx sulcatus; deorsum gibbus, ut in Acino, tribus dentibus superioribus, duobus inferioribus. Flos ad Moldavicā accedit, uti flos Acini, fauce ampliati, galea incisa, cordata, labello ample, alis ovatis, medio segmento transversim lato. Color subvidlaceus; fructus maculosae. Semina exigua, fusca; ovata, maculata.

H. Clinopodium floribūs verticillatis, foliis ovatis, serratis; in fine leniter tomentosis KALMII. Non dum floruit.

H. Thymus erectus, foliis margine reflexis, ovatis, floribus verticillato spicatis LINN. Thymus RIVIN. T. 41. In Africa, Gallia calidiori.

Thymus foliis ovatis, basi ciliatis, flore minore. Enum. Helv. p. 654. Serpyllum vulgare, minus C. B. Serpyllum flore minori RIVIN. T. 42.

β. Citri odore. Serpyllum citratum RIVIN. T. 41. In montosis lapidosis ubique.

γ. Flore majore VAILL. T. 32. f. 8.

Thymus foliis ellipticis & caule hirsutis Enum. Helv. p. 655. Serpyllum saxatile, hirsutum, Thymifolium, incanum, flore rubello & flore albo VAILL. T. XXXI. f. 40. Serpyllum parnionicum III. CLUS. Pann. p. 626. In sabuletis Cellensibus frequens;

H. Lavenie

342 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

H. *Lavendula angustifolia* MORIS. S. XI. T. I. *Lavendula* BLAKWELL. T. 294. RIVIN. T. 54.

H. *Lavendula latifolia* RIVIN. T. 54. *Monspelii*. *Paramum* a priori differt.

H. *Lavendula* foliis lanceolato linearibus, spica comosa LINN. *Stoechas Arabica* RIVIN. T. 55. In *Stoechadilus insulic*, *Syria*, *Asia minori*. Spica octosticha, & quatuor ordines una florent. In spica folia lata, lanuginosa, venosa. Calycis segmentum superius cordiforme, latum, quatuor reliqua brevissima. Flos violaceus, paulum obliquus, segmentis duobus superioribus paulo majoribus, omnibus subrotundis. Tuba capitata. r.

H. *Lavendula* foliis serratis, spicis foliosis. *Stoechas* II. CLUS. *bisp.* p. 233. *Stoechas* folio serrato DOD. *Purg.* p. 412. *Stoechas serratifolia* RIVIN. T. 55. Spica bracteis distincta. Flos verbenaæ caerulescens, segmentis quinque subrotundis, quorum duo superiora supina sunt. Calycis segmentum supremum amplius, reliqui denticuli brevissimi. Tubus floris interne gibbus. Tuba clavata. In *Toscana*, *Monspelii*. &c.

H. *Lavendula* folio multifido RIVIN. T. 54. CLUS, *bisp.* p. 235. In Africa.

Origanum spicis foliosis brevissimis, coloratis, umbellatis *Enum. Helv.* p. 656. *Origanum sylvestre seu vulgare* TABERN. p. 346. Ad omnes colles Germaniae inque *Creta*.

H. Ori-

H. *Origanum staminibus latentibus.* *Origanum Heracloticum I & II.* TABERNARVM. p. 345. *Majorana Organites* MUNTING. kist. f. 210. *Majorana perennis* RIVIN. T. 58. Differt a priori odore grato, flore carneo albido, staminibus in tubo floris latentibus, quae in priori eminent, & apicibus minutissimis, quasi abortivis;

H. *Majorana vulgaris*, annua MÖRIS. S. XI. T. 3. *Majorana* RIVIN. T. 58. *Majorana sive Marum* DOD. Coron. p. 268. Calycis foliola duo, ambitu hyperbolico, superiori minori, cui flos adhaeret. Hac nota a tota verticillata classe distat. Flos infundibuli modo dilatatus, labio superiori brevi, inciso, inferiori acute & aequaliter trifido. Spicae tetraesticæ. Cum Origano nihil communè habet:

H. *Dicamnus* LOB. ic. p. 502. In Creta, Calabria LABAT. Nihil quidem cum Majorana commune habet, praeter aliquid in spicis floralibus, neque cum Origano. Calyx hinc superne resectus; inde recta productus in segmentum ovato lanceolatum. Flos magnus, purpureus sub ortu barbae tumet, labio superiori rotundo, cavo, bifido, ex quo stamina èminent, inferiori aequaliter trifido. Folia in caule tomentosa, in spica glabra, colorata.

Mentha foliis elliptico lanceolatis, verticillis in spicam nudam continuatis ENN. HELV. p. 658. *Mentha sylvestris*

344 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

longiore folio C. B. *Menthastrum* RIVIN. T. 51. BLAKWELL.

T. 292. In aquosis ubique.

Mentha foliis ovatis, tomentosis, verticillis in spicam continuatis Enum. Helv. p. 657. *Mentha rotundifolia, spicata, altera.* C. B. *Menthastrum spicatum*, cultum, folio rotundiore, rugoso I. B. III. 2. p. 218. *Menthastrum Anglicum* RIVIN. T. 51. In fossis Alsatiae. Staminibus brevibus & non eminentibus, & foliis non acuminateis a priori differt.

H. *Mentha crispa, rotundifolia, spicata* MORISON. S. XI.
T. 6. I. B. III. p. 217. *Mentha crispa* RIVIN. T. 50. In Anglia hinc inde.

H. *Mentha angustifolia, spicata* C. B. MORIS. S. XI.
T. 6. *Mentha spicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriori*
I. B. III. p. 220. In comitatu Northamptonensi.

Mentha foliis ovato lanceolatis, verticillis paucis, supremo maximo Enum. Helv. p. 658. *Mentha rotundifolia, palustris* C. B. H. OX. III. p. 370. T. 7. f. 6. In fossis aquosis.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, acute serratis Enum. Helv. p. 658. LINN. *Mentha verticillata* RIVIN. T. 48.

Mentha palustris, verticillata DILL. GIEFF. Revera differt, non solum glabrioribus foliis & laetiori habitu, & flore majori, sed etiam clype profundi inciso, staminibus in tubo floris latentibus, cum in *Mentha verticillata arvensi* stamina tamen in tubo floris conspici possint.

Pule.

SEMINIBUS QUATUOR NUDIS. 345

Pulegium foliis subrotundis, verticillis nudis Ennū. Helv. p. 659. Pulegium FUCHS. p. 198. Pulegium latifolium C. B. Ad insulas Rheni & litora ejus aquosa abunde. In Lemno BELLON.

Lycopus Ennū. Helv. p. 660. LINN: Pseudomarrubium palustre RIVIN. T. 21.

β. Marrubium aquaticum; foliis tenuius diffinis MORIS. Prael. PLUKN: 45: f. 1. In aquosis non raro.

H. Amethystina Comment, Gotting. 1751. T. X. p. 209. Amethystina montana, erecta, foliis exiguis, serratis, trifidis, flosculis cum coma ex caeruleo janthinis AMMAN. Ruthen. p. 54. n. 70. Calyx campaniformis, patens. Flos tubulosus, limbo quinquefido, segmento inferiori latiori, emarginato, reliquis ovatis, acutis, staminibus duobus, tuba incurva simplici.

Verbena foliis laciniaitis, superioribus tripartitis, spicis angustis, longissimis Ennū. Helv. p. 661. Verbenaca MATTH. p. 1052. Verbena vulgaris I. B. III. p. 443. Ubique ad fossas.

H. Verbena Urticae folio, Canadensis, foliis incisis, flore majore I. R. H. A sequente differt foliis, floribus, magnitudine, colore; vulgari Europeae tota propior, & aspet-

346 DIDYNAMIAE VERTICILLATAE,

asperitate majori atque acutiori partium foliis divisione sola diversa. Stamina in duobus ordinibus de more quatuor. r.

H. Verbena altissima, Americana, spica multiplici, Urticae foliis, angustis, floribus caeruleis HERMAN. *Pai:* p. 242. Spicae densiores, sub quovis calyce squama. Calyx tubulosus, denticulis tribus superioribus, quorum medius brevissimus est, inferioribus duobus. Tubus floris incurvus, flos violaceus. Segmenta duo superiora acutiora, angustiora, fauces clausae, medium segmentum emarginatum. Stamina duo longiora, duo breviora. Tuba apice globoso, sub globo spiculum; Semen ellipticum, hinc convexum, inde excavatum. r.

H. Verbena foliis ovato lanceolatis, caule erecto, spicis filiformibus LINN. *Hort. Cliff.* p. II. *Ver-*
bena con foglia dortica di Canada ZANON. p. 227. ic.
375. *Verbena maxima, Urticae folio, spicata MUNTING* f. 225. *Verbena peregrina, foliis Urticae MARCHANT* p. 317. Spicae valde rarae. Calyx curvulus, segmentis brevibus, quinis, superiori minimo. Flos albus, tubo curvo, segmento imo saepe emarginato, duabus inmediocribus, duabus supremis minimis, faucibus pilis clausis. Stamina sessilia, duorum ordinum.

H. Verbena Caroliniana, Melissae folio, aspero DILL. *Hort. Elth.* T. 30. Flores minimi, pallide caerulei, segmentis ovatis, quorum duo minora propiora sibi, tria magis distantia, fauces pilis clausae sunt. Calyx tubulosus,
denti-


denticulis brevibus, superiori brevissimo. Stamina duo longiora, duo breviora.

H. Verbena Bonariensis, altissima, Lavendulae Canariensis spica multiplici DILL. Hort. Elth. p. 406. f. 406. Calyx tubulosus, denticulatus, supremo denticulo minimo. Floris tubus paulum curvus, limbus quinquefidus, segmentis violaceis, emarginatis, quorum imum maximum duo mediocria, duo supra maxima minima sunt. Stamina in duobus ordinibus quatuor. Semina de more gentis.

H. Verbena nodiflora C. B. Prodr. Spicae breves, rotundae, per caulem dispersae, & pene sessiles, exceptae foliolis ovatis firmis, ut sub quovis etiam flore foliolum sit. Calyx-bifolius, biglumi similis, flosculus albo rubellus: tubus rectus: segmenta tria subrotunda, minora, duo inferiora magna. Stamina quatuor in faucibus floris, apicibus bilocularibus. Tuba capitata. Semina hinc convexa, inde plana, ovata, resecta & emarginata. Calyce a reliquis speciebus differt.

Neque ergo duae unice antherae sunt, ut HILLIUS scripsit T. II, nat. hist. p. 170.





DIPSACEAE FLORIBUS SEMINI INNATIS,
AGGREGATIS.

H. *Gomphrena caule recto, foliis ovato lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis aphyllis* LINN: *Amaranthus affinis*, *Orientalis*, *floribus glomeratis*, *Ocymoides folia* BREYN. ic. 51. 2. sp. H. AMST. I. f. 45: *Wadepū* H. MAL. X. p. 73.

β. H. *Capitulis argenteis, majoribus: Varie-*
tas. r.

H. *Limonium peregrinum*, *Asplenii folio*. C. B. *Limonium Syriacum, elegans* RAUWOLF n. 314. *Limonium peregrinum* CLUS. cur. post. p. 33: *Limonium elegans Asplenoides* MUNTING. hist. f. 201: In *Palaestina* PO-
COCK, *Caules alati, annui. Folia eleganter semipinnata,*
dentibus obtusis & crispis. Flores in longo ordine in
ramis dispositi; sub floribus foliola crassa, bifida. Calyx
plicatus, conicus, caeruleus. Petala quinque ochroleuca,
emarginata:

H. *Statice caule nudo, ramoso* LINN. *Limonium* LOB.
p. 295. *Limonium maritimum* MOR. S. XV. T. I. Ad
ripas *Maris mediterranei & Baltici etiam, & Anglii.*
Nomen non sufficit, cum sequenti, & aliis conveniat. Huic
speciei rami pene teretes, folia in ramis minima, albo-
rubra, ovato lanceolata, petalodea; flores in ramis or-
dinati;

dinati, paralleli, in spicas heteromallas. Valde ludit, & saepissime multiplicatum est.

H. Statice foliis lanceolatis, mucronatis, radicalibus, caule ancipi, dichotomo, floribus alternis distantibus. *Limonium elatius*, *Plantaginis folio*, procumbentibus, in aculeum terminatis, floribus albis, in spicas congestis AM-MAN. n. 130. GMELIN. II. T. 92. Ad Jaicum fluvium. Diversum utique a priori ramis valde angulosis, recurvis, magis sparsis, durioribus, foliis ramorum non pellicidis & ovato lanceolatis, sed rigidis, viridibus, acuminatis, floribus inordinatis, distantibus, albis, r.

H. Limonium caule folioso, ramo, foliis ellipticis, obtusis. *Limonium lignosum*, *Gallas ferens* BOCC. Mus. Sic. T. 17. nobis autem Gallas non fert.

Statice caule nudo, simplicissimo LINN. BOERH. *Limonium gramineum*, *flore globo, majus* MORIS. S.XV. T. I. Circa Herzberg, Goslar & alibi in fabulosis Germaniae.

Valeriana foliis omnibus pinnatis Enum. Helv. p. 662, LINN. Cliff. p. 16. *Valeriana sylvestris* DOD. Purg. p. 87. In udis sepibus.

H. *Valeriana monostemon*, foliis imis integris, superioribus pinnatis. *Valeriana folio Calcitrapae* MORIS. p. 101. Monspelii & in Lusitania.

β. Flore rubro.

γ. Foliis

γ. Flois integris. *Valeriana latifolia*, ad *Valerianam* folio *Calcitrapae* adcedens MORIS. III. p. 102.

Valeriana foliis imis ovalibus, superioribus plerumque pinnatis, sexu distincta *Enum. Helv.* p. 663. *Valeriana palustris*, minor C. B. *Phu minimum* seu *Valeriana montana*, *palustris* CAMER. *Epit.* p. 23. Mas flore magno.

β. Femina flore minuto, congesto. *Valeriana palustris*, foliis subrotundis LOESEL. ic. 84. p. 279. In paludosis passim.

H. *Valeriana* foliis imis integris & semipinnatis, superioribus pinnatis, *Valeriana hortensis* vulgo. In *Dolphinatus* & *Languedociae* montibus.

H. *Valeriana* foliis omnibus integris, ovatis, leviter dentatis *Enum. Helv.* p. 664. *Valeriana Alpina*, folio *Scrophulariae* C. B. *Prodr.* p. 87. In *Helvetiae* montibus abunde. r.

H. *Valeriana* flore calcare donato *Enum. Helv.* p. 665. *Valeriana rubra* DOD. *Purg.* p. 91. *Valeriana marina*. *latifolia* MORIS. *Umbell.* T. II. *Nemausi*, Neapol., ad lacum *Benacum*, *Monspelii*, *Neocomi*, in M. *Falconario*, in muris & rupibus. Cum vulgaris *Valeriana* initium calcaris habeat, non censeo separandam esse, & in uno genere relinquo *Valerianas* semine pappum plumosum expediente.

Valerianella caule dichotomo, foliis oblongis, rariter incisis, seminis mucrone simplici *Enum. Helv.* p. 666. *Valeria-*

Valerianella arvensis, praecox, humilis, foliis serratis I: R. H.
Locusta minor RIVIN. T. 6. Ubique, passim edulis.

Valerianella caule dichotomo, foliis plerumque serratis,
seminis corona tridentata Enum. Helv. p. 666. *Valeria-*
na altera, nudo, umbilicato & levi semine COLUMN. p.
 209. *Locusta major* RIVIN. T. 6. *Monspelii & Gottin-*
gae, serotina.

H. *Valerianella Cretica*, fructu vesicario BOERH. I.
 p. 75. *Fructus vestitus tenero distante cortice, qui semi-*
ne amplior est, quod in fundo sedet, hinc rotundum,
cum longo coilo, inde biloculare. Flos per apicem am-
pullae exeuns, inaequaliter quinquefidus, de more, rubel-
lus, tristemon, ut duae priores.

H. *Valerianella semine stellato* I. R. H. *Valerianella ca-*
pitata MUNTING. f. 223. *Monspelii & in Italia. Co-*
rona magna, foliacea, octo radiorum, aristatorum, in
summo fructu. Is bilocularis est, flos parvus, albus,
inaequalis, stamina tria.

H. *Valerianella tetrastremon*, semine foliolo insidente
Comment. Gotting. 1751. p. 207. T. IX. *Valerianella pro-*
cera, folio varie secto, semine auriculato AMMAN.
 n. 26.

H. *Valerianella Indica*, vel rubra, *Cornucopioides* C.
 B. *Valerianella Cornucopioides* RIVIN. mon. irreg. T. 5.
 florentis icon. *Valerianella echinata* GARIDEL T. 97.
Valerianella Cornucopioides, echinata COLUMN. Ecphras.
 p. 306. *Semen breve, foliaceum, coronaatum calyce*
 inter-

irregulari, quinquedentato. Flos bilabiatus; segmenta duo superiora rosea, ovata; tria inferiora angustiora, medium emarginatum, communi initio nata. Stamina duo. Tuba bicornis.

H. Boerhaavia. *Talu Dama* H. MAL. *Valerianella Curassavica*, semine aspero, viscosa HERMAN. *Parad.* p. 236. ic. Semina sunt pyramides quadrangulares, inter hEDRAS transversim rugosae. Calyx campaniformis, quinquefidus, segmentis acutis. Flos sature purpureus, hilo brevi, segmentis quinque emarginatis. Tuba in imo calyce, apice globoso. Stamen in tubo floris unicum, & semen unicum. Adfinis adeo *Valeriana*e. r.

H. Cuminoides TOURNEF. *Cuminum sylvestre* WOLF. pollicit. p. 50. CAM. Epit. p. 519. In Mesopotamia, Palæstina, Syria POCOCK.

Astrocephalus foliis ad terram ovatis, serratis, ad caulem pinnatis, angustissimis Enum. *Helv.* p. 668. *Scabiosa capitulo globo*, minor C. B. *Scabiosa minor* CAMER. Epit. p. 11. Vulgaris planta in collibus siccis, a *Scabiosa officinarum* toto caelo diversa est.

B. Prolifera I. B. III. P. I, p. 5. Circa Wallenried reperi.

Scabiosa folio multisido, flore albo III. CLUS. *Pann.* p. 537. In omnibus viis Thuringiae circa Eisleben, Quedlinburg.

linburg. Satis similis est vulgari Asterocephalo, etiam inimis foliis latioribus, neque enim omnia laciniata sunt. Sed flos constanter ochroleucus, habitusque durior est.

H. Scabiosa stellata, folio laciniato, major I. R. H. *Scabiosa Hispanica*, major CLUS. hisp. p. 365. Folia longa, sub flore, reflexa. Flosculi in ambitu aliquot abortivi, semine minori. Veri flosculi albi, aut subcaerulei, seminis involucro gossypiaceo, terminato in conum pli- catum, amplissimum, pulcherrimum, stellatum. Tubae seminis circumdatur corona quinque ciliorum purpureo- rum. Floris segmenta quatuor lanceolata, imum magius, ovale.

H. Asterocephalus annuus, ruber, capite oblongo VAILL. *Scabiosa Indica*, flore saturate rubro AICHST. Aest. Ord. IX. T. 10. f. 1.

β. Barbulis carneis AICHST. 16. t. 2.

H. Scabiosa foliis planis, carnosis, inferioribus pinna- tis, ramorum integerrimis, linearibus GMELIN. II. p. 213. T. 87. Calyx incurvus, octo radiorum inaequalium. Flosculi in ambitu ringentes, quinquefidos segmentis inaequalibus, serratis, imo maximo, emarginato. Inte- riores infundibuliformes, pene acquabiles sunt.

Astrocephalus involucrum conicum habet, Scabiosa quadriangulare: ille flores quinquefidos, haec quadrifidos. &c.

Scabiosa foliis subhirsutis, iunis ovatis, superioribus se- mipinnatis EMM. Helv. p. 669. *Scabiosa pratensis*, hirsuta,

quae Officinarum C. B. *Scabiosa* flore ex caeruleo purpureo TAB. p. 158. In pratis passim.

H. Knautia LINN. *Lychnis* *Scabiosa* flore rubro, annua BOERH. *Scabiosa Orientalis*, foliis superioribus integris, flore parvo, purpureo, calyce gracili TILLI T. 48.

Succisa foliis ad terram ovatis, ad caulem oblongis, parum dentatis Enn. Helv. p. 671. *Succisa* sive *Morsus Diaboli* MATTH. p. 623. In pratis uidis circa Harste, & inter Lengeler & Boavenden :

H. *Succisa* foliis pinnatis, pinnis serratis, capitulis globosis, hispidis, congettis Enn. Helv. p. 672. *Scabiosa Alpina*, folio *Centaurea majoris* C. B. *Succisa altissima*, foliis pinnatis, serratis MANGET. D. Pharm II. p. 797. In M. Thuiri supra Genesam.

H. *Succisa* capitulo nudo, glabro, foliis glabris, pinnatis, solidis Comment. Gotting. 1751. p. 225. Folia glabra, firma, dura, pinnarum paucibus tribus, una inpare, omnibus ovato lanceolatis. Capitulum a' sque radiatis foliis, glabrum, ochroleucum. Involucrum semi-nis quadratum, denticulis quatuor majoribus, quatuor minoribus. Flosculi difformes. Squamae lanceolatae, acutae, sub floribus. Ex semine GERBERIANO. r.

Succisa a *Scabiosa* differt, quod corolla quinque separata est, substituatur, & unice involucrum seminis quatuor nigris

SEMINI INNATIS AGGREGATIS. 555

nigris setis terminetur, & quod folia calycibus subiecta brevissima semper, & ovato lanceolata sint, neque radiata.

Dipsacus capitulis haemisphaericis, nudis *Enum. Helv.* p. 672. *Virga Pastoris* BLAKWELL. T. 124. *Dipsacus vulgaris*, capitulo minore, vel *Virga Pastoris minor* C. B. Versus *Kescheröderfeld*, super *Lütjelengen*, & in vallecula ad radicem M. *Plessensis*.

Dipsacus capitulis ovalibus, calycis foliis sulcatis, dentatis, aristis glumarum rectis *Enum. Helv.* p. 673. *Dipsacus sylvestris*, aut *Virga Pastoris major* C. B. *Labrum venneris alterum* CAM. *Epit.* p. 432. Foliis semipinnatis ludit, v. g. *um Herperhausen*, diversa tamen a Dipsaco laciniato.

H. Dipsacus capitulis ovatis, aristis glumarum recurvis, asperis, *Dipsacus sativus* auct.

Dipsacus foliis pinnatis, capitulis ovatis, aristis repandis. *Dipsacus foliis laciniatis* I, R. H. In *Alsatia*, circa *Wormatiam* &c.

C A P I T A T A E.

H. *Echinopus minor*, annuus, capite magno I. R. H. *Scabiosa Cardui folia*, annua, *Batifica*, *minor* HERMAN. *Par.* p. 224. *Sphaerocephalus annuus* CAM. *Hort. ic.* 45. Folia tenuiter divisa.

H. *Echinopus caule* subunifloro, foliis duplicato pinnatifidis, foliolis latiusculis, vicinis GMELIN *Sibir.* II. p. 100. Ad lacum *Baikal.* Loculi staminum omnibus speciebus ad basin barbati sunt.

H. *Echinopus minor*, folio *Acanthi*, aculeato. I. R. H. *Carduus sphaerocephalus*, *acutus* DOD. *Purg.* p. 443 *Spina alba putata* CAM. *Epit.* p. 435. *Spina alba* LOB. II. p. 9. In *Graecia & Italia.*

Onopordon foliis tomentosis, obiter laciniatis, caule alato, brachiato, altissimo *Enum.* *Helv.* p. 674. *Onopordon* DOD. *Purg.* p. 446. *Spina alba, tomentosa, latifolia, sylvestris* LOESEL. *ic.* S2. In *vallo urbis & ad vias* abunde.

H. *Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, *Lusitanicus*, altissimus I. R. H. *Squamae majores*, quam nostro *Onopordo*, glabrae. Reliqua similia.

H. *Carduus lacteus*, tomentosus, *Acanthi folio*, flore magno. Utique a DILLENIO missus est. Caput huic majus, quam vulgari, *squamae calyx* majores, fortiores, copiosieri tomento obductae. Reliqua eadem.

H. Ono-

H. Onopordon acaulon ferme, flore albicante IUSS. Parum nota planta, foliis ad terram tomentosis, semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis. Flores brevissime petiolati, insident mediis foliis, multi congestique. Flores globosi. Squamae calycum simplices, aculeatae. Placenta nuda alveolata. Pappus tubi floris longitudine. Flosculi albi, iuxta lacinia longiori, extrorsum repandi. Semen ovato quadrangulare, basi superne lata.

H. Cinara hortensis, foliis non aculeatis C. B. *Fructus Artijchoki* ALCHST. Aut. Ord. IV. T. 3. & Ord. XI. f. 4. Sponte in Africa, Minorca. Squamae calycis emarginatae, incertes, caulis humilis.

H. Cinara spinola, cuius caules esitantur C. B. *Scolymus aculeatus* TABERN p. 656. *Cardou vulgo Ecole du potager* p. 290. Caulis excelsus, ramosus, squamari finis repandus acuminatus.

H. Cinara sylvestris, spinis longis, flavescens C. B. MICH. *hort. flor. Circa Volterra*. Nondum floruit.

Lappa capitulis & foliorum facie inferiori tomentosis Enum. *Helv.* p. 675. *Arction montanum* & *Lappa minor* Galeni LOBEL. ic. p. 587. Cobweb headed Burdock PETIVER T. 23. &c. *Lappa minor, montana, capitulis tomentosis, sive capitulis* *Dioscoridis* C. B. Ubique ad vias.

Lappa capitulis glabris, minimis Enum. Helv. p. 676.
Small headed Burdock PETIVER. T. 23. Zu Northeim am
Thor, auch um Göttingen,

Carduus laciniis foliorum complicatis & spinosis, capitulo spinoso, nutante Enum. Helv. p. 676. Carduus nutans I. B. III. p 56. Ad vias abunde.

Carduus foliis ciliatis, sultus tomentosis, capitulis sessilibus, congestis, molliter spinosis Enum. Helv. p. 677. Carduus spinosissimus, angustifolius, vulgaris C. B. Carduus caule crispo I. B. III. P. I. p. 59. Ad sepes & in ruderibus.

β. Flore albo.

Carduus inermis, foliis rigidis, ciliatis, scapo longo, paucifloro Enum. Helv. p. 677. T. XIX. & Opusc. Botan. P. V. Itin. Helv. p. 210. Spbo XXIX. Cirsiu m pannonicum I. CLUS. Pam p. 655. Super Sopronium In agro Veronensi. Passim circa Jenam in sylvis, &c in Helvetia frequenter.

H. *Carduus inermis, foliis imis laciniatis, superioribus integris, squamis calycis reflexis Enum. Helv. p. 678. T. XIX. & Opusc. Botan. Itin. Helv. p. 231. In sylvis Jurossi & Alpium. r.*

Carduus inermis, foliis glabris, imis ovatis, superioribus pinnatis Enum. Helv. p. 678. Serratula tinctoria TAB. p. 156. 157. tres varietates. Abunde in M. Pless ad dextra arcis.

β. Flo-

β. Flore albo. Itidem.

H. *Carduus caule ramoso, foliis pinnatifidis, foliolis inferiotum dentatis, squamis ex lanceolato spinosis; papposis* GMELIN. II. n. 38. T. 17. Nondum floruit.

H. *Carduus foliis ex cordato lanceolatis, margine serratis & spinosis, squamis calycum membraneis, laceris, spinosis, capitulis nutantibus* GMELIN *Flor. Sib.* II. T. 19. n. 40. Nondum floruit.

H. *Carduus inermis, foliis glabris, pinnatis, lacinia extrema maxima, capitulis squalidis* GMELIN. *Flor. Sib.* II. T. 20. Nondum floruit.

H. *Cirsium aculeatum, foliis tomentosis, spinosis, capitulis cylindricis, subhirsutis. Carduus Acanthoides, siccus, venis albicantibus* PETIVIR. *Pappus plumbosus, brevissimus tamen ramulis setarum.*

Cirsium foliis spinosis, pinnatis, pennis semibilobis, capitulis tomentosis, turbinatis, pungentibus Enn. Helv. p. 681. *Carduus lanceatus* TABERNAEMONT. p. 699. Ad vias & in sylvis.

β re albo.

H. Valde accedit, quod ex *America ad me* advenit, foliis inprimis, squamis etiam tomentosis, inque aculeum exeuntibus; sed turbinata capita minima sunt. Pappus adeo breviter pilosus, ut microscopio demum adgnoscantur pili, quos emitit, & videatur hoc genus & Acanthoi-

des sicutus Carduos cum Cirsis conjungere. Spinulae etiam breviores, numerus longe minor est foliorum calycis. Nomen tecum Cirsii foliis pinnatis, pinnis triangularibus, spinosis, calycibus reclinatis, aculeatis.

Cirsium foliis pinnatis, pinnis decurrentibus, spinosis, capitulis tomentosis, sphaericis, pungentibus Enum. Helv. p. 680. *Carduus Eriocephalus* DOD. Purz. p. 445. In montosis super Nördlingam reperi, & in montosis Helvetiae.

Simillimam plantam ex Sibiria habui, tamen aliquantum diversam, parte reflexa squamarum calycinatum longiori, seminibus minoribus, magis fuscis.

Cirsium inerme, radicibus teretibus, congestis, pinnis foliorum semibilobis, ramis unifloris. *Cirsium pratense*, *Asphodeli* radice, foliis temiter incisis VALLI. *Acanthus Jylvestris* alter LUGD. p. 1444. In sylvis non frequens, in Eulenloche, prope viam ad Besigehausen, in sylva Gottingensi versus der Bruch.

B. Flore albo. In fossis prope Harste am Pfingstanger, & in prato inter Herperhausen & Göttingerwald. A Cirsio turbinato lanceolato differt flore longiori, cylindrico, spinis calycis brevissimis. Ab acaulo foliis minus longis & compositis, pinnis paucioribus, longioribus, minus latis & confertis, tomento in capitulis: ab omnibus radicibus numerosis cylindricis.

Cirsium caule floris longitudine Enum. Helv. p. 682. *Chamaeleon exiguus* TRAGI p. 852. Cirsium acaulos, flore purpureo

purpureo I. R. H. *Passim* in siccis montosis, v. g. in adscensu ad speculam M. Heymberg.

H. *Cirsium spinosum*, *venis foliorum lacteis*. *Erioccephalos leucographos*, *flore albo, coronato* VAILL. *Carduus lacteus*, *Syriacus* CAMER. *hort. ic. X.* *Caput turbinatum*. *Squamae imbricatae*, *in aculeum terminatae*, *obnuptae tomento*. *Flosculi nonnulli imperfetti*. *Pappus plumosus*, *in placenta setaceus*. *Ima lacinia floris profundius divisa*. *Semina ex conico cordiformia*.

H. *Cirsium - - - Carduus canescens*, *aculeis flavescentibus munitus* BOERH. *Carduus ferox* MUNTING ic. 126 IMPERATI p. 883. *Chamaeleon Salmanticensis* CLUS bisp. p. 450. *Polyacanthos* IMPERATI p. 883. In Hispania. *Calycis squamae in aculeum validissimum flavescentem* abeunt. *Placenta papposa, convexa*. *Flosculi carnelia* ima lacinia profundiori, tubae apex inferius barbatus. *Pappus plumosus*. r.

Cirsium foliis semipinnatis, spinosis, capitulis oblongis, mitioribus Enum. Helv. p. 680. *Carduus arvensis* TABERN. p. 700. *Vulgarissima* planta in segetibus humidiорibus.

Cirsium caule pene nudo, alis crispis obducto, capitulis mitibus, in vertice congestis Enum. Helv. p. 681. *Cirsium pratense*, *polycephalon*, *vulgare* I. R. H. *Cirsium* foliis pinnatifidis, laciinis linearibus, caule criso, capitulis mitibus, in vertice congestis GMELIN. flor. Sibir. II. T. 23. f.

2. *Car-*

Carduus spinosissimus, angustifolius, pratensis LOESEL.
p. 35. In pratis & sylvis uidis.

β. Flore albo. Inter Lütjelengen & Geismar in
sylva.

Cirsium inerme, floribus inter flavescens folia conge-
stis ENUM. HELV. p. 679. *Carduus pratensis* LOBEL. IC. II.
p. 11. *Cirsium Acanthoides, pratense, flore ochroleuco*
VAILLANT. Nobis semper ochroleucum est.

β. Flore purpureo, in Borussia.

H. *Cirsium* foliis ciliatis, imis ovatis, superioribus se-
mipinnatis COMMENT. GOTT. 1751. p. 306. Folia ima ova-
to lanceolata, serrata, eo magis incisa, quo altior caulis
est; suprema semipinnata. Caulis nudus. Capitula con-
gesta, ex brevibus petiolis tomentosis. Calyx turbina-
tus, squamis repandis, molliter acuminatis, purpura tin-
etus. Flos speciosus, purpureus, ima parte de more pro-
fundius incisus. r.

H. *Cirsium* quod *Serratula Sibirica, Taraxaci* foliis:
rigidis, floribus purpureis. Nondum floruit.

Silybum nervis foliorum albis ENUM. HELV. p. 684.
Carduus Mariae BLACKWELL. T. 79. TRAG. p. 850.
Passim ad hortos, et si exotica videtur. Circa JERUSALEM
FOCOCK.

H. *Atractylis* succo sanguineo, flore luteo ENUM. HELV.
p. 685. *Atractylis* CAMER. Epit. p. 561. In agro
Veronensi

Veronensi, & circa Treicovagnes *Helvetiae*. In Creta
BELLON.

H. Atra stylis flore leucophaeo VAILL. Apicum filamenta
sagittata. Semina in ambitu absque pappo, in disco
pappo lato, inaequali, coronata.

H. *Carthamus* foliis ovatis, integris, margine aculea-
tis LINN. *Cnicus* sive *Carthamus* DOD. *Purg.* p. 123. In
Thuringia seritur.

H. *Cnicus sylvestris*, hirsutior, sive *Carduus benedictus*
C. B. *Carduus benedictus* AICHST, *Aest. Ord.* XI. T. 6. f. 2.
CAMER. *Epit.* p. 566.

Carlina caule unifloro *Enum.* *Helv.* p. 686. *Carlina*
altera DOD. *Purg.* p. 440. In siccis collibus versus *Allen-*
dorf & circa *Zenam*. In *Apennini* M. *Valle di Corsenna*
Toscanae. In horto caulem cubitalem profert.

Carlina caule ramoso floribus umbellatis *Enum.*
Helv. p. 685. *Carduus vulgaris* MATTH. p. 669. *Cnicus*
sylvestris, *spinosior* C. B. Ubique in apricis aridis.

B. Radiis albis.

H. *Rhaponticum* foliis pinnatis, pinnis serratis, squa-
mis calycinis rotundis *Comment.* *Gotting.* 1751. p. 206.
Centaurea *squamis ovatis*, *foliis pinnatis*, *foliolis decur-*
sentibus, *serratis* & *integris* GMELIN. *flor. Sibir.* II. p.

89. T. 41. f. 2. Elegans planta, argute serratis foliis, calyce praegrandi, flore luteo, solitario.

H. Rhaponticum flosculis sterilibus quindecimfidis, squamis calycinis rotundis. *Amberboi* *flore purpureo*, *odorato* VAILL. *Ciano Persiano*, *odorato*, *maggiore* ZANON.

T. 62.

β . Flore albo.

γ . Flore flavo. *Cyanus Orientalis*, *flore luteo*, *fistuloso* MARCHANT. p. 269. *Centaurium majus*, *Africanum*, *flore aureo*, *odorato* BREYNE Cent. I. p. 72.

Rhaponticum foliis squalidis, tomentosis, inferioribus ad basin semipinnatis, superioribus integris Enn. Helv. p. 688. *Jacea nigra* TAB. p. 152. *Jacea nigra*, *pratin-*
sis, *latifolia* C. B. Common Knapweed & Jagged Knapweed PETIVER. T. 22. In pratis & herbosis.

H. Rhaponticum foliis linguiformibus, decurrentibus, capitulis argenteis. *Centaurium majus*, *Orientale*, *Glasii-*
folio I. R. H. Coroll. COMMEL. varior. f. 39. *Calycis*
Iacerae appendices argenteae. Petala lutea, lateralia ste-
tilia, trifida, quadrifida.

H. Rhaponticum foliis pinnatis, ciliatis, calycibus acu-
tis. *Serratula annua*, *semine ciliari*, *elegantissimo* I. R. H.
Senecio carduus apulus COLUMN. Ecphras. p. 34. ic. *Ser-*
ratula annua, *foliis laciniatis*, *serratis*, *purpurascente flore*
GARIDELL. T. 52. In regno Neapolitano.

H. Rhaponticum foliis semipinnatis, capitulis cartila-
gineis, brevissime spinosis. *Jacea foliis Cichoraceis*, *vil-*
losis

losis, altissima, flore purpureo I. R. H. *Stoebe Salmanticensis prior* CLUS. *bisp.* I. p. 360. I. B. III. 1. p. 36. *Caput globosum, dense compactum, squamae pallentes, brevi & simplici spinula terminatae. Semen sursum ventricosius, basi hilo adroso, striatum, lato, breve papo coronatum. Flosculi florales tenues, quadrifidi, steriles, praelongi, purpurei omnes. Pappus in placenta pluimus.* *Monspelii.*

β. Flore albo.

H. Rhaponticum calycibus hirsutis, spinosis. Simile, sed squama calycina in longum aculeum exente, & toto calyce hirsuto, & flore majori, atque coronato. Nomen non inveni.

Calcitrapa foliis mollibus, laxe pinnatis, capitulis sessilibus, aculeis rigidissimis Enn. *Helv.* p. 689. *Carduus stellatus* DOD. *Purg.* p. 448. *Circa Wernigerode, Frankfurtum. In Anglia, Helvetia. Semina solida.*

H. Calcitrapa foliis semipinnatis, spinis calycinis prae-longis, ciliatis. Folia imia Iacobeae, semipinnata, mollier spinosa, superiora ovato lanceolata, dentata, mollia. In aliis ramorum flores sessiles, conici. Calycis segmenta viridia, glabra, armata spina fere unciali, acuta, pinnata, paribus spinarum mollium fere octo. Flosculi purpurei, in ambitu steriles. Semen quasi adrosum, papo non coronatum, sed pappus in placenta.

H. Calcit-

H. *Calcitrapa* foliis linguiformibus, capitulis tomentosis. *Calcitrapa lutea*, alato caule, capite lanuginoso VAILL. *Carduus Lusitanicus*, canescens, alato caule, capite lanuginoso I. R. H. Calyx turbinatus, squamis triangulis, viridibus, spina semunciali; patula, ad originem pinnata & dentata. Plurimum tomentum has spinas obvolvit. Flosculorum lateralium semen abortivum, pappo coronatum, flosculus quadrifidus, sterilis. Semen fertile ovatum, cicatrice notatum, coronatum pappo fusco, & flosculo praelongo, flavo, breviter quinquedentato, cuius una lacinia profundius incisa est, ut in *Carduus* solet. Placenta papposa.

H. *Calcitrapa* foliis ovatis, decurrentibus, spinis calycinis palmatis. *Carduus maritimus*, canescens, alato caule I. R. H. *Facea laciniata*, Sonchifolio H. L. B. p. 675. ic. Caput grande, turbinatum. Squamae calycinae triangulares, fine reflexo, sicco, transversim lato, in deceim & duodecim spinas palmato. Placenta papposa. Flosculi steriles, quinquefidi. Semina ex ovato truncata, pappo brevi setaceo, flosculo longo, purpureo, staminibus distinctis, hirsutulis.

H. *Calcitrapa lutea*, vulgaris, caule alato VAILL. *Spina Solstitialis* DOD. Purg. p. 449. Veronae. Flosculi quasi conglutinati, steriles, bifidi vel trifidi, glumae calycis spina sicca, ramosa, duorum triumve parium aculeorum paribus. Semen pappo brevi coronatum, & pappus in placenta.

H. Cal-

H. *Calcitrapa* caulis amplissime alatis, spinis calycinis palmatis. *Jacea Cyanoides*, caule alato HERM. Par. Batav. *Calycis squamae triangulares*, coronatae sicca palma in quinque aculeos fissa, ad latus pilis fuscis barbata, caeterum densus, conicus; ventricosus flos est. Flosculorum steriliū semen pappo-coronatum, flosculus sterilis ipse longus, quinquedentatus. Fertilis flosculus albo purpureus. Vagina staminum violacea. Pappus longus in placenta.

Cyanus flosculis radialibus latissimis, septifidis Enn. Helv. p. 691. *Cyanus minor* CAMER. Epit. p. 289. Plenūque tubam etiam in flosculis sterilibus habet.

β. Flore purpureo.

γ. Flore albo.

Cyanus foliis pinnatis, pinnulis obtusis, dentatis Enn. Helv. p. 690. *Jacea vulgaris*, laciniata I. R. H. *Scabiosa major* MATTH. p. 969. bene.

β. H. Foliis latioribus, glaberrimis, firmulis, Ex Sibiria.

γ. Flore albo.

δ. H. Flore flavo. Ex Sibiria COMM. Gotting. 1751. T. VII.

ε. Flore ochroleuco.

ζ. Flore helvolo. Ex Sibiria.

H. *Cyanus* foliis pinnatis, tomentosis, pinnis subrotundis, flore helvolo. Comment. Gotting. 1751. p. 223.

Folia

Folia pinnata, pinnis obtusis, tomentosis. Caput grande, calyce simili Jaceae vulgari. Flos ex flavo rubroque ambiguum. Flosculi steriles quinquefidi, lutei; fertiles flavi, limbo purpureo, imo segmento profundius exciso, vagina staminea violacea. Semen subfuscum, subovatum, compressum, pappo fusco.

H. *Cyanus* foliis pinnatis, ovatis, pinnis rotundis, caule prostrato *Comment. Gotting.* 1751. n. 5. *Centaurea* GMELIN. p. 76. T. 42. f. 2. Folia tomentosa, alba, alia elliptica, alia pinnata, pinnis subrotundis, extrema maxima, squamarum calycis appendix magna laciñiata & ciliata, flava. Flos purpureus, flosculis sterilibus longis, quinquefidiis. Caulis pedali bivior, terrae appresius.

H. *Cyanus* foliis glabris, integris & pinnatis, squamis calycis siccis, ovatis *Philosoph. Transact.* n. 472. *Comment. Gotting.* 1751. p. 205. Caulis bicubitalis, ramosus. Folia pinnata, pinnis ellipticis, acutis, parium 3. 4. 5, ultima inpare, ampliori, ovato lanceolata, nonnunquam dentata. Calycis squamae compositae; pars viridis obtusa, pars secca pallens, profunde incisa & fimbriata, cum aditamentis siccissimis, serratis. Flosculi steriles, quadrifidi. Fertilium semina pappo coronata, & in placenta pappus plurimus.

H. *Cyanus* foliis pinnatis, tomentosissimis. *Jacea arborea*, *argentea*, *Ragusina*. *Argentea* P. ALP. Ep. p. 116. *Jacea incana*, di *Ragusa* ZANON. T. 92. In *Syria* PO-COCK. r.

Cyanus

Cyanus pinnis foliorum pinnatis, pinnis acutis, gracilibus, dentatis *Enum. Helv.* p. 690. *Jacea foliis candicantibus, laciniatis, calyculis non splendentibus* I. R. H. Stoebe *Gallica CLUS. Pann.* p. 546. *Passim in Thuringia, circa Langensalze &c.*

H. *Cyanus foliis pinnatis, calycis plumulis reflexis* *Comment. Gotting.* 1751. p. 202. T. 6. *Folia inferiora pinnata, pinnis decurrentibus, dentatis, suprema simplicia. Calycis plumulae initio fusco, triangulari, fine reflexo, nigro, pinnato.* A GERBERO cum nomine *Jaceae laciniatae, calycibus minimis* (nam parvi sunt) *flore purpureo* accepi. GMELINUS habet GERBERI nomen, sed ejus planta non videtur a priori differre. r.

H. *Cyanus calycis plumulis reflexis, foliis linguiformibus, subhirsutis* *Comment. Gotting.* 1751. p. 201. *Centauraea calycibus ciliatis, ciliis setaceis, reflexis, foliis integerimis* GMELIN. T. XLV. p. 100. f. 1. 2. *Folia appendice aliqua caulem pene amplectuntur, longe lingulata, acuta, hirsuta. Flos exiguus, cylindricus, calycis plumulis reflexis, subfuscis, praelongis, subtiliter ciliatis. Flosculi steriles quinquefidi. Placenta papposa. Semen cinereum, ovatum, truncatum.* GERBERUS, qui misit, ad *Tanaim* reperit.

β. Flore albo.

Cyanus foliis ovato lanceolatis, subasperis, glumis calycis in reflexam plumulam desinentibus *Enum. Helv.* p. 692. *Jacea cum squamis pennatis, sive capite villoso*

I. R. H. *Facea montana, villosa capite, elatior* CLUS. Pann. p. 543. In M. Baldo, *Monspelii*. In ipsa urbe *Clausthal & super Ilfeld* abunde.

H. *Cyanus* foliis ellipticis, dentatis, rigidis, floribus caeruleis, oblongis. *Cnicus perennis*, *caeruleus*, *Tingitanus* HERM. Hort. Lugd. Bat. p. 163. H. Walther. Spinulae quatuor parium in utroque margine inferiorum segmentorum calycis. Flosculi steriles, quadrifidi, in ambitu flosculi pauci. Semen breve pappo simplici. *Campanula floralis* inferius profundius incisa. Vagina staminum livida. Placenta papposa.

H. *Cyanus* caule alato, foliis integris, subtus tomentosis Enn. Helv. p. 692. *Verbasculum* TRAG. p. 219. *Cyanei floris alia species in montanis* COLUMN. *Phytobas.* p. 78. T. 21. *Cyanus major* VALLET. T. 92. BROSSEI Tabb. pulchre. In Montibus Veronensis, Helveticis.

C O R Y M B I F E R A E.

S E M I N E N U D O.

Tanacetum foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, floribus umbellatis Enn. Helv. p. 694. *Tanacetum* TRAG. p. 158. *Tanacetum vulgare, luteum* L. R. H. Ad ripas Leiniae.

B. H. Foliis crispis.

H. *Tanacetum* foliis integris, rigidis, dentatis, scapo uniflbro. *Eallis spinosa* P. ALP. p. 327. In Creta. Calyx hemisphae-

CORYMBIFERAЕ. SEMINE NUDO. 371

hemisphaericus, multiplici ordine squamarum, appendice reflexa, sicca, fimbriata. Semina prismatica, acuminata, striata, nuda. Flosculi omnes androgyni. Campanula ventricosa, tuba bicorni; interiores vero plurimi abortiunt. r.

H. *Tanacetum* foliis ovatis, serratis, integris LINN.
Balsamita major DOD. *Coron.* p. 299. *Balsamita mas* BLAKWELL. T. 98. r.

H. *Tanacetum* flore singulari, nutante, foliis longioribus cincto Enum. *Helv.* p. 693. *Aster cernuus* COLUMN. p. 251. *Conyzoides* flore flavescente, cernuo TOURNEF. *Memoir de l' Acad. des Sciences* 1704. BARRELLIER ic. 1142. *Veronae, Michelfeldae in Italia.* Calycis folia prima similia foliis reliquae plantae, longa, reflexa, sequentia breviora, apice acuto, reflexo, ultima pene alba, apice vix reflexo. Placenta nuda. Semina longa, elliptica, acuminata, striata, absque pappo. Flosculus in ambitu gracilis, quinquefidus, circa tubam bicornem contractus, absque staminibus. Flosculi interiores multorum ordinum androgyni, campanula majori, radiata, albida, tuba lutea. Si ergo ob folia calycis reflexa a Tanaceto separasse velis, sola potest manere, ab Astere longe diversa.

Absinthium foliis incanis, pinnatis, pinnis bilobis, floribus pendulis, in spicis heteromallis Enum. *Helv.* p. 696. n. 4. GME L. flor. *Sibir.* II. T. 63. *Absinthium* CAMER. *Epit.* p. 452. In *Tartaria*, circa *Iconium*, nobis

rero passim in ruderosis. Placenta papposa. Flosculi duorum sexuum, feminae & androgyni.

H. Absinthium arborescens LOB. ic. p. 753. Artemisia foliis radicalibus a caulinis diversis GMEL. flor. Sibir. II. T. 51. f. 1. 2.

H. Absinthium (*Artemisia*) radice perenni, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, incisis, serratis, calycibus subrotundis, viridibus, nutantibus GMELIN. flor. Sibir. II. n. 107, T. 56, f. 2. 3. T. 57. 58. Flos grandior, quam in hoc genere solet, & folia ampla, fere Tanaceti. Placenta papposa. Flosculi in ambitu feminini, tuba bifida, reliqui androgyni. r.

Artemisia foliis planis, semipinnatis, pinnis rariter dentatis, floribus erectis, spicatis ENN. Helv. p. 696. *Artemisia rubra* TAB. p. 7. Ad ripas Leinae. Placenta nuda. Flosculi in ambitu feminini, exigui, reliqui androgyni.

H. Artemisia foliis duplicato pinnatis, pinnulis parallelis, tomentosis. *Absinthium Ponticum, tenuifolium, innum* C. E. In Tartaria minari, Sibiria a Jenisea ad Iacum. Romae in ruderosis. Placenta nuda. Flosculi feminini & androgyni.

H. Artemisia foliis multifidis, setaceis, caule erecto LINN. MORIS. S. VI. f. 2. *Abrotanum mas* CAMER. Epit. p. 459. *Abrotanum angustifolium, majus* C. B. Circa Veronam. In insulis de Capo Verde FRELIER. De pappo . nunc

nunc non memini, fnum in placenta adsit. Sed cum stirps non sit ad manus, hic relinquere malui. r.

Artemisia foliis planis, longe petiolatis, duplicato pinnatis, caule procumbente laxe spicato *Enum.* *Helv.* p. 697. *Abrotanum campéstre* TAB. p. 16. Ad vias in Thuringia, Helvetia. Placenta nuda. Flosculi in ambitu androgyni.

H. *Artemisia inodora*, foliis laxe pinnatis, pinnis longis, linearibus, floribus dense spicatis. *Artemisia Italica*, elatior, folio *Delphinii viridi*, caule attornbente WALTH. Flosculi feminini ad septem in centro, androgyni totidem. Placenta nuda.

H. *Absinthium* foliis linguiformibus, tomentosis, floribus longis, spicatis, cernuis. *Absinthium Lavendulae* folio, *maritimum* C. B. *Artemisia marina*. LOBEL. apud DONAT. p. 21. Ad ripas *Maris mediterranei*. Placenta nuda. Flosculi tres androgyni.

H. *Artemisia* foliis lanceolatis, linearibus, alternis, integrermis LINN. *Draco herba* DOD. Flores in ambitu feminini, in centro androgyni. Placenta nuda. In Sibiria.

H. *Abrotanum Lini* folio, inodorum AMMAN. Ruthen. p. 147. Non solum sapore differt, sed etiam hirsutum est.

Nihil videtur in mora esse, quo minus plantae nuda placenta a plantis papposa placenta separentur, ut enor- mis amplitudo generis *Absinthii* minuatur,

H. Cotula receptaculis subtus inflatis, turbinatis LINN. *Chamaemelum Aethiopicum, lanuginosum* BREYN. *Cent.* T. 73. Calyx caesius, fit squamis duorum ordinum, fine triangulari Radius fit flosculis androgynis, ligulae cavae exteriori segmento ovato acuminato, tribus interioribus minoribus, revolutis. Tuba bifida, & staminum alteri ordini minus segmentum semiflosculosum. Interni quadrifidi sunt. Semen planum, cordatum, limbo cinctum. Unus circulus est seminum nudorum tuba bicorni. Radiis altis. r.

$\beta.$ Radiis luteis. r.

H. Cotula foliis lanceolato linearibus, amplexicaulibus, inferne dentatis LINN. *Ananthocylus folio Coronopi* VAILL. DILL. *H. Elth.* T. 23. f. 26. Semiflosculi radii sunt semine abortivo, bractea vero succulenta, duabus lineis per medium divisa, & tuba. Semina cordata, plana, emarginata. Interiores flosculi androgyni, quadrifidi.

H. Santolina foliis quadrifariam dentatis, pedunculis unifloris LINN. *Abrotanum femina sive Chamaecyparissus* AICHST. Ord. XIV. T. 7. f. 3. *Polium Throphrasti & Dioscoridis* COLUMN. Ecphras. p. 54. ic. Monspelii.

H. Santolina foliis linearibus, pedunculis unifloris LINN. *Abrotanum foliis Rorismarini* MORIS. S. VI. T. 3. *Abrotanum femina, montana, Lusitanica, Rorismarini folio* MUNTING. f. 68. *Abrotano femina falso Indiano* ZANON. T. 148. H. San-

H. Santolina quae *Coma aurea Africana*, frutescens, foliis glaucis & in extremitate trifidis COMMELIN. hort. I. p. 97. T. 49. Nondum floruit.


H. Santolina quae *Ageratum laciniatis* foliis, inodorum, *Africanum* BOERH. H. L. B. p. 277. *Chrysanthemum corymbiferum* TRIUMPH. ic. 85. Flores umbellati, calycis squamiae obtusae, multiplici serie: similes pellucidae inter semina squamae. Flosculi omnes androgyni, quinquedentati, discum planum efficiunt, flavi, uti calyx flavus est. Semen oblongum, perexiguum, non coronatum. r.

H. Santolina foliis repetito divisis, planis. *Cotula flore lateo*, radiato I. R. H. Calyx & flos cylindricus, folia calycis viridia, alis albis. Semiflosculorum semen tenuiter alatum, bractea longa, bifida. Flosculi quinquedentati. Glumae tenues flosculos suscipiunt.

H. Santolina foliis duplicitate pinnatis, seminibus radialibus alatis. *Chrysanthemum Valentinum* CLUS. hisp. p. 369. In Hispania, Monspelii. Calyx hemisphaericus. Folia calycis alis albis cincta. Semina exteriora alata, triangularia, margine superiori tridentata, interiora semina non alata, triangularia. Flosculi quinquefidi; bicorni tuba, foliis pellucidis suscepti.

H. Santolina quae *Eichrysum Africanum*, frutescens, folio *Crithmi* COMMEL. Hort. Amst. II. T. 57. Nondum floruit.

Santolinarum flosculi omnes androgyni sunt.



CORYMBIFERAE

SEMINE PAPPO CORONATO.

Filago foliis lingulatis, tomentosis, mollissimis, floribus umbellatis, flavis, flosculis omnibus androgynis. *Stoechae citrina officinarum*. Circa *Rheinhausen* non valde frequens, & raro über der *Papiermühle*, copiosissime ad *Rhenum*. Flores omnes androgyni.]

B. Flore rutilo BREYNE. E. N. C. p. 45. Vol. Dec. I. ann. IV. obs. 135. est fere planta junior. In Germania, Palaestina.

H. *Filago* foliis lingulatis, subtus tomentosis, caule umbella lactea terminato Enum. *Helv.* p. 699. *Gnaphalium Americanum* MUNT. f. 619. In litoribus nonnullorum fluviorum *Walliae* Phil. *Trans.* 337. ad *Bocking.* &c. tum in *Helvetia*, insulisque ultimae *Sibiriae*. Flosculi omnes androgyni.

H. *Filago* (*Elichrysum*) *Africanum*, folio oblongo, angusto, flore rubello, postea aureo DLL. *Hort. Elth.* T. 107. ic. 127. Pars colorata squamæ calycinae semicirculatis. Flosculi omnes androgyni. r.

H. *Filago* (*Elichrysum*) *Africanum*, frutescens, angustis & longioribus foliis, incanis COMMELYN *Hort. Amstelod.* II. p. 109. T. 55. Habitu duriori & floribus majoribus cylindricis differt a *Stoechade citrina*. Flores umbellati, ochroleuco calyce. Flores in ambitu feminini, campanula bicorni, in centro androgyni. H. Fi-

CORYMBIF. SEMINE PAPPO CORON. 377

H. *Tilago* foliis tenuissimis, floribus umbellatis, cylindricis. *Elichrysum angustissimo* solid I. R. H. *Stoechas citrina*, *tenuifolio*, altera I. B. III. p. 155. In *Gallia Narbonensi*, etiam in *Helvetia*.

H. *Gnaphalium* (*Elichrysum*) obtusifolium, capitulis argenteis, conglobatis DILL. *Hort. Elth.* T. 108. Calyx pene cylindricus, albus. Plerique flosculi feminini, striatissimi, interiores androgyni. In *Virginia*. r.

H. *Filago* faetida foliis amplexicaulibus, ovatis, acutis, subtus tomentosis LINN. *Gnaphalium Africanum*, foetidum, *latifolium*, *maximum*, flore argenteo VOLC. *flor. Nor.* p. 194. Flores in ambitu feminini.

β. Flore aureo.

Filago ramis spicatis frequentissimis, aliis foliorum incidentibus Enn. Helv. p. 700. *Elichrysum spicatum* I. R. H. *Gnaphalium rectum* I. B. III. p. 160. Abunde in sylvis. Plurimi flosculi feminini, squamis imbricatis, rectis.

Filago caule ramosissimo, diffuso, umbellis sessilibus, fuscis Enn. Helv. p. 701. *Elichrysum aquaticum*, minus, capitulis foliatis I. R. H. Ad fossas, in agris & hortis.

Filago caule dichotomo, sphaeris floralibus in angulo foliorum sessilibus Enn. Helv. p. 702. *Childing Cudweed* & *lowchilding Cudweed* PETIVER, T. 18. *Gnaphalium vulgare*, *majus* C. B. *Gnaphalium* FUCHS, p. 222. Locis siccis.

Filago caule erecto, ramosissimo, glomerulis ad alas foliorum longe sessilibus Enum. *Helv.* p. 702. *Filago vulgaris, floribus per caulem sparsis* I. R. H. Locis aridis, zu Rheinhauen, um den Bovender Galgen.

Filago caule erecto, ramoso, foliis perangustis, glomerulis in summo caule sessilibus Enum. *Helv.* p. 703. n. 12. *Filago minor* I. R. H. Least Cudweed PETIVER. l. c. auf dem Flagen:

H. *Filago* foliis alternis, linearibus, pediculis longissimis, unifloris. *Helichryso sylvestris similis* C. B. *Prodr.* p. 123. Calycé differt, cujus ima segmenta crispa & reflexa sunt. Flores in ambitu feminini, emarginati, intetores androgyni. Passim POCOCK in *Palaestina, Israël &c.*

H. *Filago* foliis ovatis, undulatis, scapis unifloris. *Elichrysum sylvestre, latifolium, flore magno, singulari* VAILL. Flores etiam in ambitu feminini.

Filago sexubus tota plantā distinctis Enum. *Helv.* p. 698.

α. *Androgyna* flore breviori Choidori. *Elichrysum montanum, folio & flore rotundiore, purpureo* I. R. H. *Gnaphalium montanum, suaverubens* LOBEL. p. 483.

β. *Feinina* flore longiori, papposo. *Elichrysum montanum, longiore folio & flore, purpureo* I. R. H. *Gnaphalium montanum, purpureum* LOBEL. p. 483.

Filaginis nomen optimum est. Divulsa enim quacunque parte plantae fila gossypiae ex vulnere trahuntur.

H. *Erigeron fruticosus*, foliis lanceolatis, serratis, floribus umbellatis. *Senecio Africanus*, arborescens, folio serrato BÖERH. *Conyza frutescens*, foliis angustioribus, nervosis FEUILLEE. T. 37. *Eupatorium Africanum*, *Agerato affinis Peruviana* f. *Quinquinae* false dictae foliis floribus albis PLUKN. p. 400. T. 328. f. 2. Flos cylindricus, squamis calycis plurium ordinum. In ambitu numerosissimi flosculi bifidi, in centro decem androgyni.

H. *Erigeron fruticosus*, foliis glaucis, ovatis, serratis, floribus in alis congestis. *Senecio Virginianus*, *arboreus*, *Atriplicis* folio HERM. Par. Rat. p. 225. *Elichryso affinis*, *Virginiana*, *frutescens*, foliis *Chenopodii*, *glaucis* PLUKN. T. 27. f. 2. Calyx multis ordinibus fit squamarum imbricatarum, lanceolatarum, pene cylindricis. Semina pappo coronata. Flosculi androgyni, pallidi, quinquefidi & quadrifidi. Staminum vagina eminens. Hae plantae LINNAEO Baccharides sunt.

Erigeron floribus ex alis foliorum prodeuntibus, flosculis femininis, multis imperfectis Enum. *Helv.* p. 724. *Aster arvensis caeruleus*, *acris* C. B. *Conyza caerulea* TAB. p. 861. Am Bovender Galgen auch hinter Bovenden.

Erigeron floribus ex alis foliorum in spicam congestis, feminis omnibus ligulatis *Enum. Helv.* p. 725. *Conyza annua*, *Canadenis*, *Linariae folio BOCCONE* *Plant. rar.* T. 46. In sylva sub *Keschberüderfeld*.

H. *Erigeron* foliis inferioribus dentato laciniatis, superioribus integris LINN. *Senecio Bonariensis*, *purpurascens*, *foliis imis Coronopi*. DILL. *Hort. Elth.* T. 257. f. 334. *Calyx cylindricus*, convergens, squamæ duorum ordinum, quasi conglutinatae. *Flosculi feminini* in ambitu gracieles, fine bifido, pallidi. *Flosculi androgyni* in disco fere decem, bilabiati. r.

H. *Erigeron* foliis lingulatis, floribus solitariis per ramos sessilibus. *Virga aurea*, *minor*, *foliis glutinosis & graveo-lentibus* I. R. H. *Conyza minor*, *vera* LOBEL. ic. p. 346. *Calyx cylindricus*: Series squamarum multiplex, foliolis angustis, appressis, non patentibus. *Semiflosculi feminini* bractea dimidio tuba breviori, tridentata, *Flosculi quinquefidi de more, & semen papposum*. r.

H. *Chrysocome* foliis linearibus, petiolo sub flore intumescente *Enum. Helv.* p. 703. *Linariae tertium genus TRAG.* p. 358. In *Helvetiae* asperis, calidioribus. Super Neuenstatt *Helvetiae*. Aufm Heitersberg ROYER.

Eupatorium foliis plerumque ternatis. *Enum. Helv.* p. 704. *Eupatorium communic* SABBATI T. I. ic. *Eupatorium Avicennae* BLAKWELL. T. 110. Ad rivos.

β. Va-

β. Varietas foliis integris, non digitatis. Circa
Gernsheim.

H. Eupatorium Scrophulariae folio, floribus albis. *Valeriane a fleurs blanches CHALEEVOIX.* *Valeriana Urticae folio, flore albo CORNUT.* p. 20. 21. Calyx, ut in vulgari, cylindricus, & flosculi androgyni, sed isti triginta & quadraginta.

H. Cacalia glabra ROBERT. ic. p. 52. *Enum. Helv.* p. 705. MANGET. D. *Pharm.* I. p. 437. ic. In M. Baldas in *Helvetiae montosis & dumetis.*

H. Kleinia foliis carnosis, planis, ovato oblongis LINN. *Anteupharbium* DOD. *Purg.* p. 171. LOBEL. II. p. 26.

H. Kleinia foliis carnosis, lanceolatis, compressis, caule terete LINN. *Cacalianthemum* KLEIN. *Diff. Senecio Africanus, arborescens, folio & facie Ficoidis* COMMELYN. *Praelud.* f. 40. *Cacaliastrum* SCHREIBER A&E. *Erudit.* 1730. p. 172.

H. Cacalianthemum Nerii folio, glauco DILL. *Hort. Elth.* p. 61, T. 54.

Conyza foliis ovato lanceolatis, floribus laxe umbellatis *Enum. Helv.* p. 704. *Conyza major* MATTH. p. 870. Am Plessberge abunde. Calyx Asteris, squamis reflexis, sed flosculi feminini, qui in ambitu sunt, strictissimi. Tuba bicorni.

H. Co-

382 CORYMB. SEMINE PAPPO COR.

H. Conyza aurea, Africana, frutescens, foliis Linariae angustis COMMEL. hort. II. p. 89. T. 45. Nondum flo-tuit.

Petasites floribus spicatis, flosculis omnibus androgynis Enum. Helv. p. 706. Petasites BLAKWELL. T. 222. Ad Leinam vorm Geismar Thor [qua itur zwischen die Contre-scarpe. In Japonia.

Petasites floribus spicatis, flosculis paucissimis androgynis Enum. Helv. p. 707. Petasites major, floribus longis, pediculis insidentibus DILL. Hort. Elth. p. 309. Bey Wehnde, auch an der Contrescarpe, aufm Mäsche.

Petasites scapo unifloro, flosculis in ambitu lingulatis Enum. Helv. p. 708. Tussilago seu Farfara BLAKWELL. T. 204. Am Bächlein nach Bovenden, & alibi in udis,

CORYM-

CORYMBIFERAЕ SEMINE ARISTIS
CORONATO.

H. *Ageratum* LINN. *Eupatorium Betonicae folio*
HERM. *Parad.* p. 161. *Pappus setaceus, foliolis sericeis coronatus, calyx cylindricus, foliolis duorum ordinum. Flosculi albi, androgyni, graciliter incisi.*

H. *Eupatorium Americanum, herbaceum, Melissae folio, villosum RANDII flore caeruleo. In Virginia CLAYTON. Calycis foliola duorum ordinum, congesta in cylindrum ventricosam. Seminis nigra corona, plana, aristata. Floculi androgyni, caerulei.*

H. *Xeranthemum receptaculis paleaceis, seminum papo quinquefido* LINN. *Ptarmica Austriaca CLUS,* p. 11.
In Hispania, Austria.

Bidens foliis longe ellipticis, indivisis. *Enum. Helv.* p. 710. *Bidens, folio non dissecto* I. R. H. *Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum TABERN.* p. 117. *Bur Mangold PETIVER.* T. 30.

β. H. In varietate radiata, flosculorum radiatorum semen abortivum absque tuba, bractea ovali. Semen quatuor aristis donatum, qua nota a Coreopside differt.

H. *Bidens* foliis ovatis, & tripteris, caulis hirtis, brachiatis. In horto floruit, nunc extinctus, satis aliquis diversus. Flos grandis, non radiatus. *Squamae caly-*

calycis lanceolatae, inter flores vero graciles. Dentes duo sagittati; & medius intersidet flosculus quadrifidus, ventricosus, ora contracta. Folia sub flore congesta. Caulis hirtus, folia ovata aut triptera serrata.

Bidens foliis tripartito divisis *Enum. Helv.* p. 709.
CAESALP. p. 488. *Hepatorium aquatile* DOD. p. 395.

B. Flore radiato LOESEL. ic. 10

H. Bidens latifolia, hirsutior, semine angustiori, radiato DILL. *Hort. Elth.* T. 43. f. 51. In America.

H. Bidens Americanus, Apii folio DILL. *Hort. Elth.* T. 43. f. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Calycis nulla folia accessoria. Squamiae calycinæ primæ quinque liberiores, lanceolatae, reliquæ appressæ, bracteæ similes. Semina radiata abortiunt, bractea eoruin ovalis, tridentata, campanula plerumque quadrifida. Folia minutius divisa, non pin-nata. r.

H. Verbesina foliis decurrentibus, undulatis, obtusis LINN. *Chrysanthemum Americanum*, alato caule H. A. I. f. 3. *Caunabina Indica*, foliis integris, alato caule MAGNOL. *H. Reg.* ic. Semiflosculi duarum serierum, semine plano, cordiformi, bicorni, cornubus non sagittatis, quorum alterum minus, aut nullum est, ipse flosculus aurantius, brevis, latus, profunde bifidus, repandus. Tuba bicornis. Flosculi simili semine, campanula florali quinquefida, sexfida.

RADIATAE

RADIATAE
PLACENTA FOLIOSA.
SEMIN E N O N P A P P O S O.

H. Siegesbeckia LINN. Hort. Cliff. Cichoreo adfinis.
Lampsana sinica, *Menthastrum folio*, *calyce fimbriato*
 PLUKNET Amalthe p. 58. T. 3. f. 2. *Bidenti similis, foliis*
latissimis, serratis BUXBAUM. III. T. 52. *Calycis folia*
quinque ovato lingulata, *pilis globuliferis plen-*
Squamae hirsutae, ovatae, quarum singula suum semen su-
stentat. Semiflosculi duo vel tres, quibus semen curvum,
cuneiforme, quadrangulum insidet: bractea brevis, trifida,
flava, aversa aurantio picta. Flosculi androgyni, quin-
quedentati, simili semine & squama. r.

H. Coreopsis foliis lanceolatis, serratis, alternis, decur-
 rentibus petiolis, caule erecto H. Upsal. Crisantemo con-
 caule alato di Canada ZANONI T. 58. Ex semine Virgi-
 nico nata floruit. Calyx brevis, foliolis decem, duorum
 ordinum, multo quam radii brevioribus. Similia folia
 virescentia, subhirsuta flosculos suscipiunt. Radii quatuor
 vel quinque ovales, lati, lutei, apice breviter inciso, cum
 semine abortivo unicorni, bicorni, vel arista petalodea.
 Flosculorum tubus brevissimus, campanula quinquefida,
 grandis, tuba bicornis. Semen ovale, duobus cornu-
 bus latiusculis, foliaceis coronatum, utcumque cimicis
 simile.

B b

H. Core-

386 RADIATAE, PLACENTA FOLIOSA

H. *Coreopsis* foliis ternatis LINN. *Chrysanthemum Virginianum*, *folio acutiore, levi, trifoliato, sive Anagyridis folio* MORIS III. S. 6. T. 3. f. 4. Calycis folia exteriora quinque, sex, obtusa, firmula; interiora octo fusca apice repando. Radii octo, seminibus abortivis, latis, planis, absque tuba. Disci semina squamis distincta, priorum similia secunda. Flosculi androgyni, purpurei, quinquedentati.

H. *Rudbeckia* foliis pinnatis, extrema pinna amplissima. *Obeliscotheca Hydrophylli folio, foliorum lobis latioribus* VAILL. *Aconithum helianthenum Canadense* CORN. p. 178, 179.

B. *lobis angustioribus* VAILL. n. 2. *Aconit ou fleur du Soleil* CHARLEVOIX. n. 22.

H. *Rudbeckia* foliis asperis, ovatis, dentatis, LINN. *Helianthus &c.* GRONOV. flor. p. 103. *Chrysanthemum Virginianum, hirsutum, disco magno, petalis aureis, radiato* PLUKNET Almagest. T. 22. f. 2. *Obeliscotheca integrifolia, radio aureo, umbone atrorubente* DILL. Hort. Elth. T. 218. Disco subiecta folia calycina hispida duorum ordinum. Semiflosculi steriles, bifidi & trifidi, flavi. Semina nude, oblonga, parallelepipedata, sursum lata, nuda. Squamae aristatae, & flosculi atropurpurei.

H. *Helianthus* radice annua, amplissimo, nutante flore LINN. *Corona Solis* TOURNEF. Xp̄vōn̄is RENEAUME

p. 83. *Helianthus Pernvianus* CAMER. Epit. p. 503. In BROSSEI tabb. picta exstat. Floribus aureis, ovariis albis,

$\beta.$ Floribus aureis, ovariis nigris,

$\gamma.$ - - - - - variis,

$\delta.$ - - - - - fuscis, limbo albo circumdati,

$\epsilon.$ Flore pleno,

$\zeta.$ Flore pallido.

H. *Helianthus radice tuberosa* LINN. *Corona solis*, *flore parvo*, *radice tuberosa* I. R. H. In BROSSEI tabb. 39.

H. *Helianthus radice fusiformi* LINN. *Chrysanthemum Virginianum*, *elatius*, *angustifolium*, *folio hirsuto*, *viridi* PLUKNET. T. 159. f. 5. *Helianto maggiore di Virginia* ZANONI nov. T. 58.

H. *Buphthalmum foliis integerrimis*, *cartilagineis*. *Asteriscus frutescens*, *Leucoji foliis*, *sericeis* & *in-canis* DILL. *Hort. Elth.* T. 38. In *Virginia*.

H. *Buphthalmum foliis linearie lanceolatis*, *ferratis*, *villosois*, *calycibus nudis* Enn. *Helv.* p. 711. *Conyza major*, *altera* THAL. *Hercyn.* p. 21. ic. II. *Asteriscus calyce brevi*, *angustifolius* BOERH. p. 105. Nondum floruit, & sponte nascitur in montosis *Helvetiae*.

H. *Buphthalmum floribus nutantibus*, *calycibus foliosis*. *Aster annuus*, *Lusitanicus*, *odoratus* I. R. H. *Astero annuo*,

388 RADIATAE, PLACENTA FOLIOSA

odorato, di Candia ZANONI. T. 24. *Chrysanthemum conyzoides, Lusitanicum BREYNE* Centur. Ic. 77. *Monspelii.* Seminis corona foliacea, integra, dentata, & involucrum quadrangulare. Calycis folia exteriora lingulata, amplissima, repanda, omnia sensim minora, obtusa & lata. Semiflosculi quatuor vel quinque, bractea tridentata & quadridentata. Paleae magnae, ovatae, pellucidae. Flosculi parvi, cylindrici, vix expansi. Tuba in tubo florali latens.

H. *Buphthalmum* foliis lanceolatis, amplexicaulibus, calycis foliis peramplis, pungentibus. *Aster* I. CLUS. p. XIII. *Monspelii, in Hispania, Palaestina* POOCK.

H. *Buphthalmum* calycibus foliosis, foliis lanceolatis, serratis, trinerviis, basi hinc angustioribus Hort. Upsal. *Chrysanthemum Scrophulariae* folio, Americanum PLUKNET. Almagest. p 99. T. 22. f. 1. Calyx durus, firmus, pene cartilagineus, foliis ovato acuminatis, margine reflexis; minus tamen reflecentur intimae. Semiflosculi decem, saturate flavi, trinervii, ovati, tridentati, fine contracto. Semen cuneiforme, nudum. Flosculi quinquesidi, gluma cava excepti, in fine suo crassiori, semine simili. Folii nervus in uno latere prius quam in altero foliacea substantia augetur.

Buphthalmum foliis incanis, pinnatis, pinnis argute serratis Enn. Helv. p. 711. *Chamaemelum chrysanthemum* VAILL. *Buphthalmum* MATTH. p. 969. Ad vias montosas & sylvas.

H. *Eup-*

H. *Euphthalmum* foliis multifidis, scapis unifloris.
Pyrethrum BLAKWELL. T. 350. DOD. *Pempt.* p. 327.
Pyrethrum alternum MATTH. p. 786. *Pyrethrum officinarum* AICHST. *Aest. Ord.* V. T. 10. f. 2. In *Bohemiae Sylvis*, M. *Apennino*. r.

H. *Achillea* foliis ellipticis, obtusis, serratis, fasciculatis, floribus umbellatis. *Achillea lutea*, *Agerati folio*. *longiori* VAILL. *Ptarmica lutea*, *suaveolens* I. R. H. *Balsamita minor* DOD. *Coren.* p. 300. *Monspelii*. Plerumque semi-flosculi quinque, rotunde & irregulariter trifidi, sed videlicet nullos fuisse, verum unice difformes flosculos. Quando ed sunt aut trifidi brevissimi, aut bilabiati sunt, una parte exteriori trifida, interiori bifida. r.

Achillea foliis integris, minutissime serratis VAILL. *Enum. Helv.* p. 712. *Ptarmica* BLAKWELL. T. 276. *Ptarntica vulgaris*, *folio longo, serrato, flore albo* I. B. III. p. 147. *Squamae* inter flores barbatae. In pratis uidis non raro gegen die *Maschmühle*,

β. Flore pleno.

Achillea foliis punctatis, pinnatis, pinnis plurimis, longe aequalibus, pinnulis trifidis & quinquefidis *Enum. Helv.* p. 715. *Miliefolium terrestre, minus*, *Dioscoridis* TABERN. p. 130.

β. *Miliefolium album, minus*. Ubique ad vias.

390 RADIATAE, PLACENTA FOLIOSA

γ. *Millefolium purpureum, majus* C. B. Prodr. p. 72. Cum punctatis foliis sit, non separo, et si altius & speciosius est.

Achillea pinnis folierum primis remotis, ultimis confertis, pinnulis semipinnatis Enn. *Helv.* p. 715. n. 9. *Nobile Millefolium* TRAG. p. 476. *Veronae.* Circa *Kelbira & Stolberg* in muris. Calyx fere ovalis, squamis gracilibus. Petala quinque, aut paulo plura. Semina elliptica, limbo albo cincta. Flos albus, sed ob luteas tubas bicolor. Foliis non punctatis est, & a vulgari differt.

H. Achillea foliis pinnatis, pinnis latiusculis, semi-pinnatis, floribus umbellatis. *Millefolium Orientale, foliis Tanaci, incanis, radis pallide luteis* BOERHAAVE. Folia longa, lanuginosa, multis aequalibus primorum paribus; singulae pinnae virides semipinnatae, pinnae trifidae, vel bifidae, denique pinnulae lanceolatae. Flores umbellati, exigui. Calyx tomentosus. Flos luteus, pallens, radiis quinque, obtuse tridentatis.

H. Achillea pinnulis foliorum aequalibus, confertis, tomentosis, pinnulis imorum trifidis, summorum simplicibus Enn. *Helv.* p. 716. *Millefolium tomentosum, luteum* G. B. STRIOTES *lutea* CLUS. *Hisp.* p. 371. *Heliochryso vero di Dioscoride ZANONI nov.* T. 118. f. 7. *Veronae. Monspelii, in Valesia.* Pinnulae tres, plerumque trifidae.

H. Cha-

H. Chamacinelum Chium, vernum, folio crassiori, illo-
re magno TOURNEF. Seminis alae exiguae, semifolios-
culi tridentati, flos major, folia lata & robusta.


H. Chamaemelum foliis planis, pulposis, pinnatis, pinnis
dentatis. *Chamaemelum maritimum* LUGD. p. 1394. Ca-
lyx hemisphaericus, albo viridis, quatuor ordinibus fo-
liorum constat. Petala plana, latiora, quam in vulgari,
ovata, apice tridentato, reliqua similia.

Chamaemelum foliis pene glabris, pinnis pinnatis,
pinnulis latiusculis *Enum. Helv.* p. 717. *Chamaeme-
lum faetidum* I. R. H. *Cotula faetida* BLAKWELL.
T. 67.

H. Chamaemelum foliis lanuginosis, pinnatis, pinnis
capillariter multifidis, brevioribus *Enum. Helv.* p. 717.
Chamaemelum odoratum DODON. *Coron.* p. 243. In
Anglia, Hibernia Arvernia &c.

β. Flore pleno & semipleno, parte magna flos-
culorum in radios mutata, vel decemfidis, flosculis etiam
cum tubis binis.

H. Chamaemelum Orientale, Absinthii folio I. R. H.
Coroll. Folia calycina imbricata, multorum ordinum,
plurima, ora fusca, bractea alba, tridentata. Flosculi pal-
lentes. *Squamae aristatae.* In *Palaestina* POCOCK.



PLACENTA NUDA
SEMIN E NON FAPP O SO.

H. **M**atricaria quae Bellidoides radice repente, foliis latioribus, ferratis VAILL. *Bellis Americana*, procerior, serotina, ramosa, flore amplissimo PLUKN. T. VI. f. 2. Inferiora folia ferrata, superiora integra.

Matricaria foliis imis petiolatis, ad caulem auritis, ferratis Enn. Helv. p. 719. *Bellis major* MATTH. p. 910. Ubique in pratis.

Matricaria foliis glaucis, amplexicaulibus, profunde dentatis. *Chrysanthemum folio minus secto, glauco* I. E. III. I. p. 103. Versus Seeburg: circa Ilfeld: in ducatu Celleensi ubique, ut inter calamitates publicas locum invenerit. Alae seminis duas laterales, albae, & fossa circa semen in placenta circularis.

H. Matricaria foliis rariter pinnatis, pinnis latis, semipinnatis. *Matricaria Orientalis*, folio Tanaceti, flore suavemente I. R. H. Calyx sit ex duabus & tribus foliorum seriebus, margine fusco, squalente. Extrema folia a reliquis distantia. Flos biunciali diametro, semi-flosculi pallide rubicundi, fine contracto, tridentato. Placenta punctata.

H. Matricaria Jacobae folio, valde laciniato, flore croceo I. B. III. I. p. 104. Iconem habet ZANON. nov. T. 51. In *Palaestina* POCOCK.

β. Flore partim candido, partim luteo.

γ. Semiflosculis fistulosis.

Matricaria foliis pinnatis, pinnis latis, incisis, semiflosculis brevissimis *Enum. Helv.* p. 719 *Matricaria vulgaris* C. B. *Matricaria prima* BRUNFELS, I. p. 245. In *Japonia*, & *Germaniae* ruderolis, sed in istis forte casu nascitur, non vere spontanea.

H. *Matricaria* foliis pinnatis, pinnis laxe & capillari-
ter multifidis *Enum. Helv.* p. 718. *Chamaemelum vulga-*
re, *Leucanthemon* *Dioscoridis* I. R. H. *Anthemis*, sive
Chamomilla MATTH. p. 905. In *Helvetia calidiori*.

H. *Pyrethrum* foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, dentatis
Enum. Helv. p. 720. *Matricaria* folio *Tanaceti*, flore ma-
jore, semine umbilicato MICHEL. p. 34. *Tanacetum ino-*
dorum I. CLUS. *Penn.* p. 550. In sylvis montanis
ubique.

H. *Pyrethrum* foliis incanis, triplicato pinnatis, to-
mentosis. *Ptarmica Orientalis*, foliis *Tanaceti*, incanis,
semiflosculis brevioribus. I. R. H. *Calycis* folia multo-
rum ordinum, ora sicca & squalente. Semina cava,
membranula coronata. Semiflosculi breves, bidentati &
tridentati, flosculi numerosissimi & discus grandis, aurei
coloris omnia.

H. *Pyrethrum* foliis pulposis, rariter pinnatis, pinnulis
bidentatis & tridentatis. *Matricaria Canariensis*, sapore fer-
vido, *radiis foliorum albis* VAILL. Semen coronam folia-
ceam educit.

Calendula foliis ovatis, integerrimis. *Caltha floribus minimis, pallentibus* Enn. *Helv.* p. 722. *Calendula arvensis* TAB. p. 335. In vineis & agris *Helvetiae*, & ad lacum salsum *Thuringiae*.

H. *Calendula* flore majori, aurantio KΛΥΨΩΝ. COLUMN. *Phytob.* p. 53. *Calendula* DOD. Coron. p. 60. *Calendula vulgaris* PASSAEI. P. alt. p. 87.

β. Flore pleno.

H. *Calendula* foliis hirsutis, acute crenatis. *Caltha Africana*, flore intus glbo, foris violaceo, semine majore, oblongo BREYN. I. c. f. 2. *Bellis Africana*, florum pediculis pene aphyllis, foliis incisis H. AMST. II. f. 33.

H. *Calendula* foliis ovatis obtuse crenatis. *Calendula humilis*, *Africana*, foliis incisis, parvo flore H. L. B. *Calendula Africana*, flore intus albo, foris violaceo BREYNE Prodr. II. p. 26. T. 14. f. 1. In BROSSEI tabb. pulcherrime pingitur.

H. *Osteospermum* foliis rigidis, ovatis, dentatis. *Chrysanthemum*, *Osteospermon*, *arborescens*, *Aethiopicum*, *Populi albae* foliis BREYNE Cent. I. p. 70. DILL. Hort. Elb. T. 68. Semiflosculorum semina crassa, ovata, dura. Flosculi abortivi. Tuba simplex, capitata, . flosculo quinquefido.

H. *Osteospermum* foliis conjugatis, angulosis, petiolis foliosis. *Chrysanthemum angulosum*, *Platani foliis*, *Virginia-num* PLUKNET. Almagest. p. 99. T. 83. f. 3. non bene.

Folia

Folia calycina prima per ampla, ovata, reliqua paleacea,
cave, hirsutula, flosculum comprehendentia. Radii ferti-
les sunt. Iis semen crassum, durum, ovatum, unionis
simile, flava bractea florali coronatum, & tuba bicorni-
Flosculorum semen parvum, abortivum, coronatum tu-
bo per angusto, & campanula cylindrica, quinquefida.

H. Eriocephalos sempervirens, foliis fasciculatis & di-
gitatis DILLEN. Hort. Elt. T. 110.

Bellis scapo nudo, unifloro ENUM. HELV. p. 722. Bel-
lis minor, sylvestris C. B. BLAKWELL. T. 200. In
omnibus pratis.

B. Flore rubro, pleno PASS. ic. 98.

PLACENTA NUDA

SEMINE PAPPO. CORONATO

H. Bellidastrum ENUM. HELV. p. 723. MICHELI p. 32. T.
29. In M. Baldo & omnibus montibus Helvetiae:

H. Bellis ramosa, umbellifera CORNUTI p. 194. Aster
&c. GMELIN II. T. 78: f. 2. In semine nullus ple-
rumque pappus, & unice lanugo quaedam in flosculo.
Mucro foliorum calycis vix repandus. Petala plana, o-
vata, alba.

H. Aster

H. Aster caulis asperis, hirsutis, foliis lanceolatis, floribus in summo congestis. *Aster novae Angliae*, altissimus, *hirsutus*, floribus amplissimis, purpuro violaceis PAR. Bat. T. 98. *Aster floribus omnium maximis* VOLC. p. 50. ic. *Calycis squamae extroversae*, multorum ordinum. Petala plana, perinde multorum ordinum, acuminata, gracilia, apice inciso. Semina hirsuta, alba. Flosculi flavi.

H. Aster foliis amplexicaulibus, integris, lingulatis, glabris. *Aster novae Belgiae*, *latifolius*, *paniculatus*, floribus dilute violaceis H. L B. p. 69. AMMAN. p. 3. *Asteroides Virginiana* ZANONI nov. T. 22. *Calycis squamae* multorum ordinum, mucronibus reflexis. Semiflosculi tridentati, numerosi.

Aster foliis scabris, supremis ovatis, squamis calycinis obtusis Ennem. Helv. p. 726. *Aster atticus* DODON. Pempt. 266. MARTYN. Georg. p. 449. In pascuis M. Baldi, in M. Pless ad dextram.

H. Aster foliis scabris, ovato lanceolatis, superioribus acutis. *Aster latifolius*, *Tripolii flore* I. R. H. GARDEL ic. II. MARCHANI. p. 253. Satis adfinis Attico, squamis calycinis in fine lanceolatis, recurvis, in margine ciliatis, sed foliis superioribus acutis. Petali caerulei apex lanceolatus, obscure incisus. Flosculi junioris plantae lutei, adultae purpurascunt. Semen hirsutum.

Aster

Aster foliis pulposis, integris, imis ovatis, superioribus lingulatis. *Aster* GMELIN. T. 30. f. 2. *Tripolium majus*, *vulgare* DONAT. p. 96. Circa Harste ad fontes falsos, & Sülbeck simili loco. Calycis squamae trium ordinum, appressae, nonnunquam recurvae. Petala plana a septem a quindecim, subcaerulea, fine acuto, bidentato.

H. *Aster Chenopodii* folio, annuus, flore ingenti, specioso DILL. *Hort. Elb.* T. 34. f. 38.

β. Flore albo.

H. *Aster maritimus*, folio tereti, crasso, tridentato I. R. H. *Golden Sampire* PETIVER. T. 17. Calycis squamae numerosissimae, graciles, fuscae, appressae, fine paulum recurvo. Petala argute quadridentata, flava, Ad ripas *Maris Mediterranei*, *Britannici*, *Liburni*.

Aster foliis radicalibus lingulatis, hirsutis, sub ramis amplexicaulibus, dentatis. *Aster luteus*, folio *Succise* RUPP. *Aster primus* CLUS. *Pann.* p. 526, 567. *Jenae* ad *Salices* versus *Wenigen Jena* & ad *Werram Fl.* Passim *Berolini* Cl. ZINN. Folia ima petiolata, superiore amplexicaulia, non tamen semper conspicue, ut in aliis exemplaribus mere lingulata adpareant. Illa simplicia, haec dentata & pene laciniata. Squamae calycis praelongae, valde repandae & patulae, vagae, subulatae. Petala plana, gracilia, tridentata, multorum ordinum confusa. Semen pappo coronatum.

Aster foliis amplexicaulibus, crispis, subtus incanis, flore luteo, radiato *Enum. Helv.* p. 726. *Conyza media* AICHST. *Aest. Ord. V. T. 12. f. 1.* *Aster pratensis*, autumnalis, *Conyzae folio I. R. H.* *Bey Bovenden.* *Vorm Grohnder Thor an der Contrescarpe.* *Um Saltz der Helden.* Ab *Astere Succisae* folio facile differt flore concinno, radiis brevibus, aequalibus, in eodem ordine dispositis, squamis calycis tomentosis, repandis, fine recurvo, fusco.

Aster caule ramosissimo, foliis crispis, floribus luteis pene nudis *Enum. Helv.* p. 727. *Conyza & Pulicaria* BLAKWELL. T. 103. In agris inter stipulas & in fossis *vorm Grohnder Thor.*

Aster foliis ovato lanceolatis, serratis, hirsutis, asperis *Enum. Helv.* p. 727. n. 5. *Aster luteus*, *birjuto*, *Salicis folio C. B.* In agro *Veronensi*: Circa *Jenam* passim in M. *Kunitzberg &c.*

Aster foliis amplexicaulibus, ex ovato acuminatis, ora serrata, flore amplissimo, *Enum. Helv.* p. 727. *Aster omnium maximus*, *Helenium dictus* L. R. H. In agro *Veronensi*, *Helvetia ad lacum Neocomensem*, *Anglia*, *Sneecia occidentali*.

Aster foliis ovatis, ciliatis, utrinque glabris *Enum. Helv.* p. 728. *Aster montanus*, *Salicis folio*, glabro I. R. H. *Aster &c.* GMELIN. flor. II. f. 77. *Anfm Altenstolberg*, circa *Jenam*. *Veronae*.

Solidago caule erecto, racemis alternis, erectis LINN.
Enum. Helv. p. 729. Virga aurea, vulgaris, latifolia L.R.
H. Virga aurea, margine crenato DOD. p. 142. In syl-
vis vulgo.

H. Solidago foliis lanceolatis, integris, spicis hetero-
mallis, petiolis foliosis. Virga aurea, Limonii folio, pa-
nicula uno versu disposita PLUKN. T. 235. f. 2. Virga au-
rea, Mexicana Limonii folio MARCHANT. p. 319. Fo-
lia levia, venosa, dura, integra, ovato lanceolata; spicae
unum latus respiciunt, & tota longitudo petioli floriferi
foliolis plena est. Calycis foliola trium ordinum adpressa.
Petala plana, lanceolata, acuta.

H. Solidago maxima, Americana CORNUTI p. 169,
Virga aurea, altissima, serotina, panicula speciosa, patula
MARTYN. T. 14. Adeo serotina, jam CORNUTO mo-
nente, ut primum hoc anno apud nos floruerit. Spicae
unilaterales, densae; flores parvi; calyx cylindricus,
squamis adpressis. Semiflosculi septem ad deceni, breviter
incisi. Flosculi totidem, flavi utriq[ue].

H. Solidago paniculata, corymbosa, racemis reflexis,
floribus confertis, adscendehtibus LINN. Virga aurea,
augustifolia, panicula speciosa, Canadenis PLUKN. T. 236.
f. 1. In BROSSEI tabb. 37.

H. Virga aurea, montana, Scrophulariae folio PLUKN.
T. 235. f. 3.

H. Solidago foliis linearibus, integerrimis, congestis, flo-
rūm radiis brevissimis LINN., Helenium Linariae folio,
floribus

floribus minimis, non radiatis VAILL. *Calycis folia aliquot ordinum, pulposa, adpressa.* Petala plana, non longiora latitudine, tridentata, flava. Semen pappo coronatum. Ex *nova Anglia* accepi.

H. *Solidago* foliis lanceolatis, venosis, amplexicaulibus, glabris, calycis squamis lanceolatis. *Aster novae Belgiae latifolius*, *floribus saturate violaceis* HERM. *Hort. Lugd. Bat.* p. 67. AMMAN. *hort. BOS.* p. 3. depict. Calycis folia quatuor ordinum, lanceolati, pene rhomboidea. Semiflosculi saturate violacei, lanceolati. Pappus plurimus. Placenta alveolata. Flosculorum segmenta apice fusco.

H. *Solidago* foliis linearibus nervosis, floribus umbellatis, caeruleis. *Aster Tripolii flore* I. R. H. *Aster atticus, purpureus, Monspeliensis, angustioribus foliis* I. B. II. p. 1045. Folia calycis adpressa, non repanda. Calyx cylindricus. Petala pauca, praelonga, arguta, caerulea. Flosculi lutei, extus purpurei. Semen hirsutum. Pappus densus. Circa *Monspelium*.

H. *Solidago* foliis ovato lanceolatis, serratis, caulis ramosis, multifloris. *Aster autumnalis, Americanus*, foliis latis, crenatis, parvo, purpurascente flore HERM. *Hort. Lugd. Bat.* p. 68. *Asteriscus latifolius, autumnalis* CORNUT. p. 64. Squamae calycinae non reflexae, graciles & longae. Semiflosculi subtiliter bidentati & tridentati. Flosculi adulti rubent.

H. *Solidago* caule praeterto, ramosissimo, foliis lingulatis, floribus ramos terminantibus, albis. *Aster novae Angliae*

SEMINÉ PAPPO CORONATO. 401

gliae, *Linariae folio*, *Chamaemeli floribus* HERM. *Hort. Lugd. Bat.* p. 95. Calycis folia imbricata, intima repanda pilosa. Petala alba, lanceolata, multorum ordinum, apice inciso & contracto. Maturi flosculi purpurascunt.

H. *Senecio* foliis tomentosis, pinnatis, pinnis semi-pinnatis. *Cineraria* LUGD. p. 1383. *Cineraria marina* AICHST. *Aest. Ord. V. T. 9. f. 2.* Non video, cur a *Jacobaeis* separari debeat, cum squamas minores ad basin calycis, & verum calyces conglutinatum habeat.

Senecio foliis pinnatis, pinnis multiformibus, dentatis, floribus umbellatis, luteis *Enum. Helv.* p. 731. *Jacobaea vulgaris*, *laciniate* I. R. H. *Senecio major*, sive *Flos S. Jacobi* MATTH. p. 1133. Ubique in fossis.

H. *Jacobaea major*, foliis viridibus, rigidis & laciniatis GERB. Varietas an species foliis majoribus, durioribus, acutius crenatis, floribus majoribus, ex Tartaria.

β. Varietas latifolia, foliis ovatis. *Jacobaea latifolia* GERB. p. 280. *Marsh Ragwort* PETIVER. T. 16. Circa Cellam vix alia crescit.

Senecio foliis pinnatis pinnis parallelis linearibus *Enum. Helv.* p. 732. *Jacobaea* foliis pinnatis, pinnis linearibus, apice incisis, subtus incanis MOHRING. *Comm. Nor.* 1743. *hebd. 51.* Aliquantum a vulgari differt calycis lanugine, & foliolis ad basin magis adpressis, Vide RUPPIUM nostrum p. 176. *In Eulenloche,*

Senecio foliis pinguibus, pinnatis, pinnis alterne brevissimis, radiis exiguis *Enum. Helv.* p. 732. *Jacobaea pannonica* I. CLUS. *hist. p. XXI.* Frequens est in sylvis caeduis, maxime vero in areis carbonariorum, & ubi torfa exusta fuit.

β. IDEM flore exiguo, squamulis in basi calycis brevissimis. *Jacobaea annua*, *Senecionis folio*, parvo flore VILL. *Memoir.* p. 384. Huc icon RUPPII T. III. Perinde ut prior in sylvis.

H. *Jacobaea Senecionis folio*, glabra GERBER. Folia amplexicaulia, semipinnata, pinnis obtusis, crenulatis. Ad calycis basin squamae breves duorum ordinum. Calyx verus unifolius, sulcatus. Flosculi plani, rari, ovati, brevesque, tridentati t.

H. *Senecio* foliis amplexicaulibus, semipinnatis, pinnis semipinnatis, angulosis. *Jacobaea Africana*, *annua*, *minor*, *floribus suaverubentibus* VOLC. p. 225. ic.

Senecio foliis tomentosis, imis semipinnatis, superioribus lingulatis, amplexicaulibus. *Aster palustris*, *lutens*, *folio lanuginoso* I. R. H. Jagged Fleabane PETIVER herb. T. 16. In agro Veronensi Circa Seeburg & Denkerhausen in ripis lacuum. Calycis folia unius ordinis, hirsuta, virentia. Flos non grandis, petalis latis, flavis emarginatis. Semen quadrangulum, sulcatum, pappo copiosissimo, molli.

H. *Senecio* foliis ovatis, dentatis, acutis. *Jacobaea Hispanica*, *minus laciniata*, *petalis brevissimis* I. R. H. *Senecionis*

SEMINÉ PAPPO CORONATO. 403

nencionis genus Myconi LUGD. p. 517. *Senecio folio non laciniato* I, B. II. *Folia ovato lanceolata, parum serrata, subtus rubentia.* *Squamulae longae ad basin calycis.* *Ipse calyx unifolius, lineatus, apicibus squamarum purpureis, non sphacelatis.* *Semiflosculi longe petiolati, bractea exigua, ovali, trifida.* *Pappus mollissimus.* Conf. LINN. *Wästgöta Resa* p. 142.

H. *Jacobaea Africana*, frutescens, foliis rigidis & hirsutis Hort. Amst. II. c. 75. Flores umbellati. Calyx cylindricus cum squamis accessoriis, omnibus in apice fuscis. Radii subrotundi, breves, lati, emarginati, pallide lutei.

H. *Senecio foliis reniformibus, semiquinquelobis, lobis dentatis.* *Jacobaea Africana, Hederae terrestris folio, repens* H. AMST. II. c. 73. Calycis squamae accessoriae tres, reliquae conglutinatae tredecim. Radii calycis ovari, latiusculi, fine contracto, tridentato. Semen latum, ovarum. r.

H. *Senecio foliis cordatis, crenatis, floribus spicatis.* *Jacobaeastrum Cacaliae folio* AMMAN. n. 221. f. 24. *Vetus Senecio.* Duo magna foliola ad basin calycis. Calyx verus unifolius, sulcatus, breviter dentatus. Petala plana, septem, flava, lineata, tridentata. Semen papposum. In tota Sibiria.

H. *Senecio foliis imis cordatis, serratis, superioribus lingulatis, integris.* *Solidago &c.* GMELIN. flor. II. T. 71. *Jacobaea maritima, non laciniata, lanuginosa, latifolia*

PETIT. Ep. III. p. 48. ic. Jacobaea II. CLUS. Pann. p. 573. Cambridge Ragwort PETIV. T. 16. In agro Vero-
nensi, Austriae sylvis, & circa Jenam abunde. Calyx ali-
quantum lanuginosus, squamis unius ordinis accessoriis,
vix conspicuis. Petala plana, pauca, tridentata & quadri-
dentata.

H. Senecio foliis ovatis, dentatis, amplissimis. Doria
altissima, Orientalis, Limonii folio, amplissimo DILL. Hort.
Elth. T. 105.

H. Senecio (*Solidago*) palustris, altissima, incana &
tomentosa, foliis lato-ribus, serratis AMMAN. n. 220.
Calyx villosus, multis ad basin squamis latiusculis, calyce
vero de more unifolio, apicibus segmentorum fuscis. Pe-
tala plana, flava, lata, ovata, lineata, tridentata. Pro va-
rietate sequentis habet GMELINUS p. 162.

Semico foliis linearibus, serratis, sensim calvescen-
tibus. *Consolida palustris* TAB. p. 555. Marsh Guldenrod
PETIVER. T. 15. Circa Lauche in pratis, ubi fuit pa-
gus Oberndorf. Folia juniora lanuginosa, adulta glabra,
qualia *Lauchae* legi.

Senecio foliis longe ellipticis, acute serratis, floribus
umbellatis ENUM. HELV. p. 734. *Consolida aurea* TAB.
p. 556. Jacobaea Alpina, foliis longioribus, serratis I. R. H.
In BROSSEI tabb. pulcherrime. Verissima Jacobaea est
calyce vero unifolio, a Solidagine diversissima. Im Eulen-
lochz. auch im Bruche.

SEMINÉ PAPPO CORONATO. 405

Senecio foliis ovato lanceolatis, subtus hirsutis, floribus umbellatis Enum. Helv. p. 734. Jacobaea nemorensis, latiore & rigidiori folio, hirsuta RUPP. A priori parum differt, & in *sylva hercynica* frequens est.

Senecio foliis pinnato sinuatis, amplexicaulibus, floribus nudis, sparsis ROYEN. Senecio TABERN. p. 168. In hortis ubique.

H. Senecio - - - similis, sed latiori folio, caule glabro, flore minimo. Senecio *Aegyptius*, folio Matricariae I. R. H Nullam habet lanuginem, & folia superiora non adeo incisa, quin potius serrata, qua nota differt a Sene-
tione vulgati.

H. Senecio foliis lanceolatis, amplexicaulibus, levibus acute denticulatis, caule herbaceo LINN. Senecio Afri-
canus, altissimus, Blattariae vel Hieracii folio HERM. Par.
T. 226.

Charakteres ad finium quatuor generum ita definivi, ut Erigeron sit flosculis planis vel omnino nullis, vel exiguis, calycis foliolis fere parallelis, certe non repandis: Aster, foliis apice repandis: Solidago foliis calycis adpresis, neque repandis: Senecio foliis calycis omnibus conglutinatis, plerumque aliquot squamulis ad basin acceden-
tibus: Bellidiflora calycis folia duorum ordinum habet, non repanditorum, & eo forte Solidagines bene multae referri pos-
sunt. Alii Clari Viri aliter & aliter notas discriminis po-
fuerunt.

Arnica foliis ovatis, integris, conjugatis Enum. Helv.
p. 737. Arnica SCHROEDERI. Caltha Alpina DOD.

Purg. p. 62. In M. Baldo. In omni *sylva kercynica*, in montibus Saxonici. &c.

H. Doronicum foliis cordatis, obtusis, i mis longe petiolatis, superioribus amplexicaulibus Emm. Helv. p. 738. *Doronicum Romanum* BLAKWELL. T. 239. In montibus Genevensibus, in agro Veronensi.

SEMINÉ FOLIOLIS CORONATO.

Tagetes minor, flore fulvo, maculato DILL. Hort. Elth. p. 373. *Caryophyllus Indicus*, minor CAMER. Epit. p. 407. *Othonna PASS.* ic. 92.

H. Tagetes major, flore luteo, pallescente VAILL. *Caryophyllus Indicus*, flore luteo, simplici AICHST. Aest. Ord. XIV. T. 2. f. 3.

β . Flore aurantio, simplici,

γ . Flore pleno AICHST. l. c.

δ . Radiis fistulosis MORIS. S. VI. f. 5. *Caryophyllus Mexicanus*, fistuloso flore, simplex COLUMN. Ecphras. II. p. 46.

ϵ . etiam flosculis fistulosis. *Flos Africanus*, flore pleno, fistuloso MUNTING. ic. 158.

H. Arctotheca foliis pinnatis, pinnis undulatis, semi-pinnatis, subtus tomentosis. *Anemonospermus Africana*, folio Jacobneae, tenuiter laciniato, flore aurantio, pulcherrimo

SEMINA CORONATO FOLIOLIS. 407

mo BOERH. *Ind. alt.* p. 100. Semina lana gossypacea obducta, coronata octo foliis siccis ovatis. Calycis folia multorum ordinum, inferiora reflexa, lanuginosa, interiora semper longiora, eaque obtusa, margine fusco, squamente. Petala plana, speciosa, aurantia, fere tridentata. Flosculi perinde secundi, campanula regulari, quinquesida.

H. Arctotheca foliis tomentosis, pinnatis, extremo maximo. *Anemone adonis Aethiopica*, fibrosa radice, flore Asteris, *Taraxaci foliis*, *subincanis* HERM. Host. *Lugd. Bat.* p. 43. Semina sericeo villo lanata, coronata foliis octo inaequalibus, siccis, albis, obtusis. Calycis folia imbricata, lanuginosa, acuminata, angusta, extrema obtusa, lanceolata. Flosculi in ambitu graciles, abortivi, flavi, subtus fusci, frequenter ut in *Facea* quinquesidi. Placenta brevibus squamis distincta. Interiores flosculi secundi, purpurei, cum tubo stamineo & tuba de more. Alius adeo a priori character.

H. Helenia foliis decurrentibus LINN. *Corona Solis* *Salicis folio*, alato caule I. R. H. In *Virginia*. Calycis folia reflexa multorum ordinum. Semen breve, obesum, sulcatum, coronatum raris setis. Semiflosculi feminini, venis viridibus picti, apice multifido. Flosculi quinquesidi, in hemisphaericum congesti, androgyni.

FLANIPETALAE

SEMIN E PAPPOS O. FLACENTA NUDA.

Taraxacum pinnis foliorum triangularibus, calyce reflexo *Enum. Helv.* p. 739. *Dens leonis* BLAKWELL. T. 1.

Taraxacum pinnis foliorum triangulariter dentatis, pappo plumoso, calyce hispido *Enum. Helv.* p. 741. *Hieracium Dentis leonis folio, caulis apphyllis, glabris* DILL. GIESS. p. 122. *Common rough Dandelion* FETIVERT. 10. *Beym Bovender Galgen, und im Göttinger Walde.*

Hieracium foliis integerimis, ovatis, caule repente, scapo unifloro *Enum. Helv.* p. 742. LINN. *Pilosella major, repens, hirsuta* C. B. *Pilosella* BLAKWELL T. 365. *Hieracii character a calyce cylindrico sumitur, & squamis multorum ordinum imbricatis facto.*

Hieracium foliis virentibus, pilosis, ovato lanceolatis, scapo simplici, unifloro *Enum. Helv.* p. 743. *Hieracium quod Pilosella, folio minus villoso* I. R. H. In pratis subinde.

Hieracium foliis longe lingulatis, pilosis, caule imo folioso, erecto, multifloro *Enum. Helv.* p. 743. *Pilosella major, altera TAB.* p. 197. *Pilosella major* *uxorionauces umbellifera* COLUMN. ECPHRAS. p. 249. *Aufm Altenstolberg, und um Jena. Vom Grohnder Thor.*

Hiera-

Hieracium foliis ovatis, tomentosis, caule nudo, spica florali terminato *Enum. Helv.* p. 744. & GMELIN. flor. II. T. 13. *Heracium pratense, latifolium, non sinuatum* LIND. *hort. T. 7.* In sylvis circa Jenam abunde, & in Alsatia, in primis Helvetiae familiare.

E. Varietas angustifolia, lecta in Altenstolberg, est *Hieracium canescens, praecultum, aphyllocaulos, floribus parvis* TRIUMPHET. *Praelus.* p. 62.

H. *Hieracium montanum, tomentosum* DILL. *Hort. Elth.* T. 150. Viscidum est, odore grato & mitiori aliquujus emplastri emollientis. Folia crassula, tomentosa, ovata, integra. Calycis segmenta pilosa, nigra, viscida, multorum ordinum, imbricata. Flos flavus, numerosis semiflosculis. Semen nigrum, columnare, pappo rariusculo. r.

H. *Hieracium foliis ovatis, caule pene aphylo, floribus purpureis, umbellatis* *Enum. Helv.* p. 743. *Hieracium Alpinum, non laciniatum, flore fusco* C. B. In *Alpibus Helveticis.*

Hieracium caule unifloro, calyce & foliis ellipticis, longo villo barbatis *Enum. Helv.* p. 744. *Hieracium villosum, Alpinum, flore magno, singulari, caule nudo* DILL. *Syn. III. T. 6. f. 2.* In summo M. Brüdero. In horto folia magis serrata facta sunt.

H. *Hieracium Pyrenaicum, latifolium, folio Cerinthes* I. R. H. MORIS. S. VII. T. 4. *Hieracium pilosum, foliis variis, dentatis* DILL. *Hort. Elth. T. 149.*

Hieracium foliis ad terram pilosis, acute dentatis, caule brachiatō, pene nudo *Enum. Helv.* p. 745. *Hieracium murosum*, *folio pilosissimo* I. R. H. Ubique ad muros.

β. Varietas myophora. *Pulmenaria Gallica* PANCOV. ic. 856.

γ. Foliis ovatis, vix dentatis.

δ. Varietas an species diversa, foliis longioribus, angusticribus, argute dentatis, caulibus magis foliosis. *Hieracium Pulmonaria dictum, angustifolium* VAILL. p. 242. *Long hairy hawk-lung* PETIVER. T. 13. *Am Boden der Galgen*. Inter *Elbingerode & Blankenburg* & circa Jenam.

Η. *Hieracium* caule ramoso, foliis firmis, inferius petiolatis, reliquis ex ovato lanceolatis, semiamplexicaulibus, omnibus sinuosis, petiolorum initia dentatis GMELIN. *Sibir. II. T. X. Hieracium montanum, Rapifolium* C. B. in *Provincia Isetensi*. Folia glabra, ruta, rubigine inferne obsita. Calycis squamiae imbricatae, hirsutae, Flos grandis, flavus. Semen longum, ellipticum, sultatum. r.

Hieracium foliis glabris, amplexicaulibus, petiolatis, minute dentatis *Enum. Helv.* p. 748. *Hieracium montanum, latifolium, minus* TAB. p. 186. In pratis uidis um die Papiermühle.

Crepis (*Hieracioides*) foliis pinnatis, pinnis alterne majoribus, triangulis, floribus ante expansionem nutantibus

SEMINA PAPP. PLACENTA NUDA. 44

bus Enn. Helv. p. 750. *Erigerum tertium* DOD. p. 641.
Sed id flore radiato pingitur. *Castor Hawkweed* PETI-
VER T. 21. *Hieracium amygdalas amaras olens*, seu odore
Apuli suave rubentis. I. R. H. *Ueber der Papiermühle,*
beym Bovender Galgen &c.

H. *Crepis* foliis semipinnatis, angulosis, caule nudo,
floribus ante florescentiam nutantibus. *Hieracioides foetida*,
flore suaverubente VAILL. *Hier. apulum* flore suaveru-
bente COL. p. 242. In Neapolitano regno, & in comita-
tu Northampton MOR.

H. *Crepis* foliis semipinnatis, glabris, calycis foliis in-
terioribus latissimis. Cum nomine *Tragopogonis Virginici* COLLINSONUS misit. Annon *Tragopogon* sive
magnus, *sulphureo*, *specioso* CLAYTON p. 91? Folia am-
pleriter & varie dentata, glabra, sub ramis auriculata, lon-
gius dentata. Caulis pedalis, subnudus. Petioli florales
longi, erecti. Squamae fuscae, sensim congestae ad radi-
cem floris, numerosissimae, facientes quasi sepem circa ca-
lycem veriorem, qui sex praelatis foliis fit, viridibus, li-
neatis & sulcatis. Flos sulphureus, plenus. Semina as-
pera, ex stylo gerunt tubum cylindricum, sub bractea
hirsutum. Ea flaccida, quinquedentata. Tubus stami-
num fuscus, tumba petalo concolor. Pappus simplex.
Placenta perforata, nuda.

H. *Crepis* foliis ovatis, caule brachiatō, floribus pere-
xiguis. *Hieracioides annua*, *glutinosa*, *floribus parvis*
VAILL. 1747. Lampsanæ flori praeter pappum con-
venit.

Cre-

Crepis (Hieracioides) foliis ad terram ferratis, ad cauem pinnatis, pinnis alterne majoribus, caule pene nudo, multifloro Enum. *Helv.* p. 750. *Hieracium majus*, erectum, angustifolium, canle levi I. R. H. A sequente caule levi, pene nudo, spica florali terminato differt, & foliis caulinis non amplexicaulibus, tota etiam rectior & minus ramosa est. Ludit foliis hirsutis & glabris.

Crepis (Hieracioides) foliis semipinnatis, subasperis, amplexicaulibus, caule hispido, folioso & multifloro Enum. *Helv.* p. 750. *Hieracium multis aliis Cichorium integrum*, *hirsutum* I. B. II. p. 1024. Common Hawkweed (glabra varietas) PETIVER. herb. T. 21. Succory Hawkweed EIUSD. T. 16. Tall Succory Hawkweed ibid. Um den Bovender Galgen. In Wäldern. Folia valde variabilia, ampla, semipinnata, lanceolata; caulis inferius hirtus, superne glaber, brachiatus; folia sub divisione ramorum amplexicaulia, lata, laciniata.

β. Varietas foliis imis parum dentatis, superioribus pene integris. *Hieracioides foliis lanceolatis, hastatis, sessilibus, inferioribus dentatis* LINN. GMELIN, flor Sibir. II. p. 28. T. XI, XII.

Crepis (Hieracioides) foliis glabris, floribus minimis, caule ramosissimo Enum. *Helv.* p. 751. *Hieracium minus* Dioscoridis TABERN. p. 181. In Gräben aufm Hagen. Flores valde exigui, extus albentes. Calyx hirsutus, pariter albidus, folia quidem varia incisa & integra, glabra tamen.

H. Cre-

H. *Crepis* foliis semipinnatis, dentatis, superioribus
amplexicaulibus, squamis calycis ovatis, alatis, *Crepis Tingitana*,
Papaveris folio VAILL. *Chondrilla Tingitana* &c.
HERM. *Hort. Lugd. Bat.* p. 659.

H. *Crepis* foliis calycis accessoriis, cordatis, alatis, foliis glaucis, semipinnatis. *Crepis DAL.* p. 562.

β . Folio laciniato. *Soncho ad finis quaedam laciniata* sive *Trinziatella* I. B. II. p. 1021. Ob calycem possit
pene potius *Hieracio* accenseri.

Picris foliis amplexicaulibus, lingulatis, dentatis
Enum. Helv. p. 751. neque enim ullo modo ovalia sunt.
Hieracium asperum, majori flore, in agrorum limitibus C. B.
Ab *Hieracio* differt pappo plumoso.

H. *Helminthotheca*. Huic nomen relinquimus singu-
lari generi, si aliquid calyx in his plantis potest, in qui-
bus a petalo discriminem sumi nequit. Calyx remotus fit
quinque amplissimis foliis hirsutis, ut in *Cnico*. Calyx
interior habet quinque vel sex folia ad basin, satis bre-
via, & totidem alia in sulcis squamarum seriorum. Squamae
praecipuae duorum ordinum emittunt sub fine aristam
pinnatam. Semen elliptico conicum, longum, in stylo
pappigerum. Pappus pluinosus. Est *Hieracium echiooides*,
capitulis Cardui benedicti C. B. *Par. Bat.* p. 185. In
Anglia, *Gallia*, ad agrorum margines BLAKSTONE &c.

PLANIPETALAE

Sonchus foliis semipinnatis, rigidiusculis, capitulis nigris & hispidis *Enum.* *Helv.* p. 752. *Hieracium majus* FUCHS. p. 319. In segetibus subudis.

Sonchus foliis rigidiusculis, serratis, calycibus levibus *Enum.* *Helv.* p. 752. Foliis laciniatis & non laciniatis. *Prikied dented sowthistle & Prikled jagged Sowthistle* PETIVER herb. T. 14.

Sonchus foliis levibus, teneris, calycibus glabris *Enum.* *Helv.* p. 753. *Sonchus levis, laciniatus, latifolius* C. B. Iterum foliis laciniatis & non laciniatis differt. *Smooth Jagged Sowthistle & Broad Sowthistle* PETIVER T. 14. & plures varietates ib.

Sonchus floribus spicatis, caeruleis *Enum.* *Helv.* p. 754. *Sonchus caeruleus* CAM. Epit. p. 281. *Sonchus caeruleus, latifolius* I. B. II. p. 1005. In pago Mordschlaken ad rivum. Circa die Schluft. In sylvis circa Schierke, & in Bructero M. tum in Alpibus & Silesiae montibus.

H. *Sonchus* foliis lanceolatis, sessilibus, plerumque denticulatis, floribus corymbosis, caulibus glabris GMELIN. T. III. *Lactuca Salicis folio, flore caeruleo* AMMAN. Ruthen. n. 211. Semen cum ita brevi stipite pappum fert, ut possis negare, stipitem habere.

Prenanthes flosculis quinis, foliis pinnato hastatis *Enum.* *Helv.* p. 755. LINNAEI. *Lactuca sylvestris, murorum, flore luteo* I. B. II. p. 1004. *Sonchus sylvaticus, quartus* TAB. p. 197. Passim in sylvis.

Chondrilla Enn. Helv. p. 755. TURNER. L. I.
Chondrilla Viminca I. B. II p. 1021. COLUMN. Phytob.
 T. 3. *Chondrilla Cichoroides* DILL. E. N. C. Cent. V, VI.
 app. p. 61. T. IX. Gieß. p. 119. Ueber der Maschbrücke
 abunde. *Calyx Crepidis.* *Pappus Laeticae stylifer.*

H. *Chondrilla*, quae Hieracioites annua, Endiviae
 folio, calyce magno VALL. *Leontodon calyce toto eredo,*
inferioribus squamis siccis, foliis amplexantibus GMELIN.
flor. Sibir. II. T. V. In Sibiria, Arverniae Montd'or.
 Seminibus in praelongo filamento pappiferis cum Taraxaco,
 calyce cum Crepide convenit. Squamae ad basin latæ,
 ovato lanceolatae.

H. *Laetica* BLAKWELL. T. 88. *Laetica vulgaris ca-*
pitata & non capitata I. B. II, p. 907.

H. *Laetica* foliis ovatis, costa spinosa, *Laetica sylve-*
stris, Italica, costa spinosa., sanguineis maculis adspersa
 HERM. Par. Bat. p. 191. r.

Laetica foliis semipinnatis, costa spinosa Enn. Helv.
 p. 756, *Laetica sylvestris, costa spinosa* I. R. H. In vallo
 urbis.

Laetica foliis lingulatis & semipinnatis, costae
 principio spinoso. *Laetica sylvestris, altera, angusto, Sa-*
ligno folio, costa albicante RUPP. III. T. IV, *Laetica &c.*
 GUETTARD. II. p. 374. MAGNOL. Monsp. p. 398.
Circa Genam passim, circa Stampas, Monspelium.

Lactuca foliis glabris, pinnatis, caule brachiato. *Enum.* *Helv.* p. 756. n. 2. *Chondr illacaerulea* TABERN. p. 176. In M. Fuchsberg.

Scorzonera foliis angustissimis, imis rariter semipinnatis, reliquis integris, caule folioso *Enum.* *Helv.* p. 758. *Tragopogon laciniatus* foliis COLUMN. *Phytobas* p. 21. *Scorzoneroidea vulgaris* VAILL. *Zenac* & passim in *Germania* ad vias, etiam in M. ultra *Kescheröderfelde*.

H. *Scorzonera* foliis semipinnatis, caulis erectis, ramosis & foliosis. *Scorzonera pratensis*, foliis laciniatis glabris BUXBAUM. Cent. II. T. 22. *Scorzonera* foliis dentatis GERBERI. A priori, cui semine & foliis proxima est, differt capite duplo majore, semine longiore, pappo albo, calyce glabro.

Scorzonera foliis semipinnatis, caule pene nudo, pappo sessili *Enum.* *Helv.* p. 758. Common Hawkbit PETIVER. T. 21. & seqq. *Hieracium Chondrillae* folio, glabro, radice succisa, minus C. B. Im Rheinhäuser Walde, vorm Wehnder Thore, gegen der Maschmühle bey dem Hieracio Castorei odore.

H. *Scorzonera latifolia*, sinuata C. B. MORIS. S. VII. T. 9. *Scorzonera* DOD. Coron. p. 234. BLAKWELL. T. 406. *Scorzonera major*, *Hispanica* I. CLUS. p. XXXVI. *Scorzonera* foliis sinuatis MATTH. Ep. p. 378. In M. Göriciensibus A Jaico ad Irtim usque GMELIN. In Hispania.

SEMINA PAPP. PLACENTA NUDA. 417

Scorzonera foliis gramineis; firmulis, caule brachiato, multifloro. *Scorzonera Volcameri* FEHR. p. 36. *Scorzonerae secunda species, Jenae reperta* GESNER. app. 36. *Hinter Ziegenhayn, gegen Künitz, über Sulze, am Cospida Holze, utique circa Jenam.* Calycis squamae trium & quatuor ordinum, triangulares, medio dorso eminente. Petala pallide flava. Flos longe cylindricus, superne contractus.

Scorzonera foliis ovato lanceolatis, caule unifloro. *Scorzonera latifolia, humilis, nervosa,* I. R. H. *Scorzonera humilis, latifolia* CLUS. p. 634. *Scorzonera Italica* CLAVENNAE. In agro Veronensi, Badensi Austriae. In pratis uidis reperti inter Nordlingen & Oettingen. Calycis squamae trium ordinum, aliquo villo obnuptae. Petala lata, lanceolata, quinquedentata. Pappus sessilis, plumosus.

H. *Scorzonera caule ramoso, foliis planis* GMELINI Cum hoc nomine in horto fuit, sed in ipso Cl. VIRI. opere non adpareret, & nobis dudum periit. Forte *Scorzonera caule ramoso, foliis linearibus, acuminatis, carinatis, calycibus acutis* GMELIN. p. 4. Calyx cylindricus. Squamae imbricatae trium ordinum, molli mucrone terminatae, nervo eminente, Petala lutea, virentibus lineis picta.

Tragopogon foliis carinatis, amplexicaulibus, gramineis, luteo flore Ench. Helv. p. 758. *Tragopogon* five

D d

Barbu-

Barbula hirci CAMER. Epit. p. 312. *Im Paradiese und
beym Boevender Galgen.*

β. Varietas flore viridi. *Im Göttinger Walde.*

H. *Tragopogon graminicum*, flore suave rubente
COLUMN. p. 236. ic. In Italia & subinde in Germania.

H. *Tragopogon purpuro caeruleum*, *Porri folio*, quod
Artifi vulgo C. B MORIS. S. VII. ic. 9. *Tragopon pur-
pureum* AICHST. Aest. Ord. I. T. 13. f. 3. *Tragopogon
Crocifolium*, *montanum*, flore nigro purpureo COL.
Ecphras. p. 230. In aliquibus Germaniae sylvis nasci di-
citur bey Klingenberg &c.

H. *Tragopogon* - - - *Scorzonera Lusitanica*, *grami-
neo folio*, flore pallide luteo BUXBAUM. Cent. II. T. 21.
Verus est *Tragopogon*, squamis duorum tantum ordinum,
o>nis, etsi flore non longiores sunt. Flos palli-
de ochroleucus. Staminum tubus nigris lineis pictus. A
Scorzonera secunda GMELINI omnino calyce, principe
planta&emdash parte, ciffert.

H. *Tragopogon* caule tomentoso, Cum nomine
Scorzonerae Tragopogonis folio; flore luteo GERBERI mis-
sus. Seimen longum, incurvum, sulcatum, asperum, ex sty-
lo valente pappiferum. Squamae calycis o>to duorum
ordinum. Flos speciosus, plenus, petalis latis, quinque-
dentatis. In slis foliorum plurima lanugo. Cum plan-
ta perierit, & GMELINI nostri CLAR. liber nihil simile
habeat, nihil praeter has voces de hac specie superest.

H. Trago-

SEMINÉ PAPP. PLACENTA NUDA. 419

H. *Tragopogon corallis* calyce brevioribus, foliis lirato laciniatis H. UPS. *Chondrilla prior* CLUS. In Hispania. Calyx ex basi ventricosa. Calycis folia decem, non penitus ad basin fissa, inaequaliter lata. Flos amplius, sulphureus, plenus, exterioribus semiflosculis extus vioaceis. Pappus plumosus, fuscus. r.

H. *Tragopogon calycibus* corolla brevioribus, aculeatis LINN. *Sonchus asper*, *laciniatus*, *Creticus* C. B. Prodr. p. 60. MORIS. S. VI. T. 3. Calyx non est *Tragopogonis*, nam squamæ circa fundum ventricosum floris dilatatae arcu facto iterum eriguntur. Semine cornuto & aculeato stylifero cum *Tragopogone* convenit. r.

PLACENTA ALVEOLATA.

In tybus foliis ovato lanceolatis, dentatis, hirsutis *Enum.* *Helv.* p. 747. n. 16. *Broad Hairy Hawkslung* PETIVER T. 13. *Hieracium fruticosum*, *folio subrotundo* C. B. *Hieracii Sabaudi* varietas altera I. B. II. p. 1030. In sylvis Gottingensibus. Caulis parum ramosus, bicubitalis. Folia numerosa, longa, lanceolata, dentata; superiore breviora, lata, dentata.

In tybus foliis amplexicaulibus, subrotundis, dentatis. *Hieracium fruticosum*, *latifolium*, *hirsutum* C. B. *Hieracium caule ramoso*, *continuo folioso*, *foliis ex cordato lanceolatis*, *denticulatis*, *amplexicaulibus* GMELIN flor. *Sibir.* II. n. 30. T. 14. Circa Oppenheim in arcis ruderibus.

PLACENTA ALVEOLATA.

Non valde a priori differt, humilius tamen, foliis rotundioribus, brevioribus, & pro portione latioribus.

Intybus foliis lingulatis, dentatis Comment. Gotting. 1751. p. 219. Enum. Helv. p. 748. n. 22. Hieracium fruticosum, angustifolium, majus I. R. H. Hieracium I. DOD. p. 638.

B. Absque dentibus. Grass Hawklung PETIVER. T. 13. Intybi ab Hieracio differunt placenta alveolata.

PLACENTA PILOSA.

H. Andryala ROY. Sonchus lanatus LUGD. p. 1116. Eriophytes foliis dentatis, flore extus melino, intus subrubente VAIIL. & flore toto luteo. Monspelii. Calycis folia unus ordinis ad XVII. Flos pallens, petalis plurimis, argente dentatis, extus purpureis. Placenta plena papillis, inter quas pili incani eminent,

PLACENTA SQUAMOSA.

Hypochoeris dentibus foliorum rectangulis, caule nudo ramoso Enum. Helv. p. 159. Hieracium Intybaceum TABERN. p. 783. Hieracium Dentis leonis folio, obtuso, majus C. B. Am Bovender Galg. n & in sylvis.

Hypochoeris foliis ovatis, dentatis, caulis unifloris Enn. Helv. p. 760. n. 2. cum icon. Herba costa CAMER. bart. p. 49. In agro Veronensi. In pratis uidit inter Elbingerode & Blankenburg. Circa Jenuin. Hy-

Hypochoeris foliis glabris, semipinnatis. *Hypochoeris Chondrillae folio, flore parvo* VAILL. *Hypochoeris porcellia* TABERN. p. 179. *Auf den Aeckern des Hagens um die kleinen Teiche.* Versus Cellam. *Salmanticae & in Castella, Monspelii.*

SEMINE FOLIIS CORONATO.

H. *Catananche squamis calycinis inferioribus lanceolatis* LINN. *Chondrilla Cyanoides, lutea, folio non diviso* BARR. ic. 135. *Monspelii & in Hispania.*

SEMINIBUS PARTIM NUDIS,
PARTIM CORONATIS.

H. *Rhagadiolus calyce foliolis circumvallato.* *Hieracium Baeticum, medio nigrum* HERM. Par. Bat. p. 185. *Hieracium calyce barbato* COLUMN. Ecphras. II. p. 28. Novi generis nomen meretur, cum neque calyce, neque pappo sit *Hieracium*. Nam calyx quidem fit multis accessoriis squamis, veris autem foliis tantum duorum ordinum, qui unius esse videntur. Semina pleraque absque pappo sunt, pauca unum alterumve foliolum aristatum in corona habent, ut numerus vix tria excedat.

H. Rhagadiolus squamis calycis seminiferis longioribus, hispidis. *Rhagadioloides Calthae folio, calyce glabro* VAILL. Non est *Lampsana*. Squamae accessoriae calycis, ut in *Crepide*. Exteriores fortes, carinatae, asperae, hirtaeque semen continent curvum, secundum. Interiorum flosculorum semen infecundum est. Omnia semina secunda brevi corona sunt, infecunda conspicua, quinquedentata. Petali dentes nigricant, ut in priori. Caeterum Rhagadioli characterem facio, quod semina alia pappum gerunt alia nentiquam. In *Africa*.

H. Rhagadiolus (*Hypochoeris*) calycibus aequalibus, hispidis ROYEN. *Achyrophorus pene glaber, Bellidis, glasso, dentato folio* VAILL. Calyx hispidus, serie segmentorum simplici aut duplice. Perala plana, quinquedentata. Semina marginalia non papposa, interiora plumula coronata. Squamae inter flosculos plurimae. Semen longum, gracile, styloferum. Nostrae plantae folia neque glauca sunt, neque glabra, sed virentia omnino & hispida.

H. Rhagadiolus calycis squamis seminigeris, brevioribus & glauis. *Cichorium verrucarium, Zacintha* CLUS. p. CXLIV. In *Creta*, *Hispania*. Calycis squamae accessoriae breves, triangulares, quatuor, sex aut plures. Veri calycis squamae unico ordine, ut in *Crepide*, origine crassa, quae semen fecundum continet. In centro floris flosculi steriles, semine abortivo. In seminibus plerisque pappus reperitur.

SEMINIBUS NUDIS.

Lampsana foliis imis pinnatis, superioribus lanceolatis, serratis *Enum. Helv.* p. 759. *Lampsana* I. R. H. DOD. p. 675. In sylvis caeduis, ruderibus.

B. H. Folio crispo.

H. Lampsana calycibus fructus undique radiis subulatis; patentibus ROYEN. Hieracium Narbonense, falcatum LOB. ic. 240. Monspelii. Calycis folia ad basin tria brevia, quinque longa, angusta, per maturitatem divergentia, gerentia in sinu semen longum, gracile, acutum. Petala quinque flava & quinq uidentata.

Lampsana foliis ovatis, dentatis, canle nudo, floribus nutantibus. *Hyoseris angustifolia* TABERN. p. 180. *Hieracium VIII. CLUS. Pann.* p. 649. *Um Celle, Jena, & supra Bergehausen.* Calyx habet squamas accessorias paucas, verae squamae subhirsutae sunt, eminentia dorso. Sub calyce culis dilatatus cavusque. Tubus floris subhirsutus. Petalon quinquedentatum, pallidum.

H. Hyoseris foliis glabris, hastato pinnatis ROYEN: *Dens leonis minor, foliis radiatis* C. B. Nondum floruit.

Cichorium foliis pinnatis, pinnis triangularibus, dentatis *Enum. Helv.* p. 761. *Intubum* *selvestre* FUCHS p. 979. *Cichorium* *selvestre*, sive *Officinarum* C. B. Folis

inter flores pilosa, ciliata, erecta, faciunt quasi alveolos.
In semine brevissima corona pilorum.

β . Flore alto. *Vorm Wehnder Thor.*

γ . Flore subrubente.

Varietas altissima, erecta, multifolia & multispora. In
arce Oppenheimensi.

H. Cichorium caule simplici, foliis integris, crenatis
LINN. *Hort. Cliff.* *Endivia vulgo.*

H. Scolymos Theophrasti CLUS. *bisp.* p. 447. *Scoly-
mus Chrysanthemos, annus* MARCHANT. p. 303. pulcher-
time. In Hispania.

F I N I S.

INDEX

I N D E X.

A

- A**bies III. 6. 7
Abrotanum 272 - 374
Absinthium III. 371, 372, 373
Abutilon X. 122, 123, 124
Acacia 269, 300
Acalypha I. 37
Acanthus II. 309, 360
Acer III. 167, 168
Acetosa 16, 177
Achillea VI. 389, 390
Achyrophorus 422
Acinus 324, 340
Aconitum IV. 92, 93, 386
Acopa 204
Acorus I. 59
Acrostichum I. 2
Adhatoda I. 309
Adonis II. 98
Aegilops I. 52. 47
Aeschynomene I. 265
Aethiopis multis 322
Agemlilac 233
Ageratum II. 383. 375
Agrimony II. 161
Ajuga 314
Aizoon 135, 136
Alaternoides 169
Alaternus 13, 36
Aicea 117-119, 121, 122

- Alchimilla* II. 31
Alectrolophus II. 312
Alhagi 268
Alisso 203
Alkekengi V. 214, 215
Alliaria 249
Allium XXII. 82 - 86
Alnus I. 10. 13
Aloe XXIX. 69 - 75. 132
Alopecurus II. 42. 50
Alsinanthemum I. 203
Alfinastrum 160
Al sine XIV. 157 - 159. 27,
 38, 147, 241, 326
Alfinoides 304
Althea IV. 119. 118, 120,
 122 - 124
Alyssoides 241
Alysson V. 240, 241. 235,
 236, 230, 336
Amaranthus VIII. 23, 24. 25,
 211, 348
Amaryllis 69
Amberbe 364
Ambrosia II. 11
Amethystina I. 345
Ammi 173
Ammioselinum II. 173
Anomum 213
Amorpha I. 300
Aniacampseros 134
 D d 5

INDEX.

- Anagallis* III. 202, 201, 221,
 236
Ananas I. 86
Ananthocyclus 374
Anastatica I. 238
Anblatum 305
Anchusa 221
Andromeda I. 164
Androsace II. 203
Androsaemum 115, 116
Andryala I. 420
Anemone VII. 103, 104, 98,
 407
Anemonospermus 406
Anethum II. 180
Angelica III. 179, 172
Anisum I. 173
Anenis IV. 284
Anonymos 31
Arachnites 202
Anserina 106
Anteuphorbium 381
Anthemis 393
Anthora 92
Anthospermum I. 190
Anthoxanthon III. 50, 18
Anthriscus 181
Anthyllis 261
Antirrhinum XVI. 305-308.
 94
Antithora 92
Aparine 188, 189
Aphace 291
Apios I. 261
Apium III. 172
Apocynum VI. 226, 227, 228
Aquifolium I. 198
Aquilegia I. 91
Arabis III. 254
Arachidnoides I. 287
Aracus 288, 289
Arbor Coral 267
 Judae 298
 vitae 7
Arbuscula Corallii 267
Arbutus II. 164
Archangelica 326
Arction 357
Arctotheca II. 406, 407
Argemone II. 89, 88
Argentea 368
Aristolochia II. 165
Armerius 153, 155
Arnica I. 405
Artemisia VIII. 372, 373
Arum IV. 60
Arundo V. 46, 66
Asarum I. 38
Asclepias III. 228, 229, 227
Ascyron 115, 116
Aspalathus III. 285
Asparagus II. 77
Asperugo I. 223
Alperula VII. 186, 187
Asphodelus II. 80
Asplenium III. 2, 3
Aster XIII. 396-398, 371,
 379, 387, 388, 395, 400,
 402
Asteriscus 387, 400
Astrocephalus V. 352, 353
Asteroides 396
Astraga-

INDEX.

- Astragalus* XIV. 259, 260.
 298
Astrantia I. 177. 179
Athamantha 183
Atocha 163
Atraglypis II. 362, 363
Atriplex VI. 18, 19, 20, 25
Avena X. 47, 48
Aurantium 113
Aurea malae 14
auricula muris 221, 275
 urſi 203
Axyris I. 26
Azedarach 161

B.
Balaustium 112
Balote I. 335. 329
Balsamine 209, 232
Balsamita 371, 389
Barba caprae 90
 Jovis 261
Barbarea 247, 253
Barbula hirci 418
Batella I. 198
*Bastard *In* ligo* 300
Beccabunga 235
Been 147
Belladonna I. 212
Bellidastrum II. 395
Bellis I. 395. 370, 392, 394
Berberis I. 171
Bermudiana II. 68
Berula 236
Beta II. 22

 Betonica IV. 330, 331. 338
Betula II. 10
Bidens V. 283, 284. 285
Bistorta II. 28
Blanchette Narboni. 5
Blattaria 217
Blitum 21, 23, 25, 211
Boerhaavia I. 352
Bona sylvestris 29
 vista 273
Borraginoides 225
Borrago 223-225
Bosea I. 14
Botrys 20
Bραχυτερονος 202
Brassica VI. 251, 252. 253
Breslinge 108
Bromus VI. 48, 49
Browallia I. 304
Brunella III. 325
Buglossoides 224
Buglossum V. 224, 225.
 221-223
Bugula IV. 316
Buphthalmum VII. 387-
 389. 98
Bupleurum III. 176
Bursa pastoris 345
Butomus I. 87
Buxus I. 13

C.
Caareo 299
Cacalia I. 381
Cacalianthemum 381

Cacalia-

INDEX.

- Cacaliastrum* 381
Cactus XI. 125, 126
Cakile 251
Calamintha 337, 339, 340
Calceolus I. 65
Calcitrapa VI. 365 - 367
Calendula IV. 394
Caltha 97, 394, 405
Camara 314
Camelina 240, 249
Campana 204
Campanula XII. 193 - 195.
 196, 205
Campoides 265
Canambaya 126
Canna 66
Cannabina 384
Cannabis I. 14. 314, 329, 330
Cannacorus II. 66
Capnoides 301
Capnos 02
Capparis I. 113
Capraria I. 237
Caprifolium VI. 191, 192
Capiscum VIII. 215, 216
Capuli 215
Caput gallinaceum 267
Caracalla 271
Cardamindum III. 167
Cardamine V. 252, 253
Cardiaca V. 325, 326
Cardinalis 197
Cardiospermum I. 167
Cardon 357
Carduus VIII. 358, 359, 356,
 360 - 363, 365, 366
Carex XXVI. 53 - 55. 56

Carlina II. 363
Carpinus I. 10
Carthamus I. 363
Carum I. 172
Caryophyllata IV. 104, 105
Caryophyilus 155, 156, 406
Cassava 36
Cassia V. 298, 299
Cassida VII. 317 - 319
Caltanea I. 10. 167
Catananche I. 421
Cataria VII. 337, 338, 333
Caucalis IX. 181, 182
Cauda muris 98
Cedronella 331
Celastrus II. 169
Celosia II. 24, 25
Celtis I. 14
Centaurea 363, 368, 369
Centaurium 201, 364
Centauroides 201
Cepa 84, 85
Cerasus II. 112
Ceratia 35
Ceratocarpus 27
Ceratonia I. 15
Ceratophyllum I. 41
Ceratospermum I. 27
Cerefolium 184
Cereus 125, 126
Cerinthe II. 220
Cervaria 178
Cervicaria 193
Chaerophyllum II. 183, 184
Chamaecerasus 191
Chamaelema II. 340

Chamae-

INDEX.

- Chamaecyparis* 374
Chamaedrys VIII. 314-316
Chamaegenista 286
Chamaelea I. 36
Chamaeleagnus 12
Chamaeleon 360, 361
Chamaelinum 147
Chamaemelum V. 391. 374,
 388, 393
Chamaemespilus 111
Chamaenerium 161, 162
Chamaepitys 316, 334
Chamomilla 393
Chara I. 38
Cheiranthus III. 255
Chelidonium I. 89. 99
Chenopodiummorosus 25
Chenopodium XIV. 20, 21. 22
Chondrilla II. 415. 413, 416,
 419, 421
Christophoriana I. 89
Xerousis 386
Chrysanthemum 375, 383-
 388, 392, 394
Chrysocome I. 380
Chrysosplenium I. 32
Cicer I. 297
Cicercula 289
Cichorium II. 423, 424, 385,
 412, 422
Cicuta I. 175. 174, 176
Cinara III. 357
Cineraria 401
Circaeа II. 185
Cirsium XIV. 359-362. 358
Cistus VI. 114, 115. 164
Citrus III. 113
Clematis III. 104. 210, 229
Clematitidis 210, 211
Cleome 257, 258
Clinopodium IV. 340, 341.
 324
Clutia I. 36
Clymenum 265, 288, 291,
 394
Clypeola I. 239
Cnicus I. 363. 370
Coccygria 169
Cochlearia III. 242
Cochleata 277, 278
Coffea I. 207
Coix 52
Colchicum I. 68
Colocasia 60
Colocynthis I. 209
Colutea III. 269. 268
Coma aurea 375
Comarum I. 105
Commelina III. 66
Consolida 92, 220, 404
Convolvulus IX. 204-206
Conyza 379-382, 387, 398
Conyzoides 371
Corallodendron I. 267
Cerchorus I. 117
Coreopsis II. 385, 386
Coriandrum II. 174
Corindum 167
Cotispermum I. 26
Cornus II. 190
Corona Imperialis 80
Solis 386, 387, 407
Coronil-

INDEX.

- C**oronilla VI. 268, 269
Coronopus I. 242, 198
Corrigiola I. 159
Corruda 77
Corylus I. 10
Cotinus I. 169
Cotonia 112
Cotula II. 374, 375, 391
Cotyledon V. 133, 132, 136
Cracca 294 - 296
Crambe I. 238
Craspula IV. 132
Cataegus 110, 111
Cataeogonium 100
Crepis IX. 410 - 413
Crista galli 312
Critchium I. 177
Crocus I. 68
Crotalaria I. 285
Crucifera 187, 188, 199
Cucubalus I. 147
Cucumis I. 209, 208, 210
Cucurbita I. 209
Cuminoides I. 352
Cuminum 352
Cunila IV. 334, 335
Cupressus I. 7
Cuscuta I. 198
Cyanus XII. 367 - 370, 364
Cydonia I. 112
Cymbalaria 305
Cynapium I. 174
Cynocrambe 37
Cynoglossoides 225
Cynoglossum IV. 222, 223
Cynolurus II. 51
Cyperoides 53, 54
Cyperus I. 55, 57
Cysticarpnos 302
Cytilus I. 285, 275, 283
- D.**
- D**amasonium I. 87, 64
Datura 206, 207
Daucus III. 183
Delphinium VII. 92 - 94
Dens canis I. 79
leonis 408, 423
Dentaria I. 251
Dictamnus I. 343, 91
Digitalis III. 309, 334
Dipsacus IV. 355
Dolichos IV. 272, 273
Doria 404
Doronicum I. 405
Dorycnium I. 262
Draba I. 241
Dracopephalon III. 334, 331
Draco herba 373
Dulcamara 212
- E.**
- E**bulus 191
Echinophora 181, 182
Echinopus III. 356
Echioides 224
Echium II. 219, 224
Echolium 309
Elera 170
Elaterium I. 210
- Elatine**

INDEX.

- Elatine* I. 160, 305, 306
Elichrysum 375 - 379
Elleborine 65
Elleborum 96, 97
Emerus 268
Empetrum I. 12
Endivia 424
Ephedra I. 6
Ephemerum I. 86
Epilobium V. 161, 162
Equisetum V. 5, 38, 41
Eruca I. 164
Erigeron VI. 379, 380, 411
Erinus II. 196
Erio ephalos I. 395, 360, 361
Eriophoros 420
Eruca 239, 241, 246, 247,
 249 - 251, 254
Erucago I. 239
Ervum I. 297, 267
Eryngium III. 185
Erysimum 248
Esula 4, 36
Evonymus I. 169
Eupatorium II. 380, 381,
 161, 379, 383
Euphorbium II. 32
Euphrasia I. 313, 310.

 F.

Faba I. 297
Fabago I. 145
Fagonia I. 146
Fagopyrum III. 29
Fagus I. 10

Falcaria 176
Falcata 275
Farfara 382
Ferrum equinum II. 265
Ferula I. 179
Festuca II. 49, 43, 52
Ficaria I. 99
Ficoidea II. 127
Ficoides 125, 127, 129, 131
Ficus II. 14, 126
Filago XV. 376 - 378
Filiocastrum I.
Filicula 2, 4
Filipendula III. 90
Filix I. 2, 1, 3, 4
Flammula 99, 104
Flos Africanus 406
 Armerius 155
 Constantinopolitanus
 153
 mirabilis 211
 passionis 210, 211
 quasimodogenitus 303
 Trinitatis 231
Foeniculum I. 172, 102, 173,
 177
Foenum graecum V. 274
Fontalis 28, 40
Fontinalis 39
Fraga 108
Fragaria I. 108
Frangula II. 13, 207
Fraxinella II. 91
Fraxinus I. 12
Fritillaria III. 79, 80

Fructus

I N D E X.

- Fructus Artischoki* 357
idaens 109
Frumentum Saracenicum 29
Frutex Aethiopiac &c. 36
Africanus &c. 190
peregrinus &c. 14
Fuinaria IX. 301 - 303

G.

- Galega* I. 268. 295
Galeopsis III. 329, 330. 326
Galium XVIII. 187 - 189. 186
Garidella I. 96
Garosmus 21
Gattaria 337
Gelsemium 204, 233
Genista VIII. 285-287. 261
Genistella 286
Gentiana VIII. 199 - 201
Gentianella 199, 200
Geranium XXXVIII. 137-145
Geum 136
Gingidium 181
Gladiolus I. 66. 87
Glans terrestris 261
Glastum. 220
Glaucom II. 89
Glaucoides 160
Glaux I. 203. 160, 259
Glycyrrhiza I. 267
Gnaphaliu[m] 12, 376 - 378
Gnaphalodes I. 12
Gomphrena I. 348
Gossypium I. 124

- Gramen alterum* 157
aureum I. 49
Parnassi 77
Granadilla 210
Gratiola I. 110
Grossularia 170, 171
Guajava I. 112
Guernseylily 69
Guettardia 222

H.

- Haemanthus* II. 86
Halicacabum 214
Halimus 19
Harmala I. 117
Hedera I. 170. 14, 340
Hedysarum IV. 266. 260,
 265, 269, 274
Helenia I. 407
Helenium 398, 399
Helianthemum 114, 115, 386
Helianthus III. 386, 387
Helichrysum 378, 390
Heliotropium III. 222,
Helleboraster 96
Heileborine V. 64, 65
Helleborus V. 96, 97. 98
Helminthotheca I. 413
Hemerocallis 79, 80
Hepatica 95, 99
Hepatorium 584
Herba amara 210
costa 420
Divi Stephani 185

Herba

I N D E X.

Herba Draco 373
Gattaria 337
Turca 30
Vulneraria 176
Hermannia I. 124
Hermodactylus 68
Herniaria II. 30, 31
Hesperis VIII. 255 - 257, 247,
 249, 254
Hibiscus VI. 117 - 119
Hieracioides 410 - 412
Hieracium XI. 408 - 410,
 411 - 414, 416, 419 - 421,
 423
Hier. apulum 411
Hippocastanum I. 167
Holostium 157, 159
Hordeum IV. 41, 42
Horminum 319 - 323
Hottonia I. 203
Hulgua 310
Hyacinthus IV. 76, 82
Hydrocharis I. 87
Hydrocotyle I. 171
Hydrolypnum 17
Hydropiper 29
Hyjucca 80
Hyoscyamus IV. 217, 218
Hyoseris I. 423
Hypecoum I. 229
Hypericum VIII. 115, 116
Hypochoeris III. 420, 421,
 422
Hypopitis I. 163
Hyssopifolia 160

Hyssopus I. 340, 114,
 159
Hysterophorus I. 11

 I.
Jacea 231, 364, 366 - 370
Jacobaea 401 - 405
Jacobaeastrum 403
Jalappa I. 211
jasione I. 196
Jasminoides 207
Jasminum IV. 233, 234,
 211
Jatropha I. 36
Iberis VI. 243, 244, 245
Illecebrum I. 31
Impatiens II. 232
Imperatoria I. 179
Indigo 300
Intubum 423
Intybus III. 419, 420
Jondraba 241
Jonthlaspi 239, 240
Irion 248, 250
Iris VI. 67, 68
Isatis III. 238
Isopyron 91, 97
Iva 316
Judaicae herbae species 317
Jujuba I. 13
Juncellus 56
Juncus X. 56, 57, 58, 59
Jungia 320
Juniperus III. 6

I N D E X.

K.

- Kali* 5, 21, 127
Ketmia 117 - 119
Kleinia V. 381, 382
Knautia I. 354
Knawel II. 32
Kværr 200

L.

- Labrum veneris* 355
Lacruma Jobi II. 52
Lactuca V. 415, 416, 414
Ladanum 330
Lagopus 283
Lamium III. 326, 311, 338
Lampsana III. 423, 251, 385
Lantana I. 314
Lapatwoides 18
Lapathum XIII. 16-18, 20
Lappa II. 357, 358. 11
Laferpitium III. 177
Lath. ris 33
Lathyrus XVII. 288 - 291.
 298
Lavatera 120
Lavendula V. 342
Laureola 166
Laurocerasus 112
Laurus II. 15, 12, 77, 78
Lens II. 297, 296
Lentibularia I. 305
Leatiscus I. 12
Leontodon 415

- Leonurus* II. 325
Lepidium II. 244, 245, 246
Lerchia II. 21, 22
Leucanthemon 393
Leucojum I. 69, 242, 254.
 257
Libanotis II. 81
Ligusticum II. 175
Ligultrum I. 233
Lilioasphodelus II. 80
Lilionarcissus IV. 69
Lilium III. 79, 80
Lilium convallium 77
Liinnopeuce I. 38
Limon 113
Limonium V. 348, 349
Liinosella I. 305
Linagrostis II. 56
Linaria 306 - 308, 380
Lingua cervina 2
Linum VII. 146, 147
Liquidambar I. 12
Lithonthlaspi 245
Lithospermum III. 221
Locusta 351
Lolium III. 42, 43
Lotus XI. 262 - 264. 13,
 281
Luffa II. 209
Lunaria III. 247, 275
Lupinaster 284
Lupinus V. 270, 257
Lupulinum 281
Lupulus I. 14
Luteola I. 94

Lychins

I N D E X.

- Lychnis* V. 147 - 152, 153
 154, 155, 204
Lychniscabiosa 354
Lycium II. 207, 169
Lycocotonum 94
Lycopersicon 213, 214
Lycopsis III. 224
Lycopus I. 345
Lysimachia V. 201, 202, 160,
 162
- M.
- Majanthemum* 77
Majorana I. 343
Mala insana 214
Malva XV. 120 - 122, 119, 123
Malvinda 123
Malus I. 111, 113, 127
Mariscus I. 57
Marrubiastrum 334, 335
Marrubium V. 335, 336, 345
Martagon 79
Marram 314, 343
Matricaria VII. 392, 393
Maurocena I. 207
Mays II. 52
Medica 275 - 279
Medicago XXV. 275 - 279
Melampyrum V. 312, 313
Melanthium 95, 96
Melanzana 214
Melia I. 161
Melianthus II. 229
Melilotus VIII. 280, 281, 263,
 274, 275
- Melissa* VI. 338, 339
Melo II. 208
Melocactus 125
Melongena 214
Melothria 208
Menispernum I. 14
Menoanthes I. 204
Mentha VII. 343, 344
Menthastrum 324, 344
Mercurialis III. 37
Mesembryanthemum XXVII.
 127 - 131
- Mespilus* 111
Meum I. 176
Miliuin IV. 46
Millefolium 40, 389, 390
Mimosa V. 299, 300
Moldavica VII. 331 - 333
Mollugo 189
Molon 90
Molucca 339
Moly 82 - 85
Momordica II. 209
Monarda II. 324
Monorchis 63
Montia I. 304
Morsus diaboli 354
Morus II. 14
Moschatellina I. 163
Musa I. 60
Muscaria 76
Myagrion 240
Myagrum III. 239, 238, 240,
 249
- Myosotis* VI. 156, 157, 222,
 236
- E e 2
- Myosotis

INDEX.

- Myosurus* I. 98
Myrica II. 12. 169
Myrsophyllum 40, 203
Myrrhis V. 184, 185. 175,
 182
Myrtillus 164
Myrtus II. 110

 N.
Napea I. 124
Napellus 92
Napus 251
Narcissolencejkum 69
Narcissus III. 69
Nardus I. 41
Nasturtium IX. 244, 245,
 16-, 238, 246, 252
Nepeta 337
Nerium II. 229
Nicotiana VI. 218, 219
Nigella V. 95, 96
Nigellastrum 96, 153
Nissolia 291
Nobile millefolium 390
Noli me tangere 232
Nummularia 202
Nux metella 206
Nystanthes I. 233
Nymphaea II. 87

 O.
Obeliscorheca 386
Ochna 288
- Ocymastrum* I. 19, 153, 154
Ocymoides 148, 153, 154
Odontites II. 313
Odorata 185
Oenanthe IV. 173, 174,
 172
Olea I. 233
Oliva 233
Omphalodes II. 223
Onagra IV. 162
Onobrychis II. 266, 267
Ononis 284
Onopordon IV. 356, 357
Oreselinum 184
Ophioglossum I. 1
Ophioscorodon 86
Ophrys II. 65
Opulus I. 190
Opuntia 126
Orchis XV. 61 - 64. 65
Oreoselinum 178
Origanum II. 342, 343. 324
Ornithogalum III. 81, 82
Ornithopodium IV. 264
Orobanche I. 305
Orobanchoides 163
Orobus III. 297, 298
Osmunda III. 1
Osteospermum II. 394
Othonna 406
Otites 151
Oxalis 145
Oxyacantha 171
Oxycoccum I. 163
Oxys IV. 145

Padus

INDEX.

P.

- Fadus* II. 112
Paeonia I. 91
Palma I. 60
Panicum V. 51
Pannonica 62
Papas Peruanorum 214
Papaver VI. 88. 89
Paralysis 202
Parietaria II. 27
Paris I. 163
Parkinsonia I. 300
Parnassia I. 95
Paronychia 31, 137
Passiflora V. 210, 211
Pastinaca I. 180
Pastoria bursa 244
Pecten veneris 185
Pedicularis II. 312
Peireskia I. 127
Pelecinus I. 260
Pentagonion 195
Pentaphylloides 105, 106, 108
Pentaphyllum 105 - 107
Pentapteris II. 40
Peplis I. 160. 35
Perchevier 31
Perfoliata 176
Periclymenum 191, 192
Periploca I. 225
Perpusillum 99
Perfica I. 113
Perficaria VII. 28, 29
Pervinca II. 229
Petasites III. 382

- Petiveria* I. 258
Peucedanum II. 178
Phalangium VI. 80, 81. 85
Phalaes II. 51
Phaseolus V. 270, 271, 272,
 273
Phellandrium I. 174
Philadelphus 114
Phlomis III. 328, 329
Phragmites 46
Phu 350
Phylica I. 36
Phyllanthos 126
Phyllis I. 171
Phyllitis 3
Phyllum 37
Phytenoides 237
Phytolacca II. 211, 212
Picris I. 413
Pilosella 254, 408
Pimpinella V. 197. 173
Pinus III. 6, 7
Piper 215, 216
Piperella 314
Pirola IV. 165, 166
Pirus III. 111
Pistolechia 166
Pisum II. 287, 288. 294
Pittonia 225
Planta anatis 133
 Equisetorum 38
Plantaginella 305
Plantago 87, 198, 199
Platanus 167
Plumbago I. 204
Poa XIX. 44-46

INDEX.

Podagraria I. 172
Polemonium I. 207
Polygonum 314, 374
Polyacanthos 61
Polyanthes II. 76
Polygala II. 203, 264, 268
Polygonatum IV. 77
Polygonisfolia 159
Polygonum II. 30, 31, 32,
158, 159
Polyodium X. 3, 4, 2
Polytrichum 2
Poyna amoris 214
Populago I. 97
Populus III. 9
Porram 84, 85
Portulaca I. 125, 19
Potamogeton IX. 39, 40, 28
Potentilla XV. 105 - 108
Poterium 191
Prasium I. 338
Prenanthes I. 414
Primula IV. 202, 203
Provenzalia 59
Prunus II. 112
Pseadoacacia I. 269
Pseadoambrosia 242
Pseriocapsicum 213
Pseudodictamnus 336
Pseudofumaria 301, 302
Pseudohelleborus 97
Pseudoiris 67
Pseudeleimodoron 65
Pseudoligustrum 112
Pseudolysimachium 161
Pseudomarrubium 345

Pseudomarum 314
Pseudomelissa 331
Pseudorchis 64
Pseudorubia 187
Pseudostachys ; 28
Psoralea I. 261
Psyllium XI. 198, 199
Ptaemica 383, 389, 393
Pulegium I. 345
Pulicaria 398
Pulmonaria I. 220, 410
Pulsatilla 103
Punica I. 112
Pycnocarpos 181
Pyrethrum III. 393, 389

Q.

Quamoclit II. 204
Quercus I. 10
Quinquefolium 107

R.

Radiola - 147
Radix rhodia 134
Ranae morsus 87
Ranunculoides 102
Ranunculus XV. 99-102, 97,
103
Rapistrum I. 238, 239, 246
Rapum II. 252, 194
Rapunculus II. 195, 194
Rapantium I. 197, 195, 196
Reseda III. 94, 95
Resta bovis 284

Rhabarba-

INDEX.

Rhabarbarum 15, 17
Rhaadioloides 422
Rhagadiolus IV. 421, 422
Rhamnus II. 13, 207
Rhaphanistrum 251
Raphanus III. 251, 246
Rhaponticum VII. 363-365.
 15
Rheum II. 15
Rhododendron 229
Rhus II. 169, 170
Ribes IV. 170, 171
Ricinus II. 37
Robinia 269
Rorella II. 147
Rosa IV. 109, 110, 199, 238
Rosmarinus I. 323
Ros solis 147
Rubectota 186, 187
Rubia I. 190, 186, 188, 189
Rubus III. 109
Rudbekia II. 386
Ruellia II. 304
Ruscus III. 77, 78
Ruta I. 162, 3, 311

S.

Sabina 6
Sagitta 87
Sagittaria I. 87
Salicaria II. 160
Salicornia I. 5
Salix IX. 8, 9
Salsifora 147
Salsola I. 22

Salvia XVII. 319-323, 328
Sambucus III. 191, 190
Samolus I. 197
Sanguisorba 197
Sanicula I. 183, 136
Santolina VII. 374, 375
Saponaria VI. 154, 155
Satureja I. 340
Satyrion 62
Saururus I. 7
Saxifraga 173
Saxifragia VII. 135-137, 159
Scabiosa I. 353, 352, 354,
 356, 367
Scammoneum 205, 225
Scandix I. 185
Schoenolaguros 56
Schoenus II. 57, 56
Scirpus V. 56
Sclarea 320, 322
Scolymus I. 424, 357
Scordium 315
Scorpioides V. 265, 264
Scorpiurus II. 221
Scorzonera VII. 416, 417,
 418
Scorzoneroidea 416
Scrophularia VIII. 310, 311
Scutellaria 317
Securidaca I. 269, 260, 274
Sedum XIV. 133-135
Selinum V. 178, 179
Sempervivum 133, 135
Senecio XXI. 401-405, 364,
 379-381

INDEX.

- Senna* 298, 299
Serpentaria 7
Serpillum 341
Serratula 258, 362, 364
Seseli I. 172, 173, 177
Sherardia 186
Sicyoides I. 208
Sideritis 311, 325, 327, 330,
335
Siegesbeckia I. 385
Siler 171, 178
Siliquastrum I. 298
Silybum I. 362
Simpla nobla 171
Sinapi Vlll. 249, 250, 239,
248
Sinapistrum III. 257, 258
Sisarum 176
Sison I. 175
Sisymbrium XIv. 246-249.
252
Sisyrinchium 68
Sium V. 175, 176, 252, 253
Smilax II. 78, 79, 205
Smyrnium I. 172
Solanum Xlll. 212-214, 206,
215
Solidago X. 399, 400, 404
Sonchus V. 414, 413, 419,
420
Sophora I. 267
Sorbus V. 110, 111
Sparganium I. 59
Spartium 261, 285
Spergula 146, 154, 159
Sphaerocephalus 356
- Sphondylium* II. 180
Spina *alba* 111
alba putata 356
Solstitialis 366
Spinacia III. 22, 25
Spiraea I. 91
Squamaria I. 305
Stachys VIII. 327, 328, 334
Stapelia II. 227, 228
Staphisagria 93
Staphylinus 183
Staphylocereus 169
Statice 348, 349
Stellaria III. 39, 31
Stoebe 365, 369
Stoechas 342, 376, 377
Stramonium V. 206, 207
Stratiotes 390
Sruthiopteris II. 1, 2
Styrax 12
Succisa III. 354
Sumach 169
Symphytum I. 220, 154, 223
Syringa II. 233, 114
- T.
- Tagetes* II. 405
Tamariscus I. 169
Tanacetum IV. 393
Taraxacum II. 408
Taxus I. 6
Telephium I. 171, 133, 143,
145
Terrae glandes 291

Testiculi

INDEX.

- Testiculi* 62
Tetragonocarpus II. 113,
114
Tetralix I. 164
Tenuarium 315, 338
Thalictrum IV. 90, 91
Thamnæcnon 154
Thelygonum I. 38
Thelypteris 4
Thesium I. 31
Thlaspi 240-244
Thlaspidium II. 241, 242, 243
Thuya II. 7
Thymelaea II. 166
Thymus III. 341
Thyselimum 178
Tilia I. 113
Timothygrass 50
Tinus I. 191
Tithymalus XIX. 33-36, 32
Trachelium I. 197
Tragodes 116
Tragopogon VII. 417-419.
411, 416
Tragoselinum III. 173
Tragum 6, 22
Treilly arbor 110
Tribulus aquaticus I. 171
terrestris I. 146
Trichomanes 2
Triclis II. 25, 26
Tricolor 23
Trifolia arbor 235
Trifolium XVI. 281-284, 99,
146, 234, 261, 275, 278,
280
Triglochin II. 59
Trigonella 280
Triniciatella 413
Trinitas I. 99
Triorchis 62
Tripolium 397
Triticum XI. 43, 44.
Tuberosa 76
Tulipifera I. 98
Tuna 126
Tunica X. 155, 156
Turritis IV. 253, 249, 254
Tussilago 382
Typha I. 59
Typhoides IV. 50
- V.
- Vaccinium* III. 163
Valeriana VI. 349, 350, 197,
207, 351, 381
Valerianella VI. 350, 351,
171, 352
Vella I. 238
Veratrum I. 87, 97
Verbascum 370
Verbascum VII. 216, 217
Verbena VII. 345-347
Verbenaca 345
Verbesina I. 384
Veronica XIX. 234-237, 305
Vesicaria 167
Viburnum I. 191
Vicia XXIV. 291-296, 259
Victoria 66
Vielgutta 178

INDEX.

- Vincetoxicum* 228
Viola VIII. 230, 231. 293,
 195, 256
Virola aurea 380, 399
pastoris 355
Viscago XXI. 147-152
Viscaria 148
Viscum I. 12
Vitex I. 314
Vitis II. 170. 163
Ulmaria 90
Ulmus I. 14
Umbellifera 179
Unifolium I. 77
Volubilis 205
Urtica VI. 27. 326
Utrinque serrata 260
Uva marina 6
spina. 170
- Uva versicolor* 163
urfi 164
Vulneraria V. 261
- X.
- Xanthium* II. 11
Xeranthemum I. 383
Xylosteum 191
Xyris 68
- Y.
- Yucca* I. 80
- Z.
- Zacintha* 422
Zanichellia I. 38
Ziziphora II. 324
Ziziphus 13





