

本草備要

卷三
木部

本草備要

木部目錄

茯苓

茯神

琥珀

松節

柏子仁

側柏葉

肉桂

桂枝

枸杞子

地骨皮

山茱萸

酸棗仁

杜仲

女貞子

楮實

桑白皮

桑寄生

梔子

豬苓

黃藥

枳實枳殼

厚朴

檳榔

大腹皮

槐實

苦棟子

蔓荆子

石楠葉

辛夷

郁李仁

金櫻子

訶子

烏藥

五加皮

椿樗白皮

榆白皮

秦皮

海桐皮

蕤仁

密蒙花

芙蓉花

山茶花

木槿

杉木

烏臼木

水楊柳

阜莢

肥阜筍

櫻櫚

茶

吳茱萸

川椒

胡椒

蘇木

沈香

檀香

紫檀

降真香

丁香

乳香

沒藥

楓脂香

冰片

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

麝會

胡桐淚

燕夷

沒石子

衛矛

漆

巴豆

大風子

荆添

竹添

竹茹

淡竹葉

天竹黃

雷丸

赤檉柳

肉桂

卦莖

麻油子

柏脂

太白日光

柏脂

柏脂

本草綱目

本草綱目

薄荷

輕宣散風熱

辛能散涼能清

本經溫益體
溫而用涼也

升浮能發汗搜肝氣而抑肺盛

消散風熱清利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口氣語濇

舌胎

含眼耳咽喉口齒諸病

辛香通竅而散風熱

皮膚癰疹瘻瘍瘡疥

驚熱

凡小兒治驚藥
俱宜薄荷湯調

骨蒸破血止痢

能治血痢血痢病在虛

人不宜多服

能發汗疎表夏月
多服泄人元氣

蘇產氣芳者良

薄荷猶之酒也

之酒也 蟦蚣雞之酒也 桑椹鳩之酒也 莽草魚之酒也 食之皆醉被猫傷者薄荷汁塗之

雞蘇

一名水蘇

一名龍腦薄荷輕宣散熱理血

辛而微溫清肺下氣理血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血

痢吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病

局方有龍腦雞蘇丸

方壅中虛似

蘇葉而微長密齒面皺氣甚辛烈

木賊 輕發汗退目翳

溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形性亦能發汗解肌升散火鬱風溼入足厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜翳乃肝不能上通於目邪鬱退及疝痛脫肛腸風痔瘻赤痢崩中諸血病

浮萍

輕發汗利溼

辛散輕浮入肺經達皮膚能發揚邪汗

丹溪曰浮萍發汗甚於麻黃

止癰

癩消渴

搗汁服

生於水又能下水氣利小便治一切風溼癓瘻

浮萍一味蜜丸酒服治三十六種風濃煮汁浴治惡疾瘡癩偏身

燒烟辟蚊

紫背者良

蒼耳子

一名菜耳卽詩卷耳輕發汗散風溼

甘苦性溫善發汗散風溼上通腦頂下行足膝外達皮膚治

頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣痺痛瘰癧瘡疥采根葉熬萬應膏偏身瘡

癩

作浴湯佳

去刺酒拌蒸忌豬肉

聖惠方云葉搗汁治產後痢

天麻

宣祛風

辛溫入肝經氣分益氣強陰通血脈強筋力疎痰氣治諸風

眩掉頭旋眼黑語言不遂風溼癪

音頑

癥小兒驚癇

諸風眩掉皆屬肝木

肝病不能榮筋故見前證天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸疾自瘳

血液衰少及類中風者

忌用

風藥能燥血故也昂按風藥中須兼養血藥制其燥也養血藥或兼搜風藥宣其滯也古云治風先治血血行

風自滅

根類黃瓜莖名赤箭有風不動撫風反搖一名定風

草明亮堅實者佳溼紙包煨熟切片酒浸一宿焙用

秦艽

宣去寒溼

苦燥溼辛散風去腸胃之熱益肝膽之氣養血榮筋

風藥中潤劑散

藥中補劑

治風寒溼痹

經曰風寒溼三氣雜至合而爲痹風勝爲

行痹寒勝爲痛痹溼勝爲著痹痹在於骨

則體重在脈則血滯在筋則拘攣在內則不仁在皮則寒

通身攣急

血不榮筋虛勞骨蒸

時珍曰手足陽明經藥兼入肝膽陽明有溼則手足痠痛寒熱有熱則

拘攣在內則不仁在皮則寒

通身攣急

血不榮筋虛勞骨蒸

日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦艽柴胡各一兩甘草

五錢爲末每服三錢治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦

艽炙甘草各一兩每服一二錢錢乙加薄荷五錢

疽黃酒

齒下齦屬手陽明大腸經張潔古

毒腸風瀉血口噤牙痛

日秦艽能去下牙痛及本經風溼溼

牙痛

牛乳點服兼治

勝風淫之證利大小便

黃疸煩渴便赤

形作羅紋相交長

大黃白芍散

良菖蒲爲使畏牛乳

豨莶草

宣去風溼

苦辛生寒熟溫治肝腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛腰膝無力

風溼瘡瘍若痺痛由脾腎兩虛陰血不足不由風溼而得者

忌服

風藥能燥血

江東人呼豬爲豨其草似豬薑臭故名

唐成詒有

進豨薑表宋張詠進豨薑表云其草金稜銀線素莖紫葉對

節而生頗同蒼耳臣喫百服眼目清明卽至千服鬚髮烏黑

筋力輕健效驗多端

以五月五日六月六日七月七日九月九日採者

尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸曬九次蜜丸甚益元氣

豨薑

辛苦氣寒故必蒸曬九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁未盡則不能透骨搜風而卻病

也搗汁熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三味收之酒調服尤

妙

威靈仙

宣行氣祛風

辛泄氣鹹泄水本草苦元素甘氣溫屬木其性善走能宣疏五臟通

行十二經絡治中風痛風頭風頑痺

溼熱流於肢節之間腫屬溼痛屬熱汗多屬風

麻屬氣虛木屬溼痰死血十指麻木亦是胃中有溼痰死血

脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬寒宜辛溫藥久痛屬

熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰搜風散溼養血去瘀爲要威靈仙傳曰一人手足不

遂數十年遇新羅僧曰得一藥可治

入山求之乃威靈仙也服之而愈

癰痕積聚痰水宿膿黃

疽浮腫大小腸秘風溼痰氣一切冷痛性極快利積疴不痊

者服之有捷效然疏泄真氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎治

諸骨哽 根叢鬚數百條長者二尺餘色深黑俗名鐵腳威

靈仙忌茗麪湯

釣藤鉤宣除風熱定驚

甘微苦寒除心熱平肝風治大人頭旋目眩小兒驚啼癇癓

音熾縱筋急而縮爲癇筋緩而弛爲癓伸縮不已爲癇癓俗謂之搐搦是也

客忤胎風發斑疹主

肝風相火之病風靜火息則諸證自除

相火散行於膽三焦心包

有刺

類釣鉤藤細多鉤者良

純用鉤其功加倍

久煎則無力

茵芋

宣去風溼

辛苦微溫有小毒治風溼拘攣痺痛

時珍曰古方治風癘有茵芋膏風溼諸證多用之茵芋石南莽草皆

酒治產後風有茵芋膏風溼諸證多用之茵芋石南莽草皆

治風妙品近世罕知莽草辛溼有毒治頭風癰腫乳癰痘瘡蘇頌曰古方風溼諸酒多用之今人取葉煎湯熱含治牙蟲喉瘻甚效甄權曰不入湯

莖赤葉如石

榴而短厚莖炙用

當歸

補血潤燥滑腸

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒

諸血屬心凡通脈者必先補心當歸苦溫

助入心肝脾

心生血肝藏
血脾統血

爲血中之氣藥治虛勞寒熱欬逆

上氣

血和則氣降

溫瘧

厥陰肝邪

澼痢

便血曰澼

頭痛腰痛心腹諸痛

散寒和氣

風痙無汗

痙音擎上聲身強項直角弓反張曰痙無汗爲剛

筋也宜十全大補湯

筋骨緩縱足不任地曰痿風

而聚散無常曰瘕尙未至瘕也

寒溼客於肌肉血脉曰痹血

癰疽瘡瘍衝脈爲病氣逆裏

急帶脈爲病

腹痛腰溶溶如坐水中

衝脈起於腎下出於氣街挾臍上行至胸中上

頤額滲諸陽灌諸經二經脈之海主血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈

及婦人

諸不足一切血證陰虛而陽無所附者

潤腸胃澤皮膚養血

生肌

血旺則肉長

排膿止痛

血和則痛止然滑大腸瀉者忌用

君白芍

內長

排膿止痛

血和則痛止

然滑大腸瀉者忌用

當歸爲君白芍

爲臣地黃爲佐芎藾爲使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃耆血熱佐以條芩梔連血積佐以大黃牽牛昂按血屬陰四物能養陰陰得其養則血自生非四物能生血也若氣虛血弱之人當用人參取陽旺生陰血之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者使氣血各有所歸故名

血滯能通血虛能補血枯能潤血亂能撫

蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而不流全活血而不走雷敷海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾通治全用一定之理也川產力剛善攻秦產

力柔善補以秦產頭圓尾多肥潤氣香者良名馬尾當歸尾粗堅枯者名鑑頭當歸只宜發散用治血酒製有瘀薑製

按當歸非治痰藥昂薑製亦臆說耳畏菖蒲海藻生薑惡溼麪

菖蒲補血潤燥宣行氣搜風

辛溫升浮爲少陽引經膽入手足厥陰氣分肝乃血中氣

藥助清陽而開諸鬱

丹溪曰氣升則鬱自降爲通陰陽血氣之使

潤肝燥而補肝

虛

肝以瀉爲補所以散之辛以補之

上行頭目下行血海

衝脈搜風散瘀止

痛調經治風溼在頭血虛頭痛

能引血下行頭痛必用之加各引經藥太陽羌活陽明白

芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛

腹痛脇風氣鬱血鬱

溼瀉血痢寒痺筋攣目淚多涕

肝熱風木爲病諸風眩掉皆屬肝木及癰

疽瘡瘍

癰從六腑生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣爲陽血爲陰血行脈中氣行脈外相並周流寒溼搏之則

凝滯而行遲爲不及火熱搏之則沸騰而行速爲太過氣鬱邪入血中爲陰滯於陽血鬱邪入氣中爲陽滯於陰致生惡毒然百病皆由此起也芎歸能和血行氣而通陰陽男婦一切血證然香竄辛散能走

泄真氣單服久服令人暴亡

單服則臟有偏勝久服則過劑生邪故有此失若有配合節制

則不至此矣昂按芍地酸寒爲陰芎歸辛溫爲陽故四物取其相濟以行血藥之滯耳川芎辛散豈能生血者乎治法云

驗胎法婦人過經三月用川芎末空心熱湯 調一匙服腹中微動者是胎不動者是經閉

蜀產爲川芎

秦產爲西芎江南爲撫芎以川產大塊裏白不油辛甘者勝

白芷爲使畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸

白芍 補血瀉肝濬斂陰

苦酸微寒入肝脾血分爲手足太陰行經藥

肺瀉肝火

酸斂

以斂爲瀉 以散爲補 安肺肺固腠理

肺主皮毛

脾主肌肉

肝木不尅土

則脾安土

旺能生金

則肺安脾

和肺安則腠理固矣

和血脈收陰氣斂逆氣

酸主收斂

散惡血利小便

斂陰

小便自利非

緩中止痛

東垣曰

經曰損其肝

通行之謂也 緩其中卽調血也 益氣除煩斂汗

安胎補勞退熱治瀉痢後重

東垣曰

能

除胃

脾虛腹痛

瀉痢俱太陰

病不可缺此

寒瀉冷痛忌用

虞大民曰白芍

不惟治血虛

大能行氣古方

治腹痛用白芍四錢甘草二錢

名芍藥甘草湯

蓋腹痛因營

治腹痛用白芍四錢甘草二錢

名芍藥甘草湯

蓋腹痛因營

寒瀉冷痛忌用

虞大民曰白芍

不惟治血虛

大能行氣古方

治腹痛用白芍四錢甘草二錢

名芍藥甘草湯

蓋腹痛因營

寒瀉冷痛忌用

虞大民曰白芍

不惟治血虛

大能行氣古方

治腹痛用白芍四錢甘草二錢

名芍藥甘草湯

蓋腹痛因營

氣不從逆於肉裏白芍能行營氣甘草能斂逆氣又痛爲肝木尅脾土白芍能伐肝故也○天民又曰白芍止治血虛腹

痛餘不治以其酸寒

腸者肝膽二經往來之道其收斂無溫散之功也

心痞脇痛

火上冲則胃脘痛橫行則兩

脇痛白芍能

理中瀉肝

肺脹喘噫

同癰腫瘕瘕其收降之體又能入血

海

衝脈爲血海

男女皆有之而至厥陰

肝治鼻衄

鼻血曰衄

音女六切曰濱肝血不

足

退火益陰肝血自足婦人胎產及一切血病又曰產後忌用

丹溪曰以其酸

寒伐生發之氣也必不得已酒炒用之可耳時珍曰產後肝血已虛不可更瀉也寇氏曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥

古人猶諄諄告戒况大苦大寒可肆行而莫之忌耶○同白朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芍藥瀉肝同甘草止腹

痛同黃連止瀉痢同防風

發痘證同薑棗溫經散溼

赤芍藥主治略同尤能瀉肝火

散惡血治腹痛堅積血癥瘕瘕

那聚外腎爲經閉腸風癰腫瘤腹內爲瘕經閉腸風癰腫

目赤皆散瀉白補而收赤散而瀉白益脾能於土中瀉水赤

散邪能行血中之滯產後俱忌用 赤白各隨花色單瓣者

入藥酒炒用制其寒婦人血分醋炒下瘀後重不炒惡芒硝石

寒

斛畏鱉甲小薊反藜蘆

生地黃

大瀉火

甘苦大寒入心腎瀉丙火

小腸爲丙火心與小腸相表裏導赤散與木通同用

清燥金

胃大腸火消瘀通經平諸血逆治吐衄崩中

唾血者血隨唾出咯血者隨痰喀出或帶

血絲出腎經及肺經自兩脇逆上吐出者屬肝經衄血者血溢於腦從鼻而出欬血者欬出痰內有血並屬肺經吐出嘔出成盆成碗者屬胃經漏不止曰崩血熱則妄行宜以此涼之虛人忌用用乾地黃可也

傷寒陽強痘

證大熱痘證用之甚

本草未載

多服損胃 生掘鮮者搗汁飲之或用

酒製則不傷胃生則寒乾則涼熟則溫

故分爲三條以便施用

乾地黃 補陰涼血

甘苦而寒沉陰而降入手足少陰心包及手太陽經

腎厥陰心包肝

及手太陽經

小滋陰退陽生血涼血治血虛發熱

經曰陰虛生內熱

勞傷欬嗽

欬嗽

陰虛者地黃丸爲要藥亦能除痰丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除

痰癆驚悸

有觸而心動曰驚無驚而自動曰悸卽怔忡也有因心虛火動者有因肝虛膽怯者有因水停心下者火畏水故悸

也地黃能交心腎而益肝膽亦能行水故治之吐衄尿血

痛爲血淋不痛爲尿血由心腎氣結或憂思房勞所致多屬虛寒不可專作熱治

血運崩中

經曰陰虛陽搏謂之崩

足下熱痛折跌絕筋

生地一斤瓜薑糟一斤生薑四兩炒熟罨傷折處冷則易之又生地汁三升酒升半煮服下撲損瘀血

填骨髓

長肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹急痛

海上方

麵作餅飪食能利出蟲忌用鹽本草匯曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性凝滯若胃虛氣弱

之人過服歸地等劑反致痞悶飲食減少變證百出至死不悟豈不惜哉大抵血虛固不可專補其氣而氣虛亦不可徒補其血也凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛以四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯江浙生者南

方陽氣力微北方生者純陰力大以懷慶肥大菊花心者良酒製則上行外行薑製則不泥膈惡貝母畏蕪荑忌萊菔蘿蔔蒜銅鐵器得酒門冬丹皮當歸良

熟地黃

平補肝腎養血滋陰

甘而微溫入手足少陰厥陰經滋腎水補眞陰填骨髓生精血聰耳明目耳爲腎竅目爲肝竅目得血而能視耳得血而能聰黑髮烏髭治勞傷風

癥胎產百病爲補血之上劑

丹溪曰產前當清熱養血爲主產後宜大補氣血爲主雖有雜論後人不善用之多有風寒未解瘀血未盡妄施峻補反致

證從末治之昂接丹溪產後大補氣血一語誠至當不易之論後人不善用之多有風寒未解瘀血未盡妄施峻補反致

證從末治之昂接丹溪產後大補氣血一語誠至當不易之論後人不善用之多有風寒未解瘀血未盡妄施峻補反致

大害者不可不察王碩云男子多

以好酒拌砂仁末浸蒸

陰虛宜熟地女子多血熱宜生

地黃性寒得酒與火與日則溫性泥得砂仁則和

曬九次用

地黃性寒得酒與火與日則溫性泥得砂仁則和氣且能引入丹田六味丸用之爲君尺脈弱者加桂附所謂益火之原以消陰翳也尺脈旺者加知藥所謂壯水之主以制陽光也

何首烏

平補肝腎滌精

苦堅腎溫補肝甘益血滌收斂精氣添精益髓養血祛風

先治血血

活則風散強筋骨烏鬚髮

故名首烏

令人有子爲滋補良藥氣血

太和則勞瘦風虛崩帶瘡痔癰癧腫脹諸病自己

營血調則

者外爲

呼

止惡瘧

益陰補肝瘧珍曰不寒不疾要藥而本草不言治瘧時燥功在地黃天冬諸藥之上

二種夜則籐交一名交籐有陰陽交合之象赤雄

人氣分以大如拳五瓣者良三百年者大如栲

桃服之成地仙凡使赤白各半
泔浸竹刀刮皮切片用黑豆

與首烏拌勻鋪柳餌入砂鍋九蒸九曬用茯苓爲使忌諸血

無鱗魚萊菔蔥蒜鐵器

唐時有秀能嗣

何首烏者祖名能嗣父名延

五十八尙無妻子服此藥七

日而思人道娶妻連生數子延

服之壽百三十歲髮猶烏黑李

翹爲立何首烏傳然流傳雖

久服者尙少嘉靖初方士邵

應節進七寶美髯丹世宗服

之連生皇子遂盛行於世方用

赤白首烏各一斤黑豆拌九

蒸曬茯苓半斤乳拌當歸枸杞

菟絲各半斤俱酒浸牛膝半

斤酒浸同首烏第七次蒸至第九次破故紙四兩黑脂麻炒

蜜丸並忌鐵器昂接地黃何首烏皆君藥也故六味丸以地

黃爲君七寶丹以何首烏爲君各有配合未可同類而共施

也卽有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏

加入地黃丸中合兩方而爲一方是一藥二君安所適從乎

失製方之

本義也

牡丹皮

瀉伏火而補血

辛甘微寒入手足少陰心厥陰心包

腎

瀉血中伏火

色丹故入

血分時珍

曰伏火卽陰火也陰火卽相火也世人專以黃蘖治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸用之和血涼血

而生血

血熱則枯

破積血

積瘀不去則

新血不生通經脈爲吐衄必用

之藥

血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅

治中風五勞驚癇癰癧

筋脈伸縮

瘻或手足抽掣口眼喎斜卒然眩仆吐涎身軟時發

時止爲癇皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致除煩熱

療癰瘍

涼血下胞胎退無汗之骨蒸

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨

蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精爲志故腎藏志火之精

爲神故

心藏神

單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母菟

絲大黃忌蒜胡荽伏硫

時珍曰花白者補赤者

利人所罕悟宜分別之

苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脉而理筋骨主傷中補不足

經疏云味甘故然

暖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎漏

懷妊瀝血

崩帶遺

精腸風血痢

是齋方平胃散一兩川續斷半每服二錢米飲下治時痢亦驗

癰痔腫毒又

主金瘡折跌

以功命名

止痛生肌女科外科需爲上劑

川產良

狀如雞腳皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃爲

便

骨碎補

補腎治折傷

苦溫補腎故治耳鳴

耳鳴必由腎虛

及腎虛久瀉

研末入豬腎煨熟空心食之腎主二便久瀉多屬腎虛

不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

以功命名粥和薄傷處

前陰利水後陰利穀

牙痛

炒黑爲末擦牙嚥下亦良

又入厥陰心包

能破血止血

入血

行傷故治折傷
粥和末裹傷處

根似薑而扁長去毛用或蜜拌蒸

益母草

一名茺蔚通行瘀血生新血

辛微苦寒入手足厥陰心包

消水行血去瘀生新調經解毒

瘀血去

則經調

治血風血運血痛血淋胎痛產難崩中帶下

帶脈橫於腰間

病生於此故名爲帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升降血虛者養血滋陰而兼調氣爲經產良藥

消疗腫乳癰

亦取其散瘀解毒

通大小便然辛散之藥瞳子散大者

忌服 益母子主治略同調經益精明目

血滯病目者則宜之

活血順

氣逐風

氣行則血行 血活則風散

行中有補治心煩頭痛

血虛血熱之候

胎產帶

崩令人有子

有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血

分風熱明目調經用子爲良蓋根莖花葉專於行子則行中
有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖

葉花實爲末蜜丸治胎產百病近效方搗汁熬膏亦良

忌鐵子微炒用

澤蘭通行血消水

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰

脾肝通九竅利

關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫

防已治

產後血瀝腰痛

瘀行未盡

吐血鼻血目痛頭風癰毒撲損補而不

滯行而不峻爲女科要藥

古方澤蘭九甚多

時珍曰蘭草澤蘭一

類二種俱生下溼紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但

以莖圓節長葉光有歧者爲蘭草莖微方節短葉有毛者爲

澤蘭嫩時並可採音那而佩之楚詞所謂紉秋蘭以爲佩是也

朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥溼不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩

吳人呼

爲香草俗名孩兒菊

夏曰采置髮中則髮不臚浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭

蘭草走氣

分故能利水道除痰癖殺蟲辟惡而爲消渴良藥

經曰數食肥甘傳爲

消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能消水腫塗癰毒破瘀除癥而

爲婦人要藥以爲今之山蘭者誤矣防已爲使

寇宗奭朱丹溪並以蘭草

爲山蘭之葉李時珍考衆說以譏之按別本云蘭葉甘寒清

肺開胃消痰利水解鬱調經閩產者力勝

○閩產爲勝則是

建蘭矣○李士材云蘭葉稟金水之氣故入肺臟東垣方中

嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時

珍又謂東垣所用乃蘭草也其集諸家之

言曰陳遂齋閑覽

云楚騷之蘭或以爲都梁香或以爲澤蘭或以爲猗蘭當以

澤蘭爲正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止

齋著盜蘭說以譏之○既名幽蘭正合騷經矣○方虛谷訂

蘭說言古之蘭草卽今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂

蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得蘭名楊升菴云

世以如蒲萱者爲蘭久睨之受誣也久矣又吳草廬有蘭說

云蘭爲醫經上品有根有莖草之植物也今所謂蘭無枝無

萃因黃山谷稱之世遂謬指爲離騷之蘭寇氏本草溺於流俗反疑舊說爲非夫醫經爲實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰癖乎其種盛於閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭爲蘭何以惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷初佩以爲證竊謂初佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈眞露可飲而英可餐乎又云製芰荷以爲衣集芙蓉以爲裳豈眞芰荷可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可爲定論也第騷經旣言秋蘭則非春蘭明矣本經旣言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭無疑也然離騷不嘗曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延齡乎不又曰疏石蘭以爲芳乎若秋蘭旣屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又不得爲山蘭當是何等之蘭乎且山蘭爲花中最上之品古今評者列之梅菊之前今反屈於孩兒菊之下以爲盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品擯棄不錄何其不幸若斯之甚也本草殺蟲之藥良多皆未必有驗至於行水消痰固山蘭之葉力所優爲者也蓋李時珍陳方吳楊輩皆必定陳藏器以澤蘭蘭草爲一類二種遂折騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思若以爲一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤

蘭止爲中品乎況一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以爲孩兒菊是不特二類一種且四種一類矣而以爲九畹之受誣豈理也哉蓋本經言澤蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生於深山窮谷故也寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以諮詢多識之士

白微

瀉血熱

苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身熱支滿

忽忽不知人

陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼

汗出過

故身熱支滿煩隨火湧故不知人

血厥

多血少

陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此證宜白微

湯白微當歸各一兩參五錢甘草錢半每服五錢

熱淋溫瘡

洗洗寒熱酸痛

寒熱作則營氣不能內營故酸痛

婦人傷中淋露

血熱干金白微散治

胎前產後遺尿不知時自微

芍藥等分酒調服丹溪曰此即

河間所謂熱甚延孔鬱結神無所依不能收禁之意也延孔

女人溺孔也

產虛煩嘔

仲景安中調經種子

益氣竹皮丸用之經疏云古方往往用之蓋不孕緣於血熱血

少而其源起於真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則血自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菟蓉等藥

似牛膝而短小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱薈

棗

艾葉宣理氣血燥逐寒溼

苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二經走三

陰厥

理氣血逐寒溼暖子宮止諸血溫中開鬱調經安胎

胎動腰痛下血

膠艾湯良

阿膠

艾葉煎服亦治虛痢

治吐衄崩帶

治帶

要藥

腹痛冷痢霍亂

轉筋皆理氣血逐

寒溼之效

殺蛇治癬

醋煎外科有用乾艾作湯投白

礬二三錢洗瘡然後傅藥者蓋

人血氣冷必假艾力以佐

音九

火能透諸經而治百病

陽而艾性又能殺蟲也

以之灸

音九

火能透諸經而治百病

血熱爲病者禁用

灸火則氣下行入藥則熱上衝不可過劑丹田氣弱臍腹冷者以熟艾裝袋兜臍

腹甚妙寒溼腳氣亦宜以此夾入襪內

陳者

良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再爲末用

入茯苓數片同研則易細

煎服宜鮮者苦

酒

醋也

香附爲使

艾附丸調婦人諸病宋時重湯陰艾自明成化來則以蘄州艾爲勝云灸酒壘一灸便透

蒙筌發明並以野艾爲真蘄艾雖香實非艾種

延胡索

宣活血利氣

辛苦而溫入手足太陰

肺脾

厥陰

心包肝

經能行血中氣滯氣中

血滯通小便除風癆治氣凝血結上下內外諸痛

通氣不和因而

不痛癰瘕

崩淋月候不調

氣血不和因而在

至產後血運暴血上衝折傷積

血瘀氣危急爲治血利氣第一藥然辛溫走而不守

獨用力迅宜兼

補氣血藥通經墮胎血熱氣虛者禁用根如半夏肉黃小而堅

者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花

古名紅藍花通行血潤燥

辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血

瘀行則血活有熱結於中暴吐紫黑血者吐出爲好

吐未盡加桃仁紅花行之潤燥消腫止痛

凡血熱血瘀治經大抵鮮血宜止瘀血宜行

非活血行血不能下

凡血熱血瘀

本草不言治痘喉

閉便難血逼口噤胎死腹中

血不下

痘瘡血熱

本草不言治痘喉

癥不通又能入心經生新血

須兼補益藥爲佐使

俗用染紅併作胭

脂

胭脂活血解毒痘疔挑破以油胭脂傅之良

少用養血多則行血過用能使血

行不止而癰

血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與相類故治血病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花

數十斤煮湯寢婦於上而薰之湯冷再加半斤

而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

本草綱要
西草 通行血

色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血

本經
苦寒

入厥陰血分

心包

能行血止血

能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血

消瘀通經酒煎一兩

肝

能行血止血

能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血

消瘀通經酒煎一兩

治風癆黃疸

疸有五黃疸穀疽酒疸黃汗疸女勞疸此蓋蓄血發黃不專於溼熱者也女勞疸必屬腎虛亦

不可以溼熱例治當用四物知藥壯其

小參朮培其氣隨證而加利溼清熱藥

崩運撲損痔瘻瘡癰

血少者忌用

根可染絳忌鐵

紫草

瀉血熱滑腸

甘鹹氣寒入厥陰血分

心包
肝

涼血活血利九竅通二便

鹹寒
性滑

治心腹邪氣

即熱

水腫五疸癰癧惡瘡

血熱所致

及痘瘡血熱毒

盛二便閉滯者

血熱則毒閉得紫草涼之則血行而毒出大便利者忌之活幼心書云紫草性寒小兒脾

實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者

忌用 去頭鬚酒洗

凌霄花 一名紫葳瀉血熱

甘酸而寒入厥陰血分

心包肝

能去血中伏火破血去瘀主產

乳餘疾崩帶癥瘕腸結

不大大便

血閉淋閼風痒血熱生風之證

女科多用孕婦忌之

本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也○肺癰有用之爲君藥者凌霄花爲

未和蜜陀僧唾
調傅酒漿甚驗

篠生花開五瓣黃赤有點不可近鼻聞傷

腦

大、小薊

瀉涼血

甘溫大明大涼皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女子赤白

沃安胎涼血之功 小薊力微能破瘀生新保精養血退熱補虛不

能如大薊之消癰毒

丹溪曰小薊治下焦結熱血淋本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汁

服立瘥

兩薊相似花如髻大薊莖高而葉皺小薊莖低而葉

不皺皆用根

三七

一名山漆瀉散瘀定痛

甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰腫

醋磨塗即

散已破者爲未摻之

金瘡杖瘡要藥

杖時先服一二錢則血不衝心

即

陽明厥陰血分之藥故治血病

此藥近時始出軍中恃之從廣西山洞來

者略似白芨地黃有節味微甘頗似人參以未摻豬血坤血化爲水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有歧尖莖存恭穎夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香根

大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七治
金瘡折傷血病甚效與南中來者不同

地榆 滷止血

苦酸微寒性沉而滷

本草未嘗言滷然能收汗止血皆酸斂之功也

入下焦除血熱

治吐衄崩中

血虛血鮮者爲腸風隨感而見也血瘀者禁用

腸風

血鮮者爲腸風隨感而見也血瘀者爲臟毒積久而發也糞前爲近血出

腸胃糞後爲遠血出肺肝

血痢

蘇頌曰古方斷下多用之寇宗奭曰虛寒瀉痢及初起者忌用○蘇頌著本草圖經

似柳根外黑裏紅取上截炒黑用梢皮行血得髮良惡麥

冬

蒲黃 生滑行血炒滷止血

甘平厥陰血分藥

心包肝

生用性滑行血消瘀通經脈利小便

祛心腹膀胱寒熱

同五靈脂治心腹血氣痛名失笑散療撲打損傷瘡癧諸腫

也

一婦舌脹漏口以蒲黃頻摻比曉乃愈宋度宗舌脹漏口御醫用蒲黃乾薑末等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之涼血活血可知矣蓋舌爲心苗心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也炒黑性滳止一切血崩

帶泄精香蒲花中蕊屑湯成入藥

卷柏生用破血炙用止血

生用辛平破血通經治癥瘕淋結炙用辛溫止血治腸風脫肛生石上拳攀如雞足俗呼萬年松凡使鹽水煮半日并水煮半日焙用

蕓茹

瀉破血

辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥蟲除熱痺破癰瘻

內經同烏鵲骨

治婦人根如菜菔皮黃肉白葉長微闊折之有汁結實如豆

一顆三粒甘草爲使

菴蘭子 瀉行水散血

苦辛微寒

別錄
微溫

入肝經血分行水散血散中有補治陽痿經

澀腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃剗折傷

撲打方
多用之能制蛇

見之則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗茟蕙爲使

鬱金

宣行氣解鬱瀉泄血破瘀

辛苦氣寒純陽之品其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經

涼心熱散肝鬱下氣破血

行滯氣亦不損正氣
破瘀血亦能生新血

治吐衄尿血

婦人經脈逆行

經不下行上爲吐衄諸證用鬱金末加韭汁
薑汁童便服其血自清瘀中帶血者加竹瀝

血氣諸痛產後敗血攻心癲狂失心

屬多喜笑尙知畏懼證
屬不足狂多忿怒人莫

能制證屬有餘此病多因驚憂瘀血塞於心竅所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸鬱金入心散惡血明礬化頑痰故也痘毒入心鬱金一兩甘草二錢半煮乾焙研末冰片五分每用一錢加豬血五七滴新汲水下治班痘始有白泡忽搗入腹紫黑無膿下蟲毒同升麻服不吐則下出川廣體銳圓如蟬

肚外黃內赤色鮮微香味苦帶甘者真

市人多以薑黃爲之

薑黃

鴻破血行氣

苦辛

本草大寒藏器大明日熱

色黃入脾兼入肝經理血中之氣下氣破

血除風消腫功力烈於鬱金治氣脹血積產後敗血攻心通

月經療撲損片子者能入手臂治風寒溼痺

血虛臂痛者勿用時珍曰人臂

治痛其兼理血中之氣可知

出川廣

陳藏器曰鬱金苦寒色赤薑黃辛溫色黃蓮味苦色青三物不同所

用各別經疏曰薑黃王治介乎三棱鬱金之間時珍曰薑黃

脾兼治血中之氣，進入肝治氣，中之血，稍爲不同。今時以屬加乾薑者爲片子薑，黃圓如蟬腹者爲蟬肚鬱金，並可染色。蕘形雖似鬱金，而色不黃也。

莪蓷

瀉破血行氣消積

辛苦氣溫入肝，經能通肝經聚血，消瘀通經開胃。

化食解毒止痛，治心腹諸痛，治氣吐酸奔豚，痃癖。

酒醋磨服

腹積痃癖多見於男子癥瘕多見於婦人。莪蓷香烈，行氣通竅，同三稜用治積聚諸氣良。按五積心積曰伏梁，起臍上至

心下，肝積曰肥氣，在左脇，肺積曰息賁，在右脇，脾積曰痞氣，在胃脘右側，腎積曰奔豚，在小腹上至心下。治之不宜專用

下藥，恐損真氣。宜於破血行氣藥中加補脾胃藥，氣旺方能磨積，正旺則邪自消也。經曰：大積大聚，其可犯也。衰其大半而止，過者死。東垣五積方用三稜、莪蓷等，兼人參贊助成功。按治積諸藥，神麴、麥芽、化穀食、萊菔子、橘皮食、硇砂、阿魏、山楂、化肉食、紫蘇化魚蟹毒、葛花根、枳消酒積、麝香消酒積、果積、芫花牽牛大戟行水飲、三稜、莪蓷、鱉甲消癰瘕、木香、檳榔、行

氣滯礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積大黃芒硝攻熱積雄黃膩粉攻涎積虻蟲水蛭攻血積

雖爲泄劑亦

能益氣

王好古曰故治氣短不能接續大小七香丸積香丸諸湯散中多用之

根如生薑莪

生根下似卵不齊堅硬難搗灰火煨透乘熱搗之

人氣分

或醋

磨酒磨或煮熟用

入血分

荆三稜

瀉行氣破血消積

苦平色白屬金

皮黑內白

入肺金血分破血中之氣

亦通肝經聚血

兼入

脾經散一切血瘀氣結瘡硬食停老塊堅積

乃堅者削之從血藥則治血從

氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良苦

有人患癥瘕死遺言開腹取之得病塊如石文理五色削成刀柄因砍三稜柄消

成水乃知此藥可療癥瘕消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻虛者慎

用色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麪裹煨

白茅根瀉火補中止血止噦

甘寒入手少陰

心

足太陰陽明

脾

胃補中益氣除伏熱消瘀血

利小便解酒毒治吐衄諸血

心肝火旺逼血上行則吐血

肺火盛則衄血

茅根甘和血

寒涼

汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋

則寒熱作矣

淋

瀝崩中

血熱則崩

傷寒噦逆

即呃逆說文曰噦氣梧也

東垣作乾

嘔之甚者未是

肺熱喘急

內熱煩渴黃疸水腫

清火行水時珍曰

良藥也

世人以微而忽之惟事苦寒之劑傷沖和之氣烏足

知此哉

茅鍼潰癰癤

酒煮服

一鍼潰一

蘆根瀉熱止嘔

甘益胃寒降火治嘔噦反胃

胃熱火升則嘔逆食不消渴客

下金匱方蘆根煎服

始能通調水道下輸膀胱腎爲水臟

肺爲水之上源脾氣散精上歸於肺

熱傷寒內熱止小便數

肺爲水之

上源脾氣散精上歸於肺

始能通調水道下輸膀胱腎爲水臟

蘆根

芩根

薑薇根吳草

部

而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣能解魚蟹河豚毒取逆水肥厚者去鬚節用

苧根

瀉熱散瘀

甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾大渴大狂胎動

下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金瘡拆傷

止血雞易癰

魚骨哽

搗如龍眼雞骨雞湯下魚骨魚湯下

汁能化血爲水苧皮與產婦作枕

止血運安腹止產後腹痛

散瘀之功

漚苧汁療消渴

薔薇根

瀉溼熱

苦澀而冷入胃大腸經除風熱溼熱生肌殺蟲治泄痢消渴

牙痛口糜

煎汁

遺尿好眠癰疽瘡癬

花有黃白紅紫數色

以黃心白色粉紅者入藥子名營實酸溫主治略同

千金日
薔薇根

角蒿口瘡之神藥

角蒿所在多有開淡紅紫花角微彎長二寸許辛苦有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡

彎長二寸許辛苦

有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡

芭蕉根

瀉熱

味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹

並搗汁服

塗癰腫結

熱

爲末油調傅

大黃

大瀉血分溼熱後者佳

下有形積滯

大苦大寒入足太陰

脾

手足陽明厥陰

大腸胃心包肝

血分其性浮

而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分

仲景太陽門調

胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗

少陽陽明小承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣

在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱

熱病愈後或目赤喉頭痛膈上熱疾生也

用以蕩滌腸胃

大黃根卷二大黃

病愈後或目赤喉頭痛膈上熱疾生也

下燥結而除瘀熱治傷寒時疾發熱譴語

大腸有燥糞故譴語宜下之譴音古

溫熱瘡瘍下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癰瘕積聚

積久成形謂之

積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣

留飲宿食心腹痞滿二便不

通皆土鬱奪之

吐血衄血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏

火行水除痰蝕膿消腫能推陳致新然傷元氣而耗陰血

下多

亡若病在氣分胃虛血弱人禁服

病在氣分而用之是爲誅伐無過東垣曰能推陳致

新如定禍亂以致太平所以有將軍之號時珍曰仲景瀉心

湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾

胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者用大黃黃

連瀉心湯亦瀉脾胃之溼熱非瀉心也病發於陰而反下之

則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經

曰太陰所至爲痞滿又曰濁氣在上則生脹脹是已病發於

陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘故太陽胸

陽乳皆謂太陽亦寫牌胃血分之邪而降其濁氣也

在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問
心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足
亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不
足肝肺各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰
之主肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣
寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之李
士材曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深微蓋濁陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦

紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩爲使

欲取通利

者不得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳

夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調傅止痛無瘢

黃芩

瀉火除溼

苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家溼熱治澼痢腹痛

便血曰澼

寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰溼之不同寒宜
溫熱宜清虛宜補實宜下食宜消導瘀血宜行散痰溼宜化

痰利溼痛時手不可接者爲實痛按之痛止者爲虛痛寒熱往來

邪在少陽

黃疸五淋血閉

實熱在血分 氣逆癰疽瘡瘍及諸失血消痰

丹溪以黃芩降痰假其降火也按痰因火

動當先降火

利水解渴安胎

胎孕宜清熱涼血不妄行則胎安

養陰退陽補膀胱

水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣

肺主氣熱傷氣

治上焦之

風熱溼熱

丹溪曰黃芩焦藥

火嗽喉腥

五臭肺爲腥

目赤腫痛過服損

胃血虛寒中者禁用

得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃

連止腹痛得桑皮瀉肺火得白朮安胎

之聖藥時珍曰仲景治少陽證

下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒入

心瀉熱除脾家溼熱使胃火不流入肺不致刑金卽所以保

肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽證雖在半表半

裏而心膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默然不欲食

又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦

少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱身如火燎煩躁引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉治

明者良中虛名枯芩卽片芩瀉肺火清肌表之熱內實名條

芩卽子芩瀉大腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝膽火豬膽汁

炒山茱龍骨爲使畏丹皮丹砂

黃連 瀉火燥溼

大苦大寒入心瀉火

王海藏曰瀉心實瀉

脾也實則瀉其子

鎮肝涼血

凡治血防風爲

上部之使黃連爲中部

之使地榆爲下部之使

燥溼

開鬱

解渴

單用能治消渴

除煩

益肝膽

厚腸胃消心瘀

能去心竅惡血

止盜汗

涼心

治腸澼

瀉痢

便血

曰澼有

鬱而爲痢

黃連治痢要藥

噤口者熱壅上焦同人參煎湯呷

之但得下咽便好

喻嘉言曰

下痢必先汗

解其外後調其內

首用辛涼以解表

次用苦寒

以攻裏機要云

後重宜下腹痛

宜和身重宜除溼

脈弦宜去風

風邪內結宜汗

身冷自汗宜

溫膿血稠黏宜重劑

以竭之

下痢赤屬血分

白屬氣分戴氏

日俗謂赤熱

白寒者非也

通作溼熱處治

但有新久虛實之

分痞滿

燥溼開鬱仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之

腹痛

清熱心痛伏梁積目痛

皆傷人乳浸點或合歸芍等

分煎湯熱洗散熱活血

癰疽瘡疥

諸痛癢瘡皆屬心火酒毒胎毒

小兒初生合甘草等爲末蜜調令嚥之

明目

傳信方羊肝一具黃連一兩搗

定驚

鎖止汗解毒除疳

同豬肚蒸爲丸殺蛇則伏

虛寒爲病者禁用

久服黃連苦參反熱從火化也

昂按炎上作苦味苦必燥燥則熱

矣且苦寒沉陰肅殺伐傷生和之氣也

韓悉曰黃連與肉桂同行能交心腎於頃刻時珍曰治病用香連丸薑連丸用黃連乾薑黃散用黃連生薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡

用黃連細辛止下血用黃連大蒜一陰一

陽寒因熱用熱因寒用最得製方之妙

出宣州者粗肥

出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良去毛治心火

生用虛火

醋炒肝膽火

豬膽汁炒上焦火酒炒有吞酸嘈雜等證亦有吐酸者名酢心宜黃連

吳茱萸降火

中焦火薑汁炒下焦火鹽水或童便炒食積火

黃土炒治溼熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸

時珍曰諸法不獨爲之引導蓋辛熱制其寒苦鹹寒制其燥性用者詳之

黃芩龍骨爲

使惡菊花元參殼蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌豬肉

時珍曰方有職連丸

黃連豬肚丸豈忌

黃連瀉心火佐以龍膽瀉

內而不忌臟腑乎

殺烏頭巴豆毒

黃連瀉心火佐以龍膽瀉

瀉胃火知母瀉腎火黃芩瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉

肝膽火白芍瀉脾火石膏

肺火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝膽火黃連佐

之瀉三焦火黃芩佐之鄭奠一曰熱

鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分甚效

胡黃連

瀉熱療驚疳

苦寒去心熱益肝膽厚腸胃治胃蒸勞熱五心煩熱

心窩手心足心

三消

渴而多飲爲上消肺熱也心移熱於肺傳爲膈消是也多食善飢爲中消胃熱也癥成爲消中是也渴而小便

數有膏爲下消腎熱而水虧也

五痔

牛痔牡痔脈痔腸痔血痔溼熱下流傷

血分無所施洩則逼肛門而爲痔腫

溫瘧瀉痢女人胎蒸消果子積爲小兒驚瘧良藥朱二允曰
解吃烟毒
合茶服之甚效

性味功用同黃連故名出波斯國今秦隴南海亦
有之心黑外黃折之塵出如烟者真畏惡同黃連

苦參

瀉火燥溼補陰

苦燥溼寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝膽安五臟溼熱去
則血氣

和平而五臟自安

利九竅生津止渴明日止淚

淚爲肝熱治溫病血痢純

清血者風傷肝也宜散風涼血下
如豆汁者溼傷脾也宜清熱滲溼

腸風溺赤黃疸酒毒熱生

風溼生蟲又能祛風逐水殺蟲治大腸疥癩然大苦大寒肝

腎虛而無熱者勿服

張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可謂之毒久服必偏勝爲患經曰五

味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天

氣油也正冰注日氣會不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏勝

故令人暴天筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心元參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補○藥能醫病不能養人食能養人不能醫病糯米泔浸去

腥氣蒸用元參爲使惡貝母茺絲子漏盧反藜蘆

苦參一兩或酒煎或

醋煮能吐

天行時

知母

瀉火補水潤燥滑腸

辛苦寒滑上清肺金而瀉火

瀉胃熱膀胱邪
熱腎命相火

下潤腎燥而滋

陰火二經氣分

黃蘖入二經血分故
二藥必相須而行

消瘀定嗽止渴安胎

莫

清火治傷寒煩熱

勞骨蒸退有汗
之骨蒸

燥渴虛煩久瘧下痢

治嗽者清肺火也治渴者清胃熱也退骨蒸者瀉腎火也

利二便消浮腫

小便利則腫消
東垣曰熱在上

焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用滲溼之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便溺而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃蘖知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有熱有溼有氣結於下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾溼不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃蘖知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二尤之類昂按凡病皆有隔二隔三之治不獨便溺也然苦寒傷胃而滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒肅殺非長養萬物者也世以爲戒得酒良上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

龍膽草

瀉肝膽火下焦溼熱

待表出

大苦大寒沉陰下行益肝膽而瀉火

相火寄於肝膽有瀉無補瀉其邪熱卽所以補

之兼入膀胱腎經除下焦之溼熱與防已同功酒浸亦能

行上行治骨間寒熱骨主經風火時氣溫熱熱痢

驚癇

氣風火

時氣溫熱熱痢

黃寒溼腳氣

足傷溼熱則成腳氣腫而痛者爲溼腳氣宜清利溼搜風又有攣縮枯細痛而不腫者名乾

腳氣宜養

咽喉風熱赤睛努肉

瀉肝膽火能明目元素曰柴胡爲主龍膽爲使目疾要藥

昂按若日疾初起

宜發散忌用寒涼癰疽瘡疥過服損胃

甘草水浸一宿曝

用小豆貫衆爲使忌地黃

青黛

瀉肝散鬱火

鹹寒色青瀉肝散五臟鬱火解中下焦蓄蘊風熱

衍義曰一婦患臍腹

二陰徧生溼瘡熱癢而痛出黃汁二便澀用鰻鱺松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩和塗熱痛皆去仍服入正散而愈此中下焦蓄蘊風熱毒氣若不出當作腸風內痔婦不能禁酒物果治傷寒發斑吐咯血痢

陰虛火炎者忌用合杏仁研置柿餅中煨食名聖餅仍發痔

子治咯血

小兒驚癇疳熱丹熱傳癰瘍蛇犬毒

卽靛花取嬌碧

者水飛淨用

內多石灰故須淘淨

大青

瀉心胃熱毒

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發斑

熱甚傷血

裏實表虛則發斑輕如疹子重如錦紋紫黑者熱極而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有犀角

大青湯

黃疸熱

痢丹毒喉痺

處處有之高二三尺莖圓葉長葉對節生八

月開小紅花成簇實大如椒色赤用莖葉

牽牛

大瀉氣分溼熱

辛熱有毒屬火善走入肺經瀉氣分之溼熱

肺主氣火能平金而泄肺能

達右腎命門走精隧通下焦鬱遏及大腸風秘氣秘利大小

便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿痃癬氣塊若溼熱在血

分胃弱氣虛人禁用

東垣曰牽牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉乃瀉氣之

藥比諸辛藥泄氣尤甚若溼從下受下焦主血血中之溼宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣血俱損也王好古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥結服硝黃藥則若罔知如此三十餘年其人體肥膏梁而多鬱日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化爲痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯稍黃入血不能入氣故無效用牽牛爲末阜角膏丸纔服便通外甥素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不效予言此乃溼熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用棟實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天眞丹用牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破故紙諸藥深得補鴻兼施之妙

有黑白二種黑者力速

亦名取子淘去浮者黑丑

春去皮用得木香乾薑良

此藥漢前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

防已 通行水瀉下焦血分溼熱

大苦大寒

本經平別錄溫

太陽經藥

膀胱能行十二經通腠理利九竅

瀉下焦血分溼熱爲療風水之要藥治肺氣喘嗽

水溼熱氣諸

癇

降氣溼瘡腳氣足傷寒溼爲腳氣寒溼鬱而爲熱溼則腫

下痰

熱則痛防已爲主藥溼加苡仁蒼朮木瓜

木通

通熱加芩蘡風加羌活草薢痰加竹瀝南星痛加香附木

香

活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛

連臂加桂枝威靈仙痛連脇加膽草又

有足跟痛者屬腎虛不與腳氣同論

水腫風腫癰腫惡瘡

或溼熱流入十二經致二陰不通者非此不可然性陰而健

陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用

十劑曰通可去滯通草防已之屬是也通草卽木通

是徐之才亦以行水者爲通與燥劑無以別矣木通甘淡瀉

氣分溼熱防已苦寒瀉血分溼熱○本集以行水爲通劑改

熱藥爲

出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防已黑

點黃腥木强者名木防已不佳

陳藏器曰治風用木
防已治水用漢防已酒洗用

惡細辛畏草薢

葶苈大瀉氣秘通行水

辛苦大寒而火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣贖急者非此不能除破積聚癥結伏留熱氣消腫除痰止嗽定喘

泛溢爲腫脹爲痰嗽爲喘滿

通經利便久服令人虛

十劑曰洩可去閉葶苈

大黃之屬是也

黃泄陰分血閉葶苈泄陽分氣閉氣味俱厚不減大黃然有甜苦二種甜者性緩苦者性急泄肺而傷胃宜大棗輔之仲景有夢寐大棗瀉肺湯治肺氣喘急不得臥昂按輔以大棗補土所以制水

子如黍米微長色

黃合糯米微炒去米用得酒良榆皮爲使

甘遂 大通瀉經隧水溼

苦寒有毒能瀉腎經及隧道水溼直達水氣所結之處以攻

決爲用爲下水之聖藥

仲景大陷胸湯用之

主十二種水大腹腫滿

名水

蠱喻嘉言曰腎爲水穀之海五臟六腑之源脾不能散胃之

水精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病於上

腎不能司胃之關時其輸泄而病於下以致積水浸淫無所

底止○腎者胃之關也前陰利水後陰利穀○王好古曰水

者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭面中

四肢下腰腳外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之

別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按水腫有痰裏

食積瘀血致清不升濁不降而成者有溼熱相生隧道阻塞

而前者有燥熱衝擊秘結不通而成者證屬有餘有服寒涼

傷飲食中氣虛衰而成者有小便不通水液妄行脾莫能制

而前者證屬不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起

丹溪曰水病當以健脾爲主使

脾實而氣運則水自行宜參苓爲君視所挾證加減苟徒用利水藥多致不救

痕癥積聚留飲宿食

瘓迷顛癇虛者忌用

皮赤肉白根作連珠重實者良炳良

煨熟用

或用甘草齊荳汁浸三日其水如墨以清爲度再麪裹煨

瓜蒂爲使惡遠志反甘

草

仲景治心下留飲與甘草同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘遂末傅腫處濃煎甘草湯服之其腫

立消二物相

反感應如此

大戟

大瀉通臟腑水溼

苦寒有毒能瀉臟腑水溼行血發汗利大小便治十二水腹

滿急痛積聚癰瘕頸腋癰腫風毒腳腫通經墮胎誤服損真

氣

時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到人心則迷成癲癇入肺則塞竅爲欬喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入

經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癰癧癰腫

陳無擇並以控涎丹主之殊有奇效此乃治痰之本痰之本水也溼也得氣與火則結爲痰大戟能泄臟腑水溼甘遂能

行經絡水溼白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又曰錢仲陽謂腎爲眞水有補無瀉復云痘證變黑歸

腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則臟自不實腑者膀

胱也百祥爲大戟一味能行膀胱之水故也。謂非獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也。實則瀉其子大戟浸水青綠肝膽之色也。痘證毒盛火熾則水益涸風挾火熱則土受虧故津液內竭不能化膿而成黑陷之證。瀉其風火之毒所以救腎扶脾也。昂按瀉心乃所以補心瀉腎卽所以救腎邪熱退則真陰復矣。機要用大戟一兩棗三枚同煮焙乾去戟用棗丸服名

棗變百祥丸

杭產紫者爲上北產白者傷人漿水煮去骨用得

大棗則不損脾畏菖蒲反甘草

商陸

大通行水

苦寒有毒

諸家辛酸時珍苦寒

沉陰下行與大戟甘遂同功療水腫脹

滿腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猶行如單脹而不腫者名蠭脹

爲木橫克土難治腫脹朝寬暮急爲血虛暮寬朝急爲氣

虛朝暮俱急爲氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者吉由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治瘦

疝癰腫喉痺不通

溝切醋炒塗喉中良

溼熱之病瀉蠭毒傳惡瘡墮胎

孕令人見鬼神取花白者根

赤者傷人只堪貼臍入麝三分搗貼小便利則腫消黑豆

湯浸蒸用得蒜良

芫花 大通行水

苦寒有毒去水飲痰癥療五水在五臟皮膚脹滿喘急痛引

胸腸欬嗽瘡瘍

五水者風水皮水正水石水黃汗也水積胸中堅滿如石名石水汗如蘋汁名黃汗久不

愈必致癰膿時珍曰仲景治傷寒太陽證表未解心下有水

而欬乾嘔發熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭

痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯

主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從兩便出內經所謂潔淨府去陳

逐法也十棗湯芫花甘遂大戟等分棗十枚

葉似柳二

月開花紫碧色葉生花落陳久者良醋煮過水浸曝用根療

疥可毒魚反甘草

鬪訟者取葉擦皮膚輒作赤腫假傷以誣人

本草綱要
蕘花 大通行水

辛散結苦洩熱行水捷藥主治略同芫花

澤漆 通行水

辛苦微寒消痰退熱止嗽殺蟲利大小腸治大腹水腫益丈
夫陰氣 生平澤葉圓黃綠頗類貓睛一名貓兒眼睛草莖

中有白汁粘人

時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類耳

常山

宣叶痰截瘧通行水

辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲

痰有六風痰寒痰溼痰熱痰食痰氣

疾也飲有五流于肺爲支飲于肝爲懸飲于心爲伏飲于經絡爲溢飲于腸胃爲痰飲也常山力能吐之下之專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用

時珍曰常山蜀漆劫痰截癰頭在發散表邪及提出

陽分之後用之瘧有經瘧臘瘧風寒暑溼痰食瘴鬼之別須
分陰陽虛實不可槩論常山蜀漆得甘草則吐得太黃則利

得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則

入肺得龍骨附子則入腎得草朶檳榔則入脾蓋無痰不作

瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生

用多用爲然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每

見奇功未見其或吐也世人泥于雷數老人久病忌服之說

使良藥見疑沉疴難起抑何愚也○常山吐瘧痰爪蒂吐熱

痰烏附尖吐溼痰萊菔子吐氣痰藜蘆吐風痰

使忌蔥茗莖葉名蜀漆功用略同古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結甘

草水拌蒸

藜蘆

宣引吐

辛寒至苦有毒入口卽吐善通頂令人嘔風癟證多用之

張子

和曰一婦病風癟初一二年一作後漸日作甚至一日數求死而已值歲大飢采百草食見野草若蔥采蒸飽食覺不

部

安吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食葱訪人乃葱苗卽藜蘆是矣李時珍曰和王妃年七十中風不省牙關緊閉先考太醫吏日月池翁診視藥不得入不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣遂吐痰而甦藥不瞑眩厥疾不瘳誠然

取根去頭用黃連爲使反細辛芍藥諸

參惡大黃畏葱白

吐者服蔥湯卽止

木通

古名通草輕通行水瀉小腸火

甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱

心火降則肺熱清矣

化津液

肺爲水源

肺熱清則津液化水道通

下通大小腸膀胱導諸溼熱由小便出

故導赤散用之

凡利小便者多不利大便以小水愈通大便愈燥也木通能入大腸兼通大便

通利九竅血脈關節

治胸中煩熱偏身拘痛

楊仁齋云偏身隱熱疼痛拘急足冷皆伏熱傷血血屬於心宜木通以通

心竅則經絡流行也

大渴引飲

中焦火心與小腸相表

火淋瀝不通

下焦火心與小腸則淋

裏心移熱于小腸則淋

利

水腫浮大利小耳聾

泄腎火通竅

目眩口燥舌乾

舌爲心苗喉痺咽

痛

火炎上焦脾母

鼻龜

音壅熱

壅清道

失音

清金

脾熱好眠

脾主四肢倦則好眠心爲火不亢于

脾熱亦除

除煩退熱止痛排膿破血催生行經下乳

火不亢于

內氣順血行故經調有準乳汁循常

汗多者禁用

東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受

溼熱癃閉約束則小便不通宜此治之

○寒水太陽膀胱也

○朱二允曰火在上則口燥眼赤鼻乾在中則心煩嘔噦浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而下降矣○君火宜

木通相火宜瀉瀉利水雖同所用各別

木通

故通竅

繖有細孔兩頭皆通

通草

古名通臍木輕通利水退熱

色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁治五淋水腫目

昏耳聾鼻塞夫音淡通竅寒降火利肺氣

退熱催生

澤瀉通利水瀉膀胱火

甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功專利溼行水治

消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞腳氣痛痛淋瀝陰汗陰間有汗尿

血洩精

既利水而又止洩精何也此乃溼熱爲病不爲虛滑者言也虛滑則當用補瀉之藥

溼熱之病

溼熱旣除則清氣上行又能養五臟益氣力起陰氣補虛損

止頭旋有聰耳明目之功

脾胃有溼熱則頭重耳鳴目昏滲去其溼則熱亦隨去土乃得令而

清氣上行故本經列之上品云聰耳明

去其溼則熱亦隨去土乃得令而

而六味丸用之今人多以昏目疑之

多服昏目

小便過利而腎水虛

眼中有水屬膀胱過利則水涸而火生仲景八味丸用

滋宗奭謂其接引桂附入腎經李時珍曰非接引也乃

膀胱之卯氣也古人用補藥必兼瀉卯卯去則補藥

閨一關此乃玄妙後人不知此理專一于補必致偏

勝之患矣王履曰地黃山茱萸丹皮皆腎經藥桂附右腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎爲眞水有補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不知腎之眞水不可瀉瀉其伏陽之邪耳○脾喜燥腎惡燥故兼補爲難○易老云去脬中畱垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼山藥之滷茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神奇所以爲古今不易之良方也卽有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加入有補無瀉且客倍于主責成不專而六味之功且退處于虛位失製方配合之本旨矣此近世庸師之誤也鹽水拌或酒

浸用忌鐵

車前子

通行水瀉熱涼血

甘寒涼血去熱止吐衄消瘕瘀明目通淋

凡利水之劑多損于目惟此能解肝

與小腸之熱溼熱退而目清

矣雷斅曰使葉勿使莖蕊

子甘寒清肺肝風熱滲膀胱

溼熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有子

腎

二竅車前子能利水竅而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用之枸杞菟絲各八兩五味覆盆子各四兩車前二兩蜜丸慣遺洩者車前易蓮子時珍曰人服食須佐他藥如六味丸之用澤瀉可也若單用則過瀉治溼痺五淋暑

溼瀉痢

歐陽文忠患暴下國醫不能愈夫人云市有藥三文一貼甚效公不肯服夫人雜他藥進之一服而愈問

其方乃車前子爲末米飲下二錢一云此藥利水而不動氣水道利則清濁分穀臟自止矣

目赤障翳

能除

肝熱催生下胎酒蒸搗餅焙研

酒蒸搗餅入滋補藥炒研入利水泄瀉藥

燈草

輕通利水清熱

甘淡而寒降心火

心能

清肺熱利小腸

心與小腸相表裏心火清則肺熱小腸亦

清而熱從小便出矣通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉瘡塗乳止夜嘯

擦癬最良

綉成把擦摩極癢時蟲從草出浮水可見十餘次則能斷也

瞿麥

通利水破血

苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱爲治淋要藥

故八正散用之五淋大抵

皆屬溼熱熱淋宜入正及山梔滑石之類血淋宜小薊牛膝膏腎虛淋宜補腎不可獨瀉老人氣虛者宜參木兼木通山

梔亦有痰滯中焦作淋者宜行痰破血利竅決癰消腫明目兼通利藥最忌發汗汗之必便血

去翳通經墮胎性利善下虛者慎用寇宗奭曰心經雖有熱

而小腸虛者服之則心

熱未清而小腸別作病矣花大如錢紅白斑爛色甚艷媚俗呼洛陽花

用蕊殼丹皮爲使惡螵蛸

產後淋當去血瞿麥蒲黃皆爲要藥

扁蓄 一名扁竹通淋

苦平殺蟲疥利小便治黃疸熱淋蛇咬腹痛蟲蝕下部
煮服葉細如竹弱莖蔓引促節有粉三月開紅花

天仙藤通活血消腫

苦溫疏氣活血治風勞腹痛姪娠水腫

有天仙藤散專治水腫

葉似

葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋

木香藤一云卽青

地膚子通利水補陰

甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋

時珍曰無陰則

陽無以化亦猶東垣利小便不通用知蘖滋腎之意王節齋曰小便不通或頻數古方多以爲寒而用溫潤之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數也故老人多頻數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪爲主而佐以收澀之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之瀉之治其標也

治癩瘡散惡瘡

煎湯洗

葉作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除雀盲澀痛

葉如蕓莖

赤子類蠶砂惡螺蛸

石韋

通淋補

甘苦微寒清肺金以滋化源

凡行水之藥必
皆能先清肺火

通膀胱而利水

道益精氣補五勞

利溼清熱
黃帝治勞

之功高陽負對
傷用石韋汁

治淋崩發背

酒服
冷調

生石陰柔韌如皮背
有黃毛去毛微炙用杏仁滑石

治淋崩發背

射干爲使得菖蒲良生古瓦上者名瓦韋治淋

海金砂

通淋瀉溼熱

甘寒淡滲除小腸膀胱血分溼熱治腫滿五淋莖痛得梔子

牙硝硼砂治傷寒熱狂

大熱利小便此金底抽薪之義也

莖細如線引竹

木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

茵陳通利溼熱治諸黃

苦燥溼寒勝熱入足太陰經

膀胱

發汗利水以泄太陰陽

之

溼熱脾胃爲治黃疸之君藥

脾胃有溼熱則發黃黃者脾之色也熱甚者身如橘色汗如藥汁亦

有寒溼發黃身薰黃而色暗大抵治以茵陳爲主陽黃加大黃梔子陰黃加附子乾薑各隨寒熱治之

又治傷

寒時疾狂熱瘡瘍頭痛頭旋女人瘕疝

皆溼熱爲病

香薷

宣通利溼清暑

辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺爲清暑之主藥肺氣清則小便行而熱降

暑必兼溼治暑必兼利溼若無溼但爲乾熱非暑也

治嘔逆水腫

熬膏服小便利則消

腳氣口氣

煎湯含敷單服治霍亂轉筋

時日暑有乘涼飲令致陽氣爲陰邪所遏反中入內遂病顛癇發熱惡寒煩躁口渴吐寫霍亂宜用之以發越陽氣散邪和

則愈若飲食不節勞役作傷之人傷暑大熱大渴汗出如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃內傷之證宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷是重虛其表而濟之熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑濕用代茶誤矣李上材曰香薷爲夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者誤服之反成大害世所未知按潔古云中暑爲陰證爲不足中熱爲陽證爲有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼○身寒寒字當熱字看傷寒必病熱

陳者勝

宜冷飲熱服令人瀉

青蒿

瀉熱補勞

苦寒得春木少陽之令最早

二月生苗

故入少陽厥陰血分

膽肝治

骨蒸勞熱

童便搗葉取汁熬膏

蓐勞虛熱

凡苦寒之藥多傷胃氣惟青蒿芬香入脾獨宜于血虛有

熱之人以其

不犯胃氣也

風毒熱黃久瘧久痢癰疥惡瘡鬼氣尸疰

時珍曰月令通纂言伏內庚日采蒿懸門庭可辟邪冬至元旦各服一錢亦良則青蒿之治鬼疰蓋亦有所伏也

補中明

目 童便浸葉用熬膏亦良使子勿使葉使根勿使茲

附子 大燥回陽補腎命火逐風寒溼

辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不守通行十

二經無所不至能引補氣藥以復散失之元陽引補血藥以

滋不足之真陰引發散藥開喉脈理以逐在表之風寒同乾薑桂枝溫

經散寒 發汗 引溫暖藥達下焦以壯體在裏之寒溼能引火下行亦有津調貼足心

者○入八味丸內亦從地黃等補陰治三陰傷寒

吳綬曰附子陰證要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖

大熱而脈沉細者或厥陰腹痛加甚則唇青囊縮者急須用之若待陰極陽竭而用之已遲七八日東垣治陰盛格陽傷寒而赤

目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑附湯加人參投半効得汗而愈此神聖之妙也

中寒中風卒

日中漸傷曰傷輕爲感冒重則爲傷又重則爲中氣虛寒厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脈伏

熱厥似寒者誤投立

風

嘔

胃

膈

多由氣血虛

斃宜承氣白虎等湯

寒

嘔

胃

膈

冷

成飲

可下而食不可下

槁

在吸門喉間之厭會也

食下

胃

膈

癰

須

臾吐出槁在賁門胃之上口也

此上焦名噎

食下

良久吐出

槁

在幽門胃之下口也

此中焦名膈

朝食暮吐槁在闌門大

小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血壅塞胃口

者如寒痰胃冷則宜薑附參术

胃槁者當滋潤

宜四物牛

羊乳血瘀者加韭汁○當與韭汁牛

乳二條參看論治

脾

虛寒客中焦爲霍亂

寒客下

泄命火不足冷痢寒瀉霍亂轉筋

脾虛寒客中焦爲霍亂

寒客下

焦肝腎爲轉筋

熱霍亂者禁用

焦肝腎爲轉筋

熱霍亂者禁用

拘攣風痺癥積聚督脈爲病脊強而厥小兒慢驚痘瘡灰

白癰疽不斂一切沉寒痼冷之證

經曰陰盛生內

寒陽虛生外寒

助陽退陰

殺邪辟鬼本草通經墮胎

凡陰證用薑附藥宜冷服熱因寒

以寒則陰益盛

治之以熱則拒格

不納用熱藥冷飲下嗌之

後冷體既消熱性便發情且不違而致大益此反治之妙也

又有寒藥熱飲治熱證者

此寒因熱用義亦相同也

經曰正

者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒此正治也或以寒

治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所生而先其所因
蓋借寒藥熱藥爲反佐以作向導也亦曰從治王好古曰用
附子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽
益熾真陰愈耗精血日枯而氣無所附麗遂成不收者多矣

母爲烏頭附生者爲附子連生者爲側子細長者爲天雄

兩岐者爲烏喙五物同出異名附子以西川彰明赤水產者

爲最皮黑體圓底平八角重一兩以上者良

或云二兩者生更勝然難得

用發散熟用峻補

趙嗣真曰仲景麻黃附子細辛湯熟附配

有發其旨微矣丹溪曰烏附行經仲景八味丸用爲少陰嚮導後世因以爲補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以

行地黃之滯耳相習用爲風藥及補藥殺人多矣昂按附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不爲功故

仲景四逆真武白通諸湯多用之其有功于生民甚大況古入日用常方用之最多本非禁劑丹溪乃僅以爲行經之藥

而云用作補藥多致殺人言亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每訾陽藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四君子湯血虛用四物

湯虛甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆平和寬緩之劑須得
附子健悍之性行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當
病則雖暑熱時月亦可用也

水浸麪裹煨令發坼乘熱切片炒黃去火毒

用又法甘草二錢鹽水薑汁童便各半盞煮熟用

今時人用黑豆煮亦

佳畏人參黃耆甘草防風犀角綠豆童便反貝母半夏桔梗

白芨白斂中其毒者黃連犀角甘草煎湯解之黃土水亦可

解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏頭性

輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭烏附尖吐風痰

治癩癰取其鋒銳直達病所

丹溪治許白雲屢用瓜蒂梔子苦參藜蘆等劑吐之不透後用

附子尖和漿水與之始得大吐膠痰數碗

天雄補下焦命門陽虛

寇宗奭張元素皆云補上

焦丹溪曰可爲下部之佐時珍曰其尖皆向下生故下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛則屬心肺之分當用參耆

不當用
雄附矣

治風寒溼痹爲風家主藥發汗又能止陰汗側子

散側旁生宜于發散四肢充達皮毛治手足風溼諸痹

草烏頭大燥開頑痰

辛苦大熱搜風勝溼開頑痰治頑瘡以毒攻毒頑勝川烏然至毒無所釀制不可輕投

野生狀類川烏亦名烏喙

薑汁

炒或豆腐煮用熬膏名射罔傳箭射獸見血立死

白附子

燥祛風溼治面疾

辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面上百病

陽明之脈榮于面白附能去頭面游風作面脂消斑疵補肝虛祛風痰治心痛血癥諸

風冷氣中風失音陰下溼癰根如草烏之小者長寸許破

紋有節炮用

附方景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

破故紙 一名補骨脂燥補命火

辛苦大溫入心包命門補相火以通君火暖丹田壯元陽縮

小便亦治遺尿

治五勞七傷

五臟之勞七情之傷腰膝冷痛腎冷精流腎虛

泄瀉

腎虛則命門火衰不能薰蒸脾胃虛寒遲於運化致飲食減少腹脹腸鳴嘔逆泄瀉如鼎釜之下無火物

終不熟故補命門相火卽所以補脾破故紙四兩五味三婦兩肉菘二兩吳茱一兩薑煮棗丸治五更腎瀉婦

人血氣

婦人之血脫氣陷亦猶男子之腎冷精流

墮胎

出南番者色赤嶺南者

色綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良惡

甘草

唐鄭相國方破故紙十兩酒浸蒸爲末胡桃肉二十兩去皮爛研蜜和每日酒調一匙或水調服白飛霞曰破

故紙屬火堅固元陽胡桃屬水潤燥養血有水火相生之妙忌芸薹羊血加杜仲名青娥丸○芸薹油菜也

本草備要

破故紙卷

肉蓯蓉

瑣陽

窖

草

部

肉蓯蓉 補腎命滑腸

甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻故有蓯蓉之號驟用恐妨心滑大便長大如臂重主

斤許有松子鱗甲者良酒浸一宿刷去浮甲劈破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭曰今日所用多草蓯蓉功力稍劣

瑣陽補陽滑腸

甘溫補陰益精興陽潤燥養筋能興陽故能強筋治痿弱滑大便兼啖煮粥彌佳鱗甲櫛比狀類男陽酥炙之可代蓯蓉

巴戟天補腎祛風

甘辛微溫入腎經血分強陰益精治五勞七傷辛溫散風溼
治風氣腳氣水腫 根如連珠擊破中紫而鮮潔者偽也中
雖紫微有白糁粉色而理小暗者真也蜀產佳山葎根似巴
戟但色白人
或醋煮以亂之去心酒浸焙用覆盆子爲使惡丹參

胡蘆巴

燥潤腎命除寒溼

苦溫純陽入右腎命門暖丹田壯元陽治腎臟虛冷陽氣不

能歸元

同附子
硫黃

瘕痞冷氣

同茴香巴戟川
烏川棟吳茱萸

寒溼腳氣 出嶺

南番舶者良云是番萊菔子酒浸暴或蒸或炒

仙茅

燥補腎命

辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺無子心

腹冷氣不能食

溫胃

腰腳冷痺不能行

暖筋

相火盛者忌服

葉如茅而略闊根如小指黃白多涎竹刀去皮切糯米泔浸

去赤汁出毒用忌鐵

唐婆羅門始進此方當時盛傳服之多效照前製陰乾蜜丸酒服禁牛乳牛肉

許真君書云甘能養肉辛能養筋苦能養節苦能養氣鹹能養骨酸能養筋滑能養膚利苦酒服之必效也

淫羊藿

補腎命

辛香甘溫入肝腎補命門

時珍曰手足陽明三焦命門藥益精氣堅筋骨利

小便治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢不仁

手足麻木

名仙靈脾北部有羊一日百合食此藿所致故名去枝羊脂

拌炒山藥爲使得酒良

蛇牀子

補腎命去風溼

辛苦而溫強陽益陰補腎祛寒祛風燥溼治陰癰囊溼女子

陰痛陰癰

溼生蟲同
礬煎湯洗

子臟虛寒產門不閉

炒熱
熨之

腎命之病及

腰酸體痛帶下脫肛喉痺齒痛溼癬惡瘡

殺蟲止癢

風溼諸病煎

湯浴止風癰

時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子而
且有益婦人世人舍此而求補藥於遠域豈非

貴耳賤目乎

似小茴而細微炒殺毒則不辣

以地黃汁拌蒸三徧佳

惡丹

皮貝母巴豆

菟絲子

平補三陰

甘辛和平凝正陽之氣入足三陰

脾腎

肝強陰益精溫而不燥

不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

脾虛腎燥而生內熱菟絲益陰

清祛風明目補衛氣助筋脈益氣力肥健人

補肝腎之效老熱

弟少服菟絲子凡數年飲食倍常血氣盛忽因浴見背隨視隨長乃大疽也適值金銀花開飲至數斤腫遂消菟絲過服尙能作疽以此知金石藥不可不戒昂按此人或感他毒未可盡歸咎於菟絲也無根蔓延草

上子黃如黍粒得酒良淘去泥沙酒浸一宿暴乾搗末山藥

爲使

覆盆子

平補肝腎

甘酸微溫益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便

寇氏

日服之當覆

其溺器故名澤肌膚烏髭髮

榨汁塗髮不白

女子多孕同蜜爲膏治

肺氣虛寒

李士材曰強腎無燥熱之偏固精無凝滯之害金玉之品也

狀如覆盆故名

去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸葉絞汁滴目中出目眩蟲除

膚赤收溼止淚

蒺藜子 平補肝腎

苦溫補腎辛溫瀉肺氣而散肝風益精明目

肝以散爲補凡
補肝藥皆能明

目治虛勞腰痛遺精帶下欬逆肺痿乳閉癥瘕漏陰瘻潰

腎肝肺三經之病催生墮胎

刺蒺藜主惡血
故能破癥下胎

沙苑蒺藜綠色

似腎

故補腎則沙苑者爲優

炒用

亦可代茶

刺蒺藜三角有刺去刺酒拌蒸

瑞竹堂方齒牙打動

餘功略同

者蒺藜根燒灰傳之

使君子

補脾殺蟲消積

甘溫健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳便濁瀉痢瘡癬爲小兒

諸病要藥

經疏曰五疳便濁瀉痢瘡癬皆由脾胃虛弱因而

散水道利而前證盡除矣時珍曰凡能殺蟲之藥多是苦辛獨使君子榧子甘而殺蟲每月上旬蟲頭向上中旬頭橫下

本草備要
旬向下道藏云初一至初五蟲頭向上凡有蟲病者每月上旬空心食數枚蟲皆死而出也○按地黃胡麻皆殺蟲出閨蜀五瓣有稜內仁如榧亦可煨食久則油不可用忌飲熱茶犯之作瀉

益智子 燥脾腎補心腎

辛熱木牌藥兼入心腎主君相二火補心氣命門五焦之不足

心爲脾母補火故能生土

能牆精固氣

本草未載

又能開發鬱結使氣宣通

味辛能散溫中進食攝涎唾

胃冷則涎湧

縮小便

腎與膀胱相表裏益智辛溫固腎鹽水炒

同烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名

治嘔吐泄瀉客寒犯胃冷氣腹痛崩

帶泄精滌精固氣因熱而崩濁者禁用

出嶺南形如棗核用仁

砂仁 即縮砂藥官行氣調中

辛溫香竄補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛

痞脹

痞滯有傷寒下早裏虛邪入而痞者有食壅痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者須分虛實治之不宜專用利氣藥恐變爲鼓脹鼓脹內脹而外有形

痞脹惟覺痞悶而已皆太陰爲病也噎膈嘔吐上氣欬嗽赤

白瀉痢

溼熱積滯客於大腸砂仁亦入大小腸經

霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷

消食醒酒止痛安胎

氣行則痛止氣順則胎安

散咽喉口齒浮熱化銅鐵

骨哽

王好古曰得檀香豆蔻入肺得人參益智入脾得黃藥茯苓入腎得赤石脂入大小腸醫通曰辛能潤腎燥引

諸藥歸宿丹田地黃用之拌蒸亦取其能達下也經疏曰腎虛氣不歸元用爲嚮道始勝桂附熱藥爲害

出嶺

南研用

白豆蔻

宣行氣暖胃

辛熱流行三焦溫暖脾胃

三焦利脾胃運則諸證自平矣

而爲肺家本藥

肺主

本草綱要

砂仁卷二 白豆蔻

內豆蔻

草

部

氣散滯氣消酒積除寒燥溼化食寬膨治脾虛瘧疾感寒腹

白痛吐逆反冒

肺胃火盛及氣虛者禁用

白睛翳膜

白睛屬肺能散肺滯太陽經目眴

紅筋

太陽脈起目眴

番舶者良研細用

肉豆蔻

一名肉果燥脾滯腸

辛溫氣香理脾暖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒治積冷

心腹脹痛

挾痰挾食者並宜之

中惡吐沫小兒吐逆乳食不下又能滯

大腸止虛瀉冷痢

初起忌用

出嶺南似草蔻外有皺紋內有斑

紋糯米粉裹煨熟用忌鐵

草豆蔻

一名草果燥溼祛寒除痰截瘧

辛熱香散暖胃健脾破氣開鬱燥溼祛寒除痰化食治瘧癆

寒瘡

佐常山能截瘡或與知母同用取其一陰一陽治寒熱

瘡瘍

蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火散滯氣利膈痰因

寒客胃痛

滯因寒者多效

霍亂瀉痢噎膈反胃痞滿吐酸

痰飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒

故食料用之

過劑助脾熱耗氣

損目

閩產名草蔻

如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁如

砂仁而辛香氣和滇廣所產名草果

如訶子皮黑厚而稜密子粗而辛臭雖是一物微有不同麪裹煨熟取仁用忌鐵

香附

一名莎草根宣調氣開鬱

性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣藥通行

十二經八脈氣分主一切氣

人身以氣爲主氣盛則強虛則衰順則平逆則病絕則死矣經

曰怒則氣上恐則氣下喜則氣緩悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣耗此七情之氣也以香附爲君隨證而加升降

消補之藥○素問中仍有寒利三焦解六鬱

瘀鬱火鬱氣鬱
則氣收熱則氣泄名九氣

痰鬱火鬱氣鬱

血鬱溼鬱食鬱

止諸痛

通則不痛

治多怒多憂煥飲痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍

亂吐瀉腎氣腳氣癰疽瘡

血凝氣滯所致

香附一味末服

如瘡初作以此代茶潰後亦宜服之大凡瘡疽喜服香藥行

氣通血最忌臭穢不潔觸之○故古人治瘡多用五香速翹

飲○康祖左乳病癰又臆間生核痛楚半載禱張王

夢授以方薑汁製香附爲末每服二錢米飲下遂愈

吐血便

血崩中帶下月候不調

氣爲血配血因氣行經成塊者氣之凝將行而痛氣之滯行後作痛氣血

俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也錯經者

氣之亂肥人瘦多而經阻氣不運也香附陰中快氣之藥氣

順則血和暢然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰

能引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義

胎產百病能

推陳致新故諸書皆云益氣

行中有補丹溪曰天行健運不

珍曰凡人病則氣滯而餒香附爲氣分君

藥臣以參耆佐以甘草治虛怯甚速也

去毛用生則上

用麪裹煨用
煠用實火

胃弱而熱而
嘔者忌用

霍香宜去惡氣

辛甘微溫入手足太陰

肺脾

快氣和中開胃止嘔

胃弱而熱而
嘔者忌用

去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛有寒上焦壅熱
能理肺脾之氣古方有霍香正氣散

出交廣方莖有節葉微似

茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因葉多偽也

茴香

古作懷香燥補腎命門寒疝

大茴辛熱入腎膀胱暖丹田補命門開胃下食調中止嘔療

小腸冷氣癩疝陰腫

疝有七腫氣血寒水筋狐癩也肝經病不屬腎經以厥陰肝脈絡陰器也多因

寒溼所致亦有挾虛者當加參求于溫散藥中

乾溼腳氣多食損目發瘡小茴辛平

理氣開胃亦治寒疝食料宜之 大如麥粒輕而有細使者

名大茴出寧夏他處小者名小茴自番舶來實八瓣者名八

角茴香炒黃用得酒良得鹽則入腎發腎邪故治陰疝

受病于肝

見證于腎大小茴各一兩爲末豬

胞一箇連尿入藥酒煮爛爲丸服

甘松香

宣理氣醒脾

甘溫芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疳齒齦腳膝氣浮

煎湯淋洗出涼州及黔蜀葉如茅

根極繁密

用根

山柰

宣溫中辟惡

辛溫暖中辟惡治心腹冷痛寒溼霍亂風蟲牙痛 生廣中

根葉皆如生薑入合諸香用

行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒則入

血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥或蜜水炒青鹽炒則補

腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且斂其散

痰飲炒黑又能止血忌鐵時珍曰得參朮則補氣得歸地則

則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱

得梔子黃連則清降火熱得茯神則交濟心腎得茴香破故

紙則引氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇蔥白則發

汗散邪得三稜莪藴則消積磨塊得艾葉則治血氣暖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解

故服之尤效非宜於婦人不宜於男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實血未大虛者宜之不然恐損氣而燥血愈致其疾矣世俗泥於女科仙藥之一語惜未有發明及此者宣行氣

木香

宣行氣

辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝氣和脾

氣怒則肝氣上肺氣調則金能制治一切氣痛九種心痛皆

木而肝平木不尅土而脾和屬

胃脘日寒痛熱痛氣痛血痛溼痛痰食痛虬痛慄痛膈逆蓋君心不易受邪真心痛者手足冷過腕節朝發夕死嘔逆

反胃霍亂瀉痢後重

同檳榔用劉河間曰痢疾行血

則膿血自愈調氣則後重自除瘡閉痰

壅氣結痃癖癥塊腫毒蠭毒衝脈爲病氣逆裏急殺鬼物禦

瘡霧去腋臭實大腸消食安胎

氣逆則胎不安

過服損真氣

丹溪曰味辛氣

升若陰火衝上者反助火邪當用黃蘖知母少以木香佐之王好古曰本草主氣劣氣不足補也通壅導氣破也安胎健脾胃補也除痃癖癥塊破也不同如此汪機曰與補藥爲佐則補與寫藥爲君則瀉時珍曰諸氣臍鬱皆屬於肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬於脾中焦氣滯用之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則癃閉肝氣鬱則爲痛下焦氣滯用之者塞者通之也

良名青木香

今所用者皆廣木香土木香

磨汁用東垣用黃連製亦有蓋

番舶上來形如枯骨味苦黏舌者

良薑

宣燥暖胃散寒

辛熱暖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛

凡心口一點痛俗言心氣痛非也乃胃脘

有滯或有蟲及因怒

因寒而起以良薑酒洗七次香附醋洗

七次焙研因寒者薑二錢附一錢

因怒者附二錢薑一錢寒

怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙鹽少許服初

梁繩患心脾痛夢神授此方二味等分服後入各炒方服霍亂瀉

痢吐惡噎膈瘡瘍冷癖肺胃熱者忌之

出嶺南醫子名

紅荳蔻溫肺散寒醒脾燥溼消食解酒

東垣脾胃藥中常用之

並東壁

土炒用

草荳

一作撥除胃冷散浮熱

辛熱除胃冷溫中下氣消食祛痰治水瀉氣痢

牛乳點臘

虛冷腸

鳴亦入大冷痰惡心嘔吐酸水痃癖陰疝辛散陽明之浮熱

腸經

本草綱要
卷之三
治頭痛

偏頭痛者口含溫水隨左右以末吹一字入鼻效

牙痛

寒痛宜乾薑草荳細辛熱痛宜石膏牙硝

風痛宜阜角殭蠶蜂房二烏蟲痛宜石灰雄黃

鼻淵多服泄真氣動脾胃之火損目出南番嶺南亦有類椹子而長青色去挺用頭醋浸刮淨

皮粟免傷人肺

烟草

新增宣行氣辟寒

辛溫有毒治風寒溼痹滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使醉醉能使醒飢能使飽飽能使飢人以代酒代茗終身不厭故一名相思草然火氣薰灼耗血損年人自不覺耳閩產者佳

烟筒中水能解蛇毒

金銀花

瀉熱解毒

甘寒入肺散熱解毒

清熱即

是解毒補虛

凡物甘

療風養血止渴

溪丹

曰癰疽安後發渴黃耆六一湯吞忍冬

丹

九切當忍冬養血黃耆補氣渴何由作

治癰疽疥癬楊梅惡

瘡瘍潿血痢五種尸疰

經冬不凋一名忍冬

又名左

纏簾花葉

同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並妙

忍冬酒治癰疽發背一

切惡毒初起便服奇效

乾者亦可不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二碗煎至

丹

一碗再入酒一碗畧煎分三服一日一夜喫盡重者日二劑

服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前分兩酒煮曬乾同

甘草爲末以所煮餘酒打糊爲丸陳藏器云熱毒血痢濃煎

丹

服之爲末糖調

常服能稀痘

蒲公英

一名黃花地丁瀉熱解毒

甘平花黃屬土入太陰陽明

脾

化熱毒解食毒消腫核耑治

乳癰

乳頭屬厥陰乳房屬陽明同

忍冬煎入少酒服搗敷亦良

疔毒亦爲通淋妙品

諸家

不言

丹

蒲公英卷二

黃花地丁

杜牛膝

苦草

邵

治淋試擦牙烏鬚髮

瑞竹堂有還少丹方取其通腎東垣曰苦寒腎經君藥

白汁塗惡

之甚驗

刺人手觸之成疾名狐尿刺

盛夏孕育游諸物上必遺精汁乾久則有毒慘痛不眠百療難效取汁厚塗

卽愈于金方

極言其功

葉如萐躅花如單瓣菊花四時有花花能飛

鄭方升曰一莖兩花高尺許者掘下數

絮斷之莖中有白汁

尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服

治膈噎

如神

紫花地丁

瀉熱解毒
不瀉

辛苦而寒

瘡發背疔腫癰癰無名腫毒

葉如柳而細

夏開紫花結角生平地者起莖生溝壑者起蔓

杜牛膝

一名天名精一名地菘瀉熱吐痰破血解毒

甘寒微毒能破血

一婦產後口渴氣喘面赤有斑大便泄小便祕用行血利水藥不效用牛膝濃煎膏

飲下血一桶能止血吐痰除熱解毒殺蟲治乳蛾喉痺砂淋小便通而愈

血淋良方云濃煎加乳麝少許神效

小兒牙關緊閉急慢驚風不省人事者絞汁入好酒

灌之卽甦以醋拌渣傅項下

服汁吐瘧痰

驚風服之亦取其吐痰

漱汁止牙痛搗之

傅蛇蟲螯毒

根白如短牛膝地黃爲使

煎湯洗痔瘡塞患處良

鶴蠶

瀉殺蟲

苦辛有小毒殺五臟蟲治蛇咬腹痛

面白唇紅時發時止者爲蟲痛肥肉汁調末服

沈存中筆記云是杜牛膝子

或曰非也別是一種最粘人衣有狐氣

炒熟則香

山荳根

瀉熱解毒

苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱

心火降則不灼肺而金清肺與大腸

相表裏肺金清
則大腸亦清

消腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛含之
嚥汁喘滿

熱敷腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷療

人馬急黃血熱極所致

苗蔓如豆經冬不凋

牛蒡子

一名鼠粘子一名惡實瀉熱解毒

辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利二便行

十二經散諸腫瘍瘍之毒利腰膝凝滯之氣

性冷而滑利痘證虛寒泄瀉者

忌服

實如蒲萄而褐色酒拌蒸待有霜拭去用根苦寒竹刀

刮淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈搗和豬脂貼瘡腫及反

花瘡

肉反出如花狀

山慈菰

鴟熱解毒

甘微辛有小毒功專清熱散結治癰瘍疔腫瘰癧核塗

解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷根與慈菰小蒜相類去毛殼用

王樞丹中用之廣筆記云出處州遂昌縣洪山無毛少眞者有毛誤也

漏盧瀉熱解毒

鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經
下乳排膿止血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背首及預解時行痘疹毒取其寒勝熱又能入陽明故也出閩中莖如油麻枯黑如漆者真甘草拌蒸連翹爲使

蕷衆瀉熱解毒

味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治崩中帶下產後血氣脹

痛破癰瘕發斑痘

王海藏快斑散用之

化骨哽

能軟堅

殺三蟲

根似狗

脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞解毒軟堅

以此

浸水缸中日飲

其水能辟時疾

射干

瀉火解毒散血消痰

苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自解故能消

心脾老血行太陰厥陰之積痰

肺脾肝

治喉癧咽痛爲要藥

搖汁

醋和噙之引涎干金方治喉癧有烏扇膏治

結核痕痴便毒瘡母

鼈甲煎丸治瘡母用之皆取其

降厥陰通經閉利大腸鎮肝明目

扁竹花根也

葉橫鋪如烏羽及扇

故一名烏葵

泔水浸一日籜竹葉煮半日用

續隨子一名千金子瀉行水破血解毒

扇烏葵

辛溫有毒行水破血治癰瘕痰飲冷氣脹滿蠭毒鬼疰利大

小腸下惡滯物塗疥癬瘡

玉樞丹用之治百病多效驗疏曰乃以毒治毒之功

去殼

取色白者壓去油用

時珍曰續隨子大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相似長于利水用之得法皆

要藥

馬蘭子

一名蠶實瀉溼熱解毒

甘平治寒疝喉痺癰腫瘡癩婦人血氣煩悶血運崩帶利大小腸久服令人瀉叢生葉似薤而長厚結角子如麻大赤色有稜炒用治疝用醋拌根葉同功

蓖麻子

瀉通竅拔毒出有形滯物

辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風不遂渴

斜搗餅左貼右
右貼左卽止

口噤

鼻窒耳聾

搗爛綿裹

塞耳塞鼻喉痹舌脹

油作紙燃烟薰

能利水氣治水癥浮腫

研服當下青黃水

壯人只可五粒

能出有形滯物治

針刺入肉

搗傅傷處頻看刺

出

竹木骨哽

蓖麻子一兩凝水

石二兩研勻以一

捻置舌根噙

噙自然不見

胞胎不下

蓖麻一粒巴豆一粒麝香一分貼臍

中併足心胎下卽去之

若子腸挺出

者搗膏塗

能追膿拔毒傅療癰惡瘡外用屢奏奇功

鵝鵝油能引藥

頂心卽收

氣入內蓖麻油能拔病

氣出外故諸膏多用之然有毒熱氣味頗近巴豆內服不可

輕率

去皮黃連水浸每晨用

浸水吞

形如牛蜱黃褐有斑

鹽水煮去皮研或用油忌鐵

食炒豆犯之脹死

白頭翁

瀉熱涼血

苦堅腎寒涼血入陽明血分

腸

胃大治熱毒血痢

仲景治熱痢有白頭翁湯

藥陽明多除風去癆止血定痛通經利便下乳催生

俗云穿山甲王

不留婦人服之乳長流

治金瘡

止血散

出竹木刺孕婦忌之花如

鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

冬葵子

滑腸利竅

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便消水腫

用榆皮等分煎服

通關格下乳滑胎

秋葵復種經冬至春作子者

名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥蜀葵花赤者

治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關

格皆取其寒潤滑利之功也

白鮮皮

通祛風溼

氣寒善行味苦性燥

行水
改燥

人脾胃除溼熱兼入膀胱小腸行

水道通關節利九竅爲諸黃風痺之要藥

一味白鮮皮湯治產後風時珍曰世

醫止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中腫痛

一昧白鮮皮湯治產後風時珍曰世
與膀胱所致

根黃白而心實取皮用惡桑螵蛸桔梗茯苓草薢

草薢通祛風溼補下焦

甘苦性平入足陽明厥陰

胃肝

祛風去溼以固下焦

陽明王肉屬溼厥陰

主筋屬風補肝虛去風

堅筋骨

風溼去則筋骨堅

益精明目治風寒溼痹腰

痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡

諸病皆陽明溼熱流入下焦草薢能除分清飲史國信云若欲興陽先滋筋力

若欲便清先分肝火

萬金護命方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因大腸秘熱不通水液只就小腸大腸愈加乾竭甚則身熱心

燥濕水卽重證也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷膩之物
積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數
而痛與淋證清而痛不同宜用草薢一兩鹽水炒爲末每服
二三錢使水道轉入大腸仍以蔥湯頻洗穀道令氣得通則
便數及痛自減也○腎有二竅
淋證出於溺竅濁證出於精竅

有黃白二種黃長硬白

虛軟軟者良薏苡爲使畏大黃柴胡前胡忌茗齋

時珍曰草薢菝葜上

苡苓形不同而主治不甚相遠豈一類數種乎草薢根細長淺白菝葜根作塊亦黃

土茯苓通祛溼熱補脾胃

甘淡而平陽明主藥

胃大腸

健脾胃祛風溼脾胃健則營衛從

風溼除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘攣楊梅瘡毒

楊梅

瘡古方不載明正德間起於嶺表其證多屬陽明厥陰而兼
及其他經蓋相火寄於厥陰肌肉屬於陽明故也醫用輕粉劫
劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡卽乾愈然毒氣
竄入經絡筋骨血脈枯槁筋失所養變爲拘攣癰漏瘻致廢

痼土茯苓能制輕粉之毒去陽明溼熱用一兩爲君苡仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯療癰瘍瘡腫溼鬱而爲熱營衛不和則生脈是也土茯苓淡能滲甘能補患膿瘍者煎湯代茶甚妙大如鴨子連綴而生俗名冷

飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

白斂

瀉火散結

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌止痛

治癰疽瘡面上疱瘡金瘡撲損

箭鏃不出者同丹皮或半夏爲末酒服

斂瘡

方多用之

故名每與白芨相須

搽凍耳

同黃藥末油調

蔓赤枝有五葉根如

卵而長三五枚同窠皮烏肉白一種赤斂功用皆同

鄭奠一日能治

溫瘡血痢腸風
痔瘻赤白帶下

本草綱要
預知子 補勞瀉熱

苦寒補五勞七傷治痘癬氣塊天行溫疾蛇蟲咬毒殺蟲療
蠱綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而預知之故耳利便催生
絳生子如阜角褐色光潤出蜀中云亦難得

旱蓮草 一名鯉腸又名金陵草補腎

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏髭千金云當及時多收其效甚速經疏云性涼不益脾胃故子金方金陵煎九用薑汁和劑 苗如旋覆實似蓮房斷之有汁須臾而黑熬膏良

劉寄奴草 滌破血止血

苦溫破血通經除癰下脹止金瘡血多服令人吐利 一莖

直上葉尖長糙澀花白蕊黃如小菊花有白絮如苦買絮子

細長亦似苦買子莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時曾射一蛇明日見童子林

中搗藥問之答曰吾王爲劉寄奴所傷合藥傅之裕曰王何不殺之童曰寄奴王者不可殺也叱之不見乃收藥回每遇

金瘡傅

之立愈

馬鞭草

瀉破血消脹殺蟲

味苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癥瘕瘻瘍陰腫

搗塗

墟陌甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫花穗如車前草
類蓬蒿而細根白而小用苗葉

穀精草

輕明目

辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功在菊花

之上亦治瘧癥齒痛陽明風熱收穫後荒田中生葉似嫩

秧花如白星

小兒雀盲者羯羊肝一具不洗竹刀割開入穀精煮熟食之或作丸茶下

青葙子

一名草決明瀉肝明日

味苦微寒入厥陰

肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳蟲疥惡

瘡瞳子散大者忌服

能助陽火

類雞冠而穗尖長

決明子

瀉肝明日

甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決明之名又曰

益腎精

瞳子神光屬腎日華曰明目甚於黑豆作枕治頭風

狀如馬蹄俗呼馬蹄決

明搗碎煎惡大麻仁

麥實宣溫中

辛溫溫中明目耐風寒下水氣

時珍曰古人種蓼爲蔬收子入藥今惟酒麴用其汁耳以

香蓼青蓼
紫蓼爲良

有香蓼青蓼紫蓼赤蓼木蓼水蓼馬蓼

馬勃

輕解熱外用傅瘡

辛平輕虛清肺解熱

東垣普濟消中用之散血止嗽治喉痹咽痛

吹喉

中良或加白礬或硝掃喉取吐痰愈鼻衄失音外用傅諸瘡良生溼地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取粉刷

木鱉子

瀉熱外用治瘡

苦溫微甘有小毒利大腸

瀉痢疳積癰癧瘡痔乳癰蚌毒

消腫追毒生肌除點

音旱黑斑

專入外科核屬如鱉綠色揀去

油者能毒狗

萊菔俗作蘿蔔宣行氣化痰消食

辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中化痰散瘀消食

丹溪曰氣升則

食自降

治吐血衄血嗽吞酸利二便解酒毒制麴毒豆腐積

昔有人病夢紅裳女子引入宮殿小姑歌云五靈樓閣曉玲瓏

十

道士云此犯大麥毒也女子心神小姑脾神醫經萊菔

十一

制麴毒遂以藥併萊菔治之果愈腐漿見萊菔則難收

生搗

治噤口痢止消渴塗跌打湯火傷多食滲血故白人髡髮

服何

首烏地黃者忌之生薑能制其毒○夏月食其菜數斤秋不

患痢冬月以菜葉攤屋瓦上任霜雪打壓至春收之煎湯飲

十二

治病得效有人避難入石洞中賊燒烟薰之口含萊菔一塊

十三

烟不能毒嚼汁濡水飲之亦可王荊公患偏頭痛搗萊菔汁

十四

仰臥左痛注右鼻右痛注左鼻或

十五

兩鼻齊注數十年患二注而愈

萊菔子辛入肺甘走脾

長於利氣生能升熟能降升則吐風痰散風寒寬胸隔發瘡

疹降則定痰喘欬嗽調下痢後重止內痛

皆利氣之功丹溪曰萊菔子治痰有

衝牆倒壁之功食醫心鏡研

湯煎服治氣嗽痰喘吐膿血

炒用

白芥子

宣利氣豁痰

辛溫入肺通行經絡溫中開胃發汗散寒利氣豁痰消腫止

痛

痰行則腫消氣行則痛止爲末醋調傅消癰腫

治欬嗽反胃痺木腳氣筋骨諸病

痰阻

氣滯久嗽肺虛人禁用

丹溪曰痰在脇下及皮裏膜外非此不能達行古方控涎丹用之正此義

韓愈三子養親湯白芥子主痰下氣寬中紫蘇子主氣定喘止嗽萊菔子主食開痞降氣各微炒研看病所主爲君治老人痰嗽喘

滿懶食

北產者良煎湯不可過熟熟則力減芥菜子豁

痰利氣主治略同

蔓菁子

卽蕪菁瀉熱利水明日

苦辛瀉熱解毒利水明目

古方治目用之最多

治黃疸

搗研濾服

腹脹

搗研濾汁飲或

吐或利腹中癥瘕積聚小兒血痢

蜜和汁服

一切瘡疽

凡瘡疽搗

傅皆良醋

自寬得汗愈

癰癧冬取根用

傅蜘蛛咬毒

陳藏器日蔓菁園中無蜘蛛

李時珍曰蔓菁子可升可降

能汗能吐能下能利小便明日

解毒其功甚偉世罕知用何哉

根搗傅陰囊腫大如斗未

服解酒毒和雲薹根

油菜

搗汁雞子清調塗諸熱毒

單鹽搗不用糞

薹亦可

薹

宣散血消腫

辛溫散血消腫搗貼乳癰丹毒

孫思邈曰搗貼丹毒隨手即消其效如神

動疾發

瘡卽油菜

道家五葷之一子與葉同功治產難

馬齒莧

一名九頭獅子草瀉熱散血

酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸林疳

海上方搗汁合雞血子日服治赤白痢

癬惡瘡

多年惡瘡傳兩三編卽瘻燒灰煎膏塗禿瘡溼癬

小兒丹毒

搗汁飲以利腸津塗之

滑產

葉如馬齒有大小二種小者入藥性至難燥去莖用

亦忌魚鰐同食

甜瓜蒂

宣涌吐淡豉赤小豆並吐藥

苦寒陽明

胃 吐藥能吐風熱痰涎上膈宿食

吐去上焦之邪經所謂其高者

因而越之在土者涌之木鬱達之是也越以瓜蒂淡豉之苦涌以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐而胃弱者代以參蘆朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗法古方多有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫昂按汗吐下和乃治療之四法仲景瓜蒂散梔豉湯並是吐藥子和治病用吐尤多丹溪治許白雲大吐二十餘日治小便不通亦用吐法甚至用四物四君以引吐成法具在今人惟知汗下和而吐法絕置

本草備要
不用遇邪在上焦及當吐者不行涌越致結塞而成壞證輕病致重重病致死者多矣時醫背棄古法枉人性命可痛也

夫

治風眩頭痛懊憹不眠癲癇喉痺頭目溼氣水腫黃疸或

赤小豆煎或吹

鼻中取出黃水溼熱諸病上部無實邪者禁用能損胃耗氣語曰大吐亡

陽大下亡陰凡取吐者須天氣清明巳午以前令病人隔夜勿食卒病者不拘

類編云一女子病齁喘不止遇道人教取瓜蒂七枚爲末調服其汁卽

吐痰如膠黏三進而病如掃

又名白瓜鴻熱補脾

冬瓜

寒瀉熱甘益脾利二便消水腫

冬瓜任

止消渴

苗葉皆

散熱

毒癰腫

切片傅之丹溪曰冬瓜性急而走久病陰虛者忌之昂按冬瓜日食常物於諸瓜中尤覺宜人且味甘而不辛何以見其

子補肝明目

凡藥中所用瓜

性急而走乎

絲瓜

鴻熱涼血宣通經絡

甘平

蘇頌
曰冷

涼血解毒除風化痰通經

行血脈

老者筋絡貫
穿象人經絡

故可借其氣以引之

消浮腫稀痘瘡

出不快者燒存性入硃砂蜜水調服

治腸風崩漏疝

痔癰疽滑腸下乳

茄根

瀉散血消腫

散血消腫煮汁漬凍瘡

史國公藥酒用白茄根爲君茄科以馬尿浸三日曬炒爲末點牙卽落

茄子甘寒散血寬腸動風發病