

午13

9

共2册

溫熱暑疫全書

古吳周禹載先生輯

溫熱暑疫
全書

光緒己丑年季夏埽葉山房重刻

自序

醫之道難矣哉凡病傷寒最重溫熱尤烈傷寒僅在
一時溫熱暑疫每發三季爲時旣久病者益多苟不
明其源溯流不得清也不辨其類療治不得當也則
溫熱暑疫皆熱證也燎原之下竟乏清涼一滴人無
今昔性有異同神酣往聖志切琳瑯俊以一隙微明
靜中索照焉夫上古聖人首重色脈以營之未交已
交定人生死片言已畢中古聖人耑論穀氣盛衰定
人生死片言已畢仲景叔季聖人也旣立方論復出
不盡之藏緯以膀胱之傷與絕定人生死先後合符

了無剩義矣乃仲景於傷寒論中溫熱森森具載黃
芩白虎等湯是其治也後之學者苟能引伸此意便
可變化不窮神明千載不能細察其理反執以爲治
傷寒之法盍思本湯旣無外解之功又無內奪之力
聖人立法果何謂乎自晉以來疑鬼疑蜮陋沿無已
如崔文行解溫用白朮烏頭細辛桔梗四味更加附
子名老君神明散更加螢火名務成子螢火丸熱藥
相投以火濟火誰其辨諸如仲景書謂太陽病發熱
不惡寒而渴者爲溫病朱肱活人書謂發熱惡寒頭
疼身痛者爲溫病已悖聖訓矣又云春秋發斑欬嗽

爲溫病至風溫治在少陰其所立五方如葳蕤湯知
母葛根湯防已湯栝樓根湯葛根龍膽湯風火相熾
燔灼無休復改聖散子仍用附子表裏香燥同之東
坡先生在黃州時頗稱其效豈知朱肱已三易其方
用敗毒散而遠熱藥然厥功奚減厥罪吳氏謂傷寒
壞病更遇溫熱爲溫病潔古老人傷寒名家也其子
雲岐以傷寒過經不解者爲溫病指叔和之言爲仲
景之文趙嗣真謂仲景云重感異氣變爲溫病汪機
謂仲景云遇溫氣爲溫病遇溫熱爲溫毒竟不顧聖
經之載於方策者何曾有此一語巢氏病源遵崔文

行解散法一日用摩膏火灸二日用鍼解散三日復汗之四日用藜蘆丸瓜蒂散吐之五六日解未了者復鍼之七日熱已入胃雞子湯下之遂使龐安常自撰微言一以和解爲主奉爲靈寶少移則蹶巢龐比匪何極李思訓亦宗和解王海藏稱其當宋全盛明哲莫踰擬非其倫矣丹溪長於溫熱善用涼藥溫熱遇之自能解散要非有斟酌於其間也東垣不善外感長於內傷乃從內經悟出冬溫春溫二義誠暗中一大炬嘉言極口歎頌真先得我心者矣迨劉河間傷寒直格於熱病每多入理深談然混在正傷寒

中在人眼光採擇不免金屑雜於泥沙者歟至明季
方中行著傷寒條辨可謂直登仲景之堂獨開生面
惜其論溫熱亦分陰分陽似可用熱遂爲嘉言所宗
嗟乎病名溫熱自需寒涼乃千百年來盈庭聚訟先
後支吾陽春寡和於漢庭墳笮迭奏於晉室良由來
派不清復無面牆體認誠習焉而不察耳不然豈諸
公各自名家乃甘悖聖矩如是耶若夫夏月暑證卽
金匱中濕暍氣蒸之病也潔古東垣以動靜分陰陽
動而得之爲陽用白虎靜而得之爲陰用大順冷香
諸劑豈知夏月杲杲炎威有陽無陰動靜不甚相遠

惟多食冰果冷物及恣意房幃致傷太陰少陰者熱藥可以暫用豈得視溫熱之味爲通行之藥乎漕憲北海林夫子爲一代偉人醫學宗匠俊立雪程門三五年間極蒙提命因授所刻明計部張鳳達治暑書申明理蘊精確不磨雖有小疵不掩大德誠可振聳矚於千古者也至叔和云四時不正之氣感則爲疫不知非時不爲厲氣僅爲寒疫而大疫之沿門闔境傳染相同者允在兵荒之後尸濁穢氣充斥道路人在氣交感之而病氣無所異人病亦同所以月令於孟春掩骼埋胔不敢或後者聖王早慮及此耳非徒

澤及枯骨也後世治疫之法未有定見如嘉言上焦
如霧升逐解毒中焦如漚疏逐解毒下焦如瀆決逐
解毒俟其營衛旣通乘勢追拔勿使潛滋暗長於未
盡之時此固不易之論然求其反覆盡義變態直窮
老長吳又可之言別無依傍也俊幸生明備不安苟
且日引光明之藏志披榛莽之途輯仲景傷寒論三
注金匱補注之餘先將溫熱暑疫四證釐訂經文采
集方論無背聖法有合病情各自成帙蒙藩憲丁夫
子因戊午年時疫盛行憫編戶之疾苦如痾瘵之乃
身遂下詢疫所自始與所爲治惻然嘆曰嗟乎安得

明此理者數十輩循行救治俾在火輪火樹夢魘心
迷者一旦提置冰山雪竇之中奚止飲醍醐而稱快
哉命急付棗以公同志康熙己未辜月吳門周揚俊
禹載識

溫病方論卷一

吳門周揚俊禹載輯

後學

薛雪生白

吳蒙正功

里校

太陽病發熱而渴。不惡寒者爲溫病。

周注溫病由伏邪自內發出一達於外表裏俱熱。

熱勢旣壯鬱邪耗液故發而卽渴其表本無邪鬱。

內方喜寒故不惡寒延至三五日間或腹滿或下。

利者卽此證也與傷寒之先表後裏者大異然獨。

係太陽以未顯他經之證明自少陰發出爲表裏。

也。

若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠。睡鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時瘈瘲。若火薰之一逆。尙引日。再逆促命期。

方注灼熱。謂熱轉加甚也。風溫。謂於溫病有風也。陰陽俱浮。太陽本浮。而風溫皆陽。故上下皆見浮也。自汗出。亦衛受傷也。身重多眠。睡鼻息必鼾。語言難出者。風擁則氣昏。熱甚則氣鬱也。小便不利者。太陽主膀胱。而風溫皆陽。下則反攻。徒亡其津液。而膀胱之氣傷也。直視者。太陽之筋支者爲目。

上綱故不轉睛而上竄也。失洩言小便甚失其常
度也。火灸熨之類也。微言攻之微則變亦微。發黃
者。火熱則土燥故其色外奪也。劇言攻之劇則變
亦劇。如驚癇時瘦癡者。火盛熱極而生風也。薰亦
火劫也。一逆言乍悞也。尚引日言猶可俄延再逆。
言復悞也。促命期言天枉人之天年。其致警之意
深矣。

周注此脩緊承上文云。若發汗已。身灼熱者。名曰
風溫。是仍太陽病溫。誤發其汗。與更感於風者自
是不同。然亦名風溫何也。既曰太陽。不卽顯少陰

證惟悞汗則其證本溫。復以辛熱之藥汗之。則陰
津外出。表裏增熱。脈必至尺寸俱浮。正以風與溫
混。腎水不能獨沉。其證自汗。身重。腎本病也。多眠
睡。鼻息鼾。語言難。腎本病也。始先太陽。因汗使少
陰之候同時荐至。危且殆矣。古律垂戒云。風溫治
在少陰。不可發汗。發汗者死。豈知太陽亦不可發
汗。發汗則亦同於風溫之少陰乎。緣醫者誤認爲
傷寒。而用正汗藥也。若不汗而誤下者。傷膀胱之
氣化。小便不利。津液大傷。直視失溲。一府一藏同
時兩絕矣。至誤被火劫者。微則熱傷營氣。而熱瘀

發黃。劇則熱甚。風生而驚。癇瘕。蓋因亂其神明。擾其筋脈也。然則於三者之中。一逆已待斃。再犯則立危矣。喻嘉言論內經刺熱論。溫首引太陽之脈色榮顴骨。榮未交曰。今且得汗待時而已。與厥陰爭見者死。期不過三日。其熱病內連腎。少陽之脈色榮頰前。榮未交曰。今且得汗待時而已。與少陰脈爭見者死。互言得汗。非發汗也。故聖人專論穀氣。腎中精勝。乃汗則生。腎中虛甚。更熱則死。其旨至矣。盡矣。仲景復出不盡之藏。更視膀胱以緯之。視小便不利。則膀胱傷甚。直視失溲。命門所藏。

之精不能照物。神髓涸矣。瞳子高爲太陽不足。戴眼爲太陽已絕。已絕者其足不可屈伸。是以中風暴病。多絕膀胱。不識人者。風溫扼要。首視膀胱。未有膀胱不絕而腎水先絕者也。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之。

周注黃芩湯。治溫本藥也。明言太少二陽。何不用二經藥。非傷寒也。傷寒由表入裏。此則自內發外。無表何以知太少二陽。或脇滿。或頭痛。或口苦引飲。因不惡寒而卽熱。故不得謂之表也。如傷寒合

病皆表病也。今不但無表，且有下利裏證。傷寒協熱利，必自傳經而入。不若此之卽利也。溫何以卽利，外發未久，內鬱已深，其人中氣本虛，豈能一時盡洩於外，勢必下走作利矣。

黃芩湯

黃芩 二兩

甘草 二兩

芍藥 二兩

大棗 擘 十二枚

右四味以水一斗煮取三升，去滓，溫服一升，日再

服，夜一服。若嘔者，加半夏半升，生薑二兩。

黃芩加半夏生薑湯

黃芩 三兩

甘草 二兩

芍藥 二兩

大棗 十二枚

半夏 半升

生薑 三兩

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

周注黃芩滌熱故為溫利主藥以能泄熱也然用芍藥者性酸寒深入陰分一泄一收熱去而利止耳取甘棗者和中也膀胱與膽二府既病胃無獨安之理至有嘔明有痰飲結聚非薑半不除薑半辛燥非伏氣所宜而去嘔則有殊功也况以芩為君又何長乎

三陽合病。脈浮大。上關上。但欲眠。睡目合則汗。

方注太陽脈浮。陽明脈大。關上乃少陽之部位。故曰三陽合病。但欲眠。睡者。熱聚於膽也。目合則汗者。少陽少血。虛則不與陽和。寐屬陰。故盜汗出也。周注溫氣發出。乃至三陽皆病。其邪熱溷實。不言可知。故其脈浮大也。憶邪伏少陰時。則尺脈亦已大。今因由內發外。由下達上。而浮大見於關以上。故曰上關上也。邪雖上見陽位。少陰之源未靖。則欲眠尙顯本證。而目合則汗。卽爲盜汗。又顯少陽本證。何以獨見少陽。因母虛子亦虛。而少陰邪火。

與少陽相火同升燔灼也。所以稍異熱病者。但目合則汗不似熱病之大汗不止也。然何以不言大陽陽明二經證。以浮爲太陽經脈大爲陽明經脈也。治法當以小柴胡去人參薑半加芍藥爲主。

師曰。伏氣之病。以意候之。今月之內。欲有伏氣。假令舊有伏氣。當須脈之。若脈微弱。當喉中痛。似傷非喉痺也。病人云。實咽中痛。雖爾。今復欲下利。

周注於伏氣之時。見伏氣之病。而脈得微弱。則是少陰脈也。其人腎氣虛者。不及於陽。而卽發於陰。以少陰脈本循喉也。故將發必咽痛。至發後則痛。

極似傷矣。豈可認爲痺證。而誤治耶。然咽痛勢已發於上。殊不知腎司開闔。陰熱上升。豈遂盡泄。故必疾趨後陰。而下利可預知也。

少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差者與桔梗湯。

周注伏氣發出少陰之經。必咽痛者。不必言矣。先與甘草湯以緩其上升之勢。更與桔梗湯以開其怫鬱之邪。亦不必言矣。但伏氣爲重證。少陰爲至虛。仲景輕輕先試。不用黃芩本湯者。夫豈無故。以纔發少陰。止見咽痛。無胸滿心煩等症也。無下利

嘔渴等症也。欲用他藥。從何入手。故二三日間。姑就咽痛連舉二湯。使服之痛止。則少陰之邪先已去其大半。後有證見。隨之投藥。此聖人明示不可妄治之道也。

甘草湯

甘草 二兩

右一味以水三升煮取一升半。去滓溫服。七合。日二服。

周注少陰之脈循喉嚨。邪熱客之。能無痛乎。正挾少陰之火上升也。主甘草者。甘能治熱火也。

桔梗湯

桔梗 一兩

甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服

周注設服前湯而不除非藥之不勝病也正以少陰之火挾邪上攻則并其母亦病故加桔梗開之而自無不愈矣

少陰病得之二三日已上心中煩不得臥黃連阿膠湯主之。

周注伏邪未發津液先已暗耗今得之二三日已上雖陰火不升未見咽痛等證而心煩不臥已知

陰血消耗故令芩連祛熱膠芍滋陰兩得之矣

黃連阿膠湯

黃連 四兩

黃芩 二兩

芍藥 二兩

雞子黃 二枚

阿膠 三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內入膠
烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服
周注裏熱當祛之內燥須滋之然滋之而即得其
潤祛之而適滌其熱惟聖人合宜也心煩故主黃
連佐以黃芩則肺胃之邪俱清然熱甚以消少陰
之水水源既燥津液有不匱乏者乎雞子黃阿膠

深益血分之味。以滋其陰。連苓得此功莫大焉。况
加芍藥以斂消燦之心氣。兼以入肝。遂使煩者不
煩。不臥者臥矣。

法三陽合病大柴胡湯或雙解散

注若少陽經有客邪而從厥陰兩額傍痛寒熱口
苦宜小柴胡去入參薑中加栝萸根有嘔者但土

右五味以水煎之...
 如虛小者內洋子...
 煎法與前法...
 煎不燥皆用矣...
 煎法藥以煆...
 煎益血本之利...

春溫集補證治并方

凡溫病發必渴而煩擾。脇滿口苦。惡熱而不惡寒。明係自內發出。更無表證。雖經絡不同。必先少陽。以春行風木之令也。

一法少陽陽明合病。裏證多者。承氣湯。

一法三陽合病。大柴胡湯。或雙解散。

一法若少陽經有客邪而發。脈弦。兩額傍痛。寒熱口苦。宜小柴胡去人參薑半。加括萋根。有嘔者但去人參。

一法脈微緊。兼惡寒頭痛。宜梔子豉湯。或益元散加

溫熱暑病全書 卷一
葱豉薄荷。熱甚涼膈散去大黃朴硝加葱豉。

一法頭痛如破。暴感外邪。宜葛根葱白湯。散邪後用黃芩湯。

一法脈洪大而數。外熱譫語。熱在三焦也。三黃石膏湯。

一法凡應下證。下後熱不去。或暫解復熱。再下之。

一法下後熱不止。脈瀦咽痛。胸滿多汗。熱傷血分也。葶藶苦酒湯吐之。

一法裏熱已甚。陽邪怫鬱。作戰而不能汗出。雖下證未全者。宜涼膈散。

法腹滿煩渴。脈沈實者。二承氣湯選用。勢劇者。合黃連解毒湯。

附風溫

一法倘溫病少陰伏邪發出。更感太陽客邪。名曰風溫。必陽脈浮滑。陰脈濡弱。發熱咽痛口苦。但微惡寒者。黃芩湯加桂枝石膏。或以葱豉先撤其外。後用黃芩湯。甚則葳蕤湯加減。

一法本太陽病。發熱而渴。誤發汗。身灼熱者。亦名風溫。脈陰陽俱浮。如前證。用麻黃升麻湯。去二麻薑朮。按誤汗風溫一證。仲景不出方者。以爲太陽少

陰同時荐至。危於兩感。去生甚遠也。

附冬溫

一法冬時有非節之暖。未至而至。卽爲不正之氣。獨冬不藏精之人。腎氣外泄。腠理不固。溫氣襲人。感之爲病。此爲冬溫。脈必寸洪尺數。或實大。心煩嘔逆。身熱不惡寒。或頭疼身重。面腫咳嗽。咽痛下利。與濕無異。而時令不同也。宜陽旦湯加桔梗茯苓。法若有寒。食停滯。加厚朴溫藥一味。以溫散其中。黃芩涼解其外。卽仲景陰旦湯之意也。

一法若先感溫氣。卽被嚴寒遏抑。則發熱而微畏寒。

汗不出而煩擾。陽旦加麻黃石膏發之。

一法醫視冬溫。每有誤認傷寒。辛熱發汗。致令發斑成毒者。當以升麻葛根湯加犀角黑參。或犀角黑

參湯。

一法更有辛熱發汗。徒耗津液。裏熱益甚。胸腹滿悶。因誤用下藥。反發熱無休止。脈來澀。此陰血受傷也。急宜葶藶苦酒湯探之。以收陰氣。泄邪熱。若服後熱勢轉劇。神氣昏憤。讖語錯亂者。必不救也。冬溫爲病。亦自不一。當各隨見證治之。凡冬溫之毒。大便泄而讖語。脈虛小。手足冷者。皆不治也。

附溫瘧

一法春時溫病未愈。適復感寒。忽作寒熱者。溫瘧也。陰陽例云。脈陰陽俱盛。重感於寒。變爲溫瘧。其證寒熱交作。胸脇滿。煩渴而嘔。微惡寒者。小柴胡去參半。加括蕁根。石膏。

一法無寒但熱。其脈平。骨節煩疼。時嘔者。黃芩加生薑湯。至如內經所言。先熱後寒之溫瘧。乃得之冬中於風。寒氣藏骨髓之內。至春陽氣大發之時。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓爍。肌肉消。腠理發泄。或有勞力。邪氣與汗共併而出。此病藏於腎。自內

津外者也。如是則陰氣虛而陽邪盛。故爲熱。熱盛則必衰。衰則氣反而復入。入則陽虛。陽虛則又寒矣。故先熱後寒。名曰溫瘧。治宜人參白虎湯。周禹載曰。或有客邪。則必先微惡寒。繼大熱。熱而後大寒者也。本湯中畧用桂枝。此伏邪自發之溫瘧。與溫病復感外邪之溫瘧。自是兩種。

附溫毒發斑

熱病發斑同此

發斑因失於汗下。熱毒內攻。不得散。蘊於胃府。而發出肌表。或汗下不解。足冷耳聾。胸中煩悶。欬嗽嘔逆。躁熱起臥不安者。便是發斑之候。春至溫病之

人更遇時熱爲未至而至之異氣變爲溫毒。王叔和云陽脈洪數陰脈實大更感溫濕變爲溫毒。伏溫與時熱交并表裏俱熱溫熱爲病最重也。其脈浮沉俱盛其證心煩悶嘔逆喘咳甚則面赤身體俱赤色狂亂躁渴咽腫痛狂言下利而發斑最爲危候。斑如錦紋身熱煩躁大便燥結者黃連解毒湯。

若躁悶狂妄而無汗者三黃石膏湯。

自汗煩渴而發斑爲胃熱人參化斑湯。

煩熱錯語不眠白虎合黃連解毒湯。

斑不透。犀角大青湯已透熱不退。本湯去升麻黃芩
加人參生地黃柴胡。凡斑色紫者爲危候。黃連解
毒合犀角地黃。然須與病家言過而用。以此證雖
藥十中僅救二三。若黑色而下陷者必死也。
發斑雖禁下。若大便秘躁渴色紫者可微下之。
若發斑已盡。外勢已退。內實不大便。讖語小劑涼隔
散。或大柴胡微下之。

凡發斑紅赤者爲胃熱。紫爲胃傷。黑爲胃爛也。大抵
鮮紅起發者吉。雖大不妨。稠密成片。紫色者。半死
半生。雜色青紫者。十死不一生矣。凡斑旣出。須得

脈洪數有力。身溫足暖者易治。若脈小足冷。元氣
虛弱者難治。狂言發斑。大便自利。或短氣燥結不
通而黑斑。如果實。脈者皆不治。

附醫案三則

許叔微治一人。內寒外熱而發斑。六脈沉細。肩背胸
脇斑出數點。隨出隨隱。旋更發出。語言狂亂。乃陽
爲陰逼。上入於肺。轉之皮毛。故錯亂如狂。非讖語
也。肌表雖熱。以手按之。須臾冷透如冰。與薑附等
藥。數劑乃大汗而愈。

滑伯仁治一人。身大熱。脈沉實而滑。四末微清。以燈

燭之、遍體皆赤、斑舌上胎黑而燥裂、芒刺神昏、譫語、以小柴胡加知母石膏、一夕連進三服、次用大承氣下之而安、

呂滄州治一人、脈虛自汗、誤與真武湯、遂至神昏、時時熟睡、脈伏不至、而肌熱灼指、此營熱致斑之候、非陽病陰脈之比、先與白虎加人參湯、化其斑、復以桃核承氣下之而愈、

周禹載曰、發斑之證、已致慎其下、及用辛熱更無是理、而病情之變、復有如三案者、可見病機不可執一、妙在臨證化裁耳、故附之以廣識見云、

妙在細微

良法

戰而後勝之變動也

用軍之法貴在變通

不可執一

兵之變也如天之無常

無常則不可測也

故曰兵者詭道也

者諫之而安

彼之有求也

請以不樂時以收其膏

以取敵三則大

敵之數勝皆未嘗苦

上無然而數變

所練者難

春溫病論

周禹載曰。喻嘉言尚論篇。闡發仲景傷寒論殊暢也。醫門法律。闡發金匱要畧殊貫也。雖皆有所粉本。然學廣才張。心靈筆古。以各成其妙者也。至尚論溫病云。會內經之旨。以發仲景不宣之秘。且謂仲景畧於治溫。而法度錯出於治傷寒中。因內經云。冬傷於寒。春必病溫。此一大例也。冬不藏精。春必病溫。此一大例也。既冬傷於寒。又冬不藏精。至春月同時病發。此一大例也。奉此三例。以論溫證。而詳其治。然後與仲景三陽三陰之例。先後合符。蓋冬傷於寒。邪藏肌膚。

卽邪中三陽之謂也。冬不藏精，邪入陰藏，卽邪中三陰之謂也。嘉言之論如此，予謂溫病無陰陽之分也。何也？冬有溫氣，先開發人之腠理，而寒得以襲之，所謂邪之所湊，其氣必虛，惟不藏精之人，而後虛也。虛則寒傷其經，經必少陰者，以少陰藏本虛也。然所傷原微，且冬月大水當令，其權方盛，微邪不敢抗衡，但臥榻之側，豈容他人鼾睡？惟有阻彼生意，暗燦精髓。至於春時，強木長而水不足以供其資，始則當春而溫，木旺水虧，所鬱升發，火氣燔灼，病溫而已矣。其所傷者，寒也。所病者，溫也。所伏者，少陰也。所發者，少陽也。

也。故病必有陽而無陰。藥必用寒而遠熱。黃芩湯其
主治也。則嘉言之論溫。有陰有陽。如傷寒三陰經可
用辛熱者。予曰否否不然也。

又曰冬傷於寒。春必病溫。是言所感者本寒也。王叔
和云。從立春節後。其中無暴大寒。又不冰雪。有人壯
熱爲病者。此屬春時。陽氣發外。冬時伏寒。變爲溫病。
此亦明言寒也。變字大妙。嘉言以爲非。予獨以爲確。
寒氣內伏。鬱久而發。自成熱矣。傷寒寒也。暫襲營間。
不久而爲大熱。况遲之又久耶。爲熱乃自然之理。但
不言變。不足以教天下也。然何以不言熱而言溫。以

春行溫令故也。如李明之所云，冬傷於寒者，冬行春令也。當冬而溫，火勝而水虧矣。水既虧，則所勝妄行。土有餘也，所生受病，金不足也，所不勝者侮之，火太過也。火土合德，濕熱相助，故爲溫病。然由明之所言，是冬溫而感之，卽病者也。非伏寒也，非變也。不然，必無冬溫一證也。而後可。既有冬溫，則有是氣，已有是證矣。由其言以悉冬溫，便可垂論，不磨若論春溫，不免貽昧千古矣。經曰：逆冬氣，則少陰不藏，不藏則寒邪得而入之，傷於肌膚，伏於骨髓。始知冬爲藏精之時，惟逆冬氣，遂使少陰之經氣不閉，復遭非時之暖。

致令開洩忽然嚴寒驟返。不免受傷。故受傷者仍是寒邪也。因先被溫令開洩。似乎喜寒。且所傷不甚。故不卽病。而潛伏於少陰也。然所以不病於冬而病於春者。正因水在冬爲旺時。邪伏於經。且俛首而不敢抗。內鬱旣久。已自成熱。至行春令。開發腠理。陽氣外洩。腎水內虧。至春三月。而木當生發。孰爲鼓舞。孰爲滋養。生化之源旣絕。木何賴以生乎。身之所存者溫也。時強木長。故爲溫病。余故以彼論冬時之感溫。非是。而此論冬月之伏寒。最精。愚性甚拙。何敢好議。先賢但以爲必如此。方與冬溫兩不相阻。且與仲景論

溫熱必推本自始。動曰傷寒之旨。無悖云耳。

門人問曰。傷者寒也。何以病溫。荅曰。傷寒非病寒乎。

而何以熱也。寒鬱營間。不一二日而成大熱。况伏藏

於內者。數十日之久耶。夫既邪傷肌肉。何以得入少

陰經中。蓋惟不藏精。則少陰先病。故邪傷者少陰也。

春屬木。則自內發出。無論兼太陽或陽明。總無不由

少陽何也。彼少陽行春令也。然既從少陰矣。何仲景

專云太陽病。蓋太陽與少陰相表裏也。故以發熱爲

太陽也。曰不惡寒。明無表症也。則其熱自內出。無外

邪鬱之也。然則仲景復言太少合病者。見發熱不惡

寒或兼有耳聾脇滿證也。言三陽合病者以脉大屬陽明而多眠則熱聚於膽也。不言法者總以黃芩湯爲主治也。乃嘉言復謂有發表三五次而外證不除。攻裏三五次而裏證不除以爲在表也。又似在裏以爲在裏也。又似在表。此溫疫證感天地人濕氣熱氣尸氣邪入口鼻。溷淆三焦者相近。與春溫全不相涉也。愚故及之以破後學之惑。

門人復問曰。春溫亦間有一二表症者乎。曰。有之。伏氣之病。雖感於冬。然安保風之傷人不在。伏氣將發未發之時乎。但兼外感者必先頭痛。或惡寒而後熱。

不已。此新邪引出舊邪來也。或往來寒熱頭痛而嘔。稍愈後。渾身壯熱爲病者。此正氣又虛。伏發更重也。總之無外證者。以黃芩湯爲主治。兼外感者。必加柴胡。或以本經藥輕解。必無發汗之理。故仲景云。發汗已。身灼熱者。名曰風溫。謂悞用辛熱之藥。旣辛散以劫其陰。復增熱以助其陽。遂使熱更熾。脈俱浮。有如此之危證也。以及悞下悞火。嚴加戒諭者。舍黃芩湯別無治法也。

溫熱病脈論

溫病熱病之脈。或見浮緊者。乃重感不正之暴寒寒。

邪束於外。熱邪結於內。故其脈外絀急而內洪盛也。或不識脈形。但見弦脈。便呼爲緊而妄治之。蓋脈之盛而有力者。每每兼弦。豈可錯認爲緊而悞以爲寒乎。夫溫熱病之脈。多在肌肉之分而不甚浮。且右手反盛於左手者。誠由怫鬱在內故也。其左手盛或浮者。必有重感於風寒。否則非溫熱病。自是非時暴寒耳。

溫熱病亦有先見表證而後見裏證者。蓋怫鬱自內達外。熱鬱腠理之時。若不用辛涼發散。則邪不得外泄。遂還裏而成可攻之證。非如傷寒從表而始也。或

大溫病方五道

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

甘草湯

桔梗湯

黃連阿膠湯

方俱見前

大柴胡集方二十九道

小承氣湯

大黃四兩 去皮

厚朴二兩 炙

枳實三枚 炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服

大承氣湯

大黃四兩 酒洗 去皮

芒消三兩

厚朴八兩 炙

枳實五枚 炙

右四味以水一斗先煮枳朴取五升去滓內大黃
煮取二升去滓內芒消更上微火一二沸溫再服
調胃承氣湯

大黃 四兩 清酒浸 甘草 二兩 炙

芒消 半升

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒消更
上微火煮令沸少少溫服之

大柴胡湯

柴胡 八兩

黃芩 三兩

半夏 半升 洗

芍藥 三兩

枳實 四枚 炙

生薑 五兩 切

大棗 十二枚 擘

大黃 二兩 去皮酒洗

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服

一升日三服

雙解散

麻黃 去節

防風

當歸

川芎

薄荷

芍藥

連翹

大黃 酒洗

芒消 各半兩

石膏 碎

黃芩 酒洗

桔梗 各一兩

荆芥

山梔

白朮 薑汁拌生用

甘草 各二兩

滑石 三兩

右為散每服三錢加生薑三片水煎去滓溫服

小柴胡湯

柴胡

八兩

黃芩

三兩

人參

三兩

半夏

八兩 洗

甘草

三兩 炙

生薑

三兩 切

大棗

十二枚 擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

梔子鼓湯

梔子

十四枚 擘 生用

香豉

四合 綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取

一升半去滓分二服溫進一服

益元散

桂林滑石 六兩

生甘草 一兩

右為末每服三錢溫水或新汲水調服 取汗加

香豉薄荷安神加硃砂止泄加炮薑消斑加青黛

涼膈散

連翹 梔子 薄荷

黃芩

各五錢

芒消

二錢半

甘草

一兩半

右為末每服五錢水一椀半煎一椀去滓入白蜜

一匙微煎溫服 一方無薄荷加芍藥大棗葱白

葛根葱白湯

葛根

芍藥

知母

各一錢半

川芎 二錢

生薑 二片

葱白

五寸
連須

右六味水煎溫服

本方去知母加甘草大棗名

增損葛根葱白湯治感冒風寒頭痛

三黃石膏湯

黃連 酒洗

黃芩 酒洗

黃蘗

各二錢
酒洗

石膏 五錢

麻黃 一錢

梔子

二十枚
碎

香豉 一合

生薑 二片

葱白

三莖

右用地漿水澄清煎服半日許不得汗解再服

如脈數便閉上氣喘急舌卷囊縮者去麻黃香豉

加大黃芒消槌法加細茶一撮

葶藶苦酒湯

葶藶

三錢

研搗取汁

苦酒

三合

卽米醋

生艾汁

一合如無乾艾浸搗

右水煎作三服探吐取汗

黃連解毒湯

黃連

酒洗

黃芩

酒洗

黃蘗

酒洗

梔子

各一錢半

右四味水煎溫服無時

歲蕤湯

治風溫

葳蕤 一錢五分

石膏 二錢

白微

麻黃 去節泡

川芎

葛根

羌活

甘草 炙

杏仁 去尖

青木香 各一錢

右十味水煎日三服

麻黃升麻湯

治悞汗風溫須去二麻薑木

麻黃 二兩半 去節

升麻 一兩一分

當歸 一兩一分

知母

黃芩

葳蕤 各十八銖

天門冬 去心

芍藥

乾薑

白朮

茯苓

甘草 炙

桂枝

石膏 各六銖
碎綿裹

右十四味以水一斗先煮麻黃一二沸去上沫內

諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米

頃令盡汗出愈

栝樓根湯

治風溫無大熱而渴

栝樓根

一銖

石膏

三錢
碎

葛根

一錢五分

防風

人參

甘草

各五分
炙

右六味水煎溫服無時

陽旦湯

治冬溫

桂枝

三錢

芍藥

酒焙

甘草

各二錢
炙

黃芩

二錢 酒炒

生薑 三片

大棗 三枚 擘

右六味水煎溫服無時

頭疼欬嗽咽痛下痢加

桔梗茯苓寒食停滯加厚朴發熱畏寒加麻黃石

膏

升麻葛根湯

升麻

葛根

芍藥 酒洗

甘草

各一錢半 炙

右四味水煎溫服無時

犀角黑參湯

犀角 鎊

黑參 各二錢

升麻

射干

黃芩

人參 各一錢

甘草

八分

右七味水煎溫服無時

小柴胡去參半加栝樓湯

即前小柴胡湯去人參半夏加栝樓根四兩

黃芩加生薑湯

即前黃芩湯加生薑一兩半

白虎加人參湯

方見後熱病

以上三方治溫瘧

白虎合黃連解毒湯

即前黃連解毒湯合後白虎湯

犀角大青湯

犀角

二錢

大青

一錢五分

黑參

升麻

黃連

黃芩

黃蘗

梔子 各一錢

甘草 八分

右水煎熱服無時 如脈虛熱甚本方去苓蘗升

麻加人參生地柴胡名消斑青黛飲

黃連解毒合犀角地黃湯

黃連 酒洗

黃芩 酒洗

黃蘗 酒洗

梔子 各一錢半

犀角 磨水更佳 鑄屑亦可

生地黃 酒浸搗

牡丹皮

芍藥 各二錢

右先以七味水煎去滓入地黃再煎數沸濾清加

藕節汁側柏汁并磨好墨少許攪令黑服之

調中飲

黃芩

人參

各一錢

蒼朮 二錢 泔水 浸麻油炒 白朮 生 厚朴 薑汁炒

陳皮 炙 甘草 炙 枳實 炒

神麴 炒 黃連 各一錢 薑汁炒 山查 二錢 薑汁炒

草果 八分 炮薑 五分

右水煎去滓磨木香汁少許調服 如腹痛加桃

仁痛甚便秘加大黃口乾加省頭草

理中去朮加附子藿香升麻橘皮湯

人參 甘草 炙 乾薑

附子 炮 藿香 升麻

陳皮 等分

右水煎溫服無時

補中益氣湯

人參

白朮炒

黃耆炙

甘草

各一錢半

當歸一錢

陳皮五分

升麻

柴胡各三分

右八味加薑棗水煎溫服

通脈四逆湯

甘草

二兩

乾薑三兩

附子

一枚生用去皮切八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

其脈即出者愈 面色赤者加葱九莖腹中痛者

去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍
藥加桔梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參二
兩

溫熱暑疫全書卷之一終

本草綱目卷之...

...

附

附子 皮切入片

藥味計數一兩味甘微不出香去味賦賦人參...

熱病方論卷二

吳門周揚俊禹載輯

後學

吳蒙正功

重校

傷寒脈浮滑。此表有熱。裏有寒。白虎湯主之。

方注浮者風也。言不獨傷於寒也。滑為裏熱。以滑

且浮知熱不獨在裏也。故指言此表有熱。蓋表裏

俱熱之謂也。裏有寒者。裏字非對表而稱。以熱之

裏言。蓋傷寒之熱。本寒因也。故謂裏有寒。指熱之

所以然者言也。夫表裏皆熱。欲兩借而解之。誠哉

極其難也。譬如夏秋兩屆之間。燥熱酷甚。非金風

之薦涼。則毒暑不解也。

又注世本作表有熱裏有寒。必係傳寫之誤。夫白虎本爲治熱病暑病之藥。其性大寒。安得裏有寒者可服之理。詳本文脈浮滑。不但無緊。且復多滑。乃陽氣盛而鬱蒸。此裏有熱也。裏熱甚。必格寒於外。多厥逆身涼而爲亢害之證。此表有寒也。厥陰篇中脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。則知此表裏二字爲錯誤可知。當爲上下更易。

周注熱病皆傷寒伏邪也。至發則但熱矣。乃仲景仍以傷寒揭之者。所謂樂樂其所自生。禮不忘其

本也

白虎湯

知母 六兩

石膏 一觔

甘草 二兩

粳米 六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服

方注白虎者西方之金神司秋之陰獸虎嘯谷風

冷涼生酷暑消神於解熱莫如白虎知母石膏辛

甘而寒辛者金之味寒者金之性辛甘且寒得白

虎之體焉甘草粳米甘平而溫甘取其緩溫取其

醫心方卷之三十一 熱病

海熱暑疾全書 卷二
和。緩而且和。得伏虎之用焉。飲四物之成湯。來白
虎之嗥嘯。陽氣者。以天地之疾風名也。風行而虎
嘯者。同氣相求也。虎嘯而風生者。同聲相應也。風
生而熱解者。物理必至也。抑嘗以此合大小青龍
真武而論之。四物者。四方之通神也。而以命名。蓋
謂化裁四時。神妙萬世。名義兩符。實自然而然者
也。方而若此。可謂至矣。然不明言其神。而神卒莫
之掩者。君子盛德。此其道之所以大也。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁而面垢。讖語
遺溺。發汗則讖語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自

汗出者白虎湯主之。

周注此因中暍而引動伏邪齊出。三陽爲病極重。腹滿者。熱本病也。身重難以轉側者。濕本病也。若口不仁而面垢。讖語遺溺。則是暍本病矣。惟熱暍相兼。其熱勢尤劇。此時倘復汗之。則津液外亡。而讖語轉甚。若下之。則陰氣下竭。而陽氣上脫。故額上汗而手足逆冷矣。故必仍自汗者。主以白虎。設誤汗下而證如上者。加人參爲無疑也。

傷寒脈滑而厥者。裏有熱也。白虎湯主之。

周注滑爲邪實。何反至厥。卽熱深厥深之義。故特

申之曰。裏有熱也。裏熱安得不用白虎湯乎。

傷寒脈浮。發熱無汗。其表不解者。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表證者。白虎加人參湯主之。

周注發熱汗出。熱本病也。今脈浮無汗。必因邪

襲表矣。豈可竟與白虎湯乎。故必以辛涼先撤其

邪。然後治熱。始爲無礙。假使表邪解而煩渴轉甚

者。明係因邪以更耗津液。白虎湯固非解表之劑。

又豈有助正之功。加人參者。益其元也。元稍益而

熱易清矣。

傷寒無大熱。口燥渴。立煩者。微惡寒者。白虎加人參

湯主之。

周注燥渴且煩。爲熱證本病。而曰無大熱者。以獨背微惡寒也。背爲太陽經位。正氣大虛。故微惡寒。安得不用補正之藥於本湯中乎。

陽明病脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出不惡寒。反惡熱。身重若發汗則躁。心憤憤。反讞語。若加燒鍼。必怵惕煩躁。不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎滑者。梔子豉湯主之。方見前若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。若脈浮發熱渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。

周注浮緊傷寒脈也。何以爲熱病。以其發於夏反惡熱不惡寒也。又何以獨言陽明。以夏時濕熱上蒸。邪從胃發。且腹滿而喘。種種皆陽明證也。然咽燥非少陰證耶。不知陽明爲從出之途。少陰其伏藏之地也。夫旣陽明熱病。曷又爲脈反浮緊。正以夏時肌腠本開。人本多汗。邪風襲入。致腠理反閉。而無汗。故夏之風脈。每反顯冬之寒脈也。今云汗出而脈也。浮緊者。正因浮甚有力。熱邪盛而致也。若不知者。以辛熱汗之。耗其津液。必至躁妄昏昧。火劫溫鍼。燥其陰血。必至驚擾無寐。下之必亡其

陰必至胃虛邪陷。心中懊懣。此皆誤治。將何以救之乎。觀舌上胎滑者。則外邪尙在。以梔子解熱。香豉去邪。是爲合法。若渴飲水漿。口乾舌燥。知其外邪亦入。總以白虎湯爲治。加人參者。以誤治而津液大傷也。設使緊脈去而浮在。發熱飲水。小便不利。則其浮爲虛而熱已入膀胱矣。入膀胱者。曷不飲以四苓而主以豬苓耶。傷寒之小便不利。結於氣分。熱病之小便不利。由於血分者也。因邪鬱旣深。耗液日久。故必以阿膏補虛。滑石祛熱。而無取於白朮也。

白虎加人參湯

知母 六兩

石膏 一觔

甘草 二兩

粳米 六合

人參 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服

周注口至乾舌至燥無津液極矣能生津液而神

速者莫若人參故加之

猪苓湯

猪苓 一兩
去皮

茯苓 一兩

阿膠 一兩

滑石 一兩
碎

澤瀉 一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓肉下阿膠烱消盡溫服七合日三服

周注熱甚膀胱非水能解何者水有止渴之功而無祛熱之力也故用猪苓之淡滲與澤瀉之鹹寒與五苓不異而此易白朮以阿膠者彼屬氣此益血也易桂以滑石者彼有表而此爲消熱也然則所蓄之水去則熱消矣潤液之味投則渴除矣

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

周注渴而小便不利本當用猪苓湯然汗多在所

禁也。此與傷寒入府。不合。渡數同意。蓋邪出陽明。已劫其津。汗出復多。更耗其液。津液曾幾。尚可下奪耶。當以白虎加人參去其熱。則小便之不利者。津回而自利矣。

傷寒病。若吐若下。後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。

周注吐下後至七八日不解。知誤治而熱邪不爲吐下少衰。反因吐下轉甚。時惡風者。陽外虛也。舌燥而煩渴。飲水至數升者。陰內亡也。舍人參白虎。

將何以解其表裏補其津液耶

服桂枝湯。大汗出後。大煩渴。不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。

周注桂枝。辛熱藥也。熱病本汗。或疑爲風。飲以此湯。不更益其熱。而大汗淋漓乎。如是則津液益傷。煩渴益甚。洪大轉增。當與本湯加人參也。審矣。

其大轉當與本馬時人參出審矣

身不更益其熱而大平極漸平飲暴慎漸益壽

天風出熱外辛燥藥出熱本平短畏氣風着以地

人參屬主之微至七日不則知誤也

其益效長大五出外太熱出不輒服藥失香自當

其所以報其宗莫滿其指效唯不也舍人參白虎

夏熱集補證治并方

交夏至後。炎暑司令。相火用事。人有發熱身疼。不
惡寒。但大熱而大渴者。爲熱病。仲景以白虎湯爲
主治。今人以此湯治傷寒者。誤也。熱病下發。上內
發。外必經陽明。故無論三陽。總以石膏之辛涼。乘
勢升散。知母之苦寒。靖少陰伏邪之源。甘草粳米。
維持中氣。一了百當。至傷寒既非其時。復非其病。
邪自外來。未入者解表。已入者下奪。石膏本非表
藥。又非下藥。卽欲解熱。熱何從解。况有知母。引入
少陰。爲害不淺。理自如此。達者自會。愚不敢好與。

今人辯也。故除以上見證。正方外補集方治。

二法熱病之脈。本洪大。若見浮緊。是又感夏時暴寒。謂輕舉見緊。略按則仍洪盛。以內伏已發也。治宜通解散。去麻黃蒼朮。或加葱白香豉。或先以連鬚葱白香豉湯。減生薑撤其外。後用白虎加入參湯。

一法熱病凡客邪所感。不論脈浮緊惡風惡寒。宜解不宜下者。通用雙解散。去硝黃。於中加減如去白木芍藥桔梗二三味。加知母葱豉最妥。

一法凡溫病之發。因暴寒者居多。熱病之發。兼暑暘者爲盛。若始病見讖語面垢遺溺。背微惡寒者。白

虎加人參湯。

一法若本病兼衄。於本湯中加生地黃牡丹皮。喘加

栝蔓根厚朴杏子仁。

一法若惡熱煩渴。腹滿。舌黃燥。或黑乾。五六日不大

便。涼膈散或三一承氣湯。

一法若本病兼暑濕者。或涼膈合天水散。若小便不利者。竹葉石膏湯倍石膏。

一法若兼風痰者。用雙解散煎一大碗先飲半作探吐。法以引痰出外再盡劑微以被覆。令汗出解。蓋用涼藥熱飲。發汗百無一損也。河間製雙解散子

和演爲吐法甚妙

一法誤用辛溫藥致發斑讖語喘滿昏亂者黃連解毒

一毒加減

一法屢下後熱勢猶盛不便再下或諸濕內盛小便

黃瀉大便溏小腹痛者欲作利也宜黃連解毒湯

總論溫熱死脈死證

周禹載曰內經刺熱云太陽之脈色榮顴骨營未交

曰今且得汗待時而已與厥陰爭見者死期不過

三日其熱病內連腎少陽之脈色榮頰前熱病也

營未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者

死。太陽之脈色屬赤。初起時其色止榮顴骨一處。不交他處。純是赤色。曰今且得汗者。謂邪勢漸從外解。卽餘證未靖。少待而自解。言無害也。至於厥陰爭見者。死不外三日。是爲交已。熱病大熱煩渴汗出。反見厥陰肝經之脈色。爭見赤紫晦滯。已爲主死。况爭見青黑之色耶。何者。少陽青色。少陰黑色也。爭見者。命期甚促矣。又評熱病論云。帝問曰。有病溫者。汗出輒復熱。而脈躁疾。不爲汗衰。狂言不能食。病名爲何。夫帝旣曰病溫矣。復曰病名爲何者。正欲知病之本於陰陽也。岐伯曰。名陰陽交。

交者死。何也。交則不解也。謂人所以汗出者。生於精氣也。精氣者。穀氣也。邪正交爭而得汗者。是邪退而精氣勝也。精氣勝則能食而不復熱。復熱者邪勝。則是汗出不爲汗衰也。不能食者。精無俾也。病而留。其壽可立而傾也。故熱病曰。汗出脈尙躁盛者死。脈旣不與汗應。此不勝病矣。其死必矣。狂言者是失志。失志者死。今見三死。不見一生。雖愈必死也。此段論溫。獨創穀氣之旨。穀氣爲精。精氣爲汗。故藏精者不病溫。其病溫者。咸不藏精之人也。而有生有死者。不藏精。甚與不甚之分也。

二陽搏病溫者。死不治。雖未入陰。不過十日死。二陽者。手足陽明也。

溫病發於三陰。脈微足冷者難治。

溫病大熱。脈反細小。手足逆冷者死。

溫病初起大熱。目昏讖語。脈小足冷。五六日而脈反躁急。嘔吐昏沉。失血瘞。擗舌本焦黑。脈促結代沉小者皆死。

溫病汗後反熱。脈反盛者死。

溫病誤發汗。狂言不能食。脈躁盛者皆不治。

已上春溫死證

熱病七八日。脈微小。溲血口中乾。一日半而死。脈代

者一日死

熱病七八日。脈不躁。或躁不散數。後三日中有汗。三日不汗。四日死。

熱病已得汗。脈尚躁。喘且復熱。喘甚者死。

熱病不知痛處。耳聾不能自收持。口乾陽熱甚。陰頗有寒者。熱在髓。死不治。

熱病汗不出。大顴發赤。噦者死。

熱病泄甚。而腹愈滿者死。

熱病目不明。熱不已者死。

熱病汗不出。嘔吐下血者死。

熱病舌本爛。熱不止者死。

熱病欬而衄。汗出不至足者死。

熱病熱而瘥者死。腰折癩癧齒噤齧也。已上夏

死證

附濕溫

活人書云。先傷於濕。又中於暑。名曰濕溫。許學士云。先受暑。後受濕。所言先後感受不同。然濕病則緩。暑中則速。由斯以推。先濕後暑者為確也。其證兩脛逆冷。胸滿。頭目痛。妄言。多汗。蓋濕得暑邪。遏抑陽氣。故脛冷而腹滿。暑挾濕邪。鬱蒸為熱。故頭痛。妄言。多汗。其脈陽濡而弱。陰小而急。許學士以關

前爲陽。關後爲陰。紀氏以浮爲陽。沉爲陰。羅謙甫云。濡弱見於陽部。濕搏暑也。小急見於陰部。暑搏濕也。然濕傷血。則必小急。暑傷氣。則必濡弱。於此加浮爲陽。沉爲陰者。當矣。切不可發汗。汗之名。重暘死。治宜白虎加蒼朮湯。如有寒熱外邪。加辛涼表藥一二味。

若濕氣勝。一身盡痛。小便不利。大便反快者。加茵陳香薷。若有寒物停滯。及中寒宜溫。必小便清白。然後可。如赤瀉而少。斷不可用。通宜十味香薷飲。清暑益氣合天水散。

王字泰云昔人治濕溫。通身皆潤。足冷至膝下。腹滿。不省人事。六脈皆小弱而急。問所服藥。皆陰病藥也。此非受病重。藥能重病耳。以五苓合白虎十餘劑。少甦。更與清燥湯調理而安。凡陰病厥冷。兩臂皆冷。今脛冷臂不冷。則非下厥上行。故知非陽微寒厥。而合用祛熱藥也。

附陽毒發斑

陽邪亢極。遂成陽毒。亦有誤以辛熱與之而成者。金匱云。陽毒爲病。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。升麻鱉甲湯主之。

虛熱熾甚。毒不化者。陽毒升麻湯。大便結去射干加
酒大黃。熱甚去人參加大青。

或吐下未當。陷邪內甚。其證壯熱。頭項強痛。躁悶不
安。或狂言罵詈。要見妄言。或面生斑紋。口吐膿血。
或舌卷焦黑。鼻如烟煤。或下利黃赤。六脈洪大而
數。犀角黑參湯。黃連解毒湯。慎不可用下藥也。勢
甚者。以青布漬冷水。搭病人胸堂。必喜。熱即易之。
須臾得睡。

附陰毒發斑

有陰熱亢極而成陰毒者。金匱云。陰毒之爲病。面目

青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升
麻龍甲去雄黃蜀椒主之活人用本方加桂枝名
陰毒甘草湯。

復有陰寒極盛而成陰毒者自是兩種不可混也惟
陰寒至極反大熱躁渴四肢厥逆脈沉細而疾或
尺部短而寸口大額上手背冷汗不止或因入房
而後着寒或內傷生冷而犯房室內既伏陰復加
外寒積寒伏於下微陽消於上遂成陰盛格陽陽
氣上脫之候後五六日胸前發出紅斑其色淡其
點小是爲陰斑雖盛夏宜附子理中湯甚至身重

眼睛疼額冷汗出嘔噦死逆或爪甲青或腹絞痛
或面赤足冷厥逆躁渴不欲飲身發青黑色斑目
鼻灰色舌黑而卷莖與囊俱縮脈沉細而遲或伏
而不出或疾至七八至而不可數者急用葱餅於
臍上熨之隨用附子散或人參三白湯合四逆湯
熨後服湯已手足不和暖者不治。

劉守真曰世俗所言陰毒皆陽熱亢極畜熱深於內
身表似有陰寒此特指仲景升麻鱉甲湯去雄黃
蜀椒陰熱亢極之證若後世所言陰寒極盛之陰
毒非用回陽退陰之藥內溫正氣逼邪外出烏能

起死回生耶。

王安道曰。陰陽二毒與陰陽二證迥異。仲景書雖有陰毒之名。其所敘證不過面目青身如被杖咽喉痛而已。並不言陰寒極盛之證也。况所治之方。不過升麻甘草當歸髓甲而已。並不用大溫大熱之藥。故知仲景所謂陰毒非陰寒之病。乃是感天地惡毒之氣入於陰經。故名陰毒。而非純陰沍寒。可用熱藥之比也。

趙以德曰。按古方書謂陽毒者。陽氣獨盛。陰氣暴衰。內外皆陽。故成陽毒。陰毒者。陰氣獨盛。陽氣大衰。

內外皆陰故成陰毒二者或傷寒初得便有是證
或服藥後變而成者陽毒治以寒涼陰毒治以溫
熱藥劑如冰炭之異何仲景以一方治之乎且治
陰毒去雄黃蜀椒則反去其溫熱者矣豈非一皆
熱毒傷於陰陽一經乎在陽經絡則而赤如錦紋
唾膿血在陰經絡則面青身如被杖此皆陰陽水
火動靜之本象也其曰七日不可治者陰陽之津
氣血液皆消滅矣傷寒七日經氣已盡而此加之
以毒至七日不惟消滅其陰且火抑亦自滅矣

夏熱病論

周禹載曰冬傷於寒夏必病熱則是熱病與春溫對峙而非夏時所感之熱也乃嘉言尙論天之六氣春秋冬各主一氣獨夏月兼主二氣謂爲瘧濕暍者此仍是氣感之證而非伏藏之寒至夏始發之熱也故人素有伏氣將發復感濕暍者言之若但病瘧濕暍不得卽謂之熱病也故熱病自內任出不論兼見何經必由陽明並無表證其有表者必外受風邪不得遽投白虎亦必先撤外邪而後本湯可用此亦先表後裏之法也

又曰熱病卽伏寒也。彼冬傷於寒發於春爲溫病。發於夏爲熱病。何彼發於春此發於夏耶。蓋感之輕重不同。人之強弱亦異。而觸發亦異。有因饑飽力役者。有因房室勞傷者。故春時雖行風木之令使氣血不致大虧。感觸亦有先後不卽發也。至夏則陽氣盡泄。火令大行。正屬濕土寄旺。爾時邪烏肯伏。故其發源皆自少陰。熱病由出之途自陽明。溫病由出之途自少陽。雖所合之經不一。要不離乎陽明少陽者。各因時令之氣也。目爲日旣遲。爲熱愈熾。此仲景所以用石膏升涼胃熱。以知母蕩滌腎伏。用甘草粳米維持。

中氣也。名湯曰白虎者。白屬金屬涼。風從虎且猛。人
逢悶熱煩躁無可奈何之際。忽然狂風荐至。偃草揚
波。火輪火樹不頓成清涼世界而稱快乎。

附錄方一十八道

解散

麻黃

去節酒洗

石膏

滑石

黃芩

各二兩

杏仁

四兩去皮

甘草

一兩

右爲末每服半兩加薑三片水煎溫服取汗

菴方加羌活川芎

白香豉湯

又曰熱病即伏寒也彼冬傷於寒發於春為溫

於夏為熱病何彼發於春此發於夏耶蓋感之

不同人之強弱亦異而觸發亦異有因感發而

有因感發而發者故春時雖行盛木之令發氣

致大動感觸亦有先後不即發也至夏則陽氣

太令大行正屬濕土寄旺爾時邪氣肯伏發其

皆自少陰熱病由出之途自陽明溫病由出之途

如火燄火燄不離地氣與近壤而燄與乎陽者各

其間燄散難無何奈何之烈然然其風擊在草

中乘世俗曷曰白氣者白屬金屬涼風發氣且

人

熱病方四道

白虎湯

白虎加人參湯

梔子豉湯

豬苓湯

方俱見前

附集方一十八道

通解散

麻黃 去節酒洗

石膏 碎

滑石

黃芩 各二兩

蒼朮 四兩去皮
泔水浸炒

甘草 一兩五錢
炙

右爲末每服半兩加薑三片水煎溫服取汗陶節

菴方加羌活川芎葱白香豉

葱白香豉湯

葱白

七莖連須

香豉

一合勿炒

生薑

一片

右三味水煎日三服覆取微似汗不汗加蘇葉

雙解散

承氣湯

涼膈散

天水散

即益元散四方俱見前

竹葉石膏湯

竹葉

二把

石膏

一觔

麥門冬

一升去心

人參

三兩

半夏

半升洗

甘草

二兩炙

粳米

半升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟

湯成去米溫服一升日三服

黃連解毒湯 方見前

白虎加蒼朮湯 即前白虎湯加蒼朮二兩

十味香薷飲 清暑益氣湯 二方見後暑病

金匱升麻鼈甲湯

升麻 二兩 鼈甲 手指大一當歸一兩

甘草 二兩 雄黃 半兩 蜀椒 一兩

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取

汗 陰毒去雄黃蜀椒

陽毒升麻湯

升麻 犀角 各一錢半 射干

黃芩

人參

甘草

各一錢

右水煎溫服溫覆手足汗出則解不解再作

陰毒甘草湯

即前升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒加桂枝

犀角黑參湯

方見前

附子理中湯

人參

白朮

甘草

炙

乾薑

各三兩

附子

一枚炮

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

白服

附子散

附子 七錢五分 桂心

當歸

白朮 各五錢

乾薑 炮

半夏 各二錢五分 洗

右為散每服三錢加生薑三片水煎溫服煖覆取汗不汗再服

人參三白合四逆湯

人參 二錢五分

白朮 蒸炒

白茯苓

白芍藥 各一錢五分

生薑 三片

大棗 三枚 去核

乾薑

附子 炮

甘草 各一錢 炙

右九味水煎冷服

四時熱病