

醫
酉
与
庚
直

五

醫方集宜卷四目錄

中氣門

諸疝門

痰飲門

咳嗽門

痰喘門

癆瘵門

諸虛門

自汗盜汗門

附肺痿 肺癰

附哮喘

附蒸病

吐血門

五門

衄血門

附蒸麻

咳血門

咯血門

附紫詭

溺血門

附胡葵

胡藕

便血門

齒血門

中康門

卷四目錄

卷四目錄

醫方集宜卷之四

中氣門

病源

七情

四氣

六淫

人之一身皆賴乎氣氣之名曰衛衛者衛護週身之謂也故女子宜耗其氣以調經男子宜養其氣以全神大哉氣乎不可以不謹也或使七情以動乎內四氣以感乎外調攝非宜爲病甚速 論云百病皆生於氣是也夫怒則氣上喜則氣緩憂則氣散一日勞

則氣耗悲則氣消恐則氣下寒則氣收炆則氣泄驚
則氣結此九氣之不同也其或蒼卒之間氣不調順
令人牙關緊急不省人事手足搐溺四肢不舉漸漸
悶亂此中氣之候也但口中無涎聲不可誤用風藥
臨病之際慎之

形證

張子和云諸病皆因於氣諸病皆生於氣是也常則
安變則病然為七情六淫所干故諸病生焉為腫脹
為喘嗽為膈噎為癥疝為嘔逆為痞塞為疼痛此皆

氣之爲病也

王太僕云怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血
及吐泄也喜則氣和志達榮衛通利而氣緩矣悲則
心絲急肺葉舉上焦不通榮衛不散而氣消矣恐則
精却却則上焦閉閉則氣還而下焦脹而氣不行矣
寒則腠理閉氣不行而氣收矣炅則腠理開榮衛疎
汗大出而氣泄矣驚則心無所依神無所歸慮無所
定而氣亂矣勞一作則喘息汗出內外皆越而氣耗
矣思則心無所存神無所歸正氣留而不行故氣急

醫方集注 卷四
矣此素問之辨九氣言之詳且明矣

脉法

脉訣要曰下手脉沉便知是氣沉極而伏濇弱者難治沉而兼滑痰飲脉也

治法

一七情傷氣鬱結不舒痞悶壅塞發爲諸病當詳所起之因滯於何經上下部分宜隨經用藥
一局方多用辛香燥熱之藥以治氣果因冷氣滯不散香燥可也若脉受火邪必加苦寒之藥以佐之

一利肺氣須用枳壳多服則損胸中至高之氣

一瀉肝氣須用青皮多服亦損真氣

一云氣無補過法世俗之論也若病痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能運行邪氣不用補法氣何由行所謂正氣盛而邪氣退也

一憂思過度五臟不和三焦氣滯胸膈氣滿疼痛喘
息宜用 流氣飲 分氣紫蘇飲 分心氣飲

一氣不升降肺氣喘促胸膈脹滿宜用 蘇子降氣

湯

一氣不調順胸膈膨脹喘嗽面浮宜用 木香流氣

飲

一七情鬱結心腹絞痛宜用 七氣湯 指迷七氣

湯

治方

流氣散 治五臟不和三焦氣壅腫滿喘嗽面浮便

秘

紫蘇 青皮 當歸 芍藥 烏藥 茯苓 桔

梗 半夏 川芎 黃芪 枳壳 防風 陳皮

甘草 木香 檳榔 枳實 大覆皮 水二鍾

姜三片 紅棗一枚 煎八分 食遠服

分氣紫蘇飲

五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草菓 大

覆皮 陳皮

桔梗

各等分

紫蘇

減半

蘇子降氣湯 方見喘門

分心氣飲 治一切氣滯胸膈疼痛痞塞不消

木香 丁香 人參 麥門冬 大覆皮 大腹

子 桑皮 草菓 桔梗 厚朴 白朮 香附

藿香 紫蘇 陳皮 甘草 水二鍾 姜二片 棗

一枚煎服

木香流氣飲 治諸氣痞塞胸膈膨脹面目浮大便

秘

陳皮 半夏 厚朴 青皮 紫蘇 香附 肉

蓬朮 丁香皮 檳榔 藿香 草菓 木通

白朮 人參 木瓜 大覆皮 麥門冬 上苓

沉香 石菖蒲 姜三片 棗一枚煎服

七氣湯 治七情氣結於内心腹絞痛

人參 甘草 木官桂 半夏 姜煎服

指迷七氣湯 治七情氣不升降攻衝作痛

香附 青皮 陳皮 桔梗 蓬朮 官桂 藿

香 益智仁 三稜 甘草 水二鍾姜三片紅

棗一枚煎服

四七湯 治思慮氣結痰涎如絮咯不出噦不下

半夏 茯苓 紫蘇 厚朴 姜三片棗一枚煎

服

木香順氣散 治濁氣在上則生噎脹

木香 蒼朮 桔梗 陳皮 厚朴 砂仁 甘

草 青皮 茯苓 半夏 官桂 草豆蔻 姜

三片煎服

木香調氣飲 治氣虛痞悶惡心腹痛 出熱不可

白豆蔻 丁香 檀香 木香 藿香 甘草

砂仁 薑 三片煎服

木香導氣丸 治積熱傷脾食不消化

神麩 麥芽 蘿蔔子 牽牛 木香 陳皮

青皮 右為末糊丸如桐子大每服三五十九鹽

湯送下

勻氣散 治氣滯不勻腹痛嘔吐

木香 檀香 丁香 藿香 白豆蔻 甘草

砂仁 白水煎服

沉香下氣丸 治一切氣痰

茯苓 人參 木香 丁香 沉香 青皮 白

朮 砂仁 三稜 蓬朮 檳榔 陳皮 官桂

香附 牽牛 石菖蒲 白豆蔻 蘿蔔子 右

為末麵糊為丸如小豆大每服三五十丸姜湯送

下

撞氣阿魏丸 治五噎冷氣積塊刺痛疝氣

茴香 青皮 陳皮 蓬朮 川芎 甘草 各各

肉桂 砂仁 丁皮 白芷 胡椒 生姜 各五錢五分

四兩鹽 阿魏 醋浸一宿二錢 淹炒黑 五分同麵為糊 右為末用阿魏和

麵糊為丸如桐子大硃砂為衣每服二三十丸男

用姜鹽湯送下女用醋湯送下

木香檳榔丸 治一切氣脹大小便不利嘔酸食不

消化

木香 檳榔 青皮 枳壳 陳皮 蓬朮 木黃

連各一兩 黃栢 香附 大黃各三兩 牽牛末四兩

右爲末水丸如桐子大每服三十丸食遠姜湯送

下

木香分氣丸 治氣逆痞悶腹痛虛脹

木香 甘草 砂仁 香附 蓬朮 寒下皮 藿

香 姜黃 甘松 檀香 右晒乾不見火爲末

稀糊丸如桐子大每服三十丸姜湯或橘皮湯任

下

寬中枳朮湯 治胸膈飽悶飲食作脹或成虛滿痞

硬

白朮 枳實 陳皮 半夏 茯苓 厚朴 青

皮 山查 神麩 甘草 ○胃中寒加砂仁官

桂 ○胃中熱加炒山梔 生姜煎服

舒鬱理氣湯 治胸中氣鬱不舒暢或作酸嘔脹痞

悶不食

蒼朮 香附 山查 甘草 青皮 木香 厚

朴 蓬朮 檳榔 半夏 茯苓 神麩 水煎

鍾姜三片煎服

中湯 治脾胃氣虛飲食不化胸中作悶

人參 白朮 茯苓 甘草 神麩 山查 陳

皮 ○惡心加砂仁藿香 ○唇燥加白芍藥 ○大

便不利加澤瀉 水二鍾姜三片棗一枚煎八分

不拘時服

和中湯 治胸中寒氣作疼作脹或嘔吐不食

厚朴 乾姜 官桂 砂仁 蒼朮 陳皮 山

查 香附 茯苓 半夏 甘草 水二鍾姜三

片煎八分不拘時服

化鬱寬中飲 治胸中原有痰氣嘈熱作脹乃是熱

火生痰

陳皮 半夏 茯苓 甘草 川芎 山查 梔

子 香附 蒼朮 青皮 神麩 水二鍾姜三

片煎八分不拘時服

化鬱調衷湯 治腸腹結痛

陳皮 青皮 蓬朮 三稜 木香 丁香

分二三二

草豆蔻 香附 甘草 白朮 痛極加

分 三分

吳茱萸○有食作吐加藿香山查

姜三片自要方

諸疝門

濕熱 寒鬱 痰飲 死血

病源

夫疝者痛也起自寒濕之氣足之三陰所受三陰者太陰脾少陰腎厥陰肝乃足之陰經也何也足常履地寒濕之氣皆從下起經曰任脉為病其內苦結男子為七疝曰厥曰癥曰寒曰盤曰氣曰附曰狐其症發則可驗七名雖殊大同小異世俗呼為膀胱氣小

腸氣奔豚氣蟠腸偏墜木腎皆由任脉之所起其名
別也大抵腎虛之人寒濕之氣侵于任脉内外之氣
交攻於腎者則爲腎氣腫大而不痛者則爲木腎一
邊偏大者則爲偏墜氣流於膀胱者爲膀胱氣入於
小腸者爲小腸氣腎與膀胱其氣相通二經相并二
氣相攻則爲疼痛矣又有濕濁之氣流入外腎久而
不散變爲濕熱汚濁成膿遂爲囊癰臨病之際不可
不察也

形證

內經曰任脉爲病男子爲七疝曰寒曰水曰筋曰血
曰氣曰狐曰癰

張子和云寒疝者囊冷結硬如石莖不舉或辜丸而
痛得之於坐臥濕地或寒月涉水或值雨雪或坐臥
磚石或風冷處內過房久而無子

水疝者其狀腎囊腫痛陰汗而出或囊腫如水晶或
囊痒而搔出黃水或水腹按之作水聲得之於飲水
醉酒使內過勞汗出而遇風寒之氣聚于囊中故水
冷令人卒疝

筋疝者其狀陰莖腫脹或潰而爲膿裏急筋縮或莖中作痛痛極則痒或挺縱不收或出白物如精髓得之於房室勞傷及邪術所使

血疝者其狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨內端約紋中俗名便癰得之於重感春夏大燠勞於使內氣血流溢滲入浮囊畱而不去結成癰腫膿少血多

氣疝者其狀上連腎脬下及陰囊得之於號哭忿怒號哭則氣鬱而脹忿怒則氣散者是也小兒亦有此候俗名偏墜得之於陰痿精怯強力入房因而子稟

胎病也

狐疝者其狀如仰瓦臥則入小腹行立則出腹入囊中如狐晝出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入往來上下與狐相類也與氣疝大同小異

癰疝者其狀陰囊大如升斗不痒不痛者是也得之於地氣卑濕故江淮間人多有之此七疝之形證靈樞經論七疝一曰厥疝謂逆心痛足寒飲食吐逆不下二曰癰疝謂腹中作滿心下疼痛氣積如劈三曰寒疝謂因飲冷食積脇下腹中作痛四曰盤疝謂

腹中氣痛盤結臍旁五日氣疝謂腹中乍滿乍減而
痛六日附疝謂腹中臍下有積七日狐疝謂小腹與
陰相連而痛大便難此七疝之形證也

又云女子爲瘕聚謂陰戶凸出小腹硬而痛雖亦此
類乃是熱則不能禁固矣不可認作虛寒下脫而用
溫補之藥

脉法

脉訣曰疝多弦而緊弦則爲寒緊則爲痛弦緊相搏
則爲疝矣

內經曰肝脉大緊沉皆為疝心脉滑搏為心疝肺脉
沉搏為肺疝 木香醋

治法

丹溪云疝病專出肝經與腎經絕無相干切不可攻

一治疝之法寒疝宜溫宜用干蟠葱散 姜桂湯

吳茱萸湯 茱萸內消丸

一水疝宜逐水宜用加味五苓散 牽牛湯

一筋疝宜降心火補腎水用 茴香麝皮湯 芡實

一丸

一血疝宜和血用乳香川練散橘核散桃仁

湯

一氣疝宜散氣用聚香飲子檳榔散

一狐疝宜逐氣流經用益智湯椒苓丸

一癰疝宜用蓬朮玄胡散

一膀胱氣外腎腫大不消宜海藻木香湯

一心疝宜用木香散

一通腸疝氣以物抵則上鳴若哇聲宜用益智仁

湯

治方

蟠葱散 治寒疝疼痛作寒熱

官桂 乾姜 蓬朮 甘草 蒼朮 丁香 檳

榔 三稜 茯苓 青皮 玄胡索 木水 二鍾葱

姜煎服

桂姜湯 治寒疝

辣桂 川白姜 吳茱萸 良姜 茴香 畢澄

茄 砂仁 木香 茯苓 益智仁 甘草 白

水煎服

吳茱萸湯

治寒疝

麻黃

羌活

各五分

吳茱萸

四分

藁本

升麻

黃

芪

各三分

黃芩

當歸

黃栢

各二錢

蔓荊子

細辛

柴胡

黃連

半夏

紅花

各六分

蒼朮

一錢

茱萸內消丸

治寒疝

山茱萸

陳皮

吳茱萸

馬蘭花

木香

肉

桂

山藥

川練子

青皮

各等分

酒糊為

丸溫酒送下

加味五苓散 治水疝

木香 小茴 川練子 檳榔 黑牽牛 故紙

木通 青皮 三稜 莪朮 澤瀉 猪苓 白

朮 茯苓 肉桂

茴香蘘皮湯 治筋疝

大茴香 黃栢 知母 當歸 破故紙 益智

仁 甘草 澤瀉 青皮 一方有牡丹皮無破

故紙 燈心十根 生姜三片 煎服

芡實丸 治筋疝

醫方集宜 卷四 十四

川椒 芡實 兔絲子 小茴香 茯苓 木香

胡巴戟 桃仁 生地 右為末酒糊丸桐子大

每服五六十丸空心鹽湯送下

蓬朮玄胡散 治癩疔

蓬朮 玄胡索 當歸 川芎 芍藥 香附

青皮 陳皮 三稜 肉桂 桃仁 甘草

海藻木香湯 治膀胱氣

川練子 木香 昆布 荔枝核 海藻 青皮

小茴香 澤瀉 木通 檳榔 水二鍾姜三片

煎八分不拘時服

木香散 治心疝

木香 陳皮 良姜 乾姜 柯子 枳實 草

豆蔻 黑牽牛 白水煎服

茱萸昆布丸

吳茱萸 茯苓 昆布 檳榔 馬蘭花 官桂

木香 橘核 川練子 海藻 小茴香 右為

末酒糊丸桐子大每服六十九丸空心酒下

牽牛湯 治水疝

黑牽牛 青皮 茴香 澤瀉 木香 檳榔

白水煎服

升麻桃仁湯 治囊癰

升麻 川山甲 白芷 桃仁 紅花 青皮

赤芍藥 甘草 乳香 當歸鬚 水二鍾姜三

片煎八分食前服

茴香練實丸 治陰疝疼痛甚急小腸氣疼

川練子炒 小茴香炒 山茱萸 食茱萸 馬蘭花

青皮 陳皮 芫花 右為末醋糊為丸如桐子

大每服三十九丸空心溫酒送下

蒼朮湯 治癩疔燥濕

蒼朮 二錢 白朮 一錢 陳皮 一錢 木通 八分 赤茯苓

一錢 木香 二錢 檳榔 一錢 官桂 三錢 甘草 二錢 水

二鍾姜三片煎服

桃仁湯 治血疝疼痛

香附 烏藥 桃仁 紅花 玄胡索 甘草

山查 官桂 山川芎 赤芍藥 小茴香 白水

煎服

醫方集 卷四 十六 二十二

復元通氣散 治癩疝外腎腫大疼重

小茴香 川山甲 甘草 陳皮 木香 玄胡

索 白牽牛 水二鍾姜三片煎八分不拘時服

檳榔散 治氣疝肝經寒濕外腎腫大筋連小腹身

熱惡寒

柴胡 川練子 青皮 蒼朮 茯苓 檳榔

玄胡索 官桂 甘草 小茴香 蓬朮 水二

鍾姜三片煎八分食前服

茴香五苓散

白朮 茯苓 小茴香 猪苓 澤瀉 官桂

黑牽牛 莪朮 玄胡索 枳實 附子 三鍾姜

莪朮 玄胡散 治婦人小腸氣 木姜子 五錢 枳實 木 古二

玄胡索 當歸 芍藥 川芎 官桂 蓬朮

三稜 香附 青皮 甘草 桃仁 陳皮

水二鍾 姜三片 煎八分 食遠服 一丈內有煎藥

益智仁湯 治通腸疝氣 以物抵之 則上鳴若蛙聲

益智仁 木香 陳皮 川練子 木通 檳榔

青皮 茯苓 升麻 小茴香 甘草 水二鍾

姜三片煎八分不拘時服

橘核散 治血疝卵核紅腫將成癰爛木魚 水二錢

桃仁 檳榔 紅花 甘草 茯苓 橘核 青

皮 木通 蒼朮 川山甲 〇一方內有海藻

蒼朮 無川練子 水二鍾姜三片煎服

乳香川練散 治血疝

乳香末 三錢 川練子 五錢 火煨 姜蚕 炒為末 右三

味各為末和勻每服二錢用溫酒調服

聚香飲子 治氣疝

檀香 木香 乳香 川烏 延玄胡索 沉香

丁香 藿香 桔梗 甘草 姜黃 水二鍾姜

三片煎八分不拘時服

切疝散

烏頭 山梔子 各等分 為末用長流水同姜汁調服

一方治陰囊腫痛大小便不通

白牽牛 二兩 桑皮 白朮 木通 陳皮 各五錢

右為末每服二錢空心姜汁調服

定痛速效散

橘核 梔子炒 山查 吳茱萸 荔枝核炒 川練

子肉木 右為末空心長流水調服

五葉湯

枇杷葉 野紫蘇葉 椒葉 蒼耳子葉 水晶

蒲桃葉 右五味不拘多少量水煎湯浴洗

椒苓丸 治狐疝

真川椒

一斤去梗除閉口者炒令人出汗

白茯苓

十斤去皮

共為末密

和干杵丸如桐子大每服五六十丸空心鹽湯酒

任下

五苓散方見中濕門

痰門

病源

夫痰者濕土所生津液所化痰之在身如水之流貴乎順則流通而肢節活利隨氣往來或爲風寒濕熱所感或因七情飲食所傷以致氣逆津化成痰或畱結於胸或凝滯於經絡隨氣升降無處不到爲害百端丹溪云諸病生痰火痰火生異症若畱於臟腑爲飲爲嗽爲脹爲嘔爲眩暈爲顛癇爲吞酸爲嘈雜爲

怔忡滯于經絡爲疼痛爲麻木爲結核爲腫塊爲寒
熱皆是物也嗟夫痰本生於脾胃治當以調脾胃燥
濕爲先以治之大畧言熱痰則清之濕痰則燥之風
痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食痰則消之又
有五飲一曰懸飲飲水流於脇下咳唾則痛二曰溢
飲飲水流於四肢當汗不汗身體腫痛三曰支飲飢
逆倚息短氣難臥其形如腫四曰痰飲其人素虛腸
間瀝瀝有聲五曰留飲背惡寒或短氣而渴四肢歷
節痛脇下痛引缺盆咳嗽轉甚此五飲爲病之不同

也或有中痰若風症者手足癱瘓口眼歪斜不能言語一邊身不遂或手足身中一點釣痛多睡口中流涎亦痰候也不可誤用風藥臨此者尚宜斟酌行之

形證

丹溪云有熱痰有寒痰有食積痰有風痰有酒痰有老痰

熱痰者其狀煩渴涕稠粘色黃

寒痰者其狀心頭冷痛如停冰雪遇寒則嗽

食積痰者其狀食後則喉中有物如絮或清晨唾痰

如核而滑

風痰者其狀咽中有聲吐出如凡沫

酒痰者其狀嘔吐酸涎綠水醋心眩暈

老痰者其狀咽嗑不利咯之不出嚥之不下形如桃

膠蜆肉

王隱君云痰症爲患非上一端或夢奇怪鬼魅之物

或足腕酸軟肢節煩痛手麻背疼口眼蠕動狀若

悶挫或脊中每有一掌如水凍之寒痛者或身習

習如蟲行者或項有結核喉閉怔忡如人將捕

或顛狂失志皆痰之所致也

痰飲者有五一日懸飲二日溢飲三日支飲四日痰

飲五日留飲

懸飲者謂飲水流於脇下咳唾則痛

溢飲者謂飲水流於四肢當汗不汗身重疼痛

支飲者謂飪逆倚息短氣不得臥其形如腫

痰飲者謂其人素虛腸間瀝瀝有聲

留飲者謂背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下
痛引缺盆咳嗽轉甚

脉法

脉訣云痰脉多弦滑熱則多浮寒則多沉
陳無擇云痰飲之脉弦微沉滑

丹溪云又得瀆脉痰飲膠固脉道阻塞也

治法

一二陳湯 總治一身之痰隨症加減用

一熱痰宜用 黃芩利膈丸 滾痰丸

一寒痰宜用 半夏湯 丁香半夏丸 星香散

一食積痰宜 麩朮茯苓湯 化痰丸

一風痰宜用 干縉湯 導痰湯

一酒痰宜用 葛根解醒湯 逐水枳實湯

一老痰宜用 化痰湯 活痰湯

一痰飲有五宜用 海藏五飲湯

治方

二陳湯 治一切痰飲

陳皮 半夏 茯苓 甘草 水二鍾 姜三片煎

八分 食遠服 ○此方半夏豁痰燥濕 橘紅消

痰利氣 茯苓滲濕 甘草補脾 益補脾則不

生濕燥濕則不生痰利氣則痰消可謂體用不失

標本兩盡之藥也

寒痰加附子姜桂

濕痰加蒼朮白朮

熱痰加黃連梔子

食積痰加神麩山查

風痰加南星皂角

燥痰加萋實青黛

鬱痰加香附枳實

老痰加海石朴硝

王隱君礞石滾痰丸

括曰

甌裏翻身甲掛金

於今頭在草堂深

相逢二八求斤正

硝煨青礞倍若沉

十七兩中零半兩 水丸桐子意常斟

千般恠病如神效 水瀉雙身却不任

大黃 酒蒸 黃芩 酒洗各 沉香 五錢 礞石 煨過 右

為末清水和丸萊豆大每服五六十丸用滾白湯

下 ○此藥用黃芩大黃大瀉陰陽之濕熱 礞

石以墜痰 沉香則引諸氣上而至天下而至泉

為使也

煨青礞石法用青礞石四兩煨硝四兩入砂礞內

用瓦片蓋之將鐵線縛定鹽泥固濟晒乾火煨紅

過夜候冷取出如金色

半夏湯 治濕痰壅盛

半夏 二錢湯 細辛 五分 陳皮 一錢 茯苓 一錢 甘草

四分 水二鍾姜三片煎八分不拘時服

導痰湯 治一切痰并風痰

半夏 二錢湯泡 南星 一錢湯泡 枳實 炒一錢 赤茯苓 一錢 橘紅

二錢 甘草 五分 水二鍾姜三片煎八分不拘時服

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮 茯苓 甘草 半夏 旋覆花 青皮

桔梗 枳殼 細辛 人參 水二鍾姜三片煎

八分不拘時服

茯苓半夏湯 治胃虛身腫有痰惡心欲吐是風邪

羈絆於脾胃之間

白茯苓 半夏 白朮 天麻 陳皮 神麴

麥芽 水二鍾姜五片煎八分食遠服

麴朮茯苓湯 治食積痰

神麴 蒼朮 半夏 厚朴 陳皮 甘草 枳

實 姜三片煎服

人參半夏丸 治清嗽化痰

茯苓 人參 半夏 南星 薄荷 生姜 白

礬 寒水石 蛤粉 右爲末麩糊丸棗豆大每

服三五十九丸姜湯送下 ○一方加黃芩黃栢治

酒痰甚效

海藏五飲湯 治五飲

旋覆花 人參 陳皮 枳實 茯苓 甘草

白朮 厚朴 猪苓 澤瀉 前胡 桂心 芍

藥 水二鍾姜三片煎服

驅痰飲

南星 半夏 青皮 陳皮 赤茯苓 草菓

甘草 姜三片煎服

丁香 茯苓湯 治寒痰

丁香 茯苓 木香 乾姜 半夏 附子 肉

桂 陳皮 砂仁 水二鍾 姜三片 棗一枚 煎八

分不拘時服

辰砂化痰丸

辰砂 另研 白礬 五錢 火 天南星 一兩 湯 半夏 麩 三

辰砂 為衣 煨 枯 泡 兩 三

○右爲末姜糊和丸如桐子大每服三十丸姜湯

送下 參 半夏 南星 薄荷 生姜 白

清氣化痰丸 哈粉 右爲末麩糊丸菜豆大每

南星 半夏 黃連 黃芩 栝蒌仁 茯苓

杏仁 陳皮 枳實 甘草 右爲末姜糊爲丸

如桐子大每服七十丸姜湯送下

溫胃化痰丸 治寒痰 枳實 茯苓 甘草

半夏 三兩 陳皮 乾姜 炮 白朮 各二兩 右爲末姜

糊丸如桐子大每服五十丸姜湯送下

利膈化痰丸

南星

湯泡

半夏

姜製

蛤粉

香附

童便
煮

萋實

貝

母

去心各一
兩五錢

右為末姜糊丸如桐子大每服五十

丸姜湯送下

葛花解醒湯

方見傷飲門

治酒痰

逐水枳實丸

消痰導滯逐飲

枳實

半夏

陳皮

各二
兩

黑牽牛

頭末
三兩

右為末麵

糊丸桐子大每服五十丸姜湯送下

丁香半夏丸

治脾胃宿冷停痰嘔吐

肉豆蔻 木香 丁香 人參 陳皮 藿

香 五錢 半夏 湯泡 右為末姜汁糊丸如桐子大

每服三四十九丸姜湯送下

清氣化痰丸 清頭目涼膈化痰

陳皮 半夏 茯苓 甘草 右為末姜汁糊丸

如桐子大每服五六十丸姜湯送下

黃芩利膈丸 除胸中之熱利膈上之痰

煮黃芩 二兩 半夏 澤瀉 黃連 各五錢 南星 煨 枳

壳 陳皮 各三錢 白朮 二錢 白礬 一錢 右為末姜

汁浸蒸餅和丸如桐子大每服五六十九丸姜湯送

下

星香飲子 方見中風門 治寒痰

活痰湯 治喉中壅碍咯不出嚔不下結塞不利

桔梗 寒水石 香附 萸仁 杏仁 陳皮

茯苓 半夏 青皮 水二鍾姜三片煎八分食

遠服

三子養親湯 治痰氣

紫蘇子 白芥子 蘿白子 右三味每用一兩

碾碎用絹袋盛煎湯不拘時服

南星蒼朮湯 治膀臂重疼脉沉嘔吐

南星 橘皮 半夏 甘草 茯苓 白芥子

蒼朮 竹茹 黃芩 酒炒 水二鍾姜三片煎八分

不拘時服

干縉湯 治風痰

半夏 湯泡七次 皂角 一寸 甘草 炙 水二鍾姜三片煎

服

咳嗽門

病源主

有痰飲

有火鬱

有勞嗽

有風寒
有痰飲
有火鬱
有勞嗽
有肺脹

夫咳者傷於肺氣有聲而無痰嗽者動於脾濕無聲

而有痰咳嗽謂有聲有痰因傷肺氣而動於脾濕以

致之也夫肺爲五臟之華蓋聲音之所出合於皮毛

而司乎腠理故風寒先能傷之若腠理不密外爲四

氣所感則令人咳嗽傷於風者則脉浮鼻塞聲重清

涕惡寒發熱自汗傷於寒者則脉緊無汗惡寒煩燥

不渴傷于熱者則脉數煩渴引飲咽乾唾涕傷于濕

者則脉細四肢沉重骨節煩痛此四氣之所傷也或有七情干於五臟六腑傳於肺經亦能令人咳嗽弗獨肺經也治瘵之法審其寒熱辨其虛實寒者溫之熱者清之虛者補之實者瀉之至如停飲咳嗽則當消而逐之其或不謹日久多成勞瘵虛損之病凡此諸症在於臨時消息則了然無不瘵矣

脉法

脉訣云浮而緩者為傷風 浮而緊者為傷寒 咳

脉浮濡者生 緊瀼者死 肺脉沉數者咳血 沉

滑者多痰

治法

一傷風咳嗽聲重惡寒宜用華蓋散 參蘇飲

一感冒咳嗽頭疼宜用火金沸草散 人參荊芥散

一痰飲咳嗽宜用二陳湯隨症加減以治之

一火鬱生痰面赤作嗽宜用降火化痰丸

一勞瘵咳嗽宜用滋陰降火之藥治在本門

一肺脹動則喘滿氣急息重宜用收斂之藥

子 五味子 杏仁 青黛之類

一肺脹抑遏不得眠者難治

一上半日嗽多是胃中有火宜用知母石膏

之藥降之

一下半日嗽多者是陰虛宜滋陰降火宜用四物

湯加知母黃栢之類

一黃昏時咳嗽多者是火氣浮於肺不宜用涼藥以

五味子斂之

一咳嗽脇痛者宜用

二陳湯加

青皮

青黛

以疎肝氣或加

白芥子

一肺受虛寒久嗽不止宜川人參清肺散

一冷嗽吐痰沫宜用溫肺湯

一肺痿咳嗽有痰胸傍腫痛午後熱聲颯者宜用

人參養肺湯

一咳嗽聲啞便不可用涼藥宜用赤半夏一細辛

生姜之類以散之

一咳嗽咽乾不可用半夏南星之藥宜用貝母

萎仁以潤之

治方

華蓋散 治肺傷風寒

麻黃 紫蘇 杏仁 桑皮 赤茯苓 橘紅

甘草 水二鍾姜三片煎八分不拘時服

金沸草散 治肺感風邪

荆芥 麻黃 前胡 甘草 赤芍藥 半夏

金沸草 水二鍾姜三片棗一枚煎服

參蘇飲 治肺受風邪咳嗽聲重有痰頭疼

人參 紫蘇 枳壳 茯苓 陳皮 前胡 桔

梗 乾葛 甘草 半夏 水二鍾姜三片棗一

一枚煎服

人參荆芥散 治肺受風邪伏熱頭痛咳嗽鼻塞聲

重

人參 荆芥 麻黃 細辛 桔梗 陳皮 半

夏 杏仁 甘草 水二鍾姜三片棗一枚煎服

人參清肺湯 治肺受虛熱久嗽不止

人參 阿膠 杏仁 桑皮 地骨皮 知母

烏梅 栗壳 甘草 水二鍾姜三片棗一枚煎

服

溫肺湯 治冷嗽吐痰沫

半夏 陳皮 五味子 木乾姜 薄桂 杏仁

細辛 阿膠 甘草 水二鍾姜三片棗一枚煎

人服 治肺受熱熱火燥不出

降火化痰丸 治火鬱生痰面赤作嗽

黃芩 海石 萋實 青黛 桔梗 甘草 半

夏 青皮 炒梔子 右為末煉蜜丸如桐子大

人每服六十九姜湯送下

人參養肺湯 治肺痰咳嗽

人參 甘草 阿膠 茯苓 柴胡 五味子

貝母 杏仁 桔梗 枳實 桑皮 水二鍾姜

三片煎服

人參款花膏 治久嗽潤肺

款冬花 人參 五味子 紫苑 桑皮 右爲

末蜜丸如鷄頭子大每服一九細嚼姜湯送下

貝母散 治無痰嗽久不愈者

貝母 桑皮 五味子 甘草 知母 杏仁

款花 姜三片煎服

醫方集要 卷四
款花散 治久嗽不止

人參 款冬花 五味子 知母 貝母 粟壳

烏梅 姜三片煎服

清化丸 治鬱痰喘嗽不止

貝母 杏仁 青黛 右爲末蜜丸如彈子大每

一丸噙化

附肺痿 肺癰

病源

咳嗽有濁痰腥氣或咳唾中有紅絲膿血者名曰肺

痿此因熱在上焦也如口中燥欬胸中隱隱而痛名曰肺癰此因咳傷肺葉而成也

脉法

脉法曰肺癰之脉寸數而實肺痿之脉寸數虛濇浮大者生短濇者死

治法

桔梗湯 治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤濇

桔梗 貝母 當歸 瓜蒌子 枳壳 薏苡仁

桑白皮 防己 黃芪 杏仁 百合 甘草節

水二鍾姜三片煎八分食遠服

貝母湯 治肺癰

貝母 知母 白芷 阿膠 白芨 甘草 射

干 生地黃 桔梗 薄荷 杏仁 烏梅 桑

皮 天門冬 姜三片食遠服

平肺散 治肺痿

人參 去蘆 青皮 天門冬 去心 茯苓 陳皮 去白

地骨皮 甘草 炙各一錢 五味子 三十粒 知母 一錢五分 桑白

皮 二錢 水二鍾姜三片食遠服

知母茯苓湯 治肺痿

知母 白朮 茯苓 五味子 人參 半夏

柴胡 甘草 薄荷 川芎 阿膠 款冬花

桔梗 黃芩 麥門冬 姜三片 食遠服

喘門

病源

有寒 而有火 有痰 陰虛 而氣虛 肺風 金而濕火

人之五臟肺最居上專主乎氣喜清而惡濁經曰清陽出上竅或為四氣外感所干或因七情內鬱鬱而

生痰則爲喘喘則氣急促而不能定息焉然喘有不
同有因痰而致者有因火而致者有因氣而致者有
因痰而喘者發則有聲因火而喘者肺屬金而惡火
邪火來乘肺而爲之也因氣而喘者七情之氣干於
肺氣逆上衝而爲之也大抵喘皆屬肺治法宜降火
清金豁痰抑氣或曰喘有利下而愈之者亦有因下
而殂之者蓋視其虛實察其寒溫若汗出髮潤而喘
者爲肺絕汗出如油而喘者爲命絕直視讖語喘滿
者皆不治其或風邪浸肺久而不散鹽酸傷肺因而

不解而爲嘔喘者亦有之嗚呼可不慎哉

形證

戴云喘症不一有痰喘有氣喘有胃喘有火炎上喘
痰喘者凡喘便有痰聲氣喘者呼吸急促而無痰胃
氣虛喘者擡肩擷項喘而不休火炎上喘者乍進乍
退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠
痰得食入咽墜下稠痰喘卽止稍久食已入胃及助
其火痰再升上喘反大作勿以胃虛治用燥熱之藥
是以火濟火也

脉法

凡喘病脉滑而手足溫者生脉濇而手足冷者死

治法

一感冒風寒鼻塞聲重咳而喘急者宜用三拗湯

華蓋散 小青龍湯

一痰喘咽中半有痰聲宜用千緡湯 半夏湯

抑痰湯

一氣喘因肺氣不清呼吸急促而有聲宜用蘇子

降氣湯 定喘湯

一 胃氣虛喘宜用 人參保肺湯

一 火炎上而喘者宜用 瀉白散

一 老人素有痰喘病遇寒暄則發連綿不已宜用

蘇沉九寶飲 杏蘇散

一 形實有痰喘熱者宜用 七神定喘湯

治方

半夏湯 治痰有聲脉沉者

大半夏

二錢

茯苓

一錢五分

甘草

三分

陳皮

二錢

細辛

三分

桑白皮

一錢

水二鍾姜三片煎服

千緡湯 治痰喘不得臥

半夏 二錢 皂角 一寸 甘草 四分

水二鍾姜三片

煎服

蘇子降氣湯 治痰喘

紫蘇子 半夏 桑皮 陳皮 甘草 大覆皮

杏仁 青皮 前胡 木香 水二鍾姜三片棗

一枚煎八分食遠服

蘇子湯 治憂思傷脾肺作喘脹

紫蘇子 半夏 木香 木通 陳皮 大覆皮

人參 草菓 甘草 厚朴 枳實 白朮

水二鍾姜三片煎服

七神定喘湯 治形實有痰喘熱

杏仁 麻黃 石膏 桑皮 陳皮 青皮 甘

草 細茶一撮煎服

杏蘇散 治痰嗽喘急

杏仁 紫蘇 陳皮 青皮 枳壳 甘草 麻

黃 知母 桔梗 前胡 黃芩 半夏 桑皮

姜三片細茶一撮煎服

瀉白散 治火氣作喘

桑皮 知母 青皮 杏仁 地骨皮 甘草

姜三片煎服

人參保肺湯 治胃氣虛喘

人參 茯苓 阿膠 白朮 甘草 杏仁 陳

皮 桑皮 五味子 薄桂 水二鍾姜三片棗

一枚煎服

華蓋散 方見嗽門 治感冒鼻塞聲重咳喘

小青龍湯 方見寒門 治同上

三拗湯 治同上

麻黃 杏仁 甘草 水二鍾姜三片葱白煎溫

服出汗

抑痰湯 治同千緡湯

瓜蒌仁 半夏 貝母

定喘湯 治同蘇子降氣湯

麻黃 杏仁 半夏 片苓 桑白皮 煨冬花

甘草 白菓

蘇沉九寶飲 治同杏蘇散

紫蘇 桑白皮 麻黃 半夏 杏仁 五味子

甘草 烏梅 大腹皮 乾姜 薄荷 陳皮

附喘喘

宜薄滋味治痰為主不用寒涼須帶發散此寒包熱

也

治方

寒包熱作喘

麻黃 杏仁 甘草 半夏 桔梗 紫蘇 枳

壳 桑皮 薄桂 水二鍾姜三片煎服

劫去

用猪膽七個

硫黃

一兩

取膽汁同黃熬乾後用慢

火煮待硫黃中清汁出傾於磁器內冷定爲末每

用一分或半分茶清調下

勞瘵門

病源

夫勞瘵之病治療最難蓋起自於心傳變五臟非一朝一夕之所成也古有傳尸一症種類甚多因蟲嚙臟腑患者身發寒熱盜汗遺精髮乾膚燥腸中有塊

腦後結核咳嗽痰涎咯血肺痿羸瘦困乏或吐或瀉
此皆陰虛火動而作也如此多致不救更相傳染發
作皆因前人相似至於滅門者多有之或有不染者
何蓋邪之傷人壯者氣盛不能爲害怯者則着而成
病也由乎人之不謹色慾過度損傷精血必生陰虛
火動之病爲害匪輕然欲求生須愛命堅心絕房室
息妄想戒惱怒節飲食自培其根尚宜早治或有生
焉者否則肌肉消爍困乏着床雖良醫不能治也
或問童男室女有患勞病多不救者何也荅曰夫人

以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者多因積
想在心思慮過當以致損傷心氣蓋憂愁思慮則傷
心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散月水先閉也
火旣病而不能榮養其土故不嗜食脾旣病則金氣
虧而生嗽嗽久則水氣絕而肢體乾腎水旣枯木無
所榮養肝氣不充故多怒髮焦筋痿是病大抵起自
於心傳遍五臟故藥力不能及以致不救畱連歲月
雖不遽死亦終必亡而已矣

形證

丹溪云諸病莫若勞症最爲難治蓋因壯年不能保養性命耽於酒色日夜無有休息卒致損傷真元虛耗精液則嘔血吐痰骨蒸體熱面白顴紅口乾咽燥盜汗遺精咳嗽怠惰謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡善養生者如前症初見一二之時卽當服藥病必求痊若姑息日久形體瘦甚真元已脫然後從而醫治雖盧扁復起不能救其萬一良可歎哉

葛先師云其傳尸一症多有蟲者其害人甚惡雖

人受此已爲足憐況有侍奉親密之地或有氣連肢
屬薰陶日久受其惡氣多遭染傳名曰傳尸又曰喪
屍曰飛屍曰遁屍曰殍蠅屍曰尸疰曰鬼疰蓋表其
傳注醜瘡而神妙莫測之名也雖然未有不因氣體
虛弱損傷心腎而得者初起於一人不謹而後傳注
千數十人至於闔門盡滅者誠有之矣此病最爲可
惡蓋鬱積之久則生異物食人臟腑精華變生諸般
奇怪之物誠可驚駭是以勞傷肝膽者則生毛蟲刺
蝟瓦蛭之屬食人腸膜勞傷於心與小腸者則生羽

蟲如燈蛾蚊虫禽鳥之形食人血脉勞傷于脾胃者
則為保蟲如嬰孩蚯蚓之類食人肌肉勞傷于肺與
大腸者則為介蟲龜鱉蝦蟹之狀食人膚膏勞傷于
腎與膀胱者則為鱗蟲如魚龍蛟蜃之形食人骨髓
形狀不一不可勝紀凡人覺有此症便宜早治緩則

不能濟矣

戴云此陰虛之極痰與血病多有蟲者其傳尸一症
不可云無若寒熱交攻久嗽咯血日益羸瘦脇下作

痛在背偏枯皆難治矣

王節齋云男子二十前色慾過度損傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱咳嗽倦怠無力飲食少思甚則痰涎帶血咯嗽出血或咳血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最難治療輕者用藥數十服重者期歲然必須病人重命堅心絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥亦無用矣治之於早則易若待肌肉銷鑠着床尺脉沉數則爲難治蓋此病屬火內消陰血大便多燥然雖節飲食勿令之泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀溏寒冷

之藥似難用矣

脉法

經曰數而無力爲陰虛火動之脉

又曰失血之脉芤而且濇

平人脉大爲勞極虛亦爲勞

脉訣云骨蒸勞熱脉數而虛熱而濇小必損其軀加

汗加嗽非藥可醫

治法

一治療病先當補養氣血降心火滋腎水清其骨熱

保肺化痰追蟲涼血此其大法也更炙膏盲四花
諸穴多有可效者

一勞瘵初起發熱咳嗽嘔血宜用

滋陰保肺湯加

減用

一勞瘵初起潮熱盜汗咳嗽倦怠宜用

柴胡飲子

或補陰丸

一因憂思損傷心氣咳嗽潮熱痰中有血恍惚倦怠

宜用

劫瘵散

門冬地黃湯

加減扶羸湯

一瘵極骨蒸盜汗肌瘦食減宜用

黃芪鱉甲散

一虛癆日久咳嗽發熱精神短少夜夢遺精盜汗宜

用 保和湯 保真湯 蛤蚧散 和肺飲 太

平丸 白鳳膏

一蟲癆面唇紅時或腹痛宜早服 神授丹

治方

滋陰保肺湯 主方

知母 黃栢 當歸 麥門冬 陳皮 甘草

白芍藥 水二鍾姜三片煎八分食遠服○若咳

嗽盛加 桔梗 桑白皮○若痰盛加 半夏

葇實 馬兜苓 ○若痰不清去 半夏 加貝母

款冬花 ○若潮熱加 沙參 地骨皮 柴胡 ○

若盜汗多出加 牡蠣 黃芪 浮麥 ○若夢遺

精滑加牡蠣 茯苓 若衄血咳血出於肺也加

桑皮 炒梔子 阿膠珠 天門冬 ○若咳血痰

血出於脾也加 貝母 黃連 葇實 ○若嘔血

吐血出於胃也加 蒲黃 桃仁 炒梔子 韭

汁 ○若咯血唾血出於腎也加 側柏葉 五味

子 ○若大便泄瀉去 當歸 黃栢 加山藥

薏苡仁○若脇痛加青黛柴胡稍○若咽不

利加玄參訶子○若咳久痰稠見血加五紫

苑血百合○若久嗽不宜用燥藥蓋肺喜潤而惡

燥

柴胡飲子治勞瘵初起潮熱盜汗咳嗽倦怠

柴胡當歸白芍藥知母黃栢地骨皮

茯苓生地黄甘草黃芪熟地黄麥門

冬水二鍾姜三片煎八分食遠服

劫癆散治傷心氣咳嗽潮熱痰有血

白茯苓 生地黃 當歸 貝母 阿膠 天門

冬 五味子 甘草 門 紫苑 水 二 鍾 姜 三 片 煎

八分不拘時服

加減扶羸湯 治同上

秦艽 鱉甲 人參 當歸 紫苑 甘草 地

骨皮 柴胡 不用引

神授丹 治蟲癆面唇紅腹痛

川椒 四兩閉口 苦練根 向東南者去 為末用酒

糊丸如棗豆大每服二十九空心滾白湯送下

保和湯 治癆瘵肺成痿者服之神效

知母 貝母 天門冬 款冬花 麥門冬 天

花粉 薏苡仁 杏仁 甘草 五味子 馬兜

苓 紫苑 百合 桔梗 阿膠 當歸 生苳

紫蘇 薄荷 水二鍾姜三片煎服

保真湯 治癆症體虛骨蒸

當歸 生苳 白朮 黃芪 人參 地蓮心 麥赤

茯苓 白茯苓 天門冬 麥門冬 陳皮 芍

藥 知母 黃栢 五味子 銀柴胡 地骨皮

赤芍藥 熟苜 甘草 水二鍾姜二片棗一枚

煎服

太平丸 治癆症久嗽肺痿肺癰

天門冬 麥門冬 知母 貝母 款冬花 杏

仁 去皮尖炒 當歸 生地黃 熟地黃 黃連

阿膠 各兩半 蛤粉 炒 蒲黃 京墨 桔梗 薄荷

白蜜 四兩 麝香 少許 為末和勻用銀器石器先

下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火少入麝香

畧熬一二沸丸如彈子大每日三服食後細嚼用

薄荷湯送下臨睡噙化下一丸如痰盛用錫糖拌
化一丸吞下服此藥仰臥使藥入肺竅內則肺潤
其嗽退七日病痊凡一切咳嗽服此藥即愈

白鳳膏 治一切久嗽怯癆極虛憊咳嗽吐痰咳血

發熱

黑嘴白鴨一隻 大京棗二升 參苓平胃散一

升 陳煮酒一瓶 右將鴨縛定脚量人飲酒多

少隨量以酒盪溫將鴨項割開滴血入酒攪勻飲

之直入肺經潤補其肺次將鴨乾擗去毛於脇邊

開一孔取其腸拭乾次將棗子去核每個內入參
苓平胃散裝滿盛入肚內用麻扎定以沙鍋煮
黃芪鱉甲散 治癆極骨蒸盜汗肌瘦食減

黃芪 鱉甲 桑皮 半夏 秦艽 地骨皮

茯苓 人參 桔梗 天門冬 赤芍藥 生地

紫苑 知母 肉桂 柴胡 甘草 水二鍾姜

三片煎服

蛤蚧散 治同保和湯

蛤蚧 人參 百部 款冬花 紫苑 貝母

柴胡 阿膠 鱉甲 肉桂 黃芪 甘草 杏

仁 半夏 水二鍾姜三片煎服

和肺飲子 治同上

阿膠 人參 麥門冬 山藥 貝母 茯苓

百合 杏仁 甘草 水煎入黃蠟如皂角子大

一塊食後服

補丸 治同柴胡飲

黃栢 知母 熟地黃 龜板 白芍藥 陳

皮 牛膝 虎脛骨 鎖陽 當歸

各二兩

酥炙

各三兩

爲末用酒煮羯羊肉和丸如桐子大每服五七十

丸空心鹽湯下

天門冬丸 治同劫癆散

天門冬 杏仁 貝母 茯苓 阿膠

爲末蜜丸如彈子大每服一丸空心鹽湯化下

門冬地黃丸 治同上

麥門冬

去心 二兩

生地黃

二兩 酒浸

當歸

二兩

五味子

五錢

爲末蜜丸如桐子大每服六十九滾白湯下

諸虛門

病源

飢飽勞役傷脾 色慾奪精傷腎 持重努力傷肝

恐懼憂思傷心 形寒飲冷傷肺

夫虛損之病非止一端或自於憂思傷心飲食傷脾

恚怒傷肝寒濕傷肺色慾傷腎此五臟之所傷也難

經云所謂五損者一損損於皮毛皮聚而毛落二損

損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六腑三損損於

肌肉肌肉消瘦不能爲肌膚四損損于筋筋緩不能

自收持五損損於骨骨痿不能起於床骨痿不能起

於床者死然治損之法奈何凡損其肺者益其氣損
其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損
其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之法大抵
虛損勞極之症未有不因氣體虛弱心腎有虧水火
不濟而致也臨病之際又當斟酌輕重以調治斯得
之矣

又曰形證

戴云發熱肌瘦腰膝無力小便頻數大便滑泄目眩

耳聾虛火上攻面赤發喘此皆諸虛之症

丹溪云陰虛發熱症最難治飲酒人發熱者難治不
飲酒人因飲酒發熱者亦難治又曰發熱晝重夜輕口中無味此陽虛之症也午後
發熱夜半則止口中有味此陰虛之症也陽虛責胃
陰虛責腎飢飽傷胃陽氣虛矣房勞傷腎陰血虧矣
古人以飲食男女爲切要厥有旨哉

脉法

脉經云脉來軟者爲虛緩者爲虛微者爲虛弱者爲
虛

丹溪云脉大而無力爲氣虛

要訣曰脉花者爲氣虛 脉遲卜者爲氣脫 又曰

血虛脉大如葱管

治法

一氣虛宜用 四君子湯

一血虛宜用 四物湯

一氣血俱虛宜用 八物湯 十全大補湯

一陰虛宜用 補陰丸 虎潛丸 坎離丸

一內傷氣虛發熱宜用 補中益氣湯 人參固本

一丸 益胃升陽湯

一大傷氣血男女諸虛盜汗無力四肢倦怠肢肉消

瘦宜用 鹿茸大補湯 大建中湯 人參膏

一損傷心血驚怖心跳宜用 人參養胃湯 天王

補心丹

一色慾過度傷腎腰膝無力精神短少夜夢遺精宜

用 滋陰補腎丸 加味虎潛丸 無比山藥丸

還少丹

治方

四君子湯

治氣虛

人參

白朮

茯苓

甘草

水二鍾姜三片煎

八分不拘時服

四物湯

治血虛

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

剉白水煎服

八物湯

即八珍

治氣血俱虛

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

芍

藥

熟地黃

白水煎服

十全大補湯

治同上

人參 黃芪 甘草 當歸 白朮 芍藥 肉

桂 熟地黃 川芎 煎水二鍾 姜三片 棗一枚 煎

服 益胃升陽湯 治內傷氣虛發熱

益胃升陽湯 治內傷氣虛發熱

柴胡 升麻 甘草 當歸 陳皮 木人參 神

麴 黃芪 白朮 黃芩 白水煎服

補陰丸 方見癆瘵門 治陰虛

人參固本丸 治同益胃升陽湯

天門冬 去心 麥門冬 去心 生地黃 各二兩 人參 一兩

熟地黃

二兩

右四味除參俱不見鐵器搗成膏

煉蜜丸如桐子大每服六十九丸鹽湯下

人參膏

治大傷氣男女諸虛

右用人參不拘多少細咀量水以銀器內慢火熬

稠用磁器盛貯每服一二匙空心滾白湯下

加味虎潛丸

治房勞傷腎精神短少夢遺

人參

黃芪

芍藥

煨黃栢

鹽酒炒

當歸

酒洗

山藥

各一兩

鎖陽

酥炒

枸杞子

各二兩

虎脛骨

酥炙

龜板

酥炙

破故紙

炒

杜仲

姜汁拌炒絲斷

五味子

各七錢半

兔絲子

鹽酒浸三

宿細研焙乾
入諸藥再研
牛膝去蘆酒洗
熟地黃四兩
右為細

末煉蜜和猪脊髓為丸如桐子大每服五六十丸

溫酒或姜鹽湯下

還少丹 治同上

牛膝一兩五錢
茯苓五錢
山藥一兩五錢
山茱萸
肉蓯蓉

酒洗
遠志去心
大茴香炒
杜仲炒去絲
楮實子五

味子
石菖蒲
枸杞子
熟地黃酒洗搗各五錢

無比山藥丸 治同上

赤石脂
茯苓
山茱萸
熟地黃酒浸
巴戟天

去心 牛膝 各一兩 杜仲 炒去絲 三兩 澤瀉 一兩 兔絲子 酒煮

炒為末 山藥 各三兩 五味子 六錢 肉蓯蓉 酒浸搗 四兩 為

末蜜丸如桐子大每服五六十九空心鹽滾湯下

滋陰補腎丸 治同加味虎潛丸

黃栢 酒炒 兔絲子 酒煮炒 熟地黃 酒浸 牛膝 龜板

酥炙 虎骨 酥炙 知母 鹽水炒 芍藥 白朮 山藥

當歸 枸杞子 各三兩 人參 黃芪 鎖陽 酥炙 破

故紙 炒 杜仲 炒去絲 陳皮 各二兩 為末蜜或酒丸如桐

子大每服六十九空心淡鹽湯下

鹿茸大補湯 治同人參膏

鹿茸 黃芪 肉蓯蓉 杜仲 白茯苓 當歸

芍藥 陳皮 附子 肉桂 五味子 石斛

白朮 半夏 人參 甘草 熟地黃 水二鍾

姜三片 棗一枚 煎服

大建中湯 治同上

黃芪 附子 地骨皮 鹿茸 石斛 人參

當歸 芍藥 續斷 川芎 甘草 小草

水二鍾 姜三片 棗一枚 煎服

人參養榮湯 治損傷心血驚怖心跳

人參 當歸 陳皮 黃芪 桂心 白朮 甘

草 芍藥 熟地黃 茯苓 五味子 遠志 去心

水二鍾姜三片棗一枚煎服

天王補心丹 治同上

人參 五錢 當歸 一兩 五味子 一兩 麥門冬 去心 天

門冬 去心 栢子仁 一兩 酸棗仁 一兩 白茯苓 五錢

玄參 五錢 丹參 五錢 桔梗 五錢 遠志 去心 生地黃

四兩 爲末蜜丸如彈子大硃砂爲衣每服一丸臨

臥燈心湯下

補中益氣湯 治內傷氣虛發熱

黃芪 當歸 柴胡 升麻 人參 白朮 甘

草 陳皮 白朮煎

虎潛丸 治陰虛

人參 當歸 炙黃芪 白朮 白茯苓 熟地

山藥 杜仲 牛膝 故紙 知母 虎脰骨 酥炙

龜板 煉蜜為丸酒送下

坎離丸 治陰虛

當歸

全用好酒浸洗三日灑乾剉碎

川芎

大者用清水洗淨剉碎各四兩

白芍藥

溫水洗淨剉碎用好酒浸一日晒乾炒赤四兩

知母

去毛四兩與黃栢製同

熟地黃

八兩淮慶者佳四兩用砂仁四兩用白茯苓同入

絹袋入好酒二壺煮乾去砂仁茯苓二味只用地

黃

厚黃栢

去皮入兩內二兩鹽水浸二兩酒浸二兩人乳浸二兩蜜浸俱晒乾炒赤

右六味修製明白和合一處平鋪三四分厚夜露

日晒三日三夜以收天地之精日月之華研細末

用正冬蜜一斤八兩加水半碗共煉至滴水成珠

再加水一碗煎一滾和前藥丸梧桐子大每服八

九十九丸空心鹽湯送下冬用溫酒服之

附蒸病

治法

通用五蒸湯

人參 知母 黃芩 生地黃 甘草 乾葛

石膏 茯苓 竹葉 糯米 ○實熱加 黃連

黃栢 黃大黃 ○虛熱加 秦艽 柴胡 鱉甲

五臟

○肺蒸鼻乾加 麥門冬 天門冬 烏梅 紫苑

大腸蒸右鼻孔乾加 大黃 朴硝

皮蒸舌白加 桑皮 石膏 荆風 羌活

膚蒸嗜睡加 牡丹皮 黃芩 黃連 黃柏

氣蒸喘急遍身氣熱加 人參 山梔子 黃連

○心蒸舌乾加 黃連 生地黃 竹葉

小腸蒸下唇焦加 木通 生地黃 赤茯苓

血蒸髮焦加 當歸 生地黃 童便

脉蒸唾白浪語加 當歸 生地黃

○脾蒸唇焦加 苦參 芍藥 竹葉

胃蒸舌下痛加 糯米 石膏 大黃 朴硝

乾葛 蘇米 石膏 大黃 林檎

肉蒸食無味而嘔煩燥不安加芍藥

○肝蒸眼黑加 川芎 當歸 前胡

膽蒸眼色白加 柴胡 瓜蒌

筋蒸甲焦加 當歸 川芎

三焦蒸作寒作熱加 石膏 竹葉

○腎蒸兩耳焦加 生地黃 石膏 知母 黃栢

膀胱蒸右耳焦加 澤瀉 茯苓 滑石

腦蒸頭眩熱悶加 生地黃 防風 羌活

五蒸湯 治五臟蒸熱

生地 黃連治心 柴胡 當歸治肝 白芍 黃芪

治脾 天門冬 麥門冬治肺 炒黃栢 知母治腎

鱉甲醋炙 地骨皮治骨 白水煎

自汗盜汗門 立方之妙也

病源 盜汗屬氣虛 有陽虛 有濕 有痰 盜汗屬血虛 有陰虛 有火

夫汗者心之液也 心動則惕然而汗出也 有自汗有

盜汗 屬血虛 有陰虛 有火 夫汗者心之液也 心動則惕然而汗出也 有自汗有

盜汗自汗者因發表而自然出也盜汗者睡而汗出及覺而汗即止也大抵體虛之人或爲風暑濕熱之邪侵傷衛氣以致腠理不密陽氣外泄而汗自出矣或因房勞驚怖損傷心血而汗自睡中盜出也

形證

戴云盜汗者謂睡中汗出也不睡則不出方其睡熟也溼然出焉覺則止而不復出矣非若自汗無拘時而自出也

治法

一自汗古方用玉屏風散以黃芪實表氣白朮燥內
濕也

一盜汗用當歸六黃湯以當歸黃芪生地黃以補其
陰血黃芩黃連黃栢去其內火也此乃藥性病情
相對可見立方之妙也

一傷寒風濕濕溫等症自有本門求治

一因風傷胃而汗出者固之宜用桂枝湯

一因暑熱而汗出者清之宜用清暑益氣湯

一因濕蒸而汗出者燥之宜用清燥湯

一因房勞而汗出者溫補之宜用黃芪湯黃芪

健中湯

一痰逆頭眩惡心自汗者宜用撫芎湯

一漏風症飲酒中風多汗食則汗出如洗宜用牡

蠣白朮散

治方

玉屏風散治自汗

防風黃芪白朮白水煎服

當歸六黃湯治盜汗

當歸 生地黄 熟地黄 黃栢 黃芩 黃連

黃芪 白水煎服

黃芪建中湯 治表虛自汗

黃芪 芍藥 官桂 甘草 水二鍾半姜三片

棗一枚煎服

黃芪湯 治房勞虛損盜汗不止

黃芪 茯苓 官桂 熟地黄 天門冬 麻黃

根 龍骨 五味子 浮麥 防風 當歸 甘

草 水二鍾姜三片煎服

醫方集覽 卷四 五十一
撫芎湯 治自汗痰逆頭眩惡心

川芎 白朮 陳皮 甘草 白朮 生姜煎服

牡蠣白朮散 治漏風症飲酒中風多汗

牡蠣 白朮 防風 白水煎服

團參湯 治面赤心液盛盜汗

人參 當歸 黃芪 用猪心一個同煎不拘時

服

文蛤散 治盜汗自汗不止

用文蛤爲末加麝少許用唾津調敷臍上

桂枝湯 方見傷寒門 治風傷胃而汗

溫粉撲身法 將後數味共為末帕包周身撲之

麩皮 牡蠣 藁本 糯米粉 防風 白芷

川芎 麻黃根

清暑益氣湯 治暑熱而汗

清燥湯 方見濕門 治濕蒸而汗

諸血門 瀉手足之滯 瀉足之滯 瀉走瀉之滯 瀉瀉之滯

吐血 衄血 咳血 咯血 溺血 下血

病源

經曰榮者水穀之精也生化於脾總統于心藏受于
肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身故目得之能視耳
得之能聽手得之能攝足得之能步臟得之能液腑
得之能氣是以出入升降者濡潤宣通者由此使之
然也注之於脉少則瀆克則實常以飲食日滋故能
陽生陰長變化而爲血也蓋人身之血由水之行地
中隨氣而行通貫經絡無處不致血爲榮氣爲衛榮
行脉中衛行脉外相隨上下榮養五臟六腑四肢百
骸者也苟或榮衛失調或爲七情四氣所干以致諸

病生焉故其致病也易調治也難有因飯食過飽負
重傷胃而吐血者有因勞傷心肺而咳血者有思慮
過多傷心而咯血者有因怒傷肝氣而嘔血者有因
火熱傷肺而衄血者有因膀胱蘊血而溺血者有因
大腸風熱而便血者大抵血得熱則行得寒則止凡
諸血病未有不因熱傷氣亂而作也臨病宜詳焉

形澄也

戴云嘔血者嘔吐全血者是也咳血者嗽出痰內有
血者是也咯血者咳出皆是血疙瘡是也衄血者鼻

中出血也溺血者小便出血也下血者大便出血也
名雖有六俱是熱症但有新舊虛實之不同或妄言
為寒者誤也

脉法

凡見血之脉宜數不宜洪大

治法

吐血嘔血

一因飽食負重吐血從胃中出者宜用 蒲黃消血

散

一吐血色紫胸中覺悶形實者宜用 桃仁承氣湯

一血妄溢不能止者宜用 必勝散

一因怒傷肝而嘔血者宜用 桃仁地黃湯

一薄厥病宜用 紅花牡丹皮散 當歸龍會丸

一血熱妄溢嘔吐不止宜用 涼血地黃湯

一嘔血是火載血上錯經妄行宜用 黃芩降火湯

○咳血咯血

一勞傷心肺咳嗽咯血

一先吐紅後見痰嗽者是陰虛火動宜用四物湯爲

主加清痰降火之藥

一先痰嗽後見紅者是痰火積熱宜用消痰降火爲
主加清熱之藥

一因走急勞傷心肺咳嗽痰火宜用 茯苓補心湯

一咳血內見紅絲者名血絲線此傷心氣久必成勞
瘵之症最難治

一思慮傷心欬唾痰血宜用 門冬飲

一咯血宜用 萸實貝母湯

一唾血出於腎乃陰火升於肺以滋陰爲主宜用

五味藥皮湯

○衄血

一鼻出血謂之衄血宜用 清肺飲子

一衄血久不止脉洪大者宜用 天門冬飲 犀角

地黃湯

一治衄血用頭髮灰吹鼻孔內仍用藕節側栢葉搗
汁飲之即止 涼血地黃湯

○溺血

一溺血便尿出血也此迺下焦結熱宜用 小蘗飲

子

一血虛有熱小便出血者宜用 四物湯加 牛膝

茯苓

一血實有熱小便出血而痛者宜用 四物湯加

梔子 鬱金 大黃 瞿麥 或用當歸承氣湯

一因心腎不交水火不濟小便出血者宜用 門冬

地黃湯

一尿血不止者宜用 槐花龍骨散

一溺血用青州柿餅火煨存性爲末空心用滾白湯

調下或清心蓮子飲

○下血

一大腸熱毒下血宜用

芍藥黃連湯

四製香連

丸 涼血地黃湯

一濕毒下血宜用

槐花散

或胃風湯

升麻除

濕和血湯

一糞後下紅謂之遠血宜用

伏龍肝散

一腸僻下血水穀與血一派啣出者宜用

涼血地

黃湯 當歸和血散

一腸風下血久不止者宜用 黃連阿膠湯

治方

蒲黃消血散 治吐血嘔血門

蒲黃 紅花 桃仁 歸尾 陳皮 生地黃

一山查 炒梔子 藕節 小蘗 白水煎服

桃仁承氣湯

芒硝 官桂 甘草 大黃 白水生姜煎服

必勝散

小蘗 人參 蒲黃 當歸 川芎 熟地黃

烏梅 一個 去仁 白水煎

桃仁地黃湯

青皮 桃仁 黃連 山查 陳皮 甘草 梔

子 炒 茯苓 當歸 芍藥 川芎 茅花 生地

黃 麥門冬 白水煎服

紅花牡丹皮湯

紅花 牡丹皮 青皮 芍藥 生地黃 甘草

當歸 桃仁 陳皮 防風 白水煎服

涼血地黃湯

生地黃 黃芩 大黃 薄荷 山梔子 朴硝

茅花 甘草 側柏葉 白水煎服

芩連降火湯

黃芩 黃連 地骨皮 生地黃 當歸 芍藥

甘草 梔子炒 柴胡 照如虛加 黃芪 白水煎

服

當歸龍會丸

當歸五錢 龍膽草五錢 梔子炒五錢 黃連五錢 黃芩

五錢 青皮五錢 大黃三錢 青黛二錢五分 蘆薈二錢五分 木

香 一錢二分半

為末用麩糊為丸小豆大每服六十

丸滾白湯下加

麝香

一分

茯苓補心湯

治咳血咯血門

半夏

湯炮七次

前胡

白茯苓

人參

各七錢五分

枳壳

炒

紫蘇

甘草

炙

桔梗

乾葛

去粗皮

陳皮

各五錢

白芍

藥

二兩

熟地黃

一兩五錢

當歸

一兩二錢

川芎

七錢五分

黃每服

五錢姜五片棗一枚水一鍾煎七分溫服

門冬飲

天門冬

麥門冬

貝母

阿膠

生地黃

芍

藥 甘草 當歸 遠志 人參 一方有犀角

無人參 白水煎服

萋實貝母湯 引藥一升水一盞煎十合服

萋實 貝母 茯苓 五味子 阿膠 黃栢

紫苑 甘草

天門冬丸 方見癆瘵門

清肺飲子 治衄血門

麥門冬 茅根 桔梗 枯苓 炒梔子 生地

生甘草 歸尾 側栢葉 犀角 藕節 白水

煎服

天門冬飲

天門冬

麥門冬

當歸

人參

黃芩

生地

五味子

姜三片煎服

犀角地黃湯

犀角 生地黃

芍藥

牡丹皮

甘草

黃芩

麥門冬 白水煎

涼血地黃湯

方見前門

小薊飲子

治溺方

小蘗 生地黃 滑石 通草 淡竹葉 蒲黃

藕節 當歸 炒梔子 生甘草 水二鍾燈心

七根煎服 日水煎

當歸承氣湯 黃 藥 五 甘草 黃 苓

當歸 厚朴 枳實 大黃 朴硝 白水煎服

槐花龍骨散 槐花 龍骨 散

白龍骨 陳槐花 赤芍藥 黃葵子 生地黃

當歸 甘草 茯苓 黃芩 白朮 為末每服

一錢滾白湯調服

清心蓮子飲

麥門冬

黃芪

地骨皮

車前子

白茯苓

石蓮肉

黃芩

人參

甘草

芍藥黃連湯煎治下血

芍藥

黃連

大黃

生地黃

甘草

當歸

如腹痛加木香

水二鍾姜三片煎服

四製香連丸

方見痢門

槐花散

蒼朮

陳皮

當歸

枳壳

槐花

甘草

烏

梅木白水煎服當歸石味袁草附萊竹甘草蒲黃

胃風湯 方見痢門 旋子 生甘草 水二鍾燈心

升麻除濕和血湯 具麻門

生地黄 牡丹皮 甘草 黃芪 當歸 熟地

黃藥 蒼朮 秦艽 陳皮 升麻 官桂 芍

藥 黃白水煎服 可血

龍肝散 黃荅 芫花 人參 芍 甘草 黃荅 子 生地黄

伏龍肝 甘草 白朮 阿膠 黃芩 熟地黄

白水煎服 湯調服

涼血地黄湯

熟地黄 當歸 槐花 青皮 黃柏 知母

白水煎服

當歸和血飲

當歸 升麻 槐花 青皮 熟地黄 川芎

荆芥 白朮 白水煎服

黃連阿膠湯

黃連 阿膠 生地黃 地榆 川芎 白朮

防風 荆芥 升麻 甘草 白水煎服

五味藥皮湯

當歸 二錢 五味子 一錢 炒黃栢 二錢 蛤蚧 一錢 滑

石 一錢 青黛 五分 茯苓 一錢 澤瀉 一錢 椿根皮 八分

生地 一錢

清肺飲子 方見衄血

門冬地黃湯

麥門冬 二兩 生地黃 二兩 當歸 二兩 五味子 五錢

煉蜜為丸桐子大每服六十九滾白湯送下

又方

黃連 一錢
當歸 一錢
地榆 一錢
生地黄 七分
黃芩 七分

七分
黃栢 七分
甘草 五分
芍藥 七分
升麻 七分
川

芎 一錢
陳皮 七分
槐角子 一錢
石榴皮 一錢
須用陳的

水二鍾煎八分空心服

四卷終