

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十八

嬰孩大小便淋秘門

明周王朱楠撰

淋秘附論

夫淋者有熱淋有血淋石淋氣淋寒淋五者大同小異
熱淋者三有熱氣傳膀胱飛仙論云熱氣傳於膀胱
腎為熱淋也血淋者久熱積聚結澀脬中巢氏云熱甚

入脬多成血淋也石淋者腎熱水絕結化為砂石孫氏云腎熱水結化為砂石巢氏云腎為熱所乘則石淋也其狀如莖中痛甚者令人悶絕故也氣淋者膀胱受冷小腸脹滿巢氏云腎虛膀胱受肺之熱氣氣在膀胱則脹肺主氣氣為熱所乘故流入膀胱氣壅不散腹氣滿水道不通利故小便結滯成而氣淋寒淋者取冷過度顫後尿巢氏云取冷過度下焦受之冷氣入脬不能禁約於水小便者水溢之餘膀胱者為津液之嚙既受冷

氣脬中衰溺不能禁約於水故遣尿成寒淋其牀先寒顫後尿是也皆由冷熱之氣客入腎與膀胱流滲脬中之所致也小腸乃心之腑也水竇流行隨其氣而利之心

氣若壅小便不通心氣若冷小便多洒

洒音斟謂洒析也

心氣若

寒小便多旋心氣若熱小便艱澀心氣積熱小便白赤先赤而復白者是也所言閉小便者醫謂下結腹肚脹緊膨滿不通氣結熱盛用力努旋點滴而出乃是閉不通利于心疼痛精神昏悸速用生大地龍數條蜜少許

研傳莖卽仍燒蠶蛻紙灰留性朱硃腦子麝香同研煎
麥門冬燈心湯調下與服一時見効湯氏歌云五般淋
瀝病相傳一一須分病本源或見叫啼傷水積或然食
食入脾間次更因循傳入臟致令淋病小便乾但看微
紅筋上有熱入相和汗又連肚上青筋至腹足沙石淋
瀝痛難安唇上乾燥如皮退此是風淋定惡泉外腎不腫
氣不急下陰才腫氣相連先與寬膈疎導氣定知醫藥
可安痊諸淋皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱

遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急膏血
砂石從水道出焉故有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者
窒塞其間或令人悶絕大凡小腸有氣則小便脹有血
則小便澀有熱則小便痛痛者為血淋不痛者為尿血
敗精結者為砂敗精散者為膏金石結者為石揣本尋
源各從其類治法並用流行滯氣疎利小便清解邪熱
調平心火蓋心清則小便自利心平則血不妄行切不可
姑息用補氣得補而愈脹血得補而愈血熱得補而

愈盛水道不行加之穀道悶遏關格不通未見其能生者也又有腎氣虛弱囊中受寒夾冷而小便淋澀者其証先寒戰而復溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣盛則寒戰而成淋正氣盛則寒戰解方得便尿也小兒諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與胃為表裏俱主水入小腸下於胞行於陰為小便也腎氣通於陰津液下流之道也若乳食無節悲啼不恒虛實不調則腑臟不和致腎虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢水道

不通水不上不下停積于胞腎虛則小便數膀胱熱則水下少數而且澀致淋瀝不宣故謂之淋又有熱淋血淋氣淋石淋寒淋三焦壅盛移熱于膀胱則溲便赤者為熱淋熱甚而搏于血脉流入胞中弱血者為血淋小腹滿溺瀦有餘瀝者為氣淋溺出沙石者為石淋寒淋之病本於寒客下焦餘皆本于膀胱有熱令少腹急痛水道不利故數起而不能出也

方

五苓散 治五淋

赤茯苓 赤芍藥 山梔子 生甘草 當歸

黃芪 車前子 淡竹葉 燈心 木通 滑石

葵子 葶藶 炒各等分

右末燈心葱白煎或入生車前草搗水調五苓散服
或調硝石末服血淋白茅根燈心煎氣淋小腸脹滿
尿後有餘瀝木通煎服熱淋便赤而淋瀝臍下痛新
水調下或黃芩湯下石淋莖內痛尿澀有沙石令人

悶絕硝石隔紙炒焦研末用葵子煎湯下

石葦散 治諸淋瀝水道中痛臍下妨悶

石葦 去毛一兩 冬葵子 木通 赤茯苓 各半兩 車前子

瞿麥 榆白皮 滑石 甘草 各一分

右為細末每服一錢水一盞葱白五寸煎至七分去
滓溫服如人行十里再服大小加減一方無甘草

立効飲 治小兒諸淋不通莖中疼痛

木通 甘草 王不留行 竹胡荑 滑石 海

金沙 山梔子 檳榔 各等分

右吹咀三歲一錢水半盞煎三分去滓

葵子散 治諸淋兼小便不通

葵子 車前子 木通 瞿麥 桑白皮 炒 赤茯苓

苓 山梔子仁 甘草 炙各等分

右剉散每服一錢井水一小盞葱白二寸煎食前服

桑白皮湯 治小兒淋或澀痛小便如血色

桑根白皮 剉焙乾 山梔子仁 蘆根 剉 茅根 赤茯苓

苓 去黑皮 冬葵子 甘草 炙各一分 滑石 研

右粗搗篩五六歲兒每服一錢水一小盞煎至五分

去滓食前日二量兒大小加減

瞿麥丸 治小兒淋及治遺尿

瞿麥穗 龍膽 石葦 去毛 桂 去粗皮 皂莢 炙去皮子各半

兩 雞腸草 人參 各一兩 車前子 一分

右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服六丸至十九

空心熱湯研下更量兒加減

桃仁湯 治小兒氣淋水道不通餘瀝疼痛

茴香 紫蘇 檳榔 木通 當歸 人參

巴戟去心 赤茯苓各三錢 桃仁炒去皮

右呔咀三歲一錢水半盞煎三分去滓食前

牽牛子丸 治小兒諸淋澀臍下連兩膀胱妨悶及大

腸氣壅

牽牛子微炒 川大黃剉微炒 川升麻 郁李仁湯浸去皮微炒

研川朴七上各半兩 滑石一兩細研 海蛤一兩細研

右搗羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水研下
七丸日三四服量兒大小加減

順經散 治十餘歲因驚之後心氣下行小便淋瀝日
夕三四十次漸覺黃瘦宜服

韭子炒 琥珀別研 益智去殼 金毛狗脊去毛 白茯苓去皮

石燕子火燉醋淬研 石葦去毛

右為末每服一錢韭湯調日二服

石燕丸 治小兒諸淋腹妨悶心神煩熱

石燕子研 瞿麥穗 梔子仁 滑石研 木通剉 葵

子 海蛤研各半兩

右搗研為末煉蜜丸如菉豆大每服七丸葱白湯下
日三量兒大小加減

石葦湯 治小兒淋或澀痛小便如血

石葦去毛 赤芍藥 大黃剉炒 滑石研 甘草炙 麥

門冬去心 升麻各一分

右粗搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓食前

服日三量兒大小加減一方有川朴硝無滑石

木通湯 治小兒諸淋及熱結赤澀不通

木通剉碎 桑根白皮剉焙 滑石研 芒硝 葵子陳者

各三分

右粗搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服
食前日三量兒大小加減一方葱白湯下半錢

石鷲丹 治小兒淋澀痛悶

石鷲醋淬燒赤 瞿麥 滑石各半兩 木通剉 海蛤研

兩半

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒以葱白湯下食前大小加減

金沙散 治小兒小便淋瀝不通

鬱金 海金沙 滑石 甘草 各等分

右為末三歲一錢煎落帚母湯調下燈心木通湯亦得冬瓜最治小便不通淋瀝并渴

木通散 一名葵石散 治熱淋小便不通啼叫小腹痛悶亂

者

木通 二錢 滑石 一錢 牽牛子 一錢 葵子 一錢

右用燈心葱白車前草同煎服一方無葵子不用車前草煎一方周歲小兒一服作一錢五歲已上倍之

龍香丸 一名葵石散 治小兒寒淋因熱淋服冷藥大過小

便不禁戲取冷過度下焦受冷氣入脬不能禁止故遺尿

龍骨 煨 牡蠣 煨 各一兩 茴香 炒 白茯苓 各半兩

右為末糯米糊丸如小豆大三歲三十九苗香湯一方加赤石脂半兩

又方 同前治及久患寒淋進退不定尿如脂膏遍數無度

苗香炒一兩 金液丹 二兩 糯米二兩 龍骨半兩

右為末糯米糊丸小豆大每服百丸鹽湯或溫酒送

下

車前子湯 治諸淋澀心煩悶亂

車前子 石燕 麥門冬去心焙各半兩

右搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服

葵子散 治小兒諸淋

葵子三分 石葦去毛三分 滑石別研兩半

右粗搗篩五六歲兒每一錢水一盞棗二枚同煎取五分去滓分溫二服早晚食前各一量兒大小加減

滑石散 治小兒諸淋澀每尿之時啼叫不出

滑石 半兩

甘草

一分炙
微赤剉

川朴硝

三分

右搗細羅為散每服以葱白湯調下半錢日三四服
量大小加減

玉漿散 治小兒小便不通莖中淋痛心燥煩渴

滑石 一兩

甘草

二錢
炙

右為末三歲一錢燈心湯調下亂髮燒灰酒調最治
小便不通

二神散 治諸淋急痛

海金沙

七錢
半

滑石

五錢

右末煎燈心木通麥門冬車前草入蜜調服

榆白皮湯 治小兒淋兼石淋及治水道中澀痛

榆白皮

剉焙

瞿麥穗

各一
兩半

右粗搗篩每一二歲兒每一錢水一小盞煎至五分
去滓分溫二服空心日晚各一服量兒大小加減

麥蔥湯 治小兒諸淋閉澀不通

小麥 一合 葱白

兩莖
切

右以水一盞煎至五分去滓不計時候溫服量大小
加減

滑石散

一名車前子散

治小兒小便淋澀或尿血

滑石

研車前子

各半兩

右搗羅為末散二三歲每服半錢空心粥飲調下近
晚再服量兒大小加減

蜂房散

治小兒淋

蜂房

炙亂髮

各三分

右同燒灰研令細每服半錢米飲并水調下日三量
兒大小加減一方無亂髮有桂小麥湯或酒調服

治氣淋

一名檳榔散

赤芍藥

一兩

檳榔

一個

麩裏

右末用燈心同棗子煎湯調下

治小兒諸淋澀心煩悶亂

冬葵子

一兩

蘧麥

半兩

右搗為散每服一錢以水一小盞煎至六分不計時

候量大小加減溫服

治小兒諸淋水道中澀痛

取臘月猪脂鎔過去滓每服一粟殼大用暖酒一合
研覺令勻空心午間各一服量兒大小分減服之

治小兒淋及水道中澀痛

用車前子一升水二升煮取一升分服一方為散每
服一錢水一盞煎服大小加減溫服不計時候

又方

用煮冬葵子汁服之一方為散每服一錢煎服量大
小加減服之不計時候

治小兒淋疾

用斛葉三片煎湯服一雞子小便即時下

文仲療小兒淋兼石淋及血淋日夜淋瀝陰中疼痛

取特牛陰毛燒灰末以漿水服一刀圭日再服一方
粥飲調下半錢大小加減服一作牯牛

治熱淋

用五苓散加辰砂煎燈心淡竹葉湯調下

犀灰散 治小兒心經虛熱小便澀痛筒管內疼不可忍者用蠶蛻紙不拘多少燒留性為末入麝香服半錢燈心湯調下備急

車前草方 治小兒腸有血熱淋痛

用生車前草洗搗細井水調取清汁食前服

阮氏方 治熱淋

取大田螺十五箇以新水養候螺吐出泥澄去清水

以底下泥膩粉調塗臍上尿即通便將螺放江中若殺之病不愈

桃膠丸 治小兒諸淋并小便出血陰莖中痛

用膠一塊如棗大水半盞煎三分日進三服下石子如豆石盡止

又方 船下清苔煮汁治淋孫氏云尿在脬中為屈致津液不通以生蔥葉尖內陰莖中深三寸用口吹冷脬脹津液大通便愈一法生薑切作槌子樣內陰莖乳中

深三二寸便利 又方琥珀為末燈心湯調下立効紅

龍散治淋甚妙 又方臍中着鹽灸之即通一法炒用

鹽帛包熨小腹

治諸淋及大便五六日不通心腹煩滿

用海鹽不拘多少燒鹽熨小腹即通於臍中以手摩

良久即通大人用之亦得一方青顆鹽

地膚子湯 治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲

小便則澀痛不出出少如血須臾復出方見本門小便不通類

治寒淋小便不禁或睡中遺出不覺方見遺尿類楊氏雞腸散

石葦散 治熱淋

石葦半兩洗 海金沙三錢 車前子三錢 海蛤一錢 瞿

麥半錢

一方加木通燕子同煎為末用燈心金銀湯下

龍骨散 治寒淋小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草一兩 牡蠣粉三錢 龍骨半兩 茯苓 麥門

冬半兩 桑螵蛸半兩

右吹咀每服一錢水一小盞棗子同煎服

治小兒淋閉

取小魚摩臍及小腹溺即通

石淋 附論

夫小兒石淋者為小便中出石也腎主於水水結則化為石故腎為熱所乘熱則成淋其狀小便莖中痛尿不能出時時小便痛引膀胱裏急甚者水道塞痛令悶絕也

方

葵子散

出聖惠方

治腎熱水結化為石淋甚者水道中澀

痛不可忍

冬葵子 一兩

石南

榆白皮

石葦 去毛

木通 各半

兩

右為細末每半服以葱白湯調下日二服量大小加

減一方有滑石一兩

滑石散

出聖惠方

治証同前

滑石

瓜婁根

石葦

去毛各一兩

右羅為散每服半錢煎大麥飲

石葦散

出活幼口議

治小兒熱淋沙淋石淋

石葦

去毛

海金沙

木通

滑石

右為末水一小盞煎至半盞不拘時候頻服無效

量加

治小兒石淋水通中澀痛

出聖惠方

石葦

五分去毛

滑石

二兩

子苓

三分

右細為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

治小兒石淋澀痛心煩

出聖惠方

甘草

一分炙赤剉

雞糞白

半兩微炒

乾薑

一分炮製剉

右搗細羅為散每服煎小麥飲調下半錢日三四服

量兒大小加減

又方

出聖惠方

冬葵子

三兩

滑石

一兩

右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓溫服日

三四服量兒大小加減

草豆湯 治沙石淋

黑豆 一百二十 甘草 一寸
十五 生用

右新水煮乘熱入滑石末空腹食服

治沙石淋

取煨寒水石末用車前水調服鏡面草亦可

雞糞白散 出聖

惠方

治小兒五七歲石淋莖中有沙石不可出者及遺尿用雞糞白一兩炒令黃為散以水一大

盞露一宿每服用此水一合調散半錢服之日三四服

當下沙石量兒大小加減

又方

出聖
惠方

用蘧麥一兩細羅為散每服以温酒調下半錢日三四服量兒大小加減

血淋 附論

夫小兒血淋者是熱淋之甚則變成血淋也心主於血血之行身通於膀胱而熱氣流入脬即成血淋矣

方

加味道導赤散 治血淋尿血

生地黄洗 木通 黃芩 生甘草 車前草 山

梔仁 川芎 赤芍藥各等分

右末竹葉生薑煎服

犀角屑散出聖惠方 治小兒血淋澀痛心燥體熱

犀角屑 黃芩 石葦去毛 當歸剉 赤芍藥已上各半

兩 蒲黃一兩

右羅為散每服一錢以水一小盞入生地黄半分青竹茹半分煎至六分去滓不計時候量兒大小加減服之

道赤散出直指方 治小兒血淋

生乾地黄 木通各二錢 甘草生一錢

右為末每服一錢井水入燈心煎服仍以米飲調油髮灰空心灌下

車前散出醫方鈔選 治熱甚積於小腸則尿血

牡蠣半兩 車前子 甘草炙黃 朴硝各一分

右件為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服
量兒大小加減

露蜂房灰散

出聖惠方

治小兒血淋日夜淋瀝小腹及陰

中疼痛

露蜂房灰一分

亂髮灰一分

滑石一兩

海蛤半兩

右細為散不計時候以溫水調下半錢量兒大小加

減

又方

出聖惠方

車前葉汁一合

冬瓜汁一合

蜜一合

右件藥和令勻看兒大小加減服之

又方

出聖惠方

石葦一兩

去毛

白膠半兩

炙黃

戎鹽半兩

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不

計時候量兒大小加減溫服

又方

出聖惠方

榆白皮剉 蘧麥

蒲黃已土各半兩

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓不計時候溫分二服

治血淋神效 出湯氏寶書

海螵蛸

生乾地黄

白茯苓

各等分

右為細末用柏葉車前草煎湯調下

蒲黃散

一名冬葵子散 出聖惠方

治膀胱熱甚血淋水道澀痛

蒲黃 冬葵子

生地黄

各半兩

右為細末每服一錢水一大盞煎至六分去滓溫服

大小加減服之

治小兒血淋澀痛心燥體熱

出聖惠方

車前子

茅根

剉各一兩

右羅為散每服一錢水一小盞入生地黄一分煎至六分去滓不計時候量兒大小加減服之

薑黃散

出活幼口議

治小兒血淋

用薑黃為末每服半錢用溫酒調下連二三服以通

為服度

治小便出血

用生地黄汁生薑汁入生蜜服

治小兒血淋日夜淋瀝小腹及陰中疼痛

出聖惠方

用蜥蜴二枚燒灰細研為散不計時候以溫酒調下

半錢量兒大小加減服之

又方

出聖惠方

用牯牛陰聚毛燒灰細研不計時候以粥飲調下半

錢量兒大小加減服之

遺尿 附論

夫小兒遺尿者此由臟腑有熱因服冷藥過度傷於下
焦致膀胱有冷不能制於水故也膀胱為津液之腑與
足少陰之經為表裏腎主於水腎氣下通於陰小便者
水液之餘令膀胱既冷不能約制於水故遺尿也 楊
氏曰小便者津液之餘腎主水膀胱為津液之腑腎與
膀胱俱虛而冷氣乘之故不能制約其水出而不禁謂

之遺尿睡而出者謂之尿牀葛氏曰亦有稟受陽氣不足胞冷傳送失度尿出不禁者

方

韭菜子丸 治下元虛冷遺尿

韭菜子六兩 鹿茸四兩 肉苁蓉酒浸 熟地黄酒洗 當

歸酒浸各二兩 杜仲薑汁炒 石斛去苗 桂心不見火 附子炮去皮各

川牛膝三錢

右末山藥酒和丸用生鹽酒服

牡蠣散

出聖惠方

治小兒遺尿體瘦心煩不欲食

牡蠣粉三分 龍骨三分 麥門冬半兩去心焙 雞腸草兩半

黃耆半兩 白茯苓半兩 桑螵蛸三分微炒 甘草一分炙微赤剉

右羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許棗二

枚煎至六分去滓量兒大小加減溫服

楊氏雞腸散

出直指方

治小兒夜間遺尿睡裏自出不覺

由膀胱有熱服冷藥過多小便不禁

雞腸

一具男用雌女用雄炙乾

牡蠣粉

白茯苓

各五分

辣桂

不見

普濟方

三

火龍骨各二錢半桑螵蛸微炒五錢

右為末仍以雞肌脰一具雞腸一具燒存性為末每用前藥一錢空心酒調服本草云如無桑螵蛸加桑白皮一方無桂有麥門冬用薑棗煎服量兒大小加減一方用雞腸草

雞肌脰散出聖惠方

治小兒遺尿不可禁止

雞肌脰一具炙令黃黃耆半兩剉桑螵蛸三分微炒牡蠣半兩燒為

粉甘草一分微炙

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓量

兒大小加減服

治小兒尿牀又治產婦後損脬遺尿不知出出集驗良方

猪脬 猪肚各一個糯米半升

右將糯米入脬內又將脬入猪肚內煮爛鹽椒調勻如飲食日常服不過數次其效如神

又方出危氏方

雞肌脰 一具 雞腸 燒 猪胞 炙焦

右為末每服一錢酒調下男用雌雞女用雄雞者一方無猪胞

白朮散 出聖惠方 治小兒遺尿足寒宜服此方

白朮 半兩 土瓜根 半兩 牡蠣粉 三分

右羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許棗二枚煎至六分去滓量兒大小加減溫服

治小兒睡中遺尿不自覺 出全嬰方

桂末 雄雞肝 等分

右搗丸服如小豆大溫水下日三一方雄雞肝煮熟為丸

治小兒遺尿宜服此方 出聖惠方

用羊肚系一條淨洗水盛全滿繫繫兩頭煮全熟漉出割開其水漸漸飲之

又方 出直指方

用雞胍脰一具并腸曝乾炙令黃焦是男用雄雞是女用雌雞細羅為散每服以溫酒調下半錢量兒大

小加減一方燒雞腸為末漿水服方寸匕日三面北斗服

又方 出聖惠方

取羊脬一枚水煮令爛熟空腹量兒大小加減食之
不過三頓差

治小兒夜間尿牀由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自

出 出集驗良方

用破故紙一味炒為細末煮芡實煎湯調下一方煮
芡實雞頭子是療失禁不覺尿出方

治小兒遺尿及諸淋水道中澀痛 出千金方

用小豆葉搗汁每服一合量兒大小加減服之

瞿麥丸 出千金方 治小兒遺尿 方見本門淋秘類

療小兒睡中遺尿不自覺 出本草

以薔薇根隨多少剉以酒服之

治尿牀 出本草

取麻鞋綑帶及鼻根等唯不用底須七量以水七升
煮取二升分再服

尿血 附論

夫小兒尿血者為血性得寒則凝澀得熱則流散而心主於血小兒心臟有熱熱乘於血血滲於小腸故尿血也

方

阿膠散 出聖惠方

治小兒尿血水道中澀

阿膠 一兩搗碎 黃芩 一分 梔子仁 車前子 一分

甘草 一分炙 微赤剉

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量

兒大小加減溫服

尿血方 出直指方

生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草 炙各等分

右剉散每服一錢水一小盞煎調油髮灰少許食前

服

治小兒尿血水道中澀痛 出聖惠方

榆白皮 半兩 生乾地黄 半兩 甘草 一分炙 微赤剉

普濟方

三五

右細剉以水一小盞煎至六分去滓溫服量大小加減

又方 出聖惠方

紫苑 洗去苗土 黃連 甘草 炙微赤剉各一分

右羅為散每服一錢以水一小盞入豉三十粒煎至五分去滓量兒大小加減服之

又方 出聖惠方

苦楝子 一兩 鬱金 二枚一枚炮一枚生用

右細羅為散每服煎葱湯調下半錢量兒大小增減

又方 出聖惠方

生乾地黄 黃芩 已上各半兩

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓溫服半合量兒大小加減服之

又方 出聖惠方

車前葉 半斤搗絞取汁 冰糖 一兩

右藥相和令勻每服半合量兒大小加減服之

又方 出聖 惠方

用牛膀胱洗去土搥絞取汁一中盞又生蜜一合相和令勻每服半合日三四服量兒大小加減服之

又方 出聖 惠方

取蒲黃末以溫水調下半錢量兒大小加減服之

又方 出聖 惠方

用生地黃汁每服暖一合服之量兒大小加減服之

治小兒尿血 出聖 惠方

取燒鵲巢灰井花水服之以治夜尿淋

箬灰散 出全 嬰方

治小兒尿血陰莖中痛

用多時茶節中箬燒灰存性用一兩滑石末半兩並為末三歲一錢燈心煎湯調下

又方 治小兒小便黃赤不通

用石葦車前子等分水煎去滓服

又方 治小便不通及脬轉

用梁上塵去煙遠者一撮水調服

小兒尿血

出聖惠方

用蜀升麻五合以水五合煎取二合去滓一歲兒服盡一方一兩搗羅為散每服一錢

治小兒尿血亦治尿血白

用甘草五分以水六合煎取二合去滓一歲兒服令盡

白濁 附論

夫小兒尿白者由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分

而色白也久則成疳亦兼心膈伏熱為得之宜踈脾土消食化積則愈

方

茯苓散

出直指方

治尿白

京三稜

蓬莪茂

煨

縮沙仁

赤茯苓

各半兩

青皮

陳皮

滑石

炙各二錢半

右為末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下

螵蛸散 治小便頻數白濁

桑螵蛸炙鹽水 遠志去心 石菖蒲 龍骨 人參

茯神 當歸 鼈甲醋煮各一兩 一方用龜甲

右末夜卧時人參湯調吞

京三稜散出湯氏寶書

京三稜 莪茂各一兩炒 益智仁去殼 甘草炙 神麴炒

麥蘖炒 橘紅各半兩

右末白湯點下

猪肚丸

猪肚一箇洗淨 蓮子肉一升去皮心同猪肚煮熟日乾 母丁香 川棟

子 破故紙 船上茴香各一兩

右同為末煉密為丸或溫鹽酒下

治小兒白濁出百一選方

用淡豆豉不以多少研細入剝淨大蒜逐旋同研可丸為度如菜豆大每服十丸米飲湯下

小便赤澀附論

夫小兒小便赤澀不通者因膀胱與腎俱有熱故也腎

主於水膀胱為津液之腑此二經為表裏而水行於小腸入與脬為小便今臟腑有實熱熱入於脬故令小便赤澀不通也

方

大青散

出聖惠方

治小兒臟腑壅熱心神煩燥小便赤澀

不通

大青

川升麻

蘧麥

黃芩

甘草

炙微赤剉已上各半

兩川大黃

三分剉微炒

川朴硝

三分

滑石

三分

右羅為細散每服不計時候以溫水調下半錢看兒

大小加減

硃砂散

出聖惠方

治小兒心臟熱盛煩燥不安小便赤澀

不通

硃砂

細研

鉛霜

細研

犀角屑

黃芩

車前子

甘草

炙微赤剉已上各一分

滑石

半兩細研

川朴硝

半兩

右細羅為散入研了藥令勻不計時候煎苦竹葉湯

調下半錢看兒大小加減

車前子散 出聖 惠方

治小兒小便赤澀服藥即通無藥即澀宜服之

車前子 一兩 子苓 一兩 滑石 二兩 木通 三分 剉 赤茯苓

苓 一兩 琥珀 一兩 甘草 半兩 炙 微赤剉

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小加減服之

子苓散 出聖 惠方 治小兒壅熱小便赤澀不通水道中澀

痛不可忍

子苓 冬葵子 車前子 茅根 剉已上 各一兩 滑石

右為散每服一錢以水一小盞煎至六分不計時候量大小以意加減

冬葵散 出聖 惠方 治小兒心臟熱盛煩燥不安小便赤澀

不通

冬葵子 三分 滑石 三分 細研 梁上塵 半兩 黃芩 半兩 甘草 半兩

炙微 赤剉

右細羅為散不計時候煎葱白燈心湯下半錢量兒

大小加減

又方

出聖
惠方

生地黄汁 二合 牛蒡子葉汁 一合 蜜 一合

右相和令勻每服一合調下滑石細末半錢臨時看
兒大小加減服之

治小兒小便赤澀不通宜服此方

出聖
惠方

滑石 二兩 木通 一兩 葵子 一合

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不

計時候量兒大小加減溫服

滑石散 治小兒熱極小便赤澀不通尿輒大啼水道

中痛

方見本門小
便不通類

硃砂散

出醫方
鈔選

治心神煩燥小便赤澀不通

硃砂 一兩 滑石 犀角 各半 黃芩 車前子 各一分

甘草 一分

右羅為散入硃砂同拌每服半錢煎竹葉湯調下食
服

小便不通 附論

夫腎主水與膀胱為表裏膀胱者津液之腑其氣下通水行於小腸入脬故能滲泄而作小便或胞絡有熱津液內燥氣不舒暢故水道熱澀甚則不通皆因心經不順或伏熱或驚起心火上炎不能下降以濟腎水故使小便不通溺血者由膀胱熱故也

方

小品地膚子湯 出千金方

療小兒小便不通及治小兒熱

毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澀痛不出出少如血須更復出

地膚子 一分 瞿麥 一分 冬葵子 各二分 知母 一分 黃芩 一分

猪苓 海藻 橘皮 升麻 通草 各一分 大黃 八分

枳實 炒一分 錢半

右十二味切以水三升煮取一升大小多少量與服忌如常法一方有枳實無橘皮一日至七日兒服一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日

至二十日兒二合為三服四十日兒以此為準五十日已上七歲已下以意加藥益水

地膚子散

出聖惠方

治小兒積熱小便不通

地膚子

蘧麥

冬葵子

知母

黃芩

川升

麻木通

到川 大黃

到微炒

猪苓

去黑皮已上各半兩

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓不

計時候量大小加減服之

七物浴湯

治小兒小便不通熱發腹滿

滑石

屑二兩

大黃

二兩

雷丸

三十枚

麻黃

一兩

苦參

兩 石膏

半兩

秦皮

一兩

右粗搗篩以水七升煮取五升去滓温浴兒避風處

先從臍淋之

木通黃芩湯

一名滑石散出聖惠方

卜木通

黃芩

二兩去心

滑石

一兩半

冬葵子

三分

車前

子

二兩

赤茯苓

二兩去皮

右粗搗篩五六歲兒每服一錢以水一中盞煎至五

分去滓温服如人行十一里已來再一服看兒大小
加減

瞿麥湯

一名赤芍藥
湯出聖惠方

治小兒小便不通悶絕

瞿麥穗

赤芍藥

陳橘皮

湯浸
去白

牽牛子

炒

木通

冬葵子

各一分

右粗搗篩五六歲兒每服一錢水一中盞葱白一莖
擘碎同煎至四分去滓温服如人行十里已來再服
量兒大小加減一方無葱白

治小兒小便不通

用末雞屎白一錢七

滑石散

治小兒小便不通心腹滿悶坐卧不安

方見
本門

秘結
類

滑石散

治小兒小便淋血澀不通及小便血

方見本
門秘結

類

木通

到

甘草

炙令
赤到

葵子

已上各
一分

川大黃

剉
炒

滑石

牽牛子

炒半
兩

右細羅為散每服煎葱白燈心湯調下半錢量兒大小加減服之以利為度

浸熨湯 出聖惠方 治小兒小便不通

木通 一兩 生薑 一兩 葱白 七莖 陳橘皮 一兩 川椒

半兩

右都細剉以水二大盞煎至五七沸去滓傾入盆內看冷暖坐兒於盆中浸之將滓於兒臍腹下熨之五通

冬葵子散 出聖惠方 治小兒小便不通臍腹急痛

冬葵子 滑石 海蛤 蒲黃 各半兩

右搗羅為散每服以葱白湯調下半錢量大小加減

梔子仁散 出聖惠方 治小兒小便不通臍腹妨悶心神煩

熱

梔子仁 五枚 茅根 半兩 冬葵子 半兩 甘草 一分

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小加減溫服

又方 出聖惠方

滑石 一兩半 木通 三分 川芒硝 三分 葵子 二合

右羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量大小加減溫服

萬安散 治小兒小便不通欲死

海金沙 滑石 續隨子 炒各半兩 螻蛄 七枚炒黑

右搗羅為細散每服半錢煎燈心湯溫調下空心食前服

茯苓湯 治小兒小便不通

赤茯苓 去皮 冬葵子 木通 剉 車前子 各半兩

右粗搗篩五六歲兒每服一錢以水一中盞煎至五分去滓溫服如人行十里以來再服量兒大小加減

廣濟滑石湯 療小兒熱極病小便赤澀或不通尿輒大啼呼

滑石 十六分 子苓 十四分 冬葵子 八分 車前子草

右水二升煮取一升一歲至四五歲服一合日再服

甚良

治小兒小便不通臍腹急痛出聖惠方

石葦半兩 蘧麥半兩 小麥一兩

右剉以水二大盞煎至一盞去滓取汁一合調下滑石末半錢量兒大小加減

石葦湯 治小兒小便不通

石葦去毛 瞿麥各一兩 滑石一兩

右粗搗篩五六歲兒每服一錢水八分入小麥一百

粒同煎至五分去滓溫服如人行十里再服量兒大

小加減

葱白湯出聖惠方 治小兒小便澀少妨悶不通

葱白二莖 木通 冬葵子各半兩

右剉如麻豆大以水二盞煎取一盞去滓量兒大小加減

乳前葱白飲子出聖惠方 治小兒百日内小便不通心冲

煩悶臍下痞滿

葱白 一莖 乳汁 三合

右同煎至一合半去滓分溫為三服相去人行十里
以來再服以利為度

葵根湯

出聖惠方

治小兒小便不通二三日悶絕者

葵根

五錢

壁魚

研七箇

右以水一盞煎葵根取汁六分後入壁魚同煎五七
沸放溫服量兒大小加減

治卒不得溺及小便不通小腹妨悶

出聖惠方

取垢灰二刀圭許以酒若米飲三歲已下服一字

又方

出肘後方

以髮灰酒下之

治小兒小便淋閉不通神散及治淋瀝尿血

出傅氏活嬰方

石燕

一枚火煨燬醋為末再研

石葦

右為細散每服一錢煎三葉酸漿草湯調下甚者三
服瘥一方海金沙一兩

車前草湯

出聖惠方

治小兒小便不通臍腹急痛

車前草

細剉小麥各一兩

右用水二盞煎至一盞去滓下糯米少許又煎至半盞三四歲小兒為三服如人行十里已來再服量兒大小以意加減

治卒不得溺及小便不通

出肘後方

以少許雞子白亦佳

冬葵子散

出聖惠方

治小兒卒小便不通小腹急悶

冬葵子

一兩

木通

半兩

右藥羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不拘時候量兒大小加減服之

捻頭散

出錢氏方

延胡索

川苦棟

各等分

右同為末每服半錢或一錢捻頭乳湯調下量多少與之如無捻頭湯即湯中滴油數點食前

治小兒小便不通小腹妨悶方

出聖惠方

用葱白一斤連須細切煮令熟以綿裹於臍下熨之

立通

又方 出聖惠方

用桑螵蛸十枚炙令黃羅為末每服以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

治小兒小便不通 出千金方

右用冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末六銖 趙使君云其子年十餘歲用小遺為犬所驚當時雖無他後旬日忽小便不通大便初覺自利

後復如常率半月餘方一小遺飲食起居間皆無所苦亦無腹脹肢體腫滿之患凡服通利水臟治淋澀藥並不效移書問一醫姓劉忘其名寄三方來第一方用地骨皮一兩防風半兩甘草一分為細末煎麥門冬湯調下不四五日即通服之不已即三日一通終劑已兩日一通矣每服第二方用青皮陳皮通草之數不能盡記數服即平愈第三分不曾用也

治小兒卒不尿 出本草

用安鹽於臍中灸之

秘結 附論

夫五味之精華清者以養臟腑五味之糟粕濁者皆歸大腸司出而不納也熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之夾熱也宿食留滯則腹脹痛悶胃痞欲嘔熱氣蕃灼則受風熱涸燥秘塞熱宜踈利三黃湯積宜換積脾積丸胃中活法治之三黃丸三黃湯治熱秘凡小兒大人大小便不通內經所謂三焦約約

者不行也可用流水煎八正散時時灌之大小便利則止若不因熱藥所攻而致此者易治或用多服熱藥而燥劇至此者非惟難治不幸夭枉亦可用蜜水調益元散送痛膈丸

方

握宣丸

出濟生
按粹方

治小兒大小便難嘔吐藥食不下命

在頃刻

- 巴豆 一錢半
- 硫黃
- 良薑
- 附子
- 檳榔
- 甘草 各等

分

右為末粟米飯和丸菜豆大用椒湯洗小兒男左女
右手握之用綿裹定看作數多少置藥洗去不用即
止

治小兒大小便不通 出集驗良方

甘草 木通 梔子仁 各等分

右為粗末水一大盞燈心一莖連根葱白七箇煎半
盞服

郁李丸 出錢氏方 治襁褓小兒大便不通小便澀滯并驚
熱痰實欲瀉動者

郁李仁 一兩 川大黃 一兩酒浸炒 滑石 半錢

右另為末將郁李仁研為膏和末為丸如黍子大量
兒大小與之以乳汁或薄荷湯下服食前

甘枳湯

甘草 一錢 枳殼 一錢

右以白水煎服

膠蜜湯 治虛秘

用葱白三莖入水煎去葱入阿膠炒及生蜜溶化空心服

獨棗湯

用大棗一枚去核入輕粉半錢以棗相和縛定慢火煮熟食棗以棗湯下

治小兒大小便不通

出肘后方

右蜂房燒末酒服二錢日二服一方炙微焦為散粥

飲調下半錢大小加減服之

治小兒大小便不通

用搗白花胡葵子末煮汁服之

治大便小便不通掩臍法

取連根葱一莖去泥土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽一匙同研爛捏作餅烘熟掩臍中以帛扎定良久氣透自通不效再用一餅

五和湯

出宿州陳氏方

調氣血疎通臟腑

當歸 半兩

茯苓

半兩 去皮

甘草

半兩 炙

大黃

七錢 半

枳殼

去穢

麩炒七錢半

右為呔咀每服三錢水一盞煎至七分去滓稍熱不饑不飽服

治小兒大小便不通妨悶方

用白蜜一合以錫中煎為丸內下部中即通小便不

通嚼生葱以綿裹少許內小便道即通

千金紫雙丸

主小兒身熱頭痛飲食不消腹脹滿或

小便腹絞疼失節大小便不利或重下數起小兒無異

疼惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱唯此

丸治之不瘥或可再服小兒欲下是其蒸候哺食減少

氣自不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他

藥數用神驗

巴豆

去皮 心熬

蕤核仁

各十八株 搗

麥門冬

去心 十株

甘草

五株 炙

甘遂

一株

真珠

二銖

牡蠣

煨

蠟

各八銖

右為湯熟洗巴豆研以新布絞去油別搗甘遂甘草

牡蠣麥門冬細篩畢搗巴豆麩仁令極熟乃內諸藥散更搗三千杵如藥燥入少蜜足之半歲兒可服如荏子一雙一二歲兒服如半麻子作一雙三歲兒服如麻子一服收作一雙四歲兒服如麻子二九五六歲兒服如麻子一九七八歲服小豆大二九九歲十歲兒微大於小豆二丸常以雞鳴時服之日出時不下者飲粥汁數合即下丸皆雙出也下甚者飲冷粥止之

滑石湯 出聖惠方 治小兒大小便不通心腹滿悶坐卧不安

滑石 研 川大黃 剉 冬葵子 甘草 各半兩炙

右粗搗篩三四歲兒每服一錢水一盞入燈心七莖同煎至五分去滓溫服更隨兒大小加減一方入葱白五寸

通膈丸 出濟生拔粹方

大黃 牽牛 木通 各等分

右為細末滴水丸粟米大每服三五十九丸量虛實大小加減

大便不通 附論

夫水穀皆入于上焦至中焦而腐熟下焦而化出小兒腹臟挾熱三焦壅滯津液枯少不能傳道實熱之氣歸于大腸故大便躁澀而不通也

方

代赭丸 治小兒大便不通

代赭 研 丹砂 研 大黃 剉炒各二兩 木香 當歸 各一分焙

桂 去皮一兩 生犀角 銹三分 巴豆 炒熱去皮心搗一兩半

右搗研為末煉蜜丸如小豆大每服一九至二九空心米飲化下六七歲三九二百日兒半丸但得溏利為度

大黃散 出聖惠方 治小兒臟腑壅熱心神煩悶燥大便不通

川大黃 一兩剉微炒 犀角屑 半兩 川升麻 半兩 當歸 一

分 赤芍藥 一分 紅雪 一兩 甘草 炙微赤 一分

右粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至六分去滓三四歲溫服一合量兒大小加減服之日三四服以利為度

沒藥散 出直指方 治小兒風與滯血流蓄上焦胃膈高起

大便不通並皆治之

沒藥 大黃 枳殼 炒 北梗 各二錢 木香 甘草 炙

分一

右剉每一錢薑二片水煎服

牛黃丸 出聖惠方 治小兒大便不通心中煩熱

牛黃 一分 川大黃 三分剉微炒為末

右都研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下七丸以利為度量兒大小加減服之

橘皮湯 治小兒大便不通

陳橘皮 一分去白焙 大黃 剉炒半兩

右粗搗篩三四歲兒每服一錢水一小中煎至五分

去滓温服更量兒大小加減

鼈甲丸 治小兒大便不通不能飲食

鼈甲 醋炙去裙襴 防葵 訶黎勒 用皮煨 人參 當歸 剉

炒 郁李仁 湯浸去皮尖炒別研入

右等分搗為細散末入郁李仁和勻煉蜜丸如菉豆

大粥飲下五丸微利即瘥

桃葉湯 出聖惠方 治小兒大便不通臍腹妨悶

桃葉 一握 木通 二兩 燈心 五根 川朴硝 一分 葱白

七莖

右細剉用漿醋水三大碗煎十餘沸去滓傾向盆中

稍温便坐兒在盆中將滓以手帕裹熨于臍下令兒

即出之後吃地黄粥半盞良久便通

犀角丸 出聖惠方 治小兒臍膈壅滯腹脇妨悶大便不通

犀角屑 半兩 當歸 半兩剉炒 川大黃 一兩剉炒 巴豆 十個去心研紙

上去 丹沙 半兩研細水飛

右為末入巴豆丹砂用研令勻煉蜜和丸如菉豆大

三歲兒以溫水下三九量兒大小加減

大黃丸 出聖 惠方 治小兒大便不通心腹壅悶

大黃 剉炒一分 枳殼 去穢 麩炒 梔子仁 郁李仁 炒去雙仁 大

麻仁 研炙 三分

右搗研為末煉蜜丸如麻子大一二歲每服五丸熟

水下空心午後各一服更隨兒大小加減一方無大

麻仁

蜜尊法 出全 嬰方 治小兒大便結熱不通

用蜜不拘多少銅器中微火煎之稍凝如飴糖狀攪
之勿令焦可丸捻作槌如指許長一寸以上當熟時
急作令兩頭尖內穀道中以手急抱欲大便時去之

橘皮湯 出聖 惠方 治小兒大便不通及腹脇妨悶

陳橘皮 去白 焙 牽牛子 炒 甘草 炙 川大黃 剉炒各一分

右粗搗篩五六歲兒每服一錢水一小盞入葱白一
莖同煎至五分去滓溫服未通再服更量兒大小加

減

硃砂丹 出聖惠方

治小兒大便不通小便澀心神煩熱卧

忽多驚腹脇妨悶

硃砂 半兩細研水飛過

續隨子 三分 膩粉 一錢

右研令勻煉蜜和丸菉豆大三歲每服溫水下三九量大小加減乳食後

金花散 出王氏方

治小兒大腸秘不通兼血痢

郁李仁 一分炒 檳榔 一箇生 甘草 一錢

右為末每服一錢或半錢砂糖熱水調下

治小兒大便不通 出肘後方

用猪苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立瘥

又方

大黃 一兩剉炒 牛黃 研 甘草 炙 人參 各二分

右搗研為末煉蜜丸如菉豆大每服二丸米飲下

通中丸 出聖惠方

治小兒大便不通心腹壅悶卧即煩喘

川大黃 一兩剉微炒 巴豆霜 三分 皂莢 一兩不蛀者去皮子燒令焦黑

右大黃皂莢搗羅為末入巴豆霜同研令勻煉蜜和

丸菘豆大四五歲以溫水下三丸量兒大小加減

木通湯 治小兒大便不通

木香剉 大黃剉炒 陳橘皮去白焙 各一兩

右粗搗篩三四歲兒每服一錢水一小盞煎至五分

去滓溫服更量兒大小加減

丹參湯 治小兒大便不通妨悶

丹參 消石研 甘草炙各一分

右粗搗篩五六歲兒每服二錢水一盞棗二枚同煎

至七分去滓分溫二服更隨兒大小加減

黃連丸 治小兒風熱壅滯大便秘澀

黃連去須 大黃剉炒各一分 巴豆三粒去心膜皮出油研

右搗研為細末麵糊為丸如麻子大每服三丸至五

丸臨睡柳枝湯調下

芎黃散出聖惠方 治臟有熱小便澀大便不通腹脇妨悶

芎藭一兩 川大黃三分炒 郁李仁去皮炒三分

右搗為散每服一錢以溫水調下大小加減

走馬箭方 出聖 惠方

治小兒大便不通連腰滿悶困重氣

羊膽 一枚 蜜 一合 鹽花 半兩

右同煎如錫撚如筋粗可長一寸內下部中須臾即通

蜂房散 出聖 惠方

治小兒卒大便不通

用蜂房一枚炙令微焦細羅為散每服粥飲調下半錢量兒大小加減服之

治小兒大便五六日不通心腹煩滿 出聖 惠方

取青顆鹽末於臍中以手摩良久即通大人用之亦得

大便血 附論

夫小兒大便血者為心主於血脉心臟有熱熱乘於血
血性得熱流動妄行不依常度其血流滲於大腸者故
令大便出血也

方

槐花散

出聖 惠方

治小兒大便出血腹痛黃瘦不欲飲食

槐花 微炒

白朮

熟地黄

芎藭

已上各 半兩

黃耆

剉

木香 當歸剉微炒 甘草炙微赤剉已上各一分

右羅為散每服一錢水一小盞煎至六分去滓不計時候量兒大小加減服之

卷栢丸出聖惠方 治小兒大便出血久不止面色萎黃肌

體羸瘦或時腹痛不欲飲食

卷栢半兩 赤石脂半兩 阿膠半兩搗碎 槐花微炒

黃牛角腮炙黃焦 當歸剉微炒 黃耆剉 芎藭已上各一分

右為末煉蜜和丸如麻子大三歲兒每服以粥飲下

七九日三服量兒大小加減

羚羊角散出聖惠方 治小兒大便出血體熱黃瘦不能飲

食

羚羊角 黃耆剉 川升麻 黃芩 地榆剉 甘草

炙微赤剉已上各一分 生乾地黄半兩

右羅為散每服一錢水一小盞入苦竹茹半分煎至六分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒大便後出血方出聖惠方

用鼈甲一枚塗醋炙令黃焦去裙襴細羅為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小以意加減一方

用驚頭一枚

又方 出聖惠方

燒車釭一枚全赤投於一六水中每服半合日三服看兒大小以意加減

又方 出聖惠方

用甌帶燒灰細研每服用乳汁調下半錢量兒大小

加減

又方 出聖惠方

用鹿角燒灰細研以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減

箬葉散 出全嬰方

治小兒大便中有血或純下血用茶箬燒灰存性為末米湯調下食前

五倍丸 出全嬰方

治小兒大便下血如腸風臟毒用五倍子焙乾為末煉蜜丸如小豆大三歲三十丸

米湯空心下

訶灰散

出全
嬰方

治小兒因瘕大便中有血

用訶子燒存性一半為末米湯調下食前三歲一錢
一方椽斗子合白梅濕紙裏燒灰存性為末米湯調
下食前

三效散

出全
嬰方

治小兒糞前後血下并腸氣風下血久

不瘥

糞前下血石榴皮為末煎荔枝湯下

糞後血下五倍子為末煎艾湯調下

糞夾血或腸氣下血茄蒂燒灰存性為末米湯下

右三歲半錢大小加減與之食前五倍子為末米湯

調下最治泄痢艾葉湯治吐血瀉血

治小兒中蠱下血欲死

用青藍汁頻頻服半合

治小兒下血

用雌雞翅下血服之

治小兒若隨落有痢血壯熱不食乳哺者

用大黃黃連蒲黃各二分芒硝一分半以水二升煮取一升去滓內芒硝分二服大小便血即愈

犀角丸 出湯氏寶書

治小兒搖頭下血乃肝血液盛外有

風熱乘之肝屬木木盛而脾土為木所尅脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂浸漬於大腸故便血不止

犀角屑 一分 括樓根 半兩 蛇腿皮 炙赤 鈎藤勾

子麻黃 去節各一分 黃耆 密炙 羌活 防風 白芍藥

各半 甘草 一分

右為末棗肉丸食後薄荷湯下只二服作效搖頭即

止便血愈多次間胃風湯服之日減一日鄭都承令

嗣患七年搖頭三年下血已服百餘方前後服治搖

頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥未嘗

偶安撫王尚書挽留都下先君宰錢塘時與之有分

一日招飲令其子勸酒因視其疾又扣其詳亦不能

曉其標本酒罷退思遂處此方但損肝祛風益脾數

服而愈十餘日後血止而下白膿自此斷根今數年矣

保嬰槐花散 出永類
鈴方

治熱便血

荆芥穗 槐花

枳殼 麩炒
去穰 甘草 各等
分

右為末蜜湯調服

大便青 附論

夫小兒大便青者因驚氣及脾氣不和大腸虛冷乳食不消全氣搏於糟粕故令大便青色也

方

訶梨勒丸 出聖
惠方

治小兒內冷腹脇妨悶大便青色不

欲乳食

訶梨勒 一兩煨
用皮 白朮 半兩 陳橘皮 半兩湯浸
去白穰焙 白茯苓

苓 一分 當歸 一分剉
微炒 白芍藥 半兩 厚朴 半兩去粗
皮生薑汁

炙令
熟香 甘草 半兩炙
微赤

右羅為末煉蜜和丸如梧桐子大三歲兒每服以粥飲調下五九日三服量兒大小加減

木香丸 出聖 惠方

治兒胎寒腹痛大便青

木香 蓬莪茂

白朮

人參 去蘆 頭

當歸 剉微炒 已上各

半 麝香 一分 兩 細研 白芍藥 一分

右羅為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服以溫粥飲下七九日三服量兒大小加減

芎藭丸 出聖 惠方

治小兒胎寒腹痛大便青

芎藭 三分

黃耆 三分 剉

牛黃 半兩 細研

麝香 一分 微炒

細研 當歸 半兩 剉炒 白芍藥 一分

右羅為末研令勻煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日三服看兒大小加減

陳橘皮丸 出聖 惠方

治小兒內冷大便青不欲飲食皆胎

寒

陳橘皮 湯浸去白穰焙

當歸 剉炒

人參 去蘆

白芍藥 各半 兩

芎藭 已上各 半兩 甘草 一分 炙

右羅為末煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服以溫粥飲含下七九日三服量兒大小加減

白朮丸 出聖惠方

治小兒大腸虛冷乳食不消大便青色

白朮 研 白芍藥

木香

當歸

剉炒已上各一分

麝香

一錢

右羅為末煉蜜和丸如菘豆大每服粥飲研下五丸
日三服量兒大小分減服之

當歸丸

出聖惠方

治小兒大便青不欲飲食皆是胎寒

當歸 剉炒 人參 去蘆

白芍藥

芎藭

已上各半兩

甘草

一分炙赤剉

右羅為散煉蜜和丸如麻子大每服以乳汁下三丸

日三服量兒大小加減



普濟方卷三百八十八

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣馮敏昌

謄錄監生臣狄景通