

三  
嘉  
疾  
如

婦人  
大  
全  
良  
方  
二  
之  
四



新編婦人大全良方卷之二

新編婦人大全良方卷之二

新編婦人大全良方卷之二

象疾門

經脈不調象疾生焉故以次之

極一方總論第一

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象效法之有類原茲婦人之病與男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治不亦言之深乎但三十六病產蓐一門男子無之其如外傷風暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉無丈夫一同也依源治療可得而知之

古者治婦人別著方論者以其胎妊生產崩傷之

異况婦人之病比之男子十倍難療蓋女子嗜慾多於丈夫感病倍於男子加之慈惠愛憎嫉妬憂恚深著堅牢情不自抑所以為病根深治之難差况懷胎妊娠而挾病也不特避其毒藥仍須審其虛實冷熱而調治之無使妄投湯劑以致大柱

婦人將攝煩理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣則風冷乘虛而于之或作之於經絡或循入於腹中內受風邪脾胃虛弱故不能消於飲食也食既不充榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤若大腸氣虛則憂為下利若流入閔元致絕子嗣隨其所傷而憂成疾醫經曰凡婦人三十六種病

皆由子臟冷熱勞損而挾帶下起於胞內也是故衝任之脈為十二經之會海婦人之病皆見于少陰太陽之經而候之

寇宗奭論身四

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪是之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脈之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤已浮謂之易已形氣相失謂之難治色大不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脈病不相應既不得見其形醫人止據脈供藥其可

得乎如此言之於能盡其術也此醫家之通患也  
不能草醫者不免盡理真問病家見所問繁速為  
醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊  
侯之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難  
也已

醫局下通用方序論第五  
夫通用方者蓋產前產後皆可用也或一方而治  
數十證不可入於專門皆是名賢所處世之常用  
有效之方雖只通用亦不可刻舟求劍按圖索驥  
而膠柱者也

**加減四物湯** 治婦人經病或先或後或多或少或  
少疼不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露多

或停留不出或妊娠腹痛下血胎不安產後塊不散  
或亡血過多或惡露下服之如神○張聲道云此  
方治婦人百疾只是四物湯加茱萸煎服若陽臟  
少使茱萸若陰臟多使茱萸吳與周端仁郎中頃  
赴省試照臨一鄰案出場云某本醫家凡婦人百  
病只是四物湯加茱萸無不效者謹以此為報  
仲方加香附子

當歸 白芍藥 川芎 陸氏云川

生乾地黄 洗焙養生必用方熟者女子宜劑亦然

右等方為粗末每服四錢水一盞半煎至八分  
去滓取六分清者帶熱服食前若經帶血氣

男下必有子字

不調及常服只用本方日二三服治經血凝

滯腹內血氣作疼加莪茂官桂等方用之王碩

熟地黃滯血安能止痛如因產後欲推陳致新

補血海治諸疾加生薑煎若胎動不安下血

每服加艾葉五七片更加葱白阿膠末減四味

之半當歸用小半如疾勢甚者以四味各半兩

細切以水四盞熟艾一塊如雞子大阿膠五七

片煎至二盞半去滓分作四服一日合盡一方

草乾薑日二三服至二膳為一膳如前產後

每日可一二服如氣虛弱血海不調服一月

不妨如產後被驚氣滯撞撞積滯敗血一月

內惡物微少敗血作病或脹或疼胃膈脹悶或

發寒熱四肢疼痛加延胡索沒藥香白芷與四

物等分為細末淡醋湯或童子小便酒調下

如血風於產後乘虛發作或產後傷風頭痛發

熱百骨節痛加荆芥穗天麻香附子石膏藿香

各一分四物料共一兩中加之每服三錢水一

盞煎七分服如虛熱心煩與血相搏口舌乾

渴欲飲水者加枯樓根一兩麥門冬心法三分

如腹刺痛惡物不下加當歸芍藥一方如血

崩不止加熟地黃蒲黃各一兩嘔逆加白朮人

參各半兩如寒熱往來加炮了乾薑牡丹皮

各一分因熱生風加川芎一分柴胡半兩

腹脹加厚朴枳實各一分身熱脈數頭昏項

強加柴胡黃芩各半兩 如臟腑滑泄加桂心

附子地各一分 若虛煩不睡加竹葉人參各

一分 煩躁引飲頭痛大渴加知母石膏各半

兩若水停心下微吐逆加赤猪苓防已各三方

同煎 若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不調

只用生薑薄芎如常煎服 此是婦人常服之藥

深而切一方治婦人血虛心腹疼痛不可忍者去

地黃加乾薑名四神湯 治老人風秘加青皮

等分煎服 一方治小便澹大便秘加大黃批

仁去皮尖炒薑減半煎 一方治血痢不止加

阿膠艾葉煎 陳氏方治痢疾腹痛 一方治婦

人腹痛作聲經脈不快加熟地黃一倍添桂心

半倍煎治瘡疾加荊芥酒煎常服 一方添柴

胡名五神湯柴胡大能補虛退虛熱 一方以

四物湯共四兩為細末煉蜜為圓如梧桐子大

空心未飲下三四十圓以療年高婦人白帶又

良驗也請詳用之 一方四物湯共四兩加其

草半兩細末煉蜜為圓每兩作八圓酒醋其半

盞溫湯同化調停下名當歸煎去敗血生好血

如人行五里再進一圓無時候煎 此藥不

知起於何代或云始自魏華佗按巢氏云佗之

術精微方類阜省傳秘他術鍼灸不過數處于

金方云自三代以來醫方藥論未有如此詳備

者其間有漢晉名公諸方今產室方乃未梁時

十

共

節度巡官皆膺巧撰其中有四物散國朝太平  
興國中修入聖惠方者數方自後醫者易散為  
湯雖無保持之功但善用者若取良馬以意駢  
集之則隨意無所不至自可珍也自皇朝以  
來名醫於此四物中增損品味隨意虛實寒燥  
無不得其效者然亦非止婦人之疾可用而已  
懷娠產前後加減良方

芎藭

當歸

桂心

白芍藥

洗

洗

洗

洗

洗

洗

右四味各為細末取淨一兩各隨病證加減用  
產前初覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下臨  
產腹痛甚川芎芍藥當歸各半錢桂心一錢溫

酒下投產婦運行

產後惡露未快川芎當歸

各半錢童子小便調下仍時時打醋炭令香不

絕則血脈日收安樂無病切不可妄投藥恐逐

血過多則心虛氣劣三日內只服當歸川芎末

各一錢童子小便調下日三服三日後只服四順理

中四空心童子小便吞下 七日內補虛當歸

川芎末各一錢童子小便或米飲調下 七日

外方可服補菜補得太早則留住血一終平

善四味各半錢童子小便調下 產後頭昏目暈川

芎芍藥當歸末各半錢童子小便調下未滿月

已滿月四味各半錢水一盞煎至八分溫服

腹痛當歸末一錢桂心末半錢童子小便調下

心胸煩悶當歸為藥名一錢童子小便調下  
露過多挂心芍藥當歸各一錢童子小便調  
下大便冷用理中因水一盞煎八分溫服  
**佛手散**治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾總產  
了未進別物即先服此藥能除諸疾逐瘀血生新  
血

川芎二兩 當歸三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二方並七分溫  
服一方為粗末每服四錢水七分酒三分同  
煎至七分熟服將產前光安排此藥將兩服藥  
未煎之產了速進之三日內日二服三日外日  
一服一方名芎歸湯只是此二味等分吹咀

水煎專治失血傷胎去血產後去血崩中去血

金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心

煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉

能治之若產後眩暈宜加芍藥服之一名挂

香散治產後腹痛不可忍者加挂心等分酒與

童子小便合煎服之立效一名當歸湯治妊

娠子死或未死胎動不安每服用酒水合煎連

進數服胎若已死服之便下若未死其胎即安

此經累效萬不失一一名琥珀散臨月服之

則縮胎易產兼治產後諸疾一名羊肉湯治

虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱呼吸少氣不能

支持頭眩自汗腹因拘急每服用精羊肉一兩



薑十片水二盞煎至六分溫服 一名君臣散  
治婦人室女心腹疼痛經脈不調用水煎服若  
妊婦胎氣不安產後諸疾加酒煎服 一名芍  
當歸散治婦人血氣上喘下腫二味等分為細末  
每服二錢空心煎艾湯調下 又治產後損身  
血衝心及腹脹氣絕者神驗 難生倒橫子死  
腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童子小  
便一盞藥末四錢煎至一盞以上分為二服未  
効再作 產後血注心迷悶喘急腹痛依前  
用黑豆加生薑自然汁半合煎服 又此藥煎  
治臟毒每服一錢半入炒槐花末半錢水一盞  
煎至六分無時候服三日取下血塊即愈 如

產後頭痛加荆芥煎 如吐血亦宜服

論丹參散主治 此論理 凡此藥

四物湯婦人多用者以其不問產前產後經水多  
少皆可通用惟丹參散一味其主治頗相類何者  
以其能破宿血補新血安胎落死胎生崩中帶  
下調經脈大類當歸地黃芍藥川芎也  
**丹參散** 治婦人經脈不調或前或後或多或少產  
前胎不安產後惡血不下並治之並治冷熱勞腰  
脊痛骨節煩疼

丹參 不以多少

右為細末每服二錢溫酒調下經脈不調食前  
服令熱勞無時候服

**勝金圓**

足一方 腹各不換 一名勝金丹 有諸虛不治婦人

久虛無子產前產後一切病患兼療男子下虛無力此藥能安胎催生妊娘臨月服五七圓產時減痛婦人無子是子宮冷如服二十圓男女自至又治積年血風脚手麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐逆心痛子死腹中遠臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不語口噤產後痢疾消渴眼前見鬼迷運敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血崩不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人眾疾不論年月日深並皆治之

精製白芍藥

藁朮

夜脂

赤白

川芎

不見

牡丹皮

當歸

續斷

白茯苓

人參

白薇

下血

白芷

桂心

延胡索

並

白朮

沒藥

甘草

煨

減

下

下

下

右十五味等分為細末煉蜜為圓如彈子大每

服一圓溫酒化下初產了並用熟醋湯下空心

食前○此方係王承宣臺祖傳渠家凡婦人懷

身便服此藥甚神妙常服尤好係在京師於莊

家傳到

**金釵煎**

專治婦人諸疾產前產後風虛痼冷手足

痛痺豆淋酒化下血風頭痛產後中風荆芥酒化  
 下產前產後痰涎咳嗽桑白皮湯下經脈不調或  
 前或後或多或少或血氣攻刺腰脇重痛温酒化下  
 經脈不通產後血喘蘇木人參煎湯化下血崩不  
 止赤白帶下側拍燒灰調酒下妊娘將理失宜或  
 因驚動痛極妨悶漏胎下血膠艾煎湯化下臨產  
 艱難乳香研酒化下子死腹中胎衣不下用朴消  
 三錢重研細童便和酒化下產後勞倦傷敗血氣  
 如瘧寒熱遍身疼痛喘嗽盜汗地黃烏梅煎湯化  
 下產後敗血浮腫薑汁小許和酒半盞化下產前  
 服之助安胎臨產亦易產產後則逐去惡血不生  
 諸疾用薑便和酒化下常服治血駐顏大暖血海

升降陰陽滋養榮衛或子宮久冷多病少子能久  
 服之見效立效忌生冷油膩魚腥猪世白猪一切  
 毒物

- |                       |                     |                       |                     |                     |                      |                        |                        |                        |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 沉香                    | 人參                  | 枳殼 <small>去穢炒</small> | 牡丹皮                 | 粉草                  | 具世 <small>去心</small> | 降真香 <small>細剉</small>  | 石斛 <small>酒炒</small>   | 當歸                     |
| 黃芩 <small>兩各半</small> | 木香                  | 延胡索                   | 大豆卷                 | 乾薑 <small>炮</small> | 羌活                   | 熟地黃 <small>兩各四</small> | 白芍藥                    | 白芍藥                    |
| 川椒 <small>三分</small>  | 石膏 <small>煨</small> | 白芷 <small>兩各一</small> | 茴香 <small>炒</small> | 北細辛                 | 桂心                   | 秦艸                     | 糯米 <small>兩各二炒</small> | 糯米 <small>兩各二炒</small> |

交加散

右為細末煉蜜為圓每兩作七圓依前服餌常服溫酒化下擅奉晚公方

交加散

治產前後百病治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風尤妙

生地黃

一斤研取汁

生薑

十二兩研取自然汁

右將地黃汁炒生薑滓薑汁炒地黃滓各稍乾

培為細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜

服產後尤不可缺

交加散

治榮衛不和月經湛濁大眩滋養血絡逐散惡血將腹撮痛腰腿重墜血經諸疾並皆治之

生薑

一斤研取汁

生地黃

一斤研取汁

生薑

十二兩研取自然汁

白芍藥

延胡索

用布紙裹去根皮

紅花

炒魚鱗不用

當歸

別研各半兩

蒲黃

紙炒兩錢

右為細末每服二錢溫酒調下如月經不依常

蘇木煎酒調下若腰疼用糖菓子煎酒調下無

時候

玉露通真圓

治婦人諸疾

出經驗婦人方

半夏

薑汁炒

人參

各半兩

食茱萸

醋炒

製厚朴

各一方

澤蘭葉

半兩

甘草

蟬脫

炒

白芍藥

石膏

蚕脫

炒用紙三張代蠶

白朮

當歸

羌活

熟地黃

洗焙

白茯苓

西名二

防風

乾薑

柏子仁

蒼朮

白薇

木香

黃耆

川牛膝

附子

白芷

白芷

此方

細辛

川芎

藁本

王劉山椒

苦梗

白芷

右為細末煉蜜為圓每九錢重分作十圓切記

煉蜜無令大過及生男子婦人諸虛不豆狀

如勞疾黃耆煎酒下血氣痛燒秤鎚浮酒下

產前安胎用醋湯下產後諸疾用酒或鹽湯

下產前產後瀉用米飲送下男子婦人牙

疾用半圓指疼處良久鹽湯嚥下產前產後

血閉用童子小便送下經脈不調用經老煎

酒送下產後風毒生瘡疥刺芥茶下冷痰

翻胃醋心乾嚙下婦人子宮久冷崩漏赤白

帶下用童子小便未醋好酒一處煖熱下

補中圓常服

川芎

白芍藥

黃耆

當歸

人參

陳皮

白朮

地黃

右為末煉蜜圓如梧子大每服五七十圓溫水

下

二聖散

產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不

下方

川芎

羌活等二分

右為細末每服二錢水七分盞酒少許並七沸溫服

二聖大寶琥珀散

生地黄 一斤

生薑 如前交二味修製

當歸

牡丹皮

芍藥

蒲黃

香白芷

羌活各一味 桂心不見

熟地黄

右十味各一兩同煎二味為細末於麤合內收

之湯使于後婦人冷氣痛并血海不調膈氣

炒薑酒下二錢產後胞衣不下暖酒調下二

二錢產婦臨月日進三服則滑胎易產溫酒調

半盞同煎調二錢婦人久服則顏色紅白無

血未相攻一生無子者久服則有孕此藥治

療婦人百病空心日午食前日二服產後百病

並暖酒調下

朱翰林白朮煎治婦人胎前產後血氣諸疾

論出方

木香炮半斤

三稜

莪茂

白朮各一斤

枳殼炒去穢

白茯苓

當歸

延胡索

人參

熟地黄洗

牡丹皮

炒草各半斤

右為末米糊圓如指桐子大每服十三圓至二十圓常服溫酒吞下湯使于后胎前渾身并脚手痛炒薑酒下胎前腹內疼并安胎紫草煎酒下胎前嘔逆吐食糯米飲下胎前飲食不得渾身倦怠豆淋酒下胎前渾身發熱甘草湯下胎前咳嗽煨薑鹽湯下胎前頭痛煨薑茶下胎前產後馮紫蘇薑酒下催生胎衣不下當歸白三寸煨酒下產後赤白痢乾薑甘草湯下產後下血不止燒紗帽灰一錢調酒下無燒亦可產後渾身虛腫陳皮去白焙乾浸酒下頭疼薄荷茶下常服飯飲下赤白帶下燒棕攔灰三錢調酒下久年血氣

成塊藥心痛溫酒下炒薑酒下及良薑浸酒下皆可婦人室女經脈不通煎紅芍藥酒下經脈不調或前或後或多或少煎當歸酒下大小便秘結煨心煎湯下乳汁不行苦蘆煮猪蹄羹下產後腰疼煎芍藥酒下沉香琥珀煎益榮衛滋氣血經脈不調心忪倦乏腰膝疼痛赤白帶下五心煩熱面無顏色血海久在胎孕不固增寒壯熱婦人諸疾並能治之

沉香 別研 附子 地  
川芎 肉桂 五味子  
石斛 去根切 煎 阿膠 各半  
沒藥 研 續斷 煎 茯苓 酒洗

人參

當歸

牛膝

各三

木香

地黃

各一

右為末蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心酒  
吞下日午再服

**滋血湯**

滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷

二方

方

當歸

人參

阿膠

粉草

右為粗末

去滓溫服

二方

出

五

出

出

出

出

出

出

出

出

出

**烏鷄煎圓**

治婦人百病方三

吳茱萸

良薑

白薑

當歸

芍藥

延胡索

枳殼

陳皮

青皮

劉寄奴

生地黃

莪茂

川芎

荷葉灰

乾艾

破故紙

各一

一兩

四兩

二兩

二兩

二兩

右為細末醋煮麩糊圓如梧子大每服四五

圓月水不通紅花蘇木酒下 百帶牡蠣粉

酒下 子宮久冷白茯苓煎湯下 赤帶建茶

清下 血崩豆淋酒調懸灰下 胎不安蜜

和酒下 腸風陳米飲調百草霜下 心疼薑



蒲煎酒下 漏胎下血烏梅溫酒下 耳聾  
茶煎湯下 胎死不動斑猫三箇煎酒下 腰  
脚痛當歸酒下 胞衣不下芸臺研水下 頭  
風薄荷茶下 血風眼黑豆豉草湯下 生瘡  
生地黃湯下 身體疼痛黃耆末調酒下 四  
肢浮腫麝香湯下 咳嗽喘滿桑白皮湯下  
腹痛芍藥末調酒下 產前產後白痢乾薑湯  
下 赤者甘草湯難者三宜湯常服溫酒醋湯任  
下 並空心食前服

新編婦人太金良方卷之二

新編婦人太金良方卷之三

此一卷論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口  
噤口眼喎斜風眩頭痛血風心脾驚悸癱狂骨節  
痛風血風走注瘡癩癰疹風痰脚氣腰痛諸疾已  
上諸證雖各有方論亦要先明其大體察脈之虛  
實辨證之冷熱相入之強弱入臟入腑在絡在經  
首以局方調治未要猛浪用藥今之治法先宜順  
氣然後治風萬不失一蓋有中風中寒中暈中痰  
中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不  
分醫者不可不詳而究之如中風若作中氣治之  
十愈八九氣中若作中風治之十無一生所以疑  
惑之間不問中風中氣首以蘇合香圓麝香煎五

積散如中疾則有參蘇飲如中寒則有理中湯如  
中喝則有白虎湯如的然見得是中風如三生飲  
水香薷散排風續命風引大小竹瀝大八風湯至  
寶丹牛黃清心四辨其冷熱虛實而投之未有不  
安者也然此疾積襲之久非一月所能致今人服  
藥三五服便責無效其責醫者亦速矣正宜大劑  
么服方有其効孟子曰七年之病求三年之艾也  
婦人中風方論第一也風是四時八方之氣常  
夫中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常  
以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來  
者主長養為物者不從其鄉來者名為虛風賊害  
萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚

後或重傷於風前後重皆因體虛則發入臟腑前  
前皆在皆中風多從前入隨所中之前而乃發病  
婦人血氣虛損故令中風也當察口眼閉闔以別  
重輕涎沫有無以明證治如眼閉口閉手足不開  
涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者  
死

至寶丹 蘇合香圓 五積散 加麝香並牛黃清心圓

排風湯 治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏狂言妄  
語精神錯亂及風入五藏等證 詳見和劑方

白鮮皮 白朮 白芍藥 當歸 桂心 川芎

三生飲

方立即收是與燭回紅脈補然凡凡諸手體肝行是謹其  
知久愈尚夢救與皂此亦之排也湯有足不凡此此詳疾  
要生自弱裏傳進南真差意凡谷證此不仁也  
依再後與厘序諸日是勝却湯日也候隨不四策一  
古與云五驚氣証即凡只不所凡或冷腰能面  
法排皆積太湯悉之謹是僭用無日人痛行赤  
不凡無散便十除越再心標之一凡心難步第  
可湯恙數滑服只三與中供藥定脈驚以夢然血此  
杜則矣服泄又是日排如十有之當志從與而得  
臆然但加如越足云凡烟服十脈浮意仲前熱凡氣  
度安重參傷日不前十似三大抱脈定痺和傷也二  
處矣而塩相云能藥服有日補此弦悅骨隨此三七  
方以頭並似諸支一兼微云湯證緩愜疾此心頭十  
此眩兼奏証持二牛熟服料虛微多此脾凡也眩三  
不感廟志脈日黃火之亦極弱忘腎凡也五暈次見  
能應數退亦大清便有有生恐真凡也六身此  
久因數只弱煩心拘效平凡非排也六身此

昏不知人口眼唱斜半身不遂咽

蘇力畫覺於吐之腹中年極骨身口行行仿右  
飲云日肚春大覺之室許心疼體中則得去吹  
八服與門此有得則塞匠驚有不冷口數右  
脈藥俞如是紅面奈問者志時仁氣冷步温  
黃之山火可裏上煇絕按喜悲不不頭則服  
連後人雖治急與躁投熱不傷能相目口無  
四覺降馮之後腹心冷藥定夢行統眩苦時  
一鼻氣六疾重中驚藥則恍吳步有暈宿四  
而中湯次未永甚而則面恹前多夫足鼻冷七  
許熱八却供僕如跳馮翥多支足鼻冷七  
越心服不藥誇火一又然忘相不中則十  
三煇次多問之燁醫一而却隨隨熱透日  
日問日僕忽大心者醫熱能則不面心內說  
云絕診一然脈應以者氣食上能赤冷三話  
服蒿之時吐強驚雙以滿如氣倪翥痛次氣  
茶喋脈識馮緩欲和十胎此奄仰然每經短  
之與差證馮喜吐湯全中僅然冷而行行足  
後參有未後見不服湯咽一而痺熱則遇

防風 白茯苓

杏仁 麻黃

去殼炒皮尖

甘草 獨活

各二

右吹咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至

喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉伏或指下浮盛並宜服之並治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神效

生南星 一兩 生烏頭 去皮 生附子 各半兩

木香 一分

右吹咀每服半兩水二大錢生薑十片煎至六分去滓溫服或口噤不省人事者用北細辛皂角各少許為細末或只用半夏為細末用少許以蘆管吹入鼻中俟噴嚏其人少甦然後進藥如氣盛人只用南星五錢重木香一錢加生薑十四片煎作兩服飲之名星香飲

**參蘇飲**

治痰飲停積胸中中脘閉塞嘔吐痰涎眩

暈嘈煩恹悒歲逆及痰氣中人停留關節手足痺曳口眼喎斜半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒

人參 紫蘇葉 半夏

茯苓 乾葛 前胡 各三

甘草 木香 陳皮

枳殼 製 苦梗 各半

右吹咀每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分去滓空心溫服腹痛加芍藥

**木香養氣散** 治左癱右瘓并素有風濕諸藥不效常

服調氣進食寬中 蘇沈良方言之甚詳

羌活 鹿茸 去節 各 防風 三分

白朮

陳皮

黑附子

炮

南木香

檀榔

牛膝

大川烏

草豆蔻

杏仁

去尖炒

人參

白茯苓

川芎

當歸

甘草

桂心

各半

右吹咀每服四錢重水一大盞半生薑五片煎

至八分去滓執服大便不通加大黃心腹脹加

苦葶藶滑石膈上壅滯咳嗽氣促加半夏川升

麻天門冬知母不繆首人年六十五六已忽然中凡

瘧疾瘧疾又次享十年之壽先投參蘇飲六服先寬氣下

附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不

附子理中湯

治五臟中寒口噤四肢強直失音不

詔昔有武士守邊方雪出帳外觀瞻忽然暈倒時

林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂醒

大附子

人參

乾薑

甘草

白朮

右細剉每服四錢重水一盞半煎七分去滓不

以時候服口噤幹閉灌之開度已未年七月間

氏病氣弱倦怠四肢厥冷裕齊馬觀文夫月間

一醫作伏暑治之投暑藥一惡醫作虛汗不進飲食

齊問日無効召僕診之六脈弦弱而兩關差甚裕

而非獨甚此何証也僕若日脈觀之六部既強弱

有四肢痛吐瀉脾是証胃虛冷無吐瀉之疑者答曰未見

加減小續命湯

治卒暴中風不省人事漸覺半身

不遂口眼喎斜手足戰掉言語蹇澁肢體麻痺神  
情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸  
骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚  
氣緩弱久服得差久病風人每遇天色陰晦節候  
變更宜預服之以防瘧症  
麻黃節去根 防己  
黃芩 桂心 人參去蘆  
白芍藥 川芎 杏仁兩各一  
附子兩地手 防風一兩  
右吹咀每服五錢水一瓊半薑七片粳西箇煎  
至七分去滓不以時候服取汗隨人虛實與所  
中輕重有人脚弱服此六七劑得瘥精神悅

惚加茯神遠志 骨節煩痛有熱者去附子倍  
芍藥心煩多驚者加犀角半兩骨間冷痛者倍  
用桂附子嘔逆腹脹者倍人參加半夏一兩  
蹕問大便澁者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎  
服臟寒下利者去防己黃芩倍附子一兩加  
白朮一兩古芍錄驗有 救急無芍藥杏仁止  
十味 延年無防風達失云 便利產後失血并  
老人小兒用麻黃桂心甘草各二兩 一法治  
或歌哭或笑語無所不及用麻黃三兩人參桂  
枝白朮各二兩無附子防風生薑有當歸一兩  
自汗者去麻黃杏仁加白朮 脚弱加牛膝石  
斛各一兩 身疼痛加秦艽一兩 腰疼加批

小風引湯

仁杜仲各半兩  
加黃芩三兩  
加附子一兩  
加當歸一兩  
加杏仁一兩  
加麻黃一兩

防風

川芎

人參

白芍藥

白其草

右吹咀

每服三錢

水行盞薑三片

杏仁五箇去

皮尖搥碎同煎

至七分去滓

濕服

如加麻黃

從蓉附子當歸

羊角六味等

方即

右風引湯

千金竹瀝湯

太治熱即生風

生薑汁

生薑汁

生薑汁

生薑汁

生薑汁

生薑汁

必效竹瀝湯

右三味相和溫服方三服朝晡夜各一服

必效竹瀝湯

治中風涎潮謔語昏塞四肢緩縱

秦艽

附子

錢

右吹咀

以水四錢

煎至二盞

入生地黃汁

淡竹

瀝各半盞

再煎四

五沸去滓

分作四服

燒竹瀝法

新竹截尺許長去節作兩邊用兩磚對立相去

八下置竹仰在磚上急著火焰燒之磚外兩頭

以扼盛瀝瀝尽以絹漉清夏秋復沉冷水中以

之多有神效

防滯酸凡大熱有風人亦可單服冷暖隨人勿  
過度荆瀝亦然

婦人中風角弓反張口噤方論第二

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經

也人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之

經則腰背反折掌急如角弓之狀宜用小續命湯

前方見

治人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體

強直口噤背反張作瘛治之屬太陽經先因傷風

又感寒濕而致然也古人謂之瘛病外證完熱惡

寒與傷寒相似但其脈沉遲強細而項背反張強

硬如發瘡之狀此為異耳新產血虛多有此證當察

有汗無汗以分剛柔二瘛無汗惡寒名剛瘛有陽

瘛屬剛瘛陰瘛屬柔瘛無汗葛根湯主之有汗

桂枝加葛根湯主之凡剛柔二瘛小續命湯並可

與之有汗者去麻黃加葛根若審知剛瘛者胸滿

口噤其人卧不著席脚掌急咬齒當行大承氣湯

注云外臺云熱而瘛者死也附本散 桂心白

朮湯 附子 防風散 八物白朮散 桂枝黃散

可選而用之解感論云合面而卧為陰瘛仰目者

也瘛

**葛根湯** 治剛瘛無汗惡風產後有疾凡用

葛根 一兩 麻黃 節去根 薑錢 各三

桂枝 粉草 芍藥 各兩



大枣 三介

右吹咀每服三钱水一钱煎七分去滓温服取汗为度

**桂枝加葛根汤** 治柔痉有汗不恶寒

桂枝 芍药 甘草 各六钱

乾葛 三钱 生薑 一两 大枣 四枚

右吹咀每服三钱水一钱煎七分去滓温服取汗为度

**大承气汤** 用此药故不效

**附本散** 治伤寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止项

强直摇头口噤

附子 白朮 川芎 各三钱

肉桂 一钱

独活 半两

右为细末每服三钱枣二箇水一中盏煎至一

半温服

**桂心白朮汤** 治伤寒阴痉手足厥冷筋脉拘急汗

出不止

白朮 桂心 附子 炮一

防风 川芎 甘草 各半

右吹咀每服五钱水二盏薑四片枣三枚煎入

分去滓温服

**附子防风散** 治伤寒阴痉闭目合面手足厥逆筋

脉拘急汗出不止

柴胡 半两 五味子 白朮 各一两

茯苓

甘草

乾薑

附子 炮

防風 各三

桂心 半兩

右為粗末每服三錢薑四片水一盞煎七分去滓

八物白朮散

治傷寒陰症三日不差手足厥冷筋脈拘急無汗惡陰氣內傷

白朮

麻黃 去根

茯苓

五味子

羌活 各半

附子 炮

桂心

良薑

右為粗末每服四錢水一盞薑四片煎七分去滓

洋溫散

凡用麻葛且對散一箇水一盞煎七分去滓

白僵蠶散

治婦人中風角弓反張口噤不能言皮

層頑痺筋脈抽掣

僵蠶

蛇肉

天麻

獨活

南星 炮

川烏 炮

防風

蟬蛻 洗

白附子 炮

犀角屑

朱砂 研

桑螵蛸

麝香

研一分

右為細末每服一錢溫酒調下無時候

烏蛇圓

治婦人中風牙關緊急手足頑麻心膈痰涎壅滯

涎壅滯

烏蛇肉

天麻

白附子 炮

南星 炮

獨活

烏犀屑

僵蠶 炒

全蝎 炒

半夏 麩

麻黃去根

當歸

晚蠶沙各半

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓溫酒吞下可治角弓反張

婦人中風口噤方論第三

夫婦人中風口噤者是體虛受風風入領頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頰頰足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛入其筋則筋寧故引牙關急而口噤也

**天南星散**治婦人中風口噤四肢拘急

天南星薑汁炒 白附子炮 黑附子炮

烏蛇肉酒炙

右為細末每服半錢以生薑汁溫酒調下無時

拗開口灌

走馬散治婦人中風口噤四肢攣直

黑附子

天麻右半 桂心

石膏

麻黃去根 蝎梢炒

川烏炮去尖

南星炮各一分 麝香研半

右為細末入研藥令停每服一字無時豆淋酒調灌

**烏蛇散**治婦人中風口噤

烏蛇肉炙

全蝎炒

天麻

南星炮

僵蠶各半

膩粉半

右為細末入膩粉令停每服一字以生薑酒調灌下

婦人中風不語方論第四

巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉  
係古本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉  
嚙者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲  
之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無  
音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語經云醉  
卧當風使人發瘡

神仙解語丹

治心脾經受風言語蹇澀舌強不轉

涎唾溢盛及瘴淫邪搏陰神內鬱閉塞心脉閉滯暴

不能言

白附子地

石菖蒲去毛

遠志

水去心十沸

天麻

全蝎

酒炒

汁

酒調下無時

三威是羌活

白殭

南星

生膽曬如  
無弓炮各

對熱酒一

木香

半兩

細末煮麩糊為丸如梧桐子大量入辰砂

每服二十圓至三十圓生薄荷湯吞下無

時候

防風湯

治中風內虛脚弱語蹇

石斛酒炒

乾地黄

杜仲去皮切

丹參各一分

防風

川芎

麥門冬之

桂心

川獨活炙

右以咀每服五錢水盪半棗二枚煎至八分去

滓溫服

竹瀝湯

治中風入肝脾經年四肢不遂古強語蹇

藏靈仙

附子

苦梗

蔓荆子

防風

枳殼

川芎

當歸

芍藥

羌活

右吹咀每服四錢水一盞竹瀝半盞薑三片煎

至八分溫服日四服忌茶

婦人風痺手足不隨方論第五

夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者

為風痺其狀肌層疼痛諸陽之經皆起於手足而

循行於身體風寒之氣客於肌層始為痺復傷陽

經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩

使機閉死縱故風痺而後手足不隨也

**三痺湯** 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆

療

川續斷

杜仲

薑汁切

防風

桂心

華陰

細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草

秦艽

生地黄

川芎

川獨活

黃耆

川牛膝

兩各一

右吹咀為末每服五錢水二盞薑三片棗一枚

煎至一盞去滓熱服無時候但腹稍空服有人

病左臂不隨後已痊平而手指不便無力試諸

藥不驗服此藥終半即安

**三五七散**

亦妙

方見

復錄

婦人中風自汗方論第六

尋古治中風方續命排風越婢等悉能除去而于  
金多用麻黃令人不得瀉虛凡以風邪不得汗則  
不能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者  
更用麻黃則津液轉便脫泄反為大害中風自汗  
仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼潤動遍  
身汗出者豈勝對治當此之時獨治湯續命煮散  
復榮衛却風邪不可闕也

**獨治湯**治風虛昏憤不自覺知手足素縱坐卧不  
能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤  
宜服之

川獨治  
羌活  
人參

防風  
不當歸  
北細辛

茯苓  
桂心

白微  
遠志  
菖蒲

川芎  
甘草

右吹咀每服五錢水盪半盞五片煎七分去滓  
無時温服

**續命煮散**治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼

潤動或時搐弱亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛  
去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風  
獨治  
當歸

人參  
細辛  
葛根

芍藥  
川芎  
甘草

熟地黃

半夏

遠志

去心

荆芥穗

略

桂心

半

錢

右以咀每服五錢水一盞生薑三大片煎至七

分去滓溫服不拘時汗多不止者加牡蛎粉一

分半

婦人臂痛方論第七

論曰夫婦人臂痛筋脈攣急不得屈伸遇寒則劇

由肝虛為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋

筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服栝子仁湯

經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由

中脫伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬

於脾胃氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脈沉細

宜從卷圓控涎丹

栝子仁

栝子仁

枳實

附子

酸棗仁

黃耆

十圓

舒經湯

片子薑黃

白朮

乾地黃

覆盆子

石斛

桂心

黃耆

右為細末煉蜜為丸如梧栝子大空心酒下三

十圓

治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

其草

海相皮

當歸

羌活

赤芍藥兩各二

右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓  
溫服如腰以下疾空心服腰以上疾食後服

**茯苓圓**

茯苓一兩半夏二兩枳殼見製

風化朴消一方

右四味為末薑汁煮糊為圓如梧桐子大生薑  
湯下二十圓食後服

**控涎丹**

凡人忽患背脊手足頸項腰膝隱痛不可  
忍連筋骨牽隱釣痛坐臥不寧時時走易不定俗  
醫不曉謂之走疰便用風藥及針灸皆無益又疑  
是風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰

涎伏在心膈上下變為此疾或令人頭痛不可舉  
或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉  
中如鉅聲多流眩涎手脚重脰冷痺氣脈不通誤  
認為癰瘰亦非也凡有此疾但以此藥不過數服  
其疾如失

甘遂去心 大戟去皮 真白芥子各等分炒

右為細末糊圓如梧桐子大臨臥淡薑湯吞下  
五七圓如痰猛加至十圓

**白芥子散**

治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止  
此由榮衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏  
其痛發則有似癰瘰

真白芥子 水蠶子各二兩



送藥別研

桂心

木香兩各半

右為細末入研藥令停每服一錢溫酒調下

流氣飲子

紫蘇葉

青皮

苦梗

大黃煨

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

川芎

黃耆

枳殼去穢

防風兩各半

甘草

橘皮各三

木香

皮連大腹

薑二兩判

右吹咀每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎一

盞去滓服

婦人賊風偏枯方論第八

論曰賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也

人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體

名為偏風也其風邪入深真氣去邪氣留發為偏

枯此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於

肌故令偏枯也

論曰夫偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼

痛神智如常名曰偏枯僕原疾之由皆由陰陽偏

虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風衝坐風邪

乘虛而入疾從斯作內經云汗出偏沮使人偏枯

詳其義理如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯

槁然後被風所害人之身體或有一邊血氣不能

榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然王子亭

有云舟行於水人處於風水能注舟而亦能覆舟  
風能養體而亦能害體蓋謂船漏水入體漏風傷  
古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先  
宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損  
茵芋酒續斷湯

**大八風湯**

治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚

當歸

杏仁去皮尖

甘草

桂心

乾薑

五味子

升麻半合

川烏皮炮

黃芩

芍藥

獨活

防風

川芎

麻黃

秦艽

石斛

人參

茯苓

酒去蒸根切

去苗

半斤

石膏

黃耆

紫苑

大豆

皮三兩

右為粗末每服五錢水二盞酒一合煎至一盞

去滓溫服恍惚者不用酒煎

**增損茵芋酒** 治半身不遂肌肉乾燥漸漸細瘦或

時痛疝病各偏枯

痛

茵芋葉

川烏皮炮

石楠葉

防風

川椒汗炒出

女萎

附子炮

北細辛

獨活

卷柏

肉桂

天雄皮炮

秦艽

防己兩各一

躑躅花

當歸

生乾地黃兩各二

芍藥一兩

右以咀酒二斗漬之冬七日夏三日春秋各七  
日初服一合漸增之以知為度令酒氣相續指出

**續斷湯** 治偏枯少血

當歸 三兩 陳皮 芍藥

北細辛 兩各一 生乾地黄 二兩

右為粗末每服五錢水二盞煎至八分去滓温  
服臟寒多利者入熟附子一兩和前藥

偏風口喎方論第九

論曰偏風口喎者是體虛受風風入於夾口之筋  
也是陽明之筋上夾於口其筋偏虛凡因虛而乘  
之使其筋偏急不調故令口喎僻也

**防風湯** 治卒然口喎斜言語卒急四肢如故別無  
所苦

防風 一兩 羌活 甘草 各一方

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入  
麝香研一字温服

治口眼喎斜

用草麻子七粒去皮殼細研作餅安在手心右  
安左手左却用銅蓋乘湯坐於藥上終正即洗  
去用一方用巴豆不

廣濟療風著口面喎斜語聲不轉方

生地黄汁 竹瀝 一升 獨活 兩切三

右相和煎取一升頓服未正更進一劑

**深師續命湯** 療中風口僻喎諸疾卒死不知人補  
虛起死神方

人參 防已 麻黃節去根

芍藥 川芎 甘草

黃芩 白朮各半 桂心

附子炮 防風各一 生薑五兩

右切以水一斛二升煮取三升分為三服不差

復作忌海藻菘菜桃李生菜葱雀肉猪肉

又千金方

炒大豆三升合焦以酒二升淋取汁頓服之

方用大皂莢五兩去皮子為末以三年大醋調

如左嚼塗右右嚼塗左乾更塗

婦人血風心神驚悸論第十

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為

諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心

神虛弱致風邪乘虛于之故驚而悸動不定也其

驚悸不止則憂恍惚而憂懼也非風湯亦可用

**茯神散** 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神去木 人參 龍齒別研

獨活 酸棗仁各一 防風

遠志去心 桂心 細辛

白朮各三 甘草 乾薑各半

右為粗末每服四錢水盞半煎至八分去滓溫

服

**龍齒圓** 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不

龍齒 別研  
茯神 兩各二  
朱砂 研

人參  
當歸  
天麻 各三

犀角屑  
攪擲  
防風

生乾地黃 兩各半  
遠志  
赤箭 各一

麝香

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓薄  
苛温酒下

**朱寶琥珀散** 治婦人血風

琥珀  
沒藥 研  
木香

當歸  
芍藥  
白芷

羌活  
乾地黃  
延胡索

川芎 兩各半  
土瓜根  
牡丹皮 去心

白朮  
桂心 兩各一

右為末每服一錢水一盞煎至七分益酒三分

其再煎少時熱服重者數服切

不痛者 失血過多心神不安方第十

**寧志膏** 治婦人因失血過久心神不安言語失

常不得睡

犀角 兩各一  
酸棗仁 炒  
人參

白茯苓 神木  
琥珀 各一  
滴乳 一錢

右為末和停每服一錢濃煎燈心棗湯空心調

下彈又方 濕菴香琥珀蜜圓如  
子大薄苛湯化下一粒



愚曾治一人心藥治之無效僕言其常循衣直視  
乳香湯送下以三匙飲之立愈正丹又一男子  
亦曾病此證亦用此藥效然養正丹與百一  
方抱膽石無異抱膽石內中無  
硫黃有乳香也自合方見效

婦人飛尸血厥方論第十三

夫飛尸者遊走皮膚穿藏府每發則痛寔作無常  
遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸  
喪聞哀哭便發風尸者溢溢四肢不知痛之所在  
每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇  
每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯  
雜常覺昏廢每節氣至變輒成大惡皆宜用此方

忍冬葉

劉數斛煮之令服如鷄子大日三服

六一神精丹

治中風之要藥治客忤霍亂腹

痛脹滿尸注惡風顛狂鬼詭盡毒妖魅癥瘕積聚  
溫瘧積久百方不差但是一切惡毒無所不治但  
近世少得曾青磁石為難合爾故不錄

蘇合香圓

亦治此疾方見和劑更不贅錄

雄朱散

治因喪驚憂悲哀煩愆感尸氣而成變動

不已似冷似熱風氣觸則發

雄黃

朱砂

苦梗

羌活

當歸

升麻

川烏

訶藹

犀角屑

白朮

芍藥

鬼箭羽

白僵蠶

木香

虎頭骨

紫蘇子

川芎

南星

炒

炒

炮

酥炙

山施子

陳皮

莽草

枳殼去穢

黃芩

麻黃

蜈蚣去頭足

攬椰

全蝎

右為細末每服二錢溫酒調下一日三服

人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人

目閉不能開口噤不能言或微知人思聞人聲但

如眩冒移時方寤此由汗過多血少氣併於血陽

獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還

陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦合血厥婦人

多有之宜服白薇湯倉公散

白薇湯方

白薇

當歸

人參

新編其草一方

右以阻每服三錢水二觥煎至一觥溫服

倉公散

治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便死

不知人及卧履噤脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末九蒂衛生方無瓜

雄黃

礬石

藜蘆末

右為末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活

未嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂莢

者為正

白水散

治中風身體麻痺不仁

白水

芍藥

藁朮

續斷

當歸

虎骨

酥

炙



烏蛇肉右半

右為細末每服二錢匕温酒調下藏寒多利者加附子半兩骨中煩熱者加生地黃一兩

新編婦人大全良方卷之三

新編婦人大全良方卷之四

婦人血風身體骨節疼痛方論第一

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也

芍藥散治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎二兩

酸棗仁炒

木香

赤茯苓

桂心

川牛膝各三分

赤芍藥

當歸

枳殼去核炒

甘草各半兩

羌活

右為麤末每服三錢水一大盞薑三片煎至七

分去滓煎服無時候

**羚羊角散** 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸枣仁炒 生乾地黄

檳榔各一 五加皮 防風

赤芍藥 當歸 骨碎補炒去毛

海桐皮 川芎各三 甘草半兩

右為末每服二錢溫酒調下

**通靈圓** 治男子婦人手足痛風不可忍者

白附子 僵蠶各一兩 全蝎半兩

麝香一字 麝香半兩 血石

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服七圓溫酒下

條絲日三服

**當歸沒藥圓** 療婦人血風血氣腹脇刺痛筋攣骨

痺手足麻木皮膚瘙癢

當歸 五靈脂各一兩 沒藥半兩

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十圓生薑

湯空心下

**大效虎骨散** 治血風走疰疼痛犬支筋骨疾及打

撲傷損疼痛甚者

虎骨酥炙 虎骨酥炙 當歸

桂心 地龍去土 牛膝

漏蘆 歲靈仙 玄胡索

自然銅製

右各等分為末每服二錢熱酒調下每日一服

婦人血風白虎歷節走疰方論第一  
夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚  
卒然掣痛遊走無有常處故名為走疰也加減小  
續命湯主之

**漏蘆散** 治婦人血風走疰疼痛無有常處

漏蘆

當歸

牛膝 各三

桂心

地龍 去土

防風

羌活

白芷

法藥 研

甜瓜子 各半

兩

虎胥骨 酥炙

敗龜 各一兩

醋炙

右為細末每服二錢熱酒調下無時候

**四生圓**

治血風骨節疼痛舉臂不起行履不得

并渾身麻痺

白殭蠶 炒去絲

地龍 去土

白附子 生

五靈脂

草烏 去皮尖

右為末以米糊圓如指相子大每服二十圓茶

酒任下或作末酒調半錢亦可

**麝香圓**

治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲

嚙晝靜夜劇及一切手足不測疼痛

大八角川烏頭 三箇去

皮尖生

生全蝎 二箇

生黑豆 二粒

生地龍 半兩

右為細末入麝香一字同研停糯米糊為圓如

菜豆大每服七圓甚者十圓夜卧令葦空温酒

吞下做出冷汗一身便效凡學士云予得此方

痛一服立效在歙川日有貴家婦人遍身  
走疰一痛至夜則完如虫嚙其肌多作鬼邪治

予日此正歷節  
病也三服効節

**芍藥和母湯**

治諸肢節疼痛身體魁瘰脚腫如脫

頭眩失氣愠愠欲吐 三四方

桂心

知母

防風

芍藥

甘草

麻黃

附子 炮三兩

去根節各

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分  
去滓空心服一法有白木川芎杏仁半夏

**附子八物湯**

治風歷節四肢疼痛如錐鋸不可忍

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘草

桂心 兩各三

白木 兩

白附子

右吹咀每服四錢水二盞煎七分去滓食前

服一方去桂用乾地黃二兩

**獨活寄生湯**

最治歷節風迹人用之甚效

**小續命湯**

大治白虎歷節痛不可忍

由風濕人先自兩足踝骨甚痛不可忍  
於後漢或如錐鋸或如虫齧痛不可忍  
劇服諸藥無効  
劑而切○非解散之藥不能愈  
而得之不效  
諸尊之台先召僕酒之  
藥服一貼良驗  
自後與人良驗

**婦人血風癩瘡瘰疔方論第三**

局方治婦人時疫遍身瘡痒或赤腫癰疔五心煩  
熱血風攻疰與人參荆芥散消風散四物湯加荆

芥煎或人參當歸散或道遙散兼服導赤圓如不  
退者食後服皂角圓不可服久服如服皂角圓不退  
者此類滯熱甚者宜先服青木香圓三兩服以開  
氣道却服前藥立效

夫婦人體虛為風邪氣客於皮膚後逢風寒相折  
則起風瘙癢癩若赤癩者由涼濕折於肌肌中之  
極熱結成赤癩也得天熱則劇取冷則差白癩者  
由風氣折於肌中肌中熱與風相搏所以為白  
癩也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得暗暖則減  
著衣暖亦差也脈當浮而洪浮即為風洪即為氣  
風氣相搏則為癩癩身體為痒凡人汗出不可露  
卧及浴濕素問云汗出見使人身振寒熱生風癩也

雷公炮炙序云遍體癩風酒調生側  
**何首烏散** 治婦人血風皮膚層癢痒心神煩悶及血  
風遊走不定並宜服之

何首烏 防風 白茯苓  
枳殼 天麻 僵蚕

胡麻 荒蔚子 蔓荊子

右為細末每服二錢煎茵陳湯調下無時候  
**附子酒** 治痛風婦人血風身上瘙痒出張氏方

生附子不去皮重 皂角刺二箇

黑豆一合

右三味細剉分為二處用好酒二瓶入上件藥  
慢火煇候乾至半瓶却合作一處密縛泥頭經

二宿每服一錢溫服無時候未効又服  
治女人風痺癰癩不止 聖惠方

蒼耳花葉子各等分  
右為細末用豆淋酒調下二錢

治癰癩

白蜜多以好酒調下已試有效

治皮膚有風熱遍身生癰癩方世和虞

牛旁子水煮一兩淨 浮萍蒸通焙

右為細末每服二錢薄荷湯調下日二服

治風氣客於皮膚搔之不已方

蟬蛻洗 大葉薄荷

右等分為細末無時溫酒調下方寸匕此一方

又方

露蜂房洗過蜜炙 蛇蛻洗炙

右為細末溫酒調下一錢日二三服

婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四七凡

夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臟腑之

精皆上注於目其血氣與脈并上屬於腦也循脈

引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者

變成癩疾也

養正丹 治虛風頭旋吐涎不已蓋此藥升降陰陽

補接真氣非止頭旋而已

黑鈆 水銀 硫黃 研

朱砂各一兩

右用連珠一隻火上鑄成汁次下水銀用柳

杖子打停取下歇少時入二味打停候冷取下

研為粉以糯米軟飯圓如菜豆大每服三十圓

粳湯吞下空心食前日二服出本車方

**釣藤散** 治肝厥頭暈清頭目

釣藤 陳皮 半夏

麥門冬 去心 以茯苓 茯神

人參 去蘆 甘菊花 防風各半

甘草 一方 石膏 一兩

右吹咀每服四錢水一錢半生薑七片煎至八

分去滓煎服足素問云巨頭陽甚則入腎

目下腹耳者腎下虛也上虛在足少陽厥陰甚則肝虛  
也致肝則頭暈目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭暈腎厥頭  
痛也  
同也

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不

人事者

唱起草取其嫩心不以多少陰乾為末以

常酒服一大錢七無時候其功大効服之多

連腦蓋善通頂門

**蔓荊子散** 治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇澁

痰逆不下飲食

蔓荊子 防風 羌活

川芎 羚羊角屑 枳殼

前胡

石膏

赤茯苓

麻黃去根

荆芥穗各三

北細辛

甘菊花

白芷

藁本

旋覆花

甘草各半

右為粗末每服四錢薑三片水一盞煎七分去滓溫服無時候

四神散 治婦人血風眩暈頭痛 九篇衛生方

荆芥穗各等

菊花

當歸

旋復花

右為細末每服一錢水一錢葱白三寸茶末一錢煎至七分通口服良久去枕仰卧少時

川芎散

治風眩暈 龐安常方

小川芎

山藥

白茯苓

甘菊花不用

人參

山藥蔓肉

右為細末無時候酒調二錢日三服

治女人頭旋即天動地轉名曰心眩非血風也 普見

方齊

膽子礬二兩細研用胡餅劑子一箇拌停放版

子上按平一指厚以篋子勒成如散子大塊不

須界斷於瓦上焙乾每服一散子大為末煎燈

心竹茹湯調下

婦人血風頭痛方論第五 厥逆頭痛附凡

九方

許叔微云婦人患頭風者一居其半每發必掉眩



如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾子嘗處  
此方以授人比他藥效而捷

川芎 一兩

當歸 三

羌活

旋復花

華陰細辛

蔓荊子

防風

石膏

藁本

荆芥穗

半夏麴

乾地黄

甘草 各半

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去  
滓溫服

**七生圓**

治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥  
腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治療  
明

川烏

草烏

南星

三味並

半夏

去滑

川芎

石膏

白芷

並生用

右為細末研韭菜自然汁圓如梧子大每服七  
圓加至十圓嚼生葱茶送下  
僕常破服諸藥無

效加北服二十粒即愈減

**芍藥湯**

治狀如前但發熱者不可服

生附子

生烏頭

南星

乾薑

北細辛

川芎

甘草 三方

右吹咀每服四錢水二盞薑七片茶芽少許煎  
至六分去滓食前溫服中脫素有寒者不用茶

芽

局方如聖餅子如北細辛如半夏數自若服之見效甚速若頭痛筋掣骨重少氣噦噎脹滿時驚不嗜卧欬嗽煩寃其脈浮之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜玉

玉真圓方

石膏 煨研

半夏

洗為末 硫黃 二兩

硝石 二分

右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生

薑湯下三十圓方無半夏

硫黃圓

治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不

治服此除根

硝石 一兩

硫黃 二兩

右研令極細滴水圓如指頭大空心蠟茶清吞

下百一方云中暑者以水水服之下咽即洒然

治傷冷以艾湯下

若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右

白附子散方

麻黃 根不去

烏頭 炮去

南星 炮

白附子 炮

全蝎 炮

辰砂 方研

麝香

錢所一

白薑

方炮

右為細末酒調一字服訖去枕卧少時

裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中秘方用生蘆

根汁蘿蔔一規殼仰卧注鼻中左痛注左右痛注

右或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈東坡

云荆公與僕言已愈數人此方自後晁持仕

云是有効

治頭風痛不可忍者

硝石

人中白

腦子

等方

右研令極細用一字插入鼻中

項筋強痛方論第六

此一卷論項筋拘攣強痛每得斯疾療之似易而

實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦略以

僕考之然既有斯疾必有是方何古人言此疾證

尚且略又無的然之論詳之必是挾諸疾而生所

以絕無專門子因暇日撫古各方以備檢閱然

明學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺僅能

補而完之不亦宜乎咸淳元年上元日藥隱老人

書于存心堂

夫項項之處乃屬且右陽膀胱之經又許太學云

是呈少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏故也以感

外邪論之則有大陽經先因感風又感寒濕致令

外證發熱惡寒與傷寒相似項強急腰身反張

如中風狀痰癱口噤其身體凡凡古人以強直為

症其脈沉遲弦細新產血虛多汗出喜中風亦有  
此證已上並載第三卷第二論中言之甚詳不復  
贅錄 又有挫轉項不得者與三五七散方見  
追風散仍與急風散搽項上 若因被風吹頭目  
昏眩太陽并腦俱痛項背筋脈拘急可與蝎附散  
都梁圓 許太學治項筋強痛不可轉側者以木  
瓜煎

**追風散** 治年深日近偏正頭疼又治肝藏久虛血  
氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱  
百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙  
痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血  
風攻症頭目昏痛皆治之

川烏炮去皮 防風去蘆 石膏煨

川芎 其草多 荆芥穗

白殭蠶炒去絲 天南星炮 羌活

天麻 地龍 白附子炮

全蝎去尾 白芷各半 草烏炮去皮

沒藥研 乳香研 雄黃研

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及  
臨臥服常服清頭目利咽鼻消風化痰

**急風散方**

草烏頭三兩 生里豆一分 麝香一分  
內三兩 蒸一分 為末 餘一分 性於 酥用  
丹砂研一兩

右為細末研令停酒調塗痛處

**蝎附散**

治一切風邪頭痛夾腦風氣痰涎壅盛嘔

逆惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急

口眼喎邪面目睜動頭項拘急肩背引疼耳痒目

昏四肢麻木及沐頭浴出暴感風邪頭目昏痛兩

大陽穴疼遠年頭風經隔歲月乍差乍發服藥無

効者並皆治之

附子炮去皮

川烏炮去皮

麻黃去節

雄黃

南星

防風各三錢

白芷

朱砂

全蝎各錢

藁本各半

右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不

京城之醫用此藥魚嚼如聖餅子治眼生眵糞  
不明羞明多淚見物不明有效

**都梁圓方**

香白芷澤大塊 白芷新潔者 先以涼 刷去 煉

蜜圓如彈子大每服一圓多用荆芥點蝎茶

細嚼下食后常服只乾嚼下亦可都無巧忌

此藥大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風

邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡

浴沐後服一二粒尤佳暴寒乍暖神思不清

傷寒頭目昏暈並宜服之

**木瓜煎方**

宜木瓜二箇取沒藥研二兩乳香研一方

右二味內木瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上

蒸三四次爛研成膏子每服三匙生地黃汁半

盡無灰上醞二盞和之用八分盞熱暖化膏子

服必有人患此病自午後二時黃昏時定子此是

少陰之筋自足至頭大抵筋者有筋也日中下

也自離氣至絕而肝氣弱肝腎二藏陰氣傷於

至腎氣絕而肝氣弱肝腎二藏陰氣傷於

是時予施此而肝氣弱肝腎二藏陰氣傷於

方三服而愈

婦人腰痛方論第七

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛弱外

感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說

如風腰痛宜小續命湯加批仁杜仲並服脾胃氣

散及寒濕腰痛宜五積散加批仁如虛損及五種

腰痛者青娥圓神應圓見諸方並皆可用也如氣滯

腰痛如神保圓里牽牛苗香橘核必有功也

如神湯治男子婦人腰痛陳總領方

延胡索當歸桂心等方一方無

右為末溫酒調下二錢甚者不過數服

醫方得之於歙川研門老

獨活寄生湯夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷湿地

當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩

弱疾重或腰痛拘攣脚重痺宜急服之

獨活三兩桑寄生續斷

杜仲北細辛川牛膝

秦艽 茯苓 白芍藥

桂心 川芎 防風

人參 熟地黃 當歸

右吹咀每服三錢水一錢煎至七分去滓溫服

空心氣虛下利除地黃并治新產腰痛不得轉

動及腰脚痠痛痺弱不得屈伸此藥最能除風

消血肘後有附子一枚無寄生人參當歸抄草

近人將治歷節風脚氣流注亦效

婦人腰脚疼痛方論第八

夫腎主於腰脚女人腎藏繫於胞絡若勞傷腎氣

虛弱而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰

脚疼痛也

酸棗仁散

治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏問

食少無力

酸棗仁 炒 川牛膝 當歸 各三

分 桂心 海桐皮 草薢

續斷 附子 炮 草薢

右吹咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去

滓溫服

骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急

肢節不持

骨碎補 炒 草薢 川牛膝

草薢 川牛膝

骨碎補 炒

草薢

川牛膝

桃仁

桂心

附子

海桐皮

擲榔

川芎

當歸

赤芍藥

枳殼

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎至七分去滓食前熱服

婦人脚氣方論第九

凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加水瓜擲榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痒或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑也或手足轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胃滿氣急或遍體酸痛

皆脚氣候有身之一字黃帝所謂緩風濕痺是也頑

弱名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續

命湯主之自然成汁最速暑中三陰所患必熱小續

命湯去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良

若無紫雪以自合薄荷煎冷水調服極妙大便秘

者脾約圓麻仁圓三和散主之方並見中仍針灸

為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也

聖惠方婦人脚氣論

夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風

濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡

屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於

十是皆指若臟腑虛損則風邪先客於脚從下而上



動於氣故名脚氣也此皆由體虛或當風取涼或  
又坐卑濕或產後勞損或悲怒傷肝心氣滯致令  
月候不通因其虛傷風毒搏於肌骨則令皮膚不  
仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘攣或即冷疼或即  
腫滿或兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食即  
嘔精神昏憤肢節類疾小便赤黃大便秘澀並皆  
其證也其婦人脚氣治之與丈夫不同者以其氣  
血不調懷胎難產崩傷之異是以褚澄療寡婦師  
尼與妻妾殊別即其義也凡婦人有脚氣  
疾者必無生育

**牛膝散** 治脚氣浮腫心神煩悶月候不通

川牛膝 麩羊角 攪擲  
芒硝 兩

桂心 丹皮 赤芍藥 益母

其草 批仁 粒

右為粗末每服三大錢水一椀煎至七分去滓  
溫服利下惡物為度亦要相其強弱用之

**大腹皮散** 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹皮 桑白皮 荆芥  
亦芍藥 獨活 枳殼 本氏

右以咀每服四錢水一椀薑五片葱白七寸煎  
至七分去滓空心溫服

**半夏散** 治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔

逆不止

半夏 陳皮 人參

大腹皮 桂心 攪椰

赤茯苓 紫蘇 各兩

右吹咀每服四錢水一瓊半薑三片煎七分去

滓溫脈

**犀角散** 治婦人脚氣忽發衝心悶亂四肢煩疼有

熱者

犀角屑 木香 各半

赤茯苓 攪椰 各一

紅花 各三

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

**亦香散** 治婦人脚氣卒發衝心悶亂

木香 半兩 郁李仁 赤芍藥

大腹皮 紫膏 各一

桂心 攪椰 各一

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去

滓溫服

治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此藥一盞煎

紫蘇 乾節 各二

攪椰 乾木瓜 各一

右吹咀每服四錢水一盞煎至一半入童子小

便二合再煎三沸溫服

**紫蘇散** 治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲

食脚重虚腫

紫蘇葉

木通

桑白皮

苗香根

枳殼

羌活

獨活

荆芥穗

木瓜

青皮

甘草

大腹子

右吹咀每服三錢水一盞薑三片葱白一莖煎

至七分去滓温服

桑白皮散

治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀

腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮

郁李仁

赤茯苓

木香

防己

木腹皮

木香紫蘇子

木通

檳榔

青皮

各三分

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去

滓温服

薑苳仁散

治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急

大便澀

薑苳仁

防風

猪苓

川芎

防己

檳榔

郁李仁

大麻仁

桑白皮

枳實

甘草

羚羊角屑

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓放温

服

四白散

治男子婦人血虛羸熱夜多盜汗不進飲

食由肢羸瘦骨立拘攣脚痛不能行

黃耆

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮

半夏

白茯苓

人參

白芷

天台烏藥

甘草

京南芍藥

檀香

沉香

白朮

右為細末

每服三錢

水一盞薑三片

煎至七分溫服

自後諸證退只有脚掌痛不能行以蒼朮圓治之

效此藥太治乾濕脚氣筋脈拘攣疼痛不能行履

並補下部

蒼朮圓方

乳香

青鹽

全蝎

沒藥

川牛膝

右除研藥為細末入研藥令停以木瓜一箇大者切一頭留作蓋去穢入上件藥於木瓜內將

連藥研成膏却入生蒼朮末拌令得所圓如梧

酒亦得一日三服忌血與蒜

其亦體酒亦得一日三服忌血與蒜

散服之効和諸方並見  
大便秘者可與七宣圓神功圓七聖擯擲圓三和  
對證之處蒼木四白散子與服不能半劑

新編婦人大全良方卷之四

新編婦人大全良方卷之四



