

醫方類聚卷之四十七

傷寒門二十

聖惠方二

治傷寒七日候諸方

夫傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病終故也今七日已後病反甚者欲爲再經病也再經病者是經絡重受病也

治傷寒七日不解頭痛有熱在裏大腸祕澀與承氣湯後其小便清者病不在裏屬在表

也當須發汗若頭痛者必衄宜服桂枝湯方
桂枝兩一赤芍藥兩一甘草一兩炙麻黃一兩
節芎藭兩一柴胡一兩厚朴二兩生薑汁炙令香
熟

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一大
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不
計時候熱服衣覆取微汗如人行十里未
汗再服

治傷寒七日脉浮發熱無汗渴欲飲水無表

證宜服知母散方

知母兩一石膏兩二甘草半兩炙粳米半合人參
半兩去葛根半兩

右件藥都剉以水三大盞半煎至二盞去
滓不計時候分溫五服

治傷寒七日發熱汗出不解心中痞堅宜服

前胡湯方

前胡二兩去蘆頭赤茯苓二兩白朮二兩川大黃一兩
剉碎微炒赤芍藥兩一枳實一兩麩木通一兩半

夏一兩湯洗甘草二兩炙厚朴二兩去麄皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒七日大下後脉沉遲手足厥逆喉咽不利胃膈煩躁宜服麻黃散方

麻黃二兩去根節當歸一兩剉川升麻一兩知母一兩赤芍藥一兩天門冬一兩去心桂心一兩赤茯苓一兩

甘草一兩炙石膏二兩白朮一兩乾薑一兩炮裂

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒七日不解心煩腸中有結燥譫語宜服柴胡散方

柴胡二兩去苗半夏一兩湯洗赤芍藥一兩甘草半兩炙知母一兩黃芩一兩川大黃二兩剉陳

橘皮一兩湯浸去白 人參一兩去蘆頭

右件藥搗罌羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫溫頻服稍利為度

治傷寒八日候諸方

夫傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣不盡所以病證猶在也

治傷寒八日熱勢珍重大便結澀心服痞滿

方 食飲不下精神恍惚譫言妄語宜服鼈甲散

鼈甲一兩塗醋炙令微黃去裙襴 細辛一兩 吳茱萸三分易浸

七龜 白鮮皮一兩 附子三分炮裂 枳殼一兩

乾微炒 茵陳一兩 川大黃 碎微炒 桂心三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服微利為度

治傷寒八日煩熱不退四肢疼痛宜服犀角

散方

犀角屑一兩 川升麻一兩 柴胡一兩 葛根半

一兩 吳藍一兩 甘草一兩 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓次入馬牙消二錢更煎三

二沸不計時候溫服

又方柴胡一兩 黃芩一兩 犀角屑三分 茯神三分

參一兩 甘草半兩 微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至七分去滓下朴消二錢更煎三二沸
不計時候分溫二服

治傷寒入口不解默默煩悶腹中乾燥大腸
結澀狂言宜服柴胡散方

柴胡一兩 赤芍藥半兩 知母半兩 人參一兩 去

川大黃一兩 甘草半兩 半夏半兩 洗七徧

去葳蕤半兩 黃芩半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服以微利為度

治傷寒八日風濕相搏身痛心煩不能自轉
側不嘔不渴下之脈浮者宜服附子湯方

附子一兩炮裂去皮臍 桂心一兩 白朮一兩 白芷一兩 甘

草一兩炙 葛根一兩 人參一兩 蘆頭一兩 去 陳橘皮一兩

湯浸去白瓢焙

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞
入生薑半分棗三枚煎至七分去滓不計
時候分溫二服

治傷寒九日已上候諸方

夫傷寒九日已上病不除者或初一經受病
即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰
致停滯累日病證不罷或三陰巢氏病源傳
病已畢又重感於寒名為兩感傷寒則腑藏
俱病故日數多而病候改變也

治傷寒九日不解心腹堅滿身體疼痛內外
有熱煩嘔不安宜服前胡湯方

前胡一兩 去 蘆頭一兩 半夏一兩 湯洗七 白朮一兩 枳實一兩

一兩麩 赤芍藥一兩 黃芩一兩 甘草半兩炙厚
炒微黃 朴一兩去麤皮塗生 薑汁炙令香熟

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不
計時候溫服

治傷寒病已九日曾經發汗吐下未解三臆
牛熱其脉滑數昏憤沉重欲入百合狀證宜
服石膏湯方

石膏三兩 黃連一兩去鬚 黃蘗一兩 黃芩一兩 豉二兩
兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩

子人兩 麻黃一兩去根節 川大黃二兩剉 甘草
一兩炙 微赤

右件藥細剉和勻每服半兩以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服如人行十里再服以微利為度
治傷寒九日下之後胃膈煩滿小便不利譫
語一身不可轉側宜服赤茯苓湯方

赤茯苓二兩 柴胡二兩 黃芩一兩 龍骨二兩 川大
黃三兩剉 人參一兩去蘆頭 牡蠣一兩燒 桂心
碎微炒

一兩陳橘皮去白兩湯浸半夏一兩湯洗甘草一兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒九日心肺熱氣急喉中有膿血宜服犀角散方

犀角屑一兩柴胡一兩青竹茹一兩桔梗半兩蘆川一兩大黃一兩碎微炒麥門冬一兩去心

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下芒消末一錢攪令勻不計時候溫服

治傷寒九日心中滿悶腹脹喘急宜服檳榔散方

檳榔半兩訶藜勒皮半兩陳橘皮半兩湯浸甘草半兩炙桑根白皮三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分葱白一莖煎至五分去滓不

計時候溫服

治傷寒九日不解往來寒熱狀如溫瘧胃膈滿悶時有痰逆不止半夏散方

半夏二兩湯洗葛根二兩白朮一兩人參一兩

去蘆柴胡二兩陳橘皮一兩湯浸厚朴一兩

去蘆皮塗生薑黃芩兩甘草一兩炙

汁炙令香熟右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞入棗三枚生薑半分煎至六分去滓不

計時候溫服

治傷寒九日不解胃膈滿逆日晚即潮熱此由失下內實故也宜服芒消散方

川芒消二兩前胡一兩蘆頭去枇杷葉半兩拭去

葛根一兩川大黃二兩剉半夏一兩湯洗

剉右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞入棗三枚生薑半分煎至六分去滓不

計時候溫服以利為度

治傷寒發汗通用經效諸方

治傷寒解表利四肢和胃氣人參散方

人參二兩去蘆頭 桂心二兩 陳橘皮二兩去白 厚

朴二兩去麤皮塗生 乾薑二兩炮裂 赤茯苓

二兩 杏人二兩湯浸去皮尖 白朮二兩 甘草二兩

炙微根節 麻黃四兩去根節

右件藥搗篩為散每服四錢以水一申盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候熱服

治傷寒頭痛壯熱心胃躁悶不得汗者宜服
通神散方

麻黃根節 厚朴一兩去麤皮塗生 桂心

半兩 川大黃一兩到碎微炒 附子一兩炮裂 甘草半兩

炙微赤到 白朮半兩 人參半兩去盧頭 五味子半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以新

汲水調下三錢良久以熱水漱口三五度

後喫熱薑茶一盞衣蓋出汗

治傷寒解肌拯聖散方

麻黃二兩去根節 甘草一兩炙 桂心一兩 附子一兩

炮裂去皮臍 白朮半兩 五味子半兩 陳橘皮半兩湯浸去白

瓢 焙

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服汗出為度

治傷寒頭痛項強壯熱增寒四肢不利宜服此方

附子半兩炮裂去皮臍 羌活半兩 桂心一兩 防風三分
頭 吳茱萸半兩湯浸七微炒 桔梗三分 法當歸三分
五加皮二分 乾薑半兩炮裂到 甘草半兩

赤 劉

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

治傷寒徧身壯熱頭痛腰疼肢節不利宜服通關散方

吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒 羌活 附子炮裂去皮臍 芎藭 五加皮 桂心 防風去蘆頭 麻黃去根
節 旋復花 甘草炙微赤到已

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中

蒸入生薑半分薄荷七葉煎至六分去滓
不計時候稍熱服汗出為度

治傷寒頭痛壯熱鼻塞惡風宜服此方

羌活一兩 五加皮一兩 桂心一兩 乾薑半兩 炮海

桐皮一兩 青橘皮一兩 湯浸麻黃二兩 去

甘草一兩 炙附子一兩 炮裂吳茱萸半兩 湯浸

七遍焙 乾微炒

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候熱服

治傷寒頭目四肢疼痛正氣散方

麻黃三兩 去根節 桂心二兩 甘草一兩 炙乾薑一兩

炮裂川大黃二兩 碎微炒 青橘皮一兩 湯浸吳

茱萸一兩 湯浸七厚朴二兩 去蘆皮塗生

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候熱服

治傷寒頭痛身熱四肢不利宜服解表附子

散方

附子

一兩炮裂去皮臍

乾薑

一分炮裂剉

麻黃

半兩去根節

桂心

半兩

芎藭

半兩

烏頭

半兩炮裂去皮臍

右件藥擣細羅為散每服一錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去薑和滓不計

時候熱服良久更以熱酒調下一錢當便

汗出

治傷寒陰陽二毒出汗敗毒丸方

乾蠍

半兩微炒

麻黃

一兩去根節

躑躅花

一分

芫花

一分

醋拌炒 朱砂一分 細研

右件藥擣羅為末以水研豉心和凡如梧

桐子大陽毒煎薑豉湯下七九陰毒熱水

下七九不用衣覆汗當自出

治傷寒表裏不解宜服三神丸方

附子

半兩燒令半黑

芫花

一兩醋拌炒令黃

皂莢

一兩不去

皮炙焦黃去子

右件藥擣羅為末以豆豉心宿用湯浸至

來且研絞取細稀者用和藥末丸如梧桐

子大每服不計時候以粥飲下十九服藥後或吐或汗或瀉若得一般當便為效

治傷寒發汗極效方

蒼木四兩削去皮 甘草二兩 猪牙皂莢四挺 麻黃二兩 去根節

右件藥生用擣細羅為散每服一錢水一中盞煎三兩沸不計時候和滓溫服蓋覆令汗出立效

治傷寒發汗神驗白散方

白附子半兩 附子半兩去皮臍 半夏一分 乾薑一分 天

南星一分 皂莢子人

右件藥皆生用搗細羅為散每服一錢入生薑半分以水一中盞煎至六分不計時候和滓熱服當有汗出便差

治傷寒發汗方

附子一兩炮裂去皮臍末 太陰玄精一兩細研 硫黃半兩細研

馬牙消半兩細研

右件藥研令勻每服不計時候以生薑熟

酒調下一錢良久以稀葱粥投之通身有汗

治傷寒發汗浮萍草散方

浮萍草一兩四月十五日者麻黃半兩去根節桂心半兩附

子半兩炮裂去其脂

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出立效

治傷寒中風諸方

夫傷寒中風之候湯浮熱自發陰弱汗自出

瀉瀉惡寒巢氏病源此下有折折惡風四字翕翕發熱鼻鳴

乾嘔此其候也太陽中風以火劫發其汗風

被火熱血氣流溢巢源流溢失常兩陽相熏灼其身

發黃陽盛即欲衄虛則小便難陰陽俱虛竭

身體枯燥但頭汗出巢源此下有齊頤而還四字腹滿微

喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦

手足躁擾循衣摸床小便利者其人可治陽

明中風即口苦咽乾腹滿微喘巢源微熱惡寒而

脉浮緊者可下之巢源下之則腹滿小便難陽明病能食為中風不能食為中寒少陽中風兩耳無聞目赤胃中滿而煩不可吐止之則悸而驚太陰中風四肢煩疼其脉陽微陰澀而長為欲愈少陰中風其脉陽微陰浮為欲愈厥陰中風其脉微浮為欲愈不浮為未愈也

治傷寒中風頭疼腰膝痛四肢不利壯熱取汗不出喘宜服麻黃湯方
麻黃三兩去根節 桂心一兩 甘草一兩炙 杏仁半兩

湯浸去皮尖雙人送炒微黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫溫頻服之汗出為度

神巧萬全方同

治傷寒中風項背強急漉漉汗不出者宜服葛根湯方

葛根二兩剉 麻黃一兩去根節 甘草半兩炙 赤芍

藥一兩 桂心一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

蒸入生薑半分棗二枚煎至六分去滓溫
溫頻服汗出為度

治傷寒中風發熱頭痛咽乾舌強心胃痞滿
腰背強不得汗宜服葳蕤散方

葳蕤一兩石膏二兩白薇一兩麻黃一兩獨活一兩

甘草一兩木香一兩杏仁一兩皮尖雙人麩一兩

黃炒微

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞煎至六分去滓溫溫頻服之汗出為度

治傷寒中風五六日已上但胃中煩躁乾嘔
誦蕤湯方

誦蕤一兩柴胡三兩黃芩一兩甘草一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓溫
溫頻服

治傷寒中風發熱六七日不解而煩渴欲飲
水而吐逆猪苓散方

猪苓一兩澤瀉一兩赤茯苓一兩桂心半兩

類聚四十七

十一

木半兩葛根一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓溫溫頻服

治傷寒中風下之後日數多腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩非是結熱是胃中虛氣土逆宜服甘草瀉心湯方

甘草一兩炙黃芩半兩黃連半兩乾薑半兩
炮裂微赤剉木通半兩
剉半兩半夏半兩湯洗七遍去滑剉
右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入棗二枚神巧萬全方煎至五分去滓溫

服萬全方日三四服

治傷寒中風脉浮發熱往來汗出惡風項強鼻鳴乾嘔宜服桂心散方

桂心二分赤芍藥三分獨活三分甘草半兩炙杏
人三分湯浸去皮尖黃芩三分
雙人麩炒微黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓溫溫頻服

類聚四十七
十一

治傷寒中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛汗不出煩躁宜服此方

麻黃 三兩去根節 桂心 一兩 甘草 一兩炙 石膏 一兩

杏仁 半兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓稍

熱頻服汗出為度

治傷寒中風四肢不舉言言謇澀煩疼壯熱

附子散方

附子 一兩炮裂去皮臍 人參 一兩去蘆頭 桂心 一兩 麻黃

一兩去根節 茯苓 一兩 漢防己 一兩 黃芩 一兩 甘

草 一兩炙 赤芍藥 一兩 枳殼 二兩麩炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓稍熱頻服

治傷寒中風陽浮熱自發陰弱汗自出漉漉

惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔宜服此方

桂心 一兩 甘草 一兩 赤芍藥 一兩 葛根 半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

類聚 四十七

九

蓋入生薑半分棗二枚煎至六分去滓温服日三服夜一服

治傷寒中風身體疼不煩躁能自轉側脉浮虛者可發汗宜服桂附散方

桂心一兩附子一兩炮裂去皮臍甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓稍熱服衣

覆出汗

治傷寒中風骨節疼痛煩悶不得屈伸近之

則痛劇汗出短氣小便不利惡風或身微腫宜服此方

麻黃二兩去根節附子一兩炮裂去皮臍白朮二兩桂心

二兩赤芍藥一兩甘草一兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓温服每日

四五服

治傷寒中風汗後虛躁頭痛四肢乏力宜服

柴胡散方

類聚四十七

二十七

柴胡一兩半 石膏三兩 人參一兩 去一兩 茯神一兩

枳實一兩 炒微黃 桑根白皮一兩 麥門冬一兩 去心

桂心三分 白朮三分 防風三分 去蘆頭 地骨皮三分 甘

草三分 炙微赤 割

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓溫服日三服

夜一服

治傷寒中風頭昏皮膚疼痛宜服藿香散方

藿香一兩 白附子半兩 炮裂 零陵香一兩 半夏半兩 湯洗

七漏去滑 甘松香一兩 川烏頭半兩 炮裂 牛黃一錢

細研麝香一錢

右件藥搗細羅為散與牛黃麝香同研令

勻每服以熱葱酒調下二錢日三服夜一

服

治傷寒中風筋脉拘急天麻散方

天麻半兩 附子半兩 炮裂 川烏頭半兩 炮裂

乾蠍半兩 炒微 石膏半兩 白附子半兩 炮裂 天南星半兩

炮雄黃一分 麝香一錢 細研

類聚四十七

二十七

右件藥搗細羅為散每服以生薑湯調下
一錢日三四服神巧萬全方同

治傷寒中風頭疼項強身體壯熱服諸藥不
得汗者宜服白附子散方

白附子半兩附子半兩天南星一分天麻半兩半夏

半兩烏頭半兩朱砂一分乾蠍一分麻黃半兩去

右件藥生用搗細羅為散入研了朱砂令
勻每服以生薑湯調下一錢良久以熱葱
豉粥飲投之當便汗出

治傷寒中風語澀四肢拘急壯熱烏頭散方

川烏頭半兩炮裂去皮防風一分羌活一分丹

參半兩麻黃半兩去根節桂心一分白朮一分乾蠍一分

微炒黑豆一合炒熟

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱
酒調下二錢良久再服以汗出為度

治傷寒中風頭項強汗不出煩悶宜服此方

麻黃一兩去根節防風一兩去蘆頭川烏頭半兩炮

臍桂心半兩乾薑半兩炮裂

類聚四十七

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢頻二服以衣覆之汗出為度

治傷寒陰陽剛柔痙病諸方

夫傷寒痙病之狀身熱足寒頸項強直惡寒頭面巢氏病源熱搖頭卒口噤背脊反張巢源背直身體反張是也此由肺熱移於腎轉而為痙痙有剛柔太陽病發熱無汗而不惡寒為剛痙發熱汗出而惡寒為柔痙診其脉沉細此為痙也

治傷寒陰痙筋節急硬陽痙即易差陰痙即難損宜服羌活散方

羌活一兩黃松木節一兩茯苓一兩石膏一兩防

風一兩王不留行半兩桂心半兩麻黃一兩去根

節當歸半兩剉微炒

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服頻服三服後宜食荊芥葛根石膏豉粥避風如額上漸潤即以厚衣蓋之

汗出便差

治傷寒陰瘧頸項強直四肢拘急疼痛足冷口噤宜服附子散方

附子

一兩炮裂去皮臍

人參

一兩去蘆頭

白茯苓

壹兩前

胡

壹兩去蘆頭

白木

壹兩

麻黃

壹兩去根節

桂心

壹兩半

夏

壹兩湯洗七遍去滑

獨活

壹兩

石膏

二兩

當歸

壹兩剉微炒

乾薑

半兩炮裂剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

溫頻服

神巧萬全方同

治傷寒陰瘧手足厥冷筋脉拘急汗出不止宜服白朮散方

白朮

三分

桂心

三分

附子

三分炮裂去皮臍

防風

三分去蘆

頭

芎藭

三分

甘草

三分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候熱服

神巧萬全方同

治傷寒陰陽瘧病頭痛壯熱百節痠疼吐逆

悶絕口噤腰背反張手足強直肉熱脉數宜服麻黃散方

麻黃一兩半 防風一兩 赤茯苓一兩 秦艽一兩

夫苗 葳蕤一兩 葛根一兩 獨活一兩 漢防已一兩

三分 芎藭三分 白鮮皮三分 牡丹三分 石膏一兩 桑寄生一兩

生一兩 甘草三分 黃芩一兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

煎至七分去滓入淡竹瀝一合更煎三兩

沸分溫二服日三四服

治傷寒汗出後成陰陽瘕骨節煩痛不得屈

伸近之即痛汗出短氣小便不利惡風身體

微腫宜服此方

附子一兩半炮裂去皮臍 白朮三分 甘草半兩炙微赤剉

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候溫服

治傷寒陰瘕一日不差手足厥冷筋脉急汗

不出恐陰氣內傷宜服白朮散方

類聚
三十五

白朮兩半 白茯苓兩半 麻黃兩半 五味子兩半
桂心三分 高良薑一分 羌活兩半 附子三分
臍

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒陰瘧閉目合面手足厥逆筋脉拘急汗不止宜服柴胡散方

柴胡一兩半 白朮兩 白茯苓三分 甘草三分

赤對 五味子兩 乾薑三分 炮裂 附子二分 炮裂
防風三分 去蘆頭 桂心兩半

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒陽瘧經二三日不差毒氣攻五藏心神煩躁四肢疼痛宜服桂心散方

桂心三分 柴胡三分 赤茯苓三分 五味子三分 麥
門冬三分 檳榔三分 細辛三分 甘草三分 微赤對

白朮兩半 白茯苓兩半 麻黃兩半 五味子兩半
 桂心三分 高良薑一分 羌活兩半 附子三分
 臍

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
 入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
 服

治傷寒陰瘧閉目合面手足癱逆筋脉拘急
 汗不止宜服柴胡散方

柴胡一兩半 白朮兩 白茯苓三分 甘草三分
去苗

赤對 五味子兩 乾薑三分 炮裂 附子二分 炮裂
 防風三分 去蘆頭 桂心兩半

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
 服

治傷寒陽瘧經二三日不差毒氣攻五藏心
 神煩躁四肢疼痛宜服桂心散方

桂心三分 柴胡三分 赤茯苓三分 五味子三分 麥
 門冬三分 檳榔三分 細辛三分 甘草三分 炙
去心

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫
服

治傷寒陽瘧身熱無汗惡寒頭項強直四肢

疼痛煩躁心悸睡臥不得宜服羚羊角散方

羚羊角屑一分犀角屑一分防風一分去蘆頭一分茯神

一分柴胡一分去苗一分麥門冬一分去心一分人參一分去蘆頭一分去葛

根一分甘草一分炙一分枳殼一分去殼一分炒一分石膏

半龍齒兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒陽瘧身體壯熱頭背強直心膈煩躁

發熱惡寒頭面色赤四肢疼痛宜服麥門冬

散方

麥門冬三分去心三分麻黃三分去根節三分赤茯苓三分知母

三分犀角屑三分地骨皮三分黃芩三分赤芍藥三分

白鮮皮三分甘草三分炙三分杏仁三分湯浸三分去

黃炒微

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒陽瘧通身大熱宜服龍齒散方

龍齒三分前胡三分去蘆頭犀角屑半兩木通半兩

子芩半兩甘草一分炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入牛黃末一字攪令勻不

計時候溫服

治傷寒陽瘧通身熱仰目頭痛宜服石膏散

方

石膏二兩龍齒一兩犀角屑半兩前胡半兩去蘆頭秦

芫一兩去苗

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白七寸煎至五分去滓入牛黃末一字攪令勻不計時候溫服之

治傷寒陽瘧壯熱不歇筋脉拘急牙關急痛

宜服防風散方

防風一兩去蘆頭木通一兩剉麥門冬去心川升

麻一兩 甘草三分炙 虎杖剉 石膏一兩 葛根二兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒頭痛面色赤發熱形如中風常自汗出嘔逆下之益煩心懊懣如飢發汗致瘥身強難以屈伸宜服芎藭散方

芎藭一兩 獨活二兩 柴胡一兩半 川大黃剉碎
微防風 蘆頭三分去

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒陽瘧壯熱不渴筋脉不能舒展牙關疼急不欲見食宜服白鮮皮散方

白鮮皮一兩 百合一兩 石膏壹兩 羚羊角屑三分
木通壹兩 防風壹兩 川升麻一兩 龍齒一兩

右件藥搗篩羅為散每服三錢以水一中盞入葱白七寸豉五十粒煎至六分去滓

不計時候温服

治傷寒陽瘧通體大熱心神煩悸宜服龍齒散方

龍齒一兩去 前胡一兩去 犀角屑半兩 牛黃別研

麥門冬心焙

右件藥搗細羅為散入牛黃同研令勻每服以竹瀝調下二錢不計時候服

治傷寒陽瘧發熱惡寒頭項強直四肢拘急心神煩躁宜服牛黃散方

牛黃壹分 麝香一分 朱砂一分 人參一分

頭赤茯苓壹分 防風一分 芎藭壹分 甘草一分

炙散壹分 桂心一分 犀角屑一分 地骨皮壹分 天麻一分

麥門冬壹分 心焙

右件藥搗細羅為散入牛黃朱砂麝香同研令勻每服不計時候以竹瀝調下二錢

神巧萬全方同

治傷寒汗後熱不除諸方

夫傷寒陰陽受病毒氣未除其人已經服藥

出汗之後而脉洪大實數腹內脹滿小便難
或煩或渴面色變赤此為腑藏有結熱故也
治傷寒得汗後熱不除朝暮壯熱宜服柴胡
散方

柴胡三分去苗 赤芍藥三分 黃芩三分 梔子三分
殼三分去殼炒 麥門冬三分去心 人參二分去蘆頭 赤
茯苓三分 石膏三分 葛根三分 甘草三分炙
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒已得汗熱不除發朝暮煩熱宜服羚
羊角散方

羚羊角屑壹分 犀角屑壹分 麥門冬半兩去心 百合
半兩 柴胡半兩去苗 地骨皮半兩 木通半兩
右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒得汗後熱不除發歇身熱肢節煩疼
宜服黃耆散方

黃耆三分 鼈甲三分塗醋炙 人參三分去蘆頭

藥譜

五

柴胡三分 赤茯苓三分 桑根白皮三分 赤芍

藥壹兩 木通三分 羚羊角屑三分 知母三分 白朮

兩 麥門冬三分 地骨皮三分 枳殼壹兩 微黃去 炒

甘草三分 微赤判

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒發汗及吐下後煩熱不除頭痛滿悶

口乾渴逆宜服知母散方

知母三分 川升麻三分 麥門冬三分 人參三分 去蘆

黃芩三分 葛根三分 甘草半兩 鼈甲兩

塗醋炙令黃去裙爛 石膏壹兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

又方葛根壹兩 麥門冬一兩 黃芩兩 川升麻

兩 甘草半兩 地骨皮一兩 石膏一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

類聚

三

治傷寒汗後餘熱不除四肢拘急胃膈不利
嘔逆不思飲食宜服秦艽散方

秦艽

去苗

柴胡

去苗

枳殼

微黃

桑根

去心

白皮

剉

麥門冬

去心

葛根

剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞入生薑半分蘆根五寸煎至六分去滓
不計時候溫溫頻服

治傷寒雖得汗後熱不除心腹煩滿大小便
秘澀宜服大黃散方

川大黃

碎

微炒

柴胡

去苗

赤芍藥

三分

鱉

甲壹兩

塗醋炙

甲

壹兩

塗醋炙

黃芩

三分

犀角屑

二分

川升麻

赤茯苓

三分

知母

三分

檳榔

三分

杏仁

三分

湯

尖雙人麩

炒微黃

木通

壹兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞煎至六分去滓不計時候溫服如人行
十里再服以通利為度

治傷寒汗後熱不除進退發歇身體溫溫心
神煩悶口乾舌澀不思飲食宜服人參散方

人參壹兩 去頭 犀角屑壹兩 麥門冬壹兩 去心 柴胡

去苗 黃芩壹兩 川升麻壹兩 玄參壹兩 赤茯苓壹兩

地骨皮壹兩 葛根壹兩 梔子人壹兩 甘草壹兩

赤判

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒七八日汗後餘熱不除宜服黃芩散

方

黃芩壹兩 人參壹兩 去頭 柴胡壹兩 去苗 葛根壹兩

梔子人半兩 甘草半兩 炙赤判

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治傷寒汗後餘熱不除宜服解肌散方

知母壹兩 川升麻壹兩 天門冬壹兩 去心 黃芩壹兩 葛

根壹兩 石膏壹兩 柴胡壹兩 去苗

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒得汗後熱不除心神煩躁宜服此方

赤茯苓壹兩人參參分去甘草半兩炙麥

門冬壹兩去心黃芩兩壹

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒汗後熱不除內有熱實腹脹煩躁宜

服此方

柴胡參兩去苗川大黃壹兩剉碎微炒赤芍藥兩半枳實

壹分麩炒微黃半夏半兩湯洗七遍去滑

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒汗後心肺熱不除宜服犀角散方

犀角屑兩半牛黃一分細研麝香半分細研人參一分去朱

頭一分茯神一分麥門冬一分去心焙天竹黃一分細研

砂一分細研黃芩一分梔子一分甘草一分炙

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻

每服以竹葉煎湯調下二錢不計時候服

治傷寒汗後熱不除心神不安宜服茯神丸
方

茯神一兩 麥門冬一兩 羚羊角屑三分 梔子三分

人三分 白鮮皮三分 川升麻三分 玄參三分

分車前子兩 鐵粉半兩 朱砂半兩

右件藥搗羅為末與鐵粉朱砂同研令勻

鍊蜜和丸如梧桐子大每於食後萬全方食前

煎桑根白皮湯下二十九

治傷寒汗後餘熱不除頭痛內熱宜服此方

麻黃一兩 去節 甘草半兩 雞子一枚

右件藥細剉麻黃等二味以水一大盞半

先煎取一盞去滓下雞子攪令勻更煎二

兩沸不計時候放微溫分為二服

治傷寒十日已上曾發汗未解煩熱不除宜

服此方

大青兩 甘草一兩 麥門冬一兩

右件藥搗羅羅為散每服五錢以水一大

盞入豉半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治傷寒煩躁諸方

夫傷寒煩躁者此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少陰病惡寒而拳時自煩欲去其被者可治也病巢氏病源病脉已解而反發暮煩者由病新差強為食脾胃尚虛不能消化巢源消穀故令微煩損穀即愈少陰病脉微細沉但欲卧汗出不煩時自吐五六日自利復煩躁不得卧寐者死發汗後下之脉平而小煩者此新

虛不勝穀氣故也

治傷寒四肢煩躁頭痛口乾壯熱宜服犀角散方

犀角屑半兩甘草半兩炙枳殼半兩麩炒赤

芍藥半兩麥門冬半兩去心焙赤茯苓半兩葛根半兩

剉石膏二兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒熱盛口乾煩躁不得汗宜服麥門冬

散方

麥門冬半兩去心人參半兩去蘆頭麻黃半兩去根節梔

子人三分生乾地黃兩半赤茯苓兩半甘草一分炙微

剉木香一分黃芩一分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治傷寒身體痰疼頭面如火心胃煩躁背膊

壅悶不思飲食宜服升麻散方

川升麻三分葛根一兩剉前胡一兩去頭蘆馬牙消

一子芩兩半知母兩半赤芍藥兩半犀角屑兩半甘

草兩半玄參兩半麥門冬一兩去心大腹皮一兩剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒發汗後大下胃中乾煩躁不得眠臥

欲得飲水者少與飲之令胃和則愈若脉浮

小便利微熱煩渴者宜服猪苓散方

藥譜四十七

三十九

猪苓 一兩 去黑皮 白朮 一兩 澤瀉 一兩 赤茯苓 二兩 桂

心 一兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以清粥飲調下二錢

治傷寒頭痛鼻塞痰壅四肢壯熱憎寒恍惚煩躁宜服知母散方

知母 一兩 麥門冬 一兩 去心 升麻 一兩 桔梗 半兩 犀角屑 半兩 柴胡 一兩 去苗 貝母 半兩 令微黃 赤茯苓 半兩 地骨皮 一兩 木通 半兩 赤芍藥 半兩 甘草

半兩 炙 石膏 二兩 微赤剉

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒身體疼痛頭面如火胷心煩躁背膊妨悶不思飲食宜服子芩散方

子芩 半兩 麥門冬 一兩 去心 葛根 半兩 川升麻 一兩 前胡 一兩 去蘆頭 玄參 半兩 犀角屑 半兩 赤芍藥 半兩 檳榔 半兩 馬牙消 一兩

藥譜四十七

三十九

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒後伏熱在心煩躁恍惚或多驚恐及不得眠臥宜服茵陳散方

茵陳半兩犀角屑一分茯神半兩梔子人半兩赤芍藥半兩麥門冬半兩黃芩半兩生乾地黃一分

右件藥搗去心羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒得汗後身熱未退心神煩躁宜服此方

梔子人一兩甘草一兩黃藥一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒煩躁不得睡臥方

酸棗人一兩甘草一兩鼓一分

右件藥搗篩以水一大盞半煎至一盞去滓不計時候分溫三服

治傷寒未得汗發煩躁心悶宜服此方

麻黃一兩去根節 甘草半兩炙 桂心一兩 麥門冬

半兩 杏仁雙人 雙人 桂炒 微黃去皮尖

右件藥擣羅羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓稍熱服衣覆出汗如人

行十里未有汗再服

治傷寒五六日心膈煩躁壯熱不得臥宜服

梔子人散方

梔子一兩 川升麻一兩 柴胡一兩 石膏一兩 生

乾地黃一兩 甘草一兩炙 葛根一兩

右件藥擣羅羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服神巧萬全方同

治傷寒得汗及未得汗煩躁悶亂宜服不灰

木散方

不灰木二兩用火燒通赤 延胡索半兩 子芩半兩 黃

藥半兩 甘草三分炙 甘菊花半兩 羌活半兩

右件藥擣細羅為散每服二錢用淡漿水

一中盞煎至六分不計時候和滓溫服之

治傷寒煩躁乾逆宜服葛根散方

葛根半兩枳殼半兩麩炒半兩川大黃半兩碎微炒

麥門冬半兩甘草半兩檳榔半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒煩渴諸方

傷寒病煩渴者此謂經發汗吐下已後腑藏
空虛津液竭絕腎家有餘熱故使其煩渴也

治傷寒大汗後煩渴熱不解脉大者宜服人

參散方

人參一兩去蘆頭知母一兩甘草半兩炙微赤石膏二兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒脉浮發熱渴欲飲水小便不利宜服

猪苓湯方

猪苓一兩去黑皮赤茯苓一兩秦艽一兩去蘆頭滑石

一兩澤瀉兩一分甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒身體大熱小便黃赤煩渴不止心中

悶絕言語錯亂睡多驚恐宜服犀角散方

犀角屑兩一分人參三分去赤茯苓兩半茵陳兩半

細辛兩半陳橘皮兩半湯浸去白麻黃兩半根節去甘

草半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒吐下後內外有熱煩渴不止宜服黃

芩散方

黃芩兩一分人參一兩去甘草一兩炙桂心兩半

麥門冬壹兩去心柴胡壹兩葛根壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不

計時候溫服

治傷寒大腸秘澀煩渴不止宜服菡萏根散
方

菡萏根壹兩黃芩兩人參半兩去兩桂心半兩川

大黃壹兩判兩梔子半兩川芒消壹兩甘草半兩

炙微赤判

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服如人行

十里再服以利為度

治傷寒下後煩渴宜服此方

麥門冬壹兩去心兩五味子壹兩人參壹兩去兩甘草

壹兩石膏壹兩微兩赤兩判

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治湯寒煩渴不止宜服土瓜根散方

土瓜根壹兩麥門冬壹兩去心兩甘草半兩炙兩枇杷

葉半兩拭兩去兩毛兩炙兩微兩黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分不計時候去滓溫服

治傷寒煩渴不止宜服黃耆散方

黃耆

半兩

麥門冬

半兩

黃芩

半兩

葛根

半兩

枇杷葉

半兩

毛炙

梔子

半兩

人參

半兩

蘆頭

赤茯苓

半兩

柴胡

半兩

赤芍藥

半兩

甘草

半兩

赤剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒頭項汗出身體無汗小便不利渴欲

方 飲水者是瘀熱在裏身欲發黃宜服茵陳散

茵陳

壹兩

梔子

壹兩

川大黃

壹兩

剉

甘草

半兩

炙微

消石

壹兩

木通

壹兩

剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服如人行

十里再服以小便秘利為度

治傷寒已大汗後下利其人煩渴不解其脉

洪大宜服石膏湯方

石膏二兩 知母壹兩 地骨皮兩 甘草壹兩 微赤剉 人

參壹兩 去

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
盞入粳米一百粒煎至五分去滓不計時
候溫服

治傷寒壯熱煩渴頭痛宜服麻黃散方

麻黃半兩 去根節 葛根半兩 知母半兩 柴胡半兩

梔子人兩 石膏兩 陳橘皮去白 湯浸甘草

半兩 炙微赤 剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中
盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候
溫服

治傷寒下後上氣煩渴不止宜服麥門冬散

方

麥門冬壹兩 去心 五味子壹兩 人參壹兩 去蘆頭 葛根

壹兩 甘草壹兩 炙剉 石膏兩 芎藭兩 桑根白

皮壹兩 剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

蓋煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒嘔吐煩渴欲飲水宜服半夏散方

半夏三分湯洗七遍去滑 蘆根一兩到 赤茯苓三分 澤瀉

三分 桂心半兩 甘草一分炙 麥門冬三分去心

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒頭痛骨節煩疼或已吐下餘熱不盡

口乾煩渴宜服此方

麻黃一兩去根節 知母一兩半 葛根一兩半到 石膏二兩

半甘草一兩炙 微赤到

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒吐利後煩渴不止宜服竹茹飲子方

青竹茹一雞子大 人參半兩去蘆頭 烏梅肉二枚

右件藥細剉以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫頻服

治傷寒後熱結在胃膈煩渴宜服青箱子丸

方

青箱子二兩黃芩一兩龍膽一兩去蘆頭一兩梔子一兩

苦參壹兩黃蘗一兩菰蘗根一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫水下三十丸

治傷寒心神熱躁口乾煩渴宜服此方

秦艽壹兩

右件藥細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分溫二服

又方菰蘗根二兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞入新竹葉二七片煎至五分去滓不計

時候溫服

治傷寒譫語諸方

失傷寒四五日脉沉喘滿沉為在裏而反發汗其津液越出入便為難表虛裏實久久則成譫語發汗後重發其汗亡陽亦為譫語其脉反和者不死陽明病下血而譫語者此為

熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實者而
 瀉之澱然汗出者則愈病苦譫言妄語身有
 熱脉當洪大者生沉細微手足四逆者死也
 治傷寒邪熱在胃譫語錯亂宜服犀角散方
 犀角屑壹兩 甘草半兩炙 藍葉半兩 升麻壹兩
 柴胡壹兩 葛根壹兩 川芒消壹兩
 右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
 盞煎至六分去滓不計時候溫服
 治傷寒譫語頭疼壯熱百骨節疼痛宜服柴

胡散方

柴胡壹兩 赤芍藥壹兩 知母壹兩 梔子壹兩
 升麻三分 黃芩三分 大青三分 杏仁三分 湯浸去
 皮尖雙 人參一分 麩一分
 炒微 石膏四兩 大黃二分 甘草三分 炙
 黃一分 右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
 盞入豉五十粒煎至六分去滓不計時候
 溫服
 治傷寒邪熱在胃譫言妄語身體壯熱宜服
 大青散方

大青三分遠志三分川升麻壹兩柴胡壹兩

黃芩兩犀角屑二分人參二分去去甘草半兩

赤赤蘆根半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒逼心譫語見鬼神不安宜服漢

防已散方

漢防已半兩桂心三分防風二分去去甘草半兩

赤赤生乾地黃二斤研取汁

右件藥搗羅為末入地黃汁中更入水一

大盞調令勻入銀器中盛於甕中蒸半日

取出每服三合以溫水下之不計時候服

又方犀角屑兩黃連半兩去去茯苓三分甘草半兩

赤赤判

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒心膈熱毒煩悶譫語失度宜服生乾

地黃散方

生乾地黃二兩 玄參一兩 赤茯苓一兩 麥門

冬壹兩 川升麻一兩 甘草半兩 炙微赤

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候頻溫服

治傷寒經五六日未經發汗大便結澀譫言妄語煩躁不安宜服此方

前胡壹兩 去蘆頭 葛根壹兩 川大黃二兩 剉微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服以利為度

治傷寒熱毒在裏譫言妄語體熱心躁宜服葛根散方

葛根一兩 黃芩壹兩 川大黃二兩 剉微炒 柴胡壹兩

去苗 甘草半兩 炙微赤 犀角屑壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服以通利為度

治傷寒心藏虛熱譫語恍惚不定宜服赤茯苓散方

赤茯苓一兩 牡蠣一兩 燒粉一兩 龍骨一兩 黃芩一兩

一兩

右件藥搗篩為散先以水二大盞入羊心一枚煮令熟去羊心次入藥五錢生薑半分同煎至七分去滓不計時候放溫分為二服

治傷寒陽明病譫語有潮熱不能食者必有燥糞在腸胃若能食者但耳聾宜服大承氣湯下之方

川大黃二兩 剉二兩 川芒消一兩 枳實三分 麩一分

厚朴一兩 去麁皮生 薑汁炙令香熟

右件藥搗麁羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服如人行五里再服以利為度

治傷寒得汗後心狂譫語欲走宜服鉛霜散方

鉛霜半兩 細研 馬牙消半兩 人參半兩 去蘆頭 欝金半兩 茯苓半兩 甘草一分 微赤剉

右件藥搗細羅爲散服不計時候煎麥門冬溫水調下二錢

治傷寒發狂譫語大便不通心腹脹滿欲走宜服鬱金散方

鬱金三分 川大黃一兩半 梔子三分 柴胡半兩 甘草一分 炙犀角屑半兩

右件藥搗細羅爲散每服煎葱豉湯調下二錢如人行十里再服以大便通利爲度

治傷寒伏熱在心脾譫言狀如癡人宜服朱

砂散方

朱砂半兩 太陰玄精半兩 犀角屑一兩 鉛霜

半兩 紫石英三分 細研人參 蘆頭一兩 去赤茯苓

芩一兩 防風一兩 去蘆頭三 訶梨勒皮分

右件藥搗細羅爲散入上件四味同研令勻每服不計時候以葱湯調下二錢

治傷寒發熱面目赤黃煩躁欲走如見鬼神譫語不禁宜服黃藥散方

黃藥半兩 川大黃半兩 梔子半兩 人參半兩

夫蘆 檳榔 半兩 鬱金 半兩 川朴消 二兩 紫苑 一兩
頭 甘草 半兩 炙龍膽 半兩 去犀角屑 半兩
土 右件藥搗細羅為散每服不計時候以雞
子清調下二錢蜜水調下亦得

治傷寒發斑瘡諸方

夫傷寒病證在表或未發汗或經發汗未得
或吐下後而熱不除者此由毒氣盛故也毒
既未散而表已虛熱毒乘虛出於皮膚所以
發斑癢疹如錦文重者口內巢氏病源喉身體皆

成瘡也

治傷寒斑出癢疹如錦文而欬嗽心神煩悶
嘔吐不止宜服漏蘆散方

漏蘆 一兩 陳橘皮 一兩 湯浸前胡 兩 去麻

黃芩 一兩 去杏仁 一兩 湯浸去皮尖

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒藏腑壅毒不得宣踈肌膚發斑宜服
此方

黃芩一兩 大青一兩 梔子人兩半 川升麻一兩 石膏一兩
川朴消二兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
半入豆豉五十粒葱白二莖生薑半分煎
至五分去滓不計時候溫服稍利為度

又方犀角屑壹兩 川大黃二兩 梔子人兩半 藍

葉壹兩 川升麻壹兩 甘草半兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒十日內未得汗表裏有熱發斑狂言
欲走眼目俱黃心中煩悶大便不利宜服黃
芩散方

黃芩壹兩 大青壹兩 梔子人兩半 川升麻壹兩 大

黃壹兩 黃連半兩 茵陳壹兩 甘草半兩

川朴消壹兩

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候
溫服以利為度

治傷寒身面發斑宜服大青散方

大青壹兩 川升麻二兩 甘草二兩
半 微赤剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入豉少半合煎至五分去滓不計時候溫
服

治傷寒斑瘡欲出脉洪大心躁熱但令患人

溺於紙上如金色是也宜服此方
神巧黃全方名猪膽

汁飲

猪膽汁壹合 醎醋壹合 鷄子壹枚
打破殼

右件藥相和煎三兩沸放溫頓服

治傷寒熱毒不解欲變成斑解毒升麻散方

川升麻壹兩 梔子人一兩 大青一兩 黃芩一兩 石膏一兩

二兩 甘草壹兩
微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一中
盞入地黃汁半合煎至六分去滓不計時
候溫服

治傷寒赤斑出不止宜服犀角散方

犀角屑一兩 麻黃一兩 梔子人一兩 黃連一兩
根節去

去鬚地骨皮一兩 甘草一兩 炙馬牙消一兩 石膏一兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
盞煎至五分去滓不計時候溫服以差為
度

治傷寒黑班出不止宜服此方

川升麻一兩 黃芩一兩 川大黃一兩 碎兩 剉兩 犀角
屑一兩 川芒消一兩 梔子一兩
右件藥搗細羅為散每服不計時候煎廿

豆湯放冷調 錢服以差為度

治傷寒斑瘡已出心藏尚有餘熱發歇煩躁
宜服天竹黃散方

天竹黃半兩 研兩 川升麻半兩 子芩半兩 茯神半兩 犀
角屑半兩 赤芍藥半兩 人參半兩 蘆頭半兩 去兩 鈎霜半兩 研
麥門冬一兩 心焙兩 去兩 梔子一分 甘草半兩 炙兩 黃
連一分 去兩 鬚

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服
不計時候煎竹葉湯調下二錢

藥譜 四十七 五十七

治傷寒斑毒不解宜服黃連散方

黃連一兩犀角屑兩半石膏兩梔子一兩甘

草半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒一二日及十餘日發黃疸斑出皆主

之方

大青一兩甘草半兩炙微赤剉黃明膠半兩梓碎炒令黃豉

二兩

右件藥細剉和勻每服半兩以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒發豌豆瘡諸方

夫傷寒熱毒氣盛多發此瘡巢氏病源其瘡色

白或赤發於皮膚頭作漿巢氏病源戴白膿者其

毒則輕有紫黑色作根隱隱在肌肉裏其毒

則重甚者五內七竅皆有瘡形如豌豆故以

名焉

治傷寒毒氣未散發豌豆瘡宜服黃連飲子

藥譜 四十七 五十七

類聚 四十七 五十六

方

黃連一兩糯米一合寒水石三兩

右件藥都擣碎以水二大盞煎至一盞半

去滓不計時候分溫二服

治傷寒壯熱頭痛發瘡如豌豆遍身宜服大

青散方

大青一兩梔子一兩川大黃一兩犀角屑一兩

川升麻一兩甘草兩微赤剉

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒未解欲生豌豆瘡發熱疼痛宜

服解肌出汗方

葛根一兩石膏二兩麻黃一兩黃芩半兩

芍藥半兩桂心半兩甘草半兩微赤剉

右件藥擣細羅為散每服不計時候以煖

水調下二錢併三服衣蓋取汗

治傷寒病發豌豆瘡未成膿初覺宜服此方

神巧萬全方
名黃連散

類聚 四十七 五十九

黃連一兩去鬚○聖齊總錄一兩半

右搗碎以水一大盞煎至六分總錄七分去滓

不計時候總錄食後放溫頓服便消不成膿也

又方右以好蜜徧磨瘡上○神巧萬全方右

以好白蜜通身塗於瘡上亦可數數食蜜

如瘡爛痛可用黃土傅之

治傷寒發豌豆瘡欲出宜服此方

甘草一兩炙微赤剉

右搗碎以水一大盞煎至六分去滓任食

前後細細服之以防瘡出如已出即不服

又方右以清油一小盞服之即不生

又方右以生羊血一小盞頓服即不生

又方牛乳四兩酥一兩

右件藥先煖乳令微沸即下酥酥消盡便

空腹溫溫頓服即不生

治傷寒病壯熱頭痛發瘡如豌豆徧身方

獾猪膽一枚

右以醋半小盞合膽汁煎一沸放溫為一

服不計時候服

治傷寒白頭瘡四邊赤腫欲發豌豆瘡方

麻黃一兩去根節 川大黃一兩剉碎微炒

右件藥剉碎和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒鼻衄諸方

夫傷寒病衄血者此由五藏結熱所為也心

主於血巢氏病源心主於血肝藏於血熱邪傷於心巢源心肝故

衄血也衄者鼻出血也肺主於氣而開竅於

鼻而隨氣行所以從鼻出也陽明病口燥但

欲漱水不欲咽者必衄衄者不可攻其表汗

出必額上急巢源而緊直視而不能眴不得

眠失血者不可攻其表汗出則寒慄而振脈

緊巢源發熱其身無汗自衄者愈也

治傷寒上膻壅熱心神煩躁鼻衄不止宜服

黃芩散方

黃芩三分 川大黃三分剉碎微炒 梔子一分 犀角屑一分

半兩 石膏三分 羚羊角屑半兩 藍葉三分 甘草半兩

赤川朴消一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓不計時候溫服以差為度

治傷寒心肺熱毒鼻衄不止或兼唾血宜服

黃連散方

黃連三分黃芩一兩梔子人兩甘草半兩炙

伏龍肝三分淡竹茹一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分煎至五分去滓入生地黃汁

一合亂髮灰一錢攪令勻更煎三兩沸不

計時候放溫頻服之以差為度

治傷寒衄血及吐血連日不絕欲死宜服艾

葉湯方

艾葉半兩細剉生乾地黃半兩阿膠一分碎

黃燥為末

右件藥都和令勻分為二服每服以水一

中盞煎至五分去滓下赤馬通汁一合半

攪令勻不計時候放溫頻服以差為度

治傷寒衄血不止宜服羚羊角散方

羚羊角屑三分犀角屑三分牛黃一分人參半兩

去蘆頭白茯苓兩麥門冬三分黃耆三分梔

子人三分甘草一分紫苑三分去土丹參半

玄參三分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

煎至五分去滓入牛黃末一字攪令勻不

計時候放溫頻服之以差為度

治傷寒鼻衄不止頭痛壯熱宜服升麻散方

川升麻兩青蒿半兩犀角屑兩鷄蘇莖葉兩

麥門冬一兩川朴消兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至五分去滓下地黃汁一合更煎一兩

沸不計時候溫溫服之

治傷寒鼻衄不止兼唾血宜服刺蘇散方

刺蘇兩黃連三分黃芩兩梔子人三分亂髮

灰一分紫蘇莖葉兩阿膠二兩碎甘草三分

赤灸羚羊角屑三分

右件藥搗籠羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓下生地黃汁生薑汁各半合和令勻不計時候服之以差為度

治傷寒發汗而汗快致內有蓄熱及鼻衄血不盡內有餘血者面色黃大便赤消化痰血生乾地黃散方

生乾地黃四兩赤芍藥一兩牡丹二兩○神功
犀角屑一兩黃芩一兩茜根一兩
右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒衄血數升不住者飛雪湯方

麻黃三兩石膏三兩芫花一兩川大黃二兩
右件藥都剉以水一斗半煮取七升放冷披髮仰卧以淋其顙血住即止

治傷寒鼻衄苦參散方

苦參三兩黃連二兩梔子人二七川大黃一兩
一兩剉生乾地黃壹兩石榴花半兩
碎微炒
右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服以差為度
治傷寒鼻衄不止心胃煩悶宜服此蒲黃散
方

蒲黃三分犀角屑兩半子芩三分紫蘇莖葉兩半側

柏葉兩半甘草壹分炙微赤

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
盞煎至六分去滓以伏龍肝半兩水浸取
清一合相和令勻不計時候分為二服以
差為度神巧萬

又方生地黃汁合二白藥末兩半生藕汁合二刺薊

汁壹合

右件藥相和藥三二沸放溫不計時候分
為三服

又方甘草壹兩炙微赤雞蘇莖葉兩壹淡竹葉壹

右件藥搗碎以水一大盞半煎至八分去
滓不計時候分為二服以差為度

治傷寒衄血不止方

阿膠一兩碎兩貝母半兩煨微黃

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温

水調下一錢

又方赤馬糞半兩燒為灰石耳半兩龍骨半兩

右件藥搗細羅為散更研令極細取少許吹入鼻內未定相續用之

治傷寒口鼻俱出血可及三五升宜服此方

亂髮灰半兩伏龍肝一分

右件藥同研令細每服不計時候以新汲水調下二錢頻服以差為度

治傷寒鼻衄不止雞冠花散方

雞冠花一分麝香一分

右件藥搗細羅為散與麝香同研令勻以生地黄汁一合冷水半盞攪令勻不計時候調下二錢頻服以差為度

治傷寒胃膈間有餘熱衄血不止方

牡蠣二兩燒為粉石膏二兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以生薑湯調下二錢頻服以差為度

治傷寒氣毒熱盛鼻衄不止宜服刺薊散方

刺薊半兩土瓜根半兩子芩半兩蠟一分麝香一分

研半錢

右件藥擣細羅為散入麝香研令勻每服不計時候以冷蜜水調下二錢以差為度

治傷寒鼻衄可及一斗已來不止方

黃藥一兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以新汲水調下二錢

治傷寒熱毒攻眼諸方

夫眼者藏腑之精華肝之外候也傷寒熱毒壅滯熏蒸於肝上攻於目則令目赤腫痛若毒氣盛者眼生翳膜也

治傷寒熱毒氣攻眼昏暗及有熱淚臉下澀痛漸漸至重宜服麥門冬散方

麥門冬一兩羚羊角屑一兩防風一兩去赤

茯苓一分決明子一分赤芍藥一分甘草一分微赤判

麩人半兩地骨皮半兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒氣攻眼赤澀浮翳宜服此方

川升麻一兩黃芩一分甘草三分川朴消一分

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒熱毒攻眼障翳赤痛宜服麩人散方

麩人一兩漏蘆一兩黃芩壹兩犀角屑壹兩連翹一兩

梔子人半兩川升麻壹兩枳實半兩麩兩甘草一兩

炙微壹兩川大黃壹兩碎微炒

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒熱毒氣攻眼障翳赤澀疼痛宜服柴

胡散方

柴胡叁分地骨皮三分玄參半兩黃芩一分石膏

壹兩甘菊花一分甘草半兩羌活半兩防風半兩

去盧川朴消壹兩
頭半

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒熱毒攻眼赤澀昏暗疼痛宜服羚羊
角散方

羚羊角屑一兩 梔子人半 决明子一兩 芎藭一兩
羌活一兩 石膏一兩 柴胡一兩 去苗黃芩一兩 人參一兩
去蘆川大黃一兩 碎微炒 頭

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒熱毒氣攻眼翳膜赤痛宜服黃芩散
方

黃芩壹兩 黃連壹兩 去鬚决明子壹兩 玄參一兩 柴胡一兩
壹兩去苗 ○神巧萬
全方加甘菊花壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞
入竹葉三七片煎至五分去滓不計時候

温服

治傷寒熱毒氣攻眼忽生赤翳疼痛不可視
明或眼外浮腫宜服秦皮散方

秦皮 壹兩 前胡 壹兩 去蘆頭 麩人 壹兩 黃芩 壹兩 川升

麻 壹兩 赤芍藥 壹兩 白薇 壹兩 枳殼 壹兩 剉黃去麩炒甘

草 壹兩 炙 梔子人 半兩 川大黃 二兩 川芒 碎微少

消 二兩

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大
盞煎至五分去滓不計時候温服

治傷寒熱毒攻眼生翳赤痛不得見明心神
煩悶宜用此方

秦皮 壹兩 川升麻 壹兩 黃連 壹兩 去鬚

右件藥擣篩為散以水三大盞煎至一大
盞去滓候冷每用三合仰卧以絲纏筋頭
取湯以滴眼中如屋漏狀盡三合止須臾
復用日五六度乃佳

治傷寒未解熱毒氣上衝頭痛目赤澁宜服
石膏散方

石膏壹兩 葛根半兩 赤芍藥半兩 柴胡壹兩 甘

草壹分炙 黃芩半兩 梔子人兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分葱白一莖豉五十粒煎至

五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒氣攻眼生赤脉白翳澀痛不可

忍宜服决明子散方

决明子壹兩 川升麻壹兩 黃蘗壹兩 秦皮壹兩 麩

人半兩 黃連壹兩 川芒消壹兩 甘草半兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一中

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒攻眼生翳宜服升麻散方

川升麻壹兩 黃芩壹兩 黃連叁分 青箱子叁分 甘

草叁分炙 川芒消二兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒攻眼赤痛兼有翳暈宜服青箱

子丸方

青箱子 壹兩 川大黃 壹兩到碎微炒 黃連 壹兩去鬚 黃芩

兩 兔肝 參分微炙 川升麻 壹兩 梔子 壹兩 川朴消

二 苦參 分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫漿水下三十九

治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳宜用此方

烏賊魚骨 壹兩不用大皮

右搗細羅為散入少許龍腦更研令細日三四度取少許點眼

治傷寒大病後熱毒氣攻眼方

露蜂房 二

右以水三大盞煎至二大盞去滓放溫洗眼日三五度○山居四要用露蜂房半兩水煎露一夜洗之衛生易簡方用露蜂房半兩水二升煮一升重濾洗日三四度亦

治赤目醫

治傷寒熱毒攻眼生翳方

鼓 三七粒燒為灰

右細研如粉以少許點翳上日三四度即差

治傷寒咽喉痛諸方

夫傷寒病過經而不愈脉反沉遲手足厥逆者此為下部脉不至陰陽隔絕邪客於足少陰之經巢氏病源作絡毒氣上熏故咽喉不利或痛而生瘡也

治傷寒毒氣攻咽喉痛心煩躁熱胃膈滯悶大小便難宜服射干散方

射干壹兩枳殼壹兩

微炒犀角屑三分

川升麻壹兩

馬牙消壹兩

木通壹兩

川大黃壹兩

參壹兩甘草生用

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服神乃萬全方同

治傷寒毒氣攻咽喉窄塞疼痛不可忍宜服馬藺子散方

馬藺子半兩

地骨皮半兩

川升麻半兩

黃芩半兩

馬牙消二兩

犀角屑半兩

甘草生用

大青半兩

苦

竹葉參兩

右件藥擣篩為散以水三大盞煎至一盞
濾去滓入蜜二合同熬令稠不計時候取
一茶匙含嚥津

治傷寒咽喉閉塞不通小便赤澀宜服木通

散方

木通一兩 羚羊角屑一兩 川升麻一兩 射干一兩

赤芍藥兩半 蘆根二兩 甘草一兩

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大

盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒熱毒在心脾口舌乾燥咽喉腫痛宜

服麥門冬散方

麥門冬半兩 木香一分 川大黃半兩 漢防

已半兩 葛根半兩 滑石兩半 玄參兩半 木通兩半

甘草一分

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大
盞入生薑半分葱白二莖煎至五分去滓
不計時候溫服

治傷寒心胃氣壅閉塞不通咽喉疼痛宜服升麻散方

川升麻半兩木通半兩羚羊角屑半兩前胡半兩

去蘆桑根白皮半兩川大黃半兩碎微炒馬藟

根一兩川朴消一兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒咽喉疼痛心神煩悶宜服羚羊角散方

羚羊角屑一兩木通一兩射干一兩川升麻一兩

地骨皮一兩蘆根參兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒經數日胃中妨悶咽喉噎塞痛不能飲食宜服此方

射干參分川升麻參分人參參分去蘆頭甘草半兩生用

陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治傷寒三二日咽喉痛宜服桔梗散方

桔梗一兩去甘草二兩生用苦參半兩

右件藥都搗麤羅為散每服五錢以水一
中盞煎五分去滓不計時候溫服

治傷寒毒氣攻咽喉痛宜服絡石散方

絡石半兩玄參半兩升麻半兩射干半兩子芩半兩
木通半兩甘草一分生用

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒二三日毒氣攻咽喉痛腫宜服甘草
散方

甘草一兩生用川升麻半兩射干半兩

右件藥細剉都以水三大盞煎至二盞去
滓分為四服日三服夜一服

治陽毒傷寒諸方

夫傷寒一二日或服湯藥吐下之後身重頭

痛腰背煩悶面赤班班如錦文狂言而走或見鬼神其脉浮大而數咽喉痛下膿血此名陽毒五日可療七日不可療也

治傷寒一日便成陽毒或服藥發汗吐下之後毒氣不解身重背強煩悶狂言或走或見鬼神面赤斑斑狀如錦文咽喉痛及下膿血宜服川升麻散方

川升麻兩一當歸半兩剉黃芩參分犀角屑兩半
射干兩一黃連參分地骨皮參分甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒身體疼痛頭面如火胃心煩熱而渴小便赤黃不得睡卧宜服麥門冬散方

麥門冬壹兩去心子芩參分葛根壹兩剉川升麻兩半柴胡壹兩去苗玄參參分犀角屑兩半赤芍藥兩壹甘草參分炙知母兩壹馬牙消兩壹

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

類聚 四十七

治陽毒傷寒狂言亂走面赤斑斑喉咽乾痛心胃煩滿四肢拘急小便赤黃宜服犀角散方

犀角屑兩半射干三分柴胡壹兩去苗川大黃叁分剉碎
微炒川升麻兩壹芒消兩壹麥門冬壹兩焙甘
草半兩炙黃芩叁分
右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中盞入淡竹葉三七片小麥五十粒煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒壯熱頭痛肢體煩重口乾心躁宜服石膏散方

石膏壹兩知母兩半柴胡兩半去苗麻黃兩半去根節甘
草兩半炙黃芩兩半赤芍藥兩半防風兩半去蘆頭
赤茯苓兩半川升麻兩半甘菊花兩半
右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸豆豉一百粒煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者宜

類聚 四十七

七

服大黃散方

川大黃一兩半剉碎微炒桂心三分甘草一兩微赤剉川

芒消二兩木通一兩大腹皮一兩桃人二十壹枚

湯浸去皮尖雙人麩炒令微黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服以通利

為度

治陽毒傷寒頭昏身重咽喉痛脣乾腮赤狂言欲走心胃脹滿嘔逆不下飲食面色斑斑

如錦文宜服地骨皮散方

地骨皮半兩木香半兩柴胡壹兩去苗麻黃半兩去根節

甘草半兩炙川升麻半兩菰蘆根半兩人參半兩

去蘆頭赤茯苓半兩木通半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛宜服柴胡散方

柴胡壹兩半去苗川升麻二兩黃芩二兩赤芍藥壹兩

大青兩壹石膏兩二知母兩壹甘草半兩炙梔子兩壹

人壹兩杏人二兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞入生薑半分豉一百粒煎至六分去滓
不計時候溫服

治陽毒傷寒項背汗出急強惡風者宜服桂

枝麻黃散方

桂枝壹兩麻黃壹兩去根節甘草壹兩炙微赤剉赤芍藥

壹兩葛根壹兩剉杏人壹兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱
服衣覆取汗如人行十里未有汗再服良
久以葱豉粥投之

治陽毒傷寒服桂枝湯大汗出後大渴煩躁
不解脈洪大者白虎湯主之

知母壹兩石膏二兩搗碎甘草壹兩炙微赤粳米壹合

右件藥細剉以水二大盞煮米熟為度去
滓不計時候分溫三服

治陽毒傷寒四肢壯熱心膈煩躁嘔吐不止

宜服此方

柴胡壹兩 去苗 黃芩壹兩 人參壹兩 去蘆 甘草壹兩 炙

赤麥門冬壹兩 去心 焙 半夏半兩 湯洗七遍 去滑

右件藥搗麝羅為散每服四錢以水一中盞入竹葉三七片生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒五六日已上但胃中煩熱乾嘔

宜服菰蘆散方

菰蘆壹兩 半 柴胡壹兩 去苗 知母壹兩 半 黃芩壹兩

牛甘草一兩 炙 蘆根二兩 剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒脉洪大心中悸狀宜服甘草散方

甘草一兩 炙 桂心一兩 茯苓一兩 人參一兩 去蘆頭

阿膠一兩 搗碎 生乾地黃二兩 麥門冬一兩 去心

麻黃二兩 去根節

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治陽毒傷寒氣盛昏昏如醉熱躁煩渴口苦

舌乾宜服黃芩散方

黃芩一兩 川升麻壹兩 赤芍藥半兩 麥門冬半兩
去心

石膏二兩 柴胡壹兩 甘草半兩
炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治陽毒傷寒心躁煩悶恍惚如狂結熱不散

宜服牛黃丸方

牛黃半兩 龍腦壹分 天竹黃半兩 犀角屑

兩 羚羊角屑壹兩 朱砂壹兩 黃芩一兩
川

升麻壹兩 甘草壹分 神巧萬全方 防風半兩
去蘆

麝香壹錢 真珠半兩

右件藥搗羅為末入前研了藥更研令勻
以鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每
服不計時候以溫水嚼下十五丸

治陽毒傷寒煩熱大便不通方

川大黃

壹兩剉碎微炒川芒消

兩半

右件藥搗篩以水一大盞煎至七分去滓不計時候分溫二服如人行五七里再服當利下惡物

治陽毒傷寒毒氣在藏狂言妄語欲走起者宜服此方

龍膽

壹兩去蘆頭

鐵粉

兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以磨

刀水調下一錢

治陰毒傷寒諸方

夫傷寒初得一二日或服藥後至六七日身重背強腹中疝痛咽喉不利毒氣攻心心下脹滿短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脉沉細身如被打此名陰毒五日可療七日不可療也

治陰毒傷寒脣青面黑身重背強四肢逆冷宜服附子散方

附子三分炮裂去皮臍 桂心半兩 當歸半兩剉 半夏

一分湯洗 乾薑一分炮 白木半兩 天南星一分

七遍去滑 炮木香一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱

服衣覆取汗如人行十里未有汗再服

治陰毒傷寒四肢厥冷脉候沉細心腹脹滿

腹中疝痛咽喉不利徧身疼痛宜服烏頭散

方

川烏頭一兩炮裂去皮臍 麻黃半兩去根節 桂心半兩

赤芍藥三分 枳殼半兩麩炒 當歸半兩剉

炒川椒半兩去目及閉口者微炒去汗 乾薑半兩炮裂剉

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

熱服衣覆取汗如人行十里未有汗再服

治陰毒傷寒二三日不得汗煩躁宜服麻黃

散方

麻黃壹兩去根節 防風一兩去蘆頭 乾薑半兩炮裂剉 桂

心兩半川烏頭半兩炮裂去皮

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢衣覆取汗如人行十里未有汗再服

治陰毒傷寒迴陽散方

川烏頭半兩炮裂去皮益智子半兩青橘皮半兩湯浸

去白乾薑半兩炮裂剉麻黃一兩去根節桂心半兩

方肉桂

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服衣覆取汗如人行十里未有汗即再服

治陰毒傷寒四肢逆冷身體疼痛或時心頭結硬宜服此方

附子一兩炮裂去皮白朮壹兩甘草一兩炙桂心一分麻黃一兩去根節木香一分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服衣覆取汗如人行十里未汗即再服
治陰毒傷寒心胃滿悶喘促四肢厥逆宜服
白朮散方

白朮 壹兩 前胡 壹兩 去蘆頭 桂心 叁分 甘草 半兩 炙

附子 一兩 炮裂 五味子 半兩 乾薑 半兩 炮阿

梨勒皮 兩 厚朴 壹兩 去蘆皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
蓋煎至六分去滓不計時候稍熱服如人
行十里再服

治陰毒傷寒身重背強腹中疔痛咽喉不利
毒氣攻心下堅強短氣嘔逆唇青面黑四肢
厥冷其脉沉細宜服天雄散方

天雄 壹兩 炮裂 麻黃 半兩 去根節 當歸 半兩 剉

白朮 半兩 半夏 半兩 湯洗 肉桂 壹兩 去皮 川椒

口者微炒去目及閉汗厚朴 壹兩 去蘆皮塗生薑汁炙令香熟 陳

橘皮 叁分 湯浸 乾薑 三分 炮

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大
蓋入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不

計時候稍熱服如人行十里未汗再服

治陰毒傷寒迴陽吳茱萸散方

吳茱萸一兩易浸七遍焙乾厚朴二兩去麩皮塗

半夏七分湯洗麻黃一兩去根節肉桂一兩

皮乾薑裂分炮白朮半兩附子三分炮裂細

辛兩天南星半兩木香兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行十里未汗即再服

治陰毒傷寒面青張口出氣心下硬身不熱

只額上有汗煩渴不止舌黑多睡四肢俱冷

正陽散方

附子一兩炮裂皂莢一挺去皮塗酥乾薑

一分炮甘草一分炙麝香一錢細

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

盞煎至五分不計時候和滓熱服

治陰毒傷寒項背強心神煩宜服此方

麻黃半兩去根節附子半兩炮裂澤瀉兩半夏

半兩湯洗肉桂半兩去甘草半兩炙天南
七遍上滑乾蠍半兩乾薑半兩炮

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去薑棗

不計時候和滓熱服

治陰毒傷寒四肢厥逆頭痛心躁胃中結實

兩脇妨悶宜服前胡散方

前胡三分去桔梗三分去檳榔半兩桂心半兩

訶梨勒皮一兩木香半兩當歸半兩青橘皮半兩

半兩湯浸厚朴一兩去薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱頻服

治陰毒傷寒脉候沉細四肢逆冷煩躁頭痛

四逆湯方

乾薑半兩炮附子半兩炮裂桂心半兩

全方甘草半兩炙白朮半兩當歸半兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

蓋煎至六分去滓不計時候稍熱頻服方頓之

治陰毒傷寒心間煩躁四肢逆冷宜服此方

川烏頭一兩炮裂 桔梗一兩 附子一兩
去皮白朮 細辛兩 乾薑兩 厚朴兩 木香兩 五

右件藥搗細羅為散如患一日兩日者溫酒調下一錢如是三四日至五日者用藥末二錢以水一中盞煎至六分不計時候稍熱和滓頻服

治陰毒傷寒四肢厥逆胃膈不利宜服此方

附子二兩炮裂 乾薑壹兩炮裂 肉桂壹兩
人參壹兩 赤茯苓兩 白朮壹兩 木香兩 五
味子兩 訶梨勒皮兩 厚朴壹兩 塗生薑汁炙
令香 甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白一莖煎至六分去滓不計時候稍熱頻服

治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷昏

沉不識人變為陰毒宜服肉桂散方

肉桂三分去赤芍藥壹兩陳橋皮壹兩湯浸

附子壹兩炮裂前胡壹兩去當歸壹兩到

吳茱萸半兩湯浸七白朮三分木香三分厚朴

三分去蒼皮塗生高良薑三分人參去頭

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍

熱頻服

治陰毒傷寒手足逆冷心下煩滿宜服人參散方

人參壹兩去木香壹兩附子壹兩炮裂桂心

壹兩壹兩炮裂當歸壹兩到吳茱萸壹兩湯浸

七遍焙檳榔壹兩乾微炒

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍

熱頻服

治陰毒傷寒頭痛四肢不和心腹氣悶宜服

此方

附子 一兩炮裂 壹兩炮 陳橘皮 壹兩湯浸 去白皮
 甘草 半兩炙 兩壹 檳榔 一兩
 右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞
 入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱
 頻服

治陰毒傷寒項直脚冷百節疼痛桂心散方

桂心 二兩 麻黃 二兩去節 附子 二兩炮裂 去皮臍 甘草 半兩炙
 赤芍藥 半兩 乾薑 半兩炮裂 枳殼 半兩炙 微赤剉

去瓢柴胡 一兩 杏人 半兩湯浸去皮尖

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱頻服汗出為度

治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷宜服返陰丹方

硫黃 太陰玄精 消石 附子 炮裂去皮臍
 乾薑 炮裂 桂心 已上各半兩 神
 右件藥取前三味同研於瓷瓶子內慢火

類聚四十七

九

鎔成汁後放冷重研令細後三味搗羅爲末與前藥同研令勻用軟飯和丸如梧桐子大每服不計時候煎艾湯下五丸頻服汗出爲度

治陰毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹脉候

沉細宜服迴陽丹方

硫黃半兩細研入木香半兩葶澄茄半兩附子半兩炮裂
去皮乾薑一分炮裂桂心半兩乾蠍半兩吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒

右件藥搗羅爲末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下三十丸頻服三服後以熱酒一盞投之以衣蓋取汗

治陰毒傷寒四肢逆冷心下痛硬氣欲絕者宜服反陰正陽藁香丸方

藁香子微炒附子炮裂去皮天南星炮裂硫黃細研
丁香 木香 吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒預知子
桂心已上各一兩

類聚四十七

九

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以醋煮
麵糊和丸如彈子大每服一九研碎以炒
生薑熱酒調下良久煎葱白艾湯投之不
計時候頻服

治陰毒傷寒來蘇丹方

硫黃 消石 太陰玄精 已上各一兩

右件藥都細研於瓷瓶子中盛以瓦子蓋
瓶口用黃泥固濟陰乾以炭火半斤養令
火盡即出之更研如粉用湯浸蒸餅和丸

如梧桐子大每服不計時候熱酒下三丸
至五丸衣蓋取汗

治陰毒傷寒發汗黑聖散方

川烏頭 參兩每箇劈作四片 吳茱萸 六兩湯浸七遍焙乾

右先掘地作一坑子築合淨潔以大火燒
赤淨掃去灰然下茱萸次下烏頭安在上
面用好醋一大椀旋旋澆入坑子內以盡
為度後以瓦盆蓋之待冷取出搗細羅為
散每服以生薑熱酒調下一錢汗出立差

治陰毒傷寒頭痛心躁手足厥冷宜服此方

附子一兩炭火內燒令黑色勿令全過取出用盆子蓋之候冷細研

右件藥用水磨沉香一分煮稀粥飲不計

時候調下二錢衣覆取汗如人行十里未

有汗再服

治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨之方

吳茱萸一升○玉機微義不以多少

右以酒拌令勻濕以熟絹袋二枚盛蒸令

極熱取熨脚心候氣通暢勻暖即停熨後用

方澹寮方王氏集驗方衛生易簡方同敬義右為末溫酒和勻生絹袋盛之熱熨脚

心令通暢愈若以為湯煎洗接四肢亦可○聖濟總錄吳茱萸

湯洗焙乾參升右一味用溫酒浸令通濕以生絹

袋二箇盛蒸令極熱取茱萸袋子更牙熨

四肢前後心及手足心候氣通徹即止

治傷寒頭痛諸方

夫傷寒頭痛者是外中風邪上注腦中三陽

之脉受於風寒伏留不去則流傳於心肺故

使上膻壅滯心煩鼻塞壯熱頭痛也

治傷寒頭痛壯熱宜服石膏散方

石膏半兩○神巧萬全方麻黃一兩根節三分去桂心半兩細

辛兩半兩白木兩赤芍藥三分桔梗半兩去盧頭兩乾薑

半兩炮裂對○甘草一兩炙微赤對附子兩

萬全方一分○薄荷兩

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分葱白七寸豉五十粒煎至

六分去滓不計時候稍熱頻服

治傷寒頭痛心神煩熱四肢不利宜服黃芩

散方

黃芩兩麻黃一兩去根節赤芍藥三分石膏二兩廿

草半兩對桂心三分細辛三分前胡一兩對

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候稍熱服

治傷寒壅熱頭痛不可忍宜服此方

石膏二兩滑石一兩黃芩三分柴胡參分去苗赤芍藥

參分前胡參分去盧頭犀角屑參分甘草參分炙對杏

人雙參分湯浸去皮尖

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入淡竹葉三七片煎至五分去滓不計時候稍熱服

治傷寒壯熱頭痛煩躁無汗宜服厚朴散方

厚朴一兩去籬皮塗生 吳茱萸半兩湯浸

微炒甘草一兩多 附子一兩兩煎裂 陳橘皮一兩

湯浸去 麻黃一兩去 川大黃一兩兩煎 乾薑

半兩炮 前胡半兩去 蘆頭

右件藥搗羅為細散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去生薑不計時

候和滓稍熱服以衣覆取汗未汗再服

治傷寒頭痛心膈痰壅宜服旋復花散方

旋復花一兩 甘草半兩炙 甘菊花一兩 皂莢樹

白皮三兩塗酥 芎藭一兩

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

盞入荆芥七穗煎至六分不計時候和滓

熱服神功萬全方同

治傷寒痰壅頭痛心煩四肢拘急不得睡臥

類聚 四十七

九十七

宜服甘菊花散方

甘菊花兩半 旋復花兩半 防風一兩去蘆頭 芎藭一兩

蔓荆子兩半 細辛兩半 酸棗人兩一 葳蕤兩一 枳殼兩一

半兩麩炒 甘草半兩炙
微黃去蠟 甘草微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服

治傷寒汗後頭痛不解宜服此方

石膏壹兩 太陰玄精壹兩 麻黃二兩去根節 甘草半兩

炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服二錢以水一中

盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時

候溫服

治傷寒頭痛不止通頂吹鼻散方

藜蘆壹分去蘆頭 神瓜蒂參分 馬牙消參分

龍腦半錢 麝香半錢 方半錢 加半錢 細辛半兩

右件藥搗細羅為散研入龍腦麝香令勻

用少許吹入鼻中得嚏即差

類聚 四十七 九十七

治傷寒頭痛至甚不解方

藜蘆壹分 菰蘆皮一分

右件藥搗細羅為散吹少許入鼻中滴少黃水即差

治傷寒食毒諸方

夫傷寒食毒者由其人脾胃氣虛宿食不化因外傷風冷四肢不利身體雖不大熱心胃恒多壅悶吐逆上氣心腹脹滿小便赤色下利頻併診其脉緊數三部俱有此候乃為證

也

治食毒傷寒初得病身體不大熱心悶吐逆上氣小便赤色下利不止水穀不化宜服人

參散方

人參一兩去蘆頭 赤茯苓叁分 高良薑半兩剉 草薺

薏半兩 附子半兩炮裂去皮臍 陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙

細辛一分 甘草一分炙 子芩叁分 訶梨勒皮半兩

厚朴半兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

幾鼎四十七

卅七

盞入生薑半分煎至五分去生薑不計時
候和滓稍熱服神巧萬全方同

治食毒傷寒頭痛身不大熱心間駐悶大便

下利宜服此方

乾薑半兩炮裂剉 附子參分炮裂去皮臍 甘草半兩炙微赤剉

陳橘皮半兩易浸去白鄭焙 訶梨勒皮一兩 厚朴三分去麤

皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

盞煎至五分不計時候和滓溫服

治食毒傷寒心腹脹滿時復嘔吐增寒不下

飲食大小便秘澀宜服大腹皮散方

大腹皮一兩剉 川大黃壹兩剉碎微炒 木香半兩 桂心

半兩 白朮參分 川朴壹兩 厚朴三分去麤皮塗

熟

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治傷寒食毒腹脹氣短壅悶不下食四肢少

類聚 四十七

九十九

力宜服桂心散方

桂心壹兩當歸一兩剉炒大腹皮壹兩訶梨勒

用皮一兩煨川大黃一兩剉炒枳殼三分麩炒甘

草三分炙木香壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒食毒脾胃虛乏四肢少力不思飲食

心腹氣脹或時下利向晚增寒宜服木香散

方

木香半兩草薢半兩荳蔻半兩桂心半兩陳橘皮半兩

去白神麴一分微白木半兩葶苓半兩人參三分

去蘆甘草半兩炙柴胡半兩桃人三分湯

頭雙人麩厚朴三分去蘆皮塗生

炒微黃厚朴薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

治傷寒食毒腹脹喘急宜服檳榔散方

檳榔壹兩白木壹兩木香三分人參二兩訶梨

類聚 卷之七 十一

勒皮三分 陳橘皮壹兩湯浸去白 乾白 煎

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

盞入生薑半分棗三枚煎至五分去薑棗

不計時候和滓溫服

治傷寒食毒壯熱頭疼時復增寒四肢痠痛

口苦宜服白朮散方

白朮三分 附子三分炮裂去皮臍 乾薑半兩炮 桂心

參半兩 甘草微赤剉 川大黃三分生 木香兩 枳

殼半兩 微黃去瓢 炒

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

盞入生薑半分棗二枚煎至五分去薑棗

不計時候和滓溫服

治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食宜服赤茯苓

散方

赤茯苓兩 陳橘皮一兩湯浸去白 人參一兩去

白朮兩 五味子兩 木香兩 桔梗一兩去 厚

朴一兩 薑汁炙令香熟 生

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中

類聚四十七

百一

盞入生薑半分煎至五分去生薑不計時
候和滓温服

治傷寒食毒心腹脹氣急悶大小便不通宜
服此方

川大黃一兩到碎微炒赤芍藥一兩當歸半兩去木

香半兩川朴消枳殼半兩麩炒

右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞
入生薑半分煎至五分去滓不計時候温
服以利為度

治食毒傷寒心腹脹滿頭面徧身俱黃或時
增寒壯熱吐逆不下飲食大便秘澀小便如
血宜服木香丸方

木香一兩桂心一兩川升麻一兩白朮半兩川大黃

一兩到知母半兩厚朴一兩去麩皮塗生檳

榔壹兩川朴消

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

三十丸神巧萬
全方同

醫方類聚卷之四十七

類聚
四十七

百一