

消食化氣香殼散丸醒脾去積順氣化痰

青皮炒

陳皮炒各四兩

蘿蔔子炒

木香

三稜炒

蓬朮炒

神麴炒

麥蘖炒各一兩

枳殼炒二兩

半夏二兩

枳實炒一兩

香附子醋浸一兩半

檳榔

山楂

草昧各一兩

陳蒼朮

一升用巴豆二十粒炒黃色去巴豆不用

右為末醋糊合丸如梧桐子大每服四五十九
漸加至七八十九食後淡湯或白滾湯下

一方治食過飽滿悶

青橘皮

二兩湯洗去根炒黃

厚朴

一兩

硝砂

五錢

右作末濃煎茶調一二錢服乾恬服亦可常服

消食化氣醒酒

寬中丸治胸膈痞悶停滯飲食

山柎

不拘多少蒸熟晒乾

右為大作丸服

大安丸脾經消導之藥

山柎

二兩

神麩

炒

半夏

茯苓

各一兩

陳皮

蘿苳子

連翹

各五錢

白朮

二兩

麥芽

一兩

右為細末粥糊合丸服

濕益氣丸治傷濕食麩心腹滿悶肢躄沉重

枳實

炒

白朮

黃芩

各一兩

蘿苳子

炒熟去壳五錢

神麩

炒一兩

紅花

三錢

右為細末荷葉燒飯為丸如菜豆大每服五六

十九丸白湯下或姜湯下

一黃芩治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩 二兩

黃連 酒浸 一兩

升麻

柴胡 各三錢

甘草 二錢

枳實 二錢 炒

右為極細末湯浸蒸餅丸如菉豆大每服五七
十丸白湯下或姜湯下

阿魏丸 治脾胃怯弱過食肉麩生果之物停積中
焦不能尅化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘
並皆治之

百草霜 三錢

巴豆 去皮心膜 油七個

阿魏 酒浸 化

官桂 不見火

蓬朮 炒

麥蘖 炒

神麩 炒

青皮 去白

蘿苕子 炒

白朮

乾姜 炮各 五錢

右為末用薄糊合丸如菉豆大每服二十九不
拘時如麩傷用麩湯下生果傷用麩香湯下

秘方化滯丸 理一切氣化積奪造化有通塞之功
調陰陽有補瀉之妙久堅沉痼磨之自消暴積乍
留導之立去

南木香 堅實者 不見火 丁香 去苞 不見火

青皮 四花者 去穰

紅橘皮 水溫 去白

黃連 大者各 二錢半

京三稜 慢火 煨

莪朮

慢火煨各半夏麩揀白淨半夏研末搗生

二錢五分

前入味晒乾和研為細末

巴豆

去壳滾湯泡逐一研用好醋浸過一宿慢火熬至醋乾秤六錢

重研末將前藥末和再研勻入後烏梅肉膏巴豆若干止用四錢五分

烏梅

用肉厚者打碎去核細到火焙乾為細末秤五錢重用米醋調畧清慢火熬成膏和

入前藥

右前藥通和勻了用白麩八錢重水調得所慢

火調糊合充如粟大每服五七丸人盛者十九

五更空心用橘皮湯下常服磨滯不欲通泄

津液咽下停食飽悶枳壳湯下但有所積

物取本汁冷下因食吐不止津液咽下即止

食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下赤痢冷

甘草湯下白痢冷乾姜湯下心動石菖蒲

湯下赤白痢冷甘草乾姜湯下諸氣痛生

姜橘皮湯下小腸氣痛茴香酒下娘人血

氣當歸湯下若欲宣積滾姜湯下仍加丸

數未利再服利多飲冷水一口補住小兒量

歲數加減丸服痔積常服米飲不拘時下孕

婦勿服此藥得熱則行得冷則止

三黃枳朮丸 治傷肉食濕麪辛辣味厚之物填塞

一悶亂不安

黃芩 二兩

黃連

大黃 煨

神麪 炒

白朮

橘皮 各一兩

枳實 炒五錢

右為末湯浸蒸餅丸如棗豆大一倍每五十九

白湯下量其所傷以為加減

枳殼丸 治一切酒食傷胸膈閉悶疼痛飲食不

兩脇刺痛嘔逆惡心金皆治之

蓬莪朮 煨香熟 黑牽牛 炒

枳殼 蒸炒去灰

青皮 厚朴 去粗皮 姜汁製

人參 去蘆

茯苓 去皮 木香

陳皮 去白

白朮 各一兩 檳榔

大黃 煨 各二兩

半夏 湯泡 七次 麥藥 微炒

神麪 炒黃

三稜 各一兩 一方有乾生姜

右為末姜汁糊丸如梧桐子大每服三四十九

姜湯下常服美食

不香栝榔丸 治一切氣滯心腹痞滿腸腑急大
小便結滯不利者並亦服之

木香

栝榔

青皮

去白

枳殼

麩炒

廣茂

煨切

黃連

各一

黃栢

去粗皮

香附

大黃

各一

黑牽牛

生取頭末

右為末滴水丸如豌豆頭大每服三五丸食後

生薑湯送下加至以利為度

葛花解醒湯

治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸

膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻

砂仁

葛花

各五錢

木香

五分

青皮

三錢

陳皮

白茯苓

猪苓

人參

各一錢五分

白朮

神麴

炒

澤瀉

乾生薑

各二錢

右為細末和勻每三錢白湯調下但得微汗酒

病去矣

五苓散 見中暑類

益脾丸 治飲酒不醉又益脾胃

葛花 二兩
小豆花 一兩
藜蘆花 五錢

木香 二錢五分
一方加草豆蔻 一兩 去皮

右為末蜜合丸如梧桐子大紅花湯下十九丸或
夜飲津液下五丸最妙

葛花散 治飲酒不醉

葛花
小豆花 各一兩

右為末每服三錢 仍進葛汁及枇杷葉飲倍
飲酒無醉 又九月九日甘菊花亦能解酒為

末未飲時先服 又小豆花葉陰乾百日為末

服之亦可消酒

烏梅丸 消酒食

神麴 炒
烏梅
麥蘖

龍腦葉

右以甘草膏子為丸

不醉方

菘豆
赤豆
葛根 各等分

右為末當未飲酒前用冷水調一二匙服之令

飲無醉

瓜蒂散 治上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂也下部無脉此所謂木鬱也飲食過飽填塞胸中者大陰之分野經云氣口反大于人迎三倍食傷大陰故曰木鬱即達之吐者是也

瓜蒂

赤小豆

右二味爲極細末每服一錢溫漿水調下取吐爲度若不兩手尺脉絕無者不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以指探之如不得吐以物探之得吐則已如是食不得去者方用此藥去之

補脾丸 有脾虛而惡湯藥者製此丸用湯吞省口苦而爲便也

白朮

半斤

蒼朮

茯苓

陳皮

各三兩

芍藥

五錢

右爲末粥糊丸加潤下丸可作催生用上熱甚者加青金丸尤妙與此藥必無產患

潤下丸

見痰類

青金丸 見嗽類

生胃丹 生胃消痰沫開胸膈進飲食

粟米

四兩溫水浸透炊作飯焙乾乘熱用生姜自然汁和濕再焙乾如是法製過七次

天南星

三兩姜汁浸一宿次日用生姜自然汁和紙筋黃土泥包南星曬乾慢火炊半

日泥焦乾取出南星用藥

人參

白朮

茯苓

各二兩

陳皮

白苳蔻

硝砂

麥蘖

半夏麴

青皮

草澄茄

石蓮肉

各一兩

南木香

三錢

右為末米粉糊合丸如菉豆大每服五十九姜湯送下 廣按脾胃氣虛則不能運化水穀水

穀停積則為濕痰曰補氣曰消食曰燥濕痰三

者不可偏廢也此方中人參白朮以補氣麥蘖

砂仁以消食南星半夏以燥濕痰其餘茯苓滲

濕陳皮青皮利氣白苳蔻草澄茄開膈南木香

調氣石蓮肉清心可謂周而備矣肥白人氣虛

尤宜服之

天下受拜平胃散 治脾胃不和嘔吐痰水胸膈痞

滯不美飲食並治

厚朴 去皮

陳皮 湯洗存白

生姜

甘草 炙各三兩

茅山蒼朮 米泔水浸一宿去皮晒乾五兩到

南京小棗 二百枚去核

右用水五升煮乾搗作餅子晒乾再研為末每

服二錢鹽湯點送下泄瀉加姜五片烏梅二箇

水盞半煎服

干胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺

疼痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面

色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自利

或發癰亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

厚朴 製

橘皮 各五兩

蒼朮 米泔浸八兩

甘草

茯苓 各二兩

人參 二兩

每服水二盞生姜三片棗一枚煎去粗不拘時

溫服 一方棗肉丸小豆大每服五十九丸姜湯

下空心常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒

冷濕四時非節之氣

調胃散 治陰陽氣不和二焦痞膈五勞七傷山嵐

瘴氣

瘴氣入般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛腹肚脹
滿嘔吐惡心痰嗽手足虛腫五腫膈氣噎塞寒熱
水瀉諸痢脾胃不和飲食減少並皆宜服

藿香

甘草 炙

陳皮 去白

厚朴

去皮每兩用姜一兩製

半夏麴

每兩用生姜三兩半製

右五味各二兩同為細末每服四錢水一盞生

姜三片煎至半盞食後溫服

六君子湯 治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱

未不得者

人參

白木 各一兩

橘紅

半夏

湯泡七次

枳殼

去根麩炒

甘草

炙五錢

茯苓

一兩

每服一兩生姜七片棗一枚水二盞煎去粗溫

服

橘皮枳朮丸

治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑

不調心下痞悶 方見痞類

半夏枳朮丸 治因冷食內傷

白朮

枳實 麩炙

半夏

湯泡七次各半斤

王氏地神醫學正傳
右為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五
十丸白湯下

木香乾姜枳朮丸 破除寒滯氣消寒飲食

木香 三錢

乾姜 五錢 泡

枳實 一兩 炒

白朮 一兩 五錢

右為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五
十丸溫水送下食前服

木香人參生薑枳實白朮丸 開胃進食

木香 三錢

人參 三錢 五分

乾生薑 一錢 五分

枳實 一兩 炒

白朮 一兩 五錢

橘皮 四錢

右為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服三
五十丸溫水送下食前服

藿香安胃散 治脾胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐
熟

熟

藿香

丁香

人參 各二錢 五分

橘紅 五錢

每服生薑三片煎不拘時溫服

和中丸 治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或

澹此胃氣虛也常服則和中理氣消痰去濕厚腸
進飲食

厚朴 製一兩

白朮 一兩二錢

半夏 製一兩

陳皮 去白八錢

檳榔 四錢五分

木香 二錢五分

甘草 炙二錢五分

枳實 炒三錢五分

右為末姜汁浸餅為丸如梧桐子大每服三五

十九丸溫水下

枳確二陳湯 理脾胃順氣寬膈消痰飲

確仁 枳實 茯苓

半夏 陳皮 甘草 炙各等分

每服六錢水一盞半姜五片煎八分溫服

橘皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓 去皮 橘皮 去白 枇杷葉 去毛

麥門冬 去心 青竹茹 半夏 湯泡各一兩

甘草 炙 人參 各三兩

每服四錢水一盞姜五片煎不拘時服

八珍湯 和血氣理脾胃

當歸 赤芍藥 川芎

熟地黃

人參

白茯苓

甘草

砂仁

每服三錢水一盞姜七片棗三枚煎空心溫服

草豆蔻丸

治傷飲食卒心痛甚効或秋冬傷寒冷

之物胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通飲食

不下

草豆蔻

麵果煨

枳實

麩炒黃色

白朮

各一兩

麥蘖麴

炒黃色

半夏

湯洗

黃芩

去朽酒炒

神麴

炒黃色各五錢

乾姜

泡

橘紅

青皮

炒各二錢

炒鹽

五分

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服五十

丸白湯送下

如冬月不可用黃芩歲火不及

及傷冷物加以溫劑是其治也然亦有熱物傷

者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知也

枳實導滯丸

治傷濕熱之物不得施化而作痞滿

及悶亂不安

大黃

一兩

枳實

去根麩炒

神麴

炒各五錢

茯苓

去皮

黃芩

去朽

黃連

熟地黃

人參

白茯苓

甘草

砂仁

每服三錢水一盞姜七片棗三枚煎空心溫服

草薺九 治傷飲食卒心痛甚効或秋冬傷寒冷

之物胃脘當心而痛上支兩脇痛膈噎不通飲食

不下

草豆蔻 麵裹

枳實 麸炒

白朮 各一兩

麥蘖麴 炒黃

半夏 湯泡

黃芩 去朽

神麴 炒黃色

乾姜 泡

橘紅

青皮 炒各二錢

炒鹽 五分

右為細末湯浸蒸餅為丸如棗豆大每服五十

丸白湯送下 如冬月不可用黃芩歲火不及

及傷冷物加以溫劑是其治也然亦有熱物傷

者從權以寒藥治之隨時之宜不可不知也

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不得施化而作痞滿

及悶亂不安

大黃 一兩

枳實 去根

神麴 炒各五錢

茯苓 去皮

黃芩 去朽

黃連

白朮

各二錢

澤瀉 二錢

或加枳榔木香各二錢名木香道滯丸

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服七八十丸溫水送下食遠量強弱加減丸數以利爲度

白朮丸 治傷濕粉濕麪油膩之物

白朮

六兩

枳實 炒

半夏

泡洗七次

神麪

炒各五錢

橘紅 七錢

黃芩

炒五錢

白礬

枯三分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服六七十丸白湯送下量所傷加減丸數因素食多用椒姜故用黃芩以瀉之

木香見睨丸

治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

神麪

炒

京三稜

煨各一兩

草豆蔻

麪裹

香附子

各五錢

升麻

柴胡

各三錢

木香

一錢

巴豆霜

五分

石三稜

五錢去皮煨

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三十丸白湯送下量所傷加減服之

三稜消積丸 治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜 醋煮 廣木 醋煮 神麴 炒各七錢

淨清皮 巴豆 去心膜及殼炒去油 茴香 炒

陳皮 去白各五錢 丁香 益智 去殼各三錢

右為細末醋調麴糊為丸如梧桐子大每服十

丸加至二十九食前生姜湯送下量虛實加減

如更衣止後服

備急大黃丸 治心腹諸卒暴痛

大黃 巴豆 去皮膜及油 乾姜 各等分

右為細末煉蜜和搗為丸如小豆大每服二丸

以利為度

加味二陳湯 導痰補脾消食行氣

橘紅 茯苓 各七分 半夏 湯泡洗一錢

甘草 炙三分 川芎 蒼朮

白朮 各八分 山查肉 一錢五分 砂仁 五分

神麴 炒四分 香附子 一錢 麥蘖麴 炒五分

右除神麴麥蘖麴另包細研炒餘細切作一服

加生姜三片大棗一枚水二盞煎調神麴麥蘖

入內服

祖傳經驗遡源散

凡傷食物致惡寒發熱久不愈或傷寒後食諸物致食腹潮熱不已必先問其先食何物所傷或糍糒或肉食則以原食之物燒存性一兩重細研為末別用生菲菜連根約一束杵汁調服過一二時以東垣枳實道滯丸百餘粒催之其所傷之宿食即下退熱而愈

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐瀉

利其大病後補助脾胃此藥極妙

人參

白朮

白茯苓

乾山藥

白扁豆

去殼姜汁浸炒一兩五錢

甘草炙

桔梗

去蘆

薏苡仁

蓮肉

以上各一兩

家傳治禁口痢用石蓮肉又加石菖蒲一兩有氣加木香五錢

右為細末每服二錢棗湯調下噤口痢用粳米

湯休息痢用砂糖湯調下

別方有磁砂一兩

中暑

論

內經曰因于暑汗煩則喘渴靜則多言潔古又曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者陰証中熱者陽証又曰暑熱之時無病之人或避暑于深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形俱急肢節疼痛而煩心肌膚大熱出汗爲房室之陰寒所遏便周身之陽氣不得伸越大順散等熱藥主之若行人或農夫於日中勞役得之名曰中熱其病必苦頭

痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄
無氣以動乃爲大熱外傷肺氣蒼朮白虎等涼劑主
之王安道曰暑熱之氣一也皆夏月中傷其邪而爲
病焉豈以一暑熱分陰陽二証而名之卽其避暑于
深堂大厦及恣食藏冰瓜果品寒涼之物正經所謂
口得寒物身犯寒氣之病耳自當同秋冬卽病陰証
傷寒處治不可名中暑也此論固是抑亦有未悉之
言也與愚按仲景傷寒論中一証曰中暍卽中暑也
而微弱煩渴引飲體熱自汗此蓋得勞役體虛而
暑邪干衛之候是宜東垣清暑益氣湯等補之劑而
治之可愈一証曰熱病卽中熱也脉洪而緊盛頭疼
身熱口燥心煩此蓋得之于冬感寒邪鬱積至夏而
發乃挾暑而成大熱之候是宜黃連白虎解毒等湯
清涼之劑調之而愈曰中暑者陰証內傷之爲病也
曰中熱者陽証外感之爲病也曰陰曰陽豈不於斯
而明辨之乎學者宜再思之

脉法

經曰脉虛身熱得之傷暑

脉弦細朧遲

許學士云傷暑其脉弦細朧遲何也

傷形則氣消而脉虛所謂弦細朧遲皆虛脉也

仲景以弦為陰朱弦亦曰中暑脉虛細弱暑脉

脉虛而微弱或浮大而散或隱不見

微弱隱伏虛皆虛類也

知矣

方法

丹溪曰夏月陽氣盡出于地人之腹屬地氣傷氣于

此時浮于肌表腹中之陰虛矣夏月伏陰在內此

陰字有虛之義若作陰冷看誤矣古人治暑有用

大順散等劑蓋以涼亭水閣寒涼冰雪之傷不用

溫劑病何由安非為伏陰而用也火令之時流金

爍石何陰冷之有孫真人制生脉散令人夏月服

之非虛而何

暑證用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓散等藥有

挾痰者加南星半夏之類有挾虛者加人參黃芪

之類

戴氏曰暑有冒有傷有中三者輕重之分或腹痛水

瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲二者冒

暑也可用黃連香薷飲黃連退熱香薷消暑氣或

身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為熱傷
在肉分也當以解毒白虎等湯加柴胡氣虛加人
參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉微者熱在肺經
火乘金也此為中暑宜用清肺湯柴胡天水散之
類急治則可

清暑益氣湯

治長夏濕熱大勝人感之多四肢困

倦精神短少懶于動作胸滿氣促肢節煩疼或氣
高而喘身熱而煩心下痞滿小便黃而數大便溏
而頻或泄黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲
食自汗體重或汗少者血先病而氣未病也其脉
中得洪緩若濕熱相搏必加以遲病雖互換少
差其脉暑濕今則一也宜以清涼之劑治之

黃芪

汗少一錢

蒼朮

一錢五分

升麻

一錢

人參

白朮

陳皮

神麴

炒

澤瀉

各五分

甘草

炙

黃柏

酒浸炒

川歸

青皮

麥門冬

甘葛

各三分

五味子

九粒

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

王氏神醫學正傳 卷之二
黃連香薷飲治證同前以前方去扁豆加黃連七分半也

十味香薷飲

香薷 一錢

人參

陳皮

白朮

白茯苓

白扁豆 炒

黃芪

木瓜

厚朴 各七分姜汁製炒

甘草 炙二分

每服水二盞去粗溫服

桂苓甘露飲

桂心

人參

黃芪

茯苓

白朮

甘草

葛根

澤瀉

石膏

寒水石 各一兩

滑石 一兩火煨另研

木香 一錢

右為細末每服三錢白湯調下

五苓散 方見傷寒門 本方加茵陳名茵陳五苓散

治濕熱發熱黃證最捷

大順散

甘草

乾姜

杏仁 湯煮去皮尖炒

肉桂

各等分

右先將甘草用白砂同炒次入姜却下杏仁炒過篩去砂同桂研爲細末每服二錢白湯調下王安道曰大順散本爲冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕嘔吐水穀不分臟腑不調所立故甘草乾姜皆經火炒又肉桂而非桂枝蓋溫中藥也內有杏仁不過取其能下氣耳若以此藥治靜而得之之證吾恐不能解表反增內煩矣愚按內經必先歲氣無伐天和其暑月豈可用此熱藥此方雖錄于此不可輕用

生脉散

人參

五味子

麥門冬

去心

右細切水煎夏月時時代熱水飲之孫真人曰夏月必服五味子以補五臟氣東垣曰夏月服生脉散加黃芪甘草令人氣力湧出

玉露散

治暑渴

寒水石

滑石

石膏

栝萸根

各二兩

甘草

一兩

右為細末每服五錢新水調服

枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目

昏眩

枇杷葉 去毛 炙 三兩 香薷 七錢 五分 白茅根

麥門冬 去心 甘草 炙 乾木瓜 各一兩

丁香 陳皮 去心 厚朴 去皮 姜汁炙

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎服 如止

渴躁去丁香加知母冷水調下

生津止渴

人參 三分 體熱者減半 麥門冬 二錢 去心 五味子 十二粒

細切水煎服 加茯苓 一錢 五分

人參白虎湯 治伏暑發渴嘔吐身熱脈虛自汗

人參 一錢 五分 知母 二錢 石膏 五錢

甘草 炙 一錢

右細切入粳米一合水二鍾煎至一半不拘時

熱服 如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎

服 伏熱後及冷水沐浴或喫冷物清氣在脾

不覺日晡作寒慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服

出汗便解

五物香薷飲

驅暑和中通用

香薷

去土二兩

白扁豆

姜汁炒

厚朴

去皮姜製炒

白茯苓

去皮各一兩半

甘草

五分

每服五錢水二鍾煎去粗溫服

縮脾飲

消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁

四兩

乾葛

二兩

白扁豆

二兩

烏梅肉

草菓

炒去殼

甘草

炙各四兩

一方無乾葛有乾姜

每服四錢水一大碗煎七分以水沉冷服

六和湯

治心脾不調氣不升降癰亂轉筋嘔吐泄

瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體

浮腫嗜臥倦怠小便赤澁并傷寒陰陽不分冒暑

伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎產中

亦可服之

縮砂仁

半夏

湯泡七次

杏仁

去皮尖

人參

甘草

炙各一兩

赤茯苓

去皮

藿香葉

去土

白扁豆

姜汁略炒

木瓜

各二兩

香薷

厚朴

姜汁製
各四兩

每服一兩生姜三片棗子一枚煎溫服

五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛癰亂吐瀉小便赤

澀少 如心神恍惚加辰砂如桂分兩又名辰砂

五苓散

加味五苓散 治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或

煩或渴或小便不利

赤茯苓

去皮

澤瀉

猪苓

去皮

白朮

各一兩

官桂

不見火

車前子

各五錢

每服四分水一鍾姜五片燈心十莖煎八分不

拘時服

暑病治例

王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也

夏月人感之自口齒而入傷心包絡之經其脈虛

或浮大而散或弦細芤遲益熱傷氣則氣消而脈

虛弱其為症汗煩則喘渴靜則多言身熱而煩心

痛大渴引飲頭痛自汗倦怠少氣或下血發黃生

斑甚者火熱制金不能平木搖撼不省人事治暑

之法清心利小便最好暑傷氣宜補真氣爲要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省而爲霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉痢此則非暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然而治法有不同也

若行人或農夫于日中勞役得之者是動而得之陽證也其病必主頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚火熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類

若暑熱之時無病之人或避暑熱納凉于深堂大厦涼亭水閣大扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必主頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而心煩肌膚大熱無汗此爲陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷冰水生冷瓜果之類前藥再加乾姜硝砂神麴之屬此非治暑也治因暑而致之病也

若外不受寒止是內傷米水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲或理中湯加神麩麥芽硝砂蒼朮此專治內溫中消食也

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑之藥多用溫脾消食治濕利小便之藥學者要識此意

若既傷暑熱又復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次治其外清暑補氣而以理脾爲主于前陰陽二條內相兼用東垣清暑者益氣湯已兼此意其用黃芪升麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃栢葛根是清暑補氣也蒼朮神麩陳皮澤瀉青皮是治內補脾也

祖傳經驗秘方

凡人于夏月冲斥道途或于田野中務農作勞或肥日氣虛之人不能抵當暑熱忽然昏悶運仆其氣將絕如在日中卽當移病者于陰處徐徐以溫湯水灌之如未甦急救氣海穴以復其元氣醒後以大劑滋補之藥補之切不可灌以凉水卽死

愚按內經有曰陽氣者煩勞則張精絕辟積于夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聞憤憤乎若壞都汨汨乎不可止是則中暑運厥之候也

濕證

論

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕勝則濡泄地之濕氣感則害人皮肉筋脉原病式曰諸瘧強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重跗腫肉如泥按之不起皆屬于濕夫濕之爲病所感不同有從外感而得之者有從內傷而得之者若居處卑濕之地與夫道途衝斥風雨或動作辛苦人汗沾衣裳皆濕從外感者也或恣飲食酒漿醴酪多食柑橘瓜果之類皆濕從內

傷者也。大抵宜發汗利小便，使上下分消其濕。是其治也。經又曰：因如濕首如裹，濕熱不攘，大筋緜短，小筋弛長，緜短爲拘，弛長爲痿。因于氣爲腫，四維相代。陽氣乃竭。丹溪釋曰：濕者土之氣，首者爲諸陽之會，其位高，其氣清，其體虛，故聰明係焉。濁氣薰蒸，清道不通，故沉重不利。似乎有物蒙之，失而不治，濕鬱爲熱，熱留不去，則傷血，不能養筋，故爲拘攣。濕傷筋，不能束骨，故爲痿弱。王註曰：素嘗氣疾，濕熱加之，氣濕熱爭，故爲腫也。邪氣漸盛，正氣漸微，陽氣衰，水致邪代正氣，不相通，故四維發腫。諸陽受氣于四肢也。但今人見膝間關節腫痛，全以爲風，治者多誤。失學者宜詳察之。

脉法

脉經曰：濕家爲病，一身盡疼，發熱而身色似薰黃也。脉浮而緩，濕在表也；脉沉而緩，濕在裡也。或弦而緩，或緩而浮，皆風濕相搏也。

方法

丹溪曰：六氣之中，濕熱爲病，十居八九。

濕在上宜微汗而解經曰濕上甚而熱治以苦温
佐以甘辛以汗爲故而止也不欲汗多故不用
麻黃乾葛等劑

濕在中下宜利小便此淡滲治濕也一云濕在下
宜升提之

濕有自外而入者有自內得者陰雨濕地皆從外
治宜汗散久則踈通滲泄之

蒼朮治濕上下部俱可用一云上焦濕用蒼朮其
功甚烈

陳湯用酒苳羌活蒼朮木通散風行濕最妙

匱防已黃芪湯治風濕脉浮身重汗出惡風或周
身疼痛

防已

三錢

甘草

一錢

白朮

二錢

黃芪

三錢
五分

右作一服生姜三片大棗二枚水二大盞煎至

一盞去粗温服

喘者加麻黃 胃氣不和加

芍藥

氣上冲加桂枝

下有寒加細辛、濕

勝身重陽微中風則汗出惡風故用黃芪炙甘

草以實表防已白朮以勝濕

甘草附子湯 治風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫而痛者

甘草 炙二錢

白朮 二錢

附子 一錢五分

桂枝 四錢

每服水煎金匱方桂枝加生姜大棗名白朮附子湯

五苓散治濕勝身痛小便不利體重發渴

本方中加羌活一倍是也

防風羌活湯 治風濕相搏一身盡痛

羌活 七分

防風

升麻

柴胡 各五分

藁本

蒼朮 各一錢

每服白水二盞煎至一盞去粗溫服

羌活勝濕散 治脊痛項強肩背俱疼不可回顧此手大陽氣鬱而不行以風藥散之腰似折項似拔此足大陽經不通行此藥主之

羌活

獨活 各一錢

藁本

防風

甘草 炙

川芎 各五分

蔓荆子 三分

每服水二盞煎去粗食前溫服 如身重腰痛沉

沉然經中有寒濕也加酒洗漢防已五分輕者附

子五分重者川烏五分

茯苓滲濕湯 治濕鬱成黃疸寒熱嘔吐而渴身體

面目俱黃小便不利不思飲食不能安臥

黃芩

黃連

梔子

防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳實 各四分

赤茯苓

澤瀉 各五分

茵陳 六分

猪苓

去黑皮一錢

每服白水煎溫服

茵陳五苓散 治濕熱大甚黃疸發熱五苓散內加

茵陳一倍即是也

一方治風濕相搏 若常服能壯筋骨明目

蒼朮一斤米泔浸竹刀刮去皮曬乾為片以半

斤用童便浸一宿半斤用酒浸一宿焙乾為末

每服一錢空心益湯或酒調下

生附湯 治受濕腰痛腿腫

附子 生二分

蒼朮 炒

杜仲 姜炒五錢

牛膝 酒浸焙

厚朴 姜製

乾姜 生

白朮

茯苓 去皮

甘草 炙各二錢五分

每服五錢姜三片棗一枚食前煎服

除濕湯

治寒濕所傷身體重著脚腰酸疼大便澹

泄小便或澀或利

半夏 麩炒

厚朴 姜製

蒼朮 米泔製各二兩

藿香葉

陳皮 去白

白茯苓 去皮各一兩

甘草 炙七錢

白朮 生用一兩

每服五錢水一盞姜七片棗一枚煎食前溫服

茯苓湯 治脾氣不實手足浮腫小便赤澀氣急喘

滿

赤茯苓

澤瀉

香附子

陳皮

桑白皮

大腹皮

乾姜 各等分

每服一兩水二鍾煎去粗不拘時溫服

消腫丸 治水腫喘滿小便不利

白朮

黑牽牛炒

滑石

陳皮

各一錢五分

木通

茯苓

去木

半夏

湯泡七次

通脫木

木香

各一錢二分五厘

茯苓

瞿麥穗

丁香

各五錢

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸燈草

麥門冬湯下

三花神佑丸

治一切水濕腫病大腹實脹喘滿

輕粉

一錢

大黃

一兩

牽牛

二兩

芫花

醋半炒

甘遂

大戟

各五錢

右為末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸

溫水下無時日三服

大安丸

治脾胃有濕飲食減少

見傷食

經驗白朮酒

治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉

痛難席

白朮

一兩

右細切作一服用無灰老酒一盞半煎至一盞

去粗溫服

丹溪活套云濕本爲土氣火熱則能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱則生濕也因濕生痰故用二陳湯加酒芩羌活防風去風行濕蓋風藥能勝濕也大抵治濕宜利小便爲上策故曰治濕不利小便非其治也 如一身盡痛或無汗是濕流關節邪氣在表宜五苓散加羌活蒼朮以微汗之不可大汗恐汗去而虛濕仍在也若自汗多者宜白朮甘草湯 若小便自利清白大便泄瀉身痛自汗此爲寒濕宜五苓散加生

附蒼朮木瓜 如風濕身痛微腫惡風宜杏仁湯
官桂五錢天門冬片藥麻黃各二錢五分杏仁七箇水三盞姜十片煎分二服 又治濕消腫脹利小便健脾胃葶藶木香散葶藶子茯苓猪苓白朮各一兩木香澤瀉木通甘草桂枝各五錢滑石三兩爲末湯調服

然已上諸方乃畧示其端倪耳全在活法加減而用之不可執一而論也夫治濕者固當以參朮爲君以補脾爲主治然亦有濕盛氣滿膨脹者又當

以利水行氣爲先補脾藥又未可遽用或以參朮
爲君而利水藥爲臣使或以朮通澤瀉葶藶車前
子等利水藥爲君而以茯苓白朮人參等補脾藥
爲臣使有本而標之者亦有標而本之者看緩急
而施治之則萬舉萬全之功可立而待也

燥證

論

內經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥原病式曰經
云風熱火同陽也寒燥濕同陰也又燥濕少異也然
燥金雖屬秋陰而異乎寒濕而反同其風熱也故火
熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱能耗液而反寒
陽實陰虛則風熱勝于水濕而爲燥也凡人風病多
因熱甚而風燥者爲其兼化以熱爲其主也蓋肝主
于筋而風氣自甚又燥熱加之則筋大燥也燥金主

于收斂其脉緊澁故爲病勁強緊急而口噤也或病燥熱大甚而脾胃乾涸成消渴者或風熱燥甚佛鬱在表而裡氣平者或善伸數欠筋脉拘急或時惡寒筋惕而搐又或風熱燥併而鬱甚于裏故煩滿而或秘結也及風癰之發作者由熱甚而風燥爲其兼化涎溢胸膈燥燥而痲痺昏冒僵仆也凡此諸證皆由熱甚而生風燥病各有異者由風熱燥各微甚不等故也所謂中風筋緩者因其風熱勝濕而爲燥之甚也然筋緩不收而痿痺故諸臍鬱病痿皆屬于肺金燥之化也如秋深燥甚則草木萎落而不收病之象也是以掌得血而能握足得血而能步夫燥之爲病者血液衰少不能榮養百骸故若是也學者不可不知

脉法

脉緊而澁 或浮而弦 或芤而虛

方法

丹溪曰皮膚皴揭拆裂血出大痛或肌膚燥癢皆火燥肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎加麥門冬

人參天花粉黃栢五味之類治之

瓊脂膏 治血虛皮膚枯燥及消渴等證

鹿角膠 一斤

生地黄

二十斤洗淨細搗取真汁去粗

白沙蜜

二斤煎一二沸掠去上沫淨而止

真酥油

一斤

生姜

二兩搗取真汁

右先以文武火熬地黄汁數沸以絹摠取淨汁

又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎良

久候稠如錫以磁器收貯每服一二匙空心温

酒調下

瓊玉膏 治證同前及肺熱咳嗽甚者

方見咳嗽門

天門冬膏 治血虛肺燥皮膚拆裂及肺痿咳膿血

證

天門冬

新掘者不拘多少

右一味淨洗去皮心細搗絞取汁澄清以布摠

去粗滓用銀鍋或沙鍋慢火熬成膏每用一二

匙空心温酒調服

地仙煎 治諸燥證

山藥

一斤細杵

杏仁

一斤去皮尖

生牛乳汁

二觔

右將杏仁研細入牛乳山藥拌勻絞取汁用新
磁瓶密封重湯煮一日每服一二匙空心溫酒
或湯調下

和血益氣湯 治口燥舌乾便數舌上赤裂此藥生
津液除乾燥生肌肉 方見消渴門

當歸潤燥湯 治消渴大便秘澁乾燥結硬兼喜溫
飲陰頭退縮舌燥口乾眼澁難開等證 方見消渴

生津甘露湯 一名清涼飲子 治消中能食而瘦
口舌乾燥自汗大便結燥小便頻數

生津甘露飲子 治消渴諸燥証

辛潤緩肌湯 治諸燥饑渴及皮膚燥濕等證

以上三方俱見消渴門

潤燥湯 治大便秘燥結腸胃枯澀等證

潤腸丸 治大便秘燥閉結不通潤燥和血

活血潤燥丸 治大便秘血秘常常燥結

潤腸湯 治大腸結燥不通

以上四方並見大便結燥門

通幽湯 治大便秘燥治在幽門以辛潤之

甘草 炙

紅花 各一分

生地黃

熟地黃 各一錢

升麻

桃仁泥

當歸身 各一錢

每服水煎調枳榔末五分稍熱服之

生血潤膚飲 治原體瘦弱血少得燥證皮膚挺裂

手足枯燥搔之屑起血出痛楚十指甲厚反而莫

能搔癢

川歸身 酒洗

生地黃

熟地黃 酒洗

黃芪 各一錢 蜜炙

天門冬 一錢 五分

麥門冬 去心 一錢

五味子 九粒

片苓 去粉 洗五分

栝萎仁 五分

桃仁泥 五分

酒紅花 一分

升麻 二分

每服水一盞煎至一盞溫服如大便結燥加麻

仁郁李仁各一錢

潤體丸 治大腸結澀小便赤澀

郁李仁

大黃

桂心

黑牽牛

當歸

黃柏

枳殼 各半 兩

右為細末水丸如梧桐子大每服三四十九溫

五行故謂之君以位而言生于虛無字位稟命因動
而見故謂之相天主生物故恒于動人有此生亦恒
于動其所以恒于動者皆相火之爲也云云又曰五
者之性爲物所感不能不動謂之動者卽內經五火
也相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起于
妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則
死愚按心爲君火而又有相火寄于肝腎二臟卽內
經一水不能勝二火也五性之火爲物所感而動卽
內經一水不能勝五火也夫五行之理天人所同知
乎此則造化陰陽洞明于胸臆之間又能灼知其火
邪之虛實或補或瀉用藥以平之則愈疾之功如射
之中鵠矣學者其可忽諸

脉法

脉浮而洪數爲虛火 脉沉而實大爲實火

洪數見于左寸爲心火見于右寸爲肺火見于左
關爲肝火右關爲脾火兩尺爲腎經命門之火
男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也

方法

丹溪曰陰虛火動者難治

實火可瀉黃連解毒之類 虛火可補參朮生甘

草之類

謂之實者邪氣實也
謂之虛者正氣虛也

鬱火可發當看

何經 風寒外來者可發輕者可降重則從其性而升之

凡火盛者不可驟用寒涼必須溫散

火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可

人壯氣實火盛顛狂者可用正治硝黃水水之類

人虛火盛狂者以生姜湯與之若投以冰水之類

治必死

有補陰則火自降炒黃柏熟地黃之類

凡氣有餘便是火氣從左邊發者肝火也氣從臍

下起者陰火也

愚按氣有餘者非真氣也五志厥陽之火動而

爲邪氣也

飲酒人發熱者難治不飲酒人因酒發熱者亦難

治也

輕手按之熱甚重手按之不甚此熱在肌表宜清

之地骨皮麥門冬竹茹之類

重手按之熱甚烙手輕手按之不覺熱此病在肌膚之內宜發之東垣升陽散火湯火鬱湯之類煩燥者氣隨火升也

木通下行瀉小腸火 人中白瀉肝火

尿缸岸也
秋石亦是

黃芩黃連以豬膽汁拌炒能瀉肝膽之火

黃連加細辛瀉膀胱之火

青黛能瀉五臟之鬱火

玄參能瀉無根之遊火

小便降火極速山梔子能降火從小便中泄去其性能屈曲下行人所不知

人有氣如火從脚下起入腹者此虛極也蓋火起于九泉之下也此病十不救一治法以四物湯加降火藥服之外以附子末津調貼腳心湧泉穴以引火下行

愚按此條言猶有未悉者如果勞怯陰虛之人有此固當作陰虛治若壯實之人有此則是濕鬱成熟之候也愚嘗冒雨徒行衣濕得此證以

蒼朮黃柏加牛膝防已等藥作丸服之而愈後
累醫數人皆驗若作陰虛治即成痿證劇矣

左金丸 一名回令丸 治肝火

黃連 六兩 吳茱萸 一兩湯泡浸半時許焙乾用

右為細末粥丸煎白朮陳皮湯下

大補丸 治陰火

黃柏 去粗皮細切用新瓦盛鹽酒炒褐色

左為細末粥丸或水丸煎四物湯送下又云氣

虛四君子湯血虛四物湯送下

抑青丸 治肝火

黃連 不拘多少

右為細末粥丸白湯送下

石膏丸 瀉胃火併食積痰火

石膏 煨

右為細末醋丸菘豆大清米飲送下

四物湯加白馬脛骨降陰火代苓連用

陰虛發熱四物湯加炒黃柏酒知母乃降火補陰之

妙劑甚者加龜板兼氣虛加參芪白朮

手熱屬熱鬱當用火鬱湯或用梔子香附白芷半
夏川芎麩糊為丸服

火鬱湯 治四肢熱及五心煩燥因熱伏土中或血
虛得之或胃虛多食冷物抑遏陽氣于脾土之中

羌活

升麻

葛根

芍藥

人參

柴胡

甘草

防風

葱白

每服細切用水一盞半入內煎至一盞多稍熱

而服

升陽散火湯

治男子婦人四肢發困熱筋骨間熱

肌表熱如火燎捫之烙手此病多因血虛而得之

或胃虛過食冷物鬱遏陽氣于脾土之中火鬱則

發之

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍藥

人參

甘草

柴胡

防風

生甘草

右作一服加生姜三片白水盞半煎至一盞熱

服忌生冷等物

瀉陰火升陽湯 治肌膚煩熱面赤食少喘咳痰盛

右關脉緩弱或弦或浮而數

羌活

甘草 炙

黃芪

蒼朮

各一分

升麻

八分

柴胡

去蘆 一錢

人參

黃芩

各七分

黃連

酒炒 五分

石膏

五分 秋冬勿用

每服水二盞煎至一盞溫服

滋腎丸 降腎火

黃柏

二兩 火炒陰乾

知母

二兩 去毛 酒浸陰乾

肉桂

一錢 去粗皮

右二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下

焦火也桂與火邪同體故以寒因熱用凡諸病

在下焦皆不瀉也右為細末以熱水丸百沸湯

送下

涼膈散

大黃

酒浸紙裹煨

朴硝

甘草

各五分

連翹

一錢

梔子

黃芩

薄荷

各二分 五厘

淡竹葉

五斤

右每服水一盞煎至八分入蜜一匙和勻服
三補丸瀉三焦火

黃芩

黃連

黃栢各等分

右為細末新水水丸服

紫雪 治內外煩熱不解口中生瘡顛狂吐走解諸

熱毒邪熱小兒驚癇等証

黃芩

十兩

寒水石

磁石

石膏

滑石

各二斤研

已上用木一石煮至四斗去粗入下項藥

甘草

炙八兩

青木香

生犀角屑

羚羊角屑

沉香

各五兩

丁香 一兩

升麻

玄參

各一斤

已上再煮至一斗五升入下項藥

硝石

二斤芒硝亦可

朴硝

十斤擇淨者

已上入前藥汁中微火煎柳枝不住手攪候有

七斤投放水盒中半日入下項藥攪令勻

硃砂

三兩

當門子

即麝香一兩二錢半

右煎成霜雪紫色每服一錢或二錢凉水調下

大人小兒臨時以意斟酌加減多寡服之並于食後服

馮心湯 治心經蘊熱

右以黃連一味為細末水調服之

千金麥門冬湯 治諸病後火熱乘肺欬唾有血胸

脇脹滿上氣喘急羸瘦五心煩熱渴而煩悶

麥門冬 去心 桑白皮 蜜炒 生地黃 各七分

半夏 湯泡七次 去皮臍 紫苑茸 桔梗

淡竹葉 麻黃 各五分 五味子

甘草 各三分

每服加生姜三片煎溫服

愚按此方既曰病後火熱乘肺麻黃其可用乎曰渴而煩悶半夏亦不用可也宜去此二味加

貝母天門冬方為穩當也

梔子仁湯 治潮熱發狂煩燥面赤咽痛

梔子仁 赤芍藥 大青

知母 各五分 升麻 黃芩

石膏 各一錢 杏仁 七分半湯煮去皮尖 柴胡 一錢二分

生甘草 一錢

豆豉 五十粒

每服水二盞煎至八分去粗溫服

當歸龍薈丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋

惕搖擗神昏不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉痲痺

胸膈咽嗑不利腸胃燥澁躁擾狂越罵詈驚駭火

熱等証

當歸

龍膽草

梔子仁

黃連

黃柏

黃芩 各一兩

大黃

青黛

蘆薈 各五錢

木香 一錢

麝香 五分

右為細末煉蜜丸如小豆大每服二十九姜湯

送下

二黃丸 治三焦火盛消渴不生肌肉

大黃

黃連

黃芩 各等分

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服五丸漸加

至十丸白湯送下服至一月行及奔馬

未胡飲子 治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來

蓄熱寒戰及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾

煩渴或下後熱未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽
婦人餘疾產後經病

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥

各五錢

右為末每服炒三錢水一鍾生姜三片煎至七
分溫服日三服病熱甚者加服之

風通聖散

方

中風

清心湯

即涼膈

內加黃連五錢用蜜與竹葉

同煎

連翹

山梔子

大黃

薄荷葉

黃芩

各五錢

甘草

一兩五錢

朴硝

二錢五分

加黃連

五錢

右為細末每服五錢水一盞蜜少許竹葉十片
同煎七分溫服

洗心散

治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼澁多

淚大便秘經小便赤澁

白朮

一兩五錢

麻黃

和節

當歸

去蘆洗

荆芥穗

芍藥

甘草

大黃

麴製煨去麴切焙八錢

右為末每服二錢水一盞生姜薄荷各少許同

煎溫服

人參瀉肺湯

治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰

多大便澀滯

黃芩

梔子

枳殼

甘草

薄荷

連翹

杏仁

炒去皮

桑白皮

炒

大黃

桔梗

炒各等分

每服一兩水二盞煎去粗食後通口服

含化三黃丸

治症同前

大金花丸

治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血

淋閉咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃

加梔子名曰梔子金花丸又曰既濟解毒丸

黃連

黃柏

黃芩

大黃

各等分

或自利則去大黃加梔子

右為滴水丸如小豆大每服二三十丸新汲水

送下

四生丸 治一切熱痰常服潤肌膚諸熱症皆可服

大黃

牽牛

皂角

各二兩

朴硝

五錢

右為末滴水丸如梧桐子大每服三十九食後

白湯下

黃連解毒湯

治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘

滿陽厥極深畜熱內甚

方見濕熱

黃連湯

治一切積熱腹熱血熱酒熱並用

黃連淨不拘多少井水浸之良久碗盛于鍋內煮

取清汁服之

此方既用黃連一味又用井水浸

之不無大過乎以酒代之庶乎妙矣

神芩丸

治三焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或生瘡

癰咽膈不利或腸胃結燥小便赤澁大便閉塞一

切熱証並宜服之

大黃

生

黃芩

各二兩

牽牛

生

滑石

各四兩

黃連

薄荷

川芎 各五錢

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十丸溫水食後服

全真丹 治臟腑積熱洗滌腸垢潤利燥澁解風毒

攻症手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘

胸膈痞塞臍腹脹滿飲食減少困倦無力

川大黃 三兩用米泔水浸過三日每日一

黑牽牛 八兩淨慢火炒四兩生用四兩同取頭末四兩

右以皂角一兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿

入蘿苣一兩切作片子同皂角一處熬至半碗

去滓再煎至二鍾攤和上件藥末乾濕調勻丸

如梧桐子大每服二三十丸五六十丸諸飲下

隨証加減以利為度

牛胃散 治胃經實熱口乾舌烈大小便秘澁及熱

病後餘熱不除畜于胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴 去皮乾炒 射干 米泔浸 升麻

茯苓 各一兩 芍藥 二兩 枳殼 去穢炒

大黃 蒸 甘草 炙各一兩

每服四錢水一盞煎至七分去粗空心熱服

八正散 治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臟腑閉結小便赤澀

方見淋閉

黃芩湯 治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶并小便淋濁

不利

澤瀉

梔子仁

黃芩

麥門冬 去心

木通

生地黃

黃連

甘草

各等分

每服一兩生姜五片水二盞煎食前溫服

碧雪 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝

青黛

石膏

各研末水飛

寒水石

朴硝

滑石

甘草

煎湯二片

馬牙硝

各等分

右件諸藥將甘草湯入末再煎用柳木篋不住手攪令消鎔入青黛和勻傾泔盆內候冷凝結成霜研為末每用少許含化津嚥如喉閉難嚥用竹筒吹入喉中

玄胡粉 此藥大治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘澁
並宜服之 製法以朴硝煎過澄濾五七遍至夜
于星月下露至天明自然結作青白塊子用磁礮
子按實于炭火內從漫至緊自然成汁煎涕直候
不響再加頂火一煨便取出于淨地上倒下用盆
合蓋了以去大毒然後研為細末每二斤入甘草
生熟二兩為末一處攪勻臨睡斟量用之或一錢
二錢以桃花煎湯或葱白湯下
白虎湯 治氣熱 見濕熱

四順清涼散 治血熱 方見風熱

薄荷煎 治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷

一兩取頭
末三錢半

川芎

五錢取
末二錢

腦子

五分
別研

砂仁

五錢取
末二錢

右為末入腦子和勻煉蜜成劑任意咽嚼 和

劑方無腦子有桔梗

天竺散 治臟腑積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫

痛之症

山梔子

去殼

連翹

各三錢

甘草

三兩
二錢

鷄冠雄黃

五分

瓜棗

一兩六錢

箭金

用皂角水煑切片焙

乾三錢

右為末每服一錢食後臨睡新汲水調下

清氣散

治氣壅痰涎上膈煩熱

枳殼

川芎

柴胡

茯苓

甘草

獨活

羌活

青皮

白朮

人參

各等分

右為末每服二錢水一鐘荆芥一穗煎七分服

風散

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚搔

癢癰疹成瘡寒熱不調鼻塞聲重

藿香

去土半斤

白芷

前胡

去蘆各一斤

黃芪

去蘆

甘草

煨

人參

去蘆各二斤

羌活

去蘆

防風

去蘆各三斤

右為末每服二錢水一盞入薄荷少許煎湯調

下食後服清茶亦可

防風散

治頭目不清去風明目

防風

川芎

白芷

甘菊花 甘草

右等分爲末每服二錢食後荆芥湯調下

上清散 治上焦熱耳鼻壅塞頭目不清

川芎 荆芥穗 薄荷葉 各五錢

朴硝 石膏 桔梗 各一兩

上清丸 治口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱能清聲

音潤肺寬膈化痰爽氣寧神

百藥煎 薄荷 淨末各四兩 硝砂 一兩

片腦 一錢 玄明粉 甘松

桔梗 柯子 硼砂 各五錢

寒水石

右爲細末甘草熬膏爲丸如梧桐子大每服一

丸噙化或嚼三五丸茶湯下

通關散 治風熱上攻頭目筋脉拘急痰涎壅塞肢

節煩疼

羌活 獨活 防風 各去蘆

天麻 山梔子 大黃 各一兩

滑石 二兩 甘草 二兩

每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分食後
温服

荆黃湯 治風熱結滯或生瘡癩

荆芥 四兩 大黃 二兩

每服五錢水一鍾煎至六分空心服

丹溪活套云凡去上焦濕熱須酒洗黃芩以瀉肺火
如肺有實熱宜用如虛熱而用黃芩則傷肺氣須
先用天門冬保定肺氣然後用之 如去中焦濕
熱與痛須用黃連以瀉心火若中焦有實熱宜用

若脾胃氣虛不得轉運及中焦有鬱熱者當用茯苓
白朮黃芩葛根代之 如胸中煩熱須用梔子

實熱者切當若虛煩須用補藥為主 人參白朮黃
芩芍藥茯苓麥門冬大麥之類 下焦有濕熱腫痛
并膀胱有火邪者須用酒洗防己草龍膽黃柏知
母之類 固是捷藥若肥白人氣虛者宜用白朮蒼
朮南星滑石茯苓之類 如黑瘦之人下焦有濕

熱腫痛者必用當歸紅花桃仁牛膝檳榔等藥
柴胡瀉肝火須用片苓佐之片苓又能瀉肺火須

用桑白皮佐之若鼠尾者能瀉大腸之火 黃連
瀉心火若用猪膽汁拌炒更以草龍膽佐之大能
瀉膽中之火 白芍藥瀉脾火若冬月用必以酒
浸炒蓋其性之酸寒也 知母黃栢瀉腎火又瀉
膀胱之火 梔子瀉三焦之火在上中二焦連殼
用在下焦須去殼水洗去黃漿炒焦色研細用之
人中白非獨瀉肝火又能瀉三焦火及膀胱之火
從小便中出蓋膀胱乃此物之故道也
傳經驗方人中白散 治陰虛火盛及五心煩熱

等証

人中白 一兩

黃栢 益酒拌炒濁色

生甘草

青黛 各五錢

右爲細末每服二錢童便調服

加味地黃丸 治火熱上攻頭目不清心煩口渴四
肢痠軟無力或虛火上炎神思昏倦坐起眼中生
花夢遺泄精

淮地黃 八兩

山茱萸肉 四兩

山藥 四兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓 各三兩

黃柏鹽水炒

知母酒炒

天門冬去心

麥門冬去心各三兩

有夢遺加遠志肉四兩

蓮花鬚四兩

石龍骨火煨童便淬五次

煉蜜為丸如梧桐子大每空心白湯下五六十九寒月溫酒下如腎虛有飲作痰唾生姜湯下

