

產婦忌慎法六首

令易產方六首

下乳汁方一十五首

妬乳瘡痛方一十四首

乳癰腫方一十八首

產後血暈心悶方一十首

產乳連絕方五首

產後血不盡腰脚疼惡露不下方七首

產後惡露不絕方四首

尚德按
連疑當
作運
尚德按
血字上
長脫餘

字
疑
脫
下
疑
脫
字

產後血氣煩悶方四首

產後心痛方三首

產後腹中絞刺痛方九首

產後虛熱方二首

產後虛勞方四首

產後風虛瘦損方四首

產後虛羸方三首

產後中風方三首

產後下痢方四首

產後赤白痢方五首

產後痢日數十行方二首

產後卒患淋方五首

產後小便不禁兼數方四首

產後小便數兼渴方二首

產後渴方二首

許仁則產後方一十六首

產後遺糞方三首

產後陰道開方二首

產後陰下脫方六首

八瘕方一十二首

肉癥方二首

崩中方一十一首

崩中去血方一十三首

帶下方一十首

婦人虛羸及月病不能食方三首

陰蝕及疔方八首

陰中腫痛方四首

陰中瘡方五首

陰痒方五首

陰疔有蟲方六首

陰下脫方四首

陰挺出方三首

女人傷丈夫頭痛方二首

交接輒血出痛方二首

童女交接他物傷方三首

小戶嫁痛方四首

坐藥方三首

婦人欲斷產方四首

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

產婦忌慎法六首

千金論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不
得令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也
又凡婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰土
勿令水血惡物著地則殺人及浣濯衣水皆以器盛過
忌月乃止

為德按
子金胎
作始弄
作并

又凡產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死卽
母子俱病庶事皆不稱心能依圖無犯觸母子卽得無疾
子卽易養

又凡欲產時特忌多人瞻視唯得三二人在傍待摠產訖
卽告語衆人也若人衆令人難產

又凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須少靜皆不得預
緩預急憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未
卽生也兒生訖一切人及母皆忌問是男是女兒胎落地
卽急取口中惡物與新汲并水五合嚙忌與煖湯物亦勿
令母看視穢污

又產婦慎熱食熱藥熱麵食常識此飲食當如人肌溫濕也
並出第二卷中

令易產方六首

千金令易產方

凡欲臨產時先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令
至密即易生神驗

又方

生地黃汁半升生薑汁半合煎熱頓服

又方

燒藥杵令赤內酒中飲之

小品同並出第二卷中

備德按
千金二
升各半

小品預服散令易生母無疾病未生一月日前預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺甘草散方

甘草 八分 黃芩 大豆黃卷 粳米

麻子人 乾薑 桂心 各二分 吳茱萸 二分

右八味搗散酒服方寸七日三千金同

又療婦人易生產飛生丸方

飛生 一枚 槐子 故弩箭羽 各十枚

右三味搗末蜜丸桐子大以酒服二丸即易產

又方

取蛇脫皮著衣帶中鑑鼻繫衣帶臨欲產時左手持

馬銜石手持飛生毛令易產

下乳汁方一十五首

廣濟療婦人乳無汁方

以母猪蹄四枚治如食法以水二斗煮取一斗去蹄

土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取六升去滓內葱

白豉如常法著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身

體微微熱有少許汗佳乳未下更三兩劑甚驗崔氏同出

第三卷中

千金療乳無汁漏蘆湯方

漏蘆

通草

各八分

鍾乳

四分

黍米

一升

尙德按
千金不
用酒

右四味切將米宿漬研取汁三升煮藥三四沸去滓作
飲服 經心錄同

又方

土瓜根末酒服半錢七乳日下如流水

崔氏同

又療乳無汁單行石膏湯方

石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日盡良

又療乳無汁單行鬼箭湯方

鬼箭五兩水六升煮取四升去滓一服八合日三服

亦可燒灰作末水服方寸七日三

又下乳汁通草散方

通草
金作粥
麵粥
德千接

高
德
按
十
金
石
鍾
乳
粘
三
根
名
粘
增
三
合

右二味等分爲散麵粥服方寸七日三百日後可兼養

兩兒

又麥門冬散方

麥門冬

去心

鍾乳

研

通草

理石

各等分研

右四味擣散食前後酒服方寸七日三

又下乳漏蘆散方

漏蘆

二分

鍾乳

五分研

栝樓

五分

蟬螬

三分熬

右四味擣散食後紗糖水下方寸七日三

又方

外臺必要

三十四卷

四

無抄字
尚德按
餘千金
作得

尚德按
千金分
三服

尚德按
三升十

母猪蹄一具麤切以水二斗煮令熟餘五六升汁飲

之甚良 崔氏同

又方

猪蹄

二枚炙
搥碎

通草

八兩
切

右二味以清酒一斗浸之稍漸飲盡不出更作

崔氏同

又方

栝樓根切一升酒四升煮三沸去滓服半升日三良

崔氏同

又方

栝樓青色大者一枚熟擣以白酒一升煮取四升去

字之號

滓温飲一升日三若無大者用小者兩枚無青色者

黃色者亦好 崔氏同

又方

燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方

燒死鼠酒服灰方寸七日三立下

並出第三卷中

崔氏療乳汁不下方

鼠肉 五兩

羊肉 六兩

麋肉 八兩

右三味合作臛噉之勿令食者知

出第十卷中

妬乳瘡痛方一十四首

集驗論療婦人妬乳乳癰諸產生後宜勤擠乳不宜令汁
畜積不去便不復出惡汁於內引熱溫壯結堅掣痛大渴
引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也方

始妬乳急灸兩手魚際各二七壯斷癰脉也便可令
小兒手助將之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯
汁自下外以小豆散薄塗之癰處當差

千金同

又產後不自飲兒及失兒無兒飲乳乳畜喜結癰不飲兒
令乳上腫者方

以雞子白和小豆散塗之乳房令消結也若飲兒不
泄者數捻去之亦可令大者子含水使漱口中冷爲

吻取乳汁吐去之不含水漱令乳頭作瘡乳子盡也
千金同

又療妬乳乳癰連翹湯方

連翹

升麻

杏仁

去皮尖

射干

防已

黃芩

大黃

苦消

柴胡

各三兩

芍藥

甘草

炙各四兩

右十一味切以水九升煮取三升分服忌海藻菘菜
千金

同

又方

取葵莖燒灰擣散服方寸七日三卽愈

千金同

高德按
樓千金
作漫下
並同

又療妬乳生瘡方

蜂房猪甲中土車轍中土各等分末苦酒和塗之良

千金同一方又有車轍上脂一味

又療婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出侵淫為長
百療不差者動經年月名為妬乳病婦人飲兒者乳皆欲
斷世論苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二
物飛鳥膏及飛鳥散佳始作者可傳以黃芩漏蘆散及黃
連胡粉散並佳方如左赤龍皮湯方

櫛皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之秋冬温

之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傳膏散千金

天麻草切五升以水一斗半煎取一斗隨寒温分洗

乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠尾

花亦以洗侵淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡

洗畢傅膏散 千金同

又飛鳥膏散方

用燒朱砂作水銀上黑煙 一名細粉 礬石 三兩 燒粉

右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三

作散者不須和有汁自著可用散亦傅諸熱瘡黃爛侵

淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疳蝕口邊

獨德按 千金細 作細汁 瘡作汁 瘡無蜜 瘡二字 諸作瘡 疳作月

作癩

瘡蝸瘡等並以此傳之 千金同

又黃連胡粉膏散方

黃連 二兩 胡粉 十分 水銀 一兩同研
令消散

右三味搗黃連為末三物相和合皮裏熟投之自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸

濕瘡黃爛肥瘡若著甲煎為膏 千金同

構急小品如乳方 尚德按 千金 治乳癰 堅

黃芩 白欬 芍藥 各等分

右三味下篩漿水服一錢五七日三若右乳結將去左

乳汁左乳結即將去右乳汁服即消 千金同

又按兩 解字千 金下將 專作將

尚德按 千金瘡 作瘡若 字下有 乾字

柳白皮酒煮令熱以熨上卽消

又方

苦酒磨升麻若青木香或紫檀香以摩上並良一味
卽得佳

又方

已入腹者麝香薰陸香青木香雞舌香各二兩以水
四升煮取二升分再服忌蒜麪酒牛馬猪肉

必効療婦人妬乳癰瘡遲愈五物雄黃蘭茹膏方

雄黃

白歛

雌黃

蘭茹

各一分
並切

亂髮 如雞子一枚

右以豬脂半斤合煎三沸去滓乃內亂髮髮盡藥成以塗瘡不過十日差

乳癰腫方一十八首

廣濟療乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍方

大黃

芍藥

棟實

馬蹄 炙令黃等分

右四味搗散酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫處散不痛經宿乃消百無失一明晨更服一匕忌衝風熱食

深師療乳癰腫消核芍藥散方

芍藥

通草

桂心

昆布

白... 附子... 黃耆... 人參

海藻

木占斯 各一兩

右十味搗散以清酒服一錢七日三當先食并療臍下

氣結瘰癧

又乳癰衆醫不能療柏皮膏方

猪膏年老者佳柏皮三斤去黑皮以猪膏煎之常稍

煎柏皮熟黑便漉出更煎餘柏皮如初盡以塗瘡

甚驗

集驗療乳癰方

大黃 二兩

莽草 二分

伏龍肝 十二分

乾薑 二分

見後按

右四味擣末以酢和塗乳上即効止一方生薑極驗可

用也 千金同

又方

取鹿角下篩散以猪頰下清汁服方寸匕不過再服

亦以醋漿服之良 千金云猪脂銷上清汁

又療乳癰四物膠薄貼方

膠 炙

大黃

莽草

細辛

右各等分擣末以雞子白和塗紙上貼臃頻易晝夜貼

之割紙穿如錢大出腫頭

又療乳癰三物桂心貼方

桂心分

身頭分

甘草分

右擣散以苦酒和塗腫上以小紙覆濡其上將乳居其

中以乾布置乳下須臾布當濡有膿水也佳 范汪同

千金翼排膿散主乳癰方

鐵粉

菴蓉

桂心

細辛

芎藭

人參

防風

乾薑

黃芩

芍藥各四兩

當歸

甘草各五分

右十二味擣散酒服方寸七日三夜一加至一匕半服

藥十日血出多勿怪是惡物除甚良 出第五卷中

備急葛氏療婦人乳癰妬腫者或經久衆療不差方

堅硬紫色削柳根皮擣熟熬令溫帛囊盛熨乳上冷
更易甚良一宿即愈 十金同

又方

研米槌二枚煮令熱以絮及巾覆乳上用二槌更互
熨腫數十過差上已用大驗 千金云
灸熬

又乳癰方

大黃

竈下黃土

各一分未

生薑

二分

右三味擣末醋和塗乳痛即止極驗劉涓子不用生薑
用生魚三味等分余比用鯽魚妙

又療乳癰方

大黃

鼠屎

黃連

分

右三味搗末合鼠屎更搗以黍米粥清和傅乳四邊痛
止卽愈無黍米粟米粳米並可用 千金同

救急療乳癰腫痛如升椀大痛不可忍方

取白薑石搗末一二升用雞子白和如稀泥傅腫乾
更易之此方頻試驗如雞子慮罪取榆白皮和搗傅

卽差

又療乳癰堅硬痛不可忍方

葇菘子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水一
大盞和頓服痛卽止

又療乳癰腫方

以驗醋研地黃塗上乾即易不過三五遍服以酒研之

必効療婦人乳癰方

覺痛色未變時以飼猪米研汁飲之即差仍取猪槽木厚如匙面火炙數數熨上

又療婦人乳癰丹參膏方

丹參

白芷

芍藥

各二兩

右三味咬咀以苦酒淹經宿又取猪脂半斤微火上煎之白芷黃膏成去滓以膏塗上甚良

又...上須貼膏方

黃耆分八

白芷

大黃各五分

當歸

續斷各四分

薤白二合

松脂十二分

薰陸香

蠟各十分

猪脂升一

生地黄汁七合

右十一味切內地黃汁中漬半日內猪脂中微火上煎

三上三下白芷色黃膏成布絞去滓剪帛如瘡大小冷

帛貼瘡上日四五度易之終身無苦極効

產後血暈心悶方一十首

慶濟療產後血暈心悶不識人或神言鬼語氣欲絕方

荷葉二枚

蒲黃兩一

甘草二兩

白蜜匙一

地黃汁升半

右五味切以水三升煮取一升絞去滓下蒲黃蜜地黃

汁煖服立差止

又療產後心悶血氣衝上血暈羚羊角散方

取羚羊角一枚燒成灰末以東流水服方寸匕若未

差更服差

救急產暈心悶大困方

鯽魚剝皮作鱠以蠶食三兩口止

文仲暈絕方

續方木三兩碎以水五升煎取二升分再服或無極

木煮緋色衣取汁服甚驗

又方

取牆上青衣一抄以水四小升煮取二升分服又生薑汁一小升地黄汁一小升酒一大升相和煎五六沸分再服每劑和大黃末一匙此方甚良

崔氏凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致欲分娩者

第一須先取驗醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞其氣兼細

細飲之此為上法如覺暈即以此醋噴面蘓來即飲醋仍少

與解之

一云仍少與水解之

又凡產後忽悶汗出不知人者是具虛故也方

取破雞子吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚
驗丈夫小便亦得切不得用病人者

又若久不識人或時復發者此爲有風因產血氣暴虛風
行脉中故也若產後去血多者尤增此疾與雞子不醒者
可急與竹瀝汁一服五合須臾不定復與五合頻得三五

服立差

並出第十上卷中

近効療血暈絕不識人煩悶方

紅藍花三兩新者佳以無灰清酒半升童子小便半

大升煮取一大盞去滓候稍冷服之新汲水一大升

煮之良久

及作本

高德接
人疑當
作久

赤父馬糞絞取汁一大盞濕者良若乾者取新汲水

半大盞和研絞取汁頓服亦主人血不止神驗夏候拯錄

產乳暈絕方五首

崔氏療產乳暈絕方

以惡血服少許良

又方

以服洗兒水三合良

又方

覺暈即用三股麻繩長五六尺繫產婦右腳膝上令

人提兩頭急挽得醒徐徐解之並出第十上卷中

艾伸療產乳暈絕方

半夏一兩洗搗篩丸如大豆內鼻中即愈崔氏同

救急療產乳暈絕方

生赤小豆搗為散取東流水和方寸匕服之不差再

服崔氏同

產後餘血不盡腰脚疼及惡露不下方七首

廣濟療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚疼不下

食生地黃湯方

生地黃汁升一芍藥

甘草各二

丹參四

蜜合

生薑汁合

右六味切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜薑汁
微火煎一兩沸一服三合日二夜三利一兩行中間進
食與藥更進服

又療產後惡露不多下方

牛膝

大黃

各八分

牡丹皮

當歸

各六分

芍藥

蒲黃

桂心

各四分

右七味搗散以生地黄酒服方寸匕日二服下止

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胃急氣滿

兩脅痛方

生薑一斤

淡竹葉

一升
並切

右二味以水二升煮取一升去滓分再服

又療產後血不盡血痛悶方

取荷葉燒作灰煖水和服煮取汁亦良

又惡露不盡腹脹痛方

取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒末酒服

又方

取百斤秤錘一枚燒赤投酒五升中用此秤錘酒煮

當歸三兩取二升去滓分再服 千金同

又療一切宿血及損傷瘀血在腹內不問新久并婦人月

此酒
煎
法

精不通產後惡血不下皆良方

大黃

芒消

各三兩

桃仁

四十枚去尖皮

右三味芒消桃仁合搗四五百杵以酢漿二升半漬一

宿空腹攪調頓服之不能頓服者分作兩服良久先下

糞次下如豆泥汁或黑血為驗強人日別服一劑弱人

兩日服之下血盡便止不過三兩劑忌生冷茶葵並出第四

卷中

產後惡露不絕方四首

廣濟療婦人產後血露不絕崩血不可禁止腹中絞痛氣

息急療蓐病三十六疾方

亂髮燒灰

阿膠各二兩

代赭

乾薑各三兩

馬蹄燒一枚

乾地黄四兩

牛角鯁五兩

右七味搗篩蜜和為丸如梧桐子空腹以飲下二十五

九日二至四十九良

深師療產後虛冷下血及水穀下痢晝夜無數兼療惡露

不絕龍骨丸方

乾薑

甘草炙

桂心各二兩

龍骨四兩

右四味搗篩蜜丸如梧桐子以酒下二十九日三忌如常法此方甚良

文仲葛氏療血露不絕方

又隱居効方澤蘭湯療產後惡露不盡腹痛往來兼滿少氣

澤蘭八分 當歸三分 生地黄三分 芍藥十分

甘草六分 生薑十分 大棗十四枚

右七味切以水九升煮取三升分為三服欲死塗身得

差

產後血氣煩悶方四首

廣濟療產後心胃中煩悶血氣澀別下妨不能食方

生地黄汁升一 當歸一兩 生薑汁二合 酒五合

童子小便二升

右五味和煎三四沸去滓分服一日令盡聞食服

又血氣煩悶方

取生藕搗絞取汁飲一升未定更飲差止竹瀝亦得

千金同

集驗療產後血氣煩悶方

取生地黃汁一升酒三合相和微溫頓服之千金同

千金療婦人產後氣欲絕心中煩悶不解心効方

竹葉切

麥門冬去心

小麥各一升

甘草一兩炙

生薑二兩

大棗十四枚

二合
二
小
按

三兩者
煮本三
兩分三
服以食
無穀氣
者加粳
米五合

通按

此方名

大巖蜜

湯方中

若不用

蜜蜀椒

沙內反

用蜜未

詳何解

右六味切以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內餘藥

煮取三升去滓分服心虛悸加人參二兩少氣力加粳

米五合一方用竹皮若留中氣逆加半夏二兩忌如常

法 出第三卷中

產後心痛方三首

集驗大巖蜜湯療產後心痛方

乾地黃

當歸

獨活

甘草 炙

芍藥

桂心

小草

細辛

各一兩

吳茱萸 升一

乾薑 兩三

高德按千金內蜜五合重煮

右十味切以水九升煮取三升分三服良

千金同

經心錄蜀椒湯療產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒 二合 汗

芍藥 三兩

半夏 洗

當歸

桂心

人參

甘草 炙各二兩

生薑汁 五合

蜜 一升

茯苓 二兩

右十味切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去

滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合漸至六合盡勿

冷食 千金同

千金羊肉湯療產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若

中風乏氣力方

羊肉 三斤

當歸

黃芩

甘草 炙

何德按
千金名
羊肉當
歸湯生
四兩

芍藥

防風

芍藥

生薑

右八味切以水一斗二升煮羊肉減半煮藥取三升分

溫三服忌如常法

崔氏同出第三卷中

產後腹中絞刺痛方九首

濟療產後腹中絞刺痛不可忍方

當歸

芍藥

乾薑

芍藥

各六分

右四味擣散以酒服方七日二服

高德按方字下疑脫寸字

又療產後內虛寒入腹腹中絞痛下赤煩毒譫語見鬼羊

肉湯方

肥羊肉

斤一

當歸

甘草

炙

芍藥

各一分

赤下利 赤下利 赤下利 赤下利

右四味切以水一斗煮羊肉取七升煮藥取二升分服

又療新產後腹中加茲常堅絞痛無聊方

蜜一升

當歸一兩

右一味末入蜜中煎融融耳適寒温頓服

千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸三兩

生薑五兩

芍藥二兩

羊肉一斤

右四味切以水八升煮取三升適寒温頓服七合日三

又療產後疾痛桃人芍藥湯方

桃人半升去皮尖

芍藥

芫蕪

當歸

乾漆熬

桂心

甘草炙各二兩

升

又單行茱萸酒療產後腹內外疾痛方

吳茱萸一升酒三升漬一宿煎取半升頓服亦可再

服差止 並出第三卷十

必効療產後腹痛方

薤活四兩切酒二升煮取一升分服

又方

兔頭炙令熟以熨產婦腹如刀絞痛者熨之立定

又療痛不可忍方

取一苦瓠蘆未經開者開之去子訖以沸醎酢投中

蒸熱隨痛熨冷卽換極甚効

產後虛熱方二首

千金蜀漆湯療產後虛熱往來心胃中煩悶滿骨節疼及

頭痛壯熱晡時甚又似微瘧方

鱉母各二兩 芍藥各二兩 蜀漆葉 甘草炙

桂心 黃芩各一兩 生地黄一斤 黃耆五兩

右八味切以水一斗先煮地黄取七升去滓下諸藥煮

取二升半分三服此湯療寒熱不損人忌如常法出第三卷

中

千金翼療產後虛熱頭痛方

遵按 鱉母卽 知母

金取

右四味切以水五升煮取二升半分三服日三此不投湯

人無毒亦療腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩甚

發大熱即除 出第六卷中

產後虛勞方四首

千金增損澤蘭丸療產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘草 炙

當歸

芎藭 各七分

附子 炮

乾薑

白朮

白芷

桂心

細辛 各四分

防風

人參

牛膝 各五分

栝子人

乾地黃

石斛 各六分

馬德按
千金麥
兩冬一

厚朴炙

藁本

蕪荑各二分

麥門冬八分去心

右二十味搗末蜜丸以酒下十五丸至二十九丸良忌如

常法出第四卷中

延年增損澤蘭丸主產後風虛勞損黃瘦方

澤蘭七分

防風

乾地黃

當歸

細辛

桂心

茯苓

芍藥

人參

甘草炙

藁本

烏頭炮

麥門冬去心

石斛

紫苑

芫蕪各五分

乾薑

栝子人

蕪荑人

厚朴炙

蜀椒汗各

白朮

黃耆各六分

紫石英研

右二十五味搗篩蜜和丸如梧桐子以酒下二十至三十丸忌如常法

補繫療產婦勞虛或本來虛寒或產後血脈虛竭四肢羸弱飲食減少經水斷絕血脈不通虛實交錯澤蘭補虛丸

方

澤蘭葉九分

石膏八分

芎藭

甘草炙

當歸各七分

白芷

防風

白朮

藜蘆

蜀椒

厚朴炙

乾薑

桂心

細辛各五分

右十四味搗篩蜜丸如梧桐子酒下二十九至三十九

日再忌如常法

古今錄驗澤蘭丸療產後風虛勞羸百病必効方

澤蘭葉

分六

白芷

椒汗

蕪荑人

藁本

細辛

各四分

白朮

栝子人

人參

桂心

防風

厚朴炙

丹參

各五分

芎藭

甘草炙

當歸

各七分

乾地黄

分十

右十七味搗篩蜜和丸如梧桐子服二十九至三十九

日再服忌如常法

產後風虛瘦損方四首

廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方

澤蘭七分

厚朴炙

人參

石斛

燕蕒人

續斷

防風

桂心

各三兩

芳霧

白朮

栝子人

五味子

黃耆

遠志皮

各四分

赤石脂

六分

乾地黃

六分

甘草

六分

右十七味搗末蜜丸如桐子以酒下二十九至三十九

日再忌如常法

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯主之

及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之方

獨活三兩以水三升煮取一升分服柰酒者亦可酒
水等煮之用白鮮皮亦依此法

千金云凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋
長慎之凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故
也又產後七日內惡血不盡不可服湯候臍下塊散乃進
羊肉湯痛甚切者不在此例後兩三日消息可服澤蘭丸
比至滿月丸藥盡爲佳不爾虛損不可平復也全極消瘦
不可救者服五石澤蘭丸又凡在蓐必須服澤蘭丸補服
法必七日外不得早服也婦人因產取涼太多得風冷腹

尚德按
補字下
千金有

出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至
年終常將服之
又桃仁煎療萬病婦人產後百病諸氣方

桃仁一千二百枚去雙人尖皮熬令香

右一味搗務令極細熟以上上酒一斗五升研三四遍
如作麥粥法以極細爲佳內小長項瓷瓶中令滿以麵
遍封之務取密內湯中煮一伏時不停火使瓶口常出
湯勿令沒藥成溫酒和服一匙日再丈夫服亦極妙
延年澤蘭丸主產後風虛損瘦不能食令肥悅方

澤蘭 分七

當歸 分十

甘草 分七

藁本 分三

厚朴 分三

食茱萸 分三

蕪荑 分三

白芷 分三

乾薑 分三

芍藥 分三

石膏 分八

人參 分四

栝子人 分四

桂心 分四

白朮 分五

右十五味擣篩蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸日二

加至二十五丸忌如常法

產後虛羸方三首

廣濟療產後虛羸喘乏或乍寒乍熱狀如瘧名爲勞損猪

腎湯方

猪腎 一具去脂四破

香豉 一升

白粳米 一升

葱白 一升

人參 當歸 兩

右六味切以水一斗煮取三升去滓分服七合以意消

息忌太肉熱麵蒜

出第三卷中崔氏云以水三斗煮取五升適寒溫隨便飲之

救急療產後羸瘦不復令肥白方

烏豆肥大者淨拭熬熟如造豆黃法去皮擣爲屑下

篩以臘月猪脂成鍊者和丸如梧桐子以酒下五十

丸日再服一月內肥白也無所禁

古今錄驗療產後諸病羸瘦欲令肥白飲食和調地黃羊

脂煎方

生地黃汁

升一

生薑汁

升五

羊脂

斤二

白蜜

升五

右四味先煎地黄汁令餘五升下羊脂煎減半次下薑
次下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒一升
取煎如雞子大投酒中飲日三良

產後中風方三首

深師療產後中風口噤不知人小獨活湯方

獨活

八兩

葛根

六兩

生薑

五兩

甘草

二兩
炙

右四味切以水九升煮取三升分三服微汗佳忌如常

出第六卷中

小品人豆紫湯主婦人產後中風因篤或背強口噤或但

煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風

濕所爲方

大豆三升炒預取器盛清酒五升沃熱豆中訖漉去

豆得餘汁盡服之溫覆取微汗出身體纔潤則愈一

以去風二則消血結云周德成妻姪胎因觸傷胎死

在腹中三日因篤服此酒卽差後療無不佳千金用大豆五

升酒八升又云更合獨活湯所以爾者產後多虛著風以獨活消風去血也重者十劑崔氏云如中風口

噤加雞屎白二升和豆熬更佳

又療產後中寒風瘧通身冷直口噤不知人方

白朮四兩酒二升煮取一升去滓頓服忌如常法

產後下痢方四首

廣濟療產後腹痛氣脹肋下妨滿不能食兼之微痢方

茯苓

人參

厚朴

各八分

甘草

炙

橘皮

當歸

黃芩

各六分

右七味搗散以飲下方寸匕日三度漸加至一匕半

又療產後下痢赤石脂丸方

赤石脂

三兩

甘草

炙

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

各二兩

蜀椒

汗

附子

炮各一兩

右九味搗篩蜜和為丸如桐子酒服二十九日三良也

治風濕產後下痢膠蠟湯方

粳米一合

蠟如雞子一枚

阿膠

當歸各六分

黃連十分

右五味切以水六升半先煮米令蟹目沸去米內藥者

取二升入阿膠蠟消洋温分三兩服

千金療產後下痢腹痛當歸湯方

當歸

龍骨

乾薑

白朮

甘草

附子

熟艾

芎藭

右八味切以水六升煮取二升半去滓分爲三服日三

一日令盡出第三卷中

為德按 洋温當 神輝 高德按 千金乾 薑二兩 附子一 兩煮取 二升

產後赤白痢方五首

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛方

當歸

芍藥

地榆

龍骨

黃連

各八分

艾葉

八分

甘草

炙八分

厚朴

炙八分

黃芩

乾薑

各六分

右十味切以水八升煮取二升半去滓分温三服即差

止忌如常法

又療產後赤白痢臍下氣痛方

當歸

八分

厚朴

炙

黃連

各十二分

豆蔻

五枚去皮

甘草

六分

如常法

文仲効方療產後赤白下痢腹中絞痛不可忍

黃連

兩四

黃蘗

兩三

阿膠炙

梔子

蒲黃

兩各一

當歸

兩半

黃芩

兩二

右七味搗篩蜜和丸飲服六十九日三夜一服立定破

血止痢忌如常法

救急療產後下痢赤白腹中絞痛方

芍藥

乾地黄

兩各四

甘草炙

阿膠

艾葉

當歸

兩各二

右六味切以水三升煮取一升半去滓温分三服忌如

常法

必効療婦人新產後赤白痢心腹刺痛方

薤白

升切一

當歸

兩二

酸石榴皮

兩三

地榆根

兩四

粳米

合五

一本加厚朴

兩一

阿膠

人參

甘草

炙

黃連

各一兩半

右十味切以水六升煮取二升分三服忌如常法

千金只用

前五味

產後冷熱痢方二首

梁師療產後冷熱痢黃連丸方

右三味搗末蜜丸如桐子以飲下二十至三十九日再服忌猪肉

千金療產後忽著寒熱下痢生地黃湯方

甘草炙 黃連 桂心各一兩 生地黃五兩切

大棗二十枚 淡竹皮 赤石脂各一兩

石七味切以水一斗煮竹皮取七升去滓內藥煮取二

升半分爲三服日三翼同出第三卷中

產後痢日夜數十行方二首

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時

德接
金名
寔湯
六

下血桂枝湯方

桂心

乾薑

甘草

炙各二兩

赤石脂

十兩

當歸

三兩

附子

炮一兩

蜜

一升

右七味以水七升煮取三升入蜜一兩沸分服一升

十一

必多瘵 瘵癩日五十行者方

取一畧蠹蟲糞鑊中炒之令黃急以水沃之稀稠得

所服之差止

獨孤祭酒訥方

產後卒患淋方五首

茯苓

子芩

各二兩

右六味切以水九升煮取三升絞去滓一服七合差止

忌熱麪酢物

集驗療產後卒患淋石韋湯方

榆白皮

五兩

石韋

去毛

黃芩

各三兩

通草

三兩

大棗

二十枚

葵子

一升

白朮

一兩

右七味切以水八升煮取二升半分爲三四服

千金有甘草生

薑爲丸味

千金療產後淋瀝葵根湯方

高德按
千金前
字下有
子字汁
不錄

尚德按
千金滑
石五兩

葵根 二兩
乾者

車前子 一升

亂髮 灰

大黃

桂心

滑石 末後下
各一兩

冬瓜汁 七合

通草 二兩

生薑 六兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓分三服

出第三卷中

又產後淋滑石散方

滑石 五分
研

通草

車前子

葵子 各四兩

右四味以漿水服方寸匕至二匕為妙

千金翼療產後卒淋氣淋血淋石淋湯方

石韋 六兩

黃芩

通草 各二兩

榆白皮 五兩

大棗 三十

甘草 一兩

葵子 二

生薑

右九味切以水八升煮取二升半分三服 千金同

產後小便不禁兼數方四首

廣濟療產後小便不禁方

取雞尾燒作灰酒服方寸匕日二服

小品療產後小便不禁方

取雞子燒作灰酒服日三

又療產後遺尿不知出方

白薇 芍藥 各等分

右二味搗散以酒服方寸匕日三 千金翼各十分

千金翼諸產後小便數桑螵蛸湯方

桑螵蛸 三十枚 鹿茸 炙

黃耆 各三兩

人參

甘草 炙

牡蠣 各二兩 熬

生薑 四兩

右七味切以水六升煮取二升半分三服日再差止

產後小便數兼渴方一首

集驗產後小便數兼渴栝樓湯方

桑螵蛸 炙

甘草 炙

黃連

生薑 各二兩

栝樓

人參 各三兩

乾棗 五十枚

右七味切以水七升煮取二升半分三服

產後渴方二首

高德按
金天
李十四
枚先煮
麥小

栝樓

四兩

麥門冬

去心

人參

各三兩

乾地黄

三兩

甘草

二兩炙

乾棗

二十枚

土瓜根

五兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服良

千金療產後虛渴少氣力竹葉湯方

竹葉

切三升

甘草

炙

人參

茯苓

各一兩

小麥

五合

生薑

半夏

洗各三兩

乾棗

十五枚

麥門冬

五兩去心

右九味切以水九升先煮竹葉小麥生薑棗取七升去

滓內藥再煎取二升半絞去滓一服五合日三夜一

出第

許仁則產後方一十六首

第一產後若覺血氣不散心腹刺痛脹滿喘急不能食飲

宜依此方

鬼箭羽

折之如金色佳當歸

白朮

生薑

各三兩

細辛

桂心

各二兩

生地黄

汁五合

右七味切以好無灰酒三升水四升和煎緩火煎取二升三合去滓温分服三合忌如常法

第二產後若覺惡露下多心悶短氣貼然無力不能食宜

依此方

人參

一兩

地榆

二兩

右六味切以水七升半煎取二升四合去滓分温服八

合日三

第三產後惡露下多少得所冷熱得調更無餘狀但覺腹
內切痛可而復作宜依此方

當歸

五兩

生薑

六兩

桂心

三兩

芍藥

二兩

右四味切以水酒各三升半煮取二升三合去滓分温

三服之忌生葱

第四產後諸狀無所異但不能食者宜依此方

白朮

兩五

生薑

兩六

右二味切以水酒各二升緩火煎取一升半分溫二服

忌如常法

第五產後更無他狀但覺虛弱欲得補氣力兼腹痛宜羊

肉當歸湯方

肥羊肉

一斤去脂膜

當歸

兩五

生薑

兩六

黃耆

兩四

右四味切以水一斗緩火煮羊肉取八升澄清內藥煮

取二升半去滓溫分服若覺惡露下不盡加桂心三兩

惡露下多覺有風加芎藭三兩覺有氣加細辛二兩覺

有冷加吳茱萸一兩覺有熱加生地黃汁二合

身六產後惡露雖下不甚通利遂覺心腹滿悶齋服如
兼效喘息急不能食飲大便不通眼澀坐起不穩心腹時
時痛宜服此方

白朮

當歸

桑白皮

大黃

各三兩

生薑

四兩

細辛

桂心

各二兩

右七味切以水八升煮取二升六合去滓分溫三服此

湯當得利利又不宜過多事不獲已所以取微利緣初

產舉體皆虛尚藉藥食補之豈宜取過利脫未即止須

斷之取三兩匙酢飲飲之即止適寒溫將攝佳忌如常

法

如利後諸候不減宜依後方

當歸分十

白朮分八

甘草分七

生薑分六

桑根白皮

分六桂心分三

人參分三

細辛分四

右八味搗篩蜜丸桐子大以酒下十五至二十九忌如

常法

第七產後患水痢宜依此方

神麩

未五合六月六日者

人參分四

枳實

分六

赤石脂

分十

白朮

分六

右五味搗散飲下方寸匕漸漸加之忌如常法

第八產後患血痢宜依此方

艾葉五月五日者

黃蘗

芍藥

甘草

炙各六分

阿膠

十七分

黃連

七分

地榆

五分

右七味搗散以飲下方寸七甚妙忌如常法

第九產後患膿痢宜依此方

附子

炮

蜀椒

汗

乾薑

各五分

甘草

炙六分

赤石脂

黃耆

各十分

白朮

七分

右七味搗散飲服方寸七加一七半日再忌如常法

第十產後諸痢方

取薤白煮食之唯多益好肥羊肉去脂作炙食之唯

多益好以羊腎炒薤白食之良

第十一產後腹內安穩惡露流多少得所但緣產後日淺
久坐視聽言語多或運勞力遂覺頭項及百肢節皮肉疼
痛乍寒乍熱此是蓐勞宜依此方

猪腎

一具
去脂

當歸

芍藥

生薑

各三
兩

桂心

一兩

葱白

三合

右六味切以水八升緩火煮腎取六升澄清內諸藥煮

取二升分溫再服

第十二產後覺患風手足不多隨和言語不多流利恍惚
多忘精神不足宜依此方

獨活

當歸

芍藥

防風

芎藭

玄參兩

桂心半

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服如劑

覺安穩隔三日又服一劑若一劑後漸差但須適寒

溫將息如未全差即以此方作丸有熱加乾葛五兩有

冷加白朮五兩有氣加生薑六兩有痛加當歸芍藥各

二兩不能食加人參二兩玄參四兩覺手足不穩加牛

膝五加皮革薺各三兩黃耆四兩丸服忌如常法

第十三產後更無餘苦但覺體氣虛宜服此方

當歸各十乾地黃各十澤蘭八防風

黃耆各六續斷各六桂心六人參

地骨皮

芍藥

各七分

乾薑

六分

右十一味擣末蜜丸桐子大酒下二十丸忌如常法

第十四產後不論服藥宜忌一二分諸生冷陳久滑物若

服藥彌須將息每少服藥後忌食法為欲錄其都要

不能一一具言諸方曰白下忌桃李細辛忌生葱甘草忌

松菜海藻枸杞 狗頭附子黃連忌諸肉桂心忌生葱

第十五產後忌食不多通散當時不甚覺之在蓐雖小不

和出則成瘡補少腹疼硬乍寒乍熱食飲不為肌膚心腹

有時刺痛口乾唾粘手足沉重有此狀宜依此方

當歸

芍藥

人參

甘草

炙

鬼箭羽

牛膝分

牡丹皮分

白木分

桂心

白薇

烏梅

熬各四分

大黃

分八

又 蚤蟲

熬去翅足

水蛭

熬各二分

蒲黃

分三

朴消

赤石脂

各十分

乾地黄

分七

虎杖

分六

右十九味搗末蜜丸桐子大酒服二十九日再加二十

五丸良忌如常注

第十六產後膿血痢相兼宜依此方

赤石脂

五色龍骨

黃連

各十分

阿膠

炙

黃耆

各六分

黃蘗

四分

白朮

五分

右七味搗末蜜丸桐子大飲下三十九散服亦妙如前

服忌如常法

產後遺糞方三首

廣濟療產後遺糞方

取故鷲巢中草燒末以酒下半錢亦治男子

集驗療產後遺糞方

取礬石燒牡蠣熬各等下篩酒服方寸日三亦治男

子

又療產後遺糞不知出時方

白欬

芍藥

各二分

右二味擣為散以酒服方寸七

尚德按
等字下
疑脫分
字寸字
下疑脫
即字

產後陰道開方二首

廣濟療產後陰道開不閉方

取石灰一升熬令能燒草以水二升投灰中適冷煖入水中坐漬須臾復煖坐如常法用之

集驗療婦人產後冷玉門開不閉硫黃洗方

石硫黃研 蛇牀子各四分 菟絲子五分 吳茱萸六分

右四味搗散以湯一升投方寸匕以洗玉門差止

產後陰下脫方六首

集驗療婦人產後陰下脫方

取蛇牀子一升布裹炙熨之亦療陰中痛

千金療產後陰下脫方

以鐵精粉上推內之

又方

燒人尿末酒服方寸七日三度

又方

臍下橫文灸二七壯

古今錄驗療產後陰下脫方

蜀椒升

吳茱萸升

戎鹽

半雞子大

右三味搗以細裹如半雞子大內陰中日一易二十日

愈

偽德按
千金塗
羊指傳
鐵精粉
布推內
之然後
酒服磁
石末本
書詳之

龍頭 陰乾
二枚

葛根 一斤

右二味搗散酒服方寸七日三

八瘕方一十二首

素女經論婦人八瘕積聚無子斷絕不主令有子受胎養
法并曾傷落依月服藥法及陰閉生息肉陰痒生瘡陰瘞
蠶瘡帶下陰子藏不正陰門挺出陰腫堅隱疾方

黃帝問於素女曰吾聞天下婦人產乳有子而病者未曾
生子而病者又產乳後而中絕不復產者何也諸病作生
而令婦人腹中有積聚脅脅腰背攣而痛久而生八瘕之

高德按
生疑當

聚病深可畏不在邊言瘵之或已復作其狀寧可得聞之乎對曰婦人之病皆出於月病生產所致又從胞胎所起其病不同鍼灸食藥不得其方也

通按
此條有
錯簡不
要正

黃帝曰安心其要易聞之為寶受之良久詳思念其事曰善哉療將奈何素女曰誠為主說婦人胞胎之數皆在陰裏萬物皆從生淵深血脈精氣所從行腎為陰陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門生於子精精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持關元禁閉子精臍下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常

所從上然婦人經脈命各合調則月水如時來至故能生

從來入合於子藏若生後惡露未已合陰陽卽令婦人經
脈急令人少腹裏急支滿胃脅腰背相引痛苦四肢酸
削飲食不調結牢惡血不除月水不如時或在前或在後
乍久不止因生積聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢
寒熱四肢不欲時動陰中生氣腫肉生風甚者小便不利
苦痛如淋狀面目黃黑歲月病卽不復生子黃帝曰吾深
所憂也療之奈何可得愈病令人有子願拜受非其人不
敢妄傳何以神良耳素女曰今詳面圖

一曰黃瘦黃瘦者婦人月水始下若新傷墜血氣未止臥

寢未定五藏六腑虛羸精神不定因向大風便利陰陽開
閉關節四遠中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名
爲陰虛則生黃瘦之聚令人病苦四肢寒熱身重淋露臥
不欲食左脅下有氣結牢不可得抑苦病腰背相引痛月
水不利則善令人不產少腹急下引陰中如刺不得小便
或時寒熱下赤黃汁病苦如此令人無子療當刺關元氣
衝行以毒藥有法療治瘕當下卽愈矣

又療黃瘦皂莢散導之方

皂莢

一兩炙
去皮子

蜀椒

一兩
汗

細辛

六分

右三味搗散以三角囊大如指長二寸貯之取內陰中

則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿
近男子忌生菜等

二曰青瘕青瘕者婦人新生未滿十日起行以湯浣洗太
蚤陰陽虛玉門四邊皆解散子戶未安定骨肉皆痛手臂
不舉飲食未復內藏吸吸又當風臥不自隱障若居濕地
及濕席令人苦寒酒酒入腹中心腹煩悶沈淖惡血不除
結熱不得散則生青瘕之聚在左右脅下藏於背脊上與
肩甲腋下攀急兩足腹下有氣起喜唾不可多食四肢不
欲動搖恍惚善夢手足腫面目黃大小便難其候月水不
通利或不復禁狀如崩中此自過所致令人少子療之當

刺胃管行以毒藥有法瘕當下即愈矣

又療青瘕導藥方

戎鹽

升一

皂莢

半兩去皮子炙

細辛

一兩六銖

右三味搗散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但臥瘕當下青如葵汁養之如產法

三日燥瘕燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾步若舉重移輕汗出交流氣力未平而卒以恚怒致腹中猥咽不泄經脉攀急內結不舒煩滿少力氣上達隔中背脊少腹壅急月水與氣俱不通利而反以飲清水快心月水橫流溢入他藏不去有熱則生燥瘕之聚

四德按
疑當

食欲嘔吐留及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足酸削
又立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便澀
難有此病者令人少子療之以長鍼按而刺之法度行以
毒藥痕當下即愈矣

又療燥瘕方

大黃

如雞子許

乾薑

二兩

雞脆脰中黃膜

一枚炙

黃連

二兩

桂心

一尺

麈蟲

三枚炙

厚朴

十銖炙

郁李人

一兩去皮尖熬

右八味擣散早朝空腹以温酒一盞和三錢七頓服瘕

烏德按
日疑當
作月

烏德按
裏疑當
作裏下

當下下畢養之如產婦法三月無子者當有子三日勿
合陰陽

四日血瘦血痕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲
食過度五穀氣盛溢入他藏若大肌寒吸吸不足呼吸末
調而自勞動血下走腸胃之間流落不去內有寒熱與月
水合會則生血痕之聚令人腰痛不可以俛仰橫脅下有
積氣牢如石少腹裏急苦痛背脊疼腰股下痛陰裏若生
子風冷子門僻月水不時乍來乍去有此病者令人無子
療之瘕當下即愈矣

方闕

崔氏療婦人血痕痛方

乾薑

身賊魚骨

各一兩炙

桃人

皮尖熬

右三味搗散酒服二方寸七日二

又方

取古鐵秤鎚或大斧頭或鐵杵以炭火燒令赤投好酒三升中稍稍飲之

又方

桂末溫酒服方寸七佳日二 並出第十下卷中

古今錄驗療婦人血瘕攻刺腹脅時痛導藥方

大黃

當歸

各半分

山茱萸

一兩

皂莢

一兩去皮子炙

細辛

戎鹽

二六銖

右六味搗以香脂丸如指大每以綿裹內陰中正坐良久
久瘦當下養如乳婦之法

五日脂瘦脂瘦者婦人月水新下若生未滿三十日其人
未復以合陰陽絡脉分胞門傷子戶失禁關節散五藏六
腑津液流行陰道騶動百脉關樞四解外不見其形子精
與血氣相遇犯禁子精化不足成子則生脂瘦之聚令人
支滿裏急痛痺引少腹重腰背如刺四肢不舉飲食不甘
臥不安席左右走腹中切痛時差時甚或時少氣頭眩身
體疼解苦寒惡風膀胱脹月水乍來乍去不如常度大小
便血不止有此病者令人無子療之當刺以長鍼行以毒

尙德按
裏疑當
作裏

藥膏當下即愈矣

又療脂瘦方

皂莢

十八銖
去皮尖

礬石

六銖
燒

五味子

蜀椒

汗

細辛

乾薑

各半
兩

右六味搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽

不三行其瘦乃愈

又療婦人絕不復生及未曾生皆以脂瘦腹中有塊以湯

煎自下尚不受子導散方

皂莢

炙去
子皮

吳茱萸

當歸

各一
兩

蜀椒

汗各
二兩

細辛

熬

礬石

燒

五味子

各三
分

大黃

戎鹽各二兩

乾薑二兩

右十味搗散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中坐臥隨意勿行走小便時去之別換新者

六曰狐瘦狐瘦者婦人月水當日數來而反悲哀自恐若

以遠行逢暴風疾雨電雷驚恐被濕罷音疲倦少氣心中恍

惚未定四肢懈墮振寒若寤寐脉氣絕精神游亡邪氣入

於陰裏不去則生狐瘦之聚食人子藏令人月水閉不通

少腹瘀滯胃脅腰背痛陰中腫小便難胞門子戶不受男

精五藏氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多所思如有身狀四肢

不舉有此病者終身無子其瘦有手足卒成形者殺人未

尚德按
墮疑當
粹嗜

者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下即愈矣
又療狐瘕方

取新死鼠一枚裹以新絮塗以黃土穿地坎足沒鼠
形置其中桑薪灼其上一日一夜出分去絮內桂心
末六銖酒服二方寸七病當下甚者不過再服差止
七日蛇瘕蛇瘕者婦人月水已下新止適閉未復胞門子
戶勞動陰陽未平榮衛分行若其中風暴病羸劣飲食未
調若起行當風及度泥塗因衝寒大早若坐濕地名曰陰
陽亂度中虛若遠行道路伏飲汚井之水不潔之食通吞
蛇鼠之精流落不去則生蛇瘕之聚上食人之肝心若病

高德按
伏疑當
竹照

長大條條在臍下上還絞左右脅不得吐氣兩股脛間苦
疼少腹多熱小便赤黃膀胱引陰中攣急腰背俱痛難以
動作喜發寒熱月水或多或少有此病者不復生子其痕
手足成形者殺人未者可治之療有法度行以毒藥痕當
下卽愈矣

又療蛇痕方

大黃

黃芩

芒硝

各半兩

甘草

大如指一尺炙

烏賊魚骨

二枚

皂莢

六枚去皮子尖

右六味搗以水六升煮之三沸下絞去滓下硝適寒温

服之十日一劑空腹服之當下

八口 瘧瘧瘧瘧者如人月才新至其人處作罷疲矣
衣服潤濕不以時去之若當風睡足踐濕地恍惚覺悟蹠
立未安顏色未平復見所好心爲開蕩魂魄感動五內脫
滑若入水浣洗沐浴不以時出而神不守水氣與邪氣俱
入至三焦之中又暮出入玉門先閉津液妄行留落不去
則生鼈瘕之聚大如小杯令人少腹內切痛惡氣左右走
上下腹中苦痛若存若亡持之躍手下引陰裏腰背亦痛
不可以息月水不通面目黃黑脫聲少氣有此病者令人
絕子其瘕有手足成形者殺人未者可治之瘕有法度以
長鍼按療之行以毒藥瘕當下卽愈矣

又療鼈痕方

大黃六分

乾薑

側子各半分

附子

人參各九銖

麝蟲一寸七蒸

桂心一兩六銖

細辛

土鱖各十銖

白朮一兩

右十味搗散以酒服方寸七日三以上八般瘕疾出古今錄

驗第三十卷中

肉瘕方二首

集驗療婦人臍下結堅大如升月經不通寒熱往來下痢羸瘦此為瘕氣不可療未生瘕者可療方

生地黃三十斤 乾漆一斤

婦人崩中
二按

右二味搗漆為散內地黃汁中微火煎令可丸酒服

子大三丸至七八丸即止

崩繁療女人子門不開血聚腹中生肉癥築築如物此呼

為癥氣藏寒所致生地黃煎破血丸方

生地黃

汁一升

生牛膝

汁一升

乾漆

一斤半熬

右三味搗漆為散內地黃等汁中攪微火煎取堪為丸

止停攪丸如梧子一服三丸以酒服日再若覺腹內過

痛食後乃服之

婦人崩中方一十一首

小品療婦人崩中晝夜十數行醫所不能療方

芎藭 八兩

右一味切以酒五升煮取三升分三服不飲酒水煮亦

得

千金療崩中方

白茅根 二斤 小薊根 五斤

右二味切以酒五升煮取四升分稍稍服

又療婦人白崩中方

芎藭

阿膠 炙

桂心

赤石脂

小薊根 各二兩 乾地黄 四兩

伏龍肝 鷄子許七枚

右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓內膠令烺

高棹按
千金白
茅根三
升以水
五斗煎
取四斗

分爲三服日三

千金翼療婦人白崩中馬通方

白馬通汁二升 乾地黄四兩 伏龍肝如雞子大七枚 桂心

芎藭煎骨 阿膠炙 小薊根 白石脂各二兩

右八味切以酒七升合馬通汁煮取三升去滓內膠令

烊分服日三中議不決青黃赤白動入無心

又療婦人崩中及痢一日二夜數十起大命欲死多取諸

根煎丸得入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根合

多多仍合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得

二斛爲佳薔薇根煎方

懸鈎根 薔薇根 柿根 菝葜 各一

右四味剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煮使三分

減一去滓無大釜稍煮如初法都畢會汁煎取可丸丸

如梧桐子酒服十九日三良 並出第八卷中

交仲療婦人崩中漏下去青黃赤白使人無子方

赤禹餘糧 研 赤石脂 研 牡蠣 熬研 桂心 肉

烏賊魚骨 竈下黃土 各等分

右六味為散以清酒服方寸七日二服忌生葱

又方 鹿茸 炙 當歸 各二兩 蒲黃 半兩

右三味搗散酒服五分七日三度

又方

取好書墨為末二七若燒露蜂房末三指撮酒服之

又方

常炙猪腎食之

並出第九卷中

必効療崩中方

丁香

一百顆

好酒

一大升

右三味煮取三兩沸去滓頓服

又療婦人崩中無久近悉主之方

伏龍肝

一斤先於盆中以水二斗研令碎澄清取一斗二升用煮諸藥

小薊根

尚德按
忌以
四字
疑當大

桑寄生

續斷

地榆

艾葉

各三兩

阿膠

當歸

赤石脂

研

厚朴

各二兩

生薑

五兩

右十味切以伏龍肝水煮取三升絞去滓分三服

忌如常法

崩中去血方一十三首

廣劑療崩中去血日數升方

龍骨

研

赤石脂

研各六分

烏賊魚骨

牡蠣粉

肉蓯蓉

各五兩

龜甲

炙

芍藥

續斷

各八分

右八味搗散飲服方寸七日三漸加之加乾地黃十分

佳

天癸崩中下血不止并主男子卒痢血方

取東南引桃枝三握細剉以水四升煮取一升頓服
未差更服良

刪繁療婦人崩中泄血不斷淋瀝連年不絕黃瘦傷損芍
藥散方

芍藥 四分

牡蠣 熬

乾地黄 吸乾 白朮

乾薑

烏賊魚骨

附子 炮

桂心

黃耆

龍骨 各八分研

右十味搗散酒服方寸匕良

小品療崩中去血方

春生薊根汁一升溫服之亦可以酒煮隨意用之

又療婦人暴崩中去血不息方

牡蠣熬令赤

兔骨炙各十分

右二味擣篩為散以酒服方寸匕妙

集驗療婦人女子忽暴崩中血不斷或如鵝鴨肝者方

小薊根六兩

阿膠炙

當歸

芎藭

續斷

青竹筴各三兩

竈中黃土

地榆根各四兩

生地黃八兩

赤馬通汁一升

右十味切以水八升合馬通汁煮取二升半分為三服

未全止服三四劑後服此丸方

續斷

甘草炙

鹿茸炙

水蘓根

丹參各五分

乾地黄十分

芎藭

阿膠炙

赤石脂

當歸

地榆各六分

栝葉四分
熬

秦牛角炙 龜甲炙

各十二分
炙令黑

右十四味擣篩蜜丸如桐子以酒服十九日再加至三

十九忌如常法千金同

千金療婦人崩中去血積時不止起死人方

肥羊肉三斤 乾薑去脂

當歸各三兩

生地黄汁二斤

右四味切以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黄汁合

藥煮取三升分為四服尤宜羸瘦之人服妙

白德按
秦疑當
非驟

高德按
千金原
羊肉二
行生地
汁三

又療崩中去血產後餘疾丹參酒方

艾斤五

生地黃

地榆各五斤

丹參斤五

忍冬斤五

右五味合搗之以水漬三宿去滓煮取汁以糯米一石

釀酒飲服之

又溫經湯療崩中去血一斗服之即斷月水過期不來者

服之亦佳方

吳茱萸兩三

麥門冬一升半夏兩八

當歸

芎藭

大參

芍藥

牡丹

桂心

阿膠炙

生薑

甘草各二兩

高德按千金無方名斗作斛月水下有及四字當歸三兩分爲三服要

右十二味切以水一斗煮取三升分服忌如常法

千金翼療婦人崩中去血不止薊根酒方

大小薊根各一斤酒一斗漬五宿任意多少服之良

又療婦人崩中下血樺柳葉湯方

樺柳葉斤三 麥門冬去心 乾薑各二兩 甘草一兩炙

乾棗枚十

右五味切以水一斗煮樺柳葉取八升去滓內藥煮取

三升分三服日三並出第八卷中

救急療崩中下血數斗氣欲絕方

伏龍肝

升五

人參

兩一

麝香

兩二

生薑

兩四

右四味切以水一大斗煮取二升下藥煎取一升半

更別研伏龍肝一雞子許并香內湯中攪令調分服

帶下方一十首

廣濟療帶下病方

芍藥七大兩熬令黃黑為散以酒服三錢七

千金療帶下方

枸杞根

斤二

生地黃

斤五

右二味切以酒一斗煮取五升分為三服

又方

尚德按
兩斤字
千金並
作升

燒牛角末酒服方寸七日三

又方

桑耳燒令黑酒服方寸七日三

又方

豉酒亦佳

尚德按千金無此方云服大豆紫湯日
三服疑是方見千金第四卷中風篇中

又方

燒馬左蹄末酒服方寸七日三

又方

燒狗頭骨灰亦佳

又方

尚德按
千金燒
狗頭和
毛皮骨

尚德按
千金日

爲末以
酒服方
寸匕

外臺秘要

以水煮既帶汁服之亦佳 並出第四卷中

救急療帶下方

以竈下黃土水和爲泥作彈子丸百枚暴乾以火燒
熱徹以三年酢漬一丸綿裹內玉門中唯深待冷即
易之新患者三十九差久者五十丸餘皆自知即佳
必効療婦人帶下方

取兔皮燒令煙斷爲末酒服方寸七妙

婦人虛羸及月病不能食方三首

千金療婦人虛羸短氣曾脅逆滿風氣石斛生地黃煎方

石斛 甘草 紫苑 桂心

各四兩

二兩

防乳三宇下全德
風三有兩澤有久接
二斤斤一

生地黄

淳酒

茯苓

大黃

麥門冬 二升 桃人 半升 去心 皮尖 熬

右十味搗末合盛銅器中加三火內鹿角膠一斤數攪

之得一升次與三斤白蜜三升合和調更於銅器中

釜湯上煮盡之以生竹葉無令著器攪令盡相得藥成

先食酒

又鍾乳澤 婦人久羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷

不能食面 病悉主之方

澤蘭 甘草 山茱萸

白芷 當歸 薯蕷

藥

人參

乾地黃

麥門

石斛

細辛

桂心

艾葉

右十九味

每斤如桐子大服二十九加四十九

酒下忌如常注

第四卷中

救急療婦人月病不調或一月不來或隔月不來或多或

少臍絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方

當歸

桃人

牡丹皮

大黃

土瓜根

芍藥

別漬各三兩

各二兩

各二兩

朴消

桂心

蜚蟲

水蛭

各二兩

去翅足熬

各半兩

婦人二
導藥行

高
德標

子
金當

歸
甘草

芍
藥方

藥
各一

明
夜一

右十二味切以水九升煮取三升分溫服忌如常

婦人陰蝕及瘡方八首

千金療陰蝕瘡方

當歸

二兩

地榆

三兩

甘草

炙

芍藥

芍藥

各二兩

右五味切以水五升煮取二升流之日三夜一

又方

蒲黃

升一

水銀

兩一

右二味研之以粉上

又方

得德按
千金肥
猪肉十
斤無三
石二字
令作冷

高德按
甘疑當
作疔下
疔疔下
疔疔下
疔疔下

肥猪肉三十斤以水三石煮取熟去肉入盆中

令即易不過三二度 重出第三卷中

崔氏療陰蝕洗搨湯方

甘草 炙

乾漆 各一兩 蒸

黃芩

乾地黄

芍藥

當歸 各二兩

龜甲 五兩 炙

右七味切以水七升煮取半去滓以綿帛內湯中以

蒼處良久即易日二度每搨湯可行十里許即裛乾

取甘濕散薄付瘡上使遍可經半日又以湯搨搨訖

前傳藥其內甘濕散是蝻蛇膽等六味者是在前瘡

濕卷中余家婢遇此疾百方療不差蝕處作兩瘡

精者據
其水書
言之耳
外臺第
三十五
卷中無
方

高德按
并疑當
并

寸余於消子方中檢得此甘草湯方仍以自處蚺蛇膽

散用不經七日瘡乃平復甚効丸救十八人手下即活

遇斯疾者請廣流布傳之
出第十卷中
又按丸疑當作凡

又療疔頻用大効方

蚺蛇膽 真者研 青木香 石硫黃 研 鐵精

麝香 各四分 舊用五月五日蝦蟆 麝香臨時分之多
少入用緣麝香碎

蛇毒若先以相和
蛇膽即無力也

右六味等分擣篩為散更細研有患取如三碁子和并

花水日再服服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部

訖然後取散如二碁子內竹管裏深吹入下部中亦日

再老小量減其熏法每日一度不用再爲之甚良亦日
又療疔蟲食下部及五藏方

取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿緩纏之又擣
石硫黃爲末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截
一短竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝熟然熏之

並出第三卷中

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟆兔屎等分末傅之良

古今錄驗療婦人陰蝕苦中爛傷狼牙湯方

狼牙三兩咬咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如

雞子中黃一杯煎沸適寒溫以綿濡湯以瀝瘡中

四五度即愈

陰中腫痛方四首

膺後療陰中腫痛方

灸枳實以熨之

經心錄療婦人陰中腫痛不可近者湯洗方

防風三兩

大戟二兩

艾五兩

右三味切以水一斗煮取五升溫洗陰中日可三度良

古今錄驗療婦人陰腫堅痛礬石散方

礬石二分
熬

甘草半分
炙

大黃一分

高德按
之字下
疑厥方

右三味擣篩取棗大綿纏道陰中二十日即愈

又療婦人陰腫苦瘡爛麻黃湯洗之

麻黃

去節

黃連

蛇牀子

各一兩

酢梅

十枚

右四味切以水一斗煎取五升洗之

陰中瘡方五首

集驗療婦人陰中痛生瘡方

羊脂

一斤

當歸

杏人

去皮尖

白芷

芫蕪

各一兩

右五味細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆一枚

綿裹藥內陰中日一度

又療女子陰中瘡方

末硫黃傅瘡上

又療女子陰中瘡方

杏人未燒

雄黃

礬石燒各二分

麝香半

右四味和傅之日三度

古今錄驗療婦人陰中生瘡黃芩湯洗方

當歸

黃芩

芫蕘

大黃

礬石各二分

黃連一分

雄黃二分

右七味切以水五升煮取四升洗瘡日三度

又療婦人陰中生瘡雄黃散方

芎藭

藜蘆

雄黃 研

丹砂 研

蜀椒 汗

細辛

當歸 各一分

右七味搗篩散取方寸匕綿裏內陰中又傅外瘡方忌

如常法

陰痒方五首

廣濟療苦產門痒無計方

鱗蛇膽 研

雄黃 研

石硫黃 研

朱砂 研

峭粉 未詳

藜蘆

蕪荑 各二分

右七味搗細篩重蘿令調以臘月猪脂和如泥取故布

作篆子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易

高按
水粉
之

將宜以猪椒根三兩煮湯洗乾拭內藥佳

魯氏療陰痒痛不可忍方

取蒜隨多少水煮作湯洗之日三

又方

取狼牙蛇牀子煮作湯洗日三

又方

取杏人燒作灰乘熱綿裹內陰中良
並出第十卷中

經心錄療陰痒方

枸杞根一斤水三升煮十沸適寒温洗之

陰中痒有蟲方六首

不金總
中治按
蟲與
療陰
療方
用不
出此

外臺秘要

千金療人陰蟲瘡方

又按人字疑衍

以肥猪肉一斤以水煮肉令爛去肉以湯令極熱便灌瘡上冷易之

又方

取狼牙兩把以水五升煮取一升洗之日五六度

並出

第三卷中

崔氏療陰痒似有蟲狀煩悶真丹散方

真丹 一分

礬石 二分

芫蕪 四分

右三味為散以穀囊盛著陰中蟲當死盡

又陰痒有蟲方

取雞肝去脂及熱內陰中蟲當盡死

古今錄驗療陰疼有蟲方

取牛肝截五寸繩頭內陰中半日蟲入肝出之猪肝

亦得

又療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少

氣思美食方

用生鯉魚長一尺去頭內取骨擣末熬黃黑以猪脂

和以絹袋盛如常法內陰中至痛處即止

陰下脫方四首

廣濟療陰下脫出方

皂莢

去皮子炙

半夏

洗

大黃

細辛

各四分

蛇牀子

六分

右五味搗散薄絹袋盛如指大內陰中日二易又以羊

脂煎煮遍塗上以鐵精傅脂上多少令調以火炙布令

煖以熨之研礞石酒服方寸七日三服

集驗療婦人陰下脫散方

當歸

黃芩

牡蠣

熬各二兩

芍藥

一兩半

獨皮

一兩切熬

右五味搗散酒服方寸七日三服禁舉重良

千金同

千金療陰下脫硫黃散方

一 硫黃 研

烏賊魚骨 各二分

五味子 三銖

右三味搗散以粉土日三

出第三卷中

千金翼療諸婦人陰下脫方

細研礬石酒服方寸七日三服

出第六卷中

陰挺出方三首

廣濟療婦人子藏挺出數痛洗方

蛇牀子 一斤

酢梅 十四枚

右二味以水五升煮取二升半洗痛處日夜十過良

又方

烏頭 炮

白及 各四分

右二味搗散取方寸匕以綿裹內陰中令入三寸腹內
熱即止日一度著明晨仍須更著以止為度

集驗療婦人陰下挺出方

蜀椒

烏頭

白及各二分

右三味搗篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱明

且更著差止

千金同

女人傷丈夫頭痛方二首

集驗療女人傷於丈夫四體沉重噓吸頭痛方

生地黄

八兩

芍藥

五兩

香豉

一升

葱白

切一升

生薑

四兩

甘草

二兩

千金

高

牛

若

官

有

以

大

本

分

千

水

兼

并

分

三

右六味切以水七升煮取二升半分三服不得重作
房事 千金同

千金翼療諸婦人傷丈夫若頭痛欲嘔悶桑白皮湯方

桑根白皮兩半 乾薑兩半 桂心寸五 大棗二十枚

右四味切以酒一斗煮三四沸去滓分溫服之適衣無

令汗出千金同出第八卷中 又按翼無適衣以下六字見千金

交接輒血出痛方二首

千金療女人交接輒血出方

桂心二分 伏龍肝二分

右二味搗末以酒服方寸匕差止 出第三卷中

崔氏療合陰陽輒痛不可忍方

黃連

六分

牛膝

甘草

各四分

右三味切以水四升煮取二升洗之日三四度差止

第十卷中

童女交接他物傷方三首

集驗療童女交接陽道違理及他物所傷犯血出流離不

止方

取釜底墨斷葫蘆以塗之

又療童女交接陽道違理血出不止方

燒髮并青布末為粉塗之

尚德按

斷葫蘆

以塗之

千金作

研胡麻

以傅之

又方

割雞冠取血塗之

小戶嫁痛方四首

千金療小戶嫁痛連日方

甘草

三分

芍藥

二分

生薑

二分

桂心

右四味切以酒二升煮取三沸去滓分溫服之神良

出第

三卷中

千金翼療小戶嫁痛單行方

牛膝

五兩

右一味切以酒三升煮再沸分三服

千金雜錄

小經必要

三十四卷

七三

高德按
千金翼
大黃三
分

尚德按
按疑當
作方

又療婦人嫁痛單行大黃湯方

大黃三兩

右一味以酒一升煮一沸頓服

又療婦人小戶嫁痛烏賊魚骨散方

烏賊魚骨二枚燒為屑酒服方寸匕日三

並出第八卷中

坐藥方三首

通真論療婦人子門冷坐藥法

蛇牀子四分

茱萸六分

麝香二銖

右三味搗散蜜丸綿裹如酸棗內之下惡物為度

近効坐藥主下冷子門牽閉方

吳茱萸

葶藶子

熟各二分 蛇牀子

分 無食子

右四味爲散以綿裹如棗許內子宮中令熱爲度

又方

遠志

二分

蛇牀子

五味子

各四分

乾薑

蓮花葉

各三分

右五味搗散以口中玉泉和兔矢大內陰門中去冷內

熱良

夏侯拯錄

婦人欲斷產方四首

小品斷產方

故布方圓一尺燒屑以酒飲服之終身不產

千金云蠶子故

高德按
千金用

小臺必娶

三十四卷

六四

又療姪身欲去之并斷產方

栝樓

桂心

各三兩

豉

一升

右三味切以水四升煮取一升半分服之

又方

附子二枚搗爲屑以淳苦酒和塗右足去之大良

千金斷產方

油煎水銀一日勿息空肚服棗大一丸永斷不損人

廸功卽充兩浙東路提舉蓋司幹辦公事張寔校勘

大日本

醫官

平安山脇尚德玄飛甫

校刊

清水敬長源五甫

叅校

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十四卷終