


宣明論

卷七十一



黃帝素問宣明論方卷之七

河間

新安

吳勉學

校

積聚論

素問曰積聚留飲痞隔中滿濕積霍亂吐下瘕癥堅

硬腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也

積

不散聚者不化留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕爲積霍亂吐下爲留停瘕癥者微也瘕斯疾迺五臟六腑陰陽變化興衰之制也假也

元則害承迺制極則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃爲積飲也謂入
形精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉
密乃爲痞也謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也土
淫形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚
則霍亂吐瀉也癥者腹中土硬按之應手然水體
柔順而今乃堅硬如此者亢則害承乃制也瘕者
中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也
經曰血不流而滯故血內凝而乃瘕也

小腸移熱於大腸乃爲虛瘕大腸移熱於小腸謂兩
熱相搏則血溢而爲伏瘕血溢不利月事沉滯結

一不行故行爲虛癥爲虛與伏同癥與疝同爲傳寫
誤也世傳冷病然癥病亦有熱或陽氣鬱結怫熱
壅滯而堅硬不消者世傳爲寒癥癥也或堅痞腹
滿急痛寒主筋縮
故急主痛寒極血凝泣而反兼土化制之
故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可
一忍者皆可爲寒誤矣誤矣

何不以脈證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳

之五臟六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在

於臍上大如臂上至於心橫於心下如屋梁故曰

伏梁肝之積名曰贲音奔氣在左脇下覆如杯有頭

足久不愈令人痲瘡脾之積名曰痞氣在胃腕覆
大如杯久不愈令人四肢不收發黃疸食不爲膚
肌肺之積名曰息賁結在右脇下覆大如杯久不
愈令人灑淅寒熱喘咳發爲肺癰腎之積名曰音
音_音狇在於小腹上至心下如狇賁走往來無定久
不愈令人喘逆發爲骨疼少氣乏力此爲五藏之
積也常窵斯義未可悉也

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病
傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五
藏之氣虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積

聚其脉沉細而微者是也

木香三稜丸

治一切氣悶胸膈痞滿滯衛不和口

吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問久新

青木香

破故紙

茴香

黑牽牛

甘遂

芫花

大戟

荆三稜

蓬莪茂

川練子

葫蘆芭

芭戟

已上各一兩

芭豆

去皮不出油二分

陳米

三合將芭豆一處同炒黑

縮砂仁

一兩半

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥

入醋中浸一宿入鍋煮盡爲度乾爲細末醋麩

糊和丸如棗豆大每服五七丸食後加減看虛

實隨湯水下

導氣枳殼丸

治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分

氣逐風功不可述

枳殼

去穢炒

木通

剉炒

青皮

去皮

陳皮

去白

桑白皮

炒

蘿蔔子

炒

白牽牛

炒

黑牽牛

炒

莪朮

煨

茴香

炒

荆三稜

煨各等分

右爲末生薑汁打麩糊爲丸如桐子大每服二

十丸煎橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散

治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛

兩

芒硝

兩

三川大黃

兩

甘遂

半兩

右爲細末食後溫蜜水調下
一錢虛實加減
動止

密補固真丹

治脾腎真元損虛泄利痰嗽痞痞水

穀酸臭飲食無味臍腹冷痛肢體麻痺下虛痰厥
上實壅滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒槁面黧身
悴目黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣一切
脾胃虛證常服補養宜通氣血

天南星

兩半

半夏

製神麩

芍藥

荆三稜

炮各一兩

白附子

乾生薑

川烏頭

生各一兩

芭豆

七箇

牽牛子
代赭石
二官桂
分

右爲末水和丸小豆大每服十丸加至五十丸
溫水下除泄瀉外並加大黃一兩

木香丸 治和脾胃寬胃膈消痰逆吐嘔吐進益美

飲食

官桂

乾薑

各半兩

木香

一分

大黃

蓬莪茂

一

芫花

醋拌濕炒乾

枳殼

去穢

陳皮

各半兩

半夏

二兩

牽牛

半斤取末四兩

茴香

一兩

芭豆

四箇

炒

右爲末滴水爲丸如小豆大每服二三十丸溫

水下

軟金丸

治心胸腰腹急痛或淋悶升產後經病血

刺痛

當歸

半兩

乾漆

二錢

紅花

一錢

半用

輕粉

礪砂

粉霜

各一錢

一二稜

二錢

右同研勻棗肉爲膏和丸菉豆大新水下一丸

病甚者加得利後減

泥金丸 治心腹急痛取久新沉垢積滯推陳致新

黃蘗

大黃

芭豆

五靈脂

各半兩

猪牙皂角

一分

輕粉

粉霜

礪砂

各一分

乾漆

一分

右研勻煉蜜拌得所杵于下丸菉豆大新水下

一丸未利更加服

狀元丸

治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

芭豆

五十各取霜

神麴

半兩

半夏

一兩洗

雄黃

白麴

一兩炒

右研勻酒水丸小豆大細米糠炒變赤色食後

溫水下童子二丸三四歲一丸歲半半丸止嗽

溫澆汁下止嘔吐生薑湯下

玄胡丸

治積聚癥瘕解中外諸邪所傷

玄胡索

青皮

去白

陳皮

去白

當歸

木香

雄黃

別研

荆三稜

生薑

各一兩

右爲末酒麩糊爲丸如小豆大每服五七丸生

薑湯下

又一方

無陳皮

生薑

有廣莖

一兩

檳榔

分兩

大延胡索散

治婦人

經病產後腹痛腹滿喘悶癥

瘕癖塊及一切心腹暴痛

延胡索

當歸

芍藥

京三稜

川苦練

蓬莪茂

官桂

厚朴

木香

川芎

各一分

桔梗

黃芩

大黃

各半兩

甘草

一兩

檳榔

二錢

右爲麩末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱

服食前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染
塊子龍骨各半兩如前法煎服乎人心急痛加
本方得利尤良後常服

三稜湯 治癥瘕痞癖積聚不散堅滿痞膈食不下
腹脹

荆三稜兩二白朮兩一蓬莪茂兩半當歸兩半枳榔

木香三錢

右爲末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚痞癖氣塊及大小結胸痛不

能仰

天南星

半夏

芫花

自然銅

等分
生用

右爲末醋煮麩糊爲丸如桐子大每服五七丸
食前溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹

治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急

津液凝澁便溺不利赤癰疥疽癰發背疥癬走
注脚氣無首尾瘡癩功效不可盡述

檳榔

甘遂

葳靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶歷

已上各
二兩

乳香

沒藥

一兩
別研

黑牽牛

半兩

大戟

二兩
炒

陳皮

四兩
去白

右爲末麩糊爲丸如桐子大每服五十九至七

八十九丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麪食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止捨心爽

一痛及遶臍腹痛不可忍者

川大黃

三兩新水浸一宿蒸熟切片子焙

乾薑

一兩炮

大附子

半兩去皮臍

鱉甲

一兩半好醋一升伏時炙令倍乾妙

右爲末取三年米醋一大升先煎四五合然後

和藥丸如桐子大每服十丸至二十丸空心醋

或酒米飲下後取積如魚腸膿血爛肉汁青泥

當下

開結妙功丸

治佛熱內盛痲痺堅積腸結癥痕積

聚疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸閉結胸悶
煩心不得眠咳喘噎逆不能食或風濕氣兩腿爲
腫脹黃瘦眼溢昏暗一切所傷心腹暴熱肝腎燥
鬱偏正頭疼筋脉拘痠肢體麻痺走注疼痛頭目
昏眩中風偏枯邪氣上逆上實下虛脚膝麻木不
通氣血

荆三稜

炮

茴香

各一兩

川烏頭

四兩

神麴

麥芽

大黃

各一兩好醋半升熬成稠膏
不破堅積不須熬膏水丸

乾姜

巴豆

二箇破堅
積用四箇

半夏

半兩

桂

二錢
牽牛三兩

右爲末膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸温
水冷水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却減允
數以加至快利三五行以意消息病去爲度

木香分氣丸

治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛捨

刺如覆杯狀

陳皮

去白

檳榔

各一兩

破故紙

二兩炒

木香

一兩半

黑牽牛

十二兩炒香熟取
末五兩半餘不用

右爲末滴水爲丸如桐子大每服二三十九生

薑湯下食後臨臥服

開胃生薑丸

治中焦不和胃口氣塞水穀不化噫

氣不通噎塞痞滿口淡吞酸食時膨脹臈逆惡心
嘔吐痰水宿食不消咳嗽喘助刺痛寬中開胃進
飲食

桂心 一兩

生姜

一斤切作片子鹽三兩
曬一日再焙乾

青皮

去白

陳皮

去白

甘草

炙各二兩

縮砂仁

四十九箇

廣茂

當歸

各半兩

右爲末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸食前細
嚼沸湯化下

導滯定功丸

治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利

消食止逆定疼痛

大椒

木香

各一錢

蝎梢

三錢

芭豆

入筒出油為度

右為末後入芭豆霜研勻醋麪糊和丸如菜豆大朱砂為衣每服五丸至十丸淡醋湯下

積氣丹

治一切新久沉積氣塊面黃肌瘦諸氣無

力癥瘕積聚百吐酸水

檳榔

簡

芫花

一兩

礶砂

二錢

芭豆

二錢半生

青皮

去自

陳皮

各三錢

蓬莪朮

雞爪黃連

京三稜

章柳根

牛膝

各一兩

肉豆蔻

三錢

大戟

川大黃

甘遂

白牽牛

乾薑

青礞石

乾漆

各半兩

木香

二錢半

石菖蒲 三錢

右為末 醋麵糊和丸 如桐子大 每服一九 臨臥

燒棗湯下 每夜九服 後有肚內作聲 病退為度

金露紫苑丸

治一切脾積 兩肋虛脹 膝疼痛

草烏頭 去皮尖

黃連 半兩 官桂 桔梗

乾地黄 乾生姜 川椒 蕪荑 紫苑去

柴胡 防風 厚朴 甘草 人參

川芎 幣甲 酒浸 貝母 枳殼 甘遂各一兩

芭豆 三兩 酒煮 半日 出油 入礪砂 三生

右為末 水煮麵糊為丸 如桐子大 每服五丸 空

心臨臥米飲湯下或微踈動詳虛實加減

信香十方青金膏 灌頂法王子所傳十二上願云

藥師瑠璃光如來應當供養正徧知明行足善壽

世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯

變生百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內傷心腹滿

塞急痛或酒積食積癥瘕積聚痰癖堅積中滿膈

氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈痺消中善食而瘦或

消渴多飲而數頻也角切小便或腸風下血痔瘻冷

痛或胃癰疔或偏身癰疽惡瘡或瘡毒已入於裏

腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡疔肉或下痢腹痛
或一切風氣肢體疼痛及中風偏枯或痰逆生風
痰涎嗽兼產後腹痛及小兒疳疾諸風潮搐但平
人常服補養宜行榮衛調飲食

信砒

乳香

輕粉

粉霜

芭豆

已上各
二兩同研

龍腦對

麝香

半青黛

二錢同研

黃蠟

三錢

右研細末 鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菴豆至

小豆大先服小丸病在上食後在下食前在中

不計時候面東頂禮一丸淨器盛水送下如合

藥即淨處一面東每一丸密念呪三遍或病人不

能呪請人呪

或師氏呪過

呪曰

信香十方青金膏

藥師圓成蜜遍拋

普濟有緣除百病

仰吞一粒體堅牢

密呪曰

但言八金剛

莫說十方佛

五蘊六根俱不道

十二上願自然成

金黃丸

治酒積食積諸積面黃疽積硬塊

荆三稜

香附子

半兩澤瀉

芭豆

四十九粒出油

黍米粉

牽牛

二錢半

右各未用梔子煎湯和丸如菉豆大每服三丸
至五丸如心痛艾醋湯下七丸

逆氣丸 治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬

膈進美飲食

薑黃四兩香附子四兩縮砂 甘草 廣茂各二兩

丁香皮 甘松 木香 荆三稜各一兩

白檀半兩藿香葉半兩

右爲末入菉豆粉二兩用湯浸蒸餅爲丸如桐
子大每服三二十九細嚼日湯下食後日進三
服

丁香散 治疝瘕氣膈下痞滿息而不消積而不散

元氣在胃不妨食者

好丁香 二十五個

白丁香 七十箇

密陀僧

舶上硫黃

黃鶯調 各五分

右爲細末每服一字皂子煎湯調下不計時候
治肚内生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食
後

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃兩黑牽牛頭末兩

硃砂三山梔子半可

輕粉 二錢

右爲末煉蜜和丸拾作餅子如小錢大置槎食

後每服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行嚙補之

虛實加減

無憂散

一名萬病散

治風疾瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯

氣結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色痿黃肉有癢

痺氣并當看症蟲蛇蟲攻心腹俱痛忍中傷寒頭

痛不忍狀若山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥

宣通三五行立瘳或中風口喎語多寒澁睡後曰

申涎出不限時節不問男子女人但五日一服不

過三服永瘳人患腰膝疼痛脚氣腫滿運動艱難

飲食無味并小兒疳癩脰肛者量大小與服和三五
行自瘥大人久泄氣痢狀若休息痢並有時俱
一服取下冷脹一二升當日見効藥無四時冷熱
老幼衣弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常
時蓋緣搜出臧府中積滯蟲膿故也無孕婦人久
患血虛氣弱痿黃無力者亦可依方服宜通氣候
殊不困倦無妨此藥凡有百病並皆治之其功不
可具載有孕婦人或遇陰晦時即不可服天道晴
廟可進若雖復疾而未愈者再可服

黃耆

木通

桑白皮

陳皮

各二兩

胡椒

白朮

木香

合半

曰牽牛

四兩炒別收頭末

右七味爲細末每服二錢牽牛末二錢生薑三錢切作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾又用生薑湯或溫湯送下平明可行三五次快利無妨如病瘥後以白粥補之痊矣

五積丹

治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢

一鈇

一尺二寸火燒留性淨盆合之四而十壅合物令出煙

芭豆

十二箇白燒一兩五錢同炒令黃色爲度

右爲末醋麩糊爲丸

菜豆大每服十九鹽湯下

食後加減

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

白木

黃帝素問宣明論方卷之八

河間劉守真撰集

新安吳勉學校

水濕門

夫諸濕者濕爲土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於天熱怫鬱水液不能宣通卽停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以爲兼證云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能爲濕雖

有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以膏熱入裏極深本非病寒也

三花神祐丸

治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水濕腫

滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦
氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注
疼痛風痰涎嗽頭目旋運瘡疾不已癥瘕積聚堅
滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不
快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒濕熱腹
滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或汎常只爲轉動
之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢及小兒驚疳積

熟乳癖滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒各半兩

牽牛

二兩

大黃

一兩爲細末

輕粉

一錢

右爲末滴水爲丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利後却常服病去爲度設病愈後老弱虛人平人常服保養宜通氣血消進酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

崔宣武神祐丸

加黃柏

兩牽牛

兩粉

二粉

甘遂

大戟

芫花

各一分
依前法

劉庭瑞神祐丸

用此藥治水氣常得効

賈同知

稱之不已乃神仙奇絕之藥也

葶藶木香散

治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀

大便滑洩

葶藶

茯苓

去皮

猪苓

去皮

白朮

各一分

木香

半

澤瀉

木通

甘草

各半兩

辣桂

一分

滑石

三兩

右爲末每服三錢

白湯調下食前○此藥下水

洩瀉利小便若小便不得通利而
刀濕熱痞悶極熱而攻之不開
氣已衰而多難救也慎不

腫滿欲變成水病者不能臥

赤茯苓

甘草

澤瀉

各半兩

陳皮

二兩
去白

官桂

二錢

滑石

三兩

水一盞生薑三片同煎至六

心腹脹滿水腫小便不利

欬石 六兩 檳榔 三錢 茯苓 一兩
兩 去皮

官桂 各半 甘草 二錢
兩

葶生薑五片煎至六分

服十棗湯
服此藥

昆布 海藻 上同二
十分

葶藶 六分
炒

胃丸如桐子大每服十

九日再服稍利小便爲度詳虛實加減

茯苓散

治諸般氣腫等疾

芫花

醋拌炒

澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防已

各二錢半

陳皮

白

白檳榔

瞿麥

各半兩

藁本

二錢半

滑石

三分

大戟

炒三分

右爲細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取下碧淥水如爛羊脂即瘥如未盡隔日又服腫消如故不用服忌鹽百日

調胃散

治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏

製

甘草

炙

厚朴

去皮

陳皮

白藿香

各等分

右為未每服一錢生薑二片棗二枚水一盞同

煎溫服食前

一氣散 治水氣壅脹滿

白牽牛 黑牽牛 各二錢

右為未用大麥麩四兩同一處為燒餅碎臥用

茶湯一盞下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃 葶藶 一兩用糯米和 澤瀉 二兩 椒目 半

天戟 芭戟 去心 茯苓 去黑 芫花 醋五升 浸

甘遂 桑白皮 已上各 一兩

右爲末從發時加減一分空心用井花水調下
每服一錢加至五錢以利爲度忌鹽醋生冷毒
物油膩血物

從脚腫根在心加葶藶

從肚腫根在腹加椒目

從陰腫根在胸加澤瀉

從膝腫根在肝加芫花

從面腫根在肺加桑白

從心腫根在肋加雄黃

從肢腫根在脾加甘遂

從口腫根在小腸加巴戟

從腰腫根在腎加大戟

從四肢腫根在筋加茯苓

萬勝散 治十種水氣不可愈者

海帶

海藻

海蛤

芫花

醋浸

甘遂

大戟

甜葶藶

樟柳根

續隨子

芭戟

各等分
去心

右爲末每服三錢至五錢溫酒調下臨臥問其

再服

牽牛丸

治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛

黃芩

大黃

大椒

滑石

各等分

右爲細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸
至七丸生薑湯下食後虛實加減

梔子蘗皮湯

治頭微汗小便利而微發黃者濕熱

相博微者宜服

大梔子十五箇

黃蘗半兩

甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次作一日服溫喫不計時候

大戟丸

治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心膈痞

悶背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大便澹泄不能坐臥

大戟

芫花

醋炒甘遂

海帶

海藻

郁李仁

續隨子

各半兩

樟柳根

一兩已上入珠

爲末每料抄藥末十 硃砂

輕粉

各一錢

粉霜

各一錢

水銀砂子

一皂子大

龍腦

半錢

宜明論九
卷八
芑豆

二十箇
生用去皮

右八味已下同研勻用棗肉爲丸如棗豆大每
服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實
加減

粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便閉不
進飲食

粉霜

硃砂

海蛤

寒水石

燒粉

玄精石

白丁香

頭白麩

各一錢

輕粉三錢

海金沙

一錢

右研勻着紙裹數重上使麩裹又紙裹冷酒煎

了桑柴火燒麩熟爲度宿証餅和丸如桐子大
每服三丸生薑湯下一日三服二日加一九至
六日不加即止以補之妙

苦葶壺丸

治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參二兩

苦葶壺

四兩於鍋內紙上炒黃色爲度

右二味同爲細末用棗肉和丸如桐子大每服
十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前
此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸

治水濕脹如鼓不食者病可下

肉豆蔻

檳榔

輕粉

各一分

黑牽牛

一兩半取頭末

黃帝素問宣明論方卷之九

河間劉守真撰集

新安吳勉學

校

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛屬肺風寒隨玄府而入腠理開張內外相合先傳肺而入遂成咳嗽迺肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛

稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸

治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可

盡述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭
目昏眩耳鳴鼻塞咄膈不利心腹痞滿筋脉拘倦
肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人
保養宜通氣血調和臟腑進飲食

人參

茯苓

去皮

天南星

薄荷葉

各半兩

半夏

乾生薑

白礬

生

寒水石

各二兩

蛤粉

兩

藿香葉

一分

右爲末麩糊爲丸如小豆大生薑湯下二三十

丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩
木丸取効愈妙治酒病調和藏丸宜服之

新添半夏瓜蒌丸

治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏

生薑製

瓜蒌

杏仁

去皮尖

麻黃

白礬

枯秤

款冬花

各等分

右爲末生薑汁打麩糊爲丸如梧子大每服二
十丸煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯

治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮

甘草

葛根

各一兩

厚朴

半兩

右件爲末每服一二錢水一大盞生薑五片煎

至六分去滓食前服顯仁丸仙木芎散大人參
半夏丸

橘皮半夏湯

治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤

燥解肌熱止咳嗽

橘皮

半兩
去皮

半夏

二錢半湯
洗七次

右爲末分作二服每服水一盞半入生薑十片

同煎至七分去滓溫服

知母茯苓湯

治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

茯苓

去皮

甘草

各一兩

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

洗土

柴胡

白朮

款冬花

桔梗 麥門冬

黃芩半兩 川芎三錢 阿膠三錢

右爲末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分去滓稍熱服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾葛 白朮

甘草各一兩 白薑半兩

右爲末每服二錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎至八分如出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯 治肺痿喘不定咳嗽不已及甚者

往來寒暑

杏仁

去皮

桔梗

陳皮

去白

茯苓

去皮

防已

白礬

桑白皮

各三錢

薄荷葉

一錢

甘草

二錢

猪牙皂角

一錢

右爲末作二服水二盞生薑三片煎至六分去

滓食後溫服

防已丸 治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化

痰涎

防已二錢杏仁三錢木香二錢

右爲末煉蜜爲丸如小豆大每服二十丸前藥

白皮湯下如大便閉加葶藶一兩食後服

葶藶散 治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

苦苧藶

蛤粉

各三錢桑白皮

山梔子

人參

荆芥穗

薄荷葉

赤茯苓

去皮陳皮

桔梗

杏仁

甘草

各半兩

右爲末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至六分去滓溫服食後

保安半夏丸 治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴

咽乾煩渴大小便澁滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛

中滿膈氣上實下虛洒食積聚不消補養氣血宜

行榮衛

半夏

天南星

各半兩

牽牛

一兩

大黃

半兩

黃藥

半兩

蛤粉

一兩

芭豆

四箇

右為末水為丸如小豆大每服十九丸十五丸溫水下食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有乾薑一錢半

人參保肺湯

治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨

蒸潮熱

人參

柴胡

當歸

芍藥

桑白皮

知母

百木

川芎

黃耆

紫苑

荆芥

地骨皮

各一分

茯苓

去皮

黃芩

連翹

大黃

薄荷

各半兩山
梔子同

甘草

桔梗

各一兩

石膏

滑石

寒水石

兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分

去滓溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹

治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼

婦人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉

甘草

四錢

芭豆

燈燒

盆硝

各二錢

輕粉

二錢

豆豉

一兩慢火炒

五靈脂

二錢

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫酒送下

下續後空噓津三五次禁飲食少時覺兩喉微
煖効心腹急痛温酒下二丸未効再服得利丸
良帶下以温酒下二丸或大便流利再服

人參散

治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發

戰膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫
痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏

甘草各兩

滑石

寒水石

人參各半兩

右爲末每服二錢温水調下早晚食後兼服

子金花丸

一名旣濟解毒丸

寧神散

治一切痰嗽不已者諸藥無効世傳極驗

御米囊

一斤生醋炒

烏梅四兩

右爲末每服二三錢沸湯點常服食後日三服

賈同知方

御米殼

炒兩

烏梅肉

半兩

依前法服之

康少尹傳

煎烏梅湯亦妙

桂苓白朮丸

治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞閉堅

結痛悶推進飲食調和臧無問寒濕濕熱嘔吐瀉

痢皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宜平而愈

解酒毒療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服

之利止爲度隨證調之

揀桂

乾生薑各

茯苓

去皮

半夏

一兩

白朮

紅皮蛙澤瀉各半兩

右爲末麪糊爲丸如小豆大生薑湯下二三

九日三服病在膈上食後在下食前在中不計

時候或一法更加黃連半兩黃蘗二兩水丸取

効愈妙

潤肺散 治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者

瓜蒌實 一枚去子用

右爲末以寒食麪和爲餅子炙黃爲末每服

錢溫水化乳糖下日三服効乃止

又方 治寒嗽

麻黃 四兩 宮桂 一兩 礬 二錢

右爲末以蠶同煎每服一二錢溫服

寧肺散 治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼 四兩 木瓜 三兩 御米殼一處用蜜

五味子 一兩 人參 一兩 皂角 二兩

右爲末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効

鱉甲丸 治吐血咳嗽神効

鱉甲 一箇九肋 者醋炙黃 柴胡 一兩酒浸一宿

杏仁 一兩童子 小便浸炒 甘遂 一兩炙 人參 半兩

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服十九至十五

九煎生薑湯下

又方 用厚朴 一兩 生薑製

石膏散 治熱嗽喘甚者

右膏 一兩 甘草 半兩炙

右爲末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下
人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已

白礬 天南星 半夏 甘草 二錢半炙

人參 二錢 赤小豆 四十九粒 杏仁 四十九粒

猪牙皂角 一錢

右爲末秋米三甘醋一升熬粥和丸如桐子大

每服十五丸炒蘿卜子湯臨卧下

仙人肢丸 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服

松花膏下過多服此藥無不効

人參 沙參 玄參 紫團參 丹參

白木 牡蠣 知母 甘草 各二兩 蛤蚧 一星

全用河水淨洗文
武火酥炙黃色

右爲末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下一丸小兒量數加減

松花膏 治三二十年勞嗽預九月間宣利一切痰

涎肺積喘嗽不利

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子

甘草 蒼朮 黃精

右爲末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子
大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服
藥一粒

辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞

滿公忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏半兩洗 葶藶水研成膏 杏仁各半兩炒研成膏 朱砂

五靈脂各一兩

右爲末更研勻生薑汁煮麩糊爲丸如相子大
每服十五丸生薑湯下

大百勞散 治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食

蛤蚧

一對
蜜炙

元州鱉甲

一箇去
裙醋炙

附子

一兩

人參

柴胡

川乾薑

白茯苓

去皮

白朮

茴香

青皮

去
白

杏仁

去皮
尖

知母

貝母

陳皮

去
白

官桂

甘草

炙

半夏

生薑
製

蒼朮

湯浸各二兩蘇
木龍膽草各半兩

右爲末每服二錢水一盃用生薑三片棗二枚

烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥一斗

粒不用鐵煎

小百勞散

治勞喘嗽不已自汗者

御米殼

不拘多少炒

右爲末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣嗜悶咳嗽

痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子

九兩

良薑

一兩半

紅皮

去白

茴香

炒各一兩

乾薑

半兩

甘草

七兩

鹽

一斤炒

右爲細末每服一錢百沸湯點空心食前甚者

日進三服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

御米殼

蜜炒一兩

人參

陳皮

去白

甘草

炙一兩

右爲末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服

勞門

白朮黃耆散 治五心煩自汗四肢痿劣飲食減少

肌瘦昏昧

白朮

黃耆

當歸

黃芩

去皮

芍藥

各半兩

石膏

甘草

各兩

茯苓

寒水石

各一兩

官桂

一分

人參

川芎

各三分

右爲末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服

食前一日三服

人參白朮湯方 在消渴門第一方是也

此乃爲同不復錄耳

黃連丸

治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭

目

黃連

好者不拘多少

右爲末酒麩糊爲丸如小豆大每服二十九溫
水下不計時候日三服

必効散

治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不

已

川烏頭 一兩生

天南星 半兩生

右爲末每服二錢羅服入地如丹指大以水者
熱去滓食後服嚼

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候
不調月水過多喘嗽者

當歸

芍藥

川芎

白朮

染槐子

黃藥子

各半兩

生地黃

甘草

茯苓

去皮

黃芩

白龍骨

各一兩

右爲末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

食前

紫苑散

治勞體熱心寒脉滑短咳嗽婦人多有此

疾口乾眼溢骨痠短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能
開發玄府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通溢
滯和榮衛順三焦兼服人參白朮湯

紫苑

桑白皮

桔梗

續斷

甘草

五味子

各一兩

赤小豆

一合

右爲末水一大盞藥末五錢青竹茹彈子大同
煎至七分溫服去滓

枳實飲子

治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁

經候不調四肢煩倦心腹滿悶狀似勞氣

枳壳

一兩

吳半夏

一兩湯洗

七次以生薑汁

浸三日火炒黃色用半夏

紅芍藥

柴胡各一兩

黃芩一兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服及治五心煩熱及身體壯熱潮熱續服桃仁煎丸又治月經不調阻滯不通

桃仁二兩湯浸火炒川大黃各二兩川朴硝各二兩

蝨蟲一兩云翅頭足

右爲末用醋五升入金銀鐺內以慢火熬成膏可丸如桐子大當日晚不食夜飯溫酒下一丸不嚼破午際取下赤小豆汁似雞肝小蝦蟇衣

未再服候鮮紅即住服

盧同散 治男子婦人一切咳嗽喘急

欵冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂

甘草 白礬 佛耳草 各等分

右爲末每服一錢竹筒子吸喫日三服立効

焚香透膈散 治一切勞咳嗽壅滯胸膈痞滿

雄黃 佛耳草 鵝管石 欵冬花 各等分

右爲末每服用藥一錢安在香爐子上焚着以

開口吸烟在喉中立効

薰粟神聖散 治男子婦人久新日夜咳嗽不止者

御米殼

一兩用
蜜炒

烏梅肉

揀人參

呵子肉

葶藶

桑白皮

各半兩

右爲細末每服二三錢百沸湯潑臨母調下

新添三黃丸

治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚

者

太黃

黃芩

黃連

各等分

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二三十丸加至五十九生薑湯下不計時候日三服妙

當歸木香湯

治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩讖

語聲沉重舌根強硬言語蹇澁口苦不思飲食白

日間睡夜發虛汗神思恍惚夢寐狂言面色痿黃
頻發喘咳遍身疼痛骨節氣走注四肢沉重背脾
拘急發寒熱五心煩燥唇乾多渴胸膈不利喉咽
噎塞疔羸瘦弱經曰脉大爲勞宜服此藥

青皮

五加皮

海桐皮

桑白皮

陳皮

地骨皮

丁香皮

牡丹皮

棕蘆皮

已上諸藥全燒

爲灰末用十大錢秤

當歸

兩

木香

紅芍藥

半兩

右爲細末每服一錢水一盞入小油二點錢一

文同煎至七分溫服如婦人血臙臙下冷痛似

刀攪遍身腫滿室女經脉不通用斑猫一兩大

黃一兩炒剉二味爲末用黃狗膽汁以溫酒調
下一錢如臍下痛止心間痰未止不服二味

宣明論方卷之九

黃帝素問宣明論方卷之十

河間 劉守真 撰集

新安 吳勉學 校

燥門

消渴論

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於

風熱火也。又加大便乾澁，乃大腸受熱化成燥澁。

云諸澁枯渴。又如癰疽中風，皆因火熱耗損血液。

腑閉塞不能浸潤，金受火鬱不能發聲。經云肺主聲肢痛。

瘵疾者，風熱濕相致，而遂以偏枯。語音澁，手足不隨。

也。然中寒吐瀉亡液而成燥，亦以鮮矣。亦有寒濕相

去衛不能開發，貫注多成偏枯。經曰：諸澁枯涸乾。

及渴屬於燥也。○又如胃膈痺熱，煩滿饑不欲食。

戒消中善食而瘦，或燥熱鬱甚而成消渴。多飲

或因熱病或恣酒欲誤服熱藥以狂陽心

後脾胃真陰陽損虛肝心衰弱也鳴胃，澁拂鬱而水液不能宣行也。則

澤故瘦悴黃黑也。而燥熱消渴然雖多
後不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便
便多出俗未明妄爲下焦虛冷誤人多矣。○
入周身熱燥鬱故變爲雀目或內障癰疽發瘍止
咳嗽喘下爲痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化
者變爲水腫濕脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便
有脂液者爲消腎也此爲三消病也消渴消中消腎
經意但皆熱之所致也

人參白朮湯 治胃膈癰熱煩滿饑不欲食癰成爲
消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小

便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中
偏枯酒過積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥癢
痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荆芥穗

薄荷

桔槎

知母

澤瀉

各半兩

茯苓去皮

連翹

瓜蒌根

乾葛各兩

甘草

二兩

藿香葉

青木香

官桂

各一分

石膏

四兩

寒水石

二兩

滑石

半斤

右爲細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩
生薑三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加

至十餘錢得臟腑流利取効如常服以意加減

兼服消痞丸散以散腸胃結滯濕熱內甚自利者去了六黃芩硝

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩

黃丹

漢防已

括萎實

各等分

右為細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進

三二服即止

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參

三錢

白朮

澤瀉

瓜蒌

桔梗

梔子

連翹

各半兩

葛根

黃芩

大黃

薄荷

白茯苓

各一兩

甘草

一兩

石膏

二兩

滑石

寒水石

各三兩

右爲末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸

大黃甘草飲子

治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升

先煮三沸出
淘苦水再煮

大黃

一兩半

甘草

大蘆者四兩
長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糲水少更干豆軟盛於盆中故冷令病人食豆渴食不論無時時食食後消渴如若不止再煮

緣不三

痢門

總論

痢者五臟管毒■而不散或感冷物或胃寒暑失不能開發久傷冷熱等食更或服暖藥過極鬱化心利自古入三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也今人瘡管初發刺開乃血多曰成膿何為先熱而後也

云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃石乃熱青利是寒太素曰五泄有溏泄鶩泄殄泄濡

泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色
青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣
色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色
蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極
頻并窘痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除
濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利
積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白瘧閉淋

痛利小便偏主石淋

乃服金石熱藥多待爲
砂石從小便淋出者也腸胃

中積聚寒熱宜積氣通九竅六腑生津液去留結

消畜水止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五

藏大養脾腎之氣

比腎木之藏非
主之府也

理內傷陰痿安

魂定鬼補五勞七傷一切虛損主癩瘡驚悸

其季
初驚

動健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼

痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通經脉和血

氣消水穀保元真解百藥酒食刑毒耐勞役饑渴

宜熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽

及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮恚怒驚

恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能

令遍身結滯宜通氣和而愈及婦人下乳催生產

後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此
神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府賦白滑石

六兩

甘草

一兩

右爲末每服三錢

蜜少許

溫水調下

無蜜亦得

日三服

欲冷飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎

葱白豆豉

湯調下四錢

每服水一盞葱白五寸豆豉五十粒煮取汁一盞調下

併三

服妨爲度此藥是寒涼解散鬱熱若病甚不解

多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒兼易

得之賤物而不明素問造化之理故不取本草

神驗之言而多不用焉若以隨證驗之此凡人

之仙藥也不可闕之

傷寒當汗而不可下當下而不可汗者且如誤服此

藥則汗出自愈裏熱便得宜通而愈或半右裏

半在表可和解而不可發汗吐下者若服土藥

多愈亦獲小効是解散涼膈散和解為佳或人

耕鬱邪熱甚者小加減加蒼木末三分同葱鼓煎湯調服滑石麻黃桂

枝要發汗當即用甘草兩蒼木二兩同為末每服四

白豆豉五十枚同煎至六分去滓逼毒散非

婦可服太白散加麻黃二兩去節如神白散或逼

與加麻黃蒼木各等分濟眾云青龍散或青龍散

滑石與蒼木二倍最為發汗之妙藥也唯正可干

服之則轉加大通毒散或解利兩感涼膈散調

宜月論方

卷一

一

益元散

四錢或下孔用猪肉麩羹或酒之類調下四錢不計時候日三服宜食肉麩羹

兩催產

以用溫油漿調下三錢併二三服三一承

氣湯

前後俱下五錢須臾更頻用溫相漿調服

不下皆由風熱燥澁緊斂結滯不能舒緩是致產戶不得自然開也其藥力至則熱結頃開而產矣慎不可溫補而反生燥熱也俗未知產後日夜損血疼痛怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸證由不明素問造化故不識證候陰陽反以妄為產後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見渴甚者不令飲水本為善心為害多矣豈知治病之道俱以臨時審其藏府六氣虛實明其標本如法治之而已矣此藥之常多用雖為効至大俗以病異藥同將為妄安今以黃丹是桃仁色紅玉散若行反招侮暇

青黛

令輕粉碧色名碧玉散加薄荷葉末一分雞蘇散

主療並同但以回避
愚俗之妄侮慢耳

玄靑丸

治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸藥不

能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液
宣行者宜以逐之兼宜利積熱酒食積黃瘦中滿
水腫腹脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸證唯泄瀉
者勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各半兩

牽牛

四兩取末二兩

已土同細末

輕粉

二錢

青黛

一兩

右爲末勻水丸小豆大初服十九每服加十九

空腹日午臨卧三服以快利爲度後常服十五
二十九數日後得食久病未痊除者再加取利
利後却常服以意消息病去爲度後隨說止之
小兒丸如黍米或麻子大退驚疳熱積不下者
須常服十九

阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸
證

金井阿膠

淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細

烏梅肉

去核炒

黃蘗

剉炒

黃連

當歸

焙

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

半兩各等分

右爲末入阿膠研勻水在桐子大溫米飲下十
丸食前兼夜五六服小兒丸如菜豆忌油膩脂
肥諸物也

牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤
白諸色或渴或不渴小便澀或不澀并小兒驚疳
積熱疰癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能
食

輕粉

粉霜

硃砂

以上別研

雄黃

研朱砂

信砒

芭豆

去皮各一錢

黃丹

蠟

三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃朱

信

砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛爲油煎藥
研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑
旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或
止吐瀉痢疾調甘露散是桂苓甘露飲或益元散亦得
芍藥蘘皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無問膿
血並宜服之

芍藥

黃蘘

各一兩

當歸

黃連

各半兩

右爲末水丸如小豆大溫水下三四十九無時
兼夜五六服忌油膩脂肥發熱等物

二勝丸

治泄痢虛損不問久新者

鹽豉

紫蒜去反各等分

右同杵爲膏丸如桐子大每服三丸至五丸米飲湯下如未愈及赤白痢腹滿脇痛更與杏仁丸

杏仁丸

治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重者

杏仁

四十箇 芭豆 四十箇 去皮

右以藥同燒存性研細如泥用蠟鎔和旋丸如桐子大每服一二丸煎大黃湯間日一服

白木聖散子

治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢

亦治

御米殼二兩當歸蜜炒

肉豆蔻

縮砂仁

石榴皮 訶子

乾薑炮

陳皮去白

白朮 甘草

芍藥各等分

右爲細末每服二錢水一大盞入乳香同煎和

滓服

勝金膏 治一切泄瀉痢不已胃脘浮洪者反多日

不已者微小者立止

芭豆皮 楮實葉同燒存性

右爲末鎔蠟丸如菉豆大每服五丸煎甘草湯

下

大聖金直散 治一切寒熱赤白溇泄等痢疾

御米殼半斤炒

甘草一兩灸

乾薑半兩炮 當歸一兩

醋石榴皮一兩炒

陳皮去白

白茯苓去皮一兩

右爲末每服二錢水一盞小兒半盞乳香同煎至七分食前忌油膩生冷毒物等

車前子散 一名斷痢散能治一切痢不止

車前子不以多少炒香

右爲末每服二錢米飲調下食前空心

象骨散 治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消噫氣吞

酸食輒嘔吐霍亂泄瀉膿血四肢沉重臍腹疼痛

裏急夜起頻併不思飲食皆可治之

象骨

四兩炒

訶子

取肉二兩

肉豆蔻

一兩

枳殼

一兩

甘草

二兩

乾薑

半兩

右爲末每服三錢水一盞半煎至八分和滓熱

服食前日三服

海蛤玉粉散

治血痢解藏中積毒熱

海蛤

不以多少

右爲末每服二錢入蜜少許冷水調下不計時

候

黃帝素問宣明論方卷之十