


聖濟總錄纂要 二十一之二十三

			一	漢
			二	書
			六	門
			五	
			一	
一	二	一		
二	三	一		
冊	架	函	號	類

				漢
			一	書
			二	
			六	
			五	
一	二	一		
二	三	一		
冊	架	函	號	類

內閣文庫	
番號	漢 12651
冊數	12 ( 11 )
函號	300 219





聖濟總錄纂要

卷之二十一

二十一

藏書

桂川家藏

新安

程

林雲來

纂

張

潮山來

戴

會亦魯

錢塘

胡爾槐植三

瘡腫門

丁腫

諸疥

諸癬

代指

即天蛇頭

丹毒

疔瘡

肉刺

即雞眼疔

疔腫



聖濟總錄纂要

卷之二十一

丁腫



論曰丁腫者由風邪毒氣入于肌肉所生也凡有十種一者瘡頭烏而強凹二者瘡頭白而腫實三者瘡如堊堊色四者瘡似葩紅色五者瘡頭內有黑六者瘡頭赤紅而浮虛七者瘡頭葩而黃八者瘡頭如金箔色九者瘡頭如茱萸十者瘡頭如石榴子亦有初如風疹搔破青黃汁赤裏有赤黑脉而小腫亦有全不令人知忽衣觸手摸着則痛若故取便不知處亦有肉突起如魚眼之狀赤黑疼痛徹骨久結皆變至爛瘡瘡下深孔如火針穿之狀初作時突起如丁蓋故名丁瘡令人惡寒四肢強痛三日瘡變焦黑

腫大光起根硬不可近犯之則痛徹骨其發于手足頭面骨節間為氣血所會尤宜速治不然毒氣入腹煩悶恍惚如醉人治無所施矣

丁腫方

河東柳宗元偶病丁瘡凡四十日他藥治之莫效長樂賈宣伯教用蠅螂心貼之一夕而穴百苦皆已次年春因食鵝羊肉丁又大作再用之亦如神效按蠅螂心在腹下度取之其肉稍白者是也以此貼瘡半日許可穴再易之血盡根出而愈矣



巴豆塗 治丁瘡乃日本國傳來者

巴豆十粒 半夏一枚 附子半枚 蟪螂一枚 各為末以人

糞相和看大小瘡作紙圈子圍瘡口以藥傅上用絹

貼之一日三易

地骨皮散 同上

地骨皮五錢 小麥 大麻子各十粒 緋帛五寸

亂髮卵大 半夏七枚 曲頭棘刺二十枚 燒灰即棘

用骨皮半夏為末與各灰同研勻酒下二錢日二

乾薑胡椒傅 治一切丁腫惡毒

乾薑 胡椒炒 龍骨 皂莢去皮 斑猫去翅足

共末用酒和如膏貼上日二

諸疥

論曰字書以疥有介守之義言雖微小介然守形體而難治是以疥有五名皆因風熱邪氣客于皮膚之間久則化為蟲時作痛痒故作為瘡腫焮赤痛痒者謂之大疥皮內引起結根搔之不痛謂之馬疥瘙痒皮起謂之乾疥三者為重以風溼熱氣深在肌肉故也若水疥痞癩如癩漿溼疥瘡小而汁出特風熱淫於皮膚之間故淺而輕俱風熱



之客故皆有蟲或謂蟻蟲內出理或然也治宜疏風滌熱當以薰浴傳塗湯液並施則善

苦參散 治身瘡疥風毒癢

苦參 白花蛇酒浸去皮骨炙 川連 川歸三兩 人參

玄參 丹參 白芍 防風五錢 白蒺藜炒去刺一兩

共末酒下二錢

快肌丸 治徧身瘡疥癢

威靈儂三兩為末 雄猪膽三枚 用膽汁和末丸梧子大荆芥湯下二十七

共末酒下二錢

防風丸 治一切風疥瘡癬皮膚癢痒癩疹

防風 蟬脫 猪牙皂炙去皮二兩 天麻三兩 共末用精

羊肉煮極爛以酒熬成膏丸梧子大用荆芥酒下三十丸日二

苦參丸 治一切疥瘡

苦參 玄參 山梔 獨活二兩 甘菊 防風

大黃炒香熟 片苓 枳殼一兩 川連兩半

共末蜜丸梧子大酒下二十九日二

五參散 治諸疥風虛惡瘡



人參 玄參 丹參 沙參 苦參 秦艽 白蒺藜  
炒 山藥 子芩 防風 麻黃去根 獨活 茯神  
細辛 山梔 枳殼分 烏蛇肉酒炙  
錢五 共末水下三錢日二

雞子油塗 治一切惡疥瘡

雞子七枚煮熟用 膩粉 髮灰 枯礬分 石硫黃  
黃慢炒取油 錢五 共研入油和勻塗上日三五次差

諸癬

論曰癬之字從鮮言始發于微鮮縱而弗治則浸淫滋蔓

其病得之風溼容于腠理搏于肌肉否滯久則因風溼而  
 變化生蟲故風多于溼則為乾癬但有周郭皮枯瘙痒搔  
 之皮起白屑者是也溼多于風則為溼癬周郭中如蟲行  
 浸淫赤溼搔痒汁出是也風搏于氣血則為風癬癬痺不  
 痛痒是也如錢形則為圓癬如雀目則為雀目癬亦皆赤  
 痛而瘙痒又或牛犬所飲之水刀刃磨淬之漿取以盥濯  
 毒氣傳人亦能生癬故得于牛毒者狀似牛皮于諸癬中  
 最為痛厚乃邪毒之甚者俗呼為牛皮癬狗癬白點而連  
 綴刀癬縱斜無定形凡此八者皆風溼毒氣搏于肌中故



痛痒不已久而不差又謂之大癬

苦參丸 治一切風癬皮膚瘙痒

苦參 烏蛇肉炙四兩 石菖蒲二兩

共末入蜜丸梧子大酒下二三十九

丁香散傳

丁香 蝦蟆灰一兩 麝香一分 枯礬 五倍子

膩粉研五錢 各末研勻傳上

一抹散 治乾癬

天南星 草烏頭各一枚生為末 川羊蹄根搗取自然汁調

塗三日差

狼牙丹砂膏 治一切乾溼諸癬

狼牙 丹砂 枯礬 雷丸 雄黃 藜蘆 硫黃一兩

共末入猪脂和成膏日塗三五次

代指即天蛇頭

論曰瘡發指端爪甲脫落名曰代指蓋爪者筋之餘筋骨熱盛注于指端故其指先腫赤熱焮痛結聚成膿甚則爪甲脫落世俗謂之遭指又名淪指又名代甲其實此病類于指疽然無蘊毒故色不黯黑即病雖久亦不殺人也



漏蘆湯 治代指筋骨臟腑中熱焮赤腫痛

漏蘆 升麻 子芩 大黃炒一兩 玄參三分

水煎五錢入淡竹葉二七片煎減半去滓入芒硝一錢再二三沸溫服日二已利去芒硝

地龍散 治代指

地龍 去泥土上炙為末用猪脂和塗患上日二

升麻湯浸 治代指雖內無蘊毒然筋骨中熱氣壅盛

升麻 生甘草兩 用水煎去滓入芒硝末一兩攪勻

浸指數十次

此頭疔瘡痛不可忍臭不可聞 蜈蚣一條焙乾為末猪

膽汁調 又用黑豆生研末入繭內籠之

醬蜜塗 治代指不結靨

醬汁 白蜜 二味和煎令沸稍熱塗上日三五次

熱湯蘸 治代指為五臟氣流注十二經毒熱冲于手指

熱湯 急蘸五七次冷水浸之又復如此三度便塗羊

膽汁差未成膿者用此方甚效或以猪膽盛代指用

其線扎之亦妙

諸丹毒



論曰熱毒之氣暴發于皮膚間不得外洩則蓄熱為丹毒以其色如塗丹之赤又復陽氣伏于皮膚中故謂之丹因熱氣慄悍其發無常處大則如掌甚則周流四肢若不急治或壞爛出膿血若發于骨節之間則以藥斷截毒氣入腹則能殺人治法用鎌割明不可緩故也

漏蘆湯 治丹毒遊走

漏蘆 升麻 白芍 子芩 白斂 白薇

麻黃去根節 甘草 大黃一兩 水煎五錢溫服日二

赤小豆塗 治丹毒如掌大身赤腫痛痒

赤小豆 為細末以雞子白和如膏塗丹上日二

吳藍湯搗 治丹毒

吳藍 升麻 石羔 片芩 白斂 犀角一兩

生地三分 山梔 大黃五錢 水煎一兩入竹瀝浸搗

羚羊角塗 治赤黑丹毒

羚羊角燒灰 研細以雞子白和如膏塗患上日二次差

鹿角散塗 治赤黑丹

鹿角 燒灰存性研末入熟猪脂和塗日二

痂瘡



論曰內經謂汗出見溼乃生痲痺蓋熱盛汗出陽氣發泄而腠理疎反以寒水洗浴則熱氣內鬱於皮膚之間輕則為痲重則為瘰也世俗通謂之痲子其狀皮肉如毫針所刺徧體細瘡如麩片愈而復發是也

葛粉傳 治痲子

葛粉

三兩

生甘草

一兩

風化石灰

微炒五錢

共研撲之

活石豆粉傳 治痲子

滑石

飛過

菜豆粉

棗木葉

共研末傳之日三

乾壁土傳

治暑月肌膚瘡爛或因搔成瘡者

陳乾壁土

取向東方者

研細傳之日三四次隨手即愈

肉刺

論曰肉刺者生于足指間形如鞭胝與肉相附隱痛成刺由靴履急穿相摩而成名為肉刺俗呼為雞眼睛是也

膠脂膏貼 治肉刺

栢木上白膠

明松脂

一兩

黃蠟

五錢

將膠脂熬化入蠟成膏貼之

酥粉傳 治肉刺

蟬酥

自取者

膩粉

一錢

將酥浸溼入粉研勻用鍼撥破



塗上蜜裹日二

礪砂傳 同上

礪砂 用醋化熬成霜以少許和膠傳之其根即出

金瘡門

金瘡血不止 金刃傷中筋骨

金瘡中風水瘰 金刃腸出

金瘡血不止

論曰血行脉中周行灌溉而無窮已金刃所傷深則其流湍激若海洩河決禦之至難要在杜其冲溢之勢外觀其

形內訂其脉之何如若血出不斷其脉大而止者為難治若血出不止前赤後黑或黃或白肌肉腐爛寒冷鞞急者為難治不可不察也

麻黃散 治金瘡止血悶疼痛

麻黃兩半 白芷 附子 白芍 川歸 續斷

乾薑 炙甘草 子芩 川芎 桂心五錢

共末酒下二錢日二

天南星散 治刀刃所傷血出不止

天南星三枚 鉛丹炒紫一錢 共末研勻乾貼患上日二



聖濟總錄卷之二十一 止 十

刀箭方 治血出不止

石灰遠年者一兩 鉛丹炒三分 龍骨 狗腦骨燒五錢

共末傳上日二

風化散 治金瘡止血定痛

風化石灰一斤 乾薑三分 生栗子 白藥五兩

午日共末以備急川

石榴花散 同上

石榴花乾者五錢 石灰炒升半 共末用少許傳上少刻斷

血止痛

蒲黃散 治金瘡血出腹脹欲死

蒲黃 生地黄兩半 川芎 白芷 川歸 黃芪

續斷一兩 甘草三分 共末空心酒下三錢令腹中死血

化爲水日三若口噤用物幹開灌之加大黃兩半

金刃傷中筋骨

論曰金刃所中至于筋骨其所傷深矣然接骨絕筋亦可  
接續要在乘血氣未寒急施治法若不乘熱則風冷易入  
瘡縱暫愈後必不仁亦致痛煩而終身不完至于小碎之  
骨即當出之不爾則膿血不絕肌肉亦不能收斂矣



骨碎補丸 治一切金刃傷中筋骨風冷所入疼痛

骨碎補 兩三 山藥 附子 虎骨 炙 桂心 白檳榔

自然銅 醋淬七次 熟地 敗龜板 醋炙 白薇 山萸肉

澤蘭葉 兩一 五味子 川歸 乾薑 錢五 肉蔻 二枚

金肉菴蓉 分三 共末入蜜杵丸如梧子大酒下二三十丸

日二 水日三 水日四 水日五 水日六 水日七 水日八 水日九 水日十 水日十一 水日十二 水日十三 水日十四 水日十五 水日十六 水日十七 水日十八 水日十九 水日二十 水日二十一 水日二十二 水日二十三 水日二十四 水日二十五 水日二十六 水日二十七 水日二十八 水日二十九 水日三十 水日三十一 水日三十二 水日三十三 水日三十四 水日三十五 水日三十六 水日三十七 水日三十八 水日三十九 水日四十 水日四十一 水日四十二 水日四十三 水日四十四 水日四十五 水日四十六 水日四十七 水日四十八 水日四十九 水日五十 水日五十一 水日五十二 水日五十三 水日五十四 水日五十五 水日五十六 水日五十七 水日五十八 水日五十九 水日六十 水日六十一 水日六十二 水日六十三 水日六十四 水日六十五 水日六十六 水日六十七 水日六十八 水日六十九 水日七十 水日七十一 水日七十二 水日七十三 水日七十四 水日七十五 水日七十六 水日七十七 水日七十八 水日七十九 水日八十 水日八十一 水日八十二 水日八十三 水日八十四 水日八十五 水日八十六 水日八十七 水日八十八 水日八十九 水日九十 水日九十一 水日九十二 水日九十三 水日九十四 水日九十五 水日九十六 水日九十七 水日九十八 水日九十九 水日一百

金瘡中風水及瘰

論曰金瘡中風水者以封固不密所致也夫中風之候其倉卒無汁中水之候則出青黃汁而又疼痛發熱內腫硬

時為瘰狀可急治之凡瘰狀口急背直搖頭馬鳴腰為反折須臾十發氣息如絕汗出如雨治不可緩緩則不能救  
熟地丸 治遠年傷折忽因風氣于舊處痛不可忍

懷熟地 兩四 杏仁 去皮尖炒 牛膝 兩半 黃芪 苦參

兔絲子 酒煮 肉菴蓉 草薺 炒一兩 升麻 桂心 分三

青木香 分一 訶勒皮 錢五

共末入蜜丸梧子大酒下二三十丸日二

雞屎白豆酒 治金瘡中風反張者

雞屎白 合一 大豆 合二 先以豆炒焦黑入屎白同炒熟



又以瓶貯酒三升乘熱豆傾酒中蓋良久去滓服五合少頃又服取汗出飲酒後以薑粥助之

羌活飲 治金瘡并傷折骨諸瘡腫慎不可當風臥溼地取涼若風溼所傷則發瘰口噤殺人若覺頸項強身拘急便服

羌活一兩 竹瀝三鍾 用水煎羌活減半去滓入瀝再沸

分三服

川椒罨 治金瘡中風

川椒生用 三兩 看瘡大小用麩作餛飩灰火中炮熟乘熱

開一孔當瘡上罨之劫引風出多做候換數次差

川芎湯 治金瘡中風痛不可忍

川芎 防風 羌活 川歸一兩 炙甘草三分

水煎六錢熱服取汗如汗不出加麻黃一兩桂心三分湯成入竹瀝沸服日二

鹽韭傳 治金瘡中風水腫

韭白 食鹽等分 共搗爛放瘡上以火炙藥上熱徹愈

又方

鹿角 燒灰存性研末用猪脂和塗日二差



金瘡腸出

論曰金刃所傷有腸出者有腸出已斷者視其輕重以決死生腸有一頭見者不可續也若腹痛不可忍短氣不能食近則一日遠則三日治無及矣腸有兩頭見者速以桑白皮按作線或以麻縷續之仍用雞白塗隙勿令氣洩推內之密縫瘡口用雄雞血塗之腸有出而不斷者以大麥汁洗而內之亦如前法須研米粥飲二十餘日強糜百日方可食飯又不可令飽恐其腸斷仍常以湯散助之

磁石散

治金瘡腸出宜入之

磁石

醃滓七次

滑石

飛過等分

同研洒下一錢日三及以針

砂塗腸上其腸自收入而無害

小麥飲噴腸方治金瘡腸出不能入

小麥

三升

用水九升煮汁五升以綿濾過候冷含噴瘡

上漸入以冷水噴其背不令病人知亦不可使傍人

語卒然急噴其腸自入不可食飽勿使病人驚恐恐

驚則殺人難治

毒箭所傷

箭鏃金刃入肉

狐尿刺

惡刺

竹木刺傷肌肉不出



毒箭所傷

論曰箭鎗毒藥入皮膚肌肉間令人短氣悶絕口噤唇乾血雖止而腹滿不能言其人如醉者為難治若瘀血應時出其瘡溫而熱開口能言則可治巢氏論毒箭有三種曰嶺南夷俚人用焦銅作箭鏃其嶺北諸處以蛇毒螫物汁著管中漬箭鏃及有以苗藥為之者三種傷人皆不易治唯急飲糞汁可以禦其毒少緩則毒氣深入不可救也慎之慎之

半夏飲

治毒箭所傷箭鏃毒藥在內不出

半夏

三兩用生薑二斤取汁浸三日

白斂

三兩

同炒為末酒下一錢

日三瘡淺十日瘡深二十日方出

雄黃塗

治毒箭所傷

明雄黃

研極細傅瘡上日四五汁出愈

此方治毒

蛇蜈蚣咬亦妙

生薑飲

治中毒箭

生薑

取自然汁飲五分未退再飲一方用甘草煎

汁頻飲

旋復根散

治中毒箭



旋復根 為末酒下二錢日三仍傅瘡上無根用花  
箭鏃金刃入肉

論曰凡箭鏃金刃入肉治宜速出內有碎骨亦須去盡然後傅藥不然其瘡必不合縱然少愈亦常作疼痛若神驚血亂氣奪則死無救

丹皮散 治金瘡箭頭在骨多年不出

丹皮 白斂一兩 丁香 麝香 藿香 桑白皮一分

共末溫酒下二錢淺者十日深者二十日箭頭自出

又方 同上

磁石生研極細 明雄黃三分 同研勻用菘豆煮汁下一二錢

十日後輕撥便出手足上用此末點之亦自出

紅散子 治中箭頭用之摩瘡口上

蔓陀羅子 草烏 茄子花 蓖麻子 麒麟竭五錢

共末以好酒和調塗摩瘡上箭頭自出

解骨丸 治箭鏃不出能令自出

明雄黃 象牙末 螻蛄一兩 共末入蜜杵丸黍米大

用一丸內瘡中以細膩羊腎脂貼之箭頭自出

鼠肝傅 治箭頭不出



鼠肝五枚 研如泥傅之兼以鼠腦髓塗之良亦治針折

肉中塗之自出

象牙屑 治箭頭不出

象牙屑 研末用蜜和塗瘡上并折針竹木刺皆出

狐尿刺

論曰狐尿刺者乃狐狸尿草棘上人有誤犯則發腫痛焮

熱多在于手足指節然亦有端居不出而被此毒者蓋毒

氣有相類之症亦不因狐狸尿乃爾也

白歛膏 治犯狐尿久不差

白歛 羊屎 括蕁根五錢

共搗如膏裹瘡上一伏時其刺自出

大豉傳 治狐尿刺在手足指節間腫痛

大豉一兩 細嚼熟傅之少頃取下看豉中有毛效如不

見毛又嚼傅之以毛出為度

桂心黃蠟丸 治一切惡刺入肉者

桂心 研末用黃蠟化丸看瘡口大小置丸瘡內以溼

紙三五重搭蓋以火燻候丸化入肉其刺自出如無

刺其傷處亦平也



聖濟總錄卷之二十一  
獨栗塗 治惡刺不出

獨顛栗 去衣嚼如泥塗瘡上帛裹半日有刺自出

惡刺

論曰惡刺初得以蛇虺毒氣經由草木水澤間有人染着忽似刺割俄致腫痛其肉潰爛若手足上着注即指節墮落土人諳歷既多初覺中刺時以艾炙數十壯十愈八九灸弗愈者速以下藥塗傳

葱白蒲公草膏 治中一切惡刺

葱白一把 蒲公草五兩 大豉一分

共爛搗塗瘡上外用醋麩紙封自出

木蟲塗 治惡刺

木中蟲五枚 用米醋和研如泥封之差

黑豆汁漬 同上

黑豆一升 用水煮取濃汁頻頻漬之差

竹木刺傷肌肉不出

論曰竹木刺所傷為患甚淺然入人肌肉久不得出則損動榮衛而作瘡或中風水則腫痛若成膿淹留歲月未易治也但刺傷之初宜速治之加以塗傳無致風水之患



羊屎傅 治竹木刺

羊屎 炙乾為末用猪脂和傅日三五上經宿白出

象牙散傅 治竹木刺并鍼折不出

象牙屑 為末以雉鼠腦髓和傅上立出

糯米膏 治金瘡水毒癰疽熱毒竹木等刺

糯米 於端午日前四十九日以冷水浸之日二換

水輕淘至午日午時曝乾挂風處凡遇患用少許炒

焦為末水和成膏塗瘡口帛縛候瘡愈解去若金瘡

候犯生水作膿腫甚者急用此膏塗之良久其腫處

即消若癰疽毒瘡初發纔覺焮腫痛并痒癢等症用

此末貼項下及腫處若竹木簽刺入肉者臨臥時貼

之明日揭看其刺自出在藥內若貼腫毒藥乾即換

之須常令溼為妙唯金瘡及水毒切不可換恐傷動

瘡口

痔瘻門

諸痔

牡痔

牝痔

脉痔

血痔

腸痔

氣痔

痔瘻

腸風下血

諸痔



論曰痔有五名一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔症雖小異大率皆飲食飽甚情慾過度之所致也夫飲食飽則腸胃傷情慾過則氣血耗毒氣乘虛流入下部所以滯積而為痔也

如神丸 治腸風五痔

烏蛇肉酒炙 防風 大黃煨二兩 枳殼炒 黃芪

刺蝟皮炙 陳皮 白蒺藜炒去刺 秦艽兩半

共末入蜜杵丸梧子大空心酒下三十九臨臥再服 當日血止定痛

神妙湯 薰洗五痔

草薺 甘草 五倍子 括蕪根 大蒜

葱白等分 每日用一二兩煎水薰洗日二

神白散 治痔瘡下部發腫如梅李大痛硬不能行者即

時取效

半夏齊州者 每用一枚研極細入水片一小皂子大同

研勻用津唾和攤軟紙上貼之即冷如水良久清水漸消未全愈再貼去根尤妙

牡痔



論曰內經謂飲食自倍腸胃乃傷因而飽食筋脉橫解故

澀而為痔其狀肛邊生鼠乳或痒或痛膿血時下謂之痔

蝟皮丸 治牡痔肛邊生鼠乳疼痛寒熱

蝟皮灸 附子焦 槐木耳 枯白礬 川歸 桑白皮

赤芍一兩 楮根白皮灸 共末入蜜杵丸梧子大飲下三十丸

荆芥槐花散 治鼠乳牡痔便血痛不可忍

荆芥穗 槐花炒 枳殼炒 黃芪蜜灸二兩

共末空心飲下二錢

牝痔

論曰牝痔者由邪熱壅在肺經傳注大腸又大腸久虛風熱留滯故令肛邊生瘡而血也名曰牝痔此皆酒食房勞過度令毒氣攻注所為故又謂之酒痔

地榆湯 治牝痔肛門生瘡下血不止

地榆 子芩 赤芍 枳殼 檳榔 川歸 黃芪灸

兩 水煎四錢空心溫服日二

淋洗白礬湯 治牝痔

枯白礬 研末每用五七分入沸湯內和勻浸洗日二差



脉痔

論曰脉痔者臟腑蘊積風熱不得宣通也風熱之氣乘虛流入下部故肛邊生瘡痒痛血出也蓋實為痛虛為痒今實熱乘虛下攻肛腸故痒且痛又脉者血之腑得熱則妄行故血乃出也

槐莢煎丸

治脉痔生瘡下血痒痛

槐莢

一斤洗入水半斤研取汁

白蜜

二兩與莢汁同煎成膏

防風

黃芪

炙五錢

杏仁

去皮尖炒

皂莢子

炒三分

枳殼

炒兩

共末與杏末拌勻入膏杵丸梧子大飲下二三十丸

日二

阿膠湯

治脉痔有蟲時作痒痛血出不止

阿膠

炒

艾葉

川歸

青箱子

一兩

水煎五錢温服

二日

薰洗槐白皮湯

治脉痔有蟲或下膿血

槐白皮

二斤

用水一斗五升煎一斗傾盆中坐薰湯冷

再煖蟲當隨便利自出仍用槐白皮為末綿包錢許

內下部中日二差

出蟲方

治脉痔下部如蟲咬

桃葉

十斤

搗研蒸熟乘熱入小口器中坐薰其蟲自出



滌痔散 同上

白礬 研一兩 取小便三升溫熱入礬末五錢乘熱洗之

血痔

論曰血痔者乃肺熱流毒也肺與大腸為表裏今肺臟蘊

熱毒氣流滲入于大腸血性得熱則流散故因便而肛腸

重痛清血隨出各曰血痔

蝟皮散 治血痔

蝟皮 燒灰存性 白芷 黃芪 懷熟地 側柏葉

川續斷 地榆 川連 一兩 共末空心飲下二錢日二

地榆湯 治血痔

地榆 熟艾 防風 枳殼 炒 龍骨 黃芪

桑木耳 一兩 水煎五錢入生地一分溫服日二

蒲黃湯 治諸痔下血

蒲黃 川芎 生地 白芷 川連 川歸 白石脂

甘草 一兩 水煎五錢空心溫服日二

黃芪散 治血痔下血不止

黃芪 蜜炙 枳殼 炒三兩 防風 兩半 共末空心飲下三錢

日二



枳實槐角子散 治血痔下血久不差

枳實炒 槐角子 木賊五錢 共末用皂莢湯下二錢

日二

腸痔

論曰腸痔者以腸胃有風挾熱二者乘虛入于腸間冲發下部故令肛邊生核腫痛不消病始作令人寒熱時有血出也

枳殼湯 治腸痔腫痛生核或發寒熱

枳殼炒 子芩 白芍 黃芪一兩 川芎 川歸

檳榔煨 丹參兩半 水煎五錢空心溫服日二

括蕪散 治腸痔下血

括蕪大者一枚 烏梅肉十枚 將蕪切蓋去空以梅肉實其中仍蓋封用黃泥包裹晒乾火煨存性研末溫酒下

二錢日二

地榆散 治腸痔下部生核腫痛時發寒熱出血

地榆 槐花半生半炒 甘草一兩 共末用枳殼桑白皮湯

下二錢日二

又方 治一切痔淋洗



荆芥穗 生甘草二兩 同末水煎一兩淋洗日二

白木紫朴丸 治久積虛冷腸風痔瘻面色萎黃虛劣

白木 紫朴三兩 人參 甘草 川歸一兩 黃芪

黑乾薑 陳皮兩半 共末入蜜杵丸梧子大飲下二三

十九

二根散 治腸痔有血

枸杞根白皮 白薔薇根白皮二兩 共末水下二錢二

氣痔

論曰氣痔者因便下血或肛頭腫凸良久乃收是也此由

毒氣蘊積腸間及恚怒不節酒食過傷令下部氣滯壅結而成

烏蛇黃芪丸 治氣痔大便下血脫肛腫痛

烏蛇肉五兩 人參 獨活 枳殼 地骨皮一兩

郁李仁去皮炒 羚羊角三兩 黃芪 檳榔兩半 大黃炒

大麻仁炒二兩 訶勒皮一分 共末入蜜杵丸梧子大酒

下二十九丸以梨度未利加丸數

必效丸 治氣痔脫肛不收或生鼠乳時出膿血久不差

枳殼炒 黃芪蜜炙 共末陳米糊丸梧子大空心飲下

三十九日二



痔瘻

論曰五痔之疾或生鼠乳或發寒熱或生瘡痒痛或下膿血其症不一治之不早反勞傷過度則毒氣浸漬肌肉穿穴瘡口不合時有膿血故成痔瘻經曰痔久不差變為痔瘻是也又或蔓穿數處或形似螺蛳膿血與肌肉綿綿而下故謂之痔瘻昔人謂蟻蟲居腸間多生瘻痔方中用薰法及化蟲之藥不可不察

乳香五錢 治一切痔瘻反花瘡

麝香

冰片

丹砂

沒藥二錢

雄黃

黃蠟

生地一兩

共末研勻化蠟丸梧子大用麥冬湯

下十丸少留末塗瘡上

蝟皮丸 治五痔多年不差漸成痔瘻

蝟皮炙

龍骨炙

附子

川歸

枳殼炒

黑乾薑兩

黃芪炙

艾葉三分

共末入蜜杵丸梧子

大用黃芪湯下三十丸

腸風下血

詳結陰下血

論曰腸風下血者由腸胃有風氣虛挾熱血得熱即妄行因而滲入腸間故令下血故以為名昔人謂先血後便為



近血先便後血爲遠血遠近之別不可不察

玉壺丸 治腸風下血

皂莢鉞

青嫩者半斤用水五升浸七日砂礪煮取汁一升又熬減半入蜜一兩熬成膏

胡桃

仁十枚

枳殼

火燒酒淬一兩

乳香

沒藥

炙二錢

椿根白皮

陰地者炙一兩

共末入膏杵丸梧子大每服二十九

腸風下血煎木賊湯下

五痔疾荆芥湯下

時常瀉血米飲日下二

玉屑丸 治腸風下血及痔瘻藏毒久不差

槐根白皮

椿根白皮

苦楝根白皮

三兩三味採時春宜早夏宜遲

天南星生

生半夏

五錢

威靈仙

一兩

寒食麩

二兩

共末拌勻滴水丸梧子大每服三十九先用水二鍾

煎滾入丸令浮再服日二

琥珀散 治腸風及一切血痢脾臟下血不止

琥珀屑

研

赤小豆

白芷

枳殼

槐花

鹿角霜

一兩 上五味同炒焦黑爲末入珀末拌勻空心米飲下

二錢日二

槐角子散 治腸風

槐角子

炒

防風

枳殼

炒五錢

黃芪

炙一兩

聖濟總錄卷之二十一

卷之二十一

腸風下血

三



共末空心茶下一二錢

防風散 治腸風下血

防風

微炒

黃芪

炙二兩

炙甘草

人參

五錢

共末空心飲下二錢

白朮丸

治腸風痔瘻脫肛下血面色萎黃久不差

白朮

一斤用糯米三升同浸三日曬乾細切慢炒香為末

懷生地

半斤酒浸甑上蒸熟爛搗

如泥

二味和勻用大力者搗二三千槌如硬入好酒蜜

少許丸梧子大陰乾空心米飲下二三十丸日二

牡蠣散

治腸風下血不止及崩血

牡蠣

大者醋淬七次

細研如麩空心飲下二三錢日二

傷折門

從高墜下傷損腫痛

傷折惡血不散

筋骨傷折疼痛 傷折風腫

傷折統論

論曰諸脉從肉諸筋從骨骨三百六十有五聯續纏固手所以能攝足所以能步凡厥運動固不順從若乃倉卒之際墜墮倒仆傷折蹉跌患生不測詎可不圖療治小則消腫而伸攣大則續筋而接骨各有方劑存焉當按症施治



從高墜下傷損腫痛

論曰凡墜墮傷損腫痛輕者在外塗傅可已重者在內常導瘀血養肌肉宜察淺深以治之

阿膠湯 治墜墮傷折手足痛

阿膠 白芍兩半 生地 川芎 川歸 熟艾兩一

黑乾薑 甘草錢五 水煎三錢溫服日二

地黄糟搗方 治墜墮撲損筋骨疼痛瘀血凝滯腫熱不消

懷生地搗 酒糟等分 看輕重下藥拌勻蒸熱塗傅患

上用帛裹縛日一易

接骨膏 治一切打撲傷墜疼痛

續斷兩一 白芨 附子 川歸 獨活 桂心

雄黑狗脊骨燒 白欽 桑白皮錢五 黃米炒二合

共末用酒半鍾和藥末三錢白麩二錢生薑自然汁少許慢熬成膏攤貼三日一換冬月用杉木皮綿繩夾縛夏月以柳枝子五條夾縛雖緊不妨

續骨丸

黃蠟煉過半斤 鉛丹飛炒過 自然銅醋淬七次 蜜陀僧煨四兩

白礬兩十二 麒麟竭 丹砂飛過 乳香炙去油勿焦 沒藥



灸去油 一兩 豬脂十兩 先熬脂化蠟于冷處入僧丹銅末

再熬攪滴水不散又出鼎離火下諸末不住手攪至

凝丸彈子大且用笋皮襯之極冷收貯凡傷折用一

丸入少油化塗傷痛處以油紙帛護之甚者以燈心

裹木夾之又以一丸分作小丸熱酒下痛即止如藥

力盡痛未除再一服骨上便安

玄胡索湯 治傷折疼痛筋骨未合肌肉未生

玄胡索 川歸 白欽 懷熟地 鹿角膠 綿黃芪

桑寄生 桂心一兩 水煎五錢空心溫服日二蓋煖

傷折惡血不散

論曰脉者血之腑血行脉中貫于肉理環周一身因其肌  
體外固經脉內通乃能流注不失其常若因傷折內動經  
絡血行之道不得宣通瘀積不散則為腫為痛治宜除惡  
瘀使氣血流通則可復完

黃芪湯 治傷折惡血凝滯腫痛

黃芪 白芍 附子 生地 桂心 川歸 續斷一兩

大黃生 川椒 乾薑二兩 白水煎三錢溫服日二

糟米塗 治傷折赤腫惡血不散疼痛



酒糟<sup>二斤</sup> 糯米<sup>半升</sup> 用酒煮米熟入糟煮稀稠得所乘

溫熱塗上用帛封裹煖一日一換以差為度

蒲黃散 治傷損惡血不散不欲聞人聲胸中氣塞便利

出血

蒲黃<sup>合一</sup> 生地<sup>兩二</sup> 桂心 白芷 川歸 續斷<sup>兩一</sup>

炙甘草<sup>錢五</sup> 共末酒下一二錢日二

葱白塗 治一切墜落打撲腫毒疼痛

葱白<sup>三十根</sup> 用灰火煨透乘熱搗爛塗患上用棉紙包

縛令煖

筋骨傷折疼痛

論曰人之一身血榮氣衛循環無窮或筋肉骨節悞致傷折則血氣瘀滯疼痛倉卒之間失於調理所傷不得完所折不得續輕者肌膚焮腫重者髀肉剝脫治宜先整其骨續其所折後施貼熯封裹之劑

麒麟竭散 治筋骨損傷疼痛

麒麟竭 白芷 赤芍 沒藥<sup>炙去油</sup> 蒲黃 自然銅

醋<sup>淬</sup> 生大黃 川歸<sup>錢五</sup> 桂心 荷葉 骨碎補<sup>去毛</sup>

分三 共末空心酒下二錢日二



川芎散 治傷折腫痛血不散

川芎 桂心 附子 川椒炒 甘草 蘭葉一兩

大黃醋炒 川歸五錢 共末酒下二錢日二

接骨桂芸膏 治撲打筋骨傷折腫痛不可忍

桂心 芸苔子 白芥子 敗龜板 大黃 虎頭骨

酥炙 赤狗頭骨燒灰存性 木别子一兩 共末研勻用小黃

米粥攤帛上摻末一匙裹損上以竹片夾定繩縛七日

沒藥丸 治傷折筋骨疼痛

沒藥炙研 丹砂 牛膝一兩 為末研勻用酒麩糊丸梧

子大丹砂為衣用木瓜湯下二十九日二

八骨散 治筋傷骨損疼痛

虎骨醋炙 龍骨煨研 牛骨醋炙 雞骨醋炙 狗骨 兔骨

酥炙 羊骨醋炙 猪骨醋炙 楓香脂 自然銅醋淬七次

共末每有傷折以黃米粥熱攤布上摻末貼患處用布包裹以繩縛之

神授散 治傷折內外痛不可忍

川歸 鉛粉五錢 蓬砂錢 共研勻共蘇木煎湯下二

錢仍用粟米粥攤布上摻末貼腫處如骨碎用木皮



竹帛夾定繩縛

五骨散 治傷折筋骨痛不止

鯪魚甲項骨 虎頭項骨 猴孫項骨 黃犬項骨

野貓項骨一兩 上五骨細剉以米醋好酒各半斤浸一

宿炙黃為末入後藥用

天雄五錢去皮

肉苁蓉五錢浸洗炙

二味共末與上末

拌勻每服酒下二錢日二又用粟米為末醋煮成糊

入末拌稠攤塗帛上貼痛處用帛包棉裹煖痛立止

傷折風腫

論曰肌肉傷折皮肉破裂久而未合為外風所觸則令肌肉受寒既不得收斂又與氣血相搏不得消散故為風腫風腫不散即變膿血敗壞之疾

荊芥湯 治傷折風腫

荊芥穗 大川歸 川芎 川續斷一兩 共末酒下二錢

地黃川歸散 治傷折為風冷所侵肌肉不合腫痛

懷熟地 川歸 羌活 獨活一兩 共末空心酒下二

錢日二



沒藥散 治傷折風腫

沒藥 川芎 附子 白芷 川椒 川歸 檳榔

甘草 桂心 錢五 共末酒下二錢日二

川歸湯 治傷折皮肉破裂風毒內攻腫痛不消

川歸 大黃 炒 白芷 防風 烏頭 兩一

水煎五錢溫服日二

黃蠟膏 治傷折風腫痛

黃蠟 兩五 桂心 吳茱萸 兩一 食鹽 燒二錢 共用為末

以麻油化蠟入末熬攪勻成膏攤日一易

終

聖濟總錄纂要 卷之二十二

新安 程 林雲來 纂

錢塘 陸鴻勳 吳菴

關中 田 泓海若 較

山陽 王道明 朗士

傷折門

打撲損傷 被傷絕筋 諸骨蹉跌

傷損止痛生肌 傷折貼燻并膏藥

打撲損傷



論曰打損撲傷或焮腫疼痛或血出不止外須以貼燻塗  
傅內須服去瘀血養肌肉和血氣之劑次則生肌斂口傅  
之以俟平復此治損傷之大法也

骨碎補散 治打撲損傷筋骨皮肉發熱疼痛

骨碎補 白芷 乳香去油 生地 當歸兩 澤蘭葉

川芎 桂心 桃仁錢五 甘草 附子分

共為細末溫酒調下三錢頃又服

地黃湯 治墜墮傷折手足痛

生地 川歸兩 阿膠 白芍兩半 川芎 熟艾兩

骨碎補兩一 桂心 甘草錢五 水煎五錢溫服日二

三奇湯 治打撲損傷

威靈仙 骨碎補各五錢

作一服酒煎盡量飲蓋暖出汗即愈

回生散 治打撲損傷疼痛

大茴 官桂 烏藥 紫荆皮 甘草各一錢

右為末每服五分好生酒送下盡量飲取汗避風瘦  
人三分大便出血即愈

被傷絕筋



論曰被傷絕筋者須觀其輕重治之接續之法要在氣血未冷之際外用續筋止痛藥傳裏內兼服藥調治庶幾可救緩則風冷入于裏則難治矣

聖功散 治筋骨傷折疼痛不止接骨續筋

硃砂 明雄 乳香 沒藥 麝香

俱去油 各一錢

字一

土蟹 十枚燒酒浸灰焙乾 右為細末磁餅封貯勿令洩氣用時

強盛人服一字瘦弱人服半字燒酒調下未愈再服

沒藥散 治跌打損傷骨折筋絕

乳香 沒藥 琥珀 土蟹 明礬

去油

去油

二錢

三箇燒酒浸焙

一錢

硼砂 麝香 半兩錢 蟹爪肉

一錢

三分

一箇醋

淨七次

熟三錢

活牛角 刮取炒黃色二錢 右為細末每服五分白酒送下在

下部食前服在上部食後服

諸骨蹉跌

論曰諸骨蹉跌者墜墮倒仆傷折致諸骨蹉跌治之須扶骨對正用止痛生肌接骨之劑封裏內服藥調治倘骨碎者便當出之否則膿血不絕肌肉亦不能收斂則難愈也

接骨紫金丹

乳香 紫荊皮 骨碎補 大黃 血竭

炙去油



歸尾

礪砂

土蟹

燒酒浸灰  
瓦焙乾

自然銅

煨淬  
七次

各一

右為細末每服七分半熱酒調服其骨自接

此方治打撲骨折瘀血攻心發熱昏暈其瘀血白下  
吐血等症皆可服之如骨接而諸症未去者去土蟹

自然銅更服五分即愈

傷損止痛生肌

論曰傷折之候皆因刑杖跌撲損傷或掀腫疼痛或血出  
不止大抵最忌服冷物恐血凝入心之故內服之劑要在  
溫補和血止痛為主至於斂口生肌之外用豈可偏廢哉

虎骨散

治打撲損傷疼痛不止并治筋骨疼痛血風

注疼痛皆治

虎骨

自然銅

醋淬  
七次

地龍

水浸  
曬乾

牛膝

漏蘆

延胡索

威靈仙

龜板

桂心

當歸

各一  
兩

共為細末每服一錢煖酒調下

生肌散

治打撲墜損傷諸骨蹉跌筋絕血出疼痛不

止傳之即愈并治一切癰疽腫毒膿水將盡時用之

去腐生肌金瘡刀斧傷血出疼痛不止者傳之神妙

白蠟

合歡皮

乳香

去  
油

赤石脂

煨

沒藥

去  
油



聖濟總錄卷之二十一 生肌

血蜴 海螵蛸去殼 雄黃 龍骨服 兒茶 獐腦各

錢 土螿焙乾 蟹爪肉熟 白芷 枯礬各一錢

硃砂一錢 麝香一字 金箔少許

右為細末磁罐收貯每用少許傅傷處立能止痛止血合時須五月五日或天醫日合為妙

傷折貼燻并膏藥

論曰傷折之症輕則肌膚腫痛重則肉脫血出既整其骨內服去瘀生肌之劑外必以貼燻膏藥并用可也

接骨方 治打撲墜墮損傷手足骨折

用雄雞一隻約一斤重者生去毛生去爪嘴開腹底乘生氣即搗爛用五加皮研末和入搗之以勺為度勿太爛勿過乾用時先以五加皮煮無灰老酒飲至極醉將骨折處用手按平將雞藥傅上棉帛縛之如今日此時縛至明日此時解開其骨即生滿矣如過一時其骨即長一寸如骨接後而尚痛者以黑豆炒焦色用老酒沃之搗爛傅上半日一換

糯米塗 治跌打損傷疼痛

糯米一升 酒麴三九 將糯米煮熟如飯入酒麴和勻乘

聖濟總錄卷之二十一 傷折貼燻



熱塗上用帛封裹三日一換酒香即愈

龜板膏 治打撲損傷疼痛

敗龜板

一枚 燒灰

虎骨

燒灰

白芥子

生大黃

川歸

五錢

滴乳香

炙

沒藥

炙一分

右為末研勻用小黃米粥攤帛上摻末一匙裹損上

以竹片夾定繩縛七日

雜癩門

中藥毒

食毒

食諸菜蕈菌中毒

飲酒中毒及大醉不解

### 中藥毒

論曰炎帝嘗百草而著本經分上中下三品聖功極矣漢唐以來漸增致千百種之繁蓋無毒之中而有有毒者後代庸民去聖已遠不審良惡偶誤餌之經云有病病當無病胃傷不急救之漸致危斃古方用甘草菜豆能解諸毒亦用諸藥而各相制伏者

冬青汁飲 解砒霜毒

先用白蠟為末和新汲水服之護其腸胃仍以冬青葉搗汁灌之以大便去毒為度如冬月無葉以根搗汁和



水代之

解中砒霜方

羊血 雞血

各一鍾

和勻服之

又方

稻稈

燒灰新汲冷水淋汁濾清冷服一碗毒即下

黃連湯

解中巴豆毒

黃連

黃柏 各五錢

水二升煎一升候極冷服之忌服

熱物仍以冷水浸兩手

又方

寒水石

一味為末煮汁飲之

解烏頭附子天雄毒

遠志

一兩

防風

五錢

水煎汁飲之

服諸石藥中毒解方

白鴨屎汁

水和服之

解中大戟毒方

石菖蒲

一味煎汁服二升差或生搗汁更妙

解芫花毒方

防風 甘草

防已 等分

三味水四升煎二升服之



解射罔毒方

藍汁 大豆 菜豆二合 藕汁鍾 二豆煎汁和勻服之

解甘遂毒方

大豆五合 水三升煎升半服之

食毒

論曰飲食雖以養生亦有時而傷生何也凡食物諸品莫不有陰陽五行具焉漫不察其寒溫燥濕之性順逆宜忌之因人性南北異稟食物南北異種一或犯之棘喉潰腹可不慎與倘誤中其毒宜服藥解之

解一切飲食毒方

大豆五合 大粉草五兩 二味搗細用水四升煎二升微炒

溫服須臾或吐或瀉毒即隨去雖甚渴不可飲水

又方 治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥可解

薺苳 甘草一兩 水二升煎一升服之入口便活

食諸菜葷菌中毒

論曰諸菜雖地產陰物而能養生然氣有寒溼性有善惡偶不審辨之其不為禍也幾希如諸葷菌夜有光者煮不熟者煮訖其湯照人無影及欲爛無蟲者皆不可食倘誤



中其毒以地漿諸藥解之

解食諸菜毒方 治食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死

葛根 生搗汁一升服之良或無生者即搗乾葛末水  
和服之煮服之亦可

治食諸菜毒方

苦參<sub>二兩</sub> 甘草<sub>一兩</sub> 苦酒二升同煎數沸去滓服吐出  
即愈

治諸菌毒方

地漿水 掘地作坎以水沃其中攪之令濁俄頃取之

飲三四鍾即解 又兼治楓樹菌誤食之令人笑不  
止飲之即解

又方

橄欖<sub>七枚</sub>  
<sub>去核</sub> 搗為泥服之

又方

防風<sub>二兩</sub> 甘草<sub>一兩</sub> 用水四升煎至二升須冷飲即解

解食諸蕈毒方

木香 青皮 等分為末煎湯飲之

飲酒中毒及大醉不解



論曰本草謂酒通血脉厚腸胃禦霧露瘴氣敵風雪寒威  
惟糯米麩麩為良隨處出者名多不一或用諸燥藥為麩  
皆大熱有毒惟菜豆能解之若恣飲過多助火亂性腐腸  
損身倘中其毒及大醉不解者急宜服藥解之

黃連解毒湯 治縱飲熱酒中酒毒煩亂躁渴引飲面赤

眼紅小便澀少

黃連 黃柏 黃芩 山梔仁等分 水煎五錢溫服

解醒丸方

葛花一兩 桂花 菊花 五味子 烏梅肉五錢

共末蜜丸彈子大每用一二丸預先化下能解酒毒

若已醉者服之能解

飲燒酒醉死急救方

先用冷豆腐厚傅胸膈以護其心仍急用清水煮滾用  
鍋數箇取氣汗水三鍾徐徐灌下即解

治酒醉不醒方

甘草五錢 菜豆去殼一合 水二升煎一升温服

又方

甘菊花 九月九日採取陰乾為末清飲調下三錢



酒醉不醒方

葛根 生搗汁飲一二升即差

又方

菘菜子

合二

細研并華水一鍾調為二服

食牛馬猪犬魚蟹中毒

解金銀銅鐵石毒

中蠱毒

狗咬

食牛馬猪犬魚蟹中毒

論曰天產屬陽地產屬陰禽獸皆陰陽生物氣味各有冷熱之殊性有好惡之異大抵諸肉補陽能助起溼中之火

素問云膏粱之變足生大疔故諸肉如熱血不斷落水不沉及病牛壞馬魚目有睨目能開合腦有連珠鰕煮不灣解腹有毛及諸肉形色異常皆有毒不可食孔子色惡不食臭惡不食者此也倘中其毒宜服藥解之

解一切牛馬肉毒方

大粉草

細切微炒搗細量病人喫得多少酒取無灰

酒一處研去滓溫服須臾大吐瀉毒亦隨去雖十分

渴不可飲水飲水難救

解中雞子毒方



醇醋 飲三四口即解

治食狗肉不消心下堅硬或噎脹口乾忽發熱妄語方

韭根 一杏仁一兩 蘆根三兩 水四升煮取

三升飲之

治食魚肉毒方

苦參三兩 以苦酒一升煎三五沸去滓服

吐即愈

解諸魚毒方

陳橘皮二兩 水三升煮取升半去滓服即愈

又方

蘆根三兩 剉碎水三升煮一升飲之即解

治河豚毒解方

扁豆五兩 水四升煮汁二升服之即解

又方

橄欖十枚 水二升煎汁一升服

治解蟹毒方

黃芪 吳藍等分 水煎一兩服之即解

治蟹毒方

冬瓜 生取汁飲一二升即解

又方



聖濟總錄卷之二十二 大魚蟹中毒

紫蘇握一 搗汁一升飲之 差如無生者乾者煎汁飲之

又方

乾蒜七枚 煮汁飲之即愈

解金銀銅鐵石毒 治誤食金銀銅鐵方

蠶豆炒 研為細末砂糖調服即從大便出

解金毒方

斑鳩肉 治如食法煮食之解或鷓鴣肉食之

又方 治吞金欲死

鴨一隻 殺取血飲之即解

解金銀銅鐵毒

雞屎 水淋取汁服之或鴨屎汁亦可

解鐵毒方

磁石 為末水服三錢

蠱毒

論曰蠱毒者嶺南人多作之凡病人中蠱其狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之蝕人五臟盡即死欲知是此當令病人吐水沉者是浮者非亦有以蠱蛇合作蠱藥著飲食中使人病瘕此一種一年死治之之法當服

聖濟總錄卷之二十二 金銀銅鐵毒



聖濟總錄卷之三十一  
藥使呼蠱姓名卽去亦有服諸藥而制伏者

蠱毒方 治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕臟腑壞敗

待歿

敗鼓皮 燒灰酒服三錢須臾自當呼主姓名卽差

試中蠱毒方

雞子一枚 煮熟去殼以小銀簪一枝插在蛋內含口中

一頓飯時視簪蛋俱黑卽是中蠱 倘若人與飲食

以犀角攪之有白沫泛起卽有毒也用後方

石榴皮飲 治中蠱毒

石榴根皮

東引者

剉一兩煎濃汁飲之卽吐出活物

又方 治中蠱毒吐下血如爛肝

苦瓠

一枚

水二升煮取一升服立吐卽愈 又方煮苦

瓠令消服神驗

治蠱毒神驗方

胡荽根 搗爛絞汁半升和酒服之立下

治蠱毒神驗方

玳瑁 以水磨濃汁飲服一盞卽解

治中蠱毒或吐下血如爛肝方

聖濟總錄卷之三十一

蠱毒

蠱毒

蠱毒



蚯蚓十四枚以苦酒二升漬之蚓死但服其汁已死者

皆可活

治蝦蟆及蚪蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂

大喘而氣絕方

車轄脂半升和温酒一升漸漸服之其蠱自出

又方

刺蝟皮燒過為末水服三錢當吐出毒

治蠱毒方

牡丹根搗羅為末每服一錢日三良

治中蠱毒方

胡荽子五合白酒二升煮汁二升服之

狗咬治狗咬方代酒

甘草一兩杏仁一兩紫蘇五錢水四升煎去滓温服更以

入薑三味末傅咬處

又方

生鐵不拘多少煮令有味洗之香中之令人飲不

又方

乾薑為末內瘡中立差



聖濟總錄卷之二十一  
諸蟲齧

獬犬齧

論曰獬犬齧者犬發狂疾跑躁齧人若中之令人疼痛不止發狂如犬聲不急治之亦能殺人男子過三日不治婦人過五日不治

治獬犬齧方

地榆一兩水二升煮汁一升飲之兼為末傅瘡上每服末三錢白湯下日三服忌酒若瘡已差者搗生韭汁飲三升

又方治獬犬齧瘡

礬石 為細末摻內瘡中裹之立止痛其瘡即愈

又方

治獬犬齧方

生地黃 搗汁飲四五合并塗瘡口  
小兒胎髮炒 新香附 野菊花 研細末酒調服盡醉

又方

鼠屎二升 燒存性為末傅瘡上



聖濟總錄卷之二十三  
蛇螫

論曰諸蛇螫人如青竹赤練虺蛇地區之類皆有大毒倘  
中人不急治之則能殺人也

雄黃散 治諸蛇毒螫人欲歿佩之兼辟蛇毒

雄黃 乾薑 各等分 共爲細末傅螫處如辟蛇毒用小

絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣遠避

香白芷散 治諸蛇螫辟蛇毒

香白芷 雄黃 蓼根 各等分 麝香 少許

共爲末醋調傅螫處立愈欲辟蛇焚之卽遠遁去

一方用菊花根汁調傅尤妙

治一切蛇螫方

金線重樓 水磨少許傅螫處又爲細末酒調飲之

治毒蛇螫人方

地榆根 搗爛絞汁飲之兼漬之

治蛇入口并入七孔中方

母猪尾尖割斷瀝血滴口中卽出

治蛇螫方

鳳僊花 搗爛傅之卽愈



聖濟新錄卷之三十一  
辟蛇方

若蛇到燒殺羊角令有烟出蛇即去矣

治蛇齧方

人糞 先以火酒洗過次以糞傅齧處差

治蠍螫人方

活蜘蛛

一枚

爛研取汁傅之即差

蜂螫

蜘蛛蜈蚣傷

溺水死

自縊欲死

治九里蜂螫方

處士劉湯隱居王屋山曾見一大蜂誤落蛛網為蜂所

螫墜地俄頃蛛腹脹欲裂徐徐行入草中咬開芋梗以  
傷就咬處磨之良久腹漸消輕走如故自後有被蜂螫  
者將芋梗傅之即愈

治蜂螫人方

羊酥 傅之即愈

蜘蛛蟲等咬傷方

銹鐵 即鐵上縮衣取和獨蒜磨傅咬處

治蜈蚣咬傷方

取活蜘蛛一枚放咬處則能吸其毒如蜘蛛死痛未知



更著生者以愈為度

又方

蝸牛 搗取汁滴入咬處

又方

苦參末

百齒霜

即頭垢

二味酒調傅之

治蜈蚣咬方

桑白皮 生者取汁和白鹽傅之

溺水灸

論曰凡溺水灸心氣尚溫而脉未絕者宜換去溼衣以厚

衣裹之灌以熱湯可活切忌火烘恐寒熱相搏之故若或犯之則不能救也

治水溺灸灸法

艾炷如黃豆灸臍五七壯如不應移上一二分再灸數

壯可活

溺水灸方

皂角 為末綿裹內穀道中須更出水即活

自縊欲死 治縊死灸法

凡自縊死用麩塊塞糞門勿急剪繩用二人扶定將繩



解鬆用艾火灸臍七壯如不應移上一二分再灸只在上下臍孔間不住灸至數十壯猶有活者不可因臍傷釋手至嚙至嚙令數人搓手心脚心熱更好

五絕散 治自縊死併溺死

半夏一兩 搗篩為末丸如豆大內鼻中即愈心溫者一

日可治

治自縊死方

梁上塵 如大豆各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即活

治自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱定心下猶

溫者

雞冠血 刺取之滴口中即活男雌女雄

又方

雞屎白 如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

婦人月水不通

婦人月水不通

婦人月水不來腹痛

室女月水不通

帶下

面黃



上下臍孔間不住灸至數十壯猶有活者不可因瘡傷  
釋手至臍至臍令數人搓手心脚心熱更好

止絕散 治自溢氣併瀉

藥果白 收漿大酉半蓋麻蘇之文梟中封心溫

又古日可治

治癩瘡血方 煉取之煎口中嚼出畏難

梁盛香 如大豆各內一筒中四人各一筒同時極力

試自益及求安心脈平難極之對心博脈瀾既安心不

聖濟總錄纂要

卷之二十三

新安 程 林雲來 纂

山陽 湯起巖克敬

錢塘 朱長春永年 較

子其武與繩

婦人門

婦人月水不通

婦人月水不斷

婦人月水不來腹痛

室女月水不通

帶下

漏下

經血暴下

卽血崩



經血暴下兼帶下

血分

水分

無子

氣血統論

論曰血為榮氣為衛行陰行陽晝夜共行五十度周於身內之五臟六腑外之百骸九竅莫不假此而致養矧婦人所稟純陰以血為本以氣為用在上為乳飲在下為月事養之得道則榮衛流行而不乖調之失宜則氣血愆期而不應衛生之經不可不察

婦人月水不通

論曰婦人月水不通者所致不一有氣不化血微不通有

先期太過後期不通有大病後熱燥不通有凝寒結滯不通有積聚氣結不通有心氣抑滯不通凡此所受不同治之亦異蓋女人假血為本以氣為用血氣稽留則澁而不行其為病或寒或熱或臍腹堅痛或肌肉消瘦久而不治則為勞瘵之症

地黃煎丸

治月水不行心忪悸身體熱面頰紅赤食味

不美臍下刺痛腰膝重

生地汁

青蒿汁

生薑汁

一鍾共熬膏

麒麟竭

沒藥

去油

玄胡索

凌霄花

紅藍花

五錢



共末用膏丸彈子大酒下一丸

當歸湯 治血澁不行心忪肌熱腰重腹痛不可忍

川歸 丹皮 川芎 白芍 牛膝 麥蘖

玄胡索 桂心五錢 琥珀 沒藥炙去油一分

水煎三錢溫服日二

婦人月水不斷

論曰女人以衝任二經為經脈之海手太陽小腸之經與手少陰心之經者此二經相為表裏上下為月水若勞傷經脈則衝任氣虛衝任既虛則不能制其氣血故令月事

來而不斷也

白茯苓散 治女人血海不調因虛冷成疾致月水不絕及赤白帶下面色萎黃

白茯苓 木香 懷熟地 石菖蒲 秦艽 栢子仁

青皮 兔絲子 赤石脂 烏賊魚骨 訶勒皮

川歸 五加皮 牛角鯁燒灰 杜仲 艾葉燒存性一兩

共為末不拘茶飲酒任下二錢日二

川歸丸 治月水不斷或多或少四肢倦身瘦瘁

川歸三兩 地榆 人參 白朮 白茯苓 鹿茸



白龍骨 阿膠 白芍 卷柏 石斛 蒲黃

紫朴兩一 桂心 枳殼兩二 懷熟地兩三

共末蜜丸梧子大酒下三十九日二

地黃湯 治衝任氣虛經血虛損月水不斷綿綿不止

懷生地兩二 子芩 川歸 側柏葉兩半 熟艾錢五

水煎三錢入蒲黃一錢食前溫服日二

一方加地榆伏龍肝

白芍藥湯 治月水經久不斷

白芍藥兩 側柏葉各二

用水酒同煎三錢溫服未差再服

婦人月水來腹痛

論日月水乃經血之餘和調則所下應期無過與不及之患若衝任氣虛為風冷所乘致氣脉不順所下不調或先或後或多或少風冷之氣與月事相擊故因所下而腰背拘強臍腹刺痛也

川歸飲 治月水不調及欲來臍下痛肌體熱

川歸 白茯苓 人參 白芍 枳殼 紫朴 肉豆蔻

甘草錢五 水煎三錢溫服日二



丹皮湯 治月水來而不利攻臍腹痛不可忍

丹皮 人參 川芎 子芩 甘草 乾薑 吳茱萸

桂心兩半 白芍兩 白茯苓兩 川歸兩 桃仁八十枚炒

水煎三錢服

白芍湯 治月水來腹痛煩悶體熱

白芍藥 紫朴兩 人參兩 甘草 川歸 枳殼兩

肉豆蔻五錢 水煎三錢溫服日二

川芎丸 治月水來腰腹刺痛不可忍或多或少或來如

清水豆汁虛乏黃瘦

川芎 白芷 生地 桃仁去皮尖炒一兩 黑乾薑

蒲黃錢五 甘草錢五 人參錢五 白芍 丹皮 牛膝

桂心川歸三分

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十九日二

室女月水不通

論曰女子二七而天癸至任脉通月事以時下若稟受不足或任脉為風寒所搏致令風氣凝結不能應時而下經久不治則致勞疾

人參湯 治室女思慮太過心氣不足氣結不得宣利月



水不依時或久不通或血隔成勞漸有寒熱肌肉不  
生不思各味凡此病症不可復行破血急性之藥宜  
通心氣行榮衛滑經絡

人參 白芍 麥冬 丹皮 檳榔 草薶 大腹皮  
白朮 川芎 生地 桔梗 防已 枳殼 丁香皮

甘草 茯神 川歸 一兩 桂心 大黃 遠志  
生薑 大棗 水煎三錢入酒少許溫服日二

赤芍藥散 治室女月水不通

赤芍 牛膝 人參 木香 甘草 丹皮 玄胡索

川芎 五錢 桂心 川歸 三分 桃仁 去皮尖炒一兩

共末酒下二錢

沉香湯 治室女榮衛凝澁月水不利目昏悶肢體拘急

五心虛煩多困少力

沉香 檳榔 甘草 三兩 人參 木香 桂心

川歸 生地 白茯苓 陳皮 青皮 柴胡

鼈甲 醋炙兩半 生薑 水煎三錢溫服日二

羚羊角湯 治室女元氣不足虛勞內燥月水不利四肢

少力頰赤口乾五心煩熱



羚羊角 防風 地骨皮 川芎 黃芪蜜炙 赤茯苓

桂心 麥門冬 防風 炙甘草一兩 懷生地三兩

羌活 酸棗仁炒 川歸 紅花子 白芍藥兩半

生薑三片 薄荷七片 水煎三錢 入酒少許 溫服日二

二地散 治室女月水不通 臍腹下刺痛

懷生地 懷熟地四兩 桂心 川歸二兩

共末酒下二錢日二

帶下

論曰帶下有三十六種名雖不同其所致則一蓋婦人衝

任為經脉之海上為乳汁下為月事血氣和平則生育之

道得矣苟垂于保養風寒乘虛襲于經絡衝任不能循流

血氣蘊積冷熱相搏故成帶下冷則色白熱則色赤冷與

熱并則赤白雜下間有五色者各隨五臟虛損而應焉

川芎湯 治帶下漏血不止

川芎 吳茱萸 白芍藥 黃芪 炙甘草 黑乾薑

川歸一兩 懷熟地二兩 水煎三錢 溫服日二

桑寄生湯 治三十六種帶下

桑寄生 熟艾 川芎 鹿角膠一兩 川歸二兩

三

帶下

七



用酒水合煎三錢温服日二若口乾渴者加白茅根  
懷生地麥門冬一兩

龍骨散 治三十六種帶下不止

白龍骨 黑乾薑 黃牛角腮 禹餘糧  
燒灰 醋滓 三兩 一兩 一兩

續斷 阿膠 川歸  
炒 五錢

共末酒下一二錢日二以差爲度

側栢葉散 治帶下腹痛

側栢葉 白芍藥 川芎 牡丹皮 白芷  
炙二兩 二兩 一兩 一兩

黑乾薑 川歸 共末酒下二錢日二

禹餘糧散 治帶下五色久不止

禹餘糧 鹿茸 赤石脂 烏賊魚骨  
碎醋七次研 二兩 二兩 二兩

阿膠 川歸 白芍藥 蒲黃 牡蠣  
炒 兩 兩 一兩 童便 二兩

共末酒下二錢日二

川歸散 治帶下白黃不止體瘦繞臍腹痛

川歸 附子 白朮 白龍骨 桂心 鹿角膠  
粉炒 一兩

共末酒下一二錢日二飲下亦可收斂

漏下

論曰漏下之病經血淋瀝不斷是也夫衝任之脉所至有



時若非時而下猶器之津洩故名之漏下蓋由血虛氣衰不能約制又有瘀血在內因冷熱不調致使血敗其色或赤如豆汁黃如爛瓜黑如衄青如藍白如膿五色隨五臟虛損而漏應焉

沉香丹皮丸 治內挾瘀血月水淋瀝不止或多或少四

肢煩倦

沉香 人參 丹皮 赤芍 川歸 木香 巴戟天  
前芎 山藥 白朮 白芷 陳皮 黃芪 吳茱萸  
桂心 枳殼 紫朴 肉蔻 牛膝 龍骨 黑乾薑

一兩 共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十九日二

白馬蹄湯 治赤白帶下淋瀝不止色敗如五色者

白馬蹄 剉炒焦二兩 白龍骨 禹餘糧 兩半 白殭蠶

赤石脂 附子 懷熟地 牡蠣 醋滓 炙甘草 一兩

川歸 烏賊魚骨 燒灰兩半

水煎三錢入酒少許溫服日二

鹿茸散 治漏下久不止

鹿茸 去毛炙 阿膠 粉炒 烏賊魚骨 去甲燒灰兩半 川歸

蒲黃 微炒一兩 共末酒下二錢日二



龜甲散 治漏下赤白經久不止

龜甲醋炙 牡蠣童便淬

共末空心酒下一二錢日二以差為度

白朮散 治赤白漏下不止

白朮土炒 川柏炙兩半 白薇炒五錢

共末温酒下二錢日二

大黃散 治漏下青色

大黃炒三分 牡蠣童便淬 子芩 桂心一分 白薇五錢

共末酒下二錢

蒲黃散 治血漏不止日久虛損

蒲黃微炒二兩 鹿茸去毛炙 川歸酒炒一兩

共末酒下二錢日二

黃芪湯 治漏下赤白淋瀝不斷

黃芪炙兩半 阿膠粉炒二兩 炙甘草一分 大棗肉五十枚

水煎三錢服

經血暴下 卽血崩

論曰女人經血謂之月事者常以三旬而一見也若血氣和平則所下應期若衝氣虛則經血不能制約故令暴下



不止乃至數升也

生地散 治血傷暴下不止腰脚疼重倦怠無力心煩渴

燥面目虛浮

懷生地 黃牛角腮燒灰 酸石榴皮炙 人參

白芷 炙甘草 陳皮 地榆炙 川續斷

共末飲下二錢日二

劉寄奴湯 治血下不止臍下虛痛

劉寄奴 赤芍藥二兩 艾葉炒四兩 白茯苓一兩 川芎

川歸兩半 水煎三錢溫服日二

如聖散 治經水暴下不止

欒櫚皮燒灰一兩 烏梅肉 黑乾薑三味並燒右一兩

共末用烏梅湯下一匙日二久患不過三服

續斷丸 治經水漏下日久不止或五色相兼而下面萎

黃肌體瘦腰重無力

續斷 阿膠炒粉 川芎 丹參

地榆 鹿茸 川歸兩

牛角膠

大酒下三十丸

經血暴下



白芍藥一兩 治經水不調 赤五色雜下不定 日夜不止

白芍藥 黃芩 白朮 白龍骨一兩 龜板二兩 鱉甲二兩

桂心 附子 乾薑 牡蠣醋淬 懷生地三兩

共末酒下二錢日二

地黄湯 治經血不止 顏色不定

懷生地五兩 子芩 桃艾葉 川歸二兩 槲栢葉

伏龍肝 蒲黃微炒 升薑三兩 地榆四兩

水煎三錢溫服日二

二灰散 治經水暴下不止

蠶絲燒灰 碧葉用茶葉與內者 同研勻酒下一二錢日二

禹餘糧丸 治經血不止 氣弱黃瘦

禹餘糧米泔 附子去皮 川芎 川歸三分

白芷 龍骨 桂心 白石脂

大丹砂為衣酒下二三十九日二

經血暴下兼帶下

論曰 女人體弱久不孕者 赤白帶下復因 任氣虛不能 制約經血 以致暴下 一病兼作 故謂經血暴下兼帶下 也

經血暴下



黃牛角鯁丸 治經水不調下兼帶下經久不止面黃困劣

黃牛角鯁炭 赤石脂兩 鹿茸去毛 桑白皮炒

阿膠粉炒 艾葉分 白龍骨煨 黑乾薑分

共末入蜜杵丸梧子大酒下

白芍藥酒 治經血暴下兼帶下經久不止

白芍藥炒 懷生地 黃芪炭 艾葉炭

酒一斗浸七日服

牛角鯁散 治傷血並帶下

黃牛角鯁酒炙 側柏葉炙 川續斷炒 熟艾

伏龍肝 川歸 赤石脂兩 地榆

共末酒下二三錢日二

人參散 治血傷兼赤白帶下日久不止

人參 五味子 艾葉燒 白茯苓 牡蠣醋

地榆 白龍骨 懷熟地 炙甘草 川芎

續斷兩 共末空心用酒下一二錢日二

白茯苓丸 治血傷兼帶下積久不止漸成虛勞面黃腰

脚沉重

白茯苓 栝子仁 訶勒皮 兔絲子 木香



杜仲炒 赤石脂 五加皮 懷熟地 秦艽

川歸 石菖蒲 青皮 黃牛角鯁切燒灰

烏賊魚骨去甲燒灰 艾葉燒灰一兩

共末酒下二錢日二醋糊丸亦可

生地湯 治血傷帶下

懷生地炒 川歸 阿膠 黃芪灸一兩 艾葉炒三分

生薑水煎三錢溫服日二

烏賊魚骨丸 治血海虛敗赤白帶久下不止肢體虛熱  
煩躁頭目旋運口舌乾澀

烏賊魚骨去甲燒灰 白芍藥 川歸 山萆肉

川芎 訶勒皮 酸棗仁 白茯苓 覆盆子

玄參 葶澄茄 懷熟地 地榆 黃芪灸一兩

共末蜜丸梧子大酒下三十丸

黃芩湯 治經水暴下帶兼赤白不止

懷生地二兩 子芩 蒲黃微炒 熟艾 側柏葉

川歸五錢 水煎三錢溫服日二

車前子湯 治經血暴下兼赤白帶下經久不止

車前子 子芩 懷生地 淡竹葉 阿膠炒一兩



水煎三錢服

白龍骨散 治經血暴下兼赤白帶下不止

白龍骨 續斷 鹿茸 赤石脂 肉苁蓉

白芍藥 懷生地炒 烏賊魚骨去甲燒灰二兩

共末用米飲下二錢日二

婦人血分

論曰血分者經水通之際因寒濕傷其衝任為之中止氣壅不行播在皮膚邪氣相搏經血分而為水發為附腫故曰血分脉經曰經水前斷後病水者各為血分久之不治

積成水腫即難治也

枳實散 治血分身體浮腫心腹煩滿不能食

枳實炒 牛膝 青皮去白炒 猪苓去黑皮

桑白皮 川歸炒 木香 牡丹皮

防已 大黃炒 檳榔煨 甘遂炒五錢

人參兩一 共末湯下二錢日二

檳榔湯 治血分上攻頭面身體浮腫心煩熱滿悶

檳榔微炒 赤芍藥 郁李仁 牽牛子炒

人參 牡丹皮 百合 木香五錢 赤茯苓



牛膝

枳殼

炒三分

知母

鹽酒炒一分

水煎三錢溫服日二

婦人水分

論曰水分者以水氣上溢于皮膚分散于四肢發為肘腫蓋腎者胃之關關門不利故聚水而從其類也此病與血分相似而治療有先後耳

赤茯苓

治水氣在皮膚浮腫經水不通

赤茯苓

赤芍藥

澤漆

微炒

木通

防已

一兩

猪苓

去黑皮

小海蛤

澤瀉

兩半炒

桂心

陳皮

炒三分

共末入蜜杵丸梧子大桑白皮湯下三四十九日二

防已飲

治水病浮腫因經水斷絕名曰水分

防已

澤漆

子芩

玄參

陳皮

一兩

赤茯苓

葶藶

紙炒

杏仁

白朮

猪苓

大豆

炒兩半

桑白皮

灸一兩

水煎三錢服

甘遂丸

治水四肢浮腫經水斷絕

甘遂

微煨一兩

天冬

去心

川連

兩半

葶藶

紙炒二兩

苦胡蘆

一枚取瓠

共末蜜杵丸小豆大酒下十九至十五

丸水利止服



水通散 治水分先病水腫日久不消致經水斷絕

木通 赤茯苓 石韋去毛 桑白皮 防已

澤瀉三分 大腹皮四枚 水煎五錢溫服日二

如水利少服

婦人無子

論曰婦人所以無子者由衝任不足腎氣虛寒故也內經謂女子二七而天癸至任脉通太衝脉盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本于夫病婦疾者當原其所因而調之

白薇丸 治婦人久無子

白薇 川歸 人參 附子 川芎 藁本

禹餘糧一兩 石斛 熟地 栝子仁 紫參

薑黃 川椒 桑寄生 牛膝 五味子

桂心 吳茱萸 防風 甘草五錢

共末入蜜杵丸梧子大酒下二三十九日二

澤蘭葉丸 治久無子

澤蘭葉 川歸 白龍骨 陳皮去白炒 遠志

菴藷子 川芎 桃仁去皮尖炒 禹餘糧醋淬七次研



紫石英 藁本 蒲黃微炒 覆盆子 白芷

卷栢一兩 人參 麥門冬 黑乾薑 車前子

懷熟地 細辛 白茯苓 赤石脂 川椒炒

石膏 白薇 蛇牀子五錢

共末蜜丸梧子大酒下

妊娠門

妊娠惡阻 妊娠漏胎 妊娠胎動下血

妊娠胎萎燥 妊娠胎不長養

妊娠惡阻

論曰婦人所食穀味化為血氣下為月水凡妊娠之初月  
水乍聚一月為胚二月為胎三月為胎胎成則男女分方  
食于母而口如鳥在昧胚之時血氣未用五味不化中氣  
壅實所以脾胃不思穀味聞見于物即惡心有所阻也其  
病心中憤悶頭重目眩四肢怠惰惡聞食氣是矣  
茯苓湯 治妊娠惡阻嘔逆肢疼頭痛惡聞食氣心忪煩

悶多損墜宜安胎調血脉

白茯苓 旋復 生地二兩 人參 白芍 陳皮

桔梗炒 細辛 芫薺 甘草炙兩半 水煎三錢



橘皮湯 治妊娠惡阻嘔吐不下食

陳皮 竹茹 人參 白朮三兩 厚朴二兩

薑水煎三錢

柴胡飲 治惡阻頭疼瘦弱不思食嗜臥

柴胡 赤芍 人參 麥冬 黃芪 甘草炙五錢

生地兩半 取汁 水煎三錢入地汁一分日二

人參飲 治惡阻煩悶嘔噦吐逆惡聞食氣頭眩肢節疼

嗜臥出汗黃瘦

人參 麥冬 白朮 生薑三分 陳皮

甘草炙五錢 大棗五枚

共分二劑每劑水五鍾煎二鍾分三服頃再服

茯苓飲 治惡阻煩悶頭眩憎聞食氣聞便嘔逆四肢不

能自持

白茯苓 人參 白朮 防風 枳殼炒 生薑五錢

甘草炙一分 分爲二劑每用水四鍾煎半分二服頃再服

妊娠漏胎

論曰妊娠將理失宜經血時下謂之漏胎由衝任虛弱不能固養胞胎故令經血時下如器之漏也久漏不已則胎



氣無所稟養必致萎燥矣

續斷飲 治妊娠漏胎下血不止腹內痛

續斷 二兩 艾葉 熟地 當歸 一兩 竹茹

阿膠 雞蘇 錢五 爲粗末水煎三錢日二

艾葉飲 治漏胎淋瀝不止

艾葉 錢五 乾薑 當歸 三分 芎藭 一兩

薑水煎三錢日二

膠艾湯 治漏胎下血過多

阿膠 錢五 艾葉 一兩 水煎三錢日二

黃芪湯 治五六月下血

黃芪 兩半 熟地 桑寄生 地榆 一兩 艾葉

龍骨 三分 薑棗水煎五錢日二

竹茹桑寄生湯 治漏胎心腹痛時下血

竹茹 桑寄生 艾葉 白芍 阿膠

白朮 各等分 水煎三錢

當歸阿膠散 治胞漏下血不止

當歸 阿膠 熟艾 錢五 龍骨 二分 蒲黃 炒

地榆 三分 牛角鯁 炙 熟地 一兩

聖濟總錄卷之三十三 婦人經水不調 九

熊長發號本廠 精製選料不欺



共末酒飲任下二錢日二

妊娠胎動下血

論曰妊娠之人將護為難若觸冒風寒飲食生冷及喜怒勞動之過致患胎動胎動則氣血失度故下血也古方云母有宿疾子藏為風冷所乘者亦令胎動下血皆失將護所致

阿膠湯 治胎動腹痛下血運悶

阿膠兩一 生薑炒 側柏葉 桑寄生 當歸

艾葉三分 竹茹一大 芩藟 續斷五錢

棗水煎三錢

鹿角膠湯 治胎動漏血不止

鹿角膠兩一 人參 白茯苓五錢 水煎三錢

阿膠散 治損動胎氣腹內結痛血下不止運悶

阿膠 桑寄生兩二 人參 懷熟地 白芷

芩藟兩一 續斷兩半 共末竹茹糯米湯下三錢

秦芎湯 治胎動下血身體煩熱倦怠

秦芎 人參 炙甘草 芩藟 地榆 白芷

鹿角膠五錢 糯米一撮水煎五錢



芍藥散 治胎動下血不止臍腹痛迷悶昏塞

白芍

木賊

炒一兩

牡蠣

熟地

乾薑

烏賊魚骨

去甲五錢

共末酒下三錢

人參飲 治胎動腰腹痛血下不止

人參

芎藭

當歸

阿膠

杜仲

二兩

熟地

炙甘草

一兩

艾葉

一把

棗水煎五錢

妊娠胎萎燥

論曰人由受氣于有生十二經脉迭相滋養尤生物也得寒温之正土地之宜無物不長凡胎處胞中或有萎燥者

蓋由孕婦所稟怯弱不足自周陰陽血氣徧係非冷即熱胞胎失于滋利所以萎燥而不長也日月雖過不能生育亦有後時致生者惟宜資母血氣俾陰陽調通本末相應則胎從而有養矣

艾葉湯

治胞中冷致胎萎燥

艾葉

炒

芎藭

當歸

炒

白朮

乾薑

一兩

水煎三錢日三

白朮湯

治萎燥瘦劣面黃黑腹藏虛冷

白朮

炒二兩

人參

當歸

白芍

芎藭



訶勒皮 厚朴 炙甘草 五錢

薑水煎三錢日三

白朮當歸湯 治胎萎燥漏下腹痛不可忍

白朮 當歸 人參 芍藥 阿膠 二兩

艾葉 一兩 酒水煎五錢入大棗分三服

桑寄生湯 治胎萎燥不能轉動心中急痛

桑寄生 人參 白茯苓 萎蕤 一兩 白朮 二兩

薑水煎三錢入粳米半合溫服日二

地黃湯 治胎萎燥過時未產滋氣血益胞藏

熟地 當歸 熟艾 炒 芍藥 一兩 阿膠

炙甘草 五錢 水煎三錢日二

妊娠胎不長養

論曰妊娠將理無方脾胃不足飲食減退不能行榮衛化精微養衝任故令胎藏內弱子氣不足生化稍虧巢元方謂母病療母則胎安是也若使脾胃和而能飲食水穀化而運氣血則何慮胎氣不長也

白朮散 治胎不長養

白朮 一兩 人參 白芍 芍藥 阿膠 一兩



炙甘草五錢 共末葱粥飲下三錢日三

地黃湯 治氣血不足胎瘦不長

熟地 阿膠 芫薺 當歸二兩 人參 赤芍

炙甘草五錢 水煎三錢入粳米日三

妊娠嘔逆不下食 妊娠咳嗽 妊娠傷寒

妊娠下痢 妊娠子淋

妊娠嘔逆不下食

論曰妊娠之人脾胃氣弱風冷乘之則中焦否膈胃中虛滿其氣上溢氣不下降故雖食飲卒不得下甚則嘔逆

茯苓湯 治妊娠嘔逆不下食和胃順氣

茯苓 黃芪 人參 白朮五錢 藿香

甘草二錢 薑水煎二錢

人參湯 同

人參 山藥 白茯苓 粳米陳者一兩 半夏五錢

薑棗水煎三錢

保生湯 治妊娠嘔逆不下食

陳皮二兩 人參 白朮 麥冬 厚朴 白茯苓一兩

薑棗水煎四錢入竹葉



厚朴湯 同

厚朴 人參 白茯苓 白朮 陳皮 竹茹

半夏一兩 薑水煎三錢

妊娠咳嗽

論曰妊娠咳嗽者以肺感寒氣也經曰形寒飲冷則傷肺久嗽不已則寒氣相移不惟妊育有傷而肺氣痿弱皮毛枯悴治宜發散寒邪資補胎氣則咳嗽自已

麥冬飲 治咳嗽不止

麥冬一兩 紫苑 杏仁 桔梗炒三分 炙甘草一分

桑白皮五錢 水煎三錢入竹茹白蜜日三

人參散 治妊娠咳嗽

人參 陳皮 炙甘草三兩 生薑五兩切

共末湯下二錢

桑白皮丸 治妊娠咳嗽痰盛嘔逆

桑皮二兩 半夏 人參 阿膠一兩 丹砂一分

炙甘草五錢 共末粥丸芡實大臨臥含化一丸

妊娠傷寒

論曰妊娠感冒寒邪藏于皮膚灑然而寒燿熱而悶頭項



痛腰脊強脉浮在表者當汗之在裏者下之汗下之理制方宜輕但非破血傷胎之劑和其陰陽正其表裏使經不傳邪無深入斯無危殆矣

麻黃湯 治妊娠傷寒發熱惡寒體痛

麻黃 蒼朮三兩 陳皮二兩 白朮 炙甘草一兩

水煎三錢入葱白鹽豉

異功湯 治妊娠傷寒頭痛體疼安胎和氣

麻黃去根節 白朮 蒼朮二兩 芩藭

炙甘草兩半 葱白水煎三錢日三

柴胡湯 治妊娠傷寒憎寒壯熱頭痛身疼

柴胡 白朮兩 芩藭 白芍藥 當歸

防風 赤茯苓分 黃芪 生地五錢

薑棗水煎三錢

白散子 治妊娠傷寒護胎

白藥子研末 用雞子清調塗紙上約碗大貼在臍下乾

以溫水潤之

妊娠下痢

論曰妊娠飲食過傷脾胃不和冷熱之氣入于腸間腸虛



則泄故為痢也然冷多則白熱盛則赤冷熱相攻赤白相雜甚則膿血雜下速宜療之恐傷胎也

阿膠丸 治妊娠下痢日夜頻瀉并安胎氣止腹痛

阿膠 醋石榴皮錢五 川連兩一 當歸 肉豆蔻錢三

共末蜜丸小豆大飲下十五丸

黃連湯 治妊娠下痢頻瀉并裏急後重

川連炒 黃柏兩三 白木兩四 薑水煎五錢日三

健脾湯 治妊娠下痢臍腹撮痛益胃氣思飲食

厚朴 蒼朮兩四 人參兩二 大棗一升煮熟去皮核研棗汁五升與朴朮同

煮乾 陳皮去白炒 白茯苓兩二 炙甘草兩二

薑水煎三錢進飲食調脾胃

阿膠丸 治妊娠下痢膿血不止腹痛

阿膠兩三 白朮兩五 川連 肉豆蔻兩一

共末蜜丸梧子大飲下三十丸

黃栢散 治妊娠赤白痢腹痛腰疼如欲產

黃栢微炒 當歸 赤芍藥 阿膠 艾葉 芎藭

桑寄生兩一 炙甘草 乾薑分三 共末水煎四錢

阿膠散 治妊娠赤白痢腹痛不止



阿膠 當歸兩 白朮三分 艾葉炒 石榴皮炒五錢

共末薑水煎四錢

妊娠子淋

論曰婦人懷子而淋者謂之子淋因腎虛膀胱經客邪熱令溲少而數水道澁痛引于臍者是其候也

海蛤湯

治妊娠子淋頻數澁痛

海蛤 水通 猪苓五錢 冬葵子微炒 滑石一分

水煎三錢入燈心三十根

白芷散

治妊娠子淋頻數澁痛

白芷三分 阿膠 鬱金 滑石兩

共末葱白湯下二錢

當歸湯

治妊娠子淋澁痛

當歸 白芍藥 赤茯苓 炙甘草 山梔子等分

水煎三錢

妊娠浮腫

妊娠小便不通

妊娠大小便不通

妊娠半產

妊娠數墮胎

妊娠浮腫



論曰脾合土候肌肉土氣和平則能制水水自傳化無有停積若妊娠脾胃氣虛經血壅閉則水飲不化濕氣淫溢外攻形體內注胞胎懷妊之始腫滿必傷胎氣如臨月而脚微腫利其小便則病自愈

防已湯 治妊通身浮腫喘促小便澀

防已 大腹三分 赤茯苓 桑白皮一兩 木香

紫蘇一分 薑水煎四錢

木通湯 治妊身體浮腫心腹脹滿小便不通

木通 香薷 桑白皮一兩 木香 訶勒皮

黃芩三分 枳殼炒 檳榔 紫蘇五錢

薑水煎四錢日二

赤茯苓湯 治妊娠身體浮腫心腹急滿小便赤

赤茯苓一兩 白朮 旋復花五錢 木通 杏仁

黃芩三分 薑水煎三錢

赤茯苓飲 治妊娠胎間水氣子滿體腫

赤茯苓 白朮二兩 杏仁 旋復花一兩 黃芩兩半

水煎五錢日二

桑寄生飲 治妊娠徧身虛腫



桑寄生

紫蘇一兩

木香五錢

桑白皮炒

大腹皮

三分

水煎三錢

妊娠小便不通

論曰妊娠小腸挾熱結胞內使氣道否澁故小便不通令人腹脇脹滿臍下急痛是其証也

榆白皮散

治妊娠小便不通心神悶亂小腹急痛

榆白皮

王不留行

滑石一兩

共末燈心湯下二錢

冬葵子湯

治妊娠淋小便澁小腹急水道熱痛

木通湯

治妊娠二便不通下部脹滿

木通

大黃

生二兩

滑石三兩

大麻仁

一兩

水煎四錢

又方

治妊娠二便不通

猪脂

二兩

酒半升煎脂化分三服未通再服

妊娠半產

論曰妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產蓋由妊婦衝任氣虛不能滋養于胎胎氣不固或顛撲閃墜致氣血損痛或因時病痢瘧之類皆致半產  
延胡索湯 治半產後氣血不快惡露續斷



延胡索 當歸 白芍藥 炙甘草 芫薺

桂心 兩 水煎三錢

艾葉飲 治半產後惡露不斷心悶氣短

艾葉 生地黃 當歸 人參 地榆

乾薑 阿膠 各等分 水煎三錢

妊娠數墮胎

論曰胚胎之始賴血氣以滋育若妊娠血氣盛強陰陽之氣和相與流傳于一體唯能順時數謹人事勿動內傷則生育之道得矣衝任氣虛將攝失宜子藏風冷不能滋養

冬葵子 三合 赤茯苓 白芍藥 車前子 一兩

黃芩 五錢 水煎五錢

滑石 傅 治妊娠子淋小便數熱痛手足煩疼

滑石 飛 汲水調五錢塗臍下一寸小便即利未利 再塗

妊娠大小便不通

論曰妊娠大小便不通者以臟腑盛實熱氣蘊積不時宣導之所致也若熱結于大腸則大便不通結于小腸則小便不通今大小腸俱有熱則二便俱不通其候令人煩滿小腹脹急惟能均調腑臟使氣疏達則傳化無所留滯矣



聖濟總錄卷之三十三 不通  
三  
梔子湯 治妊娠二便不通臍腹脹痛

梔子 黃芩 柴胡 萎蕤兩半 石膏兩四

澤瀉 赤芍兩二 車前草錢五 水煎四錢入竹葉十片

柴胡通塞湯 治妊娠二便不通下焦熱結

柴胡 黃芩 陳皮 澤瀉 羚羊分三 梔子

大黃炒 石膏兩一

水煎四錢入生地一分豉微炒半分

茅根湯 治妊娠二便不通結悶氣急腹滿欲死

茅根 滑石 車前子 大黃炒各等分 水煎四錢

于胎故每有妊則數致傷墮也

地黃散 治數墮胎子宮虛冷

熟地 黃芪 人參 白朮 芩蘄 當歸兩一

吳茱萸 炙甘草 乾薑錢五 共末酒下二錢

阿膠湯 治數墮胎小腹痛不可忍

阿膠 熟地 艾葉炒 芩蘄 白朮 當歸

杜仲兩炒一 棗水煎四錢服

地黃湯 治妊娠氣血衰微胞藏挾冷數墮胎

熟地黃兩四 艾葉 當歸兩二 杜仲 芩蘄



阿膠 三兩 五加皮 三兩 水煎五錢日二

芎藭湯 治數墮胎心腹痛

芎藭 白芍藥 白朮 阿膠 炙甘草 一兩

艾葉糯米薑水煎三錢

聖濟總錄纂要卷之二十三 終





