


醫方摘要

卷之五六

漢書門類			
一	二	三	五
七	八	一	一
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	三	三	漢
函	冊	號	書
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12357	
冊數	6 ( 3 )		
函號	301	82	









新刻精選醫方摘要卷之五

後學衡陽醫士

楊拱纂集

鄭校

金陵三山書林

紹南唐棧

鴻工鋟梓

疝




丹溪云疝氣畢九連小腹急痛也有痛在畢九者痛在

五樞穴邊者皆是厥陰之經也或無形無殼或有形

如瓜有殼如蛙自素問而下皆以為寒蓋寒主收引

經絡得寒則引而不行所以作痛然亦有踢水涉水

終身不病此者無熱在內故也大抵此證始於溼熱



醫方摘要

卷之五

疝



在經鬱而至久又得寒氣外束不得踈散所以作痛  
若只作寒論恐爲未備或曰厥陰經鬱積溼熱何由  
而至予曰大勞則火起於筋醉飽則火起於胃房勞  
則火起於腎大怒則火起於肝火積之久母能令子  
虛溼氣便盛濁液凝聚并入血隧流於厥陰厥陰屬  
木繫於肝爲將軍之官其性急速火性又暴爲寒所  
束宜其痛之大暴也有以烏頭梔子作湯服之其効  
亦敏後因此方隨形證加減與之無不驗但溼熱又  
須分多少而治溼則腫多癩病是也又有挾虛而發  
者當以參朮爲君疏導藥佐之脉甚沉緊而或大無

力者是也其痛亦輕但重墜牽引耳

經有七疝 寒 水 筋 血 氣 狐 癩

寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控舉丸而痛得於寒  
濕使內過也宜以溫劑下之

水疝腎囊腫痛陰汗時出囊或腫如水晶或痒而搔出  
黃水或小腹按之作水聲得於飲水醉酒使內過多  
汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多也宜以逐  
水之劑下之

筋疝陰莖腫脹或膿或痛裏急筋縮或莖中痛痛極則  
痒或挺縱不收或白物如精久而得於房勞及邪術



所使宜以降心火之劑下之

血疝其狀如黃瓜在小腹兩旁橫骨兩端約中俗云便瘻也得於重感春夏大燠勞於使內氣血流通滲入

睥囊宜以和血之劑下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒氣鬱而脹以針出氣而愈然針有得失宜以散氣藥下之或小兒有此俗曰偏氣得於其父陰痿精疝此疝不治惟築賓一穴內踝上五寸腓分肉中灸五壯針三分言之

狐疝其狀如死卧則入小腹行立則出小腹入囊中狐

則晝出穴而溺夜則入穴而不通此疝與狐相類宜以逐氣流經之藥下之

癘疝陰囊腫緹如升如斗不痒不痛得之地氣卑濕故江淮人多有之宜以去濕之藥下之

專主肝經與腎經絕無干

大凡治疝切不可下

劫藥神效蓋濕熱因寒鬱而發用梔子以降濕烏頭以破寒鬱况二藥皆下焦之藥而烏頭為梔子所引其性急速不容胃中停留也

宜灸大敦穴







用水煎洗

疝氣神方 其病甚至氣上衝如有物築塞心臧欲死  
手足冷者二三服除根

硫黃

火中溶化即投水中  
去毒研細

荔枝核

為末炒  
令焦黃

陳皮

各等分

右為末飯丸每服十四五丸酒送下其疼立止自己  
覺疼甚不能支持畧用六丸再不可多也

一捏金散

方見心痛門

立効散 治疝氣

川芎

川練子

青皮

去穢

舶上茴香

黑牽牛

炒

槐仁 各一刃

右為末每服二錢無灰酒一鍾煎七分服

茴香練實丸

治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下

皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

川練子

茴香

山茱萸

去核

吳茱萸

湯洗

青橘皮

去穢

馬蘭花

醋炒

芫花

陳橘皮 各一刃

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸温酒送  
下量人虛實加減以利為度

金鈴丸

治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出



茴香炒

馬蘭花炒

海蛤

破故紙炒

海帶

兔系子各三

金鈴子肉

木香不見火

丁香各一刃

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五十九溫酒鹽

湯送下

烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香

良薑炒

青皮去襍

檳榔各五

川練子十個

將巴豆七

十箇打破同麩炒練子黑色去麩并巴豆止用練子

右為末每服一錢溫酒調下痛者炒生薑熱酒服

川練子散 治小腸氣痛

木香不見火

茴香

川練子

用巴豆十粒打碎同川練炒

色去巴豆各一兩去核

右為末每服二錢溫酒空心食前調服

葫蘆巴丸 治大人小兒小腸蟠腸氣奔豚氣疝氣偏

墜陰腫小腹痛形如邱上下走痛不可忍

葫蘆巴

炒一斤

茴香

去土炒

吳茱萸

湯洗七次

川練子

炒斤

大巴戟

去心炒

川烏

炮去皮

右為末酒煮糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫

酒下小兒五丸茴香湯送下一方加牽牛



馬蘭花丸 治七疝癩氣及婦人陰癩墜下小兒偏墜等症無有不効者

馬蘭花 醋炒 川練子 炒去核 橘核 炒研 海藻

海帶 昆布 三味俱洗 樺仁 去皮尖 厚朴 姜制

木通 枳實 麩炒 玄胡索 肉桂

木香 檳榔 各五

脉沉細手足逆冷者加川烏頭一箇 炮五

右爲細末酒糊丸如梧桐子大每服五七十九或酒

或薑鹽湯送下

田春丸 治疝如神

茯苓 白朮 山查 炒 大茴香

吳茱萸 各一兩 荔枝核 炒一兩 枳實 八分 橘核 炒三

右爲細末煉蜜丸每丸一錢五分重空心每細嚼一

丸薑湯送下

蒼六散 治下元氣損偏墜腎莖疼痛

真正茅山蒼朮刮去皮六斤

一斤老米泔水浸二日夜 剉片炒

一斤酒浸三日夜切晒

一斤青鹽半斤同炒黃色去鹽不用

一斤小茴香四兩炒黃色去茴香不用



一斤大茴香四兩炒黃色去茴香不用

一斤桑椹子二斤取黑汁拌晒乾

共為細末以酒調三錢空心用

敷藥 敷偏墜立効

炒陳石灰

五倍子

山梔子

各等分共為末

用麵和醋調敷一宿來早兩罨九一樣大即愈

灸疝神効法 先將所痛罨九緊繫掣定盡尖處是穴

以小艾壯灸三壯即愈

一方 治疝氣腫墜疼痛

用猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川練子

各等分填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食猪

脬以酒下之將內藥晒乾或焙乾研為末酒糊為丸

如梧桐子大每服五六十丸空心温酒或鹽湯送下

又方 治木腎不痛

天 枸杞子

南星

半夏

黃栢

蒼木

山查

白芷

神麴

滑石

昆布

吳茱萸

湯炮過各等分為末

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九丸空心鹽湯

下

一方 治外腎大如升斗



苗香

青皮

荔枝核 槌碎

右各等分炒去火毒為末每服二錢空心酒調下

治腎囊濕瘡

蜜陀僧

乾薑

滑石 各等分

右為末擦上

又方 先用茱萸湯洗

吳茱萸

寒水石

黃柏

樟腦

蛇床子

輕粉

硫黃

白礬

檳榔

白芷 各二

右為末麻油調搽

又方 治腎莖上風濕瘡及兩腿

全蝎

洗去足翅

檳榔

蛇床子 炒

硫黃

右四味研如細末用麻油調入手心搽熱或三口用手抱囊一項次搽藥兩腿上

# 積塊

夫積塊者是有形之物氣不能塊乃痰與食積死血也  
在中為痰飲在右為食積在左為死血  
大法鹹以軟之堅以削之行氣開痰為主

治塊方



海石

三稜

莪木

香附

四味醋煮

槐仁

去皮尖

紅花

五靈脂

各等分

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服五十九空心白滾湯下

凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼二陳

湯先須斷厚味為要

治積塊不可專用下藥徒損真氣病亦不去當消導

使融化行死血塊塊去須大補

蜀葵根煎湯入人參

白朮

青皮

陳皮

甘草稍

牛膝

煎成膏入細研

槐仁

玄明粉

熱飲之二服當見塊下病重者須補接之後加減

行

三聖膏

貼積塊

用風化石灰半斤瓦上炒微紅提出候熱稍減入大黃末一兩炒熱仍提出入桂心末五錢畧炒以米醋熬成膏厚攤烘熱貼之

琥珀膏

大黃

朴硝各一

為末以大蒜搗膏貼之

木香三稜丸

治一切氣悶胃膈痞滿榮衛不和口吐



木酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問久新並皆治之

青木香

破故紙炒

茴香炒

黑豆取頭末

甘遂

芫花

大戟

京三稜醋煮

蓬莪朮

醋煮

川練子

葫蘆巴

巴戟各一

巴豆

不去油二分

陳倉米

三合与巴豆一處同炒黑

砂仁一刃五分

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中浸一宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂仁為細末醋煮糊為丸如菴葶大毒服五丸或七丸食後服看虛實大小加減丸數隨湯引下

草葶冠丸

治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不通

草葶冠

麸裹煨

白朮各一兩

麥芽炒

神麴炒

黃芩

半夏各五錢

枳實炒二兩

陳皮去白

青皮

去穰麸炒

乾生薑各二錢

炒鹽五錢

右為極細末湯浸蒸餅為丸如菴葶大每服一百丸滾白湯送下

萬病遇仙丹

治邪熱上攻痰涎壅滯畚胃吐食十隔

五噎齁哈酒積蠱積血積氣塊諸般痞積瘡熱腫痛或大小便不利婦人女子面色痿黃鬼產癥瘕食吞銅鐵銀物悉皆治之五更時用冷茶送下三錢天明



可看去後之物此藥有疾去疾有蟲去蟲不傷元氣亦不損傷臟腑功效不能盡述小兒減半孕婦勿服寶之寶之

白牽牛頭末

四兩半生半炒

白檳榔

一兩

莪朮

醋煮五錢

三稜

醋煮五錢

牙皂

五錢去皮弦去

右為細末醋糊為丸如菽豆大依前數服行後以温

粥啖之忌食他物

神効阿魏散

主治痞疾

天竺黃

二錢

阿魏

二錢

蘆薈

二錢

番木鱉

一錢

白僵蚕

二錢

孩兒茶

三錢

大黃

一錢

穿山甲

七片炒焦

右為極細末每服三錢好酒調服如車行十里許膿

血化下即愈

肥氣丸

治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭

足久不愈令人發欬逆痰瘧連歲不已

厚朴

薑製五錢

黃連

七錢

柴胡

一兩

川椒

四錢

巴豆霜

乾薑

泡各五分

川烏

泡二分

皂角

去皮弦

白茯苓

各一錢半

廣木

泡二錢半

人參

泡二錢半

甘草

炙三錢

昆布

酒洗二錢半

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為極細



末和勻煉蜜為丸如梧桐子大初服二丸日加一丸  
二日加二丸漸漸加至大便微澀再從二丸起加服  
之周而復始積減大半勿服

伏梁丸 治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心  
下久不愈令人心煩

黃連 一兩 厚朴 姜製 人參 各五錢 黃芩 三錢

桂枝 一錢 乾薑 炮 菖蒲 巴豆霜 各五分

紅荳蔻 二分 川烏頭 泡五分 茯神 丹參 炒各一錢

右件除巴豆霜外為細末另研包巴荳霜旋入末和  
勻煉蜜為丸服如上法淡黃連湯下

痞氣丸 治脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不

愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴 姜製 黃連 八分 萊菔 三斤 黃芩 二斤

白茯苓 人參 澤瀉 各一斤 川烏 泡五分

川椒 五分 茵陳 酒炒 乾薑 泡 砂仁 各一斤

白朮 二分 巴豆霜 四分 桂皮 四分

右件除巴豆霜另研茯苓另末旋入外為細末和勻  
煉蜜為丸如梧桐子大服如上法淡甘草湯下

息奔丸 治肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久  
不愈者令人洒淅寒熱喘咳發肺壅



厚朴

姜制四分

黃連

八分或一分三分

乾薑

炮

白茯苓

川椒

炒

紫苑

各一分半

川烏

炮

桔梗

白荳蔻

陳皮

去白

京三稜

炮

天門冬

人參

一分

青皮

五分

巴荳霜

四分

右件除茯苓巴荳霜各令研旋入外為細末和勻煉

蜜丸如梧桐子大服如上法淡薑湯送下已上四方

秋冬加厚朴減黃四分之

奔豚丸 治腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下若

豚狀或上或下無時久不愈令人喘逆骨痠少氣及

治男子內結七疝女人瘕聚帶下

厚朴

姜制七分

黃連

五分

白茯苓

澤瀉

菖蒲

各二分

川烏

炮

丁香

各五分

苦練

酒煮三分

玄胡

一分半

全蝎

附子

獨活

各一分

肉桂

一分

巴荳霜

五分

右件除巴荳霜茯苓各令研為末旋入外為細末和勻煉蜜丸如梧桐子大淡薑湯下服如上法

貼痞膏藥

桐油

五

松香

八

當歸

一分

乳香

一分

沒藥

一分

真阿魏

三分

紅絹攤膏先以生薑煨過擦臍膚后貼膏頻以熱手



按磨或炒鹽熨之

一方治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈

雜眩運身熱時作時止

黃連

一兩五分一半以吳茱萸炒一半以益智仁炒去茱萸益智不用

萊菔子

一刃半炒 川芎

梔子

三稜

莪木

醋煮

麥麩

炒

桃仁

去皮尖各五朵

香附

童便浸焙乾

山查

各一刃

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸薑湯

下

取積冊

用大黃不拘多少為末用好醎醋熬成膏子為丸如

梧桐子大每服一百丸量虛實大小體吃飯用好墨

研濃好酒送下次日見膿血惡物為驗

茶癖用

石膏

黃芩

升麻

共為末砂糖水調服

又方 治愛吃茶

白朮

石膏

片苓

白芍

薄荷

膽星 各一刃

共為末砂糖調膏津液化下



# 腫脹

丹溪曰心肺陽也居上肝腎陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降肝腎之陰升而成天地交之泰今也七情肉傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化陽自升陰自降而成天地不交之否於是清濁相干隧道壅塞氣化濁血瘀

鬱成熱熱留而又氣化成濕濕熱相生遂成脹滿名曰鼓脹是也以其外堅中空似鼓其病膠固難治理宜補脾又養肺金以制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使脾得清化之令却鹽味以防助邪斷妄想以保母氣無有不安醫不察此喜行利藥得一時之快腹脹愈甚真氣傷而去死不遠俗謂氣無補法者以其痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能運行邪氣著而不出所以為病經曰壯者氣行則愈痿者著而為病氣虛不補何由以行經曰塞因塞用正謂此也且此病之起固非一年根深勢篤欲取速効自



取禍耳知王道者可與語此其或受病之淺脾胃尚壯積滯不痼者惟可畧與疏導亦不可峻與利藥也朝寬暮急血病暮寬朝急氣病朝暮急氣血俱虛治腫脹大法宜補中行濕利小便

人參君

白木君

蒼木臣

陳皮臣

茯苓臣

黃芩使

麥門使

二味以制肝木

少加厚朴以消腹脹

氣不運加

木香

木通

氣下陷加

升麻

柴胡提之血虛

加補血藥痰熱加利痰藥隨症加減用之無不効者腰已上腫者發汗腰已下腫者宜利小便此仲景之

要法水腫本自中宮諸家只知治濕利小便之說用去水藥甚有用導水丸舟車丸神佑丸之類此速死之兆

戴氏曰水腫通身皮膚光腫如泡者是也氣實者亦可下下後急用調補以白木為主

治十種水病并根源症狀方法

一青水先從左右肋腫起根在肝

大戟

二赤水先從舌根起根在心

葶藶子

三黃水從腰腹起根在脾

葶藶微炒

四白水從脚腫起根在肺

桑白皮



五黑水從外腎腫起根在腎

連喬

六玄水從面腫起根在外腎

羌花醋炒

七風水從四肢腫起根在骨

澤瀉

八石水從腎腫起根在膀胱

藁本

九高水從小腹腫起根在小腸

巴豆去油

十氣水或盛或衰根在腹

赤小荳

右十般種病各有根源種種不同看十種病根除一味倍多餘九味等分逐味依法脩治焙為細末煉蜜丸如梧桐子大用赤茯苓湯送下三五丸不拘時候每日三服忌鹽一百三十日鹽能化水故也又思魚

腥麩食一切毒物及生冷房室甚効

五皮散 治面目虛浮四肢腫滿心腹脹上氣喘急

陳皮 桑白布 生薑皮 大腹皮

茯苓皮各一

右剉每服五錢水煎服

濟生紫蘇湯 專治憂慮過度致傷脾肺心腹脹滿喘

促治腸鳴氣走漉漉有殼大小便不利脉虛而緊瀯

紫蘇子一 白木二 人參一 半夏

大腹皮 草果仁 厚朴 木香

陳皮 枳殼 甘草炙各五分



右作一服生薑三片大棗一枚水煎溫服

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹

木香 三分

厚朴 四分

青皮

陳皮

益智

茯苓

澤瀉

乾生薑

半夏 各二分

吳茱萸 泡二分

川歸 五分

升麻

柴胡 各一分

草豆寇 三分

蒼朮 五分

白朮 一分

右作一服水二盞煎至一盞溫服

中滿分消丸 治中腹鼓脹氣脹熱脹

黃芩 六分

黃連

枳實 炒

半夏 各五分 泡去皮臍

姜黃

白朮

人參 各二分

甘草 炙

猪苓 各錢

乾生薑

白茯苓

砂仁 各二分

厚朴 五分 姜制

知母 去毛

澤瀉

陳皮 各三分 去白

右為末蒸餅糊丸如梧桐子大每服百丸用滾白湯

或淡薑湯下

廣木潰堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人

坐卧不寧二便澀滯上氣喘促或通身虛腫

厚朴 姜制

黃芩

黃連

益智

草豆蔻

當歸 各五分

半夏 七分

廣木

升麻

紅花

吳茱萸 各二分

生甘草



柴胡

澤瀉

神曲炒

青皮

陳皮

各三分

渴加乾葛四分

右作一服生薑三片水二盞煎七分食遠溫服忌酒

醋濕麪二服之後中滿減半止有積塊未消再服後

藥

葶藶木香散

治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀大

便滑泄此藥下水濕消腫脹止瀉利小便之聖藥也

葶藶子

茯苓去皮

猪苓

白木各二分

木香五分

澤瀉

木通

甘草各五分

辣桂二分

白滑石三分

右為細末每服三錢白湯調下食前服

白木木香散

治喘嗽腫滿欬變成水病者不能卧不

敢多食小便閉而不通者

白木

猪苓

甘草

澤瀉

木通

赤茯苓各五分

木香

檳榔

陳皮

去白二錢

官桂二分

滑石二分

右作一服生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

三花神祐丸

方見痰門

五苓散

方見泄瀉門

治腫脹久不愈服此上下分消



白朮

茯苓皮

赤茯苓

人參

升麻

柴胡

黃芩

木香不見火

檳榔

青皮去穰

澤瀉

猪苓

木通

滑石

白礬為末各等分

右作一服水一鍾半生姜三片煎八分空心服忌鹽

伐木丸

蒼朮

四斤米泔浸炒

陳酒麴

二斤炒黃

皂礬

半斤醋煮乾燒紅

右為末醋打糊丸如梧桐子大每服五十六丸用

米飲送下

萬病遇仙丹

方見續門

牽牛妙酒

治一切肚腹四肢發腫不問水腫氣腫濕腫皆効

乾鷄糞二升鍋內炒黃以好酒三碗淬下煮作一碗

絹濾去渣令病人飲之少頃腹中氣大轉動作鳴從

大便利下於脚膝及臍上下先作皺起漸漸消復如

利未盡再服一劑以田螺一枚滾酒內焯熟食之即

止後以溫粥調理安好如常此方我眉有僧以此方

治一人一二日即愈自能牽牛來謝因名

一方用赤尾鯉魚一斤或十三四兩者破開洗淨將赤

豆填滿腹內以線縫住不用鹽醬白水煮熟食之食



過數魚腿上自裂出水而愈仍忌鹽醬不忌病復發  
又方用赤尾鯉魚一斤破開不見水并鹽將生礬五錢  
研末入魚內火紙包裹外以黃土泥裹放柴窰內煨  
熟取出去紙泥用之送粥服頭者上消服身尾者下  
消盡一日用之屢試經驗

煨腎散

治脾虛邪水沅注經絡腿膝牽急四肢腫痛

甘遂

生半兩

木香

一兩

右為末每服一錢以猪腰一枚剝開去筋膜摻藥在  
內用薄荷裹定外用紙四五層再裹以水濕於火內  
煨熟臨卧細嚼温酒嚥下利去黃水為度

# 黃疸

丹溪曰疸不必分五同是濕熱如蠶麪相似

輕者用小温中丸重者用大温中丸

熱多用芩連濕多用茵陳五苓散加食積藥

戴氏曰五疸者周身皮膚并眼如梔子水染因食積黃  
者量人虛實下其食積其餘但利小便為先小便利  
白其黃則自退矣

茵陳五苓散 治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴等

證本方倍加茵陳入薑棗煎服之



小温中丸治黄疸與食積又可制肝燥脾脾虛者須以

白木作湯使

針砂十兩醋炒七次  
令通紅另研

苦參夏加  
冬減

山查各二  
兩

萊菔一兩冬  
加夏減蒼木半斤

白木五兩

川芎夏減

神麴各半斤香附子一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食

前盥湯下一方無白木山查苦參萊菔有梔子

大温中丸

針砂十兩如  
前制陳皮

蒼木

青皮

厚朴

三稜醋煮

莪木醋煮

黃連

苦參

白木各五錢

生甘草二兩

香附一斤童便浸一宿

右為末醋糊為丸

一方無黃連苦參白木一方又無  
甘草名温中丸每服用六七十丸

空心用姜  
盥湯下

茵陳將軍湯

治傷寒大熱發黃面目俱黃小便赤澀

茵陳蒿

梔子

柴胡

黃白

黃芩

升麻

大黃各七  
分

草龍膽三分  
半

右作一服水一盞半煎至一盞温服

葶藶苦參散 治濕熱肉甚小便赤澀大便時秘飲食

少進諸藥不効因為火黃



苦參

黃連

瓜蒂

黃白

大黃

各一兩

葶藶子

二兩

右為末每服一錢清米飲調下以吐利為度隨時着

虛實消息加減

棗礬丸

治食勞身自俱黃

綠礬

半斤火煨通紅

右研細紅棗肉為丸如梧桐子大每服五十九丸或酒

或姜湯下

經驗槌金丸

治黃腫絕妙

蒼朮

泔浸

白朮

各二兩

甘草

炙半兩厚朴一兩

陳皮

兩半

針砂

醋炒紅

香附

童便浸神麩炒各六兩

麥蘖麵

各兩半炒

有塊加二稜

殺朮

各一兩半醋煮

右為末麵糊丸服忌魚腥濕麵生冷菓等物

腎疸湯

治腎疸目黃或渾身黃小便赤澀

升麻

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡

各半錢

蒼朮

一錢

楮苓四分

葛根

五分

澤瀉

三分

黃芩

一分

甘草

神曲

炒三分

黃白

二分

白朮

五分

人參三分

右作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

一方用



醫方摘要 五卷 十四 生春堂刊

山黃岑 三錢 白木 三錢 白槿花根 五錢 車前草 三錢

右剉一劑用酒煎服

# 嘔吐

凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦王海藏曰吐者有物無聲血病噦者無物有聲氣病嘔者有物有聲氣血俱病分嘔吐為二者以其原病之不同此特明噦之非嘔故嘔吐不分也宜分氣多少而治

河澗謂嘔為火氣炎上特一端耳有痰隔中焦不得下

者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者但因火與痰者為多

朱奉議以半夏生薑陳皮為主胃中有熱膈上有痰二

陳加炒梔子黃連生薑

夏月嘔吐不止五苓散加薑汁

吐蟲而嘔用黑鉛炒成灰槓榔末米飲調服

按內關穴止吐法 以筋頭或筆管按住內關穴半時即止吐男左女右

惡心有熱有痰有虛皆用生薑隨證用藥胃中有熱

二陳加薑炒芩連各一錢最炒

香薷飲 治伏暑而嘔 方見暑門



藿香平胃散 治內傷飲食填塞太陰嘔吐不已

藿香 一錢 厚朴 一錢薑汁一錢 蒼朮 一錢米泔浸 陳皮 一錢

甘草 各二錢炙 砂仁 五分 神麴 五分炒

右細切作一服加生薑五片大棗一枚水一盞半煎

至一盞去粗溫服

加味二陳湯 治胃中有伏火膈上有稠痰時常胃口

作痛及惡心吐清水不快

陳皮 去白一錢 半夏 炮一錢 茯苓 一錢 甘草 各二錢

梔子 炒一錢 黃連 姜汁炒一錢 川芎 各一錢

乾薑 炒五分 蒼朮 香附 各一錢 牡荊子 各一錢

挾虛者加人參 一錢

右細切作一服水二盞加生薑三片煎至一盞稍熱

服如胃口痛甚入生薑自然汁一合和勻服

白朮湯 治胃中虛損及有痰而吐者

半夏 麴 五錢 白朮 二錢 枳實 二錢 木香 一錢

甘草 各一錢 茯苓 二錢

右為細末每服二錢生薑湯調下食前服

胃苓湯治証同前

平胃散加五苓散加薑棗水煎服之

黃連六一湯 治因多食煎磚燒餅熱麴之類以致胃



脘當心而痛或嘔吐不已漸成反胃

黃連六錢 炙草一錢 右作一劑水一大鍾煎八

分去渣服

生薑汁半夏湯 治胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不

噦徹心憤憤然無柰者 半夏 湯泡七次一兩

右細切水一盞半生姜自然汁半盞同煎至一盞温

服仲景曰嘔多雖有陽明証慎不可下孫思邈曰嘔

家多服生薑乃嘔家之聖藥也氣逆者以辛散之故

以生薑為主治之

痰飲為患或因多食生冷脾胃不和以致嘔吐惡心或

頭眩或胃脘惛憊不快或發寒熱二陳湯加丁香烏

梅生薑煎服心下痞而痛者加草豆蔻仁

一方治瘧亂嘔吐不止以黃土調井水服一碗即止

# 吞酸

內經云諸嘔吐吞酸皆屬於熱惟東垣獨以為寒誠一

徧之見也

吞酸與吐酸不同吐酸是平時津液隨上升之氣鬱

積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸水而

吐出其有積又不能自涌伏於肺胃之間咯不得上



噯不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌  
表得温煖則腠理開發或得香熱湯丸津液得行而  
暫解故素問言熱言其本也東垣言寒言其末也俱  
不言外得風寒而作收引立說欲瀉肺金之實謂寒  
藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香無  
治濕熱鬱積之法為未合經

戴氏曰濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏不得傳  
化故作酸也如穀肉在器中則易為酸也

濕熱有痰二陳湯加土炒黃芩南星之類

吞酸或宿食不化用生料平胃散蒼木厚朴加神麩俱不制

麥芽薑水煎服

治吞酸必用吳茱萸順其性而析之

酸病宜節厚味必蔬食自養則病自安

主方

黃連

黃芩 各五錢

蒼朮

三味俱用陳壁土  
拌炒七錢

吳茱

湯泡去梗晒乾用

陳皮

各五錢

右為末神麩糊丸菜豆大每服五十丸津液噯下菜

連二味隨時令送為佐使熱月以黃連為佐吳  
茱萸為使寒月反之蒼朮

茯苓為主治而無陳皮黃芩之類

參萸丸 上可治吞酸下可治自利又云治濕而氣滯



者濕熱甚者用之為嚮導

六一散 七兩即一料

吳茱萸 一兩 右為末飯

丸每服五十九白湯下

三因麴朮丸 治中脘宿食留飲酸壅心痛吐清水

神麴 炒三兩 蒼朮 米泔浸一兩半 砂仁 一兩 陳皮 去白一兩

右為細末生薑汁別煮神麴糊為丸如梧桐子大每服七十九薑湯送下

加味平胃散 治吞酸因食鬱所致

生料平胃散加炒神麴炒麥芽薑棗同煎

加味二陳湯 治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因食生

冷硬物脾胃不和時吐酸水

丁香 五分 半夏 泡 陳皮 各二錢 茯苓 一錢

甘草 七分半

右細切作一服加生薑三片水煎服

藿香安胃散 治脾胃虛弱飲食入胃嘔吐作酸等証

藿香 丁香 人參 各二錢 陳皮 五錢

右為細末每服二錢加生薑水煎溫服

透隔湯 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通

噫氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香 白豆蔻 縮砂仁 檳榔



枳殼炒

厚朴薑製

半夏泡

青皮去穢

陳皮去白

甘草

大黃

朴硝

右各等分每服一兩水二盞生薑三片棗子一枚煎至一盞去滓通口食後服

# 噯氣

胃中有火膈上有痰宜

南星

半夏

軟石膏

香附之類

一本有炒梔子

右作丸或作湯服之蓋因胃中有鬱火膈上有稠痰

故也 軟石膏丸亦可服 本方痰條下云噯氣吞

酸此係食鬱有熱火氣衝上黃芩為君南星半夏陳

皮為佐熱多加青黛

# 嘈雜

痰因火動食鬱有熱治痰

入方

黃連薑汁炒 炒山梔

黃芩

南星

半夏

陳皮

熱多加青黛



肥人嘈雜以二陳湯加撫芩蒼朮白朮炒山梔  
若濕痰不喜食三補丸加蒼朮香附

丹溪曰此為食鬱有熱炒梔子薑炒黃連乃必用之藥  
戴氏曰此俗謂之心嘈是也

一方治心嘈索食

白朮

黃連姜炒

陳皮去白各二兩

右為末作丸服白湯下七八十九丸數服而止

三聖丸治嘈雜如神

白朮

四兩

黃連五錢

橘紅一兩

右為末神麩糊丸如梧桐子大每服五十九丸津瀝或

薑湯下

# 欬逆

內經曰諸逆衝上皆屬於火丹溪曰飭病氣逆也以其  
氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也古方言胃  
弱而不及火以丁香柿蒂竹茹陳皮之類未審孰為  
降火孰為補陰人之陰氣依胃為養胃土傷損則木  
侮之陰為火所乘不得內守木挾相火故直衝清道  
而上言胃弱者陰弱也虛之甚也

丹溪曰大率有痰有氣虛有虛火上衝視有餘不足治



之痰與食在上者宜吐之人參蘆稀涎散之類吐之  
痰用陳皮半夏氣虛人參白朮陰火黃連黃栢滑石  
或吐或補隨證施治

痢疾發餽用人參白朮煎湯調益元散頻服自止

主方

陳皮竹茹湯 治傷寒餘熱未鮮氣虛發餽

橘皮去白二人參 甘草炙各兩半竹茹

水一鍾生薑五片棗二枚煎七分不拘時溫服

橘皮半夏生薑湯 治氣虛有痰發餽

橘皮 半夏 乾生薑 人參

通草 各等分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去渣服

桂苓白朮散 止欬逆散痞塞開堅結進飲食謂和五

臟

棟桂 乾生薑各二錢半茯苓 半夏泡一兩

白朮 陳皮去白 澤瀉各五錢

右為末麩糊丸如小豆大每服二十九生薑湯下日

三服一方加黃連半兩黃栢二兩水丸取効愈妙

病症在上食後服病在下食前服

灸欬逆法



乳根二穴婦人直垂乳頭向下盡處是穴灸之男子  
 小兒又看高起黑圈內一莖葉是穴必須將乳頭正  
 中以草心作十字於圈內毋得偏斜大人七壯小兒  
 三壯

又海氣一穴在臍下一寸半灸三七壯立止

一方用荔枝七箇連皮肉核燒灰存性為末白湯調下  
 立止

一方用黃蠟燒煙薰二三次立止

又用硫黃燒煙嗅立止

氣虛脉沉細或伏者以補中丸氣湯加炮附子二片煎

服立止而脉即充見矣

# 翻胃

大法有四 血虛 氣虛 有熱 有痰

必用童便韭汁竹瀝薑汁牛羊乳

右手脉無力屬氣虛四君子湯

左手脉無力屬血虛四物湯

切不可用香燥藥服之必死宜薄滋味血液俱耗胃  
 腕乾稿其稿在上而近咽之下水飲可行食物難入  
 或可少食其稿在下而與胃相近食雖可入難盡入



胃良又復出名之曰反胃名雖不同病出一體

病之初起因內傷外感而致痞痛噫酸嘈雜等症醫

者率用局方燥劑劫之而愈復作復劫延蔓之久而

成翻胃展轉深痼良可哀憫

張鷟峯云噎當是神思間病惟內觀自養可以治之此

言深中病情

糞如羊屎者不治大腸無血故也年高者不治

戴氏曰氣血俱虛者口中多出白沫但見白沫出者必

死古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾

薑以養血粟米以實胃蜜以潤燥薑以去穢有治寒

者必為當時有實因於寒者用之得効不比局方泛

論 凡有此症率用之也挾寒者間或有之今人率

因痰氣又誤於醫傳變而成其無寒也明矣

主方

黃連

三錢薑汁炒

山查

二錢

保和丸

二錢

右為末米糊丸麻子大臙脂胚為衣人參煎湯入竹

瀝下六十丸

人參利膈丸 治胸中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯推

陳致新治膈氣聖藥

木香

三錢

煨榔

七錢半

人參

二錢

當歸

二錢



藿香

甘草

枳實

大黃

厚朴

薑製各一兩

右為末滴水為丸梧桐子大每服五十九溫水送下

寬中進食丸 滋形氣美飲食

神麴

炒四錢

甘草

炙一錢

木香

五分

草豆蔻

錢五

枳實

炒四錢

半夏

七錢

人參

一錢

乾生薑

錢一

青皮

陳皮

白朮

白茯苓

澤瀉

各二錢

猪苓

一錢

砂仁

一錢半

大麥芽

兩一

右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三四十丸

溫米飲下食遠服之

一方用薑汁二盞牛乳一盞生薑汁半盞和勻頓服

又用方

吳茱萸

湯泡去梗

黃連

姜汁炒

具母

瓜蒌仁

牛轉草

炒各等分

右為末糊丸每服四五十九薑湯下

治翻胃積飲用

益元散生薑自然汁澄白脚調和為小丸子時時服

之効

燒針丸

此藥清鎮專主吐逆

黃丹

不以多少



右研細用去皮小棗肉丸如雞頭子大每用一丸針  
簽於燈上燒灰爲末乳汁下

治翻胃經驗方

用大鯽魚自死者活者不効剖去腸留鱗用大蒜去  
皮薄片填之魚腹內仍合魚用濕紙包定次用麻  
縛之又用熟黃泥厚厚固日微乾炭火慢慢煨熟取  
出去鱗刺骨用平胃散杵丸如梧桐子大日晒乾瓶  
收勿令泄氣每服空心米飲下三十丸

槿花散 治翻胃

以千葉白槿花陰乾爲末陳米湯調下三五口如轉

再服

一方 治轉食

用翻翅鷄一隻煮熟去骨入人參當歸各五錢爲  
細末再煮取與食之勿令人共食

一方 治翻胃不問新久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆大用清油一斤瓦瓶浸虎脂一  
月厚綿紙封口勿令氣泄每用清油一兩入無灰好  
酒一大鍾調勻不拘時溫服服盡病減其虎脂再添  
油再浸再可活二人若一時無虎脂只用珠子硫黃  
細研半兩水銀貳錢半入硫黃末研至無水銀星再



研如墨煤色每服三錢生薑四兩取自然汁入好濃酒一鍾湯熱調空心服厚衾蓋覆當自足趾間汗出遍身皆汗透吐當立止不止再服此藥輕浮難調須先滴酒少許以指緩緩研之旋添酒調

一方

用白麩二斤半蒸作大饅頭一箇頭上開口取空將皂礬裝滿用新瓦四圍遮護饅頭塩泥封固却挖土窠安放以文武火燒一晝夜候紅色取出研為細末棗肉丸如梧桐子大每服二十九丸空心酒湯任下忌酒色

八仙膏 專治噎食

生藕汁

生薑汁

梨汁

蘿蔔汁

井糖汁

蜂蜜

竹瀝

白菓汁

每各一盞和勻作一處盛坐飯甑上蒸熟任意飲之服秋石法

每用一錢滾白湯調下治翻胃甚効







並行不悖循環無端走而不息也世人失於調理或勞傷六慾飲酒墜墮以致陰火沸騰血從火起故錯經而妄行也是以從肺而上溢於鼻者曰衄血從胃而溢於口者曰嘔血所謂咯血唾血出於腎也咳血嗽血者出於肺也又有痰帶血絲者從腎亦從肺也血出於小便者曰溺血曰血淋大便見者曰便血曰腸風痔血糞前來者為近血糞後來者為遠血流結於腸胃之間而成積者為血塊血瘕大抵血從下流者為順易治從上而溢者為逆難治凡治血者必先清其源而調其氣譬如治水者必以隄防治血者莫

先清氣氣清則血和氣濁則血亂斯言信矣

大凡治血先辨其血出何經當用此經清氣之藥後方涼血審其虛實調治庶無悞矣

丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

大法四物湯加炒梔子童便薑汁竹瀝 山梔子最能清胃腕中血也

嘔血用韭汁童便酒調鬱金末服之其血自清

嘔吐血出於胃也犀角地黄湯主之

吐血用四生丸甚妙亦能治衄血



嘔吐用童便調炒香附末服之或用童便或酒搗側柏葉溫服之

吐血不止用炒乾薑末童便調服此從治之法

吐血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之

先吐血後見痰是陰虛火盛四物為主加痰火藥有先

見痰而後見血者是積熱降痰火為急

有暴吐紫血成塊者是熱傷血結於中用四物湯加清

熱等藥調之

舌上無故出血如線用槐花炒為末糝之

治嘔血用側柏葉焙乾為末米湯調下

犀角地黄湯

犀角 鎊

地黄

牡丹皮

赤芍藥 等分

右作一劑用水煎隨病上下服

桃仁承氣湯

甘草 五分

大黃 二錢

桃仁 一錢去皮尖

芒硝 六分

肉桂 六分

右作一劑生薑三片水煎空心服

黃連解毒湯 方見火門

四生丸 治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栢葉

生地黄 等分



右鳩爛丸如鷄子大每服一丸水煎服

大金花丸 方見火門

藕汁散 治吐血不止

生藕汁

生地黄汁

大薊汁

各二合

生蜜半匙

右件藥汁調和令勻每服一小鍾不拘時服

雙荷散 治率暴吐血

藕節七箇

荷葉頂七箇

右同蜜搗細用水二鍾煎八分去渣溫服或研末蜜

調下

三黃丸 治積熱吐血咽膈不利

方見火門

枇杷葉散 治暑毒攻心嘔吐鮮血

枇杷葉

炙去毛

香薷

七錢半

白茅根

麥門冬去心

甘草

乾木瓜

各一兩

丁香

陳皮去白

厚朴去皮薑汁製五錢

右為末每服二錢淡薑湯調下 如止渴燥去丁香

加知母冷水調下

荊芥散 止吐血

荊芥穗

一錢五分

甘草

桔梗各三錢

右剉作一劑生薑三片水煎食後服



天門冬湯 治思慮傷心吐血衄血

遠志 去心

白芍藥

天門冬 去心

麥門冬 去心

黃芪 去蘆

藕節

阿膠 蛤粉炒

沒藥 焙研

當歸

生地黄 各一錢

人參

甘草 各五分

右剉作一劑水一鍾薑五斤煎八分不拘時服

一人舊有一瘕一日抓破血出一線不止七日欲死以

五靈脂末摻上即止

治齒縫出血不止用紙樵蘸蟾酥少許於血處 按上

即止

一方 用圓中歐萊根搗敷立止或燒存性擦上立止

一方 用枯礬末點効煮水含亦可

一方 治吐血用好墨為末二錢白湯化阿膠清調敷

一方 治墜馬積血心胃嘔血不止用乾荷花為末酒

調方寸匕神効

一方 治陰虛火動吐血或兼痰

生地黄

熟地黄

天門冬 去心

麥門冬 去心

黃柏

知母

杏仁

半夏 少

剪草根

歸身 少

側柏葉

石膏

右剉作一劑生薑二片水煎溫服

醫方摘要

六卷

五

生春堂



# 衄血

衄血出於肺大抵與吐血同以行血為主犀角地黄湯調鬱金末服之

一方用荆芥穗研服或用蘿腹上辛節搗汁服又以汁滴鼻孔中或灸大椎穴

治血汗血衄以人中白新瓦上焙乾少入射細研酒下服秋石更妙

原病式曰衄者陽熱拂鬱於足陽明而上熱則血妄行故病衄也

婦人經血逆行或血腥或吐血或唾血用韭汁服立効一方用血餘燒灰為末每服三錢冷水調下或以竹管吹入鼻中即止

犀角地黄湯 方見吐血門

黃芩芍藥湯 方見痢門

茜根散 治鼻衄不止

茜根

阿膠

蛤粉炒

黃芩

側柏葉

生苾

各二錢

甘草

一錢

右細切作一服用水一鍾生薑三片煎七分食後服

止衄散



黃芪 六錢

赤茯苓

白芍藥

當歸

生芩

阿膠 各三錢

右為末每服二錢食後黃芪湯調下

麥門冬飲 治鼻衄

白芍藥

蒲黃 各二錢

生薑 一錢

生地黄 三錢

麥門冬

去心二錢

右剉作一服用水一鍾蜜半盞煎至八分作二服

山梔散 治鼻衄不止

用山梔子不俱多少燒為末少許吹入鼻中

龍骨散 治鼻衄過多

用白龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九

竅出血皆可用此藥吹之

寸金散 治鼻衄不止

土馬鬃

即牆上舊草

甘草

各二錢

黃藥子

半兩

右為末每服二錢新汲水調下不止再服

麝香散 治鼻衄不止

白礬

枯另研

白龍骨

粘舌者另研五錢

麝香 五分

右三味拌和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕

然後吹藥於鼻中或以濕紙撚蘸藥鼻內尤妙

一方 用萱草根搗汁一盞薑汁半盞相和時時細呷



醫方類聚 卷之七 生春堂

一方 治衄血不止用千葉石榴花晒乾為末吹鼻中  
一方 治鼻血不止

用上好燒酒調白芨末一匙呷下咽即止

# 咯唾血

咯血唾血皆出於腎有痰帶血絲亦屬於腎也

當用清痰治血之劑內各加引經之藥

大法用四物湯加地黃膏牛膝膏之類或用天門冬

麥門冬貝母知母桔梗百部黃柏遠志熟地鬱金竹

瀝姜汁之類為主治

## 又方 治痰中見血

白朮一分 錢五 當歸一分 錢一 芍藥一分 錢一 牡丹皮一分 錢一

桃仁一分 研 錢一 山梔八分 炒黑 七分 桔梗七分 錢一 貝母一分 錢一

黃芩八分 錢一 甘草三分 錢一 青皮五分 錢一

右以水煎服

## 又方 治痰中血

白朮一分 錢一 牡丹皮一分 錢一 貝母一分 錢一 芍藥一分 錢一

桑白皮一分 錢一 山梔一分 炒 錢一 桃仁一分 研 錢一 甘草三分 錢一

水煎溫服

## 治咯血方

生春堂



荷葉 不拘多  
少焙乾

右為末米湯調二錢服

又方 治咯血

桑白皮 一錢半 半夏 炒

知母

貝母

茯苓 各一錢 阿膠 炒五分

桔梗 七分

陳皮 一錢

甘草

杏仁 炒各五分

生芩 一錢

山梔 七分

柳桂 二分即桂之嫩小枝條也宜入治上焦

右以水煎生薑三片

天門冬丸 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 一兩 甘草

白茯苓

阿膠 炒

木仁 炒

貝母 各五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸熱津含化

夜可十丸

雞蘇散 治勞傷肺經唾內有血咽喉不利

雞蘇葉

黃耆

生地黄 洗淨

阿膠 炒

貝母

白茅根 各一兩

桔梗

麥門冬 去心

甘草 各五錢

右剉作一服用水一鍾薑三片煎七分溫服

恩袍散 治咯血吐血唾血及煩燥欬嗽

生蒲黃

乾荷葉

茅根

各等分



右為末每服三錢濃煎桑白皮湯食後溫服

# 咳血

咳血者嗽出痰內有血是也嘔血者嘔全血者是也咯血者每欬出皆是血疔瘡衄血者鼻中出血是也溺血者小便出血也下血者大便出血也雖名色分為六俱是熱証但有虛實新舊之不同或妄言為寒者誤也

咳血嗽血皆出於肺大抵因痰甚火熱而上治宜清金涼血消痰為土用

青黛

瓜棗仁

貝母

海石

炒山梔

一方加杏仁阿子

味減半

右為末蜜丸噲化

清肺飲子

治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五

心煩熱欬嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜治之

前胡

半夏

湯炮

白茯苓

去皮

枳殼

紫蘇

人參

桔梗

甘草

乾葛

陳皮

去白

當歸

酒洗

熟地黄

白芍藥

川芎

各等分

右細切一服水一鍾半生薑三片煎七分食後溫服



渣再煎

一方 治欬嗽見血

用新綿燒灰半錢食後酒調下

人參芎歸湯 治虛勞少血津液內耗心火炎燥執乘

肺金咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛寒咳嗽

當歸 酒洗一錢

川芎 一錢

白芍藥 一錢

人參 去蘆一錢

半夏 湯泡一錢

橘皮 去白一錢

阿膠 炒一錢

赤茯苓 一錢

細辛

北五味 去梗

甘草 各五分

右細切一劑水一鍾半薑三片煎一鍾食後溫服

# 溺血

溺血屬熱胞移熱於膀胱則癰溺血

大方用紗山梔仁水煎服

一方用

小蓟

滑石

通草

蒲黃

淡竹葉

藕節

當歸稍

甘草稍

山梔 各等分

右作一劑水煎空心服

小兒尿血 用甘草升麻煎湯調益元散



治尿血因血虛者用四物湯加牛膝膏服

一方 治溺血

生車前草

淡竹葉

生牛膝

生地黄

生蒲黃

當歸尾

山梔仁

甘草稍

滑石

右剉水煎空心服立効患者必須忌葷腥

玉屑膏 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍者

黃芪

人參 各等分

右為末用蘿蔔大者切一指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩為度勿令焦至熟蘸參

芪末吃不拘時仍以鹽湯送下

一方 治尿血

用車前草搗汁五合空心服効

鹿角膠丸

治房勞過度小便尿血

鹿角膠

五錢

沒藥

另研

油頭髮灰

各三錢

右為末用茅根汁打麵糊丸如梧桐子大每服五十

丸空心鹽湯下

一方 治小便出血

龍骨


右為末方寸匕水調溫服日三服



姪婦尿血 用阿膠炒黃為末空心米湯調二錢立効

# 下血

下清血而色鮮者腸風也色濁而色黯者臟毒也肛  
 門射如線者虫痔也為下部虛陽不升血隨氣降也  
 下血不可純用寒涼藥必於寒涼藥中加辛味為佐  
 久不愈者後用溫劑必兼升舉藥中加酒浸炒涼藥  
 如酒煮黃連丸之類寒因熱用也  
 凡用血藥不可單行單止  
 腸風下血獨在胃與大腸治用黃芩秦艽槐角升麻



青黛定腸風痛用蒼朮滑石當歸生地黄黃芩甘草

下血屬虛者當溫散之四物加炒乾薑升麻

便血過多者加蝟皮阿膠

兼風者用蒼朮秦艽防風芍藥香附

槐花散 治腸風下血臟毒

槐花 炒二兩 栢葉 二兩 荊芥 二兩 枳殼 炒二兩

右為末每服三錢米飲空心調服或用酒調下

一方 治腸風下血或在糞前後見血并皆大効

黃連 酒炒 槐角 炒 蝟皮 炒存性 枳殼 炒

荊芥 炒 條芩 酒洗 苦參 各一兩 地榆



防風

秦艽 各七錢

右為末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服一百二十

丸空心白湯下或白酒亦妙屢驗

槐角丸 治腸風下血不問糞前後遠年近日並皆取

槐角 炒一兩 枳殼 麩炒 當歸 酒洗 黃芥 酒洗

黃柏 側柏葉 黃連 各酒洗 荆芥穗

防風 地榆 各五錢

右為末用酒糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心

白湯送下忌生冷

治腸風下血効方

乾柿餅 燒存性 瓜瓢 燒存性 牡礪 煨一錢

右為末每服三錢空心調下其血立止

一方 治臟毒下血

黃連 去鬚為末 烏梅肉 各等分

右二味同搗為丸如梧桐子大每服二三十丸空心

白湯送下

酒煮黃連丸

黃連 去鬚十兩 好酒 五斤

右將黃連細切以銀瓦器盛酒煮黃連待乾盡為度

焙乾為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心



當歸和血散

治腸辟濕毒下血

槐花炒

青炭

各六錢

當歸身

升麻

各二錢

川芎

四分

荆芥穗

熟地黄

白朮

各六分

右為細末每服三錢米飲調下

黃連丸 治飲酒過多下血不止

黃連

二兩

赤茯苓

阿膠

炒各一兩

右用黃連茯苓為末調阿膠衆手丸每服二十九食

後米飲下

一方

槐花炒

荆芥穗

各等分

右為末酒調下一錢七仍空心食猪血炒

一方 治卒下血

用赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

烏梅丸 治便血下血

烏梅三兩燒灰存

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心

米湯下

一方 治中毒下血

用蝟皮燒存性研細每服一錢用水調下日進三服

一方 治下血劫劑



百藥煎 一兩取一半燒為灰

右為末糊為丸如梧桐子大每服六十九空心米湯

一方

血餘灰 鞋底灰 猪牙皂角灰 各等分

右為末酒調三錢匕

一方 治糞前有血面色黃

石榴皮

右為末煎茄子湯調一錢匕

一方 治糞後下血不止

艾葉 不拘多少

右以生薑汁二合和服

# 痔漏

經曰因而飽食筋脉橫解腸澀為痔丹溪曰痔漏因風熱燥歸於大腸也以治血為主

大法用條芩涼大腸人參槐角黃連涼血生血當歸和血川芎升麻枳殼寬腸

薰洗藥方

五倍子 朴硝 桑寄生 蓮房

荆芥 煎湯先薰後洗加冬瓜皮葉亦好



腫者用木鱉子五倍子研末調敷

秦艽羌活湯 治痔漏以塊下垂不任其痒

羌活 分一錢二

秦艽

黃芪 各一錢

防風 七分

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡 各五分

藁本 三分

細辛

紅花 各少許

右細切作一服水煎服忌寒風處大小便

秦艽蒼朮湯 治痔核已破謂之痔漏大便便秘必作

大痛此濕熱風燥四氣合而為病故大腸頭成塊者

濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火邪也其西

方肺金主氣其體收下亦助病為邪須當用破氣藥

兼之其効如神

秦艽 去蘆

桃仁 去皮尖研

皂角 燒存性各一錢 蒼朮 米泔

防風 各七分

黃柏 酒洗五分

當歸稍 酒洗 澤瀉 各三分

檳榔 二分

大黃 少許雖大便澀亦不可多用

右作除檳榔桃仁皂角仁三味另研外餘藥細切作

一服水三盞煎至一盞二分去粗入檳榔等三味末

子再上火煎至一盞空心熱服待少時以美膳壓之

不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麪大料椒

薑等物若犯之其藥無効如有白膿加白葵花頭五

朮去萼心青皮 半錢 入正藥中同煎木香三分為細

生春堂梓



木同檳榔等三味依前煎服餌古人治此疾多以歲  
月待除之惟此藥一服即愈

秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛

者非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸身

白木

各一錢半

炙甘草

澤瀉各六分

黃柏

酒洗五分

大黃

煨

陳皮

各三分

柴胡

升麻

各二分

紅花

桃仁

二十個去皮尖另研

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱空心服  
之避風寒忌房事酒濕麪大辛熱之物

槐角丸

治痔瘻有效

槐角炒

當歸

蝟皮

地骨皮

各等分

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九丸空心服

蝟皮丸

治諸痔瘡出血裏急疼痛

槐花炒

艾葉炒

枳殼

地榆

當歸

川芎

黃芪

白芍

白礬枯

貫衆

蝟皮

各一兩

頭髮

燒三錢

猪後蹄重甲

十枚炙

皂角

一挺炙去皮

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸食前米湯

經驗方

治腸風臟毒內外痔屢效



黃芩 一兩

黃連 一兩

大黃 酒浸煨 一兩

當歸 酒洗 一兩

皂角 仁燒存性 三錢

秦艽 一兩

蒼朮 一兩

防風 七錢

苦參 二兩

蝟皮 炙 一兩

枳殼 麩炒 一兩

桃仁 去皮 三錢

槐角 炒 一兩

檳榔 五錢

地榆 五錢

右為末酒打糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心白湯下或酒下

又方 治翻花痔

荆芥

防風

朴硝

煎湯洗之

又用木鱉子鬱金研末入龍腦些少水調傅之或用熊膽片腦和勻貼之尤妙

一方 治外痔

五倍子

苦參

朴硝

瓦松

煎湯薰洗擠去惡污腐肉以濕綿花蘸訶子末夾在谷道中一夜即斂而愈

一方

先用乾馬齒莧煎湯洗次用螺螄活搗敷痔瘡以紙封口空心鹽湯調服枳殼末二錢神效

外敷蝸牛膏

用蝸牛一枚射香少許用小磁罐子盛蝸牛以射香末糝之次早取汁塗痔瘡有効



黃連散 元有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚腫痛作膿就在痔孔出作食積注下治

黃連

阿魏

神麩炒

山查

桃仁

連翹

槐角炒

犀角等分

右以末以少許置掌心時時舐之津液嚥下如消三分之二止後服槐角蠟皮等丸

一方 治痔用蚘蛇膽研細香油調塗痔立効

一方 皂角燒烟燻後用白芷為末鵝膽調敷即消

一方 用鬱金末水調敷痔即消

一方 治久痔用熊膽調塗神効

一方 治痔瘡有頭

用芫花入土根洗淨木臼搗以少水絞汴於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔瘡頭繫時微痛候心燥痔落時以紙撚蘸膏於孔內末除其根

經驗膽槐丹

十月上巳日取槐角子棟肥嫩結實者用新黃瓦盆二箇如法固濟埋於背陰墻下約二三尺深預先尋取黑牛膽五六箇臘月八日取出槐子裝入膽內高懸陰乾至次年清明日取出入磁瓶內盛放每日空心滾白湯吞服初一日一粒二日二粒加至十五日



十五粒以後日減一粒周而復始不問遠年近日痔漏並皆服之其効神亦能補虛

灸法

用大蒜一片頭垢捻成餅子內安頭垢餅於痔上外

安蒜艾灸之

一方用熊膽一分半蝸牛去亮一分筒研成膏少加水調塗痔

立効忌酒

一方用蟻螂不以多少焙乾為末先用礬水洗淨貼之

一方用蚕繭入男子指甲滿外用童子髮纏裹燒存性

蜜調塗

一方用隔年橙子風乾的燒烟坐桶中薰神効

秘結

燥結因血少不能滋潤理宜養陰面多黃可候

有虛有風者有濕者有火者有津液不足者有氣結

者切不可一例用芒硝大黃利藥巴豆牽牛尤不可

用

久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不

宜用峻利之藥

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎



塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身

升麻

桃仁泥

各一錢

生芩

熟芩

各五分

甘草炙

紅花

各三錢

右作一服水煎食前調枳榔末五錢或加麻仁泥一

錢加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯

升麻

生芩

各一錢

歸稍

生甘草

大黃

煨

熟芩

桃仁泥

麻仁

各一錢半

紅花

三分

右除桃仁麻仁另研作一服水煎次下桃仁麻仁煎

空心熱服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘常常燥結

當歸稍

一錢

防風

三錢

大黃

紙裹煨

羌活

各一兩

桃仁

二兩研如泥

麻仁

二兩半

皂角

燒存性

一兩三錢

右除二仁另研外餘為末後和勻蜜丸如梧桐子大

空心每服五十丸白湯送下三兩服之後以蘇子麻

仁粥每日早晚食之大便不致結燥以磁器盛之紙

封毋令見風

脾約麻仁丸

治腸胃熱燥大便秘結

厚朴

薑製

芍藥

八分

枳實

麩炒

杏仁

去皮尖砂五分



麻仁另研五錢 大黃蒸焙一兩六錢

右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十九臨卧温水下大便通利即止

滋腸五仁丸 治津液枯竭大腸秘澁傳道艱難

栝子仁五錢 桃仁去皮 杏仁炒去皮 陳皮四兩

松子仁一錢 郁李仁炒二錢

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸空心米飲下

潤腸湯 治大便秘澁連日不通

麻子仁一盞半細研用水浸瀝去皮取濃汁 芝麻半盞微炒研用水浸取濃汁

桃仁泡去去皮炒黃研如泥 荆芥穗末各一兩

右前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度

搜風順氣丸 見預防中風門

牛黃丸 治上焦熱臟腑秘結

大黃一兩 白牽牛頭末半兩

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手足煩者蜜調下

搜風潤腸丸 治三焦不和胸中痞悶氣不升降飲食

遲化腸胃煩澁大便秘結

沉香 檳榔 木香 青皮去穢



蘿蔔子 炒

槐角 炒

陳皮 去白

枳殼 去穢

三稜 煨

枳實 麩炒

木通 各五錢

隋李仁 去皮 一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五六十九木瓜湯下當服溫潤腸胃導化風氣 一方有大黃無木通

米飲下

治大便不通

用皂角燒烟馬桶內坐薰即通

治大小便不通

用火燒鹽於臍內切蒜一片蓋鹽上艾灸二三炷即通

治大小便不通

用明礬末一匙安臍中冷水滴之冷透腹內自然通

如是曾灸無臍孔即於灸盤上用紙撚作圈子籠灸

盤着礬末任內仍作前法用水滴之

治大小便不通

用連根葱一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十一粒

鹽二匙同研爛捏作餅子烘熟掩臍中以帛扎定良

久氣透自通不然再換一餅

提盆散 即霹靂箭

用草烏一味為末用葱頭帶涎蘸烏頭末納肛門中

蜜導法



凡諸秘結不通或兼他證又或老弱虛極不可用藥者用蜜熬入皂角末少許乘熱攪作兌候冷以導之冷秘生薑兌佳

### 豬膽汁導法

用大豬膽一枚瀉汁和醋少許灌谷道中一飯頃當大便即通

## 淋閉

夫淋有五皆屬於火以解熱利小便山梔之類不可發汗汗之必洩血

戴氏曰淋者小便淋瀝欲去不去不去又來皆屬於熱也痰熱隔滯中焦淋瀝不通二陳湯煎大碗頃服探吐之以提其氣

淋澁有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜滋陰降火以四物加知母黃柏或以四物湯下滋腎丸

陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳入主方

治老人氣虛而淋者

人參

白朮

木通

山梔仁

各等分



右作一劑水煎空心服

有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨屬利水藥 亦有死血作淋者用牛膝膏

參苓琥珀湯 治小便淋澀莖中痛相引脇下痛不可忍 悉者

人參

茯苓 各五分 川練子 去核

生甘草 稍

玄胡索

各七分

琥珀

柴胡

川歸尾

澤瀉 各三分

右細切作一服水一盞半加燈心十數莖煎至一盞服

琥珀散

治五種淋瀝疼痛小便有膿血出症

琥珀

沒藥

海金砂

蒲黃 各一兩

右為細末每服三錢空心煎萱草湯調下

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心 一分

通草 二分

澤瀉

瞿麥

琥珀

各五分

蒲蓄

木通

車前子 炒 另研

茯苓 去皮

猪苓 去皮 各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍服

通關丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分即滋腎丸

黃柏

酒洗 焙乾

知母

酒洗 焙 各一兩

肉桂

一錢



右為細末熱水丸如梧桐子大每服一百丸空心白湯下服後須頓兩足令藥易下行也如小便已利莖中如刀刺痛當有惡物下為驗

地髓湯 治死血作淋痛不可忍此證亦能損胃不食  
杜牛膝 一合一名苦杖根即鼓槌草

又以水五鍾煎耗其四而留其一去滓入射香少許空心服之又單以酒煎亦可又名苦杖散 老人虛寒者八味丸或六味地黄丸為要藥

又方 治氣虛而淋者  
八物湯加黃芪虎杖甘草煎湯服諸藥中可加牛膝

一方 治諸淋

四苓散 益元散 燈草 山梔子

右水煎空心服 或益元散加車前末一錢 或益元散加阿膠末一錢

八正散 治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便赤澀癰閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之

車前子 瞿麥 篇蓄 滑石  
甘草 山梔 大黃 木通各等分

右剉一服水一鍾入燈心十莖煎至六分食前溫服  
五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出



或如膏如沙如石或如豆汁並皆治之

赤茯苓 一錢 赤芍藥 二錢 山梔仁 二錢 當歸 二錢

甘草 生一錢 條芩 六分

右剉一服水一鍾煎八分空心服

石常散 治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作有時

勞後即發或尿如豆汁或出沙石並皆治之

芍藥 白朮 滑石 葵子

木通 瞿麥 石常 各二兩 當歸

甘草 各一兩 王不留行 一兩

右為末每服二錢空心小麥湯調下

通草湯 治諸淋

王不留行 葵子 通草 菝葜根

蒲黃 當歸 去蘆 桃膠 瞿麥

滑石 各一兩 甘草 半兩

右剉一服水一鍾薑五片煎服

又方 治血淋

側柏葉 藕節 車前子 各等分

右三味同搗取真汁調益元散神效

又方 治沙淋及莖中有沙作痛

石首魚腦骨 五對火煨 出火毒 滑石 半兩



右共研為細末分作二服煎木通湯調下未愈再服  
數劑必待沙出盡乃安

又經驗 治小便溺血立効

金陵草

車前草 各一握

右二味搗汁服半盞空心服

鐵服丸 治大小便不通神効

大皂角

燒存性

右一味不拘多少煉蜜為丸如梧桐子大每服七十  
丸白湯下

一方 治小便不通用葵子炒茯苓等分為末空心白

酒調下

治小便淋痛赤澀下砂石

萱草根一握搗汁服或嫩苗煮食之亦可

一方 用田螺搗敷臍即利

小便不通 土狗大者一箇小者二箇炙乾為細末入

水片麝香各少許用小筒或鶯翎管吹入龜口內少

頃氣透自通

又用用螺螄一碗連殼乾鍋內炒熱淬以好白酒三碗  
煮至一碗取螺以針挑肉食仍以此酒下之食至二  
三次殊効雖白濁晚卸亦治



又白茯苓去皮剉作錢余大塊四兩用知母貝母剉開  
 各一兩捌錢瓦器火煮至乾去二母將苓銅器內慢  
 火炒散為末黃蠟溶化和如脾子大每服空心食遠  
 嚼一九蜜湯下

淋莖中疼甘草稍無甘味者木通各五錢食鹽二分半  
 右剉水煎露一宿空心服畏冷者再溫服

又方 以生明礬末填臍中井水頻以指蘸滴礬令濕  
 透或以蚯蚓糞朴硝等分調敷小肚効

附小便不禁

戴氏曰小便不禁出而不覺赤者有熱白者氣虛也

節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫澁  
 之藥殊不知屬熱者多屬膀胱火邪妄動水不得寧  
 故不能禁而頻數來也故年老人多頻數是膀胱血  
 少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而  
 佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用  
 溫藥也病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致  
 小便多小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治  
 其本也收之澁之治其標也

治小便遺失

阿膠 炒成珠 牡蠣

鹿茸 酒炙 桑螵 稍酒炙 各等分



石為末用糯米糊丸如梧桐子大每服五十丸空心  
鹽酒下

家韭子丸 治大人小兒下元虛寒小便不禁或成白濁

家韭子炒六兩 鹿茸酥炙四兩 菴蓉酒浸 牛膝酒浸

熟地黃 當歸各二兩 杜仲去皮 石斛去蘆

乾薑炮 桂心各一兩 兔絲子酒浸 巴戟去心各一兩半

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心鹽  
湯溫酒任下小兒須作小丸服之

附交腸病 尿出小便尿出大使用白幘頭燒灰酒調  
五分即愈

丹溪云一人嗜酒飲大醉忽糟粕出前竅溺出後竅

四物湯加 海金沙 檳榔 木通

桃仁去皮尖各等分

右作一劑水煎空心服八劑而安

附轉脬

大法宜大吐以提其橫隔之氣二陳湯之類甚妙

一方 治忍小便人致轉脬用

自取瓜甲燒灰存性為末米飲調下

一方

用田夾棍紐頭拴燒灰調酒服甚効



# 消渴

治消渴以養肺降火生血為主

分上中下而治

三消皆禁用半夏血虛亦忌用口乾咽痛大便難者亦不宜用汗多者不可用不得已必用薑鹽製用

消渴若泄瀉先用

白木炒

芍藥炒等分

炒為末調服後却服前藥即諸汁膏

天花粉乃消渴之神藥也

上消者肺也多飲水而少食大小便如常以白虎加

人參湯

中消者胃也多飲水而小便赤黃以調胃承氣湯三

黃丸治之

下消者腎也小便濁淋如膏之狀以六味地黄丸治之

人參石膏湯 治膈消上焦燥渴不欲飲食

人參 一錢

石膏 二錢四分

甘草 八分

知母 二分

一方并

黃芩

杏仁

右剉一劑用水一鍾半粳米一撮煎七分溫服

地黄飲子 治消渴咽乾煩燥



醫方摘要 六卷 十一

人參去蘆 生地黄 熟地黄 黃芪蜜炙

天門冬去心 麥門冬去心 澤瀉 石斛去根

枇杷葉炒去毛 枳殼炒去穰 甘草炙各等分

右作一劑水一鍾煎七分食後溫服

六神湯 治三消渴疾

枇杷葉 天花粉 乾葛 蓮房

甘草 黃芪各等分

右作一劑水鍾半煎七分食後溫服

烏梅五味湯 治消渴生津液

五味子 巴戟酒浸去心 百藥煎 烏梅

甘草各等分

右剉片一劑用水煎空心服

麥門冬飲子 治膈消胸滿煩心津液短少消渴

五味子 知母 甘草炙 瓜萸仁

人參 乾葛 生地黄 茯神各八分

麥門冬一錢六分去心

右作一劑水二鍾竹葉十四片煎一鍾溫服

補腎地黄丸 降心火益腎水治消渴除骨蒸壯筋骨

明眼目用之神効

生地黄半斤酒浸二日蒸爛研膏 黃芪一兩酒炒

生春堂梓



白茯苓

四兩

黃柏

一斤剉同地

黃晒乾

當歸

酒洗

枳殼

去穢

麥門冬

去心

熟地黄

酒浸

天門冬

去心

人參

甘菊花

各二兩

生苧

一兩

右為末滴水丸如梧桐子大每服七十九空心鹽酒

送下

玉泉丸

治煩渴口乾

麥門冬

去心

人參

茯苓

黃芪

半生半

烏梅

焙

甘草

各一兩

瓜萋根

乾葛

各一兩

右為末蜜丸如彈子大每服用一丸溫湯嚼下

括萋丸

用括萋根薄切用人乳汁拌蒸竹瀝拌晒為末煉蜜

為丸如彈子大噙化或丸如菜豆大每服一百丸米

飲送下

甘露湯

治煩渴口乾

百藥煎

乾葛

各一錢

烏梅

半

五味子

天花粉

一錢

甘草

三分

右作一劑用水煎服

猪肚丸

黃連

去鬚

麥門冬

去心

知母

瓜萋

各四兩

右為末入雄猪肚內縫之蒸熟乘熱於石臼中杵爛



如乾加煉蜜丸如梧桐子大每服一百丸食後米飲下可以清心止渴

一方

繅絲湯飲之一口吐之此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引氣上潮於口如無繅湯以繭殼絲綿煮湯代之

忍冬丸 治消渴既愈之後須預防癰疽之患

用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置瓶罐內用無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研為細末以所浸酒打麵糊為丸如梧桐子大每服

一百丸不拘時溫酒米飲送下

三黃丸 方見火門

六味地黃丸 方見虛損門

調胃承氣湯 方見傷寒門

# 便濁

內經曰諸轉反戾小液渾濁皆屬於熱夫便濁之證因脾胃中濕熱下流滲入膀胱故使便溲或白或赤而渾濁不清也原病式曰血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸王病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁



醫方摘要 卷之六 十五  
肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大率多是濕痰流  
注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法  
此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不  
可一例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺  
或隨溲溺而出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂  
而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房  
勞致虛而得之者治法宜滋水藏以復真陰是皆千  
古不易之定論也

丹溪曰便濁屬熱有痰有虛

大率皆是濕痰流注亦燥中宮之濕赤者乃是濕傷血

胃中濁氣下流滲入膀胱

肥白人多是痰宜燥濕降火兼升提之

大法宜二陳湯加二朮升麻柴胡提氣能使大便潤而

小便長不可純用寒涼恐傷血赤者加白芍藥煎服

一法 治便濁有半年或一年時常夢遺形瘦作心虛

治以珍珠粉丸和定志丸服

夢遺主熱精滑主濕熱熱則流通故也痰熱用青黛

海石黃柏

精滑用知母黃柏降火牡礪粉燥濕白濁同治法

入方



青黛

蛤粉

椿根末

滑石

乾薑炒

黃柏炒褐色

右為末神麩糊丸仍用前燥濕痰丸子亦治帶下

心法曰黃柏治濕熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒入腎滑石

利竅乾薑味苦斂肺氣下降使陰血生而火自降

又方

黃柏炒

生栢二兩一方云生栢

蛤粉三兩

神麩炒半兩

右為末水丸服

一方用良薑三錢芍藥黃柏炒焦各二錢樗根白皮

一兩伍錢為末糊丸每服二十九

思想而得病在心治當安心神以帶補一法用溫膽湯

去竹茹加入參遠志蓮肉酸棗仁茯神煎服

珍珠粉丸治精滑白濁等証

黃柏炒褐

真蛤粉各一兩

珍珠煨二錢

右為末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒

下或加樗根白皮滑石青代等藥

定志丸

遠志去心并草水煮

石菖蒲各二兩

人參

白茯苓各五兩

右為末蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每七丸加至二

十九空心米湯下



王關丸 治男子諸虛思慮過度心神不安不寐多驚  
遺精白濁累治經驗

人參

酸棗仁炒

牡蠣煨

五倍子

枯礬

龍骨煨

茯神去木

遠志各等分

右為末蒸棗肉為丸如梧桐子大每服五六十丸麥  
門冬湯或蓮子湯食前送下

草辭分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數  
無度凝面如油光彩不定凝脚澄下凝結如膏糊之  
狀

石菖蒲

烏藥

益智仁

川草辭

白茯苓

甘草稍各等分

右細切作一服用水一盞半入鹽一錢煎至一盞空  
心服

治濁固本丸

蓮花鬚

黃連炒各二兩

白茯苓

砂仁

益智

半夏

黃柏炒各一兩

甘草炙三兩

猪苓二兩半

右為末蒸餅為丸空心溫酒下五十九

九龍丹 治精滑

枸杞子

金櫻子

山果子

即山蓮肉



佛座鬚

熟地黄

芡實

白茯苓

川歸 各壹兩

右為末酒麪糊為丸梧子大每五十九或酒或鹽湯下如精滑便濁者服二三日溺清如水飲食倍常行

步輕健

水陸二仙丹

治遺精白濁夢泄脫精等證

金櫻子 一斗 芡實 二斤

右以芡實去殼杵為細末取金櫻子黃熟者用藍盛於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細紋取自然汁煎熬成胎糖和芡實末為丸梧子大每五

七十丸空心薑鹽湯下

定志環珠粉丸 治心虛夢泄

人參

白茯苓

各三兩

遠志

甘草水煎去心

石菖

蒲各一兩

海蛤粉

黃柏

炒焦各二兩

樗根皮

二兩

青代

二兩

右為細末糊為丸青代為衣如梧子大每五十九空

心薑鹽湯下

經驗秘真丹

治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

兔絲子

韭子

柏子仁

各一兩

龍骨

煨

牡蠣

山茱萸

去核取肉

赤石脂

煨各半兩

補骨脂

一兩

遠志

去心并草水煮

巴戟

覆盆子

枸杞子



黃栢鹽酒炒

山藥各七錢半 芡實

杜仲薑汁炒 各一兩

金櫻子去刺子取肉 乾二兩

鹿角膠兩半 炒珠乾薑 炒黑色 一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心

薑鹽湯下

大造丸

方見虛損門

六味地黄丸

方見虛損門

韭子丸 治膀胱腎冷小便白濁滑數無度

赤石脂煨

韭子炒

川牛膝酒浸

牡蠣煨

覆盆子酒浸

附子炮去皮臍

桑螵蛸酒炙

鹿茸酒蒸炒

肉從蓉酒浸

龍骨生各一兩

雞肫腔煨灰

沉香不見火 各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒

鹽湯任下

秘精丸 專治下虛胞寒小便白濁或如米泔如凝脂

牡蠣煨

兔絲子酒蒸 炒別研

龍骨生用 五味子

韭子炒

白茯苓去皮

白石脂煨

桑螵蛸酒炙 等分

右為末酒糊丸梧子大每七十丸空心鹽酒下

一方 治小便白濁出髓條

酸棗仁炒

白朮炒

人參去蘆

白茯苓去皮

破故紙

益智仁

大茴香

左顧牡蠣

煨各一兩



右為末加青鹽酒糊為丸如梧子大每服二十九溫酒米飲任下

瑞蓮丸 治思慮傷心小便赤濁

白茯苓 去皮 石蓮肉 去心 龍骨 生用 天門冬 去心

麥門冬 去心 柏子仁 炒另研 酸棗仁 去殼炒研 當歸 酒浸

紫石英 煨 遠志 甘草煮去心 乳香 龍齒 各一兩

右為末煉蜜丸梧子大硃砂為衣每七十九空心溫酒棗湯下

桑螵蛸散 專治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦悴減食此說多因房勞過度耗傷

真氣得之

桑螵蛸 鹽水煮 遠志 甘草湯煮去心 菖蒲 鹽水炒 龍骨 煨

人參 去蘆 茯神 去木 龜甲 醋炙各一兩 當歸 酒洗

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

# 怔忡驚悸

怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜如人將捕獲者是也

驚悸者騫然而跳躍驚動而有卒厥之狀有時而作者是也



丹溪曰屬血虛有痰有思慮便動屬虛時作時止者痰  
因火動瘦人多是血少肥人只是痰多時覺心跳者  
亦是血虛怔忡無時而作驚悸有時而作

大法四物湯安神丸之類有痰用痰藥驚悸者屬血虛  
宜硃砂安神丸最好或有痰迷心竅者宜用治痰藥  
一方 治勞後大虛心跳

硃砂 水飛 二兩 白芍藥 二兩 側柏葉 二兩 當歸身 二兩  
炒黃連 一兩 半 川芎 炙甘草 陳皮 各一兩  
右為細末猪心血為丸如黍米大每五六十九丸津唾  
嚥下或少用白湯一口送下食後臨卧服

安神丸

黃連 一錢 半 酒洗 硃砂 一錢 飛 生地黄 酒洗 當歸身 酒洗  
甘草 炙 各五分

右為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大每十五丸食後  
津唾嚥下 硃砂安神丸無地黃當歸用生甘草

溫膽湯 治心膽怯怔忡易驚

半夏 炮 竹茹 枳實 各二錢 生薑 四錢  
陳皮 三錢 甘草 一錢

右細切作一服水二盞煎一盞去粗食後溫服

定志丸 治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸等症



人參

白茯苓

各三兩

石菖蒲

一兩

遠志

去心

右為細末煉蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸食後白湯下

朱雀丸 治怔忡驚悸等症

茯神

二兩

沉香

半兩

硃砂

半兩另研為衣

右為細末蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下

八物定志丸 平補心氣安神鎮驚除隔間痰熱等症

遠志

去心

石菖蒲

去心

麥門冬

去木

白茯苓

各一兩

白木

半兩

人參

一兩

牛黃

二錢另研

右為末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每二十丸白湯下

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白木

炒

茯神

去木

黃芪

龍眼肉

酸棗仁

炒各一錢

人參

木香

各五分

甘草

炙二兩半

右細作一服水二盞加生薑三片大棗一枚煎至一盞去粗溫服

茯苓飲子 治痰飲蓄於心胸怔忡不已

赤茯苓

去皮

半夏

泡

茯神

去木

麥門冬

去心

橘皮

去白各一錢

沉香

不見火

甘草

檳榔

各五分

右判一服生薑五片煎八分食後溫服

加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚



半夏湯炮一錢 白茯苓 厚朴各六分 茯神去木

紫蘇各四分 遠志去心 甘草各二分

右作一服生薑五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

養心湯 治憂愁思慮傷心驚悸不寧痰多少睡

黃芪蜜炙 白茯苓 茯神 半夏麩

當歸 川芎各一錢 甘草炙八分 遠志去心

辣桂 栝子仁炒 五味子 酸棗仁炒

人參各五分

右作一服水煎薑三片棗一箇食前服 治停水怔

仲加換柳赤茯苓

真珠丹 治肝經因虛內發風邪則魂散不守時或

驚悸怔忡

栝子仁炒 人參 酸棗仁炒各一兩 熟地黃

當歸各一兩半 犀角鎊 茯神去木 沉香

龍齒各半兩 真珠母三錢 研

右為末煉蜜丸如梧子大辰炒為衣每四五十九金

錢薄荷湯下

牛黃清心丸 方見中氣門

一方 治憂愁思慮傷心令人惕然心跳動驚悸不安

之証



川歸身

酒洗 一兩

生地黄

酒洗 一兩

遠志

去心 一兩

茯神

去水 一兩

石菖蒲

黃連 各五錢

辰砂

四錢 另研飛

牛黃

二錢 另研

金箔 三十片

右以前六味研細入牛黃辰砂二味末子猪心血丸如黍米大金箔為衣每五十九煎燈心湯下

參歸腰子丸

治心氣虛損

人參 五錢

當歸身

五錢

猪腰子

一隻

右以腰子用水二碗煮至一鍾半將腰子細切入二藥同煮至八分喫腰子以汁送下有喫不盡腰子同藥渣焙乾為細末山藥糊為丸如梧桐子大每服三

五十九空心多服為妙

# 健忘

健忘精神短者多亦有痰者

戴氏曰健忘者為事有始無終言談不知首尾比以為病之名非比生成之愚頑不知人事者

寧志膏

方見虛損門

定志丸

方見怔忡門

朱星丸

方見怔忡門

壽星丸

治心虛被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健



忘妄言如有所見神效 方見中風門

寧志膏 治失血過多心神不安言語不常不得睡卧

辰砂 研 酸棗仁 炒 人參 白茯神 去木

琥珀 各七錢半 滴乳香 一錢 研

右為末和勻煎燈心棗湯空心調下一方無茯神琥珀

珀蜜丸彈子六薄荷湯下

人參遠志丸 心氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬 去心 白茯苓 菖蒲 各七錢半 人參

遠志 去心 酸棗仁 炒 黃芪 各半 桔梗

丹砂 官桂 去皮各二錢半



右為末蜜丸加豆大每二十丸至三十丸米湯下



新刊精選醫方摘要卷之六終

新刊精選醫方摘要卷之六終



