

醫宗金鑑

卷七

新北京廣益書店刊行

醫
宗
金
鑑

(卷七)

印刷日十月五年十德康.....刷印

行發日十三月七年十德康.....行發

書名..... 醫宗金鑑	定價..... (全八冊) 每冊一十二圓	主編者..... 新東京三馬路六六ノ一 修 哉	發行者..... 新東京三馬路六六ノ一 車 編 程	印刷所..... 新東京三馬路二五ノ三 廣 益 書 房 工 場	發行所..... 新東京三馬路六六ノ一 廣 益 書 房	總發行所..... 新東京三馬路一七〇ノ一 滿洲製藥株式會社 長春醫藥所
------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------

監修人 	宋 毅	校正人 	程 石
-------------	-----	-------------	-----

御纂醫宗金鑑外科總目

卷一 外科心法要訣

人身經絡圖歌起至藥筒拔法歌止

卷二 外科心法要訣

腫瘍主治類方 腫瘍敷貼類方 潰瘍主治類方 洗滌類方 膏藥類方 麻藥類方 去腐類方 生肌類方

卷三 外科心法要訣

頭部 面部

卷四 外科心法要訣

項部 背部 腰部

卷五 外科心法要訣

眼部 鼻部 耳部 口部 脣部 齒部

卷六 外科心法要訣

舌部 喉部 胸乳部

卷七 外科心法要訣

腹部 腋部 肋部 內癰部

卷八 外科心法要訣

肩部 臍部 臂部 手部

卷九 外科心法要訣

下部 臀部

卷十 外科心法要訣

股部 膝部

卷十一 外科心法要訣

脛部 足部

卷十二 外科心法要訣

發無定處(上)

卷十三 外科心法要訣

發無定處(中)

卷十四 外科心法要訣

發無定處(下)

卷十五 外科心法要訣

雜證部

卷十六 外科心法要訣

御纂醫宗金鑑目錄

卷一 編輯外科心法要訣

人身經絡圖歌 脈訣歌 十二經氣血多少歌 癰疽總論歌 癰疽陽證歌 癰疽陰證歌
 癰疽半陰半陽歌 癰疽五善歌 癰疽七惡歌 癰疽順證歌 癰疽逆證歌 癰疽辨腫歌
 癰疽辨痛歌 癰疽辨膿歌 癰疽辨癢歌 癰疽辨暈歌 癰疽總論治法歌 內消治法歌 內託治法
 虛實治法歌 癰疽鍼法歌 癰疽砭法歌 癰疽灸法歌 (隔蒜灸 黃蠟灸 附子餅灸 豆鼓餅灸
 鱗蝟灸 麥冬粳米灸) 癰疽烙法歌 神燈照法歌 桑柴火烘法歌 牛膠蒸法歌 藥筒拔法歌

卷二 編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲 神授衛生湯 清熱消風散 乳香黃耆散 內疎黃連湯 回陽三建湯 竹葉黃耆湯
 內消散 內固消心散 琥珀蠟藥丸 護心散 透膿散 託裏消毒散 神功內託散 復元通氣散
 雙解貴金丸 黍米寸金丹 麥蠶丹 保安萬蠶丹
 腫瘍敷貼類方

如意金黃散 五龍膏 四虎散 眞骨妙貼散 二青散 坎宮錠子 離宮錠子 白錠子 蝟蟬拔毒散

二味拔毒散 回陽玉龍膏 沖租膏 鐵桶膏 烏龍膏 神效干槌膏 馬齒莧膏

潰瘍主治類方

四君子湯 四物湯 八珍湯 十全大補湯 人參養榮湯 內補黃耆湯 異功散 理中湯 六君子湯

香砂六君子湯 託裏定痛湯 聖愈湯 柴胡四物湯 地骨皮飲 知蘘四物湯 三黃四物湯

補中益氣湯 人參黃耆湯 獨參湯 溫胃飲 橘皮竹茹湯 胃愛丸 二神丸 加味地黃丸 參朮膏

八仙糕

洗滌類方

葱歸湯腫湯 艾茸敷法 豬蹄湯

膏藥類方

萬應膏 紺珠膏 陀僧膏 巴膏 亞聖膏 絳珠膏 絳紅膏 加味太乙膏 白膏藥 化腐紫霞膏

貝葉膏 碧螺膏

麻藥類方

瓊酥散 整骨麻藥 外敷麻藥

去腐類方

白隆丹 紅升丹 元珠膏

生肌類方

生肌定痛散 輕乳生肌散 薑礬散 腐盡生肌散 月白珍珠散 五色靈藥 生肌玉紅膏

瑩珠膏 呂祖一枝梅

卷三 編輯外科心法要訣

頭部

百會疽 透腦疽 侵腦疽 佛頂疽 額疽 勇疽 鬢疽 天疽銳毒 耳後疽 耳發

耳根毒 玉枕疽 腦後發 腦鑠 油風 白屑風 禿瘡 螻蛄癩 髮際瘡

面部

額瘍 額疽 額疔 面發毒 面遊風 瘡腮 頰瘍 骨槽風 發頤 時毒 鼠眉疽

眉心疽 龍泉疽 虎鬚毒 燕窩瘡 雀斑 黑痣 蠟黑肝癩

卷四 編輯外科心法要訣

項部

腦疽 偏腦疽 天柱疽 魚尾毒 百脈疽 結喉癰 夾喉癰 少陽經瘰癧 太陽經濕瘰癧

馬？瘰癧 陽明經瘰癧 重臺瘰癧 上石疽 失榮證 鈕扣風

背部

上中下發背 上搭手 中搭手 下搭手 蓮子發 蜂窩發 陰陽二氣疽 串疽 酒毒發

連珠發 丹毒發 禽疽 痰注發 黃瓜癰

腰部

腎俞發 中石疽 纏腰火丹

卷五 編輯外科心法要訣

眼部

眼胞菌毒 眼丹 鉞眼 眼胞痰核 椒瘡 粟瘡 皮翻證 濕睛瘡 目中努肉

鼻部

鼻疽 鼻疔 鼻淵 鼻蠶瘡 鼻瘡 鼻疔 肺風粉刺 酒敬鼻

耳部

黑疔 耳疔 耳衄 耳痔 耳聾 耳挺 旋耳瘡

口部

大人口破 鵝口瘡 口瘰

唇部

反唇疔 鎖口疔 唇疽 繭唇 唇風

齒部

牙衄 牙宣 鑽牙疽 牙疔 牙癰 走馬牙疳 齒齲 齒齲

卷六 編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹 疥包 舌癭 重舌 痰核 重腭 舌疔 舌疳 (附瘰癧風)

喉部

緊喉風 (附纏喉風) 慢喉風 喉閉 (附酒毒喉閉) 啞瘴喉風 弄舌喉風 喉疳 喉癰 上腭癰
乳蛾 喉瘤

胸乳部

甘疽 臆疽 脾發疽 并疽 蜂窩疽 蠱疽 瘰癧疽 內外吹乳 乳疽 乳癰 乳發 乳漏
乳中結核 乳勞 乳岩

卷七 編輯外科心法要訣

腹部

幽癰 中皖疽 嚇癰 衝疽 臍癰 (附臍中出水) 少腹疽 腹皮癰 緩疽

腋部

腋癰 腋疽 黯疔

肋部

肋疽 淵疽 內發丹毒 脇癰(附疽)

內癰部

肺癰 大小腸癰 胃癰 脾癰 肝癰 心癰 腎癰 三焦癰 內癰總論 驗內癰法

卷八 編輯外科心法要訣

肩部

肩中疽 乾疽 通肩疽 謬疽 肩風毒 樂疽

髑部

臙癰(附藕包毒) 魚肚發 石榴疽 肘癰

臂部

臂癰(附疽) 腕癰 免疽 穿骨疽 骨蠹疽 蠹蝨串

手部

手發背 掌心毒 虎口疽(附合谷疔) 病蝦 手丫發 調疽 蛇頭疔 天蛇毒 蛇眼疔 蛇背疔

蛙節疔 蛇腹疔 泥鰌疽 代指 蟻螂蛙 窩瘡 狐尿刺 鵝掌風

卷九 編輯外科心法要訣

下部

懸癰 穿襠發 跨馬癰 便毒 疔瘡 陰疽瘡 腎囊癰 腎囊風 婦人陰瘡

臀部

鶴口疽 坐馬癰 臀癰 上馬癰下馬癰 涌泉疽 臟毒 痔瘡 坐板瘡

卷十 編輯外科心法要訣

股部

附骨疽 咬骨疽 股陰疽 橫痃疽 陰疽 伏兔疽 股陽疽 環跳疽 肚門癰 箕門癰 腿遊風

青腿牙疔

膝部

膝癰 疵疽 膝眼風 鶴膝風 下石疽 緩疽 委中毒 上水魚 人面瘡

卷十一 編輯外科心法要訣

脛部

三里發 腓膈發 黃齏癰 青蛇毒 接骨發 附陰疽 內踝疽 外踝疽 穿踝疽 濕毒流注

(附瓜藤纏) 腎氣遊風 膿瘡 鱗漏 四鬢風 風疽

足部

足發背 湧泉疽 脫疽 敦疽 甲疽 足跟疽 厲癰 四淫 臭田螺 牛程躃 土粟 冷疔 腳氣瘡

田螺肥 肉刺

卷十二 編輯外科心法要訣

發無定處(上)

疔瘡 流注 癭瘤 多骨疽 結核 癩發 癩疔 烏白癩

卷十三 編輯外科心法要訣

發無定處(中)

大麻風 楊梅瘡 楊梅結毒 赤白遊風 紫白癩風 白駁風 癩瘍風 丹毒 粟瘡作癢 枯筋筋

卷十四 編輯外科心法要訣

發無定處(下)

疥瘡 癬 黃水瘡 暑令癩毒小癩 瘡疽 產後癩疽 翻花瘡(無圖) 血風瘡 癩瘡 浸淫瘡 火赤瘡
貓眼瘡 魚脊瘡 骨痿瘡 風疔(無圖) 血疔 白疔 漆瘡 血箭 血痣 癩痛(無圖) 瘡口誤入毒水
(無圖) 諸瘡生蠅蛆(無圖)

卷十五 編輯外科心法要訣

御纂醫宗金鑑 總目

雜證部

跌撲 金瘡 箭頭入肉 鐵鉞入肉 鐵鉞誤入咽喉 誤吞銅錢 骨蝕咽喉 杖瘡 夾傷 竹木刺入肉
破傷風 發瘰 湯火傷 凍瘡 人獸傷 熊虎狼傷人 馬獸傷 瘋犬獸傷 馬汗驅涎入瘡 蛇獸傷
蜈蚣獸傷 蠍螫 蠶獸 射工傷 蚯蚓傷 天蛇傷 蠅躄傷 百蟲入耳

卷十六 編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒 胎瘤 紅絲瘤 胎癩瘡 痘癰 葡萄疫 胎驚丹毒 滯熱丹毒 嬰兒瘡瘍 垂癰 胎風
臍瘡 臍突 陰腫 脫肛 肛門作癢 遺毒 痘裏夾癰 痘疔 痘裏發丹 痘爛 痘風瘡
逐日人神所在不宜鍼灸歌 十二時人神歌 十二支日人神所在歌 十干日不宜用鍼犯之病多反覆
九宮尻神圖 九宮尻神歌 升打靈藥固罐法 升打靈藥封罐口法 煉金頂砒法 製寒食麵法


御醫醫宗金鑑卷一

編輯外科心法要訣

十二經循行部位歌

手之三陽手太陽。手之三陰調內手。足之三陽頭外足。足之三陰足內走。（註）手之三陽手外頭者。謂手陽明大腸。經從手次指內側之端。上行手臂外之上行。（晉杭）至頭鼻孔兩旁也。手少陽三焦經。從手四指外側之端。上行手臂外之一。直行至頭耳前動脈也。手太陽小腸。經從手小指外側之端。上行手臂外之一。下行至頭耳中澤下也。手之三陰調內手者。謂手太陰肺經。從胸乳上循行臍內。下行肘臂內之上。行至手大指內側之端也。手厥陰心包絡經。從腋下乳外。循行臍內。下行肘臂內之中。行至手中指之端也。手少陰心經。從腋筋間循行臍外。下行肘臂內之下。行至手小指內側之端也。足之三陽頭外足者。謂足陽明胃經。從頭目下循頰頸乳中。下行腹外股膝臍之前。行至足二指之端也。足少陽膽。經從頭口外眥。循行繞耳顛顛。下行手膝膝附之中。行至是四指外側之端也。足太陽膀胱經。從頭目內眥。循行額巔項背。外行臀膕腓踝之後。行至足小指外側之端也。足之三陰足內走者。謂足厥陰肝經。從足大指外側之端。循行前行上內踝。上髕膕膝之中。行內有陰器腹臍之外。行上至乳下也。足太陰脾經。從足大指內側之端。循行內踝膝裏股內之中行。上行腹中。至季脇也。足少陰腎經。從足心循行踝足跟內循之。後行上腹內至胸也。諸陽蹠外。諸陰行裏。四肢背腹皆如此也。


頭前正面歌



頭前正面歌


頭督唇任五中行。昔傍足太顛手陽。側上足少繞耳手。鼻傍手明唇足方。
 (註) 頭之正面分五行。(音枕) 其中行上唇唇以上。屬督脈。下唇唇以下。屬任脈。此為中行也。其第二行。目內眥旁上。屬足太陽經。鼻


旁下。屬手陽明經。此為第二行也。其第四行。面頤骨外旁。屬手太陽經。頭側上。屬足少陽經。繞前後。屬手少陽經。此為第四行也。其第三行唇旁屬足陽明經。為第三行也。




頭後項頸歌

頭後七行督中行。惟二足太足少陽。頸前任中二足明。三手四行手太陽。五足少陽六是手。七足太陽督
行。(註)頭後項頸分七行。其中行屬督脈。惟兩旁第二行屬足太陽經。其餘第三行四行五行。皆屬足少
陽經。頸前中行屬任脈。二行屬足陽明經。三行屬手陽明經。四行屬手太陽經。五行屬足少陽經。六行屬手
經。七行屬足太陽經。項後中行屬督脈經也。





手太陽臂外圖




手太陽

胸腹脊背歌

胸腹二行足少陰。三足陽明四太陰。五足厥陰六少陽。脊背三三足太陽。(註)胸腹之中行屬任脈。兩旁第一行屬足少陰腎經。第三行屬足陽明胃經。第四行屬足太陰脾經。乳下脇上第五行屬足厥陰肝經。脇後第六行屬足少陽膽經。脊兩旁第一行三行俱屬足太陽膀胱經。脊之中行屬督脈經。


手肘臂內圖




手膊臂外內歌

手膊臂外上手明。中手少陽下太陽。手膊臂內上中下。手太厥少分二行。(註)手膊臂之外面。係手三陽經部位也。上行屬手陽明經。中行屬手少陽經。下行屬手太陽經。手膊臂之內面。係手三陰經部位也。上行屬手太陰經。中行屬手厥陰經。下行屬手少陰經。

足膝外圖



足膝內圖



足膝外內歌

足膝外前足陽明。中行少陽後太陽。足膝之內前中後。足厥太少分三行。(註)足膝之外面。係是三陽經部位也。前行屬足陽明經。中行屬足少陽經。後行屬足太陽經。足膝之內面。係是三陰經部位也。足大指外側之前行。股內之中行。屬足厥陰經。內側之中行。股內之前行。屬足太陽經。足小指外側之後行。屬足少陰經。

手太陰肺經圖



肺經歌

太陰肺經起乳上。系橫出腋臑中廉。達肘循臂八寸口。上魚大指內側邊。(註)手太陰肺經。起於乳上三肋端。去中行旁開六寸。腋前外灣。而至臑間。由臑中廉達肘內。循臂裏。滿前廉。八寸口。上魚際。終於手大指內側。去爪甲角加韭葉。

手陽明大腸經圖



大腸經歌

陽明之脈手大腸。次指內側起商陽。循手臂外過肘臑。達肩入缺上頸旁。貫頰下齒出人中。上俠鼻孔終迎香。(註)手陽明大腸經。起於手大指之次指內側。去爪甲角如韭葉許。循大指次指之岐骨。行臂外前廉。過肘外。自臑達肩。行缺盆直上頸頸之側。環出人中之左右。以俠鼻孔兩旁。迎香穴而終焉。

足陽明胃經圖



胃經歌

陽明胃起目下胞。從鼻入齒還承漿。頤後頰裏上耳前。額顙下循兩頸旁。從缺盆口下乳中。循腹臙班腿面行。外抵膝臑走足跗。至足中指外側當。(註)足陽明胃經。起於目下鼻旁。下夾口吻。繞臙。上行身前。至額角。下行頸側。夾結喉。至肩上橫骨陷中。下行當乳之中。去中行旁開四寸。從乳頂下行至臙旁。去中行旁開三寸。從臙旁下行至腿之合縫。去中行旁開二寸。從合縫斜行向外。直下膝外前廉。至臙骨。倒上腹轉注而下行。至足中指之端。去爪甲角如韭葉而止。

足大陰脾經圖



脾經歌

太陰脾起足大指。上循內側白肉際。核骨之後內踝前。上臑循行脛膝裏。股內前廉入腹中。斜行九肋季脇止。(註)是太陰脾經。起於足大指端。內側。去爪甲角韭葉許。由內側白肉際核骨之後。過內踝之前。自裏上廉上膝。由大腿內廉入腹裏。至乳上旁開四寸五分。至胸中行旁開六寸許。是其部也。向外行至九肋間。季脇之端而終。

手少陰心經圖



心經歌

少陰心經腋筋間。臑後肘臂內後廉。由內後廉至銳骨。小指內側爪甲端。(註)手少陰心經。起於臂內腋下筋間。循臂臑之外後廉。至肘內廉。循臂內後廉。下抵掌後銳骨之中。行於手小指內側。去爪甲角如韭葉許而終。

手太陽小腸經圖



小腸經歌

太陽小腸小指端。循手外廉踝骨前。從手踝骨出肘外。上循臑外出後廉。上過肩解繞肩胛。交肩貫頸曲頰邊。面鳩骨下陷中取。耳中珠子經穴全。(註) 手太陽小腸經。起於手小指外側之端。去爪甲角如韭葉許。由手外側至手踝骨之前。行肘外後廉。上循臑外。過肩後廉。而上行肩。自肩貫頸。過曲頰斜上顙骨。至耳前而終。

定太陽膀胱經圖



膀胱經歌

太陽膀胱起內背。上額交頤耳後尋。下項循肩后膊內。俠脊抵腰下貫髀。貫髀斜入委中穴。與支下合臑中存。貫臑內出外踝後。小指外側終至陰。(註)足太陽膀胱經。起於目內眥。上額交頤。從頤至耳上角後行。下項循后膊內。有二道。一道俠脊旁開寸半。抵腰中。腰中有四空。從腰中下貫髀。入臑中。一道又從膊內左右分。下貫臑。俠脊內。旁開三寸。下滿髀樞。循髀外後廉。下合臑中。以下貫臑內。出外踝之後。循京骨至小指外側端。去爪甲角如韭葉許。至陰穴而終。

足少陰腎經圖



腎經歌

少陰腎經起足心。上內踝。骨是後跟。上膈出膈入股內。行至胸中部位分。(註) 足少陰腎經。起於足心陷中。循內踝。入足後跟。中行內踝之上。上膈分中。出膈內廉。後股內。上行至合縫。自合上行。去腹中行旁開一寸。至臍。從臍旁上行。復上去中行旁開一寸五分。從腹上行至胸中。旁開二寸而終。


心包絡經歌

厥陰心包腋下起。腋下乳外臑內行。入肘下行兩筋間。入掌中指之端止。(註)手厥陰心包絡經。起於腋下三寸。乳外側一寸許。從腋下向外。上轉循臂內。入肘內。下行兩筋之間。入掌中。循中指出其端而終。

圖經絡包心陰厥手



圖經絡包心陽少手



三焦經歌

少陽三焦四指端。手腕臂外兩骨間。貫肘上肩項耳後。上繞其前動脈間。(註)手少陽三焦經。起於手小指次指之外側。去爪甲角如韭葉許。由小指次指岐骨之間。上行手腕臂外兩骨中間。貫肘上肩。由肩項至耳後。上繞耳上角。下循耳前動脈而終。


足少陽膽經圖



膽經歌

少陽膽經起外背。繞耳前後上額顛。顛後頸肩腋季脇。跨膝踝跗小指出。(註)足少陽膽經。起於目外眥。斜貫耳前。循行耳後。上抵額顛。至顛後。行頸側。過肩下腋。走身側之季脇。下腿跨。行膝之外。至外踝之前。內行足跗。至足小指次指之外側。去爪甲角如韭葉許而終。

足厥陰肝經圖



肝經歌

厥陰肝經起聚毛。循行足跗內踝間。上環陰器季脇。上行乳下二肋端。
（註）足厥陰肝經。起於足大指後。去爪甲韭葉聚毛處。循行足跗上面。走內踝。上行臍。膈過膝。直上環陰器。向外灣行至季肋內。斜上行直乳下。二肋端而終。

任脈歌

任脈起於兩陰中。上行毛際腹中行。頸下結喉中央上。唇稜下陷承漿名。(註)任脈起於前陰後陰之中間。前行橫骨。上行毛際。由毛際直上腹之中行。上行頸下結喉上之中央。由結喉上行。至下唇稜下陷中而終。

任脈圖




督脈圖



督脈歌

督脈起於尻骨端。後行脊背腰腦髓。前行鼻柱皆中道。唇內齒上齦縫間。(註)督脈起於尻骨之端。由尻骨後行脊背之中行。上行至顛頂之中。前行至鼻下人中。至唇內門牙之中縫而終。

圖脈府藏配分



脈部位歌

脈爲血脈百骸通。大會之地寸口宗。掌後高骨名關上。關之前後寸尺名。（註）脈者血之府也。周身血脈。運行。貫通。十二經中。皆有動脈。獨取寸口者。蓋以其經。每至寅時。各經之氣。皆上朝而大會於肺。故曰寸口宗也。掌後有高骨隆起。界於尺脈寸脈之間。名曰關部。關前之位。其名曰寸。關後之位。其名曰尺。尺寸者。謂從關上至魚際長一寸。從關下至尺澤長一尺。故名之也。

脈分主歌

上焦候寸下焦尺。中焦之候屬兩關。包絡與心左寸應。膽與肝家在左關。膀胱小腸腎左尺。胸中及肺右寸間。胃與脾脈右關取。大腸並腎右尺班。（註）兩寸之脈。主候上焦胸中。兩關之脈。主候中焦膈中。兩尺之脈。主候下焦腹中。左寸之脈。浮候包絡。沉以候心。左關之脈。浮以候膽。沉以候肝。左尺之脈。浮候膀胱小腸。沉以候腎。右寸之脈。浮候胸中。沉以候肺。右關之脈。浮以候胃。沉以候脾。右尺之脈。浮候大腸。沉亦候腎。此遵內經分配三部診脈法也。僞訣以大腸小腸配寸。三焦命門配尺。包絡竟置不問。悉屬不經。滑壽以左尺候小腸膀胱。右尺候大腸。千古雙眼也。當從之。

浮沉脈歌

浮沉從肉上下行。皮浮屬肺血心經。筋沉屬肝骨沉腎。肌肉爲脾候在中。（註）脈從肉上行者。謂之浮。脈從肉下行者。謂之沉。然心肺俱浮。於皮毛取之而得者。肺之浮也。於肉脈取之而得者。心之浮也。故名皮浮屬肺血心經也。肝腎俱沉。以筋平取之而得者。肝之沉也。至骨取之而得者。腎之沉也。故曰筋沉屬肝骨沉腎也。肌肉在浮沉之間屬脾。其候在中。故曰候在中也。凡脈以部位而得名者。皆統於浮沉。故以浮沉

爲提綱。以統濡弱及伏牢革虛實微散諸脈也。

濡弱及伏牢革諸脈歌

浮沉無力曰濡弱。中取無力扞脈看。沉極筋骨爲伏脈。浮沉極力革牢參。(註)浮而無力謂之濡脈。沉而無力謂之弱脈。浮沉有力。中取無力。狀如葱管。謂之扞脈。沉極推至筋骨。按之而始得者。謂之伏脈。浮而極有力者。謂之革脈。沉而極有力者。謂之牢脈。

虛實微散諸脈歌

三部有力曰實脈。三部無力虛脈稱。三部無力而且小。似有如無微脈名。三部無力而且大。渙漫不收散脈形。(註)浮中沉三部。俱有力。謂之實脈。浮中沉三部俱無力。謂之虛脈。浮中沉三部無力。按之且小。似有似無。謂之微脈。浮中沉三部無力。按之且大。渙漫不收。謂之散脈。

遲數緩疾結促代諸脈歌

三至爲遲六至數。四至爲緩七至疾。緩止爲結數止促。動止難還代脈識。(註)一呼一吸。謂之一息。一息三至。謂之遲脈。一息四至。謂之緩脈。一息六至。謂之數脈。一息七至。謂之疾脈。緩脈動時一止。謂之結脈。數脈動時一止。謂之促脈。結促之脈。動而中止。不能自還。謂之代脈。凡脈以至數而得名者。皆統於遲數。故以遲數爲提綱。以統緩疾結促代五脈也。

滑瀉弦緊洪細大長短動諸脈歌

滑脈如珠溜不定。瀉脈滯澀往來艱。弦脈端直細且勁。緊比弦粗勁且彈。來盛去衰洪脈是。細則如絲大豁然。長脈迢迢短縮縮。如豆搖搖作動看。(註)形狀如珠。滑溜不定。謂之滑脈。往來滯澀。進退維艱。謂

之滑脈。狀如弓弦。細而端直。按之且勁。謂之弦脈。較弦則粗。按之勁。左右彈者。謂之緊脈。上來應指而盛。下去減力而衰。謂之洪脈。脈形軟直如絲者。謂之細脈。脈形粗大豁然者。謂之大脈。來去迢迢而長。謂之長脈。來去縮縮而短。謂之短脈。其形如豆。約約動搖不移者。謂之動脈。凡脈以形狀而得名者。皆統於滑瀯。故以滑瀯爲提綱。以統絃緊洪細大長短動八脈也。

癰疽見癰脈歌

癰脈脈宜洪大數。若逢牢短化膿難。疽脈最宜沉與弱。浮大且散命歸泉。(註)癰乃陽毒。應見陽脈。若洪大而數。則毒易潰。若見牢短之脈。則爲陰凝氣少。故曰化膿難也。疽乃陰毒。脈應見沉與弱。是爲順脈。若見浮大而散。則爲陽脫氣敗。故曰命歸泉也。

癰疽伏脈歌

癰疽伏脈理當明。毒閉於經六脈停。審證無凶宜穿發。氣通脈道自然行。(註)癰疽二證。有見伏脈者。皆由於毒氣閉塞經絡。榮衛壅滯之故。以致六脈停止。沉伏不見也。若審其證無凶象。非死脈也。治之惟宜穿通經絡。宣發榮衛。使氣得通。而脈道自然行矣。

腫瘍潰瘍浮脈歌

腫瘍浮脈恐多虛。或有風寒在表居。潰後脈浮氣外瀉。頻加補劑始相宜。(註)腫瘍脈浮者。非氣血不足。即爲風寒在表。須詳證施治。潰瘍脈浮者。乃氣從外瀉。須補劑調養。始爲合法。

腫瘍潰瘍沉遲脈歌

腫瘍沉脈多毒閉。潰後多毒在內存。無力須詳毒內陷。遲寒數熱更當分。(註)腫瘍不當。脈沉而脈沉者。

乃毒閉使然也。潰後而沉者。是毒尙存於內也。若沉而無力。恐內虛毒陷。當詳審之。沉而遲則爲兼寒。沉而數。則爲兼熱。更當分別。

腫瘍潰瘍數脈歌

腫瘍數脈宜熱毒。數且兼洪欲作膿。潰後洪大爲病進。膿出洪數治無功。(註)腫瘍脈數。作膿兼洪。皆正應之脈也。若潰後洪大。膿出數洪者。皆爲邪盛正虛。病脈相反。其病日進。治亦無功。

腫瘍潰瘍滑脈歌

腫瘍滑脈尙爲順。初起有痰治痰宜。潰後痰多恐氣乏。喘生毒陷死之機。(註)滑主流通。腫瘍初起脈滑無痰。尙爲順脈。若有痰則當以治痰爲急。恐潰後痰多氣乏。必致喘生毒陷而死也。

腫瘍潰瘍瀉脈歌

腫瘍瀉脈屬毒滯。有力爲實無力虛。潰後脈瀉爲傷血。急補氣血莫遲疑。(註)瀉主滯澀。腫瘍初起。脈瀉者。乃氣血爲毒滯之。徵若按之有力。毒滯爲實。按之無力。正損爲虛。不可不辨。若潰後脈瀉。爲傷血不足之象。急當大補氣血。莫遲疑也。

腫瘍潰瘍虛實脈歌

腫瘍脈虛宜內託。潰後內虛大補膏。腫瘍脈實宜消散。潰後如實毒未清。(註)腫瘍未潰脈虛者。不須功毒。惟宜內託。已潰脈應虛者。急當以大補收功。如腫瘍未潰。脈實者當消毒散毒。已潰脈實者。乃毒氣竊未清也。

腫瘍潰瘍長脈歌

腫瘍長脈爲有餘。消散之方任所施。潰後得之爲氣治。條然和暢不須醫。(註)腫瘍見脈長者。乃氣血有餘。消散之。方任意施治。潰後脈長者。乃氣之暢也。故曰氣治。不待醫藥自能愈也。

腫瘍潰瘍短脈歌

腫瘍短脈元氣虛。大加補劑始相宜。潰後脈短爲虛甚。補之仍短決死期。(註)腫瘍脈短者。元氣虛也。非大加補益之劑不可。潰後脈短者。虛之甚也。若補之而脈仍短者。則爲敗證。其死必矣。

腫瘍潰瘍洪脈歌

腫瘍洪脈陽熱盛。宣熱攻毒必有功。潰後洪脈毒留內。治之不退自然凶。(註)腫瘍未瘍。脈洪者熱盛也。宣熱攻毒之法可施。若潰後脈洪者。邪盛也。服藥而脈洪不退者。爲正虛邪盛。其凶不免。

腫瘍潰瘍微脈歌

腫瘍微脈爲虛候。內托受補始能痊。潰後見此雖爲順。微細無神作逆觀。(註)腫瘍脈微者。乃虛候也。當以內托補劑爲主。受補者方能痊可。若潰後脈微雖爲順候。設按之微細無神。則根本已虧。亦當作逆證觀也。

腫瘍潰瘍動緊脈歌

腫瘍將發脈動緊。乃因毒氣外搏經。潰後見之毒內搏。此爲殘賊證不輕。(註)腫瘍見動脈緊脈者。乃毒氣外搏於經之象也。若潰後見動緊之脈。則爲毒氣內搏於臟腑之象。蓋動緊乃殘賊之脈。潰後不宜見之。故曰證不輕也。

腫瘍潰瘍緩脈歌

腫瘍脈緩何須藥。和緩從容最吉祥。潰後見之爲胃好。便和飲食自然康。(註)腫瘍脈緩。乃氣血和平。不

待服藥。自然安愈之吉兆也。潰後見之。則爲胃和。飲食自甘二便自調。其證自然康寧也。

腫瘍潰瘍紅弦脈歌

腫瘍紅脈血原虛。潰後見紅理所宜。腫瘍弦脈邪作痛。潰後而弦邪病脾。(註)腫瘍未潰脈紅者。其血必虛也。潰後見紅。乃去血之後。亦理之所宜也。腫瘍脈弦者。乃毒攻作痛之象。蓋弦主痛也。若潰後脈弦者。則爲肝邪侮脾蓋弦乃肝脈也。

腫瘍潰瘍牢脈歌

腫瘍牢脈爲邪固。未作膿時脈見牢。已潰見牢邪難已。結核癰癰不能消。(註)腫瘍脈牢。未作膿時見之。主毒邪牢固難消。潰後見之。邪亦難已。若一切結核癰癰。見此牢脈。皆主牢固不能消之候也。

腫瘍潰瘍濡弱脈歌

腫瘍濡弱脈不足。扶虛托裏始能痊。潰後雖爲脈病應。但無虛候始得安。(註)腫瘍脈見濡弱不足者。必用扶元托裏之劑。始能痊也。潰後脈見濡弱。雖爲脈病相應。但無虛證。始得安全。若精神疲憊。飲食不思。亦危候也。

腫瘍潰瘍散脈歌

腫瘍散脈最可愁。毒盛氣散不能收。潰後見斯亦爲逆。急投補固或無憂。(註)腫瘍最忌散脈。蓋散脈爲毒盛氣散。不能收功之診。潰後見之。亦主逆也。急投補虛收固之劑。或有生者。

腫瘍潰瘍大細脈歌

腫瘍脈大爲順候。潰後脈大不相宜。腫瘍潰後脈細小。總主癰疽氣血虛。(註)腫瘍脈大爲正實毒必易出。

爲順候也。潰後脈大爲病進。其毒難化。爲不宜也。腫瘍潰瘍。脈見細小者。總屬氣血兩虛。惟宜大補爲主。

腫瘍潰瘍促脈歌

促脈無分腫潰瘍。總爲陽結不宜常。漸退毒散猶可愈。常進不退必然亡。(註)腫瘍潰瘍。脈見促者。皆爲陽結。但宜暫而不宜常也。如促脈漸漸而退。則毒亦漸漸而散。猶或可愈。若常進不退。其亡必矣。

腫瘍潰瘍結代脈歌

腫瘍結脈爲陰結。急宜溫解始能康。潰後見結陰虛歇。如代之歇定然亡。(註)腫瘍脈結者。乃陰結也。急用溫散解毒之劑。始可獲效。若潰後見結脈。則爲陰虛之歇止。尙不主死。若如代脈之歇。動而中止。不能自還。則爲真臟之脈。見定主亡也。

十二經氣血多少歌

多氣多血惟陽明。少氣太陽厥陰經。二少太陰常少血。血虧行氣補其榮。氣少破血宜補氣。氣血兩充功易成。厥陰少陽多相火。若發癰疽最難平。(註)人之十二經。有氣血多少之分。多則易愈。少則難痊。瘍醫明此臨證。可豫知癰疽瘡瘍之始終難易。而用藥消補之法始當也。如手陽明大腸。足陽明胃。此二經常多氣多血。手太陽小腸。足太陽膀胱。手厥陰包絡。足厥陰肝。此四經常多血少氣。手少陽三焦。足少陽膽。手少陰心。足少陰腎。手太陰肺。足太陰脾。此六經常多氣少血。大法血多者則破其血。氣多者則行其氣。氣少者難於起發。宜託補之。血少者難於收斂。宜滋養之。氣血兩充。則易於起發。易於收斂。惟手足厥陰少陽四經。倍多相火。此四經若發癰疽。肌肉難長。瘡口難合。倘過用驅毒峻利之藥。以伐其氣。以消其血。必難收功。故明其經之氣血多少。則用藥不致有妄汗妄下之弊矣。

癰疽總論歌

癰疽原是火毒生。經絡阻滯氣血凝。外因六淫八風感。內因六慾共七情。飲食起居不內外。負挑跌撲損身形。膏梁之變榮衛過。藜藿之虧氣血窮。疽由筋骨陰分發。肉脈陽分發曰癰。癩起皮裏肉之外。瘡發皮膚癰。通名。陽盛焮腫赤痛易。陰盛色黯陷不疼。半陰半陽不高腫。微痛微焮不甚紅。五善爲順七惡逆。見三見四死生明。臨證色脈須詳察。取法溫涼補汗攻。善治傷寒雜證易。能療癰疽腫毒精。(註)經云。諸痛癢瘡。皆屬心火。故曰癰疽原是火毒生也。癰疽皆因榮衛不足。氣血凝結。經絡阻隔而生。故曰經絡阻隔氣血也。其因有三。外因。內因。不內外因也。外因者。由於春之風。夏之熱暑。長夏之濕。秋之燥。冬之寒也。當其時而至。則爲正氣。非其而至。或過盛。則爲淫邪。凡此六淫爲病。皆屬外因。亦有因於八風相感。如冬至日正北大剛風。立春日東北凶風。春分日正東嬰兒風。立夏日東南弱風。夏至日正南大弱風。立秋日西南謀風。秋分日正西剛風。立冬日西北折風。應時而至。主生養萬物。不應時而至。主殺害萬物。若人感受。內生重病。外生癰腫。凡此八風爲病。亦屬外因。故曰外因六淫八風感也。內因者。起於耳聰淨聲。眼觀邪色。鼻聞過臭。舌食滋味。心思過度。意念妄生。皆損人神氣。凡此七慾爲病。皆屬內因。又有喜過傷心。怒過傷肝。思過傷脾。悲過傷肺。恐過傷腎。變久則氣結。卒驚則氣縮。凡此七情爲病。亦屬內因。故曰內因六慾共七情也。不內外因者。由於飲食不節。起居不慎。過飲醇酒。則生火消灼陰液。過飲茶水。則生濕停飲。過食五辛。則損氣血。傷肌失飽。則傷脾胃。凡此皆飲食之致病也。晝日過勞。挑輕負重。跌撲捫墜等類。損其身形。夜不靜息。強力入房。勞傷精氣。凡此皆起居之致病也。其起於膏粱厚味者。多令人榮衛不從。火毒內結。起於藜藿薄食者。多令人胃氣不充。氣血虧少。凡此亦屬不內外因也。人之身體。

計有五層。皮脈肉筋骨也。發於筋骨間者。名疽。屬陰。被於肉脈之間者。名癰。屬陽。發於皮裏肉外者。名曰瘍毒。只發於皮膚之上者。名曰疔癩。凡癰疽陽盛者。初起焮腫色赤。疼痛。則易潰易斂。順而易治。以其爲陽證也。陰盛者。初起色黯不紅。場陷不腫。不硬不疼。則難潰難斂。逆而難治。以其爲陰證也。半陰半陽者。漫腫不高。微痛不甚。微焮不熱。色不甚紅。此證屬險。若能隨證施治。不失其宜。則轉險爲順。否則逆矣。五善者。五善之證也。諸瘡見之爲順。則易治。七惡者。七惡之證也。諸瘡見之爲逆。則難治。凡患癰疽者。五善爲順。七惡爲逆。見三善者。則必生。見四惡者。則必死也。醫者於臨證之時。須詳察色脈。宜溫者溫之。宜涼者涼之。宜補者補之。宜汗者汗之。宜攻者攻之。庶有濟也。然外證癰疽。猶如內證傷寒。善治傷寒。則雜病無不易治。能療癰疽。則諸瘡無不精妙。蓋以能辨表裏陰陽。虛實寒熱也。

癰疽陽證歌

陽證初起焮赤痛。根束盤清腫如弓。七日或疼時或止。二七瘡內漸生膿。痛隨膿減精神爽。腐脫生新氣血充。嫩肉如珠顏色美。更兼鮮潤若榴紅。自然七惡全無犯。應當五善喜俱逢。須知此屬純陽證。醫藥調和自有功。(註)凡癰疽初起。焮熱赤痛。根束者暈不散也。盤清者不漫腫也。腫如弓者高腫也。此皆屬陽之證。故潰膿脫腐。生新收口。俱見易也。

癰疽陰證歌

陰證初起如粟大。不紅不腫疼瘡僵。木硬不痛不焮熱。瘡根平大黯無光。七朝之後不潰腐。陷軟無膿結空倉。瘡上生衣如脫甲。孔中結子似含芳。紫黑膿穢多臭穢。若見七惡定知亡。須知此屬純陰證。雖有岐黃命不長。(註)凡癰疽初起。如粟米大之瘡。不紅不腫。不焮熱。木硬不痛。根散漫。色黯無光者。此皆

屬陰之證。故不潰腐。空倉無膿。生衣如甲葉不脫。孔中結子。如花含子。紫黑膿清。臭穢俱見難愈也。

癰疽半陰半陽歌

陰陽相半屬險證。陽吉陰凶生死昭。似陽微痛微焮腫。如陰半硬半腫高。腫而不潰因脾弱。潰而不斂爲膿臍。五善之證雖兼有。七惡之證不全逃。若能飲食知味美。二便調和尙可療。按法施治應手效。陽長陰消自可調。
(註) 凡癰疽似陽不甚焮熱腫痛。似陰不甚木硬平陷。此屬半陰半陽之險證。若漸生善證則生。漸生惡證則死也。

癰疽五善歌

心善精神爽。言清舌潤鮮。不躁不煩渴。寤寐兩安然。肝善身輕便。不怒不驚煩。指甲紅潤色。溲和便不難。脾善唇滋潤。知味喜加餐。膿黃稠不穢。大便不稀乾。肺善聲音響。不喘無噎痰。皮膚光潤澤。呼吸氣息安。腎善不午熱。口和齒不乾。小水清且白。夜臥靜如山。(註) 寤寐者。醒與睡也。不怒不驚者。不自怒驚也。溲者小水也。便者大便也。不午熱者。不午後發熱也。

癰疽七惡歌

一惡神昏憤。心煩舌燥乾。色多紫黑。言語自呢喃。二惡身筋強。目睛正視難。瘡光頭流血水。驚悸是傷肝。三惡形消瘦。瘡形陷又堅。膿清多臭穢。不食脾敗難。四惡皮膚槁。痰多韻不圓。喘生鼻煽動。肺絕必歸泉。五惡時引飲。咽喉若療烟。腎亡容慘黑。囊縮死之原。六惡身浮腫。腸鳴嘔飽繁。大腸多滑泄。臟腑敗之端。七惡瘡倒陷。如剝籬一般。時時流污水。四肢厥逆寒。(註) 呢喃言語不清也。驚悸心驚跳也。消瘦肌肉瘦也。皮膚槁乾槁也。韻不圓。不響亮也。鼻煽動。鼻孔煽動也。咽喉若療烟乾熱噎痛也。容慘下槩

也。囊縮外腎縮也。嘔餽嘔而作格逆也。如剝鱗。瘡面無皮。似剝皮鱈魚之狀也。

癰疽證歌

順證初起小漸大。憎寒壯熱漸熾疼。氣盛頂尖高腫起。血盛根脚收束紅。陽證一七膿熟潰。陰證廿一膿始成。已潰醃氣無毒氣。腐脫新生飲食增。瘡形雖大終無害。老少壯弱俱成功。(註)癰疽初起。從小而大。漸漸憎寒壯熱。漸漸疼痛熾赤。氣盛者頂尖高腫而起。血盛者則根脚收束而紅。此順證也。陽證則十四日。而膿即熟者。陽性速也。陰證必待二十一日。而膿始成者。陰性遲也。已潰膿有醃氣。而無滷氣者。則腐肉易脫。新肉易生。飲食自增。瘡形雖大。終無害也。醃氣即俗呼哈拉氣也。

癰疽證歌

逆證黍米下知疼。漫腫不熱頂塌平。未老白頭堅且硬。舌乾煩躁不生膿。肉腫瘡陷豬肝紫。遺尿直視并撮空。眼神透露精神短。身縮循衣唇吻青。面若塗脂皮枯槁。唇白腹脹定難生。已潰內堅皮破爛。腐後心煩膿水清。新肉不生多臭穢。頭低項軟憔悴容。陽病指甲青必絕。陰病額紅命必終。鼻生煙煤謔妄語。新肉板片瀉直傾。面色土黃耳枯黑。人中抽縮溝坦平。口張氣出無回返。鼻孔相漏隨息行。汗出如珠不易散。血水如肺痰膠凝。肉綻爛斑神離亂。滿面黑氣慘天庭。綿潰內似葡萄簇。眼眶迷漫黑氣濃。以上無論腫與潰。但逢此證悉屬凶。(註)癰疽初起。形如黍米。不知疼痛。漫腫不熱。頂見平塌。未潰白頭。按之堅硬。舌乾煩躁。此等逆證。決不化膿。肉腫瘡不腫。而陷。其色如豬肝之紫者。是毒邪已深也。若更見遺尿直視。神露神短。撮空循衣。唇吻青。面若塗脂。皮膚枯槁。唇白腹脹。種種惡候。斷無生理。已潰後。內堅皮爛。腐後心煩。膿水清稀。新肉不生。臭穢難近。頭低項軟。形容憔悴。陽病指甲青色。陰病兩腮紅赤。以至眼腫

迷漫。黑氣濃等證。無論毒之腫潰。但逢此數者。皆爲凶證難治也。

癰疽辨腫歌

虛漫實高火焮紅。寒腫木硬紫黯青。濕深肉綿淺起皰。風腫宣浮微熱疼。痰腫硬綿不紅熱。鬱結更硬若巖稜。氣腫皮緊而內軟。喜消怒長無熱紅。瘀血跌撲暴腫熱。產後閃挫久瘀經。木硬不熱微紅色。將潰色紫已成膿。(註)人之氣血。周流不息。稍有壅滯。卽作腫矣。然腫有虛腫、實腫、寒腫、濕腫、風腫、痰腫、有鬱結傷肝作腫。有氣腫。有跌撲瘀血作腫。有產後與閃挫瘀血作腫。形勢各異。如虛者漫腫。實者高腫。火腫者色紅皮光焮熱癰硬。寒腫者其勢本硬。色紫黯青。濕腫者皮肉重墜。深則按之如綿綿。淺則起光亮水皰。破流黃水。風腫者皮膚拘皺不紅。其勢宣浮微熱微疼。痰腫者。腫如綿。硬如饅。不紅不熱。鬱結傷肝作腫者。不紅不熱。堅硬如有稜角。狀如巖凸。氣腫者以手按之。皮緊而內軟。遇喜則消。遇怒則長。無紅無熱。皮色如常。跌仆瘀血作腫者。暴腫大熱。胖脹不紅。產後與閃挫瘀血作腫者。瘀血久滯於經絡。忽發則木硬不熱微紅。若膿已成而將潰者。其色必紫。諸腫形狀如此。不可一概而論也。

癰疽辨痛歌

輕痛肌肉皮膚淺。重痛深在骨筋間。虛痛飢甚不脹閉。喜入揉按暫時安。實痛飽甚多脹閉。畏人挨按痛難言。寒痛喜煖色不變。熱痛焮痛遇冷散。膿痛鼓長按復起。瘀痛隱隱潰不斂。風痛氣痛皆走注。風刺氣刺細心看。(註)痛由不通。然亦種種不一。有輕痛、重痛、虛痛、實痛、寒痛、熱痛、膿痛。瘀血凝結作痛。風痛、氣痛之別。輕痛者肌肉皮膚作痛。屬淺。重痛者痛徹筋骨。屬深。虛痛者腹肌則甚。不脹不閉。喜人揉按。暫時可安。實痛者食飽則甚。又脹又閉。畏人挨按。痛不可言。寒痛者痛處定而不移。皮色不變。遇煖則

喜。熱痛者皮色嫩赤。遇冷則減。膿痛者增寒壯熱。形勢跋長。按而復起。瘀血凝結作痛者。初起隱隱作痛。微熱微脹。將潰則色紫微痛。既潰則不疼。風痛者走注甚速。氣痛者流走無定。刺痛難忍。諸痛如此。不可不詳辨也。

癰疽辨膿歌

癰疽未成宜消託。已成當辨有無膿。按之堅硬無膿象。不熱無膿熱有膿。大輒應知膿已熟。半輒半硬膿未成。按之即起膿已有。不起無膿氣血窮。深按速起稀黃水。深按緩起壞污膿。實而痛甚內是血。內是氣兮按不疼。輕按即痛知膿淺。重按方疼深有膿。薄皮剝起其膿淺。皮不高阜膿必濃。稠黃白膿宜先出。桃紅紅水次第行。肥人膿多瘦人少。反此當究有變凶。稠黃氣實虛稀白。粉漿污水定難生。汗後膿穢猶可愈。膿出身熱治無功。(註)凡看癰疽瘡瘍形勢。未成者即用內消之法。若形勢已成。即用內託之法。當辨膿之有無淺深。以手按之堅硬者。無膿之象。按之不熱者無膿。熱者有膿。按之大輒者內膿已熟。半輒半硬者膿未全成。按之指起即復者有膿。不復者無膿。其氣血必窮而虛甚也。深按之而速起者。內是稀黃水。深按之而緩起者。內是壞污膿。按之實而痛甚者。內必是血。按之虛而不疼者。內必是氣。輕按即痛者。其膿淺。重按方痛者。其膿深。薄皮剝起者。其膿必淺。皮色不變。不高阜者。其膿必稠。大抵癰疽瘡瘍。先宜出黃白稠膿。次宜出桃花膿。再次宜流淡紅水。胖人宜於膿多。瘦人宜於膿少。若胖人膿少。是肉不腐。瘦人膿多。是肉敗壞。皆非吉也。又凡氣實者多稠黃膿。氣虛者多稀白膿。半虛半實者多稠白膿。又有膿出如粉漿。如污水者。謂之敗漿。不治之證也。命必難生。惟汗後膿穢者可愈。若膿已出。而身猶大熱不休者。治亦無功。蓋癰疽之得膿。如傷寒之得汗。汗出而反大熱者。壞傷寒也。膿出而身猶大熱者。壞癰疽也。

癰疽辨瘻歌

初起作瘻因風熱。潰後膿瀝或冒風。將斂作潰生新肉。瘻若蟲行氣血充。
初起。皮膚作瘻者。爲風熱相搏。潰後作瘻者。輕出膿瀝。甚由瘡口冒風。故突起疔瘻。形如小米。抓破之後。津水者是脾濕。津血者是脾燥。若將斂作瘻者。緣初腫時肌肉結滯。氣血罕來。及至將斂。氣血漸充。助養新肉故瘻也。然必瘻若蟲行。方稱美疾。他如疥癬作瘻。皆屬風淫。勿視爲一類也。

癰疽辨暈歌

眞暈應知非腫痕。瘡旁形狀若紅筋。藏府蘊受銳毒發。三暈可愈五傷身。
眞暈。應知非腫痕。瘡旁形狀若紅筋。藏府蘊受銳毒發。三暈可愈五傷身。
（註）俗以腫痕爲暈。非眞暈也。眞暈生於瘡口之旁。狀若紅筋。皆由藏府蘊受銳毒而成。二三暈可治。五暈難醫。

癰疽總論法歌

癰疽瘡瘍初如粟。麻癢焮痛即大毒。不論陰陽灸最宜。灸後湯洗膏固護。
癰疽瘡瘍初如粟。麻癢焮痛即大毒。不論陰陽灸最宜。灸後湯洗膏固護。內用疎解與宣通。外宜敷藥四圍束。輕證神燈照三枝。平場須急補不足。高腫不可過於攻。內熟毒盛須消毒。二便祕結宜通利。臟腑宣通方爲福。十日以後瘡尙堅。鈇鉞點破最爲先。半月之後膿若少。藥筒拔提膿要黏。瘡已潰爛傷不脫。當腐剪破開其竅。能令膿管得流通。自然瘡頭無閉塞。頻將湯洗忌風吹。去腐須當上靈藥。生肌散用將斂時。保養須勤毋怠惰。切忌膿出投寒涼。冬宜溫室夏明窗。肌肉長平將蒼斂。謹慎調理更加詳。新肉如珠皮不斂。若失保養命多亡。
（註）癰疽瘡瘍初起如粟。若麻癢焮痛者。卽毒甚也。七日以前。形勢未成。不論陰陽。但先當灸之。輕者使毒氣隨火而散。重者拔引毒氣通徹內外。實良法也。灸完卽用湯洗之法。洗完用太乙膏貼於瘡頂上。預防風襲。內服疎解宣通之劑。如神效衛生湯。內疎黃連湯鱗酥丸之類。外圍敷藥。如神和膏玉帶膏之

類。四圍車之。證以神燈照之。每日三枝。行勢已成。當因證施治。平場者宜投補劑。以益其不足。使毒外出。高腫者。可過於攻伐。以傷元氣。致難潰敗。肉熱盛者。須佐消毒之劑。以防毒熾。二便秘結者。急用通利之方。使臟腑宣通。方爲佳兆。如十日之後。瘡尚堅硬。必須用破鍼。當頭點破。半月之後。膿尚少者。急用藥筒拔法拔之。膿血膠黏者爲順。紫血稀水者爲逆。逾二十一日。縱有稀膿。亦難治矣。若已潰之後。腐仍不脫。堵塞瘡口者。用刀剪當頭開寸餘。使膿管通流。自然瘡不閉塞。拔膿剪腐已完。用方盤一箇。瘡下放定。將豬蹄湯以輦吊淋洗瘡上。併入孔內。輕手擦淨內膿。庶敗腐宿膿。隨湯而出。以淨爲度。再以輦吊疊成七八重。勿令太乾。帶湯乘熱。覆於瘡上。兩手輕按片時。帛濕再換。如此洗按四五次。血氣疏通。患者自然爽快。每日如是洗之。謹避風寒。腐肉處以黃靈藥摻之。候腐肉脫盡。已見紅肉時。洗後隨用根脚。挑玉紅膏於手心上。擦化搽塗明口內。外用太乙膏蓋之。不數日新肉頓生。瘡勢將斂。以生肌散或珍珠散撒之。保養謹慎。不可怠緩。膿出後切忌投以寒涼之藥。患者冬宜溫室。防其寒也。夏宜明窗。避風暑也。肌肉長平。蒼斂時尤加小心。謹慎調理。即使新肉如珠。皮口將斂。若調理疏忽。失於保養。恐致虛脫暴變。命必危亡矣。

內消治法歌

內消表散有奇功。脈證俱實用最靈。脈證俱虛宜兼補。發渴便秘貴疎通。清熱解毒活氣血。更看部位屬何經。主治隨加引經藥。毒消肌肉自然平。(註)經云。發表不遠熱。又云汗之則瘡已。故曰內消夫故有奇功也。惟脈證俱實者。斯可用之。若脈證俱虛。便宜兼補。發渴便秘。須急疏行。不可輕施表散之劑也。癰疽皆因氣血凝結。火毒太盛所致。故以清熱解毒。活氣活血爲主。更宜詳看部位。屬何經絡。即用引經之藥以治

之。則腫痛自消。肌肉自平矣。

內託治法歌

已成不起更無膿。堅硬不赤或不疼。膿少清稀口不斂。大補氣血調衛榮。佐以祛毒行滯品。寒加溫熱禦寒風。腫消膿出腐肉去。新生口斂內托功。(註)凡瘡腫已成。不能突起。亦難潰膿。或堅腫不赤而疼。或不癢。膿少清稀。瘡口不合。皆氣血虛也。宜以大補氣血。調和榮衛爲君。祛毒爲佐。加以辛香。行其鬱滯。加以溫熱。禦其風寒。候膿出腫消。腐肉盡去。氣血充足。新肉自然生矣。

虛實治法歌

癰疽未膿灸最良。藥服託裏自安康。發熱惡寒身拘緊。無汗表散功最長。腫硬口乾二便秘。下利毒熱自然涼。焮痛熱盛煩躁渴。便和清熱自吉昌。內膿不出瘀肉塞。用刀開割法相當。輭漫無膿不腐潰。宜服溫補助生陽。潰後新肉如凍色。倍加溫熱自吉祥。大汗亡陽桂枝附。自汗肢厥四逆湯。脾虛潰後肌消瘦。膿水清稀面白黃。不眠發熱瘡口爛。食少作渴大便秘。宜服清補助脾劑。投方應證保無妨。(註)凡治癰疽。不問陰陽表裏。口數遠近但未見膿時。俱宜灸之。焮腫發熱脈浮者。宜用托裏之藥。若脈緊。發熱惡寒。遍身拘緊無汗者。宜用表散之藥。腫硬口乾。二便秘澀者。宜用下利之藥。以洩其毒。熱焮痛勢深。煩躁敗冷。口燥舌乾硬和者。宜用清熱之藥。內膿不出。瘀肉堵塞瘡口者。用刀開割之。輭漫無膿。不腐潰者陽虛也。助以溫補之劑以生其陽。潰後新肉生遲。如凍色者肉冷肌寒也。宜倍加溫熱之藥。如大汗不止者亡陽也。宜用桂枝附子等藥。自汗肢厥者。宜用四逆湯。若潰後肌肉消瘦膿水清稀。面色黃白者。脾虛也。不寐發熱者。虛火上炎也。瘡口憺大者。氣陷不固也。食少作渴。大便澀者。脾虛熱也。俱宜服清補助脾之藥。

癰疽鍼法歌

取膿除瘡用鉞鍼。輕重疾徐在一心。皮薄鉞深蕩好肉。肉厚鉞淺毒猶存。腫高且輭鉞四五。堅腫宜鉞六七。分。腫平肉色全不變。此證當鉞寸許深。背腹肋脅生毒患。扁鉞斜入始全身。欲大開口鉞斜出。小開口直出法須遵。氣虛先補鉞宜後。膿出證退效如神。用在十日半月後。使毒外出不傷人。又有不宜用鉞處。癰疽冬月與骨筋。(註)經云癰氣之遠者。當以鉞開除去之。又云鉞鍼末如鋒銳。以取大膿。故曰取膿除瘡用鉞鍼也。其輕重疾徐。自有一定。在人心度量用之。不可亂施。蓋皮薄鉞深。皮傷好肉。肉厚鉞淺。毒又難出。大抵腫高而輭者在肌肉。鉞四五分。腫下而堅者在筋脈。鉞六七分。腫平肉色不變者。附於骨也。宜鉞寸許。若毒生背腹肋脅等處。宜扁鉞斜入。以防透膜。鉞既透膿。視瘡口必有膿意如珠。斯時欲大開口則將鉞斜出。欲小開口。則將鉞直出。所謂逆而奪之。順而取之也。隨以棉紙捻蘸元珠膏度之。使膿會齊。一三時將捻取出。瘡口貼太乙膏。四圍敷烏龍骨。元氣虛者必先補而後鉞。膿一出則諸證悉退。再者用鉞自有其時。不可太早。亦不專太遲。如十日之間。瘡尚堅硬。用鉞當頭點破。半月後不作膿腐者。用鉞鍼品字樣。三孔開之。不問深淺。以知痛爲佳。隨用藥筒拔法拔之。又有不宜鉞者。如癰疽結核之類。肚臍骨節近筋之處。及冬月閉藏之時。皆在所禁也。

癰疽之法歌

癰疽腫赤走不定。赤遊丹毒紅絲疔。時毒瘀血壅盛證。石治法最宜行。只須刺皮無傷肉。磁鋒對患最宜輕。毒血遇刺皆出盡。腫消紅散有奇功。(註)凡癰疽紅腫色赤。遊走不定。及赤遊丹毒。紅絲疔走散。時毒瘀血壅盛等證。皆宜行砭石之法。然忌其太深。內經所謂刺皮無傷肉也。法用細磁器擊碎。取有鋒芒者一塊。用

筋一根。將頭劈開。夾而縛之。用一指輕捺筋梢。以磁鋒對患處。懸寸許。再用重筋一根。頻擊筋頭。令血遇刺管出至。次日腫未全消。再量行砭之。以腫消紅散爲度。

癰疽灸法歌

癰疽初起七日內。開結拔毒灸最宜。不痛灸至痛方止。癢疼灸至不疼時。法以濕紙覆其上。乾處先灸不遲。蒜灸黃瘡附子灸。豆豉蟬蟻各用之。(註)凡癰疽初起。七日以前。開結拔毒。非灸不可。不痛者灸之。知痛。癢疼者灸至不疼。著毒則不痛。至好肉則痛。必灸至知痛者。令火氣至好肉方止也。著皮肉未壞。則痛。著毒則不痛。必灸至不疼者。令火氣著毒方止也。法以紙蘸水滿覆患上。看紙先乾處。卽先灸之。灸法貴於早施。如證起二三日卽灸。十證可全八九。四五日灸者。十證可全六七。六七日灸者。十證可全三五。愈早愈妙。其法不一。有隔蒜灸者。有當肉灸者。有用黃蠟灸者。有用附子灸豆豉灸蟬蟻灸者。一壯至百壯。以效爲度。至艾壯之大小。則量瘡勢以定之。然灸有應忌者。如腎俞發不宜灸。恐消腎液。手指宜灸。因皮肉澆薄。恐皮裂肉努。至於頭乃諸陽之首。諸書但云禁灸。若誤灸逼毒入裏。令人痰喘上涌。一加大腫。然遇純陰下陷之證。必當灸之。不灸則不能回陽。若半陰半陽之證。則仍當禁而不灸。

隔蒜灸法

大蒜切成片。約三錢。厚安瘡頭上。用大艾壯灸之。三壯卽換一蒜片。若漫腫無頭者。以濕紙覆其上。其先乾處。置蒜片灸之。兩三處先乾。兩三處齊灸之。有一點白粒如粟。四圍紅腫如錢者。卽於白粒上之。若瘡勢大。日數多者。蒜搗爛。鋪於瘡上。艾鋪蒜上灸之。蒜收再易。以知痛甚爲效。凡癰疽流注。

鶴膝風。每日灸三十壯。癰疽陰瘡等證。艾數必多。宜先服護心散。以防火氣入內。灸小兒。先將蒜置大人臂上。燃艾候蒜溫。即移於小兒毒上。其法照前。經云寒邪客於經絡之中則血泣。血泣則不通。不通則衛氣從之。癢過而不得行。故熱。大熱不止則肉腐爲膿。蓋毒原本於火。然與外寒相搏。故以艾火蒜灸之。使開結其毒。以移深居淺也。

黃蠟灸法

凡癰疽發背惡瘡頭瘡。先以濕麵隨腫根作圈。高寸餘。實貼皮上。如井口形。勿令滲漏。圈外圍布數重。防火氣烘膚。圈內鋪蠟屑三四分。厚次以銅漏杓盛桑木炭火。懸蠟上烘之。令蠟化至滾。再添蠟屑。隨添以井滿爲度。皮不痛者毒淺。灸至知痛爲度。皮痛者毒深。灰至不知痛爲度。去火杓。即噴冷水少許於蠟上。俟冷起蠟。蠟底之色青黑。此毒出之徵也。如漫腫無頭者。亦以濕紙試之。於先乾處灸之。初起者一二次即消。已成者二三次即潰。瘡久潰不斂。四圍頑硬者。即於瘡口上灸之。蠟從孔入。愈深愈妙。其頑腐瘵膿盡化。收斂甚速。

附子餅灸法

生川附子爲末。黃酒合作餅如三錢厚。安瘡上以艾壯灸之。每日灸數壯。但令微熱。勿令疼痛。如餅乾。再易餅灸之。務以瘡口紅活爲度。治潰瘍氣血俱虛。不能收斂。或風寒襲之。以致血氣不能運行者。實有奇驗。

豆豉餅灸法

癰疽發背。已潰未潰。用江西淡豆豉爲末。量瘡大小。黃酒合作餅。厚三分。置患處灸之。餅乾再易餅。如已有瘡孔。勿覆孔上。四布豉餅。列艾其上灸之。使微熱。勿令肉破。如熱痛急易之。日灸三度。令瘡孔出汗卽瘥。

蟬蛸灸法

疔瘻惡瘡。諸藥不驗者。取蟬蛸剪去兩頭。安瘡口上。以艾灸之。七壯一易。不過七枚。無不效者。

麥冬粳米飲

此方治癰疽陰瘡。法當艾灸。或灸太過者。或陽瘡不應灸而誤灸者。以致火毒入裏。令患者頭項浮腫。神昏痰湧。吁吁作喘。急服此藥。以清解火毒甚效。

麥門冬去心 粳米各三錢

水二鐘。煎一鐘。徐徐飲服。

(方) 麥門粳米各等分。能醫灸後頭項腫。神昏痰湧作喘聲。水煎徐徐功最勇。

癰疽烙法歌

烙鍼二枚須一樣。筋大頭圓七寸長。燃時蘸油燒火上。斜入向輟烙斯良。一烙不透宜再烙。膿水流出始

康。再用紙摺入烙口。外貼膏藥古稱強。此法今時不常用。惟恐患者畏驚惶。今時多用陽燧錠。代火鍼烙實奇方。(註)癰疽流注。經久不消。內潰不痛。宜用火鍼烙之。二枚一樣。形如筋粗。頭圓。長七寸。摺蘸香油炭火上燒紅。於瘡頂近下。斜入向輓處烙之。一烙不透再烙。必得膿水。不假手按流出。方用綿紙搓捻如繩狀。隨深淺摺入烙口。餘紙分開。外貼膏藥。此古法也。今罕用之。蓋恐患者驚懼。故以陽燧錠代之。

陽燧錠

蟾酥末

硃砂末

川烏末

草烏各五分末

直僵蠶一條末

以上共和勻。用硫黃一兩五錢。置杓內。微火純化。次入前蟾酥等末。攪勻。再入當門子麝香二分。冰片一分。攪勻。即傾入濕磁盤內。連盪轉成片。俟冬取收磁罐內。用時取甜瓜子大一塊。要上尖下平。先用紅棗肉擦灸處粘藥於上。用燈草蘸油。燃火炸藥錠上。灸五壯或七壯九壯畢。即飲米醋半酒鐘。候起小皰。用線鍼串破出黃水些須。貼萬應膏。其毒即消。如風氣痛。用筋子於骨縫中按之。疼痛處以墨點記灸之。再諸瘡初起。於腫處各灸三五壯立瘥。

(方歌) 陽燧錠灸寒。腫瘡。硃砂二烏殭硫黃。火煉加蟾共冰麝。乘熱傾出成片良。

神燈照法歌

癰疽輕證七日時。神燈照法最相宜。未成自消已成潰。即發即腐實稱奇。油浸灼火周圍照。初用三根漸加之。照後敷藥貼患上。有膿湯洗不宜遲。(註)凡癰疽輕證。初起七日前後。神燈照法最宜。能使未成者自消。已成者自潰。不起發者即起發。不腐者即腐。實有奇驗。將神燈照麻油浸透。用火點著。雖瘡半寸許。

目外而內。周圍徐徐照之。火頭向上。藥氣入向。毒氣隨火解散。自不致內侵臟腑。初用三根。漸加至四五根。候瘡勢漸消時。仍照之。但照後即用敷藥圍敷瘡根。比瘡暈大二三分爲率。瘡口用萬應膏貼之。如乾及右膿。用豬蹄湯潤洗之如已潰。大膿瀉時。不必用此照法。

神燈照法方

硃砂 雄黃 血竭 沒藥各二錢
麝香四分

共爲細末。每用三分。紅綿紙裹藥搓撚。長七寸。麻油浸透聽用。

〔方歌〕神燈照法功速急。醫沒雄硃血竭宜。爲末紙裹麻油潤。火點薰瘡火毒離。

桑柴火烘法歌

癰疽初起腫且疼。重若負石不潰膿。桑柴烘法能解毒。止痛消腫有奇功。新桑樹根劈條用。木枝長有九寸零。劈如指粗一頭燃。吹滅用火患處烘。片時火盡宜再換。每用三四枝方靈。每日須烘二三次。腫潰腐脫新肉生。〔註〕凡癰疽初起腫痛。重若負石。堅而不潰者。桑柴烘之。能解毒止痛。消腫散瘀。毒水一出。即能內消。若潰而不腐。新肉不生。疼痛不止者。用之助陽氣。散瘀毒。生肌肉。移深居淺。實有奇驗。法用新桑樹根。劈成條。長九寸。劈如指粗。一頭燃著吹滅。用火向患處烘片時。火盡再換。每次用三四枝。每日烘二三次。以知熱種潰肉腐爲度。此古法也。但桑柴火力甚猛。宜用於未潰之先。可以生發阻氣。速潰速腐。若已潰之後。或瘡口寒。或天氣寒。或肌肉生遲者。亦須烘之。使肌肉常煖。法以桑木燒作紅炭。以溫約盛之。懸患上。自四圍烘之。瘡口或高或低。總以瘡知熱爲度。每日烘後。再換敷貼之藥。若肌肉遇煖則生。潰後此法。亦瘍科所不可缺也。

牛膠蒸法歌

癰疽發背痔漏瘡。牛膠蒸法最相當。熬稠攤紙貼患上。醋煮軟布熱蒸良。溫易瘡瘻膿出盡。洗法膠紙貫案湯。(註)癰疽發背。痔漏惡瘡。膿瘡久頑不效者瘡。用牛皮膠一塊。火熬稀稠得所。攤厚紙上。每剪一塊。貼瘡口。次用醃醋煮軟布二塊。乘熱從膠紙上蒸之。稍溫再易。蒸至瘡瘻膿出至盡。豫用貫案二兩。煎湯熱洗。去膠紙。外用膏藥貼之。次日照前蒸洗。直至膿盡瘡乾爲度。

藥筒拔法歌

癰疽陰證半月間。不發不潰硬而堅。重如負石毒膿鬱。致生煩躁拔爲先。破鍼拔孔品字樣。膿鮮爲順紫黑難。(註)癰疽陰證。十五日前後瘡不起發。膿至深不能外潰。瘡勢堅硬。重如負石。毒膿內潰好肉致生煩躁。宜用藥筒拔法爲先。令毒膿得出路而出。豫將竹筒藥水煮熟。次用破鍼置瘡頂一寸之內。品字樣放開三孔。深一寸或半寸。量瘡之高下。取竹筒乘熱合於瘡孔上。拔出膿血。紅黃鮮明者爲順證易治。若膿血紫黑者爲敗證。難治。

煮竹筒方

羌活

獨活

紫蘇

蘄艾

菖蒲

白芷

甘草各五

錢

連鬚葱二兩

水十碗。熬數滾聽用。次用鮮嫩竹一段。長七寸。徑口一寸半。一頭留節。刮去青皮。厚約分許。靠筒鑽一小孔。以杉木條塞之。放前藥水內。煮數十滾。將藥水鍋置患人榻前。取筒傾去藥水。乘熱急合瘡頂鍼

孔上。按緊自然吸住。待片時藥筒已溫。拔去杉木塞子。其筒易落。外用膏藥蓋貼。勿令受風。膿血不盡。次日再煮。仍按舊孔再拔。治陰瘡擠膿不受疼之良法也。勿忽之。如陽瘡則不必用此法。恐傷氣血損之。

(方歌) 藥水黃筒有奇能。令瘡膿出不受疼。菖蘇羌獨艾芷草。整葱竹筒水煎膿。

御纂醫宗金鑑卷二

編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲

此方治一切癰疽。不論陰陽瘡毒。未成者即消。已成者即潰。化膿生肌。散瘀消腫。乃瘡癰之聖藥。誠外科之首方也。故名之曰仙方活命飲。

穿山甲三大片炒

皂刺五分

歸尾一錢五分

甘草節一錢

金銀花二錢

赤芍藥五分

乳香五分

沒藥五分

花粉一錢

防風七分

貝母一錢

白芷一錢

陳皮一錢五分

右十三味。好酒煎服。悉飲盡醉。

(方歌) 仙方活命飲平劑。瘡毒癰疽俱可醫。未成即消疹腫去。已成膿化立生肌。穿山皂刺當歸尾。草節金銀赤芍宜。乳沒天花防貝芷。陳皮好酒共煎之。

神授衛生湯

此方治癰疽發背。疔瘡對口。一切丹瘤惡毒諸證。服之宜熱散風。行瘀活血。消腫解毒。疎通臟府。乃表裏兩實之劑。功效甚速。

皂角刺一錢 防風六分 羌活八分 白芷六分 穿山甲六分炒 連翹六分 歸尾一錢

乳香五分 沉香六分 金銀花一錢 石決明六分 天花粉一錢 甘草節一錢

紅花六分

大黃二錢

酒拌炒

右十五味、水二椀。煎八分。病在上部。先飲酒一杯。後服藥。病在下部。先服藥。後飲酒一杯。以行藥力。如氣虛便利者。不用大黃。

(方歌) 神授衛生表裏劑。癰疽諸瘡惡毒良。行瘀活血兼消腫。表裏疎通實劑方。皂刺防風羌芷甲。連翹歸尾乳沉香。金銀石決天花粉。甘草紅花共大黃。

清熱消風散

此方活癰疽瘡腫。已成未成之際。無表無裏。故外不惡寒。內不便祕。惟紅腫嫩

痛。高腫有頭者。宜服此藥以和解之也。

皂角刺一錢 防風五分 陳皮一錢 連翹一錢去心 花粉五分 柴胡一錢 黃芩五分

川芎五分 白芍五分 甘草五分 當歸五分 黃耆一錢 金銀花五分 蒼朮一錢炒

紅花一錢

右藥十五味。水二鍾。煎八分。食遠服。

(方歌) 清熱消風無表裏。癰疽諸毒和解方。皂刺防風陳翹粉。柴芩芍草香當。銀花蒼朮紅花入。婦女還加香附良。若婦人加香附子。用童便炒。

乳香黃耆散

此方治癰疽發背諸毒。疼痛不可忍者。乃氣虛不勝毒之故也。服之未成即消。已成即潰。不用刀。惡肉自脫。并治打撲損傷。筋骨疼痛之證。

當歸一錢

白芍一錢

炒

人參一錢

生黃耆一錢

川芎一錢

熟地一錢

乳香五分

沒藥五分

陳皮一錢

粟殼一錢

去筋
膜蜜炙

甘草節一錢

右水二鍾。煎八分。量病重者。食前後服之。

(方歌) 乳香黃耆治氣弱。癰疽諸毒痛難當。未成即消已成潰。歸芍參香芍地黃。乳沒粟陳甘草節。更增打撲筋骨傷。

內疎黃連湯

此方治癰疽陽毒在裏。火熱發狂。發熱。二便秘澀。煩躁嘔噦。舌乾口渴飲冷等

證。六脈沉數有力者。急宜服之。以除裏熱。

山梔一錢 連翹一錢 薄荷一錢 甘草五分 黃芩一錢 黃連一錢 桔梗一錢

大黃二錢 當歸一錢 白芍一錢 木香一錢 檳榔一錢

炒

右水二茶鍾。煎八分。食前服。加蜜二匙亦可。

〔方歌〕內疎黃連瀉裏熱。癰瘡毒火陽盛狂。腫硬發熱二便秘。煩躁乾嘔渴飲涼。梔翹薄荷草芩連桔。大黃芍木檳榔。

回陽三建湯

此方治癰瘡發背初起。不疼、不腫、不紅、不熱。堅如頑石。硬若牛皮。體倦之。涼。脈息遲細。色似土硃。粟頂多孔。孔孔流血。根脚平散。輭陷無膿。皮不作腐。頭溫足涼者。並急服之。

人參一錢 附子一錢 當歸一錢 川芎一錢 甘草五分 茯苓一錢 生黃耆一錢

枸杞一錢 紅花五分 紫草五分 獨活五分 陳皮一錢 蒼朮五分 厚朴五分

炒

炒

木香五分 山臠肉一錢

右十六味。加煨薑三片。皂角樹根上白皮一錢。水二碗。煎八分。入酒一杯。隨病上下。食前後服之。用棉帛覆蓋着上。常冷濕煖。不得大開瘡孔。走泄元氣爲要。

〔方歌〕 回陽三建治陰疽。體倦身涼脈細遲。不腫不疼不紅熱。堅如頑石硬如皮。根平輭陷無膿腐。參附歸芎草茯苓。枸杞紅花與紫草。獨活蒼朴木山英。

竹葉黃耆湯

此方治癰疽發背。諸般疔毒。長裏不實。熱甚口中乾大渴者。服之生津止渴。

人參八分

生黃耆八分

石膏八分

半夏八分

麥冬八分

生地二錢

白芍八分

甘草八分

川芎八分

當歸八分

竹葉十片

黃芩八分

右十二味。水二鐘。薑三片。燈心二十根。煎八分。食遠溫服。

〔方歌〕 竹葉黃耆口乾渴。清熱補正助生津。參耆膏夏麥冬地。芍草芎歸竹葉芩。

內消散

此方治癰疽發背。對口疔瘡。乳癰。無名腫毒。一切惡瘡。能令癰腫內消。使毒內化尿

尿色赤污。從小便而出。勢大者。雖不全消。亦可轉重爲輕。移深居淺。

知母一錢

貝母一錢

花粉一錢

乳香一錢

半夏一錢

白及一錢

穿山甲一錢

皂刺一錢 花銀一錢

右九味。水酒各一椀。煎八分。隨病上下。食前後服之。留藥渣搗爛。加秋芙蓉葉一兩。研爲細末。再加白蜜。五匙。用法調敷瘡上。一宿即消。重者再用一服。

(方歌) 內消散用化諸毒。毒化從尿色變行。知貝天花乳夏及。穿山角刺共金銀。藥渣搗和芙蓉葉。白蜜用敷毒即平。

以上諸方。治癰疽七日以前。瘡勢未成。形體壯實。而表裏之證相和者。宜服。病退即止。如過七日以後。形勢已成。則宜托裏消毒等湯。使毒現於外。以速其膿。若仍用前散下之藥。恐傷元氣。致生變證也。

內固清心散

此方治癰疽發背。對口疔瘡。熱甚掀痛。煩躁飲冷。其人內弱。服之預防毒氣。內

攻於心也。

菘豆粉二兩 人參二錢 水片一錢 雄黃二錢 辰砂二錢 白豆蔻二錢

元明粉二錢 茯苓二錢 甘草二錢 乳香二錢

右十味爲細末。每服一錢五分。蜜湯調下。不拘時服。

(方歌) 內固清心防毒攻。內弱毒氣入心中。揪滯熱甚兼欲冷。豆粉人參冰片雄。辰砂白蔻元明粉。茯苓甘草乳香同。

琥珀蠶攀丸

此方治癰疽發背。瘡形已成。而膿未成之際。其人即不虛弱。恐毒氣不能外出。

致攻於裏。預服此丸。護膜護心。亦且活血解毒。

黃蠟一兩 白礬二兩 雄黃一錢 珀琥一錢另 硃砂一錢 白蜜二錢
二錢 二分 研極細 研細

右三四味。先研細末。另將蠟蜜。入銅杓內溶化。離火片時。候蠟四邊稍凝。方將藥味入內。攪勻共成一塊。將藥火上微烘。急作小丸。如綠豆大。硃砂爲衣。磁罐收貯。每服二三十丸。食後白湯送下。毒甚者。早晚服。其功最速。

(方歌) 珀琥蠟攀治癰毒。未出膿時平劑佳。預服護膜能解毒。蠟攀雄珀蜜硃砂。

護心散

此方治瘡毒內攻。口乾煩躁。惡心嘔吐者。服此藥護心解毒也。

菉豆粉一兩 乳香三錢 硃砂一錢 甘草一錢
淨末

右四味。研細末。每服二錢。白滾湯調服。早晚二次。

(方歌) 護心散治毒內攻。煩躁口乾嘔逆沖。豆粉乳香硃共草。二錢調下有神功。

透膿散

此方治癰疽諸毒。內膿已成。不穿破者。服之即潰破毒出。

生黃耆四錢

穿山甲一錢

川芎三錢

當歸二錢

皂角刺一錢
五分

右五味。水三鍾。煎一鍾。瘡在上。先飲酒一杯。後服藥。瘡在下。先服藥。後飲酒一杯。

〔方歌〕透膿散治膿已成。不能潰破劑之平。用此可代鍼瀉毒。角刺歸耆山甲芎。

託裏消毒散

此方治癰疽已成。內潰遲滯者。因血氣不足。不能助其腐化也。宜服此藥。託之令其速潰。則腐肉易脫而新肉自生矣。

皂角刺五分

銀花一錢

甘草五分

桔梗五分

白芷五分

川芎一錢

生黃耆一錢

當歸一錢

白芍一錢

白朮一錢

人參一錢

茯苓一錢

右十二味。水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕託裏消毒助氣血。補正脫腐肌易生。皂角銀花甘桔芷。芎耆歸芍朮參苓。

神功內托散

此方治癰疽腦頂諸發等瘡。日久不腫不高。不能腐潰。脈細身涼。宜服此溫補托

裏之劑。以助氣血也。

人參一錢

五分

附子一錢

製

川芎一錢

歸身一錢

黃耆一錢

白朮一錢

分土炒

白芍一錢

炒

木香五分

研

穿山甲八分

炒

甘草五分

炙

陳皮一錢

白茯苓一錢

右十二味。煨薑三片。大棗二枚。水二茶鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕神功內托陰毒證。不腫不高不潰疼。參附芎歸耆朮芍。木香山甲草陳苓。

復元通氣散

散。

此方治乳癰腹癰。便毒。耳痛耳聾等證。皆由毒氣滯塞不通故耳。服之則氣通毒

青皮四兩

陳皮四兩

栝蒌仁二兩

穿山甲二兩

金銀花二兩

連翹一兩

甘草二兩

半生半炙

右七味研末。每服二錢。黃酒調下。

〔方歌〕復元通氣乳腹癰。便毒兼治耳痛聾。青陳萸甲銀翹草。一服能致服毒氣通。

雙解貴金丸

此方治背疽諸毒初起。木悶堅硬。便秘。脈沉實者。悉效。隨證加藥。服法列後。

生大黃一兩 白芷十兩

右二味爲末。水丸。每服三五錢。五更時用連鬚葱大者三根。黃酒一碗。煮葱爛。取酒送藥。服畢蓋臥汗。過三二時。俟大便秘。一二次立效。(按)此宜通攻利之劑也。濟之以葱酒。力能發汗。故云雙解弱者隨用中劑。行後以四君子湯補之。老人虛人。每服一錢。用人參加生薑煎湯送下。過一時。再一服得睡。上半身得汗則已。

(方歌) 雙解貴金治諸毒。腫瘍初起木硬堅。大黃白芷爲丸。服葱酒煎送汗下痊。

黍米寸金丹

此方乃異人所傳。常有暴中急證。忽然卒倒者。撬開牙關。研灌三丸。其人

活。又能治發背癰疽。遍身癢腫。附骨癰疽等證也。凡初起憎寒壯熱。四肢倦怠。沉重者。不分表裏。幼輕重。並宜服之。

乳香

沒藥各一錢

狗膽一個

鯉魚膽三個

礪砂二錢

蟾酥一錢

狗寶一錢

麝香五分

白丁香四十個

蜈蚣全者七條酥炙

黃蠟三錢

烏金石一錢

頭胎男乳一合

輕粉一錢

雄黃一錢

水銀煉粉霜白色者三錢

右十六味爲細末。除黃蠟乳汁二味。熬成膏子。同藥和丸。如菘豆大。小兒用一丸大人三丸。重者五丸。冷病用葱湯。熱病用新汲水送下。衣被密蓋。勿令透風。汗出爲度。諸病如失。

〔方歌〕黍米寸金奇效方。癰疽發背服之良。乳香沒藥狗鯉膽。蟾蜍寶麝白丁香。蜈蚣黃蠟烏金石。男乳輕雄共粉霜。

麥靈丹

此丹能治癰疽惡毒。無名諸瘍。及疔瘡回裏。令人煩悶神昏。或婦人初發乳證。小兒痘疹餘毒。或腰腿暴痛等證。

鮮蟾酥一錢

活蜘蛛二十一箇黑

色大者佳

定心草一錢即兩

頭尖鼠糞

飛羅麵六兩

右四味。共研一處。用菊花熬成稀膏。和好搗爲麥子形。子大。每服七丸。重大者九丸。小兒輕證五

丸。在上俱用滾白水服。下用淡黃酒送服。每一料加麥子一合。收磁罐內。

〔方歌〕麥靈丹治惡疔毒。鮮蟾酥與活蜘蛛。定心草共飛羅麵。黃菊熬膏相合宜。

保安萬靈丹

此方治癰疽毒。對口發頤。風寒濕痺。濕痰流注。附骨陰疽。鶴膝風。及左癱右

癱。口眼歪斜。半身不遂。血氣凝滯。偏身走痛。步履艱辛。偏墜疝氣。偏正頭痛。破傷風牙關緊閉。截解

風寒。無不應效。

茅山蒼朮八兩

麻黃

羌活

荆芥

防風

細辛

川烏湯泡

去皮

草馬湯泡

去皮

川芎 石斛 全蠍 當歸 甘草 天麻 何首烏各一兩 雄黃六錢

右十六味。爲細末。煉蜜爲丸。重三錢。硃砂爲衣。磁罐收貯。視年歲老壯。病勢緩急。斟酌用之。如惡瘡初起。二三日間。或癰疽已成。至十日前後未出膿者。狀若傷寒頭痛煩渴拘急惡寒。肢體疼痛。惡心嘔吐。四肢沉重。恍惚悶亂。皮膚壯熱。及傷寒四時感冒。傳變疫證。惡寒身熱。俱宜服之用葱白九枝。煎湯調服一丸。蓋被出汗爲效。如汗遲以葱湯催之。其汗必出。如淋如洗。令其自收。不可露風患者自快。瘡未成者即消。已成者即高腫潰膿。如病無表裏相兼。不必發散。只用熱酒化服。又按此方原載諸風癱瘓門中。今移錄於此者。蓋瘡瘍皆起於榮衛不調。氣血凝滯。始生癰腫。此藥專能發散。又能順氣搜風。通行經絡。所謂結者開之也。經云汗之則瘡已。正與此相合也。服後當避風。忌冷物。戒房事。如婦人有孕者勿服。

〔方歌〕 萬靈丹治諸瘡病。此藥猶能治腫瘍。發表毒邪從汗解。通行經絡效非常。麻黃羌活荊防細。川草烏芎石斛蒼。全蠍當歸甘草等。天麻何首共雄黃。

腫瘍敷貼類方

凡腫瘍初起時。腫高赤痛者。宜敷涼藥。以寒勝熱也。然亦不可太過。過則毒爲寒凝。變爲陰證。如漫腫不紅。似有頭而不痛者。宜敷溫藥。乃引毒外發也。經云發表不遠熱。敷熱藥亦發表之意。凡調敷藥。須多攪。則藥稠結。敷後貼紙。必須撕斷。則不崩裂。不時用原汁潤之。蓋借濕以通竅。乾則藥氣不入。更

添拘急之苦矣。凡去敷藥必看毛孔有汗。意者爲血脈通。熱氣散也。反此者逆。

如意金黃散

此散治癰疽發背。諸般疔腫。跌撲損傷。濕痰流毒。大頭時腫。漆瘡火丹。風熱天

泡。肌膚赤腫。乾濕脚氣。婦女乳癰。小兒丹毒。凡一切諸般頑惡熱瘡。無不應效。誠瘡科之要藥也。

南星

陳皮

蒼朮各二

黃蘗五觔

薑黃五觔

甘草二觔

白芷五觔

上自天花粉十觔

厚朴二觔

大黃五觔

右十味。共爲咀片。曬乾磨三次。用細絹羅篩。貯磁罐。勿泄氣。凡遇紅赤腫痛。發熱未成膿者。及夏月時。俱用茶清同蜜調敷。如欲作膿者。用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭。皮色不變。濕痰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等證。俱用葱酒煎調敷。如風熱所生。皮膚亢熱。色亮遊走不定。俱用蜜水調敷。如天泡火丹。赤遊丹。黃水漆瘡。惡血攻注等證。俱用大藍根葉搗汁調敷。加蜜亦可湯潑火燒。皮膚破爛。麻油調敷。以上諸引調法。乃別寒熱溫涼之治法也。

〔方歌〕如意金黃敷陽毒。止痛消腫實良方。南陳蒼蘗薑黃草。白芷天花朴大黃。

五龍膏

此膏治癰疽陰陽等毒。腫痛未潰者。敷之即拔出膿毒。

五龍草

即烏蘇母。詳本草綱目。蔓草部俗。名五爪龍。江浙多產之。

金銀花

豨薟草

車前草

蓮根藥

陳小粉^{各等分}

右四味。俱用鮮草葉。一處搗爛。再加三年陳小粉。并飛鹽末二三分。共搗爲稠糊。徧敷瘡上。中留頂。用膏貼蓋。避風爲主。若冬月草無鮮者。預採蓄下。陰乾爲末。用陳米醋調敷。一如前法。并效如此方內五龍華。或缺少不便。倍加豨薟草亦效。

〔方歌〕五龍膏用拔膿毒。平劑五龍草銀花。豨草車前俱搗爛。小粉飛鹽攪糊搽。

四虎散

此散治癰疽腫硬。厚如牛領之皮。不作膿腐者。宜用此方。

草烏 狼毒 半夏 南星^{各等分}

右四味爲細末。用豬腦同搗。徧敷瘡上。留頂出氣。

〔方歌〕四虎散敷陰癰疽。頭腫不痛治之平。厚似牛皮難潰腐。草烏狼毒夏南星。

眞君妙貼散

此散治癰疽諸毒。頑硬惡瘡。散漫不作膿者。用此藥敷之。不痛者即痛。痛者即止。

如皮破血流。濕爛疼痛。天泡火丹。肺風酒刺等證。并用之皆效。

蕎麥麵^{五觔} 明淨硫黃^{十觔} 白麵^{五觔}

爲末

右三味。共一處。用清水微拌。乾濕得宜。趕成薄片。微晒。單紙包裹。風中陰乾。收用。臨時研末。新汲水調敷。如皮破血流。瀰滿者。用麻油調敷。天泡火丹酒刺者。用靛汁調擦并效。

〔方歌〕 眞苦妙啗硫二麵。水調頑硬不痛膿。油調濕瀰流血痛。靛汁泡丹酒刺風。

二青散

此散治一切陽毒紅腫。疼痛瘡癩等證。未成者即消。

青黛

黃蘗

白斂

白薇各一兩

青露三兩即芙蓉葉

白及

白芷

水龍骨

即多年船船舊油灰

白鮮皮各一兩

天花粉三兩

大黃四兩

朴硝一兩

右十二味。爲末。用醋蜜調敷。已成者留頂。未成者徧敷。

〔方歌〕 二青散用數陽毒。腫痛疔熟用之消。袋藥斂薇青露及。芷龍鮮粉大黃硝。

坎宮錠子

此錠子治熱毒腫痛。焮赤諸瘡。并搽痔瘡最效。

京墨 兩

胡黃連 二錢

熊膽 三錢

麝香 五分

兒茶 二錢

冰片 七分

牛黃 三分

右七味爲末。用豬膽汁爲君。加生薑汁大黃水。浸取汁。酸醋各少許。相和藥成錠。用涼水磨濃。以筆蘸塗之。

(方歌) 坎宮錠子最清涼。熱腫諸瘡并痔瘡。京墨胡連熊膽麝。兒茶冰片共牛黃。

離宮錠子

此錠子治疔毒腫毒。一切皮肉不變。漫腫無頭。搽之立效。

血竭三錢

硃砂二錢

膽礬三錢

京墨一兩

蟾酥三錢

麝香一錢

五分

右六味爲末。涼水調成錠。涼水磨濃塗之。

(方歌) 離宮錠治諸疔毒。漫腫無頭涼水塗。血竭硃砂爲細末。膽礬京墨麝蟾酥。

白錠子

此錠專敷初起諸毒。癰疽疔腫。流注瘰癧包惡毒。及耳痔耳批等證。

白降丹四錢即

白靈藥

銀麩二錢

寒水石二錢

人中白二錢

右四味。共爲細末。以白及麵打糊爲錠。大小因人。不可入口。每用以陳醋研敷患處。如乾再上。自能消毒。

(方歌) 白錠專敷初起毒。癰疽疔腫與瘰癧。降丹銀麩人中白。寒水白及醋研消。

蝌蚪拔毒散

此散治無名大毒。一切火毒瘡毒。敷之神效。

寒水石

研極細末

淨皮硝

研極細末

川大黃

各等分研極細末

蝦蟆子

初夏時河內有蝌蚪或羣大頭長尾者撈來收罐內泥封口埋至秋天化成水

右川蠟、水一大椀。入煎藥末。各二兩。陰乾再研勻。收磁罐內。每用時以水調塗患處。

〔方歌〕拔毒散治無名毒。火毒瘟毒俱可施。寒水消黃蠟蚌水。浸乾藥末水調之。

二味拔毒散 此散治風濕諸瘡。紅脹痛癢疥癬等疾甚效。

明雄黃

白礬各等分

右二味爲末。用茶清調化。鵝翎蘸掃患處。癢痛自止。紅腫即消。

〔方歌〕二味拔毒消紅腫。風濕諸瘡痛癢寧。一切肌膚疥癬疾。雄礬爲末用茶清。

回陽玉龍膏

此膏治癰疽陰瘡。不發熱。不發痛。不腫高。不作膿。及寒溼流注。冷痛痺風。脚

氣手足頑麻。筋骨疼痛。及一切皮色不變。漫腫無頂。鶴膝風等證。但無肌熱者。一概敷之。俱有功效。

軍薑三兩

炒

肉桂五錢

炒

赤芍三兩

炒

南星一兩

炒

草烏三兩

炒

白芷一兩

右六味。製畢共爲細末。熱酒調敷。

〔方歌〕回陽玉龍陰毒證。不熱不疼不腫高。軍薑桂芍星烏芷。研末須將熱酒調。

沖和膏

此膏治癰疽發背。陰陽不和。冷熱相擬者。宜用此膏敷之。能行氣疎風。活血定痛。散

瘰消腫。祛冷蟻堅。誠良藥也。

紫荊皮五兩

炒

獨活三兩

炒

白芷三兩

赤芍二兩

炒

石菖蒲一兩

五錢

右五味共爲細末。葱湯熱酒。俱可調敷。

(方歌) 沖和發背癰疽毒。冷熱相凝此藥敷。行氣疎風能活血。紫荊獨芷芍菖蒲。

鐵桶膏

此膏治發背將潰已潰時。根脚走散。瘡不收束者。宜用此藥圍敷。

膽礬三錢

銅絲五錢

麝香三分

白及五錢

輕粉二錢

鬱金二錢

五倍子一兩

微炒

明礬四錢

右八味。共爲極細末。用陳米醋一碗。杓內慢火熬至一小杯。候起金色黃泡爲度。待溫用藥末一錢。攪入

醋內。炖溫。用新筆塗於瘡根。周圍。以棉紙覆蓋藥上。瘡根自生繃紋。漸收漸緊。其毒不致散大矣。

(方歌) 鐵桶膏收毒散大。周圍敷上束瘡根。膽礬銅絲及輕粉。五倍明礬鬱金。

烏龍膏

此膏治一切諸毒。紅腫赤暈不消者。用此藥敷上。極有神效。

木鼈子二兩

去殼

草烏半兩

小粉四兩

半夏二兩

右四味於鐵鉢內。慢火炒焦黑色爲度。研細。以新汲水調敷。一日一換。自外向裏塗之。須留瘡頂。令出毒氣。

〔方歌〕烏龍膏用治諸毒。赤量能收治腫瘍。木鼈草烏小粉夏。涼水調敷功效良。

神效千槌膏

此膏專貼瘡瘍疔毒初起。貼之即消。治瘰癧連根拔出。大人瘰癧。小兒螻拱頭等證並

效。

土木鱉

五個
去殼

白嫩松香

四兩
揀淨

銅綠

一錢
研細

乳香

二錢
沒藥
二錢

蓖麻子

七錢
去殼

巴豆肉

五粒
杏仁
一錢
去皮

右八味。合一處。石臼內搗三千餘下。即成膏。取起浸涼水中。用時隨瘡大小。用手捻成薄片。貼瘡上用。絹蓋之。

〔方歌〕千槌膏貼諸疔毒。瘰癧腫瘡螻拱頭。木頭松香銅乳沒。蓖麻巴豆杏仁投。

馬齒莧膏

馬齒莧性味清涼。能解諸毒。今用其一味。或服或敷。甚有功效。所治諸證列後。

一治楊梅偏身如癩。喉硬如管者。取莧梳粗一握。酒水煎服出汗。一治發背諸毒。用莧一握。酒煎或水煮。冷服出汗。再服退熱去腐。三服即愈。并杵莧敷之。一治多年頑瘡腫瘡。痛疼不收口者。杵莧

數之。取蠶。一日一換。三日後腐肉已盡。紅肉如珠時。換生肌藥收口。
一治婦人臍下生瘡。痛癢連及二陰者。用芎四兩。青黛二兩。研勻敷之。
一治濕癬白禿。取石灰末炒紅。用芎汁熬膏。調勻塗之。
一治丹毒加藍靛根。和搗敷之。
〔方歌〕馬齒莧膏只一味。楊梅發背服敷之。頑瘡面腫搗汁用。婦女陰瘡共黛施。濕癬白禿如灰末。丹毒藍根相和宜。

潰瘍主治類方

四君子湯

人參

茯苓

白朮各二錢

甘草一錢

右四味。薑三片。棗二枚。水煎服。

四物湯

川芎一錢

當歸三錢

酒洗

白芍二錢

地黃三錢

右四味。水煎服。

八珍湯

人參一錢

茯苓一錢

白朮一錢

五分

甘草五分

川芎一錢

當歸一錢

白芍一錢

地黃一錢

炒

炙

右八味。水煎服。

十全大補湯

於八珍湯內。加黃耆肉桂。水煎服。

人參養榮湯

於十全大補湯內。去川芎。加陳皮遠志五味子水煎服。

內補黃耆湯

於十全大補湯內。去白朮。加遠志麥門冬。水煎服。

〔按〕四君子湯。補氣不足者也。四物湯補血不足者也。八珍湯。雙補血氣不足者也。十全大補湯。大補血氣諸不足者也。人參養榮湯。去川芎者。因面黃血少。加陳皮以行氣之滯。五味子以收斂氣血。遠志以生心血也。內補黃耆湯。治潰瘍口乾。去白朮者。避其燥能亡津也。加遠志麥冬者。以生血生津也。如痛者。加乳香沒藥以定痛。硬者。加穿山甲皂角刺以消硬也。以上諸方。凡癰疽潰後諸虛者。悉準於此。當隨證酌用之。

〔方歌〕四君參苓白朮草。四物芎歸芍地黃。二方雙補八珍是。更加耆桂十補湯。榮去芎加陳遠味。內去朮加遠冬良。痛甚乳沒硬穿皂。潰後諸虛斟酌方。

異功散

人參二錢

白朮二錢

茯苓一錢

甘草五分

陳皮五分

土炒

炙

石五味。薑三片。棗二枚。水煎服。

理中湯

人參二錢

白朮二錢

土炒

乾薑一錢

甘草五分

炙

右四味。水煎服。

六君子湯

人參二錢

白朮二錢

土炒

茯苓二錢

甘草一錢

炙

陳皮一錢

半夏一錢五

分製

右六味。薑三片。棗二枚。水煎服。

香砂六君子湯

人參一錢

白朮二錢

土炒

茯苓一錢

甘草五分

炙

藿香一錢或

木香

陳皮一錢

半夏一錢五

分製

砂仁五分

右八味。薑三片。水煎服。

(按)四君子湯加陳皮。名異功散。潰後脾虛氣滯者宜之。四君子湯減茯苓。加乾薑。名理中湯。潰後脾虛寒滯者宜之。蓋氣虛則陽虛。陽虛生寒。故於補氣藥中。加溫熱之味也。四君子湯加陳皮半夏。名六君子湯。潰後氣虛有痰者宜之。六君子湯加藿香或木香砂仁。名香砂六君子湯。潰後胃虛欲嘔吐者宜之。無痰

飲氣虛。嘔逆甚者。加丁香沉香。潰後氣虛。有寒。加肉桂附子。潰後瀉者。加訶子肉豆蔻。腸滑不固加

薑粟殼。食少咳嗽者。加桔梗麥冬五味子。渴者加乾葛。傷食脾胃虛弱。加山查神麴穀芽或麥芽此皆潰後氣不足者。以四君子湯爲主。隨證加減也。

〔方歌〕四君加陳異功散。理中減苓加乾薑。有痰陳半六君子。嘔吐砂仁木藿香。逆加丁沉香桂附。瀉加訶薏粟滑腸。咳桔冬味渴加葛。傷食查麴穀麥良。

托裏定痛湯

於四物湯內。加肉桂乳香沒藥粟殼。水煎服。

聖愈湯

於四物湯內。加柴胡人參黃耆。水煎服。

柴胡四物湯

於四物湯內。加柴胡人參黃芩半夏甘草。水煎服。

地骨皮飲

於四物湯內。加丹皮地骨皮。

知藥四物湯

於四物湯內。加知母黃蘗。

三黃四物湯

於四物湯內。加黃連黃芩黃蘗。

〔按〕托裏定痛湯。潰後血虛疼痛者宜之。聖愈湯。潰後血虛。內熱心煩氣少者宜之。柴胡四物湯。潰後血

虛有寒熱者宜之。地骨皮飲。潰後不寒者宜之。知藥四物湯。潰後五臟陰火骨蒸者宜之。三黃四物湯。潰後六腑陽火煩熱者宜之。蓋血虛則陰虛。陰虛生熱。故補血藥中。多加寒涼之味也。此皆潰後血不足者。以四物湯爲主。隨證加減也。

(方歌) 四物加桂乳沒粟。托裏定痛功效奇。聖愈四物參耆入。血虛血熱最相宜。血虛寒熱小柴合。惟熱而丹地骨皮。陽火煩熱三黃合。陰火骨蒸加藥知。

補中益氣湯

補中益氣湯。治瘡瘍元氣不足。四肢倦怠。口乾時熱。飲食無味。脈洪大無力。心煩

氣怯者。俱宜服之。

人參一錢

當歸一錢

生黃耆二錢

白朮一錢

升麻三分

柴胡三分

甘草一錢

麥冬一錢

五味子五分

陳皮五分

右十味。水二鍾。薑三片。棗二枚。煎一鍾。空心熱服。

人參黃耆湯

治潰瘍虛不睡。少食。或寒濕相凝作痛者效。卽前方去柴胡。加神麴五分炒。朮

五分炒黃藥五分炒。

(方歌) 補中益氣加麥味。潰後見證同內傷。參耆歸朮升柴草。麥味陳皮引薑薑。人參黃耆寒濕熱。加麴

藥減柴方。

獨參湯

此湯治潰瘍膿水出多。元氣虛餒。外無邪氣。自汗脈虛者宜服之。

人參二兩

右一味。水二鍾。棗十枚。或蓮肉元眼肉。煎好徐徐服之。若煎至稠厚即成膏矣。作三次用醇酒熱化服之亦可。

(方歌) 膿水過多元氣餒。不生他恙獨參宜。徐徐代飲無窮妙。棗蓮元肉共煎之。

溫胃飲

此湯治癰疽。脾胃虛弱。或內傷生冷。外感寒邪。致生呃逆。中脘疼痛。嘔吐清水等

證。宜急服之。

人參一錢

白朮二錢

乾薑一錢

甘草一錢

丁香五分

沉香一錢

柿蒂十四

吳萸七分

附子一錢

酒洗

右九味。水三鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

(方歌) 溫胃飲治寒呃逆。內傷外感邪寒生。理中加丁沉柿蒂。寒盛吳萸附子寧。

橘皮竹茹湯

此湯治潰瘍。胃火上逆氣衝。以致時時呃逆。身熱煩渴。口乾唇焦。此熱呃也。服之有效。

橘紅三錢 竹茹三錢 生薑一錢 柿蒂七個 人參一錢 黃連一錢

右六味。水二鍾。煎八分。空心溫服。

(方歌) 橘皮竹茹熟呃逆。胃火氣逆上衝行。橘紅竹茹薑柿蒂。虛加參補熱連清。

胃愛丸

此丸治潰瘍。脾胃虛弱。諸味不喜者。宜服此丸。助脾氣。開胃口。而飲食自進矣。

人參一兩

山藥一兩肥大上白者切片

建蓮肉五錢

白豆蔻三錢

男乳拌令透晒後微焙

去皮心

小紫蘇五錢蜜拌晒乾微蒸

陳皮六錢用老陳米先炒黃色方入同炒微燥勿焦

雲片白朮一兩鮮白者米泔浸去澀

片時連梗葉切片

水切片晒乾同麥芽拌炒

甘草三錢

上白茯苓一兩切一分厚咀片用砂仁二錢同茯苓各碗內飯上蒸熟

右九味。共爲細末。用老米二合。微焙碾粉。泡荷葉。熬湯打糊。丸梧桐子大。每服八十丸。清米湯送

下。不拘時服。

〔方歌〕不思飲食宜胃愛。開胃扶脾效若仙。具功由藥確梗葉。建蓮白寇米糊丸。

清震湯

治潰瘍。脾腎虛弱。或誤傷生冷。或氣惱勞役。或病後入房太早。以致寒邪乘入中脘。

乃生啞逆急服之。

人參

益智仁

半夏

各一錢製

澤瀉三分

香附

陳皮

白茯苓各一錢

附子一錢製

炙甘草一錢

柿蒂二十個

水煎服。

〔方歌〕清震湯治腎家寒。人參益智半夏攪。澤瀉香附陳茯苓。附子甘草柿蒂煎。

二神丸

此丸治癰疽。脾腎虛弱。飲食不消。黎明溏瀉者。服之有效。

肉果二兩搗裏煨肥

補骨脂四兩微炒香

大者搗去油

炒香

右二味。共爲細末。用大棗四十九枚。老生薑四兩切片。水浸薑棗。煮至水乾爲度。取棗肉爲丸。桐子大。每夜半。用清米湯送下七十九丸。治腎瀉脾瀉甚效。

〔方歌〕二神丸治脾腎弱。飲食不化瀉氣明。肉果補脾骨脂腎。生薑煮棗肉丸成。

加味地黃丸

此丸治癰疽已潰。虛火上炎。口乾作渴者。宜服之。

熟地

八兩酒蒸搗膏

山藥四兩

炒

山萸肉五兩

去核

白茯苓四兩

牡丹皮

四兩酒洗

澤瀉三兩

蒸

肉桂六錢

五味子三兩

炒

右八味。共爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服二錢。空心鹽湯送下。

〔方歌〕 加味地黃勞傷腎。水衰津少渴良方。山萸山藥丹苓澤。肉桂五味熟地黃。

參朮膏

武膏治癰疽發背等證。大潰膿血之後。血氣大虛。急宜用此補之。

人參

半兩切片用水五六碗。沙鍋慢火熬至三碗將渣再煎汁一碗共用蜜絹濾淨復熬稠厚磁碗內收听用

雲片白朮六兩

懷慶熟地六兩俱熬同上法

以上三膏。各熬完畢。各用磁罐盛之。入水中待冷。取起密蓋勿令泄氣。如患者精神短少。懶於言動。氣自汗者。以人參膏三匙。白朮膏二匙。地黃膏一匙。俱用無灰好酒一杯。炖熟化服。如脾虛弱。飲食少。或食不知味。或已食不化者。用白朮膏三匙。人參膏二匙。地黃膏一匙。熱酒化服。如腰膝痠軟。脚無力。皮膚枯槁者。用地黃膏三匙。參朮膏各二匙。化服。如氣血脾胃相弱。無偏勝者。三膏每各匙。熱酒化服。此膏用於清晨及臨睡時。各進一次。自然強健精神。頓生氣血。新肉易長。瘡口易合。

切瘡形危陽。勢大膿多者。服之自無變證也。夏天炎熱。恐膏易變。令作二次熬用亦好。愈後常服。能鬚髮變黑。返老還童。以上諸方。功難及此。

〔方歌〕參朮膏治大膿後。血氣雙補此方宗。人參朮同熟地。熬成膏服有奇功。

八仙糕

此糕治癰疽。脾胃虛弱。食少嘔泄精神短少。飲食無味。食不作飢。及平常無病久病者服之。能健脾胃。

山藥六兩 人參六兩 粳米七升 糯米七升 白蜜一匊 白糖霜二兩

半

蓮肉六兩 芡實六兩 白茯苓六兩

右將山藥、人參、蓮肉、芡實、茯苓五味。各爲細末。再將粳糯米爲粉。與上藥末和勻。將白糖入蜜湯中。隨將粉藥乘熱和勻。攤鋪籠內。切成條。蒸熟。火上烘乾。磁器收貯。每日清早白湯泡數條。或乾用亦可。飢時隨用。服至百日。啓脾壯胃。功難筆述。

〔方歌〕八仙糕用健脾胃。食少嘔泄服之靈。山藥人參粳糯米。蜜糖蓮芡白雲苓。

洗滌類方

洗有蕩滌之功。滌洗則氣血自然舒暢。其毒易於潰腐。而無壅滯也。凡腫在四肢者。湯潰之。在腰腹脊背

者淋之。在下部者浴之。俱以布帛或棉蘸洗。稍溫即易。輕者日洗一次。重者日夜洗二次。每日洗之。可間斷。凡洗時冬月要猛火以逼寒氣。夏月要明窗以避風涼。若不慎此。輕則有妨收口。重則恐變純陰。夫洗藥不一。如初腫與將潰者。俱用葱歸湯腫湯燙洗。如陰證不起者。俱用艾茸湯敷法。如潰後俱用豬湯燙洗。用豬蹄湯者。以助肉之氣而逐腐也。此滌洗之法。乃瘍科之要藥也。

葱歸湯腫湯

此湯治癰疽疔瘡。初腫將潰之時。用此湯洗之。以瘡內熱癢爲度。

獨活三錢

白芷三錢

蔥頭七個

當歸三錢

甘草三錢

右五味。以水三大椀。煎至湯醇。濾去渣。以絹帛蘸湯熱洗。如溫再易之。

〔方歌〕葱歸湯腫洗諸毒。初起將潰用之宜。洗至熱癢斯爲度。獨芷葱歸甘草俱。

艾茸敷法

此膏治陰疔黑陷而不痛者。用之爲良。以知痛則生。不知痛出紫血者死。然必內服。

大補回陽之劑以助之。

硫黃五錢

雄黃五錢

艾茸一兩

右以硫雄二味爲末。同艾入水煎半日。水將乾取艾出。搗爛溫敷患處。再煎再易。十餘次爲度。

〔方歌〕艾茸法治陰疔。黑陷不痛用之良。石硫黃雄同艾煮。搗成膏敷定能康。

猪蹄湯

此湯治癰疽諸毒流膿者。熬好洗之。以助肉氣。消腫散風。脫腐止痛。去惡肉。活死肌。潤瘡口。如腐盡者。不必用之。當以米泔水熱洗之。令瘡潔淨。不可過洗。過洗則傷水。皮膚破爛。難生肌肉斂口矣。

黃芩

甘草

當歸

赤芍

白芷

蜂房

羌活各等分

右七味。共爲粗末。看證之大小。定藥之多少。先將豬蹄前蹄一隻水六碗。煮蹄軟爲度。將汁濾清。吹去汁上油花。卽用粗藥末一兩。投內汁中。再用微火煎十數沸。濾去渣。候湯微溫。卽用方盤一個。韋身於瘡下放定。隨用軟絹蘸湯淋洗瘡上。并入孔內。輕手捺盡內膿。庶敗腐宿膿。隨湯而出。以淨爲度。再以絹帛疊七八重。蘸湯勿令大乾。覆於瘡上。兩手輕按片時。帛溫再換。如此再按四五次。可以洗通血氣。輕毒止痛去瘀也。洗訖用絹帛挹乾。卽隨證以應用之藥貼之。

(方歌) 猪蹄湯治癰疽毒。已潰流膿用此方。消腫散風能止痛。芩甘歸芍芷蜂羌。

膏藥類方

萬應膏

此膏治一切癰疽發背。對口諸瘡。按該流注等毒。貼之甚效。

川烏 草烏 生地 白斂 白及 象皮

官桂 白芷 當歸 赤芍 羌活 苦參

土木鱉 穿山甲 烏藥 甘草 獨活 元參

定粉 大黃各五錢

右十九味。定粉在外。用淨香油五觔。將藥浸入油內。春五夏三。秋七冬十。候日數已足。入潔淨大鍋內。慢火熬至藥枯。浮起爲度。住火片時。用布袋濾去渣。將油稱準。每油一觔。對定粉半觔。用桃柳枝不時擾之。以黑如漆。亮如鏡爲度。滴入水內成珠。簿紙攤貼。

(方歌) 萬應膏用貼諸毒。發背癰疽對口瘡。川草烏同地斂及。象皮桂芷芍歸羌。苦參木鱉穿烏藥。甘獨元參定粉黃。

紺珠膏 此膏治一切癰疽腫毒。流注頑腫。風寒濕痺。癩癰乳癰。痰核血風等瘡。及頭痛牙疼。

腰腿痛等證悉驗。

製麻油四兩 製松香一觔

右將麻油煎滾。入松香文火溶化。柳枝攪化盡。離火下細藥末二兩三錢。攪勻即傾於水內。拔扯數十次。易水浸之聽用。

一瘰血腫毒瘰癧等證。但未破者。再加魏香散。隨膏之大小。患之輕重。每加半分至三二分爲淬。一毒深膿不盡。及頑瘡對口等證。雖潰必用此膏獲效。一未破者貼之勿揭。揭則作癢。痛亦勿揭。能速於成

膿。患在平處者用紙攤貼。患在灣曲轉動處者。用絹帛攤貼。一臙瘡及臀腿寒濕等瘡。先用茶清入白麪少許。洗淨貼之見效。一頭痛貼太陽穴。牙痛塞牙縫內。一內癰等證。作丸用蛤粉爲衣服下。

一便毒瘰核。多加魏香散。如臙瘡再加銅青。如疔拱頭癰毒貼之亦效。

製油法

每麻油一觔。用當歸、木鱉子肉、知母、細辛、白芷、巴豆肉、文蛤打碎、山茨菇打碎、紅茅大戟、續斷各一兩。槐柳枝各二十八寸。入油鍋內浸二十一日。煎枯去渣。取油聽用。香朝鮮琥珀膏。多續續子。此方宜加之。

製松香法

擇片子淨嫩松香爲末。十觔。取槐柳桃桑芙蓉等五樣枝合五觔。剉碎。用大鍋水煎濃汁。濾淨再煮一次。各收之。各分五分。每用。初次汁一分煎滾。入松香末二觔。以柳槐枝攪之。煎至松香沉下水底爲度。即傾入二次汁內。乘熱拔扯數十次。以不斷爲佳。候溫作餅收之。餘香如法。

膏內細藥方

乳香

沒藥各五分

明雄黃四錢

血竭五錢

麝香一錢 輕粉二錢

右爲細末。加入膏內。

魏香散

乳香

沒藥

血竭各等分

阿魏

麝香各減半

爲末。罐收聽用。

(方歌) 紺珠膏貼癰疽毒。流注頭腫濕痺名。瘰癧乳癰痰核塊。血風頭痛及牙疼。松香化入麻油內。乳沒雄黃竭麝輕。隨證更加魏香散。麝香竭乳沒并。

陀僧膏

此膏專貼諸般惡瘡。流注瘰癧。跌撲損破。金刃誤傷等證用之有救。

南陀僧二十兩

研末

赤芍二兩

全當歸二兩

乳香五錢去油研

沒藥五錢去油研

赤石脂二兩

研

苦參四兩

百草霜二兩

篩研

銀朮一兩

桐油二觔

香油二觔

血竭五錢

研

孩兒茶五錢

研

川大黃半觔

右藥。先將赤芍、當歸、苦參、大黃。入油內燻枯。熬至滴水不散。再下陀僧末。用槐柳枝攪至滴水將欲成珠。將百草霜細篩入。攪勻。再將羣藥及銀黝篩入。攪極勻。傾入水盆內。衆手扯千餘下。再收入磁盆內。常以水浸之。

〔方歌〕陀僧膏貼諸惡瘡。流注癰癤跌撲傷。陀僧赤芍歸乳沒。赤脂苦參百草霜。銀黝油香油共。血竭兒茶川大黃。

巴膏方

此膏貼一切癰疽發背惡瘡。化腐生肌甚效。

象皮六錢

穿山甲六錢

山梔子八十

人頭髮二兩

血竭一錢另研

兒茶二錢另研
極細末

礞砂二錢另研
極細末

黃丹飛

香油

桑槐桃柳杏枝各五寸

右將桑槐桃柳杏五枝。用香油四觔。將五枝燻枯。撈出。次入象皮、穿山甲、人頭髮燻化。再入山梔子、礞砂。用絹將藥注瀝去。將油復入鍋內煎滾。離火少頃。每油一觔。入黃丹六兩。攪勻。用慢火熬至滴水成珠。將鍋取起。再入血竭、兒茶、礞砂等末。攪融。用涼水一盆。將膏藥傾入水內。用手扯藥千餘遍。換水數次。拔去火氣。磁罐收貯。用時不宜見火。須以銀杓盛之。重湯炖化。薄紙攤貼。

亞聖膏

此膏治一切破爛諸瘡。並楊梅結毒。貼之甚效。

象皮一兩

驢甲一塊

即懸蹄

雞子清三個

木鱉子七個

蛇蛻二錢

蟬蛻四錢

血餘三錢

穿山甲六錢

槐枝

榆枝

艾枝

柳枝

桑枝各二十

一寸

黃丹

黃蠟

麻油三匁

右將藥浸七日。煎如常法。濾去渣。每淨油一匁。入黃丹七兩。煎成膏。入黃臘五錢化勻。再加血竭五錢。兒茶三錢。乳香三錢。沒藥三錢。煨牡蠣五錢。五靈脂五錢。右五味研極細末。入膏內成膏。出火攤貼。

〔方歌〕 亞聖膏治破爛瘡。楊梅結毒貼之良。象驢雞鱉蛇蟬蛻。血甲槐榆艾柳桑。丹臘麻油勻化後。竭茶乳沒蠟靈糞。

絳珠膏

此膏治潰瘍諸毒。用之去腐定痛生肌甚效。

天麻子肉八十

粒

雞子黃十個

麻油十兩

血餘五錢

黃丹

五兩水飛

白蠟三兩

血竭三錢

硃砂三錢

輕粉三錢

乳香三錢

沒藥三錢

兒茶三錢 冰片一錢 麝香五分 珍珠三錢

右將麻油燻血塗至焦枯。加麻子肉。雞子黃再燻枯。去渣。入蠟候化。離火少時。入黃丹攪勻。再加細藥和勻。取用攤貼。

(方歌) 絳珠化腐生肌。麻肉雞黃油血塗。丹蠟竭砂輕乳沒。兒茶冰脂共珍珠。研細和勻隨證用。乳巖須要人銀朱。乳岩巖加銀朱一兩。

絳紅膏 此膏治一切腫毒已成。疼痛不消者。貼之悉效。

銀朱五錢 右一味爲細末以生桐油調攤如膏。先用神燈照。後貼此膏。

(方歌) 絳紅膏治毒已成腫痛難消用最靈。一味銀朱爲細末。桐油調和貼之平。

加味太乙膏 此膏治發背癰疽。及一切惡瘡。濕癢流注。風濕偏身。筋骨走注作痛。湯燙火

燒刀傷慘毒。五損內癰。七湯外證。俱貼患處。又男子遺精。女人白帶。俱貼臍下。臍旁腸癰。亦可丸服。諸般瘡癰。血風癩癢。諸藥不止。痛養者並效。

白芷 當歸 赤芍 元參各一兩
柳枝 槐枝各一百寸
肉桂二兩 沒藥三錢

大黃二兩

木鱉二兩

輕粉四錢研
不見星

生地二兩

阿魏三錢

黃丹四兩
水飛

乳香五錢

血餘一兩

右將白芷、當歸、赤芍、元參、肉桂、大黃、木鱉、生地八味。併槐柳枝用真麻油稱足五兩。將藥浸入油內。春五夏三。秋七冬十。入大鍋內。慢火熬至藥枯。浮起為度。住火片時。用布袋濾淨藥渣將油稱準。用細舊絹將油又濾入鍋內。要清淨為佳。將血餘投入。慢火熬至血餘浮起。以柳枝挑看。似膏溶化之象。方算熬熟。淨油一兩。將飛過黃丹六兩五錢。徐徐投入。火加大些。夏秋尤熱。每油一斤。加丹五錢。不住手攪候鍋內先發青煙。後至白煙疊疊。旋起氣味香馥者。其膏已成。即便住火將膏滴入水中。試軟硬得中。如老加熱油。如稀加炒丹。每各少許。漸漸加火。務要冬夏老嫩得所為佳。候煙盡撥下鍋來。方下阿魏切成薄片。散於膏上。化盡。次下乳沒輕粉攪勻傾入水中。以柳棍攪成一塊。再換冷水。浸片時乘溫每膏半斤。扯拔百轉成塊又換冷水浸。隨用時每取一塊。銅杓內復化隨便攤貼至妙。

〔方歌〕太乙膏治諸般毒。一切瘡傷俱貼之。白芷當歸赤芍藥。元參桂沒柳槐枝。大黃木鱉輕生地。阿魏黃丹乳血餘。

白膏藥

此膏專貼諸瘡腫毒。潰破流膿甚效。

淨巴豆肉十二兩

兩

蓖麻子十二兩

去殼

香油三兩

蝦蟇五個各師

人髮一兩

活鯽魚十尾

先將巴豆肉蓖麻子入油內浸三日。再將蝦蟇浸一宿。臨煎時入活鮑魚。共燻焦去渣淨。慢火熬油滴水成珠。離火傾於淨鍋內。再加官粉二斤半。乳香末五錢。不時攪之。冷定爲度。用時重湯炖化。薄紙攤貼。

〔方歌〕白膏專貼諸瘡毒。巴豆蓖麻浸入油。活鮑蝦蟇同燻後。再將官粉乳香投。

化腐紫霞膏

此膏善能穿透諸毒。凡發背已成。瘻肉不腐。及不作膿者。用此膏以腐爛瘻肉。

穿潰膿毒。其功甚效。

金頂砒五分

潮腦一錢

螺獅肉二兩用肉

輕粉三錢

血竭二錢

巴豆仁五錢研

用白仁

右各爲末。共碾一處。磁罐收貯。臨用時用麻油調搽。頑硬肉上。以棉紙蓋上。或膏貼俱可。

〔方歌〕化腐紫霞膏穿毒。透膿化腐效如神。金砒潮腦螺獅肉。粉竭麻仁巴豆仁。

貝葉膏

此膏貼癰疽發背。一切潰爛諸瘡。

麻油一觔

血餘雞子大

白蠟二兩

一個

右將血餘。以文火燻化去渣。下火入白蠟溶化。候溫用棉紙剪塊三張。張張於油壺內蘸之。貼於磁器幫上。用時揭單張貼患處。日換八九次。力能定痛去腐生肌。其功甚速。切勿忽之。

〔方歌〕貝葉膏治潰爛瘡。去腐生肌功效強。血餘麻油煎流去。下火入燻化貼良。

螺碧膏

此膏治下部濕瘡疥癬。并結毒瘰癧。

松香

取嫩白者佳。爲末篩過。用銅盆以豬油遍搽之。入水至滾。入香不住手攪之。以香沉底爲度。即傾取水中拔扯百十次以不斷爲度。

右將麻油煎滴水成珠。入松香一片。文火溶化。看老嫩。取起離火住滾。徐徐入糠青膽礬各淨末五錢。以柳枝左攪勻爲度。如老加熟豬油二三錢。用綠紙薄攤貼之。

(方歌) 碧螺膏治疥濕瘡。豬脂麻油嫩松香。再入糠青膽礬末。綠紙薄攤效非常。

麻藥類方

瓊酥散

此散治一切腫毒等瘡。服之開錢不痛。

蟾酥一錢

半夏六分

鬧羊花六分

胡椒一錢

八分

川椒一錢

八分

葶芩一錢

川烏一錢

八分

右七味。共爲細末。每服半分。黃酒調服。如欲大開。加白酒藥一丸。

(方歌) 瓊酥散是磨人藥。開錢不痛用蟾酥。葶芩鬧羊生半夏。胡椒川椒與川烏。

整骨麻藥

此藥開取筋頭。服之不痛。

麻黃 胡茄子 薑黃 川烏 草烏各等分 鬧羊花倍用

右六味。共爲末。每服五分。茶酒任下欲解。用甘草煎湯服之即甦。

〔方歌〕整骨麻藥。取箭頭。不傷筋骨可無憂。麻黃薑黃胡茄子。川草烏與鬧羊投。

外敷麻藥

此藥敷於毒上。麻木任割不痛。

川烏尖 五錢

草烏尖 五錢

蟾酥 四錢

胡椒 一兩

生南星 五錢

生半夏 五錢

一方加萆薢 五錢 一方加細辛 一兩

右爲末。用澆酒調敷。

〔方歌〕外敷麻藥調澆酒。刀割不痛效最神。川草烏蟾椒星夏。一加萆薢一加辛。

去腐類方

腐者。壞肉也。諸書云。腐不去。則新肉不生。蓋以腐能浸淫好肉也。當速去之。如遇氣實之人。則用刀割之取效。狀遇氣虛之人。則報恃藥力以化之。蓋去腐之藥。乃瘍科之要藥也。

白降丹

此丹治癰疽發背。一切疔毒。用少許。瘡大者用五六厘。瘡小者用一二厘。水調敷瘡頭。

上。初起者立刻起。消散。成膿者即潰。腐者即脫腫。誠奪命之靈丹也。

硃砂

雄黃各二錢

水銀一兩

礬砂五錢

火硝

食鹽

皂礬

皂礬各一兩

五錢

先將硃雄礬三味。研細。入鹽礬硝皂水銀共研勻。以水銀不見星爲度。用陽城罐一個。放微炭火上。徐徐起藥入罐。化盡。微火逼令乾。取起。如火太乾。則未走。如不乾。則藥倒下無用。其難處在此。再出一陽城罐合上。用棉紙截半寸寬。將罐子泥草灰光粉三樣研細。以鹽滴瀟汁調極濕。一層泥。一層紙糊合口四五重。及糊有藥罐上二三重。地下挖一小潭。用破碗盛水放潭底。將無藥罐放於碗內。以瓦挨潭口四邊齊地。恐炭灰落碗內也。有藥罐上以生炭火蓋之。不可有空處。約三炷香。去火冷定開看。約有一兩外藥矣。煉時罐上如有綠煙起。急用筆蘸罐子鹽泥固之。

紅升丹

此丹治一切瘡瘍潰後。拔毒去腐。生肌長肉。瘡口堅硬。肉黯紫黑。用丹少許。雞翎掃上立刻紅活。瘍醫若無紅白二丹。決難立刻取效。

硃砂五錢

雄黃五錢

水銀一兩

火硝四兩

白礬四錢

皂礬六錢

先將二礬火硝研碎入大銅杓內。加火酒一小杯炖化。一乾即起研細。另將朱砂雄礬研細。至不見星爲度。元。再入礬礬末研勻。將陽城罐用紙筋泥塘一指厚。陰乾。常輕輕撲之。不使生裂紋。塘泥罐子泥亦可用。如有裂紋。以罐子泥補之。極乾再晒。無裂紋方可。入前藥在內。罐口以鐵油密蓋定。加鐵梁盡。上下用鐵

錫鐵絲紮緊。用棉紙擦條薰蜜。周圍塞罐口縫間。外用熟石膏圍束。醋調封固。罐上加炭火二塊。使盡熱。罐口封固易乾也。用大釘三根。釘地下。將罐子放釘上。罐底下置堅大炭火一塊。外砌百眼爐。升三炷香。第一炷香用底火。如火大則汞先飛上。二炷香用大半罐火。以筆蘸水擦盡。第三炷香火平罐口。用扇搨之。頻頻擦盡。勿令乾。乾則汞先飛上。三香完。去火冷定開看。方氣足。盡上約有六七錢。刮下研極細。磁罐盛用。再預以鹽滴汁調罐子稀泥。綠筆蘸泥水掃罐口周圍。勿令洩氣。蓋恐有綠煙起汞走也。綠煙一起即無用矣。

(方歌) 白降丹爲奪命丹。拔膿化腐立時安。硃雄汞與礬砂入。還有硝鹽白皂礬。若去礬鹽紅升是。長肉生肌自不難。

元珠膏 此膏治腫瘍將潰。塗之膿從毛孔吸出。已開鍼者。用搨蘸送孔內。呼膿腐不淨。塗之立化。

木鱉子肉十四個 蟹螯八十個 柳枝四十九寸 驢甲片三錢 草烏一錢 麻油二兩

右藥浸七日。文火燥枯。去渣入巴豆仁三個。煎至黑。傾於鉢內。研如泥。加麝香一分。攪勻入罐內收用。

(方歌) 呼膿化腐用元珠。木鱉蟹螯共柳枝。驢甲草烏油內浸。燥枯巴豆麝香施。

生肌類方

凡大毒潰爛。內毒未盡。若驟用生肌則外實內潰。重者逼毒內攻。輕者反增潰爛。雖即收口。其於旁處。生大疽。是知毒未盡。不可驟用生肌藥也。只以貝葉膏貼之。頻換。俟生肉珠時。方用生肌藥。如元氣者。須當大補。以培元氣。

生肌定痛散

此散治潰爛紅熱。腫痛有腐者。用此化腐定痛生肌。

生石膏一兩為末用甘

草湯飛五七次

辰砂三錢

冰片二分

硼砂五錢

右四味。共為末。撒患處。

〔方歌〕生肌定痛治潰爛。腫疼紅熱實相宜。石膏飛過辰砂用。共入冰硼細撒之。

輕乳生肌散

此散治潰爛紅熱。腫痛腐脫者。用此定痛生肌。

石膏一兩

煨

血竭五錢

乳香五錢

輕粉五錢

冰片一錢

有水

加龍骨白芷各一錢

不收口 加雞內金一錢

炙

右為末撒之。

〔方歌〕輕乳生肌治腐脫。石膏血竭乳輕冰。若然有水加龍芷。收口須添雞內金。

薑藥散

此散治一切諸瘡發癢者。用此撒之甚效。

枯礬

乾薑

右等分爲末。先用細茶食鹽。煎湯洗之。後用此散撒之。冷瘡不收口者。用乾薑一味爲末。撒患處。覺熱如烘。生肌甚效。

(方歌) 薑藥最治諸瘡癢。先用鹽茶煎洗之。若是冷瘡不收口。乾薑一味撒生肌。

腐盡生肌散

此散治一切癰疽等毒。諸瘡破爛不斂者。撒上即愈。

兒茶

乳香

沒藥各三錢

冰片一錢

麝香二分

血竭三錢

旱三七三錢

右爲末撒之。

有水加龍骨一錢

欲速收口

加珍珠一兩

蟹黃二錢法取團臍蟹蒸
熟取黃晒乾取用

或用豬脂油半觔
去渣

加黃蠟一兩

溶化傾碗內。稍溫加前七味。調成膏。攤貼癰疽破爛等證。若杖傷則旱三七倍之。一用鮮鹿腿骨。紙包
夾內煨之。以黃脆爲度。如黑焦色則無用矣。爲細末撒之。生肌甚速。

(方歌) 腐盡生肌瘡不斂。兒茶乳沒冰麝香。血竭三七水加骨。收口珍珠共蟹黃。或用豬油溶黃蠟。調前味貼之良。一用火煨鹿腿骨。爲散生肌效甚長。

月白珍珠散

此散治諸瘡新肉已滿、不能生皮、及湯火傷痛、并下疳腐痛等證。

青缸花五分 輕粉一兩 珍珠一錢

右爲末撒之。下疳腐爛。用豬脊髓調搽。一用雞子清傾瓦上。曬乾取清。爲末撒之。

(方歌) 月白珍珠皮不長。并醫湯火下疳瘡。青缸輕粉珍珠共。豬髓調搽真妙方。一用雞清傾瓦上。曬乾爲末撒之良。

五色靈藥

此五色靈藥。治癰疽諸瘡已潰。餘腐不盡。新肉不生。撒之最效。

食鹽五錢 黑鉛六錢 枯白礬 枯皂礬 水銀 火硝各二兩

兩

先將鹽鉛溶化。入水銀結成砂子。再入二礬火硝同炒乾。研細入鉛汞再研。以不見星爲度。入罐內泥固濟封口。打三炷香。不可太過不及。一宿取出視之。其白如雪。約有二兩。爲火候得中之靈藥。如要色要者。加硫黃五錢。要色黃者。加明雄黃五錢。要色紅者。用黑鉛九錢。水銀一兩、枯白礬二兩。火硝三兩。辰砂四錢。明雄黃三錢。升煉火候。俱如前法。凡升打靈藥。硝要炒燥。礬要煨枯。一方用

燒酒煮乾。炒燥方研入罐。一法凡打出靈藥倍加石膏和勻復入新罐內打一枝香。用之不痛。

〔方歌〕五色靈藥白用鹽黑鉛硝末皂枯礬。欲成紫色硫黃入。黃者雄黃加五錢。紅去皂鹽鉛重用。硃砂飛也。必須添。

生肌玉紅膏

此膏治癰疽發背。諸般潰爛棒毒等瘡。用在已潰流膿時。先用甘草湯甚者用豬蹄湯淋洗患上。輾絹挹淨。用搨棉挑膏於掌中。捺化遍搽新肉上。外以太乙膏蓋之。大瘡洗換。二次內兼服大補氣血之藥。新肉即生。瘡口自斂。此外科收斂藥中之神藥也。

當歸二兩

白芷五錢

白蠟二兩

輕粉四錢

甘草二兩

二錢

紫草二錢

瓜兒血竭四錢

麻油一觔

右將當歸、白芷、紫草甘草四味、入油內浸三日。大杓內慢火熬微枯色。細絹濾清。將油復入杓內煎滾。入血竭化盡。次下白蠟。微火亦化用茶鍾四個。預放水中。將膏分作四處。傾入鍾內。候片時方下研極細。輕粉各投一錢。攪勻候至一日夜用之極效。

〔方歌〕生肌玉紅膏最善。潰爛諸瘡搽即收。芷蠟輕甘草。瓜兒血竭共麻油。

瑩珠膏

此膏治潰瘍。去腐定痛生肌。并楊梅瘡杖臙瘡下疳等證。

白蠟三兩

豬脂油七兩

輕粉一兩五

樟冰一兩五

錢末

錢末

先將白蠟脂油溶化。離火候溫。入輕粉樟冰攪勻候稍凝。再入冰片末一錢。攪勻成膏。罐收聽用。凡用先將甘草苦參各三錢。水煎。洗淨患處貼膏。杖瘡用荊川紙攤極薄貼之熱則易之。其疔瘡即散。疼痛立止。楊梅瘡加紅粉二錢頑瘡乳巖加銀硃一兩。廉瘡加水龍骨三錢。或龍骨四錢。

〔方歌〕 瑩珠膏用治潰瘍定痛生肌功效強。白蠟豬脂樟冰粉楊頑乳杖并廉瘡。

呂祖一枝梅

此藥治男婦大人小兒新久諸病。生死難定之間。用艾實大一餅。貼印堂之中。點官香一枝。香盡去藥。已後一時許。視貼藥處有紅斑暈色。腫起飛散。謂之紅霞捧日。病雖危篤。其人不死。如貼藥處。一時後不腫不紅。皮肉照舊不變謂之白雲漫野。病雖輕淺。終歸冥路。小兒急慢驚風。一切老幼痢疾。俱可貼之。凡病用之。皆可預知生死也。

雄黃五錢

巴豆仁五錢

不去油

硃砂三分

五靈脂三錢

銀朱一錢

五分

蓖麻仁五分

麝香三分

右各研細。於端午日淨室中。午時共研。加油燕脂爲膏。磁盒收藏。勿經婦人之手。臨用豆大一圓。掬餅貼印堂中。其功立見。用過餅送入河中。

(歌方) 昌胤一枝梅驗病。定人生死印堂中。紅斑腫起斯爲吉。無腫無紅命必終。藥用五靈菟麻子。砂銀巴豆麝香雄。

御纂醫宗金鑑卷三

編輯外科心法要訣

百會疽圖



百會穴在頂中央白面倒觀之正對耳夫

頭部

百會疽

百會疽在巔頂結。經屬督脈百會穴。初如粟米漸如錢。甚似葡萄堅似鐵。高腫熱實清毒火。平塌陽虛溫補。怯。腫連耳項動痰聲。七日不潰命必絕。(註)此百會疽。又名玉頂發。生在巔頂正中。屬督脈經百會穴。由營榮太過。火毒凝結而成。初起形如粟米。漸腫很大如錢。甚則形似葡萄。堅硬如鐵。高尖紅腫。焮熱疼痛。瘡根收束。憎寒壯熱。大渴嗜飲隨乾。口苦唇焦。便秘煩躁。脈見洪數者。此屬氣實。宜服黃連消毒

飲。以清毒火。外敷沖和膏。若漫腫平塌。紫暗堅硬。舉痛根散。惡寒便瀉。脈見細數者。此屬陽虛。宜服十全大補湯。以溫補之。外敷回陽玉龍膏。若面赤過頰口乾不渴唇潤者。此屬陽虛浮泛。宜服桂附地黃丸。引火歸源。更用生附子餅。置兩足心涌泉穴。各灸五壯。以洩其毒。初起貼琥珀膏。已潰糝黃靈藥。太乙膏蓋貼。腐盡再易生肌之藥治之。若腫連耳項。痰如拽鋸。七日無膿不潰。神昏者命必絕矣。

黃連消毒飲

蘇木二分

甘草三分

陳皮二分

桔梗五分

黃芩五分

黃蘗五分

人參三分

藥本五分

防己五分

防風四分

知母四分

羌活一分

獨活四分

連翹四分

黃連一錢

生地黄四分

黃芩一錢

澤瀉二分

當歸尾四分

水煎。食遠溫服。

(方歌) 黃連消毒清毒火。諸般火證服最良。蘇木甘草陳皮桔。芩蘗人參藥本防。知母羌活獨活等。連翹黃連生地黄。黃芩澤瀉當歸尾。服後最忌飲寒涼。

沖和膏

回陽玉龍膏俱見腫瘍門

生肌散

十全大補湯

黃靈藥

太乙膏俱見腫瘍門

桂附地黃丸

附子餅見前炎法

琥珀膏見後髮際瘡

透腦疽

透腦疽生百會穴前



透腦疽生百會穴前

透腦疽

透腦疽生百會前。形如鷄子痛而堅。輒漫膿稀虛塌陷。紅硬膿稠實腫尖。(註)此證生於百會穴之前。顛門之際。亦由督脈經火毒而成。初如粟米。漸如鷄子。堅硬疼痛。瘡頂塌陷根脚漫腫。色暗者屬虛。若色紅腫硬。頂尖膿稠者屬實。速潰者順。遲潰透腦髓者逆。其腫潰內外治法。俱按百會疽。

透腦疽

透腦疽生透腦旁。濕火攻發屬太陽。穴名五處知其位。紅腫紫逆要審詳。(註)此疽生於透腦疽側下。由太陽膀胱經濕火而成。穴名五處。紅腫高起。焮熱疼痛。膿色如蒼膿者屬氣血俱實。順而易治。若紫陷無膿。根脚散大者屬氣血兩虛。逆而難治。初起宜服前防敗毒散汗之。次服內疎毒連湯下之。將潰服託裏透膿湯。已潰服托裏排膿湯外貼琥珀膏圍敷沖和膏。其餘內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

托裏透膿湯

人參

白朮土炒

穿山甲炒研

白芷各一錢

升麻

甘草節各五分

當歸二錢

生黃耆三錢

皂角刺一錢五分

青皮五分炒

水三鐘。煎一鐘。病在上部。先飲養酒一鐘。後熟服此藥。病在下部。先服藥。後飲酒。瘡在中部。藥內兌酒半鐘熱服。

(方歌) 托裏透膿治癰疽。已成未潰服之宜。參朮甲芷升麻草。當歸黃耆刺青皮。

荆防敗毒散

見項部
腦疽

內疎黃連湯

沖和膏俱見腫瘍門

托裏排膿湯

見項部
魚尾毒

琥珀膏

見髮際
瘡內

佛頂疽圖

佛頂疽在馬腦之前上星穴



佛頂疽

佛頂疽屬督上星。陰陽不調毒熱成。不論虛實皆險證。潰爛黑陷必然凶。(註)此證一名頂門疽。生於頭頂前門之前。屬督脈經上星穴。由藏府陰陽不調。熱毒上壅而成。色紫堅硬腫痛。脈洪大而數者為實。脈微細而數者為虛。皆屬險證。若潰爛黑陷。六脈散大。神昏謔語。二便閉結者為逆。首尾內外治法。俱按百會疽。

額疽類

疽類



額疽

額疽生額火毒成。左右膀胱正督經。裏陷焦紫無膿重。高聳根收紅腫輕。(註)此證生前額正中骨。屬督脈經。或生左右額角者。屬膀胱經。總由火毒而成。初起瘡頂塌陷。乾焦色紫。不生大膿者。其勢重而屬險也。若紅腫高聳。瘡根收束者。其勢輕而屬順也。初服荊防敗毒散汗之。次服仙方活命飲消之。將潰氣虛者。宜服托裏透膿湯。氣實者宜服透膿散。外敷沖和膏。已潰宜服托裏排膿湯。外貼琥珀膏。其餘內外治法。正按癰疽潰瘍門。

荆防敗毒散

見頭部
腦疽

仙方活命飲

見頭部
腦疽

托裏透膿湯

見前條
腦疽

透膿散

沖和膏

俱見頭部
瘡門

托裏排膿湯

見頭部
魚尾毒

琥珀膏

俱見髮際
瘡內

勇疽圖

勇疽在臑腋後五分臑子臑穴又名太陽穴



勇疽

勇疽背後太陽穴。膽經怒火伏鼠形。七日不潰毒攻眼。黃膿爲吉黑血凶。（註）此證一名勇疽。又名腦發疽。屬足少陽膽經怒火而成。生於目小背之後五分。生在太陽穴者。無論左右。皆可以生。初起如粟。漸腫疼痛形如伏鼠。面目浮腫。七日信膿不潰。火毒攻睛。腐爛損目。若十一日鏡出黃膿。毒從膿解爲順易治。若出紫黑血者。係氣虛不能化毒爲逆難治。初服仙方活命飲清解之。毒甚宜服內疎黃連湯。外敷二味拔毒散。其將潰已潰。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後。避風忌水。

仙方活命飲

內疎黃連湯

二味拔毒散

俱見腫瘍門

鬢疽



鬢疽在左右鬢角

鬢疽

鬢疽三焦膽二經。證由慾怒火凝成。此經氣多而血少。潰腐惟宜少見膿。(註)此證發於鬢角。屬手少陽三焦足少陽膽二經。由於相火妄動。外受風熱。更因性情忿怒。慾念火生。凝結而成。此二經俱屬氣多血少。最難腐潰。更兼鬢角肌肉。澆薄不宜鍼灸。候其自潰。潰後不宜多見膿。膿多者過耗血液難斂。初起宜服柴胡清肝湯解之。膿成者宜托裏消毒散托之。外敷二味拔毒散。已潰內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

柴胡清肝湯

柴胡 生地各一錢
五分 當歸二錢 赤芍一錢
五分 川芎一錢 連翹二錢
去心

牛蒡子一錢五
分炒研

黃芩 錢生梔子研

天花粉 甘草節 防風各一

錢

水二鍾煎八分。食遠服。

(方歌) 柴胡清肝治怒證。宜血疎通解毒良。四物生用柴翹麥。黃芩梔粉草節防。

托裏消毒散

二味拔毒散俱見腫瘍門

天疽銳毒圖



天疽 銳毒

天疽居左銳毒右。經屬膽腑生身後。謀慮太過鬱火成。此處肉薄當急救。(註) 此二證左爲天疽。右爲銳毒。俱生耳後一寸三分高骨之後。天者不盡天年。謂之天。銳者如鋒刃之銳利。言毒甚也。得此二證。愈者甚少。初起俱如黍粒。漸腫如瓜。堅硬平塌。紫暗不澤。較諸疔疼痛倍增。名雖各異。而左右耳後。俱屬足少陽膽經。由謀慮不決。鬱火凝滯而成。此處皮肉薄。氣多血少。終屬險證。急當治之。遲則熱貫下入淵液。前

傷任脈。內重肝肺。惡證悉添。必致不救。若紅腫連潰者順。堅硬黑陷者逆。如果投方應證。亦只十全四五也。初宜服柴胡清肝湯消解之。膿將成宜服托裏消毒散。虛者十全大補湯托補之。外俱敷烏龍膏。其餘內外治法。俱按癰疽腫潰瘍門。(淵液膽經穴名)

柴胡清肝湯

見前

托裏消毒散

烏龍膏

俱見腫瘍門

十全大補湯

見潰瘍門

耳後疽



耳後疽

耳後疽生耳摺間。三焦風毒膽火炎。紅腫有頭焮為順。黑陷鼻痛冷潰難。(註)此證生於耳摺之間。無論左右。屬三焦經風毒。兼膽經怒火上炎而成。初起如粟。漸增腫痛。小者如杏。大者如桃。若紅腫有頭。焮如易潰稠膿者為順。若黑陷堅硬。鼻痛引腦。甚則頂顙后肘俱痛。不熱遲潰紫血者為逆。初治注同天疽。已

內外治法。俱按癰疽潰瘍門。又有初起失於托裏。或誤食寒涼。則毒不能外發。遂攻耳竅。膿從耳竅出者。名爲內潰屬喉。多服十全大補湯。大抵少年得此證者。其愈最緩。老年得此證者。易於成漏。

十全大補湯

見潰瘍門

耳發圖



耳發

耳發三焦風熱成。初根漸若蜂房形。赤腫疼痛生輪後。黃膿屬毒紫血凶。(註)此證生於耳後。屬三焦經風熱相搏而成。初如椒粒。漸腫若蜂房。將腐亦多眼孔。焮赤疼痛。腫連耳輪。蓋發者乃癰證之毒甚者也。不可聽其自潰。恐潰遲膿通耳竅。當在十一日後。剪破瘡頂。出黃白膿者屬吉。爲順。出紫鮮血者屬凶爲逆。初起俱宜服仙方活命飲消之。外敷二味拔毒散。其餘內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

仙方活命飲見腫瘍門 二味拔毒散見腫瘍門

耳根毒圖



耳根毒在耳聾後偏上發左右相同

耳根毒

耳根毒初發核形。腫如伏鼠。焮赤疼。三焦風火膽怒氣。暴腫潰速非疽癰。(註)此證生於耳後。初起形如瘰核。漸增腫勢。狀如伏鼠。焮赤疼痛。由三焦風火。膽經怒氣上沖。凝結而成。但此證暴腫潰速。根淺易愈。非若癰疽之勢大毒甚也。初起寒熱往來。宜服荆防敗毒散汗之。發熱痛甚者。仙方活命飲消之。膿成者服透膿散。虛者服托裏透膿湯。潰後外撒紅靈藥。貼太乙膏。膿盡換搽生肌玉紅膏。生肌斂口。若遇虛者。膿水清稀。或瘡口斂遲。即服香貝養榮湯補之自斂。

仙方活命飲

見腫瘍門

荆防敗毒散

見頭部腦疽

透膿散

見腫瘍門

托裏透膿湯

見前侵腦疽

紅靈藥

生肌玉紅膏

太乙膏

俱見潰瘍門

香貝養榮湯

見頭部石疽

玉枕疽圖



玉枕疽

玉枕疽屬督脈經。證由積熱風邪乘。枕骨微上腦戶穴。高腫爲順紫陷凶。(註)此證由督脈經積熱。外受風邪凝結而成。生在玉枕骨尖微上腦戶穴。初起如粟。麻痺相兼。寒熱往來。口渴便秘。漸增堅硬。大者如茄。小如鵝卵。紅活高腫。潰出稠膿者。屬吉而順也。若紫暗塌陷。潰出血水者。屬凶險也。初則俱服神授衛生湯消解之。虛者宜服托裏消毒散。外敷沖和膏。其餘內外治法。俱按癰疽腫潰瘍門。

神授衛生湯

托裏消毒散

沖和膏

俱見腫瘍門

腦後發



腦後發

腦後發生在督經。熱結風府粟腫疼。紅活易潰稠膿順。紫暗難潰血水因。(註)此證屬督脈經枕骨之下。風府穴。由積熱外受風邪凝結而成。初如粟米。焮腫作疼。痛引頭頂肩項。氣粗鼻塞。漸大如盤如盃。紅活速潰出稠膿者順。紫暗難潰時津血水者逆。初起內外治法。按玉枕疽。其餘內外治法。俱按癰疽腫潰瘍門。

腦鑠

腦鑠項後如橫木。精涸毒火上乘生。黑如竈烟牛唇硬。木痛未腐水流清。急施桑艾法至痛。火燎刺痛屬陽經。速服仙方活命飲。若見七惡定然凶。(註)此證先於督脈經風府穴。山陰精枯涸。毒火乘之而生。初起形如椒粒堅硬紫暗。漸腫如橫木。甚則上至巔頂。下至大椎。色如竈烟。硬若牛唇。未膿皮先腐爛。時流清水。肌肉冰冷。輕者木痛。重者毒氣將陷。全不知疼。宜急施桑柴烘法。或艾壯灸法。以痛為度。速服仙方活命飲以舒解其毒。七日之後。不發長不生大膿者。宜服十全大補湯救之。投補藥不應者。難治。若初起熱如火燎刺痛。屬陽證。速服黃連消毒飲。外敷回陽玉龍膏。此證若首尾純見五善之證者屬順。見七惡之證者屬逆也。其餘內外治法。俱按癰疽腫潰瘍門。

腦鑠圖



桑柴烘法

艾壯灸法

見前百
首卷

仙方活命飲

見腫
瘍門

十全大補湯

見讀
瘍門

黃連消毒飲

見前百
會疽

回陽玉龍膏

見腫
瘍門

油風圖



油風

油風。頭髮乾焦脫。皮紅光瑯癢難堪。毛孔風襲致傷血。養真海艾。血瘡。(註)此證毛髮乾焦。成片脫落。皮紅光亮。癢如蟲行。俗名鬼剃頭。由毛孔開張。邪風乘虛襲入。以致風盛燥血。不能榮養毛髮。宜服蘇養真丹。以治其本。外以海艾湯洗之。以治其標。若耽延年久。宜鍼其光亮之處。出紫血。毛髮庶可常生。

神應養真丹 羌活 木瓜 天麻 白芍 當歸

菟絲子 熟地酒蒸 川芎

搗膏

等分爲末。入地黃膏。加蜜丸桐子大。每服百丸。溫酒或鹽湯任下。

〔方歌〕神應養真治油風。養血消風髮復生。羌歸木瓜天麻芍。菟絲熟地與川芎。

海艾湯 海艾 菊花 藁本 蔓荊子 防風

薄荷 荆穗 藿香 甘松各二錢

錢

水五六碗。同藥煎數滾。連湯共入麻日鉢內。先將熱氣薰面。候湯少溫。用布蘸洗。日洗二三次。洗後避風忌魚腥發物。

〔方歌〕海艾湯治油風瘰。先薰後洗善消風。菊藁蔓荊風薄荷。藿香海歌與甘松。

白屑風圖



白屑風生於頭面作髮起白屑及脫髮起耳項癢倍增

白屑

白屑風生頭與面。燥癢日久白屑見。肌熱風侵成燥化。換肌潤肌醫此患。(註)此證初生髮內。延及面目耳項燥癢。日久飛起白屑。脫去又生。由肌熱當風。風邪侵入毛孔。鬱久燥血。肌膚失養。化成燥證也。宜多服祛風換肌丸。若肌膚燥裂者。用潤肌膏擦之甚效。

祛風換肌丸

大胡麻

蒼朮炒

牛膝酒洗

石菖蒲

苦參

何首烏生

花粉

靈仙各二兩

當歸身

川芎

甘草各一兩

兩生

右爲細末。陳煮酒跌丸菘豆大。每服錢。白滾水送下。忌魚腥發物火酒。

(方歌) 換肌丸治白屑風。燥癢日增苦蟲行。風燥血分失潤養。學起白屑落復生。歸芍胡麻蒼朮膝。萬蒲花
粉草藏靈。苦參何首烏爲末。煮酒跌丸菜豆形。

潤肌膏

香油四兩

奶酥油二兩

當歸五錢

紫草一錢

將當歸紫草入二油內。浸二日。文火燂焦去渣。加黃蠟五錢溶化盡。用布濾傾盤內。不時用柳枝攪冷成膏。每用少許。日擦二次。

(方歌) 潤肌膏擦白屑風。肌膚燥癢用更靈。酥香二油歸紫草。燂焦加蠟濾攪凝。



禿瘡

禿瘡風熱化生蟲。騷癢難堪却不疼。白痴如錢生髮內。宜服通聖擦膏靈。(註) 此證頭生白痴。小者如豆。

大者如錢。俗名錢癬。又名肥瘡。多生小兒頭上。癢甚難堪。却不疼痛。日久延漫成片。髮焦脫落。卽成禿瘡。又名癩頭瘡。由胃經積熱生風而成。宜用防風通聖散料。醇酒浸焙爲細末。每服一錢或二錢。量其壯弱用之。食後白滾湯調下。服至頭上多汗爲驗。初起肥瘡。宜擦肥油膏。用久則效。已成禿瘡者。先宜艾葉湯。煎湯洗淨瘡痂。再用豬肉湯洗之。隨擦躑躅花油。以殺蟲散風。蟲死則瘡止。風散則髮生。血潮則肌膚潤。久擦甚效。

防風通聖散

防風

當歸

白芍酒炒

芒硝

大黃

連翹

桔梗

川芎

石膏服

黃芩

薄荷

麻黃

滑石各一兩

荊芥

白朮土炒

山梔子各二錢五分

甘草二兩生

共爲末。

(方歌) 防風通聖治禿瘡。胃經積熱致風傷。連翹梔子麻黃桔。白朮歸芎滑石防。黃芩甘草石膏芍。薄荷荊芥並硝黃。共末酒拌曬乾碾。白湯調服發汗良。

肥油膏

番木鱉六錢

當歸

藜蘆各五錢

黃礬

苦參

杏仁

狼毒

白附子各三錢

鯉魚膽二個


用香油十兩。將前藥入油內。熬至黑黃色。去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡。用布濾過。攪收。每用少許。用藍布裹於手指。薰油擦瘡。

〔方歌〕 肥油膏能治肥瘡。散風殺蟲長髮強。黃蘗苦參白附子。番魚狼毒枯仁良。藜蘆當歸鯉魚膽。煤焦人蠟實奇方。

躑躅花油方

躑躅花根四兩。搗爛。用菜油一盃。煤枯去渣。加黃蠟少許。布濾候冷。服布蘸擦。日用三次。兜帽蔽之。勿令見風。

〔方歌〕 躑躅花油療禿瘡。驅蟲止瘡擦之良。躑躅花根研極爛。菜油煤枯入蠟強。



蟻疔癰

蟻疔癰即疔拱頭。勢小勢大各有由。胎毒堅小多衣膜。暑熱形大功易收。(註)此證多生小兒頭上。俗名蟻疔。未破如曲疔拱頭。破後形似蟻疔串穴。有因胎中受毒者。其瘡腫勢雖小。而根則堅硬。潰破雖出膿水。而堅硬不退瘡口收斂。越時復發。本毒未罷。他處又生。甚屬纏綿難斂。宜用三品一條槍。封於孔內。化盡堅硬衣膜。換撒生肌散。貼玉紅膏以收斂之。不致再發也。亦有暑熱成毒者大如梅李。相聯三五枚潰破膿出。其口不斂。日久頭皮串空。亦如蟻疔串穴之狀。宜貼紺珠膏。拔盡膿毒。將所串之空皮剪通。使無藏膿之處。用米泔水日洗一次。乾撒生肌散。貼萬應膏甚效。有因瘡口開張。日久風邪襲入。以致瘡口周圍作癢。抓破津水。相延成片。形類黃水瘡者。宜用敗銅散搽之。忌魚腥發物。

三品一條槍

白砒一兩

五錢

明礬五兩

砒礬二味。共研細末。入小罐內。加炭火煨紅。青烟已盡。疊起白烟。片時。約上下紅徹。住火取罐安地上。一宿。取出。約有砒礬淨末一兩。加雄黃二錢四分。乳香一錢二分。共研極細。厚糊搗成線條。陰乾。瘡有孔者。插入孔內。無孔者。先用鐵連孔竅。早晚插藥二條。插至三日後。孔大者。每插十餘條。插至七日。孔內藥條滿足方佳。患處四邊。自然裂開大縫。共至十四日前後。其堅硬衣膜。及釘核癩癧痔漏諸管。自然落下。隨用湯洗。搽玉紅膏。虛者兼服健脾補劑。自然收斂。

(方歌) 神奇三品一條槍。能醫堅硬衣膜瘡。雄乳白砒礬生用。研末煨煉搽條良。

敗銅散

化銅舊罐子一個。研爲細末。用香油調敷。自能滲濕祛癢。瘡口易斂。

(方歌) 敗錦散治潰風傷。蠶蟻破津脂水瘡。化銅舊罐研細末。香油調敷滲濕良。

紺珠膏

萬應膏

生肌散

玉紅膏

俱見散
傷門

髮際瘡圖



髮際瘡在項後髮際內胖及注此瘡

髮際瘡

髮際瘡生髮際邊。形如黍豆。甚疼。頂白肉赤初易治。胖入肌厚最難。 (註) 此證生項後髮際。形如黍豆。頂白肉赤堅硬。痛如錐刺。癢如火燎。破津膿水。亦有浸淫髮內者。此由內鬱濕熱。外益受風。刺搏而成也。初宜珠紺丹汗之。次用酒蒸防風通聖散清解之。外搽黃連膏效。惟胖入項後髮際。肉厚而多摺紋。其裏反刺瘡內。因循日久不瘥。又兼受風寒凝結。形如臥瓜。破爛津水。時破時斂。俗名謂之肉龜。經年不愈。亦無傷害。常用琥珀膏貼之。可稍輕也。

琥珀膏

定粉一兩

血餘八錢

輕粉四錢

銀朱七錢

花椒十四粒

黃蠟四兩

琥珀五分

麻油十二兩

卡

將血塗花樹麻油煤焦。撈去渣。下黃蠟溶化盡。用夏布濾淨。傾入磁盃內。預將定粉銀朱輕粉琥珀四味。各研極細。共合一處。徐徐下入油內。用柳枝不時攪之。以冷爲度。綿燕脂攤貼。紅羅紙攤貼亦可。
(方歌) 琥珀膏能治諸瘡。活瘀解毒化腐良。定血輕朱椒蠟珀。麻油熬膏亦療瘡。

紺珠丹

即萬靈丹
見腫瘍門

防風通聖散

見前
禿瘡

黃連膏

見鼻部
鼻瘡

頭風傷口

頭風引口眉稜痛。風火寒痰有四因。或由楊梅毒攻項。或因產後被風侵。(註)此證畏寒惡風。其痛走注。定。得煖少減者風痛也。寒熱口苦。大渴。二便秘。不眠者火痛也。手足厥冷。面青唇白。氣逆不渴。小。白者寒痛也。身重肢痠。胸煩作嘔。口吐痰沫者痰痛也。以上四證。舊有古方羌活沖和湯。倍用芍加菊花。隨經形證。加引治之。倘若因循失治。風攻眉稜痠痛。眼皮跳動。漸攻睛珠。起藍雲遮睛。多致損目。若眉稜疼痛。以碧雲散常吸之甚效。

羌活沖和湯

防風

白芷各一錢

細辛

甘草各五分

生地

芥朮

黃芩各一錢
羌活一錢
川芎二錢

五分

引加葱頭三根。生薑一片。紅棗肉二枚。水煎食遠服。痛由頂後起。屬膀胱經。倍羌活加藥木。痛由耳後起。屬膽經。加柴胡。痛由太陽牽引頭額兩目。屬胃經。倍白芷加葛根煨石膏。頭痛兼有腹痛身重。屬脾經。倍蒼朮。頭痛兼有足冷氣逆。屬腎經。倍細辛。甚者加麻黃生附子。減黃芩。頭痛兼有嘔涎沫者。手足厥冷。屬肝經。加吳茱萸。頭痛有火熱渴。倍酒洗黃芩。加生石膏。便秘者加生大黃。頭痛吐痰涎。四肢不冷者。加半夏。

(方歌) 冲和頭風風傷目。風火寒痰四因生。日久肩稜痠痛跳。遮睛損目此能清。防風白芷細辛草。生地蒼朮羌活芎。詳在隨加引經藥。葱薑紅棗水煎成。

碧雲散

川芎

不食草各一兩

細辛

辛荑各二錢

青黛一錢

共爲細末。患者口噙涼水。令人以蘆筒吹入左右鼻孔內。取嚏爲效。每用少許。鼻常吸之其效驗。

(方歌) 碧雲散去頭風證。肩稜痠痛更堪醫。鵝不食草辛荑黛。芎細同研不時吸。

貼兩太陽穴

治頭痛如破

雀腦川芎

白附子各等分

御纂醫宗金鑑 編輯外科心法要訣

二六

研末。葱汁調稠。紙攤貼左右太陽穴效。產後風寒侵腦。頭痛不可發汗。宜用四物湯。倍用芍加荊芥。服之。其效綽。楊梅毒入腦髓。以致頭痛者。治在本門。

四物湯兄潰 瘍門

癩疽癰疽



面部

癩癰癰疽

癩癰癰疽癰疽形。風熱積熱小腸經。癰起癩紅浮腫痛。疽紫漫硬木麻疼。(註)此二證發於顛骨尖處。屬筋經。不論左右。初小漸大如榴。發陽分者。由風熱而生。初起癩紅浮腫疼痛。七日即潰。名爲癰癰。毒根淺易愈。發陰分者。由積熱而生。色紫漫腫。堅硬麻木疼。三七方潰。名爲顛疽。毒甚根深難愈。癰

初宜仙方活命飲。疽證初宜內疎黃連湯。或麥靈丹。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

仙方活命飲

內疎黃連湯

麥靈丹 俱見腫瘍門

額疔圖



額疔色赤堅硬形小根深左右相間

額疔

額疔初起粟米形。證由陽明火毒生。堅硬頂凹根深固。寒熱交作麻癢疼。(註)此證生在額骨之間。屬陽明胃經。不論左右。初如粟米黃色小粒。次如赤豆。頭凹堅硬。按似疔豆。麻癢疼痛。多因過食炙煖藥酒。以致胃經積火成毒而生。初宜蟾酥丸。或麥靈丹汗之。次服黃連消毒飲清之。外治法同疔門。凡疔皆屬迅速之證。初覺即當急治。遲則毒火攻心。令人昏潰謔語。惡證悉添。多致不救。

蟾酥丸見疔瘡門

麥靈丹見腫瘍門

黃連消毒飲見頭部百會疽

面發毒



面發毒

面發毒在頰車生。初少漸多赤豆形。腫硬焮疼津黃水。證屬風熱客陽明。(註)此證生面上頰車骨間。初一個。漸發數枚。形如赤豆。色紅焮痛。堅硬似疔。時津黃水。由風熱客於陽明。上攻而成。初宜服荊敗毒散汗之。若胃火盛。則唇焦口渴。便燥者即服涼膈散下之。法以清涼消毒散敷之即愈。

涼膈散

黃芩

薄荷

梔子生研

連翹去心

石膏生

甘草生

芒硝

大黃各等分

水一鐘。苦竹葉二十片。煎八分。加蜂蜜三匙和服。

(方歌) 涼膈散醫肺胃熱。口渴唇焦便燥結。岑薄梔榔石膏草。芒硝大黃苦竹葉。

清涼消毒散

白及

乳香

雄黃

天花粉

麝香

烏藥

山慈菇

黃蘗

各等分。共研細末。雞子清和蜜水調敷。

(方歌) 清涼消毒去風熱。及乳雄黃花粉磨。烏藥慈菇黃蘗研。雞清蜜調毒即滅。

荆防敗毒散

見項部
腦疽

面風圖



面遊風

面遊風燥熱濕成。面目浮腫癢蟲行。膚起白屑而癢極。破津黃水津血疼。(註)此證生於面上。初發面目浮腫。癢若蟲行、肌膚乾燥。時起白屑。次後極癢。抓破。熱濕盛者津黃水。風燥盛者津血。痛楚難堪。由平素血燥。過食辛辣厚味。以致陽明胃經濕熱受風而成。癢甚者宜服消風散。痛甚者宜服黃連消毒飲。外抹摩風膏。緩緩取效。

摩風膏

麻黃五錢

羌活一兩

白檀香一錢

升麻二錢

白及一錢

防風二錢

當歸身一錢

用香油五兩。將藥浸五日。文火燂黃。即撈去渣。加黃蠟五錢。溶化盡。用絹濾過。攪冷塗抹瘡上。(方歌)摩風膏抹遊風證。麻黃羌活白檀升。及防歸身香油泡。燂黃去渣加蠟凝。

消風散

見頭部
鈕扣風

黃連消毒飲

見頭部
百會疽

疔腮圖



疔腮

疔腮胃熱是其端。初起焮痛熱復寒。高腫焮紅風與熱。平腫色淡熱濕原。(註)此證一名髭發。一名含理瘡。生於兩腮肌肉不著骨之處。無論左右。總發端於陽明胃熱也。初起焮痛。寒熱往來。若高腫色紅焮熱者。係胃經風熱所發。若不腫色淡不鮮者。由胃經濕熱所生。始則俱以柴胡葛根湯表之。若口渴便秘。宜四順湯涼飲解之。表裏證俱解。腫痛仍作者。勢必成膿。宜托裏消毒散托之。膿熟者鍼之。體虛者宜平補之。其診治法。按癰疽潰瘍門。此證初起。若過服涼藥。令毒攻喉者險。

柴胡葛根湯

柴胡

葛根

石膏煨

花粉

黃芩各一錢

甘草五分

生

牛蒡子炒研

連翹去心

桔梗各一錢

升麻三分

水二鐘。煎八分。不拘時服。

〔方歌〕柴胡葛根發表證。痒腿腫痛或平形。石膏花粉黃芩草。牛蒡連翹桔梗升。

四順清涼飲

防風

梔子生研

連翹去心

甘草生

當歸

赤芍

羌活各一

大黃二錢

水二鐘。燈心五十寸。煎八分。食遠服。

〔方歌〕四順清涼攻裏證。口乾便秘痒腮瘡。防風梔子連翹草。歸芍燈心羌大黃。

托裏消毒散 兒腫瘍門

頰瘍

頰瘍。胃經積熱生。初如紅粟。漸榴形。膿出腫消。易斂愈。膿稀難斂。漏因成。(註)此證生於耳下頰車骨間。由陽明胃經。積熱而生。始發如粟。色紅。漸大如榴。初起宜犀角升麻湯清解之。若失治。或過敷寒藥。以致肌冷凝結。堅硬難消。難潰者。宜升陽散火湯宣發之。將潰宜托裏消毒散。膿熱滅之膿出。腫退瘡口易斂者。則愈。或牙關緊急不聞。或旁腫不消。膿水清稀。因而成漏。復被寒侵瘡孔。致生多骨。經年纏綿難愈者。服桂附地黃丸。外用豆豉餅煖灸。又壯。初用九壯。以知熱瘡爲止。每日灸之。以朽骨脫出。膿漸少而肌漸平爲度。兼用紅升丹。搽入瘡口內。萬應膏蓋貼。每日一易。患者當慎起居。戒腥發等物。漸漸收功。

頰瘍圖



犀角升麻湯

犀角二錢

五分

升麻一錢

七分

黃芩八分

白附子八分

麵裹煖

生甘草五分 白芷八分 川芎八分 羌活一錢 防風八分

水三鐘。煎一鐘。食遠熱服。

〔方歌〕犀角升麻醫頰瘍。色紅初起服之良。黃芩白附生甘草。白芷川芎羌活防。

升湯散火湯 撫芎六分 蔓荊子 白芍酒炒 防風 羌活

獨活 甘草半生 人參各一錢 柴胡 香附各一錢 葛根一錢
半炙 錢 五分

升麻一錢 殭蠶一錢五分
分炒

生薑一片。紅棗肉一枚。水三鐘。煎一鐘。食遠溫服。

〔方歌〕升陽散火過敷寒。牙又拘攣木痛堅。撫芎芍防羌獨草。參柴香附葛升蠶。

托裏消毒散見腫痛門 豆豉餅見炙法內 紅升丹 萬應膏俱見潰痛門

骨槽風

骨槽風腮頰腫身肉發



骨槽風

骨槽風火三焦胃。耳前腮頰隱隱寒腐潰筋骨仍硬痛。牙關拘急夾邪風。(註)此證一名牙又發。一名穿腮發。乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也。起於耳前。連及腮頰。筋骨隱痛。日久腐潰。腮之裏外筋骨。仍然漫腫硬痛。牙關拘急。皆由邪風深襲筋骨故也。此證屬在筋骨陰分。故初起腫硬難消。潰後瘡口難合。多致不救。初起熱不盛者。內宜服清陽散火湯。外以清胃散擦牙。真君妙散貼敷腮。如初起發表之後。人壯火盛者。用皂刺大黃甘草節白芷殭蠶下之。後減大黃。加生石膏以清之。然亦不可過。用寒涼之藥。恐其凝結也。有硬腫日久失治。不能盡消者。膿勢將成。宜用中和湯托之。已潰按癰疽潰瘍門治法。亦有過服寒涼。以致肌肉堅凝。腐臭。非理中湯佐以附子。不能回陽。非殭蠶不能搜風如法治之。諸證俱減。惟牙關拘急。不開宜用生薑片熟艾熨車穴二七壯。其穴在耳垂下五分陷中處。每日灸之。兼用鍼刺口內牙盡處出血。其牙關即開。

若寒熱不退。形焦體削。痰盛不食。或口內腐爛。甚則穿腮落齒者。俱爲逆證。當腐爛之初。治法即同牙海。亦不過稍盡人事耳。

清胃散

薑黃

白芷

細辛

川芎

各等分。共研細末。先以鹽湯漱口。擦牙痛處。

〔方歌〕清胃散擦牙腫疼。薑黃白芷細辛芎。同研先以鹽湯漱。後擦此藥有奇功。

中和湯

白芷

桔梗

人參

黃耆各一錢

藿香五分

肉桂五分

甘草

白朮土炒

川芎

當歸

白芍各一錢酒炒

麥門冬五分去心

水二鐘。薑三片。棗二枚。煎八分。加酒一杯食遠服。

〔方歌〕中和湯治骨槽風。日久不消欲潰膿。芷桔參耆薑桂朮。朮芎歸芍麥門冬。

俚中湯見潰瘍門

眞君妙貼散見腫瘍門

升陽散火湯方見類傷

發頤圖



發頤

發頤腫痛結核般。經屬陽明身熱寒。傷寒疹毒汗未去。腫至咽喉調治難。(註)此證又名汗毒。發於頤領之間。屬足陽明胃經。初起身發寒熱。腫如結核。微熱微痛。漸腫如桃如李。疼痛倍增。由傷寒發汗未盡。或疹形未透。壅積而成。初起宜荊防敗毒散汗之。外以二味拔毒散敷之。即消。如消之不應者。勢痛日增。勢必潰膿。宜服托裏透膿湯。潰後按癰疽潰瘍門治法。若此證失於調治。或誤投寒涼剋伐之藥。毒必內陷。腫至咽喉。痰湧氣堵湯水難嚥者逆。

荊防敗毒散

見頭部腦疽

二味拔毒散 見腫瘍門

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

時毒圖



管毒於項領之間石同

時毒

時毒初發類傷寒。漫腫無頭在項間。因感四時不正氣。治分壯弱疎解痊。(註)此證初起。狀類傷寒。憎寒發熱。令人恍惚不寧。肢體痠疼。或兼咽痛。一二日間。發於項腮頰頤。作腫無頭。漸漸焮赤疼痛。或似結核有根。漫腫色赤。俱由感冒四時不正邪氣。客於經絡。釀結而成。非發於病後之頤毒也。惟在醫者。精察痛色。辨別虛實。治法須宜疎肝。不可驟用寒涼。致毒不外發而內攻咽喉者險矣。初服荊防敗毒散汗之。其腫不消者。宜服連翹消毒飲。腫仍不消。膿勢將成。壯者宜服透膿散。弱者宜服托裏透膿湯。外敷二味拔毒散。膿熟鍼之。潰按癰疽潰瘍門治法。

②

荊防消毒散

見項部
腦疽

連翹消毒飲

見背部
酒毒發

透膿散

見腫
瘍門

託裏透膿湯見頭部
侵腦疽

二味拔毒散見腫
瘍門

鳳眉疽圖



鳳眉疽

鳳眉疽生兩眉梭。形長如瓜漫腫紅。膀胱小腸肝膽熱。煩悶嘔逆不食凶。(註)此疽亦名眉發。生於眉梭。無論左右。俱屬足太陽膀胱、手太陽小腸、足厥陰肝、足少陽膽、四經積熱所致。形長如瓜。疼痛引腦。二口合腫。堅硬色赤。按之有根。六日內刺之得膿則吉。無膿則險。甚則十四日不潰。煩悶嘔逆不食者凶。初宜服仙方活命飲。次服托裏透膿湯。速潰爲妙。遲則恐攻眼損睛矣。其餘內外治法。按癰疽潰瘍門。

仙方活命飲見腫

瘍門

托裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

眉心疔圖



眉心疔

眉心疔生在印堂。硬腫爲疔浮腫癆。督經風熱氣凝滯。根堅木痛當疔防。(註)此證生於兩眉中間。疔名曰印堂疔。毒初起色暗根平。腫硬疼痛。至二十一日。腐潰出稠膿者順。無膿黑陷者逆。瘍名曰面風毒。瘍去初起。色赤浮腫焮痛易治。七日潰膿若色黑木痛。麻養太過。根硬如鐵釘之狀。寒熱並作。即眉心疔也。俱由督脈經風。熱壅結氣滯所成。疔傷二證。俱按百會疔。眉心疔治法同疔。

龍泉疽

龍泉疽



龍泉疽在人中之正中央

龍泉疽起在人中。麻癢堅疼赤豆形。上焦風熱攻督脈。憎寒壯熱治同疔。(註)此證生於水溝穴。即人中是也。屬督脈經。形如赤豆。勢小根深。堅硬木痛。色紫頂焦。寒熱交作。不時麻癢。由上焦風熱攻於督脈而成。宜按疔門急速治之。遲則毒氣內攻。令人煩悶。惡心乾嘔。神亂昏慣。腮項俱腫。多致不救。

虎鬚毒

虎鬚毒



虎鬚毒在下唇之下死死平

虎鬚毒在頰下生。胃腎積熱入任經。癰疽腫痛速潰易。疽堅硬痛麻癢疔。(註)此毒一名欬癰。腫痛焮赤。速潰易治。一名承漿疽。堅硬痛腫。遲潰難治。若根深形小似豆。麻癢痛甚。惡寒發熱。心煩作嘔者。疔也。當從疔治。皆由過食炙煇。以致胃腎二經。積熱上攻任脈而成。癰疽二證初起。宜服仙方活命飲。加升麻桔梗消之。若便秘唇焦大渴者。宜內疎黃連湯清之。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。初起麻癢如疔。治法按疔門。

仙方活命飲

內疎黃連湯俱見腫瘍門

燕窩瘡



燕窩瘡

燕窩瘡在下頰生。如攪粟豆癢熱疼。形類黃水瘡破爛。此證原來濕熱成。(註)此證生於下頰。俗各羊癩子。瘡初生小者如粟。大者如豆。色紅熱癢微痛。破津黃水。形類黃水瘡。浸淫成片。但癢如攪。由脾胃濕熱而成。宜服芩連平胃湯。外搽碧玉散即效。

芩連平胃湯

黃芩一錢
五分

黃連一錢

厚朴一錢
黃炒

蒼朮一錢
炒

甘草五分
生

陳皮一錢

水二鍾。薑一片。煎八分。食後服。

〔方歌〕芩連平胃燕窩瘡。除濕清熱服更良。薑炒厚朴瘡疔草。陳皮同煎引生薑。

碧玉散

黃蘗末

紅棗肉各五錢
燒炭存性

共研極細末。香油調搽患處。

〔方歌〕碧玉散搽燕窩瘡。色紅疔瘡津水黃。毒家藥末香油拌。消疹止癢滲濕方。

雀斑

雀斑



雀斑淡黃碎點形。火鬱孫絡血風成。犀角升麻丸常服。正容散洗漸無痕。(註)此證生於面上。其色淡黃。碎點無數。由火鬱於孫絡之血分。風邪外搏。發爲雀斑。宜常服犀角升麻丸。並治一切粉刺酒刺。黶黶醫下。妙證。外用時珍正容散。早晚洗之。以澤其肌。久久自愈。亦有水虧火滯而生雀斑者。宜服六味地黃丸。

犀角升麻丸

犀角一兩
五錢

升麻一兩 羌活一兩 防風一兩 白附子五錢

白芷五錢

生地黃一兩

川芎五錢

紅花五錢

黃芩五錢

甘草二錢
五分

各研細末。合均蒸餅爲小丸。每服二錢。食遠臨臥。用茶清送下。

(方歌)犀角升麻治雀斑。黶黶醫下亦能痊。犀升羌防白附芷。生地芎紅芍草丸。

時珍正容散

豬牙皂角

紫背浮萍

白梅肉

甜櫻桃枝各一兩

焙乾。免鷹糞白三錢。共研爲末。每早晚用少許。在手心內。水調濃搽面上。良久以溫水洗面。用至七八日後。其斑皆沒神效。

(方歌)正容散洗雀斑容。豬牙皂角紫浮萍。白梅櫻桃枝鷹糞。研末早晚水洗靈。

六味地黃丸

懷熟地八兩

山萸肉

懷山藥各四兩
兩妙

白茯苓

丹皮

澤瀉各三兩

其爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二錢。空心淡鹽湯送下。

〔方歌〕六味地黃善補陰。能滋腎水並生津。萸苓山藥丹皮瀉。研末蜜丸服最神。

黑痣圖



黑痣生於面部

黑痣

黑痣生而微點斑。小如黍粒豆形圓。孫絡之血陽束結。挑破水晶膏點痊。(註)此證生於面部。形如黴點。小者如黍。大者如豆。比皮膚高起一線。有自幼生者。亦有中年生者。由孫絡之血。滯於衛分。陽氣束結而成。宜用線鍼挑破。以水晶膏點之。三四日結痂。其痣自落。用貝葉膏貼之。兼成醫醋。愈後無痕。

水晶膏

礬子石灰水化開。取末五錢。又用濃礬水多半茶鐘。浸於石灰末內。以礬水高石灰二指爲度。再以糯米五十粒。撒於灰上。如礬水滲下。陸續添之。泡一日一夜。冬天兩日一夜。將米取出。搗爛成膏。挑少許點於痣上。不可太過。恐傷好肉。

〔方歌〕水晶膏能點黑痣。礬水浸灰入糯米。一日一夜米泡紅。取出搗膏效無比。

貝葉膏見潰瘍門

黛黑肝黯

肝黯如塵久昏暗。原於憂思抑鬱成。大如蓮子小赤豆。玉容久洗自然平。〔註〕此證一名黛黑斑。初起色如塵垢。日久黑似煤形。枯暗不澤。大小不一。小者如粟粒赤豆。大者似蓮子芡實。或長或斜或圓。與皮膚相平。由憂思抑鬱。血弱不華。火燥結滯而生於面上。婦女多有之。宜以玉容散早晚洗之。常用美玉磨之。久久漸退而愈。戒憂思勞傷忌動火之物。

玉容散

白牽牛

團粉

白斂

白細辛

甘松

白鴿糞

白及

白蓮蕊

白芷

白朮

白殭蠶

白茯苓各一兩

荆芥

獨活

羌活各五錢

白附子

麝條白

白扁豆各一兩

防風五錢

白丁香一兩

共研末。每用少許。放手心內。以水調濃搽面上。良久再以水洗面。早晚日用二次。

(方歌) 玉容散透蘂好麝。牽牛團粉斂細辛。甘松鴿糞及蓮蕊。芷朮殭蠶白茯苓。荆芥獨羌白附子。麝條白扁豆防風。白丁香共研爲末。早晚洗面去斑容。

御纂醫宗金鑑卷四

編輯外科心法要訣

腦疽圖



腦疽在項後入髮際正中屬督脈經

偏腦疽圖



偏腦疽在項後入髮際旁屬膀胱經

項部

腦疽

腦疽項正屬督脈。左右偏腦太陽經。陽正陰偏分難易。治與癰疽大法同。(註)此疽有正有偏。正屬督脈經。入髮際名爲腦疽。俗名對口。偏屬太陽膀胱經。名爲偏腦疽。俗名偏對口。正腦疽係陽亢熱極而生。其證多嫩赤腫痛。色鮮紅活。根束頂尖。時痛時止。督脈純陽。草於尾闕。上貫頭頂。挾毒上升。故易膿易腐易斂。次屬順證。若偏腦疽。係寒熱錯雜所生。其證漫腫。色暗平塌堅硬。然足太陽經外陽內陰。從頭走足。陽降難凝。難膿難腐斂。多屬逆證。更有食風蟲者。其瘡根又易於散大旁流。故順逆二證。治法當辨別是癰是疽。腦癰者皮薄易破。腦疽者皮厚難破。初起有表證。令人寒熱往來。宜服荊防敗毒散。有裏證令人口唇焦紫。大渴大便結燥。宜服內疎黃連湯。若瘡勢已成。按癰疽腫瘍潰瘍門大法治之。

荊防敗毒散 荊芥 防風 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 川芎

枳殼 麩炒

茯苓各一

人參

甘草各五分

薑三片 水二鐘 煎八分 食鹽服 藥甚加葱三枝。

(方歌) 荊防敗毒治初瘡 增氣壯熱汗出良 羌獨前柴荊防桔 芎枳參苓甘草強。

內疎黃連湯見腫瘍門

天柱疽圖



天和疽生項後六椎骨為大癰

天柱疽

天柱疽生天柱骨。上焦鬱積蓄督經。灸之有炮方為順。色黑形陷逆而凶。(註)此疽生於項後高骨。名天柱骨。即大椎骨也。疽之初起。形如臥蠶。由上焦鬱積。蓄於督脈。以致肩背拘急極癢入骨。宜於疽上以艾灸之。若灸之有炮者順。無炮者逆。甚至色黑形陷。血出不止。潰爛神昏。嘔噦惡心等證。是為大凶。其內外治法同腦疽。

魚尾毒圖



魚尾毒

魚尾毒生後髮角。在左右淺而輕。膀胱濕熱七日潰。膿出腫消痛自寧。(註)此毒生於項後髮際兩旁之處。由足太陽膀胱經濕熱凝結而發。其毒或在左或在右。皆屬輕淺。初起宜煎防敗毒散。膿將成。宜服托裏排膿湯。其外治之法。同癰疽腫瘍潰瘍諸證。

托裏排膿湯

當歸

白芍酒炒

人參

白朮土炒

茯苓

連翹去心

金銀花

浙貝母

名一錢
去心

生黃耆一錢

陳皮八分

肉桂六分

桔梗胸之上
加一錢

牛膝下部加
八分

白芷頂之上
加五分

甘草四分

薑一片、水三鍾。煎一鍾。食遠溫服。

(方歌) 托裏排膿治潰瘡。排膿消腫實稱強。歸芍四君調桂芷。銀耆貝桔膝陳良。

荆防敗毒散見腦疽

百脈疽圖



百脈疽

百脈疽生腫色形。引耳繞頸色紫紅。痛熱不食氣逆厥。刺出膿血血出因。(註)此疽初發。漫腫大小數塊。環繞頸項。其色紫紅。痛熱不食。氣逆欬嗽。其發引耳。十五日可刺。遲則毒攻咽喉。刺見膿者順。見血者逆。餘治法。按癰疽腫瘍潰瘍門。

結喉癰圖



結喉癰生項前頸下結喉裏

結喉疽

結喉癰發項前中。肝肺積熱塞喉因。膿成若下急速刺。潰穿咽喉何以生。(註)此癰發於項前結喉之上。名猛疽。以其毒勢猛烈也。蓋項前之中。經屬任脈。兼肝肺二經積熱變憤所致。腫甚則堵塞咽喉。湯水下。其凶可畏。若膿成不斂。向內潰穿咽喉者則難生矣。初宜服黃連消毒飲。外敷一味拔毒散。將潰調治。法。按癰疽腫瘍潰瘍門。

黃連消毒飲

見頭部百會疽

一味拔毒散見腫瘍門

夾喉癰



天喉癰生結喉二旁

夾喉癰

夾喉癰生喉兩旁。肝胃毒熱發其疔。癰與結喉掣同治。尤嫌痰壅不時嘔。 (註) 此癰一名夾疽。生於結喉之兩旁。屬足厥陰肝經足陽明胃經火毒上攻而致。其治法與結喉癰同。

火陽經癰瘰



火陽經癰瘰左右同

太陽經濕癰圖



太陽經濕癰腫生髮際下與偏腦疽異

馬刀癰癰圖



形如長蛤名馬刀癰

圖癰瘰經明陽



陽明經癰瘰其形不一而接數枚

圖癰瘰臺重



臺重癰瘰少陽陽明二經客住此證

癰瘰

小瘰大瘰三陽經。項前項後側旁生。癢濕氣筋名雖異。總由志忿鬱熱成。更審纏綿者急治。成勞日久不收功。(註)此證小者爲瘰。大者爲癰。當分經絡。如生於項前。屬陽明經。名爲瘰癧。項後屬太陽經。名爲

濕瘰。項之左右兩側。屬少陽經。形軟。遇怒即腫。各爲氣瘰。堅硬筋縮者。名爲筋瘰。若連綿如貫珠者。即爲瘰癧。或形長如蛤蜊。色赤而堅。痛如火烙。腫勢甚猛。名爲馬刀瘰癧。又有子母瘰。大小不一。有重瘰。瘰上堆疊三五枚。盤疊成攢。有鵝項而生者。名蛇蟠瘰。如黃豆結囊者。又名鎖項瘰。生左耳根名蜂窩瘰。生右耳根名惠突瘰。形小多癢者。名風瘰。頰腫痛者。名爲燕窩瘰。延及胸液者。名瓜藤瘰。生乳旁兩腋軟肉等處者。名疽癩瘰。生於偏身。漫腫而軟。囊內含硬核者。各流注瘰。獨生一箇。在頰門者。名單窠瘰。一包生十數個者。名蓮子瘰。堅硬如磚者。名門凹瘰。形如荔枝者。各石瘰。如鼠形者。名鼠瘰。又名鼠瘡。以上諸瘰。推之移動爲無根。屬陽。外治宜因證用鍼灸敷貼蝕腐等法。涎之不移動者爲有根。且深屬陰。皆不治之證也。切忌鍼砭及追蝕等藥。如妄用之。則難收斂。瘰癧形名各異。受病雖不外痰濕風熱。氣毒結聚而成。然未有不兼恚怒鬱滯謀慮不遂而成者也。有外受風邪。內停痰濕。搏於經絡。其患身體先寒後熱。瘡勢宣腫微熱。皮色如常。易消易潰易斂此爲風毒也。如防風羌活湯。海菜丸。揀擇用之。有日時亢熱。暑濕偶中三陽經。兼過食膏粱厚味。釀結而成。其患色紅微熱。結核堅硬緩腫。難消潰遲斂遲。此爲熱毒也。如升陽調經湯。柴胡連翹湯。雞鳴散。隨證輕重。揀擇用之。有感冒四時疫厲之氣而成。其患耳項胸腋。驟成腫塊。宜發暴腫。色紅皮熱。令人寒熱。頭眩項強作痛。此爲氣毒也。如李果連翹散堅湯。散腫滯堅湯。俱可因證治之。有肝傷恚忿。血虛不能榮筋。其患核堅筋縮。推之不移者。此筋瘰也。初服舒肝潰堅湯。次服香貝養榮湯治之。有誤食汗液蟻鼠殘陳水宿茶不淨之物。其患初小後大累。累如貫珠。連接三五枚。不作裏熱。初不覺疼。久方知痛。此爲誤食毒物也。如楊氏家藏治瘰癧方。製成雞蛋。竅透虛實。揀擇用之自愈。其項後兩旁濕瘰。經屬膀胱寒水。外感風邪。與濕凝結。漫腫疼痛。皮色如常。有日久將

潰。皮色透紅。微熱痛甚。其內外治法。用藥總不宜寒涼。初腫宜用附子敗毒湯。外敷神功散。將潰已潰。俱按癰疽潰瘍內外治法。用藥首尾得溫煖即效。誤犯寒涼。令人項背拘強。疽勢塌陷。毒氣攻裏。便瀉者逆。但凡生瘰癧者。男子不宜太陽。青筋暴露。潮熱咳嗽。自汗盜汗。女人不宜限內紅絲。經閉骨蒸。五心煩熱。男婦有此。後必變瘡癆。俱爲逆證。難收功也。

防風羌活湯

治風毒癩癧。初發寒熱者。

防風

羌活各一錢

連翹二錢去心

升麻七分

夏枯草二錢

牛蒡子一錢炒研

川芎一錢

黃芩一錢酒浸

甘草五分

昆布一製酒洗

海藻一錢酒洗

殭蠶一錢酒炒

薄荷一錢

水煎服。

(方歌) 防風羌活驅癩方。風毒發熱最爲良。芎芩甘草翹麥草。夏枯海藻薄升蠶。

海菜丸

治風痰癩癧。透項而生。無寒熱者。常服消盡爲止。

海藻菜

蕎麥同炒過去麥不用

白殭蠶微炒去絲

右等分。爲細末。用白梅肉泡湯爲丸。如梧子大。飯後或臨臥時。每服六七十丸。米湯送下。兼忌魚腥。

厚味。

〔方歌〕海菜丸治風痿癱。海藻菜與白殭蟲。海湯爲丸如桐子。米湯送下病可痊。

升陽調經湯丸

治熱毒癰癤透於項下。或至頰車。此證由陽明胃經中來也。若其癰深遠。隱曲肉低。俱作塊子。堅硬大小不齊。並皆治之。或作丸服亦可。

升麻八錢

連翹去心

龍膽草酒炒

桔梗

黃連去鬚

京三棱酒炒

葛根

甘草各五錢炙

知母酒洗

廣茂各一兩酒炒

條黃芩六錢酒洗

黃蘗七錢去粗皮酒洗

右撮一劑。稱一半爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。或一百五十丸。一半研粗末。每用五錢。若胃強能食。大便乾燥者。可旋加至七八錢用水二鍾。先將粗末浸半日。煎至一鍾。去渣熱服時仰臥。伸脚置高處。去枕頭。嚙藥一口。作十次嚙之。一鍾將喫完。可留一口。將丸藥送下。服藥畢。臥如常。此治法也。

〔方歌〕升陽調經醫毒熱。項頰癰癢堅如鐵。升葛甘草知蘗棧。黃連膽草翹茂桔。

柴胡連翹湯

治男婦熱毒。馬刀瘰癧。食氣寒血滯。經閉等證。

柴胡

連翹去心

知母酒炒

黃芩各五錢酒炒

黃芩酒炒

生地

甘草各三錢炙

瞿麥穗六錢

牛蒡子二錢

炒研

當歸尾一錢

五分

肉桂三分

右共研粗末。每服三錢或五錢。水二大鍾。煎至一鍾。去渣食後熱溫服。

〔方歌〕柴胡連翹醫瘰癧。馬刀血滯與經閉。黃芩牛蒡歸藥知。瞿麥肉桂甘生地。

雞鳴散

治瘰癧疼痛。及熱毒結核。或多煩悶。熱而不寒者。

黑牽牛一兩

胡粉一錢

即定粉

生大黃二錢

朴硝煉成粉

者三錢

右共爲細末。每服三錢。雞鳴時井花水調服。以二便利爲度。如未利再服。

〔方歌〕雞鳴散治瘰癧癧。結核煩悶熱相乘。粉牽硝黃爲細末。井水調服便利通。

李杲連翹散臥湯

治氣毒瘰癧。耳下或至缺盆。或至肩上。生瘡硬如石。推之無根者。名馬

刀瘡。從手足少陽經中來也。或生兩脇。或已流膿。或未被並皆治之。

當歸酒洗

連翹去心

莢朮酒炒

京三棱各五錢

酒炒

土瓜根酒炒

龍膽草各一兩

酒炒

柴胡二兩

錢

黃芩一兩二錢

生用一牛酒炒

炙甘草六錢

黃連酒炒

蒼朮各三錢

炒

赤芍藥一錢

右以一半爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。或一百五十丸。一半研粗末。每用五錢。水一鐘。八分。先浸半日。煎一鐘。去渣熱服。臨臥頭低脚高。去枕而臥。每日作十次嚥之。留一口送下丸子。服畢如常安臥。

(方歌) 李杲連翹散堅湯、氣毒瘰癧馬刀瘡。歸芍柴苓稜莪草。土瓜龍膽黃連蒼。

舒肝潰堅湯

夏枯草

殭蠶各二錢炒

香附子酒炒

石決明各一錢五分生

當歸

白芍酒炒

陳皮

柴胡

撫芎

穿山甲各一錢炒

紅花

片子薑黃

甘草各五分生

引燈心五十寸。水三鍾。煎一鍾。食遠溫服。便燥者。加乳香一錢。便澇者。加煨牡蠣一錢。

(方歌) 舒肝潰堅湯開鬱。筋癱石疽柴決當。夏枯陳殭香附撫。紅花芍草甲薑黃。

散腫潰堅湯

治氣毒瘰癧。一切馬刀。結硬如石。推之有根者。如證從耳下串至缺盆。或至肩

上。或至脇下者。皆屬手足少陽二經所發也。若瘰癧循生下頰。或至頰車。堅而不潰者。屬足陽明經所發也。或二證已破。及流膿水者。並皆治之。服藥多少。臨證斟酌。量病入。飲食多少。大便軟硬。以意消息之。

柴胡梢四錢

龍膽草酒炒

黃蘗去粗皮酒炒

知母炒

花粉

昆布去上酒洗

桔梗各五錢

甘草根炙 京三稜酒炒 廣茂酒炒 連翹去心 當歸各三錢 白芍酒炒 葛根

黃連各錢 升麻六錢 黃芩梢八錢一半酒炒一半生用 海藻五錢

右共研末。每用六錢。或七錢。水一鍾。先浸半日。煎至一鍾。去渣熟服。服時於臥處伸脚在高處。頭低。每一啣口。分十次嚥之。至服畢依常安臥。取藥在胸中多之停留意也。另攪半料作細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服一百丸。此湯藥豫留一口。以送丸藥。

〔方歌〕 散腫潰緊氣滯滯。馬刀癩癩耳肩交。偏癩或至頰車骨。結硬如石用之消。知波三稜歸芍草。升芩在粉柴胡梢。葛根黃連廣茂桔。昆布龍膽藥連翹。

楊氏家藏治療方 治誤食毒物。致成癩癧。其功甚速。

荊芥 白殭蠶炒去絲 黑牽牛各錢 蟹螯二十八個去頭翅足大米炒

右爲末。臥時先將滑石末一錢。用米飲調服。半夜時再一服五更初即用溫酒調藥一錢或二三錢。量入之強弱用之。服後如小水並無惡物。行下。次日早再用一服。仍不行。第三日五更初。先喫白糯米粥。再服煎藥一服。更用燈湯心。調琥珀重一錢服之。以小水內利去惡物爲愈。如尿孔痛。用青黛一錢。以甘草湯調下。其痛卽止。

〔方歌〕 梅氏家藏治療方。誤食諸毒成癰瘡。牽牛蟹發癰癩疥。爲末酒服量弱強。

法製蠶雞靈

治誤食毒物。致腋下生馬刀癩癢者。其功稍緩。

蟹發七個大

頭足

右將雞子一個。頂上敲開小孔。入蟹發在內。紙封固了。於飯上蒸熟。取出去殼。切開去蟹發。五更空心
和米飯同服。候小水通如米泔水。或如脂。則其驗也。如大便小水不通。卽服琥珀散三二貼催之。然後常
服炒蠶散。白消連翹丸尤佳。

〔方歌〕 製蠶雞蛋治馬刀。醜子一個入蟹發。紙封蒸熟去殼藥。同飯嚼服癩可消。

琥珀散

琥珀

黃芩

白茯苓

烏藥

車前子

瞿麥

茵陳蒿

石韋

紫草

茅根

連翹

各等分
去心

右爲極細末。每服三錢。用燈心湯調下。不拘時服。

〔方歌〕 琥珀散能利二便。瀉毒滯熱最稱奇。芩苓烏藥車瞿麥。茵草紫草翹宜。

妙靈散

服蠶雞蛋後。卽將此藥與內消連翹丸和兼常服。瘡愈方止。

海藻 川牛膝 何首烏 當歸酒洗 海螵蛸 桑寄生各一兩 海帶

青箱子酒洗 昆布酒洗 甘草節各五錢 木香二錢 沉香二錢

右爲細末。每服一錢。食後溫酒調下。

內消連翹丸 連翹二兩 核桃仁 白及 射干 夏枯草 土瓜根

去心

澤蘭葉 沙參 漏蘆各一兩

五錢

右爲細末。入核桃仁研勻。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三五十九。空心。食前或酒下。或鹽湯送下。

〔方歌〕內消連翹解毒。妙靈與此兩會服。核桃及射夏枯草。土瓜澤蘭沙漏蘆。

附子敗毒湯 治濕毒瘰癧。

羌活一錢 川附子一錢 白殭蠶三錢 前胡一錢 連翹一錢五分 生黃耆一錢五分

製

分

分

蔓荊子一錢 陳皮一錢 防風一錢 白茯苓一錢 金銀花二錢 青葙五分

五分

五分

節

引用生薑一片。水三鍾。煎一鍾。食遠溫服。

(方歌) 附子敢毒太陽經。濕毒痲癩漫腫疼。陳苓前草香羌活。銀花殭髮烈防風。

消核散

治頸項痰癭癩癧。不論男婦小兒。用之無不神效。

海藻三兩

牡蠣

元參各四兩

糯米八兩

甘草二兩

紅娘子

二十八個同糯米炒胡黃色去紅娘子川米

共研細酒調服一錢。或錢半。量人壯弱。

(方歌) 消核散治諸癩癧。男婦小兒用之愈。紅娘糯米炒胡黃。甘草元參藻牡蠣。

犀角丸

治諸般癩癧。心火上攻。兩目赤澀。服之有效。

犀角

青皮

黑牽牛半生半炒

陳皮各一兩

連翹五錢

薄荷二兩

皂角二枚

前五味。共研細末。用皂角去皮弦泡搗。以布絞取汁一盞。又用新薄荷搗取汁。同熬成膏。和入藥末內爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。食後滾湯送下。

(方歌) 犀角丸能除心火。諸般癩癧兼目紅。牽牛半生半炒用。陳薄皂角連翹青。

夏枯草膏

治男婦小兒憂思氣鬱。癩癧堅硬。肝旺血燥。極用退烈之劑。恐傷脾氣。以此膏常

京夏枯草一觔

牛

當歸

白芍酒炒

黑參

烏藥

浙貝母去心

殭蠶

各五錢

昆布

桔梗

陳皮

撫芎

甘草各三

錢

香附一兩

酒炒

紅花二錢

前藥共入砂鍋內。水煎濃湯。布濾去渣。將湯復入砂鍋內。漫火熬濃。加紅蜜八兩。再熬成膏。磁罐收

貯。每用一二匙。滾水沖服。兼戒氣怒魚腥。亦可用薄紙攤貼。瘰癧自消。

〔方歌〕夏枯草膏醫諸瘰。化硬消堅理肝虛。血燥憂思肝木旺。烈藥傷脾服此宜。歸芍貝殭香附桔。昆紅參

草撫陳皮。烏藥同熬加紅蜜。滾水沖服戒怒急。

瘰癧末潰敷方

金倍散

治瘰癧堅硬難消難潰。敷之神效。

整文蛤一枚

攪孔

金頭蜈蚣一條研

粗末

將蜈蚣末裝入文蛤內。紙糊封口。外再用西紙糊七層。曬乾。麩拌炒。以紙黑焦為度。去紙研極細末。

加麩香一分。再研勻。陳醋調稠。溫敷堅硬核處。外用薄紙蓋之。每日一換。

〔方歌〕金倍散敷擊瘰癧。蜈蚣末入文蛤中。紙糊曬乾同熬炒。加麩研之醋調靈。

神功散 治濕毒癩癧。敷之神效。

製川烏頭 嫩黃蘗各等分

共研細末。米醋調稠。溫敷腫處。每日一換。

〔方歌〕神功散敷濕癩癧。嫩黃蘗與川烏頭。等分爲末加米醋。調塗腫處即能瘳。

李杲龍泉散 治諸般癩癧。未成者消。已成者潰。

瓦粉即定粉 龍泉粉即礬刀石上粉也 我朮酒浸炒乾 京三稜酒浸炒乾 昆布各五錢去土酒洗

右共研極細。滾水調塗患處。用此消堅尤速。

〔方歌〕李杲龍泉敷諸癩。瓦粉龍泉我朮梭。昆布共研爲細末。滾水調塗速又靈。

朱震亨貼癩癧餅 治項間癩癧。不辨肉色。不問大小。及日月深遠。或有赤硬腫痛。並皆貼

之效。

生山藥 蓖麻子肉

右等分。搗勻攤貼之。

(方歌) 靈寶疔瘰癧可移。寬麻山藥共研泥。不問日久並腫硬。作餅貼之效更奇。

神效瘰癧方

治瘰癧初起。消腫止痛。

白膠香

海螵蛸

降真香

心無上
氣者

右等分研末。溫水調稠。薄紙攤貼。

(方歌) 神效瘰癧實良方。疎滯消腫止痛強。未破已前用之效。白膠海螵降真香。

龍珠膏

龍牙草五兩即
馬鞭草

棘棗根五錢

海藻二錢
五分

蘇木五錢

右細切。水二十盞。煎至十二三盞去滓。又用桑柴灰。蒼耳草灰。石灰各二盞半。紙兩層。先鋪籬底。次置三種灰於籬內。用滾水熱淋取灰汁十盞。澄清同前湯入鍋內。熬成膏。用巴豆霜。白丁香。石膏。麝香。輕粉。各少許研細入膏內。攪勻。磁罐收貯。取敷核上。再敷時去舊藥。其核即潰。根小者但塗於根上。其核自潰。

(方歌) 龍珠膏敷瘰癧瘡。潰遲未潰敷之良。海藻蘇木龍牙草。再加棗根共煎湯。桑石蒼耳灰淋水。同煎成膏添麝香。石膏白丁香巴豆。研入膏內塗瘰癧。

瘰癧潰後方

蟾酥熬子

蟾酥黃豆大
一塊

白丁香十五
粒

寒水石黃豆大
一塊

巴豆十粒
去殼

寒食麵黃豆大
一塊

右各研細。共合一處。再研勻。煉蜜揉成熬子。每用一根。用鍼將瘰癧當頂鍼一孔。插熬子入孔內。用綠雲膏蓋貼。連插三日後。單換膏藥。候十日後。頑根自脫。以膿淨硬退為效。如硬未盡。再用。以盡為度。

(方歌) 蟾酥熬子化堅方。瘰癧將潰納入瘡。寒水石共巴豆肉。寒食麵與白丁香。

五雲膏

專貼鼠瘡馬刀瘰癧已潰。

銀黝子四兩
連碎

黃丹八兩
飛過

黃油二十
兩

用砂鍋一口。盛香油。火溫候油熱。將銀黝子投入油內。用桃柳桑槐棗五樣樹枝攪之。候起珍珠花時。撈去渣。用布濾淨。復將油下入鍋內。慢慢將黃丹篩入油內。用五枝不住手攪之。以滴水成珠為度。取出收貯。用時勿令見火。以重湯炖化。紅緞攤貼。

(方歌) 五雲膏貼鼠瘡證。瘰癧潰後共馬刀。銀黝油熬渣濾淨。黃丹五枝攪成膏。

綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

元參

黃蘗

木鱉子各一錢
去殼

右藥共切片。用香油一兩。蝶焦色。去渣。入淨松香五兩。再熬成膏。傾入水中。扯散令金黃色。入銚內。再熬數滾。候溫。將豬膽汁三枚。銅綠三錢。預用醋一兩。浸一宿。細濾去渣。同人膏內。用柳枝攪之。候冷爲度。用時以重湯炖化。薄紙攤貼甚效。

〔方歌〕綠雲癩破貼最神。軍藥連龍元參芩。油燥澆渣加松脂。膽汁銅綠入裏勻。

蛇脫膏

· 蜜蜂二十
一個

蛇脫七分
半

蜈蚣二條
端午前收者佳

右用香油四兩。將前三藥入油。用文武火燥枯。撈去渣。入定粉二兩。用如筋粗桑枝七條。急攪。候冷。出火氣七日夜。方用紙攤貼患處。

〔方歌〕蛇蛻膏貼潰後癩。專消餘毒功效極。蜈蚣蜜蜂燥去渣。定粉油熬出火氣。

九治癩癬馬刀潰破之後。應用方藥。氣血兩虛。宜八珍湯。堅硬未消者。宜香貝養榮湯。食少便瀉者。宜香砂六君子湯。血虛肝熱。或瘡口出血。或紅腫者。宜逍遙散。加丹皮炒梔子。瘡口斂遲。宜用十全大補湯。而白斂。虛煩不寐者。宜歸脾湯調理。俱藥劑大小。量人歲數虛實。斟酌用之。

八珍湯見潰瘍門

香貝養榮湯見石瘡門

香砂六君子湯見潰瘍門

逍遙散見背部上搭手

十全大補湯見潰瘍門

歸脾湯見乳部乳中結核內

益元散見六乙散加硃砂少許見胸部蠱疽

上石疽圖



上石疽

石疽生於頸項旁。堅硬如石色照常。肝鬱凝結於經絡。潰後法依擦癰瘡。(註)此疽生於頸項兩旁。形如李。皮色如常。堅硬如石。舉痛不熱。由肝經鬱結。以致氣血凝滯經絡而成。此證初小漸大。難消難潰。潰難斂。疲頑之證也。初起氣實者。宜服舒肝潰堅湯。氣虛者。宜服香貝養榮湯。外用葱白蜂蜜搗泥敷貼。日久不消者。以陽燈鏡每日灸之。以或消或軟或將潰為度。既潰法同擦癰。

香貝養榮湯

白朮二錢
土炒

人參

茯苓

陳皮

熟地黃

川芎

當歸

貝母去心

白附酒炒

白芍各一錢

酒炒

桔梗

甘草各五

分

薑三片。棗二枚。水二鍾。煎八分。食遠服。胸膈痞悶。加枳殼木香。飲食不甘。加厚朴蒼朮。寒熱往來。加柴胡地骨皮。膿潰作渴。倍人參當歸白朮。加黃耆。膿多或潰。倍當歸白芍。臍下痛成瘡。加青皮木香。

肌肉生遲。加白蘇肉桂。癢多。加半夏橋紅。口乾。加麥冬五味子。發熱。加柴胡黃芩。渴不止。加知母赤小豆。潰後反痛。加熟附子沉香。膿不止。倍人參當歸。加黃耆。虛煩不眠。倍人參熟地。加遠志棗仁。

(方歌) 香貝養榮用四君。四物貝桔香附陳。氣血兩虛宜多服。筋癢石疽效如神。

陽燧錠見首卷

烙法

舒肝潰堅湯見癰

癰門



失榮證

失榮耳旁及項肩。起如瘰核不動堅。皮色如常日漸大。憂思怒鬱火凝然。日久氣衰形削瘦。愈潰愈硬現斑。腐爛浸淫流血水。瘡口翻花治總難。(註)失榮證。生於身之前後。及肩項。其證初起。狀如瘰核。世之不動。堅硬如石。皮色如常。日漸長大。由憂思悲怒氣鬱血道。與火凝結而成。日久難愈。形氣漸衰。肌肉削瘦。愈潰愈硬。色現紫斑。腐爛浸淫。滲流血水。瘡口開大。努肉高突。形似翻花瘰證。古今雖有治法。終屬敗證。但不可棄而不治。初宜服和榮散堅丸。外貼阿魏化堅膏。然亦不過苟延歲月而已。

和榮散堅丸

治失榮。調和榮血。散堅開鬱。

川芎

白芍酒炒

當歸

茯苓

熟地

陳皮

桔梗

香附

白朮各一錢

土炒

人參

甘草炙

海粉

昆布

貝母各五錢

去心

升麻

紅花各三

錢

夏枯草

一觔熬湯再加紅蜜四兩再熬成膏

共研細末。夏枯草膏合丸。如梧桐子大。每服三錢。食遠白滾水送下。身熱。加黃芩柴胡。自汗盜汗。去升麻。倍人參。加黃耆。飲食無味。加藿香砂仁。飲食不化。加山查麥芽。胸痞悶。加澤瀉。香。欬嗽痰氣不清。加杏仁麥冬。口乾作渴。加知母五味子。睡眠不寧。加黃蘗遠志紫仁。驚悸

健忘。加茯神石菖蒲。有汗惡寒。加薄荷半夏。無汗惡寒。加蒼朮藿香。婦人經事不調。加延胡索丹皮。腹脹不寬。加厚朴大腹皮。

〔方歌〕和營散堅丸消滲。開結益虛理肝脾。八珍貝桔陳香附。昆海升紅枯草宜。

阿魏化堅膏

用蟾酥丸藥末一料。金頭蜈蚣五條。炙黃去頭足。共研勻。將太乙膏二十四兩。重湯炖化。離火入前藥末攪。冷爲度。每用時以重湯炖化。用紅絹攤貼。半月一換。輕者漸消。重者亦可少解。常貼可保不致翻花。

〔方歌〕阿魏化堅消結聚。蟾酥丸料研末細。蜈蚣炙黃太乙膏。炖化攪勻功速極。

太乙膏見潰瘍門

蟾酥丸見潰瘍門

鈕扣風圖



鈕扣風

鈕扣風生胸頸間。風濕結聚搔癢難。延及成片浸汁水。因地而名當辯看。(註)此證生於頸下。天突穴之間。因汗出之後。邪風襲於皮裏。起如粟米。搔癢無度。抓破津水。誤用水洗。浸淫成片。輕者外敷獨勝散。冰硫散。甚者宜服消風散即愈。

獨勝散

芥菜花一味。研細醋調患上。

(方歌)獨勝散治鈕扣風。已破未破用煤靈。內只芥菜花一味。止癢消腫有奇功。

冰硫散

硫黃一錢

潮腦

川椒

生白礬各二錢

錢

共爲細末。先用白蠟化一個。掏空將藥填滿。用蘿蔔皮蓋之。紙包三四層。炭火內煨半時許。待冷將藥取出。同熟豬脂油調搗搽患上自愈。

〔方歌〕冰硫散肉首硫黃。潮腦椒礬用最良。蘿蔔掏空雞填滿。油調專搽鈕扣瘡。

消風散

治鈕扣風。騷癢無度。抓破津水。亦有津血者。

荆芥 防風 當歸 生地苦參 蒼朮炒 蟬蛻 胡麻仁 牛蒡子炒研

知母生 石膏各一 甘草生 木通各五分

錢煨

水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕消風止癢散風濕。木通蒼朮苦參知。荆防歸旁蟬膏草。胡麻生地水煎之。

背部

上中下發背

三發火毒發督經。中發屬肝對心生。上發屬肺天柱下。下發屬腎臍後癡。(註) 上中下三發背。俱屬督脈經。皆由火毒而成。上發背火毒傷肺。生天柱骨下。一名脾肚發。其形橫廣如肚。中發背。火毒傷肝。生於脊心。一名對心發。其形中闊。兩頭有尖如瓜下發背。火毒傷腎。生於腰中。一名對臍發。其形平漫如龜。初起皆形如粟米。其焮痛麻癢。周身拘急。寒熱往來。因循數日。突然大腫。氣實者多焮痛。氣虛者多麻癢。初起治法。不論虛實。即宜隔蒜灸。灸之不應。則就患頂當肉灸之。至知痛爲效。以大化小。移深居淺。灰後用鍼。當瘡頂點破一孔。隨用拔法。務使毒氣內外疎通。庶不致內攻。如有表證。發熱惡寒無汗者。宜刑防敗毒散汗之。如有裏證。發熱惡熱大便燥者。宜內疎黃連湯下之。表裏證兼有者。宜神授衛生湯雙解



之以減瘡勢。膿將成。心行託裏。如潰破腐肉不去。外貼巴膏以化之。其餘治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。
 此三證。無論老少。總以高腫紅活。癰者爲順。若漫腫塌陷焦枯紫黑者爲逆。

荆防敗毒散

癰疽門

內疎黃連湯

神授衛生湯俱見腫瘍門

巴膏見潰瘍門
膏藥類方

上搭手圖



上搭手

上搭手生肺俞穴。左右名同經有別。右屬肺分左屬肝。總由氣鬱痰凝結。(註)此證生於足。太陽膀胱經肺俞穴。在兩肩骨之動處。無論左搭手。右搭手。其名雖同。而偏在左者屬肝。偏在右者屬肺。故曰經有別也。總由氣鬱痰凝結而成。初宜神授衛生湯燻解之。次以逍遙散清之。兼以六鬱湯調之。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

逍遙散

當歸酒洗

白芍酒洗

白茯苓

白朮土炒

香附下二錢
酒炒

柴胡八分

黃芩五分

陳皮一錢

薄荷五分

甘草六分
生

水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕逍遙散能和氣血。開鬱行滯又消結。歸芍苓朮香柴芩。陳薄甘草清淨煎。

六鬱湯

香附酒炒

茯苓

陳皮

半夏製

川芎

山梔各一錢

蒼朮炒

縮砂仁

甘草各五
分生

薑三片。水二鍾。煎八分服。

〔方歌〕六鬱湯能開六鬱。取其消痰又行氣。芍縮二陳蒼山梔。香附生薑兼化滯。

神授衛生湯見腫瘍門

中搭手

中搭手生近膏肓。經屬膀胱脊骨旁。七情不和憤怒火。虛實寒熱細參詳。(註)此證生在脊骨兩旁。屬足太陽膀胱經膏肓穴。一名膵疽。由七情不和。憤怒火凝而生。遇氣寒而實。便燥不渴者。宜一粒金丹溫下之。若氣熱而實。便燥大渴者。宜內疎黃連湯寒下之。若氣血虛。痞不能發長者。宜內托黃耆散托補之。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

中搭手圖



一粒金丹

木香

乳香各五

巴豆霜一錢

沉香五分

分

五分

各爲細末。和勻。用肥膠囊個半。去皮核。搗爛和藥末爲丸。如芡實大。每服一丸。細嚼用白滾水。一口將藥送下。少頃再飲白滾水。一口。即瀉一次。若飲滾水三口。即瀉二次。遇胃氣壯實。兼毒滯盛者。服

藥後連飲滾水三四口。即瀉三四次。不可太過。毒滯瀉盡。即以米飲補之。

(方歌) 一粒金丹療惡瘡。寒實不渴便燥良。木乳沉香巴豆肉。棗肉爲丸服即康。

內托黃耆散 當歸 白芍炒 川芎 白朮土炒 陳皮 穿山甲炒研 皂刺

黃耆各一 檳榔三分 紫肉桂五分

錢

水二鍾。煎八分。食前服。

(方歌) 內托黃耆治瘍虛。託裏諸瘡用最宜。歸芍芎朮陳皮桂。山甲檳榔皂刺普。

內疎黃連湯見腫瘍門

圖手搭下



下搭手在脊第十四節之後關三寸盲門穴

下搭手

下搭手生經膀胱。穴在背門腰窩旁。房勞過度生毒火。紫陷腐爛透膜腸。(註)此證發於腰窩旁開三寸。臍足太陽膀胱經。背門穴。由房勞過度。有傷腎水。水竭不能制火。火旺以致榮枯不和。逆於肉裏而生也。初發紅活痲腫。令人寒熱往來。口渴煩躁。百節疼痛。宜服仙方活命飲。宣解毒火。次服內托黃耆散。托毒發長。將潰內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。若初腫腰藍痛如折。不能俯仰者險。若色紫塌陷。腐爛孔深。透膜透腸者逆。

仙方活命飲

見腫瘍門

內托黃耆散

見前中搭手

蓮子發



蓮子發

蓮子發名取象形。瞻與膀胱毒化成。形斜平塌侵督。形長高腫半背經。(註)此證一名太陰疽。生於脊背及兩脇。屬膽與膀胱經。火毒合化凝結而成。若形斜平塌。頭侵督脈。尾站助。皆屬毒重。若形長高腫。偏於半背。中不過督脈。旁不過肋骨。屬毒輕。遇氣實之人。初宜蠟酥丸。或麥靈丹汗之。次宜一粒金丹。之。遇氣虛之人。初宜仙方活命飲宣解之。次宜內托黃耆散托補之。其餘內外治法。俱宜按癰疽腫瘍潰瘍門。

蠟酥丸見癰疽門

仙方活命飲見癰疽門

一粒金丹

內托黃耆散俱見前中搭手

麥靈丹見癰疽門

蜂窩發



蜂窩發

蜂窩發似蜂房形。每在肩後脊旁生。此證最忌頭向上。急清心火免內。 (註)此證多生肩後。及脊旁。形似蜂房。由脾經積熱更兼心火凝結成毒。初起高腫如龜形。腫脹半背者。宜麥靈丹。潰爛大者。宜服內托黃耆

滿。若頭尖向上。惡心火熱極。防毒火內攻臟腑。亦有瘡形長若尺許。根橫滿背。名爲竟體疽。屬毒甚險。初覺宜急服黃連消毒飲。清心解毒庶免內攻。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

內啞黃連湯見腫瘍門

傷門

黃連消毒飲見頭部百會疽

陰陽二氣疽



陰陽二氣疽

陰陽二氣疽

陰陽二氣疽者。腫消軟硬變不常。七情內乖逆榮衛。如期膿潰自無妨。(註)此證生於脊背之旁。乍膿乍消。時軟時硬。由七情內乖。榮衛不和而生也。初發令人寒熱往來。若大渴神清。高腫脈洪。二七膿成。潰破者順。若不渴神昏。漫腫脈細。應期無膿。飲食不思者逆。初服奪命丹以退寒熱。次服仙方活命飲。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

奪命丹

輕粉

麝香

白砒

各五分麵裏火煨

白礬

辰砂為衣

血竭各一錢

雄黃二錢

蟾酥

二錢乾者酒化入藥

乳香

沒藥

寒水石煨

銅綠各二錢

蝸牛二十一箇蓮殼

右為細末。先將蝸牛研爛如泥。勻合前藥。丸如不成。加好黃酒少許。打三五百下為丸。如茶豆大。每服二、三丸。先用葱白一寸。令病者嚼爛。自吐於手心內。男用左手。女用右手。將藥丸裹入葱泥內。用無灰酒一大鐘。溫熱送下。被蓋汗出為度。重者不過三服。不可多用。

〔方歌〕奪命丹中粉麝香。砒礬砂竭共雄黃。蟾酥乳沒兼寒水。銅綠蝸牛用最良。

仙方活命飲

見睡傷門

串疽圖



串疽生於背脊或脇

串疽

串疽生於背脇間。連發相串色依然。漫腫漸紅多界痛。積憤鬱火是其原。(註)此證生於背脇之間。初發一處。其後挨次發出二三處。形雖不同。而色仍同也。潰後多相串通。故又名老鼠竇。又名遊走血脾癰。初發漫腫無頭。皮色如常。漸腫漸透紅色。多疼牽引旁處舉痛。因積憤鬱火而成也。初服仙方活命飲宜解毒。其次內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

仙方活命飲見腫瘍門



酒毒發

酒毒發生滿背間。皮色不變如彈拳。堅硬麻木而微內。藥酒厚味使之然。(註)此證生於背背。皮色不變。

景景如彈如拳。堅硬如石。時麻時木痛徹五內。二便澀滯。週身拘急。數日後頭面手足虛腫。泄瀉似痢。緣由過飲藥酒。更兼厚味積毒所致。初起宜服連翹消毒飲。次服內疎黃連湯。其證或消或潰。須宜速治爲順。若遷延日久。不消不潰。必腐爛筋骨。即成逆證。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

連翹消毒飲 連翹去心 梔子 桔梗 赤芍 當歸 元參 射干 黃芩

紅花 葛根 陳皮各一錢 甘草五分 大黃初起便燥 花粉一錢

生者加一錢

水二鐘。煎八分。食遠服。有痰者。加竹茹一錢。

一(方歌) 連翹消毒療諸瘡。能解酒毒葛大黃。紅花梔桔元參草。芍芩花粉射陳當。

內疎黃連湯見腫瘍門

連珠發圖



連珠發

連珠毒發貫珠形。在背微疹色淡紅。發時尿閉少腹滿。陰囊作腫百節疼。(註)此證生於背。不論左右。連
 腫三五塊。形若貫珠。由榮血火毒。或酒色過度而成。其瘡微痛。皮色淡紅。發時少腹脹滿小水閉澀。陰囊
 作腫。百節疼痛。初起宜服神授衛生湯。加木通車前。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

神授衛生湯見腫瘍門

丹毒發



丹毒發

丹毒發如湯火傷。細瘤赤暈渴非常。丹石剛劑致此證。紅活者生紫黯亡。(註)此證生於背。形如湯火所傷。細瘡無數。赤暈延開。發時其渴非常。由素服丹石剛劑所致。初服黃連消毒飲。兼國老膏服之。外用牛肉薄片貼之。其色紅活鮮潤神清者生。若紫黯神昏。更兼脈躁膨脹嘔噎者亡。

國老膏

甘草二觔

大者

錘碎。河水浸一宿。揉令漿汁濃。去盡筋渣。再用絹濾過。銀器內慢火熬成膏。用磁罐收貯。每服三錢。無灰酒調下。或白滾水亦可。

(方歌)國老膏能丹石毒。諸瘡用此腫即消。甘草二觔河水泡。取汁熬膏溫酒調。

黃連消毒飲 見頭部
百會疽

禽疽圖



禽疽勢如拳打紅紫疹痕

禽疽

禽疽毒由時氣成。數塊似疹色紫紅。背生形如拳打狀。拘急麻木不作疼。(註)此疽之毒。由時氣風熱而
成。始發數塊如疹。其色紫紅。在背而生。形如拳打之狀。脊背麻木拘急。並不作痛。神清脈和。服藥得汗
者順。若神昏脈躁。或微或代。發寒齒噤者逆。初宜急服仙方活命飲。加羌活獨活汗之。外敷二味拔毒散。
或蟬蛭拔毒散消之。若漫腫不潰。即服托裏透膿湯。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

仙方活命飲 二味拔毒散

蟬蛭拔毒散 俱見腫
瘍門

托裏透膿瘡 見頭部
百會疽

痰注發

痰注發如布袋形。按之木硬覺微疼。其發不紅亦不熱。濕痰七情鬱滯成。(註)此證發於脊背。長形如布袋。短形如冬瓜按之木硬。微覺疼痛。不熱不紅。皮色如常。由濕痰七情鬱滯凝結於肌肉之分。日積深久而成。初起宜服瘡科流氣飲。外貼金鳳化痰膏消之。如此證久遠疲頑。治之不消者。屆期要潰。治法俱按癰疽癩潰瘍門。



瘡科流氣飲 人參 厚朴薑製 桔梗 防風 紫蘇 黃耆蓋水 枳殼麩炒

當歸 白芍酒炒 肉桂 烏藥 甘草各七分 川芎 南木香 白芷 檳榔各五分

分

引用生薑一片。水二鐘。煎八分溫服。

(方歌) 流氣飲舒痰涎壅。人參朴桔芷防風。蘇耆葶桂木香草。烏藥檳榔歸芍芎。

金鳳化痰膏

鳳仙花一捧去青
蒂研末

大葱自然汁一茶
鍾

好米醋一茶
鍾

廣膠三錢切米粒大
入葱汁泡之

人中白八錢火微煨
存性研末

先將葱汁米醋廣膠。投入鍋內熬化。次下鳳仙花末。熬成膏。再入人中白末。將鍋離火不時攪勻。用時以重湯炖化。量痰包之大小。薄紙攤貼。候膏自落。再換新膏。

(方歌) 金鳳化痰消硬堅。濕痰串注貼更痊。鳳仙中白廣膠醋。葱汁同熬用紙攤。

黃瓜癰圖



黃瓜癰

黃瓜癰在背旁生脾火色紅黃瓜形。腫高寸餘長尺許。四肢麻木引心疼。(註)此證生於背旁。一名肉龜。由脾火積毒而成。皮肉色紅。狀若黃瓜。腫高寸餘。長可尺許。四肢麻木。疼痛引心。紅活速潰者順。紫陷脈微自汗譫語。堅硬潰遲者逆。初起宜服仙方活命飲。加羌活柴胡。或奪命丹治之。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

仙方活命飲

見腫瘍門

奪命丹

要陰陽二氣疽



腰發

腎俞發

腎虧發生腎俞穴。單者酒色發濕熱。房勞怒火則雙生。紅活黑陷順逆別。(註)此證生腎俞穴。在腰骨兩旁陷肉處。有單有雙。單者由酒色濕熱而成。雙者由房勞怒火而發。若瘡形紅活高腫。十四日膿屢順。若瘡形紫黑乾枯堅硬。應即無膿屢逆。或膿稀傷膜者。係真陽血氣大虧。初宜服人參養榮湯。或加減八味丸。以救其源。其順逆內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

人參養榮湯 加減八味丸見潰瘍門

中石疽圖



中石疽

石疽寒凝瘀血聚。生於腰膈最纏綿。堅硬如石皮不變。時覺木痛消潰難。(註)此證由寒凝瘀血凝結。生於腰膈之間。纏綿難以收功。其疽時覺木痛。難消難潰。堅硬如石。皮色不變。初宜內服沒藥丸。外用鮮商陸搗

爛。貼於患處治之。隨用艾壯當頂灸之。以軟為度。潰後按癰疽潰瘍治法。

沒藥丸 桃仁一兩 乳香 沒藥 川芎 川椒去目及合口者 當歸 赤芍各五錢

自然銅二錢五分 火 澆醋滓七次

共研細末。用黃蠟二兩。火化開。入藥末。不住手攪勻。丸如彈子大。每用一丸。以好酒一盅。將藥化開。煎至五分。乘熱服下。

(方歌) 沒藥丸治中石疽。乳沒桃芎歸芍宜。川椒自然銅黃蠟。用酒服之行血瘀。

纏腰火丹圖



纏腰火丹蛇串。乾濕紅黃似珠形。肝心脾肺風熱濕。纏腰已偏不能生。(註)此證俗名蛇串瘡。有乾濕不同。紅黃之異。皆如蠱蟻珠形。乾者色紅赤。形如雲片。上起風粟。作癢發熱。此屬肝心二經風火。治宜龍膽瀉肝湯。濕者色黃白水皴。大小不等。作爛流水。較乾者多疼。此屬脾肺二經濕熱。治宜除濕胃苓湯。若腰肋生之。係肝火妄動。宜用柴胡清肝湯治之。其間小兒。用線鍼穿破。外用柏葉散敷之。若不速治。纏腰已偏。毒氣入臍。令人膨脹悶嘔者逆。

龍膽瀉肝湯

龍膽草

連翹去心

生地

澤瀉各一錢

車前子

木通

黃芩

黃連

當歸

梔子生研

甘草各五分

生軍二錢便祕加之

水二鍾。煎八分。食前服。

(方歌)龍膽瀉肝火丹生。形如雲片粟多紅。芩連梔歸車歸尾。生地軍翹瀉木通。

除濕胃苓湯

蒼朮炒

厚朴薑炒

陳皮

猪苓

澤瀉

赤茯苓

白朮土炒

滑石

防風

山梔子生研

木通各一錢

肉桂

甘草各三分

水二鍾。燈心五十寸。煎八分。食前服。

(方歌)除濕胃苓火丹瘡。脾肺濕熱腹白黃。胃苓湯用通梔子。滑石防風共作湯。

柏葉散

側柏葉

炒黃
為末

蚯蚓糞

韭菜地
內者佳

黃礬

大黃各五

錢

雄黃

赤小豆

輕粉各三

錢

右為細末。新汲水調搽。香油調搽更效。

(方歌) 柏葉散搽火丹方。大黃赤豆麝雄黃。柏葉輕粉蚯蚓糞。研末香油調更良。

柴胡清肝湯見頭部

錢

眼胞菌毒圖



菌毒生於眼胞邊形如豆黃色水泡日久如圖形

眼部

眼胞菌毒

菌毒生於眼睫邊。如菌黃亮水胞圍。頭大蒂小漸垂出。脾濕鬱熱結癢堅。(註)此證生於上下眼胞睫邊。初如菌形。頭大蒂小。黃亮水胞。或有頭小蒂大者。漸長垂出。堅癢不痛。有纏綿經年不愈者。以致目病。蓋眼胞屬脾。其經素有濕熱。思鬱氣結而生也。初起宜用清涼圓洗即消。有經年皮厚。消之下應者。法當用蠟絲紙。蘸水潤眼皮菌毒處。少頃用左手大拇指。墊於患根。右手持蠟鍼尖端。齊根切下。血出不妨。即用

雲鏡。磨濃塗之。其血即止。內服涼膈清脾飲。忌海腥煎炒。

清涼圓 當歸尾 石菖蒲 赤芍藥各錢 川黃連生 地膚子 杏仁各一錢生

羌活五分 膽礬二分

共研粗末。以大紅綢包之。如櫻桃大。甜滾水浸泡。乘熱速洗。勿見塵土。

〔方歌〕清涼圓內用川連。歸尾菖蒲芍膽礬。羌活杏仁地膚子。菌毒初起洗之痊。

翠雲錠子 杭粉五兩 銅綠 黃連各一兩 輕粉一錢

共爲細末。用糯米百粒。水一盃。煎半盃。去米再煎。至三分。和藥作錠。陰乾。用時水磨令流。以雞翎蘸塗患處。

〔方歌〕翠陰錠子能止血。銅綠輕杭黃連強。共爲細末和成錠。菌毒切後塗之良。

涼膈清脾飲 生地黃 連翹去心 梔子生研 薄荷 荊芥 防風 石膏煨

黃芩 赤芍各一錢 甘草五分生

水二鍾。燈心二十根。煎八分。風遠服。

〔方歌〕涼膈清脾生地黃。連翹梔子薄荷防。石膏芩芍兼甘草。醫治菌毒服即康。

眼丹

眼丹圖



眼丹眼胞上下生。紅熱腫痛輭偏風。焮熱紫硬偏於熱。荊防敗毒服有功。(註)此證由脾胃濕熱。受風而
成。紅腫疼痛。若腫輭下垂。不能視物者。偏於風盛也。浮腫易消。若焮紅色。紫硬者。偏於熱盛也。硬
難消。初起俱宜荊防敗毒散散其風。口渴便燥者。宜內疎黃連湯瀉其熱。有日久消之不應者。宜服透膿散。
膿熱針之腫。用如意金黃散洗之。潰用琥珀膏或白膏藥貼之。此證宜速潰。遲則潰深穿透眼胞。成漏難斂。

荊防敗毒散

見項部
腦疽

內疎黃連湯

如意金黃散

透膿散

俱見腫
瘍門

琥珀膏

見頭部
髮際瘡

白膏藥

見潰
瘍門

鐵眼圖



鐵眼表後邊即小灣也

鐵眼

鐵眼眼腫豆粒形。輕者洗消膿不成。重則亦痛膿鐵愈。破後風侵浮腫生。(註)此證生於眼皮毛睫間。由脾經風熱而成。形如豆粒有尖。初起輕者。宜用如意金黃散。鹽湯沖洗。膿不成即消矣。風熱甚者。色赤多痛。洗之不消。膿已成也。候熱鐵之。貼黃連膏亦有破後邪風侵入。昏口。令人頭面浮腫。目赤澀痛者。外仍洗之。內服芎皮散即愈。

芎皮散

川芎二兩

青皮一兩

共爲末。每服一錢。菊花湯調服。或以精擦之。雞子清調敷腫處。又用南星末。同生地黃搗膏。貼太

陽穴自消。

(方歌) 芎皮散內用芎。青皮減半用最靈。爲末菊花湯調服。醫治鍼眼自成功。

如意金黃散見腫傷部 黃連膏見鼻部鼻瘡內

眼胞癢核圖



癢核不腫上下胞合赤及裏皮色如常

眼胞癢核

眼胞癢核濕氣鬱。核結如棗如豆形。皮裏肉外推之動。皮色如常硬不疼。(註)此證結於上下眼胞。皮裏肉外。其形大者如棗。小者如豆。推之移動。皮色如常。硬腫不疼。由濕痰氣鬱而成。宜服化堅二陳丸。外用生南星。蘸醋磨濃。頻塗眼皮。日數淺者即消。日數深者。雖不能即消。常於令皮薄。微微撥損。以手指甲擠出如白粉汁即消。貼貝葉膏收口。從眼皮裏潰破者難效。

化堅二陳丸

陳皮

半夏各一錢

白僵蠶二兩

白芷各一兩

錢

炒

五錢

甘草三錢 川黃連三錢

共研細末。荷葉湯合丸。如梧桐子大。每服二錢。白滾水送下。

(方歌) 化堅一陳丸消痰。週身結核服更痊。陳皮半夏茯苓草。殭蠶荷葉川黃連。

貝葉膏見潰瘍門

椒瘡圖



粟瘡圖



粟瘡生於上下眼皮裏形如黃水

椒瘡粟瘡

椒瘡粟瘡生胞裏。脾胃血熱是根苗。粟瘡黃軟濕易散。椒瘡赤硬熱難消。(註)此二證生於眼胞之裏。雖皆由脾胃血熱所致。然粟瘡偏於濕盛故色黃形軟其證易愈。椒瘡偏於熱盛故色赤形硬。其瘡難消。俱宜服清脾涼血湯。外以清涼圓洗之。若眼皮裏有紅絲堆壘者。乃血熱有瘀也。法以證草刮瘡處。令血出即愈。

清脾涼血湯

荊芥

防風

赤芍

黑參

陳皮

蟬蛻

蒼朮炒

白鮮皮各一錢

連翹去心

生大黃各一錢

分酒洗

厚朴薑炒

甘草各五分

錢

竹葉三十片。水煎其送服。

(方歌) 清脾涼血根粟瘡。厚朴陳皮鬱芍蒼。蜈蚣黑參荆防草。白鮮皮與生大黃。

清涼圓見菌毒

皮翻證圖



皮翻證

皮翻證係眼胞翻。狀如舌舐唇一般。翻因胞腫睫緊故。血壅氣滯胃經原。(註)此證由胃經血壅氣滯而成。小兒多有之。眼皮外翻。如以舌舐唇之狀。又如疔風眼爛。胞腫睫緊者。則眼皮亦翻。治宜瀉脾胃之積熱。以瀉黃散服之即愈。亦有內翻者。即目科拳毛倒睫。弦弛不內。外翻者即目科胞垂難視之證也。

瀉黃散

石膏五錢 梔子仁一兩 甘草三兩 防風二兩酒拌 稀莖草四兩酒
煨 生 生 微炒香 蒸晒乾

共研細末。壯人二錢。弱人一錢。小兒六七分。白滾水調下。
 (方歌) 瀉黃散治皮翻證。石膏梔子草防風。稀莖草同研細末。滾水調下有奇功。

漏睛瘡



漏睛瘡

漏睛瘡在大眇生。肝熱風濕病睛明。紅腫痛潰膿稠易。青黑膿稀難長平。(註) 此證生於目大眇。由肝熱風濕病。發於太陽膀胱經睛明穴。其穴之處。係淚淚之所。初起如豆如蠶。紅腫疼痛。瘡勢雖小。根源甚深。潰破出黏白膿者順。出青黑膿或如膏者險。初宜服疎風清肝湯。潰後用黃蠶漿。熬入瘡口。筆貼萬應膏。其口漸漸收斂。有膿從大眇內出者。成漏難斂。亦有瘡口過出淚液。以致目內乾澀者。收斂更遲。若潰斷眼邊弦者不治。

疎風清肝湯

當赤尾

赤芍

荊芥穗

防風

川芎

菊花

生梔子

薄荷各一錢

柴胡

連翹各一錢五分
分去心

金銀花二錢

甘草五分
生

燈心五十寸。水煎食遠服。

(方歌) 疎風清肝滯睛瘡。又除肝熱散風強。歸芍銀花芍菊草。柴翹梔子薄荷防。

黃靈藥

萬應膏俱見潰瘍門

目中努肉圖



目中努肉心火成。實火大背色深紅。小背紅絲淡虛火。努肉時覺或脹疼。(此) 此症生於目兩背。熱後努出。時覺疼痛。總屬心火所成。然火有虛實。如大背紅肉色深紅者。心經實火也。宜黑參湯服之。小背紅絲色淡紅者。心經虛火也。宜決明散主之。外俱用清涼圓泡洗。久久自愈。

黑參湯

黑參

苦參

梔子研

菊花

黃連

枳殼麩炒

草決明

車前子

防風

大黃炒

升麻各二錢

水煎。食後服。

(方歌) 黑參湯治大背疼。內生努肉實火成。苦參梔菊黃連殼。草決車防大黃升。

決明散

玉竹

黃連

枳殼麩炒

川芎

甘草生

羚羊角各一

兩鎊

車前子

青箱子

草決明各五錢

共研細末。每服三錢。食後服。臥時。再用一服。

(方歌) 決明努肉虛火攻。玉竹黃連枳殼芎。車前青箱羚羊草。研末水調最有功。

清涼圓見菌毒

鼻疽圖



鼻部

鼻疽

鼻疽生於鼻柱間。肺經鬱火發督原。堅硬色紫常木痛。千金仙方托裏痊。(註)此證生於鼻柱。屬督脈經。鼻爲肺竅。故又屬肺。由肺經鬱火凝結而成。堅硬色紫。時覺木痛。初宜服千金漏蘆湯。宜解鬱毒。次用仙方活命飲。加梔子木通薄荷桔梗酒之。若腫痛不減。勢欲作膿。則宜托裏透膿湯主之。外治法按癰疽潰瘍門。

千金漏蘆湯

漏蘆一兩

枳殼一兩

朴硝一兩

大黃一兩

甘草一兩

禁炒

五錢

生

麻黃一兩

黃芩一兩

白斂一兩

連翹一兩

升麻一兩

去心

共研末。每用二錢。水一鍾。薑三片。薄荷葉一錢。煎五分溫服。以取便利爲度。
 (方歌) 千金漏蘆鼻疽發。色紫緊疼效更嘉。漏蘆枳殼硝黃草。麻芩白斂翹升麻。

仙方活命飲

見腫瘍門

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

鼻疔圖



鼻疔在右鼻孔內疼痛異常

鼻疔

鼻疔生在鼻孔中。鼻竅腫引腦門疼。甚則唇腮俱浮腫。肺經火毒蟬離宮。(註) 此證生於鼻孔內。鼻竅腫塞。脹痛引腦門。甚則唇腮俱作浮腫。由肺經火毒。凝結而成。宜將蘇丸研末。吹入鼻竅。若腫硬外發。用雞宮錠塗之。此證初起之時。須當速治。遲則毒氣內攻。以致神昏嘔噦。鼻腫如瓶者逆。

蟾酥丸

見疔瘡門

離宮錠

見腫瘍門

鼻淵

鼻淵濁涕流鼻中。久淋血水穢而腥。膽熱移腦風寒火。控腦砂因蝕腦蟲。(註)此證內因膽經之熱。移於腦髓。外因風寒凝滯火邪而成。鼻中時流黃色濁涕。宜奇授養香丸服之。若久而不愈。鼻中淋瀝腥穢。血水頭眩虛暈而痛者。必係蟲蝕腦也。即名控腦砂。宜天羅散服之。但此證久則必虛。當以補中益氣湯兼服之即效。

奇授養香丸

藿香連枝葉八兩

研細末。雄豬膽汁和丸如梧桐子大。每服五錢。食後蒼耳子湯下。或黃酒送下。
(方歌) 奇授養香鼻淵流。濁涕淋漓久不休。豬膽汁合藿香末。蒼耳湯下患可瘳。

天羅散

絲瓜藤

近根處者
燒存性

爲末。每用三錢。食後黃酒送下。

(方歌) 天羅蟲蝕腦髓中。頭痛鼻流血水腥。絲瓜根燒研細末。黃酒調服慣殺蟲。

補中益氣湯

見潰瘍門

鼻齧瘡及生小兒鼻下兩

鼻齧瘡圖



鼻齧瘡

鼻齧瘡多小兒生。鼻下兩旁乳斑爛形。總由風熱客於肺。膿汁浸淫癢不疼。(註) 此證多生小兒鼻下兩旁。色紫斑爛。由風熱客於肺經。膿汁浸淫。癢而不痛。宜服澤瀉散。外搽青蛤散即愈。

澤瀉散

澤瀉

鬱金

山梔

甘草各一錢生

共研末。每服一錢。甘草煎湯調下。

(方歌) 澤瀉散治鼻齧患。膿汁浸淫肺火毒。澤瀉鬱金山梔草末。甘草煎湯調送服。

青蛤散

蛤粉一兩

青黛三錢

石膏一兩

輕粉

黃蘗各五錢

煨

煨

生末

共研細末。先用香油調成塊。次加涼水調稀。薄塗瘡處。

(方歌) 青蛤散塗鼻齧消。蛤粉青黛煨石膏。輕粉黃蘗研極細。香油拌塊涼水調。

鼻痔鼻瘡



鼻痔鼻瘡浸淫鼻孔難以潤靈圖

鼻瘡

鼻瘡肺熱生鼻中。燥乾如火微腫疼。內服黃芩外定痛。燥乾黃運膏潤靈。(註)此證生於鼻竅內。初覺乾燥疼。狀如粟粒。甚則鼻外色紅微。腫痛似火灸。由肺經壅熱。上攻鼻竅。聚而不散。致成此瘡。內宜黃芩湯清之。外用油紙粘辰砂定痛散。送入鼻孔內。若乾燥者。黃連膏抹之立效。

黃芩湯

黃芩二錢
酒炒

甘草五分
生

麥冬一錢
去心

桑白皮一錢
生

梔子一錢五分
連皮酒炒

連翹去心

赤芍

桔梗

薄荷

荆芥穗各一錢

水煎食後服。

〔方歌〕黃芩湯醫肺火盛。鼻內生痛赤腫空。芩草麥冬桑柘髓。赤芍桔梗薄荷煎。

辰砂定痛散 辰砂五分末 冰片二分 胡黃連 兩末 石膏一兩散

共研細末

〔方歌〕辰砂定痛鼻瘡乾。冰片胡連膏煨研。油紙摻藥入鼻孔。消疼散熱效通仙。

黃連膏 黃連三錢 當歸尾五錢 生地一兩 黃蘗三錢 薑黃三錢

香油十二兩將藥燥枯。撈去渣。下黃蠟四兩溶化盡。用夏布將油濾淨。傾入磁盤內。以柳枝不時攪之。候凝爲度。

〔方歌〕黃連一潤諸燥瘡。歸尾生地藥薑黃。油燻去渣加黃蠟。布濾摻凝塗抹強。

鼻痔

鼻痔初起榴子形。久垂紫硬礙氣通。肺經風濕熱鬱滯。內服辛夷外點平。〔註〕此證生於鼻內。形如石榴子。漸大下垂。色紫微硬。撐塞鼻孔。礙人氣息難通。由肺經風濕熱鬱。凝滯而成。內服辛夷清肺飲。以清肺熱。外以燥砂散。逐日點之。漸化爲水而愈。宜戒厚味暴怒。庶不再發。

辛夷清肺飲 辛夷六分 甘草五分生 石膏散 知母 梔子生研

黃芩各一 枇杷葉三片去毛蜜炙 升麻三分 百合 麥冬各一錢 去心

水二鐘。煎八分。食遠服。或加羌活防風連翹薄荷

(方歌) 鼻痔辛夷清肺飲。辛草膏知梔子芩。枇杷升麻百合麥。或加羌活清翹薄荷。

礞砂散見耳部
耳痔內

肺風粉刺圖



肺風鼻痔瘡疔形如黍屑赤腫痛破出粉汁白皮自腐如黍米

肺風粉刺

肺風粉刺肺經熱。面鼻疙瘡赤腫疼。破出粉汁或結屑。枇杷顛倒自收功。(註)此證由肺經血熱而成。每發於面鼻。起碎疙瘡。形如黍屑。色赤腫痛。破出白粉汁。日久皆成白屑。形如黍米白屑。宜內服枇杷清肺飲。外敷顛倒散。緩緩自收功也。

枇杷清肺飲

人參三分

枇杷葉一錢刷去毛

甘草三分

黃連一錢

桑白皮二錢鮮者佳 黃蘗一錢

水一鍾半。煎七分。食遠服。

〔方歌〕 枇杷清肺枇杷葉。參草苦連桑白皮。黃蘗同煎其是服。肺風疥刺盡皆宜。

顛倒散 大黃 硫黃各等分

研細末。共合一處。再研勻。以涼水調敷。

〔方歌〕 顛倒散敷功效極。大黃硫黃各研細。等分再勻涼水調。尚醫酒渣肺風刺。

酒渣鼻圖



酒渣鼻

御纂醫宗金鑑 卷五

酒敷鼻生進及邊。胃火薰肺外受寒。血凝初起久紫黑。宜鬱活瘀緩緩痊。(註)此證生於鼻準頭。及鼻兩邊。由胃火薰肺。更因風寒外束。血瘀凝結。故先紅後紫。久變爲黑。最爲纏綿。治宜宣肺中竅氣。化滯血。如麻黃宣肺酒。涼血四物湯。俱可選用。使榮衛流通以滋新血。再以顛倒散。敷於患處。若日久不愈。以梔子仁丸服之。緩緩取愈。

麻黃宣肺酒 麻黃 麻黃根各三兩

頭生酒五壺。將藥入酒內。重湯煮三炷香。露一宿。早晚各飲三五杯。至三五日出膿成癩。十餘日則膿盡。膿盡則紅色退。先黃後白而愈。

(方歌)麻黃宣肺酒釀成。血熱上注外寒察。麻黃並根入酒泡。重湯煮飲效不虛。

涼血四物湯 當歸 生地 川芎 赤芍 黃芩酒炒

赤茯苓 陳皮 紅花酒洗 甘草各一錢生

水二鍾。薑三片。煎八分。加酒一杯。調五靈脂末二錢。熱服。氣弱者。加酒炒黃芩二錢立效。

(方歌)涼血四物散鼻紅。散瘀化滯又調榮。茯苓四物陳紅草。薑煎加酒入五靈。

梔子仁丸

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃蘗

生梔子各一錢

五分研

水煎服。

〔方歌〕黃連解毒癩痛瘡。諸般疔毒煩燥狂。黃連芩蘗生梔子。四味煎服保安康。

蟾酥丸見疔瘡門

黃連消毒飲見頭部百會疽

耳疳

耳疳時出黑臭膿。服震白纏黃色停。胃濕相兼肝經火。紅風偏肝血熱成。〔註〕此證耳內悶腫出膿。因膿色不一。而名亦各殊。如出黑色臭膿者名耳。俱出青膿者。名震耳。出白膿者。名纏耳。出黃膿者。名停耳。俱由胃濕與肝火相兼而成。宜柴胡清肝湯主之。氣實火盛者。以龍膽瀉肝湯服之。惟風耳則出紅膿。偏於肝經血熱。宜用四物湯加丹皮石菖蒲服之。外俱用醬茄內自然油滴之。俟膿淨換滴耳油。時時滴入。腫消生肌自愈。

滴耳油

核桃仁研爛。擽油去渣。得油一錢。兌冰片二分。每用少許。滴於耳內。

〔方歌〕滴耳油治耳疳證。膿淨滴之效更深。核桃擽油消腫痛。冰片發散熱通神。

柴胡清肝湯見頭部

髮疽

龍膽瀉肝湯見頭部

膿火丹

四物湯見潰瘍門

耳聾

耳聾上焦血熱成。鮮血時流耳竅中。肝火柴胡清肝治。胃熱生地麥門冬。(註)此證由上焦血熱所致。耳竅中時流血。若肝脈弦數者。以柴胡清肝湯服之。腎脈虛數者。以生地麥冬飲主之。總以涼血爲急。乃抑沸止沸之法也。外以神塞丸塞之即瘳。

生地麥冬飲

生地黃

麥冬各五錢去心

水二鍾。煎八分。食後服。

(方歌) 生地麥冬耳聾鮮。上焦血熱是其原。各用五錢煎食後。清肺降火保平安。

神塞丸

麝香一分

生白礬一錢

沉香三分

糯米五十粒

共研細末。糲糊爲丸。如梧子大。每丸薄綿裹之。如左耳出血塞右鼻。右耳出血塞左鼻。右鼻出血塞右耳。右鼻出血塞左耳。兩耳俱出血。塞兩鼻。兩鼻俱出血。塞兩耳。

(方歌) 神塞麝香生白礬。沉糯同研糲糊丸。大如梧子薄綿裹。塞入耳鼻聾血痊。

柴胡清肝湯見頭部聾耳

耳痔

耳聾

耳挺

耳痔莖挺耳竅生。肝腎胃火凝結成。微腫開疹皮損破。塞久令人必重聽。(註)此三證皆生耳內。耳痔形如

櫻桃。亦有形如半桃者。耳莖形類初生蘑菇。頭大蒂小。耳挺形若棗核。細條而長。努出耳外。俱由肝經怒火。腎經相火。胃經橫火。凝結而成。微腫悶疼。色紅皮破。不當觸犯。偶犯之痛引腦巔。皆宜服梔子清肝湯。外用礪砂散點之。漸漸消化。

梔子清肝湯

梔子生研

川芎

當歸

柴胡

白芍酒炒

丹皮各一錢

甘草五分

石青煨

牛蒡子各一錢

炒

黃芩

黃連各五分

水二鍾。煎八分。食後服。

〔方歌〕 梔子清肝葦痔癩。腎肝胃火忿怒成。芎歸柴芍丹皮草。芍藥芍連用石功。

礪砂散

礪砂一錢

輕粉

雄黃各三分

冰片五釐

共研細末。水調濃。用穀草細梗咬毛。蘸點痔上。

〔方歌〕 礪砂散實有奇功。痔瘻涎在耳內生。輕片黃雄所爲末。水調點痔消積形。

旋耳瘡

耳瘡生耳後縫。瘡延上下連耳疼。狀如刀裂因濕熱。穿粉散搽即成功。(註)此證生於耳後縫間。延及耳指上下。如刀裂之狀。色紅時流黃水。由膽脾濕熱所致。然此瘡月盈則瘡盛。月虧則瘡衰。隨月盈虧。是以又名月蝕瘡也。宜穿粉散搽之。即可成功。

穿粉散

輕粉研隔紙
微炒

穿山甲炙

鉛粉

黃丹各三錢
水飛過

共研極細末。香油調敷。

(方歌) 穿粉散敷旋耳瘡。清熱溼濕油調良。輕粉研細隔紙炒。穿山甲共鉛粉黃。

口部



大人口破

大人口破分虛實。豔紅爲實淡紅虛。實則滿口爛斑腫。虛白不腫點微稀。(註)此證名曰口瘡。有虛火實火之分。虛火者。色淡紅。滿口白斑微點。甚者陷露龜紋。脈虛不渴。此因思慮太過。多醒少睡。以致心腎不交。虛火上炎。宜服四物湯。加黃蘗知母丹皮。少佐肉桂以爲引導。從治之法也。外以柳花散搽之。實火者色豔紅。滿口爛斑。甚者腮舌俱腫。脈實口乾。此因過食膏粱厚味。醇酒炙博。以致心脾實火妄動。宜服涼膈散。外搽赴筵散。吐涎則效。如口瘡舌乾。黃硬作渴者。宜服加減八味丸。以滋化源。俱禁水漱。

柳花散

黃蘗一兩末 青黛三錢 肉桂一錢 龍腦香二分即冰片

各研細。再合一處研勻。每用少許。搽於患處。

(方歌) 桃花散治白口瘡。黃蘗青黛龍腦香。肉桂共研搽患處。虛火上炎白平康。

赴筵散

黃芩 黃連 梔子生 乾薑 黃蘗末 細辛各等分

共研細末。每用少許。搽於患處。

(方歌) 赴筵散醫實火攻。口瘡斑爛色多紅。芩連梔子乾薑蘗。細辛同研有神功。

涼膈散

見面部 面發毒 加減八味湯 見潰瘍門

鷄口瘡

鵝口滿口白斑點。小兒脾熱所生。初生多是胎中熱。甚則咽喉腫疼。(註)此證小兒多有之。屬心脾經之熱所生。初生小兒則鵝胎熱上攻所致。滿口皆生白色斑點作痛。甚則咽喉腫疼。難於乳哺。多生啼叫。法用青紗一條。裹飭頭上。蘸新汲水。揩去白胎。以淨爲度。重手出血無妨。隨用冰硼散搽之。內服涼膈散即愈。

冰硼散

冰片五分

硼砂

元明粉各五錢

硃砂六分

共研極細末。用少許搽於瘡處。如咽喉腫痛。以蘆筒吹之立效。

(方歌) 冰硼散治咽喉痛。口瘡白點滿口生。冰硼硃砂元明粉。研末搽之立見功。

涼膈散見面部而發毒

口瘡

口瘡陰虛陽火成。膀胱濕水溢脾經。濕與熱瘵薰胃口。滿口糜爛色紅疼。(註)此證由陽旺陰虛。膀胱濕水泛溢。脾經濕與熱瘵。鬱久則化爲熱。熱氣薰蒸胃口。以致滿口糜爛。甚於口瘡。色紅作痛。甚則連及咽喉。不能飲食。初起宜服導赤湯。口臭瀉泄脾虛濕者。宜服連理湯。糜爛延及喉咽。日輕夜重者。服少陰甘桔湯。便秘者服涼膈散。外俱以葦藥散搽之有效。

導赤湯

木通

生地各二錢

甘草一錢生

竹葉二十片。水一鍾。煎半鍾。溫服。

〔方歌〕導赤湯醫口糜證。脾濕化熱毒胃成。木通生地生甘草。竹葉煎服熱自平。

加味連理散

白朮二錢土炒

人參

白茯苓

黃連

訖薑各一錢

甘草五分炙

水煎熱服。

〔方歌〕連理胃熱脾虛濕。口糜氣瀉泄俱。參苓白朮炙甘草。乾薑黃連脾胃宜。

少陰甘桔湯

桔梗二錢

甘草一錢生

川芎

黃芩

陳皮

元參

柴胡各六分

羌活

升麻各四分

葱白一根。水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕少陰甘桔治口糜。芎芩羌活桔陳皮。元參柴草升麻共。葱白水煎神效奇。

薑蘘散

乾薑

黃蘘各等分

各研末。共合一處研勻。乾搽口內。溫水漱口。

〔方歌〕薑蘘散搽口糜爛。黃蘘乾薑各細研。等分兌勻搽患處。溫水漱口效如仙。

涼膈散見面部面發毒

圖方口鋪



圖方唇反



腎部

反唇疔 鎖口疔

反唇疔發唇裏稜。鎖口疔在嘴角生。粟米堅腫麻癢痛。脾胃心經火毒成。(註)此二證俱由火毒而成。反唇疔生於唇稜偏裏。上唇屬脾。下唇屬胃。鎖口疔生於嘴角。係心脾二經所屬。二證初起形如粟米。色紫堅如鐵。腫甚麻癢木痛。寒熱交作。煩悶作嘔。反唇甚則令唇外翻。鎖口甚則口不能開。俱屬迅速之證。須速治。遲則毒氣攻裏。令人昏憤惡心。即名走黃。治法俱按疔門。禁用灸法。

腎疽圖



腎疽

腎疽生於上下唇。寒熱交爭毒氣深。紫硬時覺木痛甚。脾胃積熱乃其因。(註)此證生於唇。無論上下左右。由脾胃積熱所致。色紫有頭。大者如李。小者如棗。腫硬如鐵。時覺木痛。甚則寒熱交作。初宜服神效

奇湯。實者服雙解貴金丸。外用離宮錠。空之即愈。若者數日病不消者。必欲潰破治法。即按瘰疬腫腸潰瘍門。

神授衛生湯

雙解貴金丸

離宮錠俱見腫瘍門



痛食積

痛食積火成。初如豆粒漸痛形。痛硬潰若翻花逆。久變三消定主因。(註)此證由脾胃積火結聚而成。初起如豆粒。漸長若蠶繭。堅硬疼痛。妨礙飲食。初起及已成無內毒者。用礬餅貼之。陀僧膏蓋之。日久漸消或口渴者。宜服清涼甘露飲。若面赤口昏燥裂。更甚者此屬風質。宜服涼膈散。若日輕夜重。五心煩熱。兩頰現紅。脈虛數無力者。宜服加減八味丸。以滋水養陰。若潰後如翻花。時津血水者屬逆。失於調治。久

期變爲上消中消下消之證屬凶。

清涼甘露飲

麥冬去心

知母

黃芩

石斛

枳殼炒

枇杷葉去手鬚炙

銀柴胡

犀角鎊

生地

茵蒿

甘草各一錢生

燈心五十寸。淡竹葉。一錢水二鍾。煎八分。食遠服。

(方歌) 清涼甘露醫癰唇。潤燥止渴又生津。麥冬知草芍斛殼。枇杷銀胡犀地茵。

蟾酥餅見疔瘡門

陀僧膏見潰瘍門

涼膈散見面部面發毒

加減八味丸見潰瘍門



長風生在唇上下皆同

昏風

昏風多在下唇生。陽明胃經風火攻。初起發癢色紅腫。久裂流水火瘡疼。(註)此證多生下唇。由陽明胃經風火凝結而成。初起發癢。色紅作腫。日久破裂流水。疼如火燎。又似無皮。如風盛則唇不時聯動俱內以雙解通聖散服之。外以黃連膏抹之自愈。

雙解通聖散

防風

荊芥

當歸

白芍酒炒

連翹去心

白朮土炒

川芎

薄荷

麻黃

梔子

各五錢

黃芩

石膏煨

桔梗各一兩

甘草

二兩生

滑石三兩

共研粗末。每用五錢。水一鐘半。煎八分。澄渣溫服。

(方歌)雙解通聖胃火風。疎表清裏膏防荊。歸芍連翹芩朮桔。麻黃梔草薄荷芎。

黃連膏見鼻部鼻疔

齒部

牙齦

牙齦牙縫內出血。胃腎二經虛實熱。實多口臭牙堅牢。虛者反此當分別。(註)此證由熱而成。當分虛實

無論大人小兒。若胃經實熱者。則血出如湧。口必臭而牙不動。宜服清胃湯。甚則服調胃承氣湯。或用酒製大黃木三錢。以枳殼五錢煎湯。少加黃便調服。下黑糞即愈。若胃經虛火者。牙齦腐爛。淡血滲流不已。宜服二參湯。及補中益氣湯。加黃連丹皮。若腎經虛者。血則點滴而出。牙亦微痛。口不臭而牙動。或落者。治宜滋腎。有火者六味地黃丸。無火者七味地黃丸。俱加猴棗。隨手應效。若疳積氣盛。食積疳丸。外俱用小蘗散擦牙。隨用青竹茹醋浸一宿。含漱甚效。

清胃湯

石膏四錢 黃芩 生地各一錢 丹皮一錢 黃連 升麻各一錢

水二鍾煎八分。食後服。

〔方歌〕清胃陽明實火結。口臭相兼齒衄血。芩連生地升麻膏。丹皮同煎功效捷。

調胃承氣湯

大黃四錢 芒硝三錢 甘草二錢

水三鍾。煎一鍾。去渣少少溫服。

〔方歌〕調胃承氣實火攻。齒衄口臭用之靈。酒浸大黃芒硝草。胃熱煎服立刻清。

二參湯

人參 元參各等分

水煎溫服。

〔方歌〕二參湯醫虛火泛。齦腐滲流血水淡。人參元參各等分。水煎服下有神驗。

蘆薈丸 蘆薈 子青皮 白雷丸 白蕪荑 川黃連 胡黃連

鶴虱草各一錢 木香三錢 麝香一錢

共研末。蒸餅糊丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。

(方歌) 蘆薈丸醫積氣盛。木麝青皮胡黃連。蕪荑雷丸鶴虱草。川連同末蒸餅丸。

小蘗散

小蘗 百草霜

蒲黃微炒

香附子

各五錢
醋浸陰乾

右研細末。用搽牙上。半刻時。溫茶漱之。

(方歌) 小蘗散搽牙衄方。蒲黃微炒百草霜。香附同研爲細末。搽牙止血功效強。

補中益氣湯見讚

楊門

六味地黃丸見面部

雀斑

七味地黃丸即桂附地黃丸減去

附子見面部頰瘍

牙宣

牙宣初起腫牙齦。日漸腐頰久露根。惡熱惡涼當細別。胃經客熱風寒侵(註)此證牙齦宣腫。齦肉日漸腐頰。久則削縮。以致齒牙宣露。總由胃經客熱。積久。外受邪風。寒涼相搏而成。有喜涼飲而惡熱者。係客熱遇寒涼。凝滯於齦肉之間。有喜熱飲而惡涼者。係客熱受邪風。稽留於齦肉之內。客熱遇寒者。百齦出血。惡熱口臭。宜服清胃湯。客熱受風者。牙齦惡涼。遇風痛甚。宜服獨活散。外有齦牙腐臭。齒根動搖者。屬胃中

虛火。而兼腎虛。齒乃腎之餘。宜服三因安腎丸。又有牙齦腐臭。時津白膿者。屬胃中濕。熱宜服犀角升麻湯。外俱用胡桐淚散擦之。以食鹽沖湯漱口。惟牙齦動搖。或兼疼痛者。日以李杲牢牙散擦之。夜用固齒白玉膏貼之。緩緩取效。若齦肉腐爛。露牙牀骨者逆。

獨活散

獨活

羌活

防風

川芎各一錢

六分

薄荷

生地

荊芥各一

錢

細辛七分

右爲粗末。每用二錢。水煎澄渣。食後服。日用三服。

(方歌) 獨活風毒注牙根。齦腫嫌涼痛莫禁。羌活防風共生地。薄荷荊芥合芎辛。

三因安腎丸

補骨脂炒

胡蘆巴炒

茴香炒

川棟子炒

續斷各三

兩炒

山藥

杏仁炒

白茯苓

桃仁各二

兩炒

共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二錢。空心淡鹽湯送下。

(方歌) 三因安腎虛火燦。牙齦腐臭齒根搖。山藥香蒿苓骨脂。胡蘆巴續川棟桃。

胡桐淚散

胡桐淚

細辛

川芎

白芷各一錢

五分

寒水石二

兩

生地

兩

青鹽二分

共研細末。乾搽牙齦患處。待頓飯時。以溫水漱去。少時再上。

(方歌) 胡桐淚散牙齦腫。津血宜露或出膿。細辛寒水石生地。青鹽白芷共川芎。

李杲牢牙散

龍膽草一兩五錢

錢酒浸

羌活

地骨皮各一錢

錢

升麻四分

共研末。先以溫水漱口。用少許搽之。

(方歌) 李杲牢牙搽齒病。牙齦搖動或兼疼。膽草升麻羌地骨。研末漱口搽有功。

固齒白玉膏

官粉一兩

研

珍珠三錢

末

陽起石一兩

用殭蠶四十九條防風當歸川芎牙皂青鹽升麻白芷地骨皮各五錢細辛藥木各三錢共研

粗末長流水五盞從藥入砂鍋內以桑柴火熬藥至三盞去渣再入砂鍋內煎至一盞將龍骨陽起石火煨通紅入藥汁內淬之如此七次去藥汁將龍骨陽起石焙乾研末

麝香二錢末

龍骨二兩

象牙五錢末

用黃蠟三兩。溶化濾淨。再化。離火候溫。方入前藥和勻。乘熱攤紙上。如膏冷。將鬩斗燒熱仰放。紙鋪

鬩斗底上攤之。用時先以溫水漱口。將膏剪一小條。貼於患處。閉口勿語。

(方歌) 固齒白玉貼牙效。一切牙痛及動搖。官粉珍珠陽起麝。龍骨象牙黃蠟熬。

清胃湯見牙

頰

犀術升麻湯見面部

頰傷

鑽牙疳

鑽牙疳在牙根生。突出硬骨銳而鋒。痛如鍼刺殊難忍。證由肝胃積熱成。(註)此證由肝胃二經積熱所致。乃牙根肉內鑽出骨尖如刺。疼痛異常。小兒多有之。法用鈹鍼就患處刺開好肉。連牙齊根取出。若血出不者。以濕紙換貼二次即止。內服蘆薈消疳飲。外以冰硼散搽之。戒厚味其牙復生如舊。

蘆薈消疳飲

蘆薈生

胡黃連

石膏煨

羚羊角

梔子生研

牛蒡子炒研

銀柴胡

桔梗

大黃生

元參各五分

薄荷葉四分

甘草三分

水二鍾。淡竹葉一錢。煎六分。食遠服。

(方歌) 蘆薈消疳清胃肝。羚羊梔子蒡胡連。銀胡桔梗大黃薄。甘草元參竹葉煎。

冰硼散見口部

鵝口瘡

牙疔

牙疔縫胃火成。大腸濕熱亦可生。腫如粟米連腮痛。若兼麻癢即黑疔。(註)此證由胃經火毒。或太陽經濕熱可致之。每生於兩旁牙縫。腫起一粒。形如粟米。痛連腮項。若兼麻癢。破流血水。疼痛異常者。即黑

也。屬腎火毒。俱用銀簪尖挑破。以見血爲度。搽拔疔散。再以蟾酥丸噙化。徐徐嚥之。若煩躁者口渴宜服黃連解毒湯即愈。若失治。毒反攻心。令人煩躁昏愵者逆。

拔疔散

礞砂

白礬

硃砂

食鹽

用鐵錐刀燒紅將白礬食鹽放於刀上煨之

各等分。擇丁日午時。研爲細末收之。

(方歌) 拔疔散治諸疔毒。礞砂白礬食鹽硃。等分研末搽患處。化硬搜根功效殊。

蟾酥丸

見疔瘡門

黃連解毒湯

見身部墨疔

牙癰

牙癰胃熱腫牙牀。寒熱堅硬痛難當。破流膿水未收口。誤犯寒涼多骨妨。(註)此證由陽明胃經熱毒所致。生於牙牀。堅腫疼痛。身發寒熱。腮頰浮腫。初宜服荊防敗毒散。若大渴煩嘔者。錢氏九汗之。便祕者。雙解貴金丸下之。腫處宜軟刺破。搽冰硼散。若初時堅腫破流血水。久不收口。過食寒涼者。必生多骨。俟骨尖刺出。搖則內動。始可取出。其口方能收斂而愈。

荊防敗毒散

見頭部腦疔

蟾酥丸

見疔瘡門

雙解貴金丸

見腫疔瘡門

冰硼散

見口部搽口瘡

走馬牙疳

走馬牙疳證不輕。癰積疔瘡毒火攻。牙根腐爛色變黑。頰肉腫就下食因。(註)此證多由疔毒積火毒餘毒

上攻。最爲迅速。總因積火熱毒而成。牙根作爛。隨變黑腐。臭穢難聞。若癰積毒火攻牙者。初宜服蘆薈疳飲。脾胃虛者。兼服人參茯苓粥。若疹痘餘毒所中者。宜服清疳解毒湯。外勢輕者。俱用溺白散擦之。堅硬青紫。漸腐穿腮齒搖者。宜蘆薈散擦之。如牙縫黑腐不盡。及腐爛深坑。藥不能到。宜用勒馬鬚微絲之。再用手法。去其黑腐肉。見紅肉流鮮血者吉。若取時頑肉難脫。堅硬腐爛漸開。以致穿腮破唇。宜貼蓮膏。身熱不食者逆。但此證惟癰積攻牙成疳者。好後易犯。由積火時時上攻也。惟在調理飲食得宜。如藥粟子。鵝蟹甜辣等物。俱當禁忌。若稍有疎忽。必致復發。慎之慎之。

人多茯苓粥

人參一錢

白茯苓六錢

共研末。同粳米一茶鐘熬成粥。先以鹽湯將口漱淨。後再食粥。

(方歌) 八參在苓善扶脾。飲食短少服之宜。二味研末加粳米。熬粥食之理胃虛。

清疳解毒湯

人中黃

川黃連

朱胡各五錢

知母

連翹去心

牛蒡子炒研

犀角鎊

黑參

荆芥

防風各一錢

石膏一錢五

分根

淡竹葉一錢。燈心五十寸。水二鐘。煎八分。食遠服。嘔加蘆薈根五錢。

(方歌) 清疳解毒方甘證。疹痘餘毒化熱成。中黃知連柴芩勞。犀角參芩荆芥風。

溺白散

溺垢

即婦人尿桶中

白霜梅燒存

枯白礬各二錢

白礬火煨五錢

性

錢

右研細末。先用非根松蘿茶。煎成濃汁。乘然以雞翎蘸洗患處。去淨腐肉。見津鮮血。再敷此藥。日敷三次。若瀾至咽喉。以蘆筒吹之。

〔方歌〕 潮白散搽走馬疳。塌垢白霜梅白攀。非根茶葉煎湯滌。薰洗腐肉敷藥痊。

蘆薈散

蘆薈一錢

黃蘗五錢

人言五分用江棗五枚去核每

末 蘆薈人言一分火燒存性

共研細末。先用米泔水漱淨疳毒。後敷此藥於堅硬及腐處。

〔方歌〕 蘆薈散搽牙疳爛。色紫牙搖腮硬穿。棗裏人言燒存性。再加黃蘗末同研。

勒馬聽徽絲

白砒一分

麝香三分

青綿撕碎

青黛各一錢

末

末

飛末

用香油拌勻用時先以清米泔水漱口。次用鑷尖將絲挑少許。塞於牙根縫內。日三易之。

〔方歌〕 勒馬聽徽疳漸蝕。牙縫腐黑急速施。油調砒麝青綿黛。泔水漱口後塞之。

青蓮膏

青黛二錢

乳香

輕粉各一

麝香五分

白砒一分即

錢

人言

右爲細末。用香油調稠。薄攤紙上。用鎚鎚實。陰乾收之。每於臥時以泔水漱淨口拭乾。隨疳證大小。剪膏藥貼之。至曉揭去。再以泔水將口漱淨吐之。至晚再貼。

〔方歌〕 青蓮膏貼腐疳宜。化腐消堅效更奇。乳麝白砒輕粉黛。研末油調紙攤之。

蘆薈消疳飲

見鑽牙疳

齒懸

齒懸齒內生小蟲。胃經滌濕風火凝。口臭只緣胃火盛。齒根腐爛出血膿。(註)此證係齒內生蟲。由胃經濕風火凝聚而成。齒根脹痛腐爛。時出膿血。若口臭甚者。胃火盛極上攻所致也宜服玉池散。外用雀麥連一把。苦瓠三十片。洗淨。將麥剪長二寸。以瓠葉裹作五包。廣一寸。厚五分。三年陳醋漬之。至日中時。以兩包火中炮炙令熟納口中。熨齒外冷。更易之取。包置水中。解視之即有蟲長三分。老者黃色。新者白色。其效如神。

玉池散 當歸 白芷 升麻 防風 甘草 地骨皮 川芎 細辛

藁本 槐花各一錢

生薑三片。黑豆三十粒。水煎去渣。候溫含漱。冷則吐之。若用此方。煎服更效。

(方歌) 玉池疏風療蟲牙。津膿根爛漱服佳。歸芷升防甘地骨。芎辛薑藁豆槐花。

齒懸

齒懸風熱客陽明。牙齦腫痛出臭膿。遇風痛甚久宣露。白馬懸蹄塞入竅。(註)此由風熱客於手足陽明經而成。初起牙齦宣腫覺痛。遇風痛甚。當作歪口吸氣之狀。牙齦腐孔。時出臭膿。久則懸齒宣露。初宜清胃湯。加羌活。外用白馬懸蹄少許。以綿裹之。塞入膿孔甚效。

清胃湯見牙

御纂醫宗金鑑卷六

編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹

紫舌脹屬心經火。熱盛血壅腫硬疼。舌腫滿口宜鍼刺。血色紫重色紅輕。(註)此證由心經火盛血壅。以致舌腫滿口。堅硬疼痛。宜用衣錢繫筋頭上。露鋒分許。當舌刺數。十刺令血出。紅色者輕。紫色者重。隨以溫水漱口。搽冰硼散。內用涼膈散。去料硝大黃。加牛蒡子荊芥。倍用梔子。服之甚效。

冰硼散見口部

鵝口瘡

涼膈散見面部

面發毒

痰包

痰包每在舌下生。結腫綿軟似匏形。痛脹舌下妨食語。火稽痰涎流注成。(註)此證生於舌下。結腫如匏。光軟如綿。塞脹舌下。有妨飲食言語。色黃木痛。由火稽痰涎。流注而成。宜用立剪當包上剪破。出痰涎如鷄子清。稠黏不斷。拭淨。搽冰硼散。服加味二陳湯。忌煎炒火酒等物。

加味二陳湯

陳皮

半夏製

白茯苓

黃芩各八分

黃連

薄荷

甘草各五分生

水二鐘。薑三片。煎八分。食前服。

〔方歌〕 加味二陳療痰包。結腫舌下形如匏。二陳湯加苓連薄。薑煎服下自然消。

冰硼散

見口部
鵝口瘡

舌衄

舌衄心火血分炎。舌上生孔似鐵尖。或如筋頭其色紫。甚黑腐爛血出泉。〔註〕此證係舌上忽生孔。小者如鐵尖。大者如筋頭。其孔色紫屬熱甚。色黑防腐爛。血出如泉湧。由心火上炎。以致血熱妄行而成。宜服升麻湯。兼搽必勝散甚效。

升麻湯

升麻

小薊根

茜根各一兩

五錢

艾葉七錢

五分

寒水石三兩

共研。每三錢水一鍾。煎七分。澄去渣。入生地黃汁一羹匙再煎二滾。溫服。或加炒側柏葉五錢亦可。

〔方歌〕 升麻舌衄心火炎。小薊茜根各兩半。艾葉七錢五分。加寒水三兩同研爛。

必勝散

螺青另煨

蒲黃各一錢炒

共合一處。研細。搽於患處。後用溫鹽湯漱口。

〔方歌〕 必勝心熱血妄行。舌生小孔湧血紅。螺青研末蒲黃炒。同勻搽之自歸經。

重舌 痰核 重唇 舌疔

舌證發於心脾經。其證皆由積熱成。重舌舌下血脈脹。痰核舌上一核生。重腭生於口上腭。時覺心煩梅子形。舌疔舌上生紫點。其形如豆寒熱增。(註)此證無論大人小兒。俱可以生。重舌者。由心脾蘊熱循經上冲舌本。遂令舌下血脈脹起如小舌狀。故名重舌。宜用冰硼散搽之。痰核者。心脾痰涎鬱熱。舌上生核。強硬作痛。宜用衣鍼點破。搽冰硼散。內服加味二陳湯。重腭者心脾有熱。以致上腭生。形如梅子。外無寒熱。內時作煩。此屬熱極。禁用鍼刺。宜服黃連解毒湯。加桔梗。不時用紫雪散噙化舌疔者。心脾火毒。舌生紫點。其形如豆。堅硬寒熱。疼痛應心。初起宜用蟾酥丸。含於舌下。隨化隨嚥。或再服三粒。以解內毒。甚者刺之。服黃連解毒湯。兼搽紫雪散。及徐徐嚥之即愈。

紫雪散

犀角鎊

羚羊角鎊

石膏

寒水石

升麻各一兩

元參二兩

甘草八錢

沉香剉

木香各五錢

剉

水五盞。煎藥剩湯一盞。將滓用絹濾去。將湯再煎滾。投提淨朴硝三兩六錢。文火慢煎水氣將盡。欲凝結之時。傾入盃內。下硃砂冰片各三錢。金箔一百張。各預研細和勻。將藥盤安人涼水盆中。候冷凝如雪爲度。大人每用一錢。小兒二分。十歲者五分。徐徐嚥之即效。或用淡竹葉燈心煎湯化服亦可。咽喉腫痛等證。吹之亦效。

(方歌)紫雪散醫積熱效。沉木犀角元參草。寒水升膏朴硝加。硃消冰研入內攪。

冰硼散見口部

鵝口瘡

加味二陳湯見痰包

黃連解毒湯見耳部

蟾酥丸見走瘡門

舌疳附瘰癧風

舌疳心脾毒火成。如豆如菌痛爛紅。漸若泛蓮難飲食。綿潰久變瘰癧風。(註)此證由心脾毒火所致。其證最惡。初如豆。次如菌。頭大蒂小。又名舌菌。疼痛紅爛無皮。朝輕暮重。急用扎庭丹點之。自然消縮而愈。若失於調治。以致熾腫。突如泛蓮。或有狀如鴛冠。舌本短縮。不能伸舒。妨礙飲食言語。時津臭涎。再因怒氣上沖。忽然崩裂。血出不止。久久延及項領腫如結核。堅硬瘰癧。皮色如常。頂輭一點。色暗木江。破後時津臭。水腐如爛棉。其證雖破。堅硬腫痛。仍前不退。此爲綿潰。甚至透舌穿腮。湯水漏出是以又名瘰癧風也。蓋舌本屬心。舌邊屬脾。因心緒煩擾。則生火。思慮傷脾氣鬱。鬱甚而成斯疾。其證外勢。頗類喉風。但喉風咽喉常腫。湯水不能下嚥。此證咽喉不腫。可以下嚥湯水。胃中亦思飲食。因舌不能轉動。迭送硬食。故每食不能充足。致令胃中空虛而快證悉添。日漸衰敗。初起宜服導赤湯。加黃連。虛者服歸脾湯。熱甚者服溫涼甘露飲。合歸脾湯。便溏者服歸芍異功湯。頷下腫核。初起宜用錦地羅蘸醋磨濃敷之。潰後宜水澄膏貼之。自古治法雖多。然此證百無一生。縱施藥餌。不過苟延歲月而已。

清溪祕傳北庭丹

番礪砂

人中白各五分

瓦上青苔

瓦松

溘雞矢各一錢

用傾銀罐三個。將藥裝在罐內。各口封嚴。外用鹽泥封固。以炭火煨紅。待三炷香爲度。候冷開罐。將藥取出。入麝香冰片一分。共研細末。用磁鉢刺破舌菌。用丹少許點上。再以蒲黃蓋之。

〔方歌〕北庭丹點舌菌生。瓦松濟鶴矢人中。瓦上青苔香藥末。罐封火煨入磨冰。

歸芍異功湯

人參

白朮土炒

廣陳皮

白芍酒炒

當歸身各一錢

錢

白茯苓二錢

甘草五分

炙

燈心五十寸。水煎空心服。

〔方歌〕歸芍異功扶脾氣。健胃又能止瀉利。四君歸芍廣陳皮。引加燈心是良劑。

水澄膏

硃砂二錢

水飛

白斂

白及

五倍子

鬱金各一兩

雄黃

乳香各五錢

錢

右爲細末。米醋調濃。以厚紙攤貼之。

〔方歌〕水澄膏貼潰核驗。水飛硃砂末二錢。及斂鬱金雄黃乳。五倍同用研醋攤。

導赤湯見口部

口癰

歸脾湯見乳部

乳中結核

清涼甘露飲見唇部

唇唇

喉部

緊喉風附纏

喉風

緊喉膏梁風火成。咽喉腫痛難出聲。聲如拽鋸痰癢塞。穴刺少商吐下功。(註)此證由膏梁厚味太過。致肺胃積熱。復受邪風。風熱相搏。上壅咽喉。潰痛聲音難出。湯水不下。痰涎癢塞之聲。頗似拽鋸。初發暴速。急刺手大指內側少商穴。出紫黑血。以瀉其熱。痰盛者以桐油餞導吐之。吐痰後隨用甘草湯漱之。以解桐油之氣。內服雄黃解毒丸吐下之。喉中吹白降雪散。俟關閉之後。內宜清咽利膈湯。按法調治。隨手應效者順。若面青唇黑。鼻流冷涕者逆。若兼項外透腫。即名纏喉風。其治法雖與此證相同。然終屬險惡。難治。

桐油餞

溫水半盞。加桐油四匙。攪勻。用硬度鷄翎蘸油。探入喉內。撚之。連探四五次。其痰癢出。再探再吐。以人醒聲高爲度。

(方歌)桐油餞法導痰癢。一切喉風用最靈。半盞溫水桐油入。鷄翎蘸探吐喉通。

雄黃解毒丸

雄黃一兩 鬱金一錢 巴豆十四粒
去皮油

共研末。醋糊爲丸。如黍粒大。每服五分。津液送下。

(方歌)雄黃解毒緊喉風。開關通閉火能平。巴豆去油鬱金末。醋糊爲丸黍粒形。

白降雪散

石膏一錢五分 硼砂一錢 焰硝 膽礬各五分 元明粉三分
分服

冰片二分

共研極細末。以筆管吹入喉內。

〔方歌〕 白降雪散喉風證。腫痛聲難風火凝。蝦石膏。與鹽雜末。枳實礪片共元明。

清咽利膈湯

牛蒡子炒研

連翹去心

荆芥

防風

梔子生研

桔梗

元參

黃連

金銀花

黃芩

薄荷

甘草各一

錢生

大黃

朴硝各一

錢

水二鍾。淡竹葉二錢。煎八分。食遠服。

〔方歌〕 清咽利膈黃痛消。疏風清熱芩連翹。荊防梔桔參連草。銀花芩薄大黃硝。

慢喉風

慢喉發緩體虛住。微腫咽乾色淡紅。或由暴怒五辛火。或因憂思過度成。〔註〕此證有因平素體虛。更兼暴怒。或過食五辛而生者。亦有憂思太過而成者。體屬虛弱病實。其發緩。其色淡。其腫微。其咽乾。舌見滑白胎。大便自利。六脈微細。唇如紫色。若午前痛甚。服補中益氣湯。加以清涼。如麥冬黑參桔梗牛蒡子服之。若午後作痛作渴。身熱足冷者。陰陽兩虛也。忌用苦寒。宜少陰甘桔湯。以宣達之。若面赤咽乾不渴者。其脈必虛大。以甘露飲服之必效。俱兼用冰硼散一錢。加燈草煨灰。存性三分。吹之立驗。

甘露飲

天冬去心

麥冬去心

黃芩

生地

熟地

枇杷葉蜜炙

石斛

枳殼麩炒

茵陳蒿

甘草各等分

水二鍾。煎八分。食後服。

(方歌) 甘露飲諸肉熱侵。面赤咽乾生液津。天麥冬苓生熟地。枇杷斛草枳茵陳。

補中益氣湯

見潰瘍門

少陰甘桔湯

見口瘡

冰硼散

見口瘡

喉閉 附酒毒喉閉

喉閉肝肺火盛由。風寒相搏腫咽喉。甚則腫痛連項外。又有酒毒當細求。(註)此證由肝肺火盛。復受風寒。相搏而成。咽喉腫痛。面赤腮腫。甚則項外漫腫。喉中有塊如拳。湯水大難嚥。語言不出。暴起身發寒熱。急刺少商穴。或鍼合谷穴。以開咽喉。初宜疏散。服荊防敗毒散。寒熱已退。即用清咽利膈湯。兼吹紫雪散。隨以薑汁漱口。以宣其熱。或用醋漱。以消積血。痰癢塞者。桐油錢探吐痰涎。若腫發於項外。膿脹痛者。防透咽喉。不可輕鍼。急用皂角末吹鼻取嚏。其腫即破或食用皂角末醋調厚敷。項腫。須臾即破。初腫時用生羊肉片貼之。喉閉聲嘶者。肺氣將絕。急宜獨參湯救之。若卒然如嚔吞吐不利。係寒氣客於會厭也。宜蜜炙附子片含之勿嚥。初終忌用苦寒之藥。恐難消難潰。又有酒毒喉閉。由酒毒蒸於心脾二經。熱癰咽喉。腫腫色黃。其人面赤。目睛上視以桐油錢探吐痰涎。宜服鼠黏子解毒湯。亦用紫雪散吹之。

鼠黏子解毒湯

鼠黏子炒研

桔梗

青皮

升麻

黃芩

花粉 甘草生 元參 梔子生研 黃連 連翹去心 葛根

白朮土炒 防風 生地各等分

水煎食後服

(方歌) 鼠黏解毒酒毒閉。桔梗青皮能降氣。升芩花粉草元參。極連翹葛朮防地。

荆防敗毒散見項部 清咽利膈湯

腦疽

桐油餞俱見緊

喉風

紫雪散見舌部

重舌

獨參湯見潰瘍門

噤瘖喉風

噤瘖喉風腫痛咽。牙關緊急不能言。風痰湧塞咽膈上。火盛生痰風搏源。(註)此證頗類緊喉。由肺胃蘊熱。積久生痰。外復受風。邪與痰熱相搏。湧塞咽膈之上而成斯疾。初起咽喉腫塞疼痛。湯水難嚥。語言不出。牙關緊急。此屬險候。急用雄黃解毒丸。化水。用細竹管將藥水吹入鼻孔。直達咽喉。藥入作嘔。即令患者吐之。其牙頓鬆。咽喉即稍開通。先與米飲飲之。次服清咽利膈湯。簞吹冰硼散。用藥不應者險。若唇黑鼻流冷涕者逆。

雄黃解毒湯

清咽利膈湯俱見緊

喉風

冰硼散見口部

鵝口瘡

弄舌喉風

弄舌喉風。心脾經。實火外寒凝滯成。舌出攪動因脹悶。咽喉作痛更兼疼。（註）此證由心脾實火。與外寒鬱遏。凝滯而成。咽喉腫痛。痰涎堵塞。音啞言謇。舌出不縮。時時攪動。覺舌脹悶。常欲以手捫之。故名弄舌。急刺少商穴。穴在兩手大指裏側。去指甲角旁韭葉寬。即是。用三稜舌刺之。有血者生。無血者死。噙蟾酥丸。徐嚥藥汁。若痰涎上湧。不能嚥藥者。急用桐油錢探吐痰涎。隨服清咽利膈湯。吹金鎖匙。若喉內如松子及魚鱗狀。不堵塞者。此屬虛陰上浮。急用蜜炙附子片。嚥嚥其汁即效。

金鎖匙

冰片二分

白殭蠶一錢

雄黃二錢

焰硝一兩

硼砂五錢

各研末。和勻。以細筆管吹入喉內腫痛處。

（方歌）金鎖匙吹弄舌風。心脾火鬱外寒乘。消寒逐熱除疼痛。冰片殭蠶雄焰硼。

蟾酥丸見疔

瘡門

桐油錢

清咽利膈湯

俱見緊喉風

喉疔

喉疔初覺陰虛成。噙乾刺痛色淡紅。腎火炎上金受尅。破爛失音臭腐疼。（註）此證一名陰虛喉疔。初覺咽噙乾燥。如毛草常刺喉中。又如硬物隘於咽下。嘔吐酸水。噙出甜涎。淡紅微腫微痛。日久其色紫暗不鮮。頗似凍榴子色。由腎液久虧。相火炎上。消燬肺金。熏燎咽喉。腫痛日增。破爛腐衣。疊若蝦皮。聲音嘶啞。喘急多痰。臭腐蝕延。其疼倍增。妨礙飲食。胃氣由此漸衰。而虛火益盛。煩躁者宜服知藥地黃湯。若

吐酸涎者。宜服甘露飲加川黃連。便燥者兼服萬氏潤燥膏。面唇俱白。不寐懶食者。宜歸脾湯加酒炒川連。腫吹紫雪散。腐吹八寶珍珠散。其證投方應病。或者十全一二。否則難救。

萬氏潤燥膏

豬脂一觔。切碎。煉油去滓。加煉過白蜂蜜一觔。攪勻候凝。挑服二匙。日用三五次。

〔方歌〕萬氏潤燥膏神驗。降火清金滋便乾。豬脂煉油加白蜜。挑服失音也能痊。

八寶珍珠散

兒茶

川連末

川貝母去心

青黛各一錢五分

紅褐燒灰存性

官粉

黃蘗末

魚腦石微煨

琥珀末各一錢

人中白二錢煨

硼砂八分

冰片六分

京牛黃

珍珠各五分

豆腐內煮半炷香時取出研末

麝香三分

各研極細末。共兌一處。再研勻。以細筆管吹入喉內爛肉處。

〔方歌〕八寶珍珠喉疳腐。冰麝兒茶連貝母。紅褐官粉黛牛黃。腦石中白藥硼琥。

知蘗地黃湯

即六味地黃丸加知母黃蘗見面部雀斑

甘露飲見慢喉風

歸脾湯見乳部乳中結核

喉癰

喉癰咽乾生苔蘚。初瘥時增燥裂疼。過飲藥酒五辛火。微瀾延開蟻蛙形。(註)此證一名天白蟻。咽啞乾燥。初覺時癢。次生苔蘚。色暗木紅。燥裂疼痛。時吐臭涎。妨礙飲食。由過長灸燻藥酒。五辛等物。以致連積於胃。胃火薰肺而成斯疾。宜服廣筆鼠黏湯。未潰吹麝精散。已潰吹清涼散。患者清心寡慾。戒厚味發物。或者十全一二。若失治。兼調理不謹。致生微瀾。延漫開火。疊起腐衣。旁生小孔。若蟻蛙蝕之狀。多致不救。

廣筆鼠黏湯

生地黄

浙貝母各三錢

去心研

元參

甘草各二錢

五分生

鼠黏子酒炒

研

花粉

射干

連翹各二錢

去心

白僵蠶一錢

炒研

苦竹葉二十片。水二鍾。煎八分。肌時服。

(方歌) 廣筆鼠黏喉蘚乾。初瘥生苔裂痛添。生地元參花粉貝。連翹射草白僵蠶。

清溪祕傳礬精散

白礬不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅酒水於磚上將礬末布於磚上以磁盤覆蓋四面灰擁一日夜礬飛盡上掃下用二錢

白霜梅三個

去核

真明雄黃

穿山甲各一

錢炙

共研細末。以細筆管吹入喉內。

(方歌) 礬精散用火燒磚。水濕布礬上覆蓋。掃霜再兌雄梅甲。研末吹喉癰自痊。

清涼散 硼砂三錢 人中白二錢煨 黃連末一錢 南薄荷六分 冰片五分

青黛四分

共研極細末。吹入喉癰腐處。

〔方歌〕清涼散吹天白蟻。冒火薰金成此疾。薄黛冰硼中白連。腐裂疼痛皆可去。

上膠癰

上膠癰若葡萄形。少陰三焦積熱成。舌難伸縮鼻紅涕。口難閉合寒熱增。〔註〕此證又名懸癰。生於口中上腭。由心腎經與三焦經積熱而成。形若紫葡萄。舌難伸縮。口難閉合。鼻中時出紅涕。令人寒熱大作。宜黃熱消毒飲。加桔梗元參服之。兼吹冰硼散。或日久腫硬下垂。不潰者以燒鹽散日點三五次。兼服射干丸。過時失治。飲食不入。煩躁神昏者逆。

燒鹽散 食鹽火燒 枯白礬各等分

二味研細。以筋頭蘸點患上。

〔方歌〕燒鹽散治上膠癰。懸似葡萄色紫形。枯礬燒鹽等分末。筋頭蘸點消熱癰。

射干丸 射干 川升麻 杏仁去皮尖 麩炒 甘草各五錢炙 木鼈子

川大黃各二

錢炒

右研細末。煉蜜和丸如小彈子大。每用一丸。口中含化徐嚥。

(方歌) 射干丸療懸癰患。熟聚成形口開難。大黃升草木鼈杏。蜜丸彈狀口中含。

黃連消毒飲

見頭部
百會疽

冰硼散

見口部
鵝口瘡

鎖喉毒

鎖喉毒生因積熱。外感風寒耳前結。外似癰癰漸攻喉。心與小腸聽會穴。(註)此證由心與小腸積熱。外風寒。凝結而成。初生於耳前聽會穴。形如癰癰。漸攻咽喉。腫塞疼痛。妨礙飲食。證須速治。宜服牛黃心丸。開關解熱。兼服清咽利膈湯。吹冰硼散。投方應效。方能成功。

牛黃清心丸

九轉膽星二兩

雄黃

黃連末各二

茯神

元參

天竺黃

五倍子末

荆芥

防風

桔梗

犀角末

當歸各一

冰片

麝香

珍珠各五分

京牛黃

錢

豆腐煮

輕粉各三

分

各研極細末。共和一處再研勻。甘草熬膏和丸。如龍眼大。硃砂爲衣。口中曬乾。收入磁瓶內。將瓶口堵嚴。勿令洩氣。臨服時一丸薄荷湯磨服。

〔方歌〕牛黃清心鎖喉毒。伏輕冰磨多雄竺。珍倍荊防桔膽星。犀角歸連熟退速。

清咽利膈湯

見口部
喉風

冰硼散

見口部
鵝口瘡

乳蛾

乳蛾肺經積火成。雙輕單重喉旁生。狀若蠶蛾紅腫痛。關前易治關後凶。〔註〕此證由肺經積熱。受風凝結而成。生咽喉之旁。狀如蠶蛾。亦有形若粟栗者。紅腫疼痛。有單有雙。雙者輕。單者重。生於關前者。形色易見。吹藥易到。手法易施。故易治。生於關後者。難見形色。吹藥不到。手治難施。故難治。俱宜服清咽膈湯吹冰硼散。易見者膿然鍼之。難見者用雞翎探吐膿血。若兼痰壅氣急聲小。探吐不出者險。急用三稜鍼刺少商穴。出紫黑血。仍吹服前藥。緩緩取效。

清咽利膈湯

見緊
喉風

冰硼散

見口部
鵝口瘡

喉瘤

喉瘤鬱熱屬肺經。多語損氣相兼成。形如元眼紅絲裏。或單或雙喉旁生。〔註〕此證由肺經鬱熱。更兼多語損氣而成形如元眼。紅絲相裏。或單或雙。生於喉旁。亦有頂大薄小者。不犯不痛。或醇酒炙煇或因怒氣喊叫。犯之則痛。忌用鍼刀。宜服益氣清金湯。以消瘤。碧玉散點之即效。

益氣清金湯

苦桔梗三錢

黃芩二錢

浙貝母去心研

麥冬去心

牛蒡子各一錢五分炒研

人參

白茯苓

陳皮

生梔子研

薄荷

甘草各一錢生

紫蘇五分

竹葉三十片。水三鍾。煎一鍾。食遠服。滓再煎服。

(方歌) 益氣清金肺熱攻。注喉成瘤元眼形。陳芎苓蘇苦桔貝。麥冬梔薄草參苓。

消瘤碧玉散

硼砂三錢

冰片

胆礬各三分

共研細末。用時以筋頭蘸藥。點患處。

(方歌) 消瘤碧玉點喉瘤。開結通喉熱可搜。君以硼砂冰片兌。膽礬末入患皆瘳。

胸乳部

甘疽圖



甘疽生在乳上為瘰癧

甘疽

甘疽憂思氣結成。膈生穀粒紫萐形。寒熱硬痛宜速潰。潰遲須防毒陷攻。(註)此證因憂思氣結而成。生於膈上。卽胸膛兩旁肉高處。屬肺經中府穴之下。無論左右。皆能爲患。初如穀粒色青。漸若紫萐色紫。堅硬疼痛。憎寒壯熱。速潰稠膿者順。若過十日寒熱不退。信膿不生。脈見浮數。防毒內陷攻裏。致生惡證屬逆。初宜服荊防敗毒散。以疎解寒熱。次服內託黃耆散。應期不潰者。急服十全大補湯託之。其餘內外治法。按疽腫瘍潰瘍門。

荊防敗毒丸

見頂部
腦中

內託黃耆散

見背部
中搭手

十全大補湯

見潰
瘍門

臃中疽圖



臃中疽

臃中疽起粟粒形。色紫堅硬漸焮疼。七情火毒發任脈。急隨證治緩成凶。(註)此證生於心窩之上。兩乳尖。屬任脈經臃中穴。由臟腑不和。七情不平。火毒凝結而成。初起如粟。色紫堅硬。漸生焮熱腫痛。憎壯熱。急服仙方活命飲。加蘇葉薄荷葉汗之。或煩躁作嘔。脣焦大渴。宜奪命丹清之。俟表證已退。急服裏透濃湯。若瘡勢不起屬虛。宜十全大補湯托之。但臃中為氣海氣之所居焉。施治貴早。表遲則毒陷攻裏。傷膜透氣者逆。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

仙方活命飲見腫瘍門

奪命丹

見背部陰陽二氣疽

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

十全大補湯

見潰瘍門

脾發疽圖



脾發疽

脾發疽生心下旁。灸博毒酒火爲殃。初如粟粒時寒熱。漸增腫痛潰膿昌。(註)此證生於心窩下兩旁。屬脾胃食竇穴。無論左右俱生之。皆由過食炙博味藥酒。以致脾經積火。成毒而發。初起形如粟粒。寒熱往來。增腫痛。若頂尖根束。紅活鮮潤。應期即潰稠膿者順。若頂平根散。色紫堅硬。屆期不潰。既潰膿如蟹沫。逆。初服荊防敗毒散汗之。唇焦大渴煩躁者。宜服太乙紫金錠。次服內疎黃連湯清之。其餘內外治法。俱癰疽腫瘍潰瘍門。

太乙紫金錠

一名紫金丹
一名玉樞丹

雄黃三錢鮮紅大

塊者研末

硃砂

三錢有神
氣者研末

麝香

二錢揀淨
皮毛研末

川五倍子

二兩一名文蛤
搗破研末

紅芽大戟

杭州紫大戟爲土江南土大戟次之北方綿大戟白者性烈峻利弱服之反致吐血憤之勿用取上品者去蘆根洗淨焙乾爲末一兩五錢

山慈菇

二兩洗去皮
毛焙乾研末

千金子

一兩一名續隨子
仁白者去油

以上之藥。各擇精品於淨室中製畢。候端午七夕重陽。或天月德天醫黃道上吉之辰。凡入室合藥之人。三日前俱宜齋沐。更換新潔衣帽。臨日方入室中。淨手薰香。預設藥王牌位。主人率衆焚香拜禱事畢。各將前藥七味。稱準入於大乳鉢內。再研數百轉。方入細石臼中。漸加糯米濃汁。調和軟硬得中。方用杵搗千餘下。極至光潤爲度。每錠一錢。每服一錠。病勢重者連服二錠。以取通利。後用溫粥補之。修合時除合藥潔淨之人。餘皆忌見。此藥惟在精誠。潔淨方效。

〔方歌〕太乙紫金諸瘡毒。疔腫癰疽皆可除。雄雉倍磨千金子。紅芽大戟山慈菇。

一、一切飲食藥毒。蠱毒瘴氣惡菌。河豚中毒自死。牛馬豬羊六畜等類之肉人誤食之。必昏亂卒倒。或生異形之證。並用水磨灌服。或吐或瀉。其人必甦。一、南方山嵐瘴氣。烟霧癘疫。最能傷人。感之纔覺意思不快。惡寒惡熱。欲嘔不嘔。即磨一錠服之。得吐利便愈。一、癰疽發背。對口疔瘡。天蛇無名腫毒。蛙節紅絲等疔。及楊梅瘡諸風癩疹。新久痔瘡。並用無灰淡酒磨服。外用水磨塗塗搽瘡上。日夜數次。覺癢而消。一、陰陽二毒。傷寒。心悶狂言亂語。胸膈塞滯。邪毒未出。瘟疫煩亂發狂喉閉喉風。俱用薄荷湯待冷磨服。一、赤白痢疾。肚腹泄瀉。急痛霍亂絞腸痧及諸痰喘。並用薑湯磨服。一、男子婦人。急中顛邪。喝叫奔走鬼交鬼胎。鬼氣鬼魔。失心狂亂。羊兒豬頭等風。俱用石菖蒲煎湯磨服。一、中風中氣。口眼歪邪。牙關緊急。言語蹇澀。筋脈變縮。骨節風腫。遍身疼痛。行步艱辛。諸風諸癘。並用酒磨炮熱服之。一、白縊溺死。驚死壓死。鬼魅迷死。但心頭微溫未冷者。俱用生薑續斷酒煎磨服。一、切惡蛇風火毒。蠱溪潤諸惡等。蠱傷

腫隨即發服。攻注偏身。甚者毒氣入裏。昏悶響叫。命在須臾。俱用酒磨灌下。再吃葱湯一盃。蓋被出立甦。一、新久瘡疾。臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服。一、小兒急慢驚風。五疳五痢。脾病黃腫。癩疹癩瘤。一關緊急。並用薄荷浸水磨濃。加蜜服之。仍搽腫上。年歲幼者。每錠分作數服。一、牙痛酒磨塗痛上。仍含許良久嚥下。一、小兒父母遺毒。生下百日內皮肉爛斑。穀道眼眶損爛者。俱用清水磨塗。一、打撲傷損用松節無灰酒研服。一、年深月近。頭脹頭痛。太陽痛極。偏頭風。及時瘡愈後。毒氣攻注腦門作脹者。一、用葱酒研服一錠。仍磨塗太陽穴上。一、婦人經水不通。紅花湯下。一、凡遇天行疫證。延街闔巷。相傳染者。用桃根湯磨濃滴入鼻孔。次服少許。任入病家。再不傳染。一、又治傳尸染瘡。諸藥不能取效。一、土指教服此。每早磨服一錠至三次。後逐下惡物尸蟲。異形怪類。後得脫利。以此相傳。活人不計其數。一、女子久患勞瘵。爲尸蟲所噬。磨服一錠。片時吐下小蟲十餘條。後服蘇合香丸。其病頓失。調理月餘。愈。真濟世衛生之寶藥也。

荆防敗毒散

見頭部
腦疽

內疎黃連湯

見腫
瘍門

井疽圖



井疽在心窩中穴

井疽

井疽心火發中庭。初如豆粒漸腫疼。心躁肌熱唇焦渴。紅活易治黑陷凶。（註）此證生於心窩。屬任脈中庭穴。由心經火毒而成。初如豆粒。腫痛漸增。心躁如焚。肌熱如火。自汗唇焦。大渴飲冷。急服內疎黃浦湯。或麥靈丹。若煩悶作嘔。發熱無汗者。奪命丹汗之。如紅活高腫者順。黑陷平塌者逆。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。若潰後經年不愈者。必成穿心冷癭難治。

內疎黃連湯

麥靈丹

俱見腫瘍門

奪命丹

見背部陰陽二氣疽

蜂窩疽

蜂窩疽形似蜂窩。胸側乳上瘡孔多。漫腫紫痛心火毒。黑陷者逆順紅活。(註)此證生於胸側乳上。亦有偏身而發者。由心火毒盛而成。色紫漫腫。疼痛。身發寒熱。初起六七孔。漸漸延開有三五寸。亦有六七寸者。形似蜂房。卽有數十竅。每竅出黃白膿。宜腫瘡面全腐。腐脫有新肉。色紅鮮潤者順。若出黑水。氣穢平坦者逆。始終內外治法。俱按癰疽腫潰瘍門。遇氣寒之人。至八九日不潰。以神燈照每日照之。應期卽潰。

神燈照法見首卷

蜂窩疽圖



神燈照法白乳瘡之形如蜂房

蠹疽圖



蠹疽在膈子骨軟陷中

蠹疽

蠹疽生於缺盆中。初豆漸李堅紫疼。寒熱尿澀宜蒜灸。證由膽胃積熱生。(註)此證一名缺盆疽。又名鎖匙疽。生在胸上頂下。潛子骨肉軟陷中缺盆穴。屬膽胃二經積熱而成。初發寒熱往來。筋骨拘急。飲食不思。胸腹膨脹。小水短澀。初發如豆。漸大如李。色紫堅硬。疼痛。初宜艾世隔獨頭蒜片灸之。內服奪命丹。次服六一散。通利小水。膿勢將成。宜服內托黃耆散。氣血虛甚者。宜服十全大補湯托補之。其餘內服治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。此證宜急托治。若失治腐爛內陷。瘡口難斂。必成敗證。

六一散 滑石六兩 甘草一兩

生

共為末。每服三錢。燈心煎湯調服。

(方歌) 六一散醫小水瘰。能除燥濕熱有功。滑石甘草研成末。燈心湯調服立通。

奪命丹

見背部陰陽二氣道

內托黃耆散

見背部中搭手

十全大補湯

見潰瘍門

瘰癧癰疽圖



瘰癧癰疽在乳房

瘰癧

瘰癧癰在乳旁生。結核紅腫硬焮疼。包絡痰凝脾氣鬱。治宜溫舒化堅癭。(註) 此證生於乳旁。初腫堅硬。形類結核。發長緩慢。漸增焮腫。色紅疼痛。由包絡痰凝。脾氣鬱結而成。係寒證非熱證也。治宜溫舒化堅。以內補十宣散服之。外敷回陽玉龍膏消之。如不消膿勢將成也。內外治法。即按癰疽腫瘍潰瘍門。

內補十宣散

人參

黃耆

當歸各二兩

桔梗

厚朴薑製

川芎 白芷 肉桂 防風 甘草各一兩

共研末。每服三錢。熱酒調服。不飲酒者。木香煎湯調下。

(方歌) 內補十宣諸腫毒。已成令潰未成消。參耆桔朴芎歸草。芷桂防風熱酒調。

回陽玉龍膏

兒腫
瘍門

內外吹乳

吹乳乳毒乳腫疼。內吹胎熱痛焮紅。外吹于鼻涼氣襲。寒熱煩渴結腫疼。(註) 乳房屬胃。乳頭屬肝。而右內吹外吹之分。內吹者懷胎六七月。胸滿氣上。乳房結腫。疼痛。若色紅者因多熱也。不紅者既因氣鬱。日兼胎旺也。多熱者宜服柴胡清肝湯。氣鬱者宜服逍遙散。外俱敷沖和膏必消。或初腫失於調治。或本人復傷氣怒。以致大腫大痛其勢必欲成膿。宜用逍遙散加黃耆白芷連翹以養血排膿治之。膿潰之後。宜調養血氣。待生產後。按潰瘍治法。方得收口。妊娠用藥禁忌。另有歌訣。詳載首卷。外吹者由乳母肝胃氣濁。更兼子吮乳睡熟。鼻孔涼氣。襲入乳房。與熱乳凝結腫痛。令人寒熱往來。煩躁口渴。初宜服荊防牛蒡湯。外用隔蒜灸法。俟寒熱退仍腫者。服橘葉煎散。外敷沖和膏消之。其腫消之不應者。將欲作膿。即用透膿散。其餘內服外敷之法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門又有至如內未懷胎。外未行乳而生毒者。係皮肉爲患。未傷乳房。此肝胃熱凝結而成乳毒也。治當按疔瘡治之。無有不效者。

荊防牛蒡湯

荊芥

防風

牛蒡子炒研

金銀花

陳皮

花粉 黃芩 蒲公英 連翹去心 皂刺各錢 柴胡 香附子

甘草各五分生

水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕 荊防牛蒡乳外吹。寒熱腫疼俱可推。銀花陳草柴香附。花粉芩蒲翹刺隨。

橘葉栝蒌散

橘葉二十個

栝蒌量登用半個或一個

川芎 黃芩

梔子生研

連翹去心 石膏煨

柴胡

清皮

青皮各錢

甘草五分生

水二鍾。煎八分。食遠服。滓再煎服。紫腫焮痛。用石膏。紅腫者去之。

〔方歌〕 橘葉栝蒌吹乳證。涼襲熱乳凝結成。芎岑梔草連翹等。石膏柴與陳皮青。

柴胡清肝湯見頭部

髮疽

逍遙散

見背部上搭手

沖和膏

透膿散

俱見腫瘍門

隔蒜灸法

見首卷灸法內

乳癰圖



乳疽圖



乳疽 乳癰

乳疽乳癰乳房生。肝氣鬱結胃火成。癰形紅腫焮熱痛。疽形木硬覺微疼。癰發膿成十四日。疽發月餘膿始成。未潰托裏排膿治。已潰大補養榮靈。(註)此證總由肝氣鬱結。胃熱壅滯而成。男子生者稀少。女子生者頗多。俱生於乳房。紅腫熱痛者為癰。十四日膿成。若堅硬木痛者為疽。月於成膿。初起寒熱往來。宜服括蕪牛蒡湯。寒熱悉退。腫硬不消。宜用復元通氣散消之。若不應。復時時跳動者。勢將潰膿。宜用托裏透膿湯。膿脹痛者鍼之。宜服托裏排膿湯。虛者補之。如人參養榮十全大補等湯。俱可選用。外敷貼之藥。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

括蕪牛蒡湯

括蕪仁

牛蒡子炒研

花粉

黃芩

生梔子研

連翹去心 皂刺

金銀花

甘草生

陳皮各一錢

青皮

柴胡各五分

水二鍾。煎八分。入黃酒一杯和勻。食遠服。

(方歌)括蕪牛蒡胃火鬱。憎寒壯熱乳癰疽。青柴花粉岑翹刺。銀花梔子草陳皮。

復元通氣散

見腫瘍門

託裏透膿湯

見頭部侵腦腫

托裏排膿湯

見項部魚尾毒

人參養榮湯

十全大補湯

俱見潰瘍門

乳發 乳漏

乳發如癰胃火成。男女皆生赤腫疼。潰久不斂方成漏。只爲膿清肌不生。(註)此證發於乳房。焮赤腫痛。其勢更大。如癰。皮肉盡腐。由胃腑濕火相燄而成。治法急按乳癰未成形者消之。已成形者托之。腐脫遲者黃靈藥撒之。以免漏潰乳房。致傷囊橋。難以收斂。若久不收口。外寒侵襲。失於調養時流清水者。卽成乳漏。外用紅升丹柞撚。以去腐生肌。再兼用豆豉餅灸法。緩緩灸之以祛寒。內當大補氣血。節勞煩。慎起居。忌發物。漸可生肌斂日而愈。

黃靈藥

紅升丹

俱見潰瘍門

豆豉餅

見首卷灸法內

乳中結核

乳中結核梅李形。按之不移色不紅。時時隱痛勞嚴漸。證由肝脾鬱結成。(註)此證乳房結核堅硬。小者如梅。大者如李。按之不移推之不動。時時隱痛。皮色如常。由肝脾二經氣鬱結滯而成。形勢雖小。不可輕忽。若就延日久不消。輕成乳癆。重成乳巖。慎之慎之。初起氣實者。宜服清肝解鬱湯。氣虛宜服香貝養榮湯。若鬱結傷脾。食少不寐者。服歸脾湯。外俱用木香餅灸法。消之甚效。

清肝解鬱湯

當歸

生地

白芍酒炒

川芎

陳皮

半夏

各八分製

貝母去心研

茯神

青皮

遠志去心

桔梗

蘇葉各六分

梔子生研

木通

甘草各四分生

香附一錢

醋炒

水二鍾。薑一片。煎八分。食遠服。

〔方歌〕清肝解鬱貝茯神。四物毒皮遠夏陳。梔桔通蘇香附草。能消乳核氣鬱伸。

歸脾湯

人參

白朮土炒

棗仁炒研

龍眼肉

茯神各二錢

黃耆一錢五分

當歸一錢

酒洗

遠志去心

木香末

甘草各五分

生薑三片。紅棗肉二枚。水煎服。

〔方歌〕歸脾湯治脾胃怯。倉少怔忡夜不安。棗遠龍眼參歸草。茯神耆朮木香煎。

木香餅

生地黃一兩

搗爛

木香五錢

研末

共和勻。量結核大小。作餅貼腫上。以熱熨斗間日熨之。堅硬木痛者。每日熨之。

〔方歌〕木香餅消乳核方。舒通結滯功倍強。生地研爛木香末。和餅貼患熨之良。

香貝養榮湯

見項部
上石疽

乳癆

乳癆初核漸腫堅。根形散漫大如盤。未潰先腐微斑點。敗膿津久勞證添。(註)此證卽由乳中結核而成。或消之不應或失於調治。就延數月。漸大如盤如盪。堅硬疼痛。根形散漫。串延胸肋腋下。其色或紫或黑。未潰先腐。外皮微點。爛斑數處。漸漸通破。輕津白汁。重流臭水。卽收膿膿也。日久潰深傷膜。內病添。午後煩熱乾嗽。顴紅形瘦。食少陰虛等證俱見。變成瘡癆。初結腫時。氣質者宜服養貝散。及神效養氣虛者逍遙散。及歸脾湯合而用之。陰虛之證已見。宜服六味地黃湯。以培其本外治法。按癰疽潰瘍門。此瘡成癆至易。獲效甚難。

養貝散

栝萋

貝母去心

南星

甘草生

連翹各一錢

水二鍾。煎八分。澄滓加酒二分。食遠服。一加青皮升麻。

(方歌)養貝散治乳結核。漸大失調變乳癆。初腫氣實須服此。南星甘草共連翹。

神効栝萋散

大栝萋一個去皮

當歸

甘草各五錢

沒藥

乳香各二錢

共研粗末。每用五錢。醇酒三鍾。慢火熬至一鍾。去滓食後服之。

(方歌)神効栝萋沒乳香。甘草當歸研末良。乳癆初腫酒煎服。消堅和血是神方。

逍遙散

見背部上脊手

歸脾湯見乳中

六味地黃湯

卽六味地黃丸改作煎劑見面部雀斑

乳巖圖



乳巖

乳巖初結核隱疼。肝脾兩損氣鬱凝。核無紅熱身寒熱。連灸養血免患攻。就延續發如堆粟。堅硬巖形引腋胸。頂透紫光先腐爛。時流污水日增疼。潰後翻花怒出血。卽成敗證氣不靈。(註)此證由肝脾兩傷。氣鬱凝結而成。自乳中結核起。初如黍粟。漸如棋子。無紅無熱。有時隱痛。連宜外用灸法。內服養血之劑。以免內攻。若年深日久。卽潮熱惡寒。始覺大痛。牽引胸腋。腫如覆碗堅硬。形如堆粟。高凸如巖。頂透紫色光亮。肉含血絲。先腐後潰。污水時津。有時湧冒臭血。腐爛深如巖壑。翻花突如泛蓮。疼痛連心。若復因急怒。暴流鮮血。根腫愈萎。斯時五臟俱衰。卽成敗證。百無一救。若患者果能清心滌慮。靜養調理。庶可施治。初宜服神效括蕪散。次宜清肝解鬱湯。外貼季芝鯽魚膏。其核或可望消。若反復不應者。瘡

勢已成。不可過用剋伐峻劑。致損胃氣。即用香貝養榮湯。或心煩不寐者。宜服歸脾湯。濕熱瀰漫者。宜服逍遙散。稍可苟延歲月。如得此證者。於腫核初起。即加醫治。宜用豆粒大艾壯。當頂灸七壯。次日起應。挑破。用三稜鍼刺入五六分。插入冰螺散捻子。外用紙封糊。至十餘日。其核自落。外貼絳珠膏。生肌玉紅膏。內舒服肝養血理脾之劑。生肌斂口自愈。

季芝鯽魚膏

活鯽魚肉

鮮山藥各等分
去皮

右共搗如泥。加麝香少許。塗核上。覺癢極勿搔動。隔夜輕輕揉之。七日一換。旋塗即消。

(方歌) 鯽魚膏貼乳巖疾。腫如覆盃似堆粟。山藥同研加麝香。塗於患處七日易。

冰螺擦

礪砂一分

大田螺五枚去殼
線穿晒乾

冰片一分

白砒即人言一錢二分麵
實是熬去麵用砒

將螺肉切片。同白砒研末。再加礪片同碾細。以稠米糊揉成捻子。磁罐密貯。用時將捻插入鍼孔。外用紙糊封。貼核上勿動。十日後四邊裂縫。其核自落。

(方歌) 冰螺擦消諸核癩。礪砂螺肉煨白砒再加冰片米糊擦乳巖堅硬用之宜。

神效栝蕒散見乳勞

香貝養榮湯見項部
上石疽

清肝解鬱湯

歸脾湯俱見乳
中結核

逍遙散見背部
上搭手

絳珠膏

生肌玉紅膏俱見潰
瘍門

醫宗金鑑正誤表

(第七冊)

5	5	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	卷別
21	17	42	40	54	28	14	6	2	52	12	1	頁數
3	3	2	3	7	6	4	4	8	17	5	9	行數
枯	于	皂	片	竭	武	華	用	活	肉	膈	手	誤
杏	子	白	勛	魏	此	草	調	治	消	復	脇	正
杏	桐	白	入	麝	此	方	白	此	肌	倒	下	改正所在
仁	子		松	香	齊	內	蜜	方	肉	上	行	
良	大	礬	香	魏	治	五	調	治	消	復	脇	
			一	竭	癰	龍		癰	瘦	轉	膈	
3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	卷別
21	21	42	40	40	29	24	11	5	44	30	8	頁數
8	3	12	8	2	1	11	11	10	1	12	2	行數
茶	于	元	分	取	陽			尿	向	七	二	誤
茶	子		八	冷	險	熱	疔		內	六	三	正
茶	白	不	川	即	切	治	治	使	藥	凡	分	改正所在
油	附	見	烏	傾	瘡	潰	癰	毒	氣	此	三	
燂	子	星	一	冷	形	瘍	疔	內	入	六	行	
枯		爲	錢	水	危	虛	毒	化	內	慾		
		度	八	中	險	熱						

6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3

33 27 17 37 34 33 15 9 43 31 16 2 42 33 23

7 6 7 4 6 9 2 9 7 1 8 7 8 4 7

蕪 清 中 錢 運 骨 乳 赤 瘡 心 醜 雞腐 各 雄 瘥

堅 陳 疽 兩 連 滑 歸 湯 必 雞 腐雞 名 雞 效

根腫愈堅 陳皮 見項部腦中 地骨皮各一兩 黃連 薄滑芍 兩旁斑爛形 當歸尾 托裏透膿湯 必行託裏 雞子一個 雞腐雞斂 俗名羊鬍子 堅硬難消 日久不效

6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3

32 19 38 35 34 22 14 2 35 19 10 2 35 29

13 3 12 11 6 7 9 12 4 2 6 7 3 4

湯 百 各 燭 風 腫 各 雞 腿 雜

黃 厚 牙 牙 分 疖 濁 食 服 炒 名 陰 腮 雞

六味地黃湯 厚味藥酒 火疔牙縫胃成 牙疔出血 丹皮一錢五分 臭膿者名耳疖 濁涕淋漓 食遠服 宜服仙方 各五錢炒 名石癰 陽降陰凝 腮之裏外 雞子清

