

醫方類聚卷之一百十五

咳嗽門 二

金匱方

肺痿肺癰咳嗽上氣病脉證治



肺痿吐涎沫而不咳者其人不可渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之若服湯已渴者屬消渴
甘草乾姜湯方

甘草

四兩

乾姜

二兩泡○千金方云集驗肘後有大棗十二枚

右咬咀以水三升煮取壹升五合去滓分

溫再服○三四方右為剉散每服四錢水

壹盞半棗三箇煎七分去滓溫服不拘時

候

欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

射干麻黃湯方

射干

十三枚一法三兩

麻黃

四兩

生薑

四兩

苑

欬冬花

各三兩

五味子

半升

大棗

七枚半夏

大者洗八枚一法半升

右九味以水

千金方東流水

一斗二升先煮麻黃

兩沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

千金方分三服日三

○玉機微義射干細辛紫苑欬

冬花

各壹錢半

麻黃生薑

各二錢

半夏

二錢

子壹錢大棗二箇右咬咀水煎作壹服

欬逆上氣時時唾濁似坐不得眠皂莢丸主

之皂莢丸方

皂莢

八兩刮去皮用酥炙

右豈味末之蜜九梧子大以棗膏和湯服
三九日三夜壹服千金方同

欬而脉浮者厚朴麻黄湯主之千金方治咳
曾滿喉中不利如水
雞聲其脉浮者方

厚朴麻黄湯方

厚朴五兩麻黄四兩石膏如雞子大杏仁半升
半夏半升乾姜二兩細辛二兩小麥壹升五味子半升
右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓
內諸藥煮取三升溫服壹升日三服

脉沉者澤漆湯主之千金方治上
氣其脉沉者

澤漆湯方

半夏半升紫參五兩壹斤澤漆三斤以東流水
作紫苑
升五兩生姜五兩白前五兩甘草五兩黃芩壹斗人參壹斗
桂枝各三兩○千金方

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服

五合至夜盡于金方每服五
合日三夜壹

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯
主之

麥門冬湯方

麥門冬七升○千金半夏壹升人參二兩甘草

二兩粳米合三升大棗十二枚○干

右六味以水壹斗二升煮取六升溫服壹

升千金方去滓服半升日三夜壹服○三因方麥門

冬去心壹錢半夏湯洗六錢壹字人參壹分甘草炙壹分

粳米二錢右為麤散每服四大錢水三盞棗

二介煎六分去滓空心服

肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶人棗瀉肺湯方

葶藶熬令黃色擣丸如彈丸大大棗十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶

煮取一升頓服○三因方治肺癰胃滿脹

膏身并面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭

酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞葶藶炒令黃研細丸如彈

子右一味用水三盞煮棗十枚至壹盞去

棗入藥煎至七分食後服金匱令先投小

青龍湯三服乃進此藥醫方大成集成南北經驗方袖珍方

永類鈔
方同

欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之

桔梗湯方 亦治血痺

桔梗 二兩 甘草 二兩
右二味以水三升煮取壹升分溫再服則吐膿血也

欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之

越婢加半夏湯方

麻黃 六兩 石膏 半斤 生姜 三兩 大棗 十五枚 甘草 二兩 半夏 半升

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

肺脹欬而上氣煩燥而喘脉浮者心下有水

千金方此下云氣脅下痛引缺盆設若有實者必躁其人常倚伏 石膏主之

小青龍加石膏湯方

麻黃千金方芍藥千金方桂枝千金方細

辛千金方甘草千金方乾姜各三兩○干

五味子壹升半夏各半石膏二兩

右九味咬咀以水一斗先煮麻黃去上

沫內諸藥煮取三升減二升下藥煮取二

升強人服壹升羸者減之日三服小兒服

四合千金方又云欬而引脅

外臺灸甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液

液者虛門

千金甘草湯

甘草千金方

右壹味以水三升煮減半去滓分溫三

服

千金生姜甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽

燥而渴

牛姜兩人參二兩○甘草四兩大棗十枚

右四味以水七升煮取三升去滓分溫

三服

千金桂枝去芍藥加皂莢湯 千金方名桂枝皂莢湯 治

肺痿吐涎沫

桂枝 各三兩 生姜 各三兩 甘草 二兩 大棗 十枚 ○千

枚皂莢 一枚去皮子炙焦 ○千金方 兩

右五味以水七升微微火煮取三升 千金方

洋分溫三服

外臺桔梗白散治欬而胃滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為

肺癰

桔梗 貝母 各三分 巴豆 一分去皮熬研如脂

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉山若下多不止飲冷水壹杯則定

千金葦莖湯治欬有微熱煩滿胸中甲錯是

為肺癰

葦莖 二升 薏苡仁 半升 桃仁 五十枚 瓜瓣 半升

右四味以水一升先煮葦莖得五升去滓

內諸藥煮取二升服壹升再服當吐如膿

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞葶藶大棗瀉肺湯主之方見前三日壹劑可至三四劑此先服小青龍湯壹劑乃進小青龍湯方見前

痰飲欬嗽

心下有痰飲胃脇支滿曰眩苓桂朮甘湯主之茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓四兩桂枝兩白朮各三兩甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯

主之方見前腎氣丸亦主之方見脚氣中

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之甘遂半夏湯方

甘遂大者三枚半夏拾貳枚以水乙升芍藥五枚煮取半升去滓

○千金計草如指大乙枚炙一本作無○
方三枚計草千金方水一升煮取半升
右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半
升和藥汁煎取八合頓服之

脉浮而細滑傷飲 脉弦數有寒飲冬夏難

治脉沉而弦者懸飲內痛 病懸飲者十棗

湯主之 千金方三因方夫有支飲家數煩曾
中痛者不卒死至一百日言歲可與

此方得效方治飲水流在脅下咳唾引痛一
歲不愈者醫方大成治支飲懸飲咳喘引

曾曾其
肝弦者

十棗湯方

芫花 熬○得效方
大成微炒 甘遂 大戟 各等分○得
效方大成少
炒

右三味擣篩 得效方
到散 以水壹升五合先煮

肥大棗十枚取八合去滓內藥末強人服

壹錢匕羸人服半錢平旦溫服之不下者

明日更加半錢得快下後糜粥自養 神巧
萬全

方玉機微義同萬全方又云欬而引脇下
痛者亦十棗湯主之三因方若已下不可

與○大成右為末每服壹錢用棗湯調下

體弱者不可多服 醫方集成
與大成同

病溢飲者當發其汗大青龍湯主之 小青
龍湯亦主之

大青龍湯方

麻黃六兩 去節 桂枝二兩 去皮 甘草二兩 炙 杏仁四兩 去皮
皮生薑三兩 大棗十二枚 石膏如雞子 大碎
右七味以水九升先煮麻黃減二升去上
沫內諸藥者取三升去滓溫服壹升取微
似汗汗多者溫粉粉之○三因方治溢飲
身體疼重汗不出拘急痛麻黃去節 湯七錢半 桂

心甘草炙各二錢半 石膏雞子大 杏仁四兩 去皮 炙

右為剉散每服四大錢水壹盞半薑五片
棗二枚煎七分去滓空腹服溫覆壹服汗
者勿再服復服汗出多亡陽虛逆惡風煩
躁不得眠也得效方同

小青龍湯方于金方治欬逆 倚息不得卧方

麻黃三兩 去節 芍藥三兩 五味子半升 乾薑三兩 甘草三兩
細辛三兩 桂枝三兩 去皮 半夏半升 湯洗
右八味以水壹斗先煮麻黃減二升去上

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升千金方弱
者服半升若渴去半夏加栝蒌根三兩若
微痢去麻黃加薤花如雞子大若食飲噎
者去麻黃加附子壹枚若小便不利小腹
滿者去麻黃加茯苓四兩若喘者去麻黃
加杏仁
○三因方治溢飲支飲倚息不得
臥及喘滿者麻黃去節芍藥細辛桂心乾
姜炮甘草炙各三錢五味子二錢半夏湯洗七
右爲剉散每服四大錢水壹盞半煎七分
去滓空腹服渴者去半夏加栝蒌根三錢
三字微利去麻黃加元花壹雞子大炒

入噎者去麻黃加附子壹枚炮小便不利
者去麻黃加茯苓半兩喘者去麻黃加杏
仁三錢三字咳而上氣肺脹其脉浮心下
有水氣者胷中痛引缺盆加石膏二錢半
研得效

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其
脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已
湯主之虛者卽愈實者三日復發復與不愈
者宜木防已湯去石膏加茯苓芒消湯主之

木防已湯方

木防已三兩石膏拾貳枚如雞子大桂枝貳兩○千

人參四兩

右四味以水六升煮取二升分温再服

木防已加茯苓芒硝湯方

木防已千金方三兩桂枝各貳兩○千人參

芒硝三兩茯苓各四兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分温再服微利即愈

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

澤瀉湯方

澤瀉五兩白朮貳兩

右二味以水二升煮取壹升分温再服玉

微義

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之千金方夫酒

吐而此坐久飲過受所致也其脉虛者必冒其胃中木有支飲支飲胃滿主之

厚朴大黃湯方

厚朴乙尺大黃陸兩枳實四枚○千

右三味以水五升煮取二升分溫再服玉

微義

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之方見

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支

飲故也小半夏湯主之

小半夏湯方

半夏乙升 生姜半斤

右二味以水七升煮取壹升半分溫再服

千金方玉 ○三因方半夏湯洗七次 右為判散

每服四大錢水二盞薑十片煎七分去滓

溫服

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒蘆黃丸

主之

防已椒目亭蘆大黃丸方

防已 椒目 葶藶熬 大黃各乙

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服壹

丸日三服稍增口中津液渴者加芒硝

半兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

小半夏加茯苓湯方

半夏乙升 生姜半斤 茯苓三兩一法四兩

右三味以水七升煮取壹升五合分温再

服玉機微義同千金方云胡○三因方大治不用茯苓用桂心四兩

半夏湯半夏五兩洗 茯苓三兩右為判散每服

四大錢水二盞薑七片煎七分去滓温服

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癩眩此水也

五苓散主之千金方方見傷寒門

五苓散方

澤瀉乙兩 豬苓乙分 茯苓去皮 白朮三分 桂二分

去皮

右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲

暖水汗出愈

外臺茯苓飲治心胃中有停痰宿水自吐口水後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白朮各三兩 枳實二兩 橘皮二兩

半生薑兩

右六味水六升煮取壹升八合分温三服
如人行八九里進之

欬家其脉弦為有水十棗湯主之方見前

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百

日一歲宜十棗湯方見前

久欬數歲其脉弱者可治實大數者死其脉

虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治

屬飲家

欬逆倚息不得卧小青龍湯主之方見前

青龍湯下已多唾口燥寸脉沉尺脉微手足

厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱

如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與

茯苓桂枝五味子甘草湯治其氣衝

桂苓五味甘草湯方三因方名茯苓五味子湯

茯苓四兩桂枝二兩土皮〇干金方桂心三兩甘

草三兩〇干五味子半升〇三因

右四味以水八升煮取三升去滓分三温

類聚百三

十一

類聚百五

十一

服○三因方右爲剉散每服四大錢水壹
盞半煎七分去滓空腹服服之衝氣卽伍
反更咳滿者去桂加乾薑細辛各三兩咳
滿止而復渴衝氣更發者以細辛乾薑爲
熱藥此法不當逐渴反止者爲支飲也支
飲法當冒冒者必嘔嘔者復加半夏二兩
半以去其飲飲去嘔則止其人形腫與痺
加杏仁二兩半若面赤如醉以胃中熱上
熏加大黃三兩須詳證加減

衝氣卽伍而反更欬胸滿者用桂苓五味甘
草湯去桂加乾姜細辛以治其咳滿

苓甘五味姜辛湯方

茯苓^{四兩} 甘草 乾姜 細辛^{各三} 五味子

^{半升}

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半

升日三^{千金方同}

咳滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾
姜爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支

類聚百三

飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半
夏以去其水

桂苓五味甘草去桂加乾姜細辛半夏湯方

茯苓四兩甘草四兩細辛各二兩乾姜各二兩五味子三兩

半夏各半升

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半

升日三千金方同

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應
內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之

者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽
故也苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯方

茯苓四兩甘草三兩五味子三兩乾姜三兩細辛三兩

半夏半升杏仁半升皮尖去

右七味以水壹斗煮取三升去滓溫服半

升日三千金方同

若而熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黃
以利之

茯苓五味加姜辛半夏大黃湯方

類聚百三

茯苓四兩甘草三兩五味子半升乾姜三兩細辛三兩

半夏半升杏仁半升大黃三兩

右八味以水壹斗煮取三升去滓溫服半

升日三方千金方同

先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓

苓湯主之方見前

千金方

肺痿

麻黃湯治肺脹咳而上氣咽燥而喘脉浮者

心下有水方

麻黃 芍藥 生薑仲景用乾薑 細辛 桂心

各三兩 半夏 五味子各半升 石膏四兩

右八味以水壹斗煮取三升分三服

仲景名此為小青龍加石膏湯川甘草三兩為丸味

咳嗽

麻黃石膏湯治上氣胃滿者方

麻黃四兩石膏壹斤厚朴五兩小麥壹升杏仁半升

右五味以水壹斗先煮小麥熟去之
下藥煮取三升去滓分三服深師用治久逆上
氣喉中如水雞鳴名小投杯湯咳者加五
味子半夏各半升乾姜三累

溫脾湯治食飽而咳者方

甘草兩四大棗貳拾

右二味咬咀以水五升煮取二升分三服
溫服之若咽中痛而聲鳴者加乾薑壹兩
百部根湯治嗽不得卧兩眼突出方

百部根 生薑各一斤 細辛 甘草各三兩 貝

母 五味子 白朮各二兩 桂心四兩 麻黃六兩

右九味咬咀以水壹斗二升煮取三升去

滓分三服古今錄驗用杏人四兩紫苑叁兩

海藻湯治欬而下利胃中痞而短氣心中時
悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡
寒方

海藻四兩 五味子 半夏各半升 生薑壹兩 細辛

二兩 茯苓六兩 杏人五拾枚

右七味峻阻以水壹斗煮取三升去滓分
三服日三一方無五味子生薑

白前湯治水欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿
晝夜倚壁不得卧咽中作水雞鳴方

白前 紫菀別後方 半夏別後方 大戟各

兩○別後方七合

右四味峻阻以水壹斗浸壹宿明旦煮取

三升分三服別後方又云禁食羊肉鰂大佳

治九種氣嗽欲死百病方

乾薑 半夏 細辛 紫菀 吳茱萸

薤花一作花 茯苓 甘遂 甘草 防葵

人參 烏頭 大黃 杏仁各一分 葶藶二分

巴豆 厚朴 白薇各二分 五味子 遠志

前胡 菖蒲 枳實 蜀椒 皂莢 當

歸 大戟 桂心各半分

右二十八味為末蜜丸如梧子大先食服
二丸日三服以知為度不知增之

麻黃散治上氣嗽方

類聚百五

麻黃半斤 杏仁百枚 甘草三兩 桂心一兩

右四味治下篩別研杏仁如脂內藥末和合臨氣上時服一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕可至三七氣發便服即止一方去桂心甘草

太醫令王叔和所撰御服蜀椒圓治上氣欬

嗽甚良

蜀椒九分 烏頭五分 杏仁 菖蒲 皂莢

礬石各一分 細辛 欬冬花 紫菀

乾薑各三分 吳茱萸 麻黃各四分

右十二味為末蜜丸梧子大暮臥吞二丸治二十年久咳不過二十九

通氣圓治久上氣咳嗽咽中腥臭虛氣攪心痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注時氣食不生肌胃中隔塞嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少惡疰淋痛病方

飴糖三升 蜀椒二升 杏仁一斤 蜈蚣五節 大附子五枚
乾薑 人參各四分 桂心六分 烏頭七分 天門冬

類聚百五

二十一

類聚南五
三十一

分十

右十味為末別治杏人如脂稍稍內藥末
搗千杵烱糖乃內藥末中令調和含如半
棗壹枚日六七夜三四服以胃中溫為度
若夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣食不
消加杏人五合小腹急腰痛加天門冬杜
仲有風加烏頭三枚附子壹枚立夏後勿
加也有留飲加葶藶壹兩

治咳嗽上氣方

蜀椒 桂心 海蛤各四分 昆布 海藻

乾薑 細辛各六分 麥門冬拾分

右八味為末蜜丸梧子大飲服十丸加至
二十九日三服有人風虛中冷胃中滿上
氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲欬服此方
得瘥

治欬嗽胃脇支滿多唾上氣方

礬石一作烏頭不用 菖蒲各一分 細辛 黃

環名二 欬冬花 紫苑 杏人各三分 吳茱

莫

四分乾薑

五分蜀椒

合五

右十壹味為末蜜丸梧子大每服壹丸著
牙上咽汁日五六服劇者常含不止

又方薑汁

壹升砂糖

合五

右二味煎薑汁減半內糖更煎服之

又方白糖

五分皂莢

末一方

右二味先微暖糖令消內皂莢末合和相
得丸如小豆先食服二丸

又方酒壹升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半

升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飯

三四口止之

又方巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日

杏二枚二日三枚

又方服芥子七丸以油酒下之

射干煎治咳嗽止氣方

射干

款冬花

各二

紫菀

細辛

各二

桑白皮

附子

甘草

各貳

白蜜

竹瀝

生薑汁

各一升壹

云飴糖

五

右十貴味以射干先內白蜜并竹瀝中可
五六沸去之咬咀六物以水壹升合浸壹
宿煎七上七下去滓乃合飴薑汁煎如餹
服如酸棗壹九日三劇者夜二不知加之
以知爲度

杏人煎治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁合上五味子合各三款冬花合各三紫苑壹

薑各二桂心三甘草四麻黃壹

右八味以水壹斗煮麻黃取四升治諸藥

爲末又內膠飴半斤白蜜壹斤合內汁中
攪令相得煎如飴先食服如半棗許日三
服不知加以知爲度

又方治忽暴嗽失聲語不出方

杏人 薑汁 砂糖 蜜各壹五味子

紫苑各叁通草 貝母各四桑根白皮

兩五

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓內
杏人脂薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初

服三合日再夜一後稍加

通聲膏方

五味子 欵冬花 通草各叁兩 人參 細

辛 青竹皮 桂心 菖蒲各二兩 杏人

薑汁各壹升 白蜜二升 棗膏三升 酥五升

右十三味咬咀以水五升微火煎三上三

下去滓內薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服

棗大二丸

杏人飲子治暴熱嗽方

杏人四拾枚 紫蘇子一升 橘皮一兩 柴胡四兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服

常作飲服

蘇子煎治上氣欵嗽方

蘇子 生薑汁 地黃汁 白蜜 杏人

各二升

右五味擣蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹

絞取汁更擣以汁澆又絞令味盡去滓熬

杏人令黃黑治如脂又以向汁澆之絹絞

往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜壹崔氏無地黃汁

又方菴薑末三兩膠飴一斤

右二味和令調蒸五升米下冷以躡大含稍稍咽之日五夜二

芫花煎治新久嗽方

芫花 乾薑各貳兩白蜜貳升

右三味為末內蜜中令相和微火煎令如

糜每服如棗核大壹枚日三夜一以知為

度欲利者多服深師以治冷飲嗽又治三

芫花取三升去滓內薑加蜜合煎如糜服之

款冬煎治同前

款冬花 乾薑末 紫苑各三兩五味子二兩

芫花壹兩合赤兩熬

右五味咬咀先以水壹斗煮三味收三升半去滓內芫花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如糖每服半

棗許日三

治三十年欬嗽或飲或欬寒氣嗽雖不同悉主之之方

細辛 欬冬花 防風 紫苑各三兩 梨蘆

二兩 蜀椒合五

右六味咬咀取藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛次欬冬花次椒以大棗百枚間著諸藥間以水壹斗二升微火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服壹

枚以胃中溫濕為度若強人欲嗽吐者可小增服之便吐膿囊裏結吐後勿冷飲食欬愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已

治三十年久嗽方百部根二十斤大本本草二十根

擣取汁煎如飴服一方寸七日三服外臺和飴

壹斤煎成煎以溫粥飲調下深師方以白蜜二升更煎五六沸服三合

又方紫苑二兩 欬冬花三兩

右二味治下篩先食飲服一方寸七日三

服七日瘥

又方白蜜壹斤生薑二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止且服如棗大含壹丸日三服禁一切雜食

治久嗽不瘥方

兔屎四十九枚○聖惠方壹兩礪砂二分○聖惠方三分胡桐

律壹分

右三味為末蜜和丸如梧子大每服三九

以粥飲下日三聖惠方日三四服吐冷物盡即瘥

治積年欬喉中呀聲一癸不得坐卧方

紫菀 貝母 半夏 桑根白皮 五味

子 射干 百部各五分 欬冬花 皂莢

乾薑 橘皮 鬼督郵 細辛各四分 白石

英 杏人各八分 蜈蚣二枚

右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十

九日再稍加至二十九崔氏無半夏射干

細辛白石英用麻黃貳兩羌根壹兩白皮壹兩半以煮棗湯送下

又方白蜜壹斤生薑二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止且服如棗大含壹丸日三服禁一切雜食

治久嗽不瘥方

兔屎四十九枚○聖惠方壹兩礪砂二分○聖惠方三分胡桐

律壹分

右三味為末蜜和丸如梧子大每服三九

以粥飲下日三聖惠方日三四服吐冷物盡即瘥

治積年欬喉中呀聲一發不得坐卧方

紫苑 貝母 半夏 桑根白皮 五味

子 射干 百部各五分 欬冬花 皂莢

乾薑 橘皮 鬼督郵 細辛各四分 白石

英 杏人各八分 蜈蚣二枚

右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十

九日再稍加至二十九崔氏無半夏射干

細辛白石英用麻黃貳兩羌根白皮壹兩半以煮棗湯送下

欵冬圓治三十年上氣咳嗽唾膿血喘息不
得卧方

欵冬花 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心

菖蒲 各五分 人參 細辛 蕤花 紫苑

甘草 桔梗 防風 芫花 茯苓 皂

莢 各三分

右十六味為末蜜丸如梧子大酒服三丸

日三服○聖濟總錄欵冬花丸方欵冬花

去梗乾薑 炮蜀椒 去目及閉口者炒出汗 吳茱萸 淨洗焙乾

炒 桂 去麤皮 菖蒲 剉米泔浸半日炒 人參 細

辛 去苗 芫花 醋浸炒乾 紫苑 去苗 甘草 炙 桔梗

炒 白茯苓 去皮 皂莢 炙去皮子 石壹十四

味持羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

酒卜二九加至十九日三服

又方欵冬花 紫苑 細辛 石斛 防風

芎藭 人參 當歸 藁本 甘草 蜀

椒 白朮 半夏 天雄 菖蒲 鍾乳

料心 麻黃 各三分 獨活 去骨 烏頭 芫花

附子各壹兩 桃人二十枚 大棗二十枚

右二十四味為末蜜丸如梧子大酒服二

十九日二服不知加之酒漬服亦得

又方欵冬花 乾薑 桂心 紫菀各三細分

辛二分 杏人 皂莢 礬石一作禁石 菖蒲 烏

頭各一分 蜀椒五合 吳茱萸六合

右十二味為末蜜丸如梧子大酒服五丸

日三夜一二十年嗽不過五十日愈患欬

嗽喉鳴上氣服壹劑永瘥

治肺傷咳唾膿血腸澀背氣不能食惡風目
暗眩眩足脛寒冷方

白膠 生薑各五兩 桂心 人參 紫菀各

兩 大棗二十枚 乾地黃切半 桑白皮切二 芎

藟 大麻人 飴糖各一升 大麥三升

右十二味以水一斗五升煮麥取壹

斗去麥下藥煮取三升分五服

五味子湯治唾中有膿血牽脅痛方

五味子 桔梗 紫菀 甘草 續斷各

兩竹茹三兩赤小豆一升地黃 桑根白皮各五兩

右九味咬咀以水九升煮取二升七分

為三服○聖濟總錄五味子炒生乾地黃

焙桑根白皮炙剉各壹兩桔梗炒紫苑土續

斷甘草炙剉赤小豆各半兩右八味麤搗篩每

服三錢匕入竹茹少許水壹盞半煎至八

分去滓溫服日三夜一玉機微義治咳嗽

不已皮膚乾燥唾中有血胃脇疼痛五味

桔梗紫苑甘草續斷各二錢竹茹三錢赤小豆一撮生地黄桑白皮各半兩右咬咀作二服水煎

竹皮湯治欬逆下血不息方

生竹皮三兩紫苑二兩飴糖壹斤生地黄切壹升

右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分

三服

百部圓治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根三兩升麻半兩桂心 五味子 甘草

紫苑

乾薑

各一兩

右七味為末蜜和丸如梧子大每服三九日三以知為度

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁

杏仁

各二斤

糖

蜜

各壹升

猪膏

二合

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙

拭令淨擣如膏合薑汁糖蜜等合煎令可

丸每服如杏核壹枚日夜六七服漸漸增

加

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方好酥

三十斤三徧鍊停取凝當出醍醐服壹合

日三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方三鍊酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日夜一夜一

鍾乳七星散治寒冷欬嗽上氣胃滿唾膿血方又名吸散

鍾乳

礬石

欬冬花

桂心

各等分

右四味治下篩作如大豆十聚七星形以

小筒吸取酒送下先食服日三不知加之
數試大驗又云臨并吸服之

又方鍾乳 細辛 欵冬花 天雄 紫菀

石膏各等分

右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸
之日二只得食粥七日嗽愈乃止若大豆
聚不知小益之勿太多

七星散治三十年欵嗽方

欵冬花 紫菀 桑根白皮 代赭 細

辛 伏龍肝各一兩

右六味治下篩作七星聚聚如菹豆者以
竹筒口當藥上一一吸咽之令藥入腹中
先食日三元服四日日復作七星聚以一
臠肉炙令熟以展轉藥聚上令藥悉徧肉
上仰卧阻嚼之細細咽汁令藥力歆歆割
割然毒氣入咽中藥力盡總咽却取瘥止
未瘥復作如初羊牛鹿肉皆可猪肉不可
用

治嗽熏法以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後
 以硫黃末薄布艾上務令調勻以荻壹枚
 如紙長捲之作十枚先以火燒纏下去荻
 烟從孔出口吸烟咽之取吐止明且復熏
 之如前聖惠方同日一二止自然可瘥得食日
 粥飲皆忌恐是熏黃如硫黃見火必焰矣

神巧萬
 全方同

又方熏黃壹兩研令細以蠟紙并上熏黃令
 與蠟相入調勻捲之如前法熏之亦如上

法日一二止以吐為度七日將息後以羊
 肉羹補之聖惠方同

又方爛青布廣四寸布上布艾艾上布青礬
 末聖惠方布少白礬末礬上布少熏黃末又布少鹽
 又布少鼓末急捲之燒令著內燥罐中以
 紙蒙頭更作一小孔口吸取烟細細咽之
 以吐為度若心胃悶時略歇煙盡止日壹
 二度用三捲不盡瘥三七日慎油膩

痰飲

小半夏湯病心腹虛冷遊痰氣上胃脇滿不
下食嘔逆者

半夏壹升生薑壹斤橘皮兩四

右三味咬咀以水壹斗煮取三升分三服
若心中急及心痛內桂心四兩若腹滿痛
內當歸三兩羸弱及老人尤宜服之一方

用人參二兩仲景無橘皮人參

又方半夏壹升生薑壹斤桂心三兩甘草一兩

右四味咬咀以水七升煮取二升半分三

服

甘草湯治心下痰飲胃脅支滿目眩方

甘草二兩桂心兩白朮各三兩茯苓四兩

右四味咬咀以水六升宿漬煮取三升去
滓服壹升日三小便當利

十棗湯治病懸飲者若下後不可與也凡上

氣汗出而欬者此為飲也方見金匱

小青龍湯病溢飲者當發其汗方見金匱范汪

用大青龍湯

椒目圓腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之

椒目 木防已 大黃各壹兩 葶藶二兩

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服壹

九日三後稍增口中有津液止渴者加芒

消半兩

大茯苓湯主胃中結痰飲澀結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風小方

茯苓 白朮各三兩 當歸 橘皮 附子各貳

兩生薑 半夏 桂心 細辛各四兩壹

右九味咬咀以水壹斗煮取三升去滓分

三服服三劑良

茯苓湯治胃膈痰滿方

茯苓四兩 半夏壹斤 生薑壹斤 桂心八兩

右四味咬咀以水八升煮取二升半分四

服冷極者加大附子四兩若氣滿者加檳

榔三七枚

大半夏湯治痰冷澀飲胃膈中不理方

半夏青升 白朮兩 生薑兩 茯苓 人參 桂

心 甘草 附子各二兩

右八味咬咀以水八升煮取二升分三服

半夏湯治痰飲澼氣吞酸方

半夏 吳茱萸各二兩 生薑六兩 附子一枚

右四味以水五升煮取三升半分三服老

小各半日三

乾棗湯治腫及支滿澼飲方

大棗拾枚 大戟 大黃 黃芩 甘草 枳

遂各一兩 芫花 薤花各半兩

右八味咬咀以水五升煮取壹升六合分

四服空心服以快下為度

常歸湯治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

常歸 人參 桂心 黃芩 甘草 芍

藥 芒消各二兩 大黃四兩 生薑 澤瀉各三兩

右十味咬咀以水壹斗煮取三升分三服

○聖濟總錄常歸焙切 人參 桂去皮 黃芩去

心 甘草 芍藥 芒消各二兩 大黃四兩 澤瀉

參

右九味麤擣篩每服三錢匕以水壹盞半入生薑半分切煎取八分去滓溫服

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參 旋復花 橘皮 細辛 各壹兩 澤瀉

白朮 杏仁 枳實 各貳兩 茯苓 柴胡

生薑 半夏 芍藥 各叁兩

右十三味咬咀以水九升煮取二升七合分三服日三

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔 十貳枚 生薑 杏仁 白朮 各四兩 半夏

捌兩 茯苓 五兩 橘皮 叁兩

右七味咬咀以水壹斗煮取三升去滓分三服

吳茱萸湯治胃中積冷心嘈煩滿汪汪不下飲食心胃應背痛方

吳茱萸 三兩 半夏 四兩 桂心 人參 各二兩 甘草

壹兩 生薑 五兩 大棗 二十枚

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓分
三服日三

治胃膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或
水鳴多唾口中清水自出脅肋急脹痛不欲
食此皆胃氣弱受冷故也其脉喜沉弦細遲
悉主之力

半夏

生薑

各五兩

芍藥

各二兩

茯苓

各四兩

旋復花

細辛

橘皮

桂心

人參

甘草

桔

梗

各貳兩

右十壹味咬咀以水壹斗煮取三升分三
服病先有時喜水下者用白朮三兩去旋
復花若欲得利者加大黃二兩須微調者
用乾地黄

治冷熱久滯實不能飲食心下虛滿如水狀
方

前胡

生薑

茯苓

半夏

各四兩

甘草

枳實

白朮

各參兩

桂心

貳兩

右八味咬咀以水八升煮取三升分三服

前胡湯治胃中久寒澹實隔塞胃痛氣不通利三焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱身重臥不欲起方

前胡 人參 當歸 甘草 半夏各參兩

大黃 防風 麥門冬 吳茱萸 黃芩

各壹兩 生薑四兩 杏仁四拾枚

右十二味咬咀以水壹斗煮取三升去滓

分三服深師方云若脅下滿加大棗拾貳枚此利水亦生

旋復花湯治胃膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花 細辛 前胡 甘草 茯苓各兩

兩 生薑八兩 桂心四兩 半夏壹升 烏頭五枚

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分

三服

薑椒湯治胃中積聚痰飲飲食減少胃氣不足咳逆嘔吐

薑汁七合 蜀椒合 桂心 附子 甘草各一兩

橘皮 桔梗 茯苓各貳兩 半夏參兩

右九味咬咀以水九升煮取二升半去滓

內薑汁煮取二升分三服服三劑佳者欲服大散諸五石丸必先服此湯及進黃耆丸佳一方不用甘草

薑附湯治痰冷滯氣胃滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方

生薑八兩生附子四兩生

右二味咬咀以水八升煮取三升分四服亦主卒風

擦膈散治心上結痰飲實寒吟心悶方

瓜丁二十枚赤小豆七枚人參各壹分甘草各壹分

右四味治下篩酒服方寸匕日二亦治諸黃

斷膈湯治胃中痰癖方

恒山三兩甘草各壹兩松蘿各壹兩瓜蒂貳拾一枚

右四味咬咀以水酒各壹升半煮取壹升半分三服後服漸減之得快吐後須服半

夏湯方見前篇

松蘿湯治胃中痰積熱皆除方

松蘿貳兩烏梅 梔子各十枚甘草一兩恒山兩

右五味咬咀以酒三升浸壹宿平旦以水

三升煮取壹升半去滓頓服之亦可分二

服壹服得快吐即止

杜蘅湯主吐百病方

杜蘅 松蘿各叁兩瓜丁叁七枚

右三味咬咀以酒壹升二合漬二宿去滓

分二服若壹服即吐者止未吐者更服相

去如行十里久令藥力盡服壹升稀糜即

定老小用之亦佳

蜜煎主寒熱方

蜜五合恒山 甘草各貳兩

右三味取二味咬咀以水壹斗煮取二升

去滓內蜜五合溫服七合吐即止不吐更

服七合勿與冷水一方用甘草半兩

又方蜜二合醋八合

右二味調和平旦頓服須臾猥猥然欲吐

擿之若意中不盡明旦更服無不大嘔安

穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胃
膈中痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之
卽瘥方單煮茗作飲二三升許適冷暖飲
二升須臾擿卽吐吐畢又飲如此數過劇
者須吐膽乃止不損人而渴則瘥

葱白湯治冷熱膈厥發時頭痛悶亂欲吐不
得者方

葱白莖二七 烏頭 甘草 眞珠 恒山各

兩桃葉壹把一作
批把葉

右六味咬咀以水酒各四升和煮取三升
去滓內珠每服壹升吐卽止

大五飲圓主五種飲壹日留飲停水在心下
二日澀飲水澀在兩脅下三日淡飲水在胃
中四日溢飲水溢在膈上五臟間五日流飲
水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及
傷寒飲冷水過多所致方

菘菘 遠志 苦參 藜蘆 烏賊骨

白朮 廿遂 大黃 石膏 括蕁根

桔梗 半夏 紫菀 前胡 五味子

芒消 桂心 芫花 當歸 人參

貝母 茯苓 芍藥 大戟 葶藶

黃芩 各膏兩 甘草 恒山 薯蕷 厚朴

細辛 附子 各參分 巴豆 參拈枚

右三十三味為末蜜和丸如梧子大飲服

三九日三稍稍加之以知為度

旋復花圓治停痰癖飲結在兩脅腹脹滿羸

瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀
或利腹中動搖作水聲腹內熱口乾好飲水
漿卒起頭眩欲倒脇下痛方

旋復花 桂心 枳實 人參 各五分 廿遂

參分 吳茱萸 細辛 大黃 黃芩 葶藶

厚朴 芫花 橘皮 各四分 乾薑 芍藥

白朮 各陸分 茯苓 狼毒 烏頭 礬石 各八分

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸

日二後加以知為度延年方無白木狼毒烏頭礬石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂白芨茯苓子各真分對椒防葵杏仁各參兩乾地黃四分

中軍候黑圓治澀飲停結滿悶白暗方黑又作里

芫花參兩巴豆捌分杏仁五分桂心一分桔梗各四分

右五味為末蜜丸如胡豆每日服三丸稍

增得快下止

順流紫圓治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰澀大小便不利小腹切痛膈上塞方

石膏斤代赭分烏賊骨各半夏分桂心分

四分巴豆七枚

右六味為末蜜丸如胡豆平旦服壹丸加

至二丸胡洽有藜蘆茯苓當歸各三分范注方無石膏半夏有當歸壹分茯苓叁分藜蘆五分

治停痰澀飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食不消喜唾乾嘔大小便或澀或利方

旋復花 大黃 附子 茯苓 椒目 桂心 芫花 狼毒 乾薑 芍藥 枳

藥身百集

實 細辛 各八分

右十二味為末蜜丸如梧子飲下三九日
三服後漸增

治風氣膈上痰飲方不開口苦瓠湯煮三五
沸以物裹熨心膈上

千金月令

主肺氣喘息急唾稠黏似膿方

桑根白皮 八分 白煎 四分 紫苑 六分 洗去土甘
草 四分 赤茯苓 四分 牛麥門冬 十二分 半夏

洗 十二分 湯 柴胡 八分 生薑 十二分 石膏 十二分 杏

人 六分 去皮碎 麻黃 十二分 去
已上經宿浸 麻黃根節不浸

右切以水三升分取半浸藥以一半先煎
麻黃去上沫卽下諸藥煎取七合去滓空
腹分溫再服忌熱麪油膩羊肉等

主消痰疾理嗽方

杏仁 三十七顆 去 麻黃 四分 去根 斤 麻 八

五味子 四分 研破 甘草 四分 貝母 八分

右以水二大升先煎麻黃去上沫下諸藥

真經

卷六

煮取七合去滓不司食前後任意飲之

又方夜干四分欵冬花六分升麻八分甘草四分貝

母六分白前四分赤茯苓四分紫苑四分去上秤

右切以小壺大升半煎取七合去滓空腹

進壹服食後通進壹服

主肺熱方

知母 大青 石膏 生地黄 黃芩

桔梗已上各五分甘草二分

右以小壺大升煎取七合去滓服之

主肺熱肩背疼痛悶胃弱方

桔梗六分甘草五分青木香四分

右切以小壺升二合煮取半去滓分再服

海上仙方

遠年咳嗽

遠年咳嗽久難痊休要求神枉使錢但用欵

冬花作末燒香口吸便安然

咳嗽不止

咳嗽如不止須用乾浮萍搗和煎服喫所患

立時寧

聖惠方一 欬嗽

治久欬嗽諸方

夫久咳嗽者由肺虛極故也肺氣既虛為風寒所搏連滯歲月而嗽也此皆陰陽不調氣血虛弱風冷之氣搏於經絡留積於內邪正相并氣道壅澁則欬嗽而經久不差也

治久咳嗽胃中氣不利宜服百合散方

百合壹兩紫蘇子三分桑根白皮一兩紫苑

三分去甘草半兩欬冬三分漢防已三分

貝母三分煨杏仁半兩湯浸去皮尖人參

三分去微黃赤茯苓兩麻黃一兩桔梗半兩

蘆頭兩根節去 頭

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水壹大

盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不

計時候溫服

治久欬嗽不差木乳散方

皂莢樹白皮二兩蘇酥貝母一兩微黃枳殼

壹兩麩炒麻黃壹兩去根節 百合壹兩炙 甘草半兩 微黃去瓢赤判

右件藥搗羅為散每服三錢以水壹中 盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三

四服

治久嗽不止紫苑散方

紫苑三兩去苗土 款冬花三兩

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中 盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三

四服

治久肺氣欬嗽涕唾稠黏上氣喘急蛤蚧丸

蛤蚧一對頭尾全者 漢防已半兩 貝母半兩 微塗酥炙令微黃

黃甜葶半兩 桑根白皮一兩 蟬殼半兩 炒令紫色

兩豬苓半兩去黑皮 赤芍藥半兩 陳橘皮三分湯 兩

人參半兩去蘆頭 甘草壹分炙 五味子半兩 焙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵在 如梧桐子大每於食後以溫粥飲下三十

凡

治久咳嗽上氣不差宜服紫蘇子丸方

紫蘇子壹兩五味子壹兩蘿蔔子壹兩桑根白

皮一兩皂莢三兩酥炙微黃去子甜亭歷二兩

炒令紫色

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服以棗煮粥飲下二十九

日三四服神巧萬全方御醫撮要同

治一切喘嗽久不差甜亭歷丸方

甜葶藶一兩隔紙人參三分去赤茯苓三分

蛤蚧一對頭尾全者杏仁壹兩湯浸去皮微黃雙人麩炒微

右件藥搗羅為末以棗肉和丸如梧桐子

大每服以粥飲下三十九神巧萬全方日三四

服

治久咳嗽肌體虛羸不思食飲宜服此方

栝子二兩五靈脂壹兩甜葶藶壹兩隔紙蝦

蟆頭壹枚杏人雙人麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以溫粥飲下二十九日三四服

治久肺氣咳嗽鹿角膠煎方

鹿角膠

四兩搗碎

赤茯苓

壹兩

紫苑壹兩去苗土

紫蘇子

二兩

貝母

壹兩煨

百合壹兩

已上六味搗羅為末

杏人

二兩湯浸去皮尖雙

生地黃汁五生

薑汁

三合

白蜜

八兩

牛酥

五合

右件藥都一處與地黃汁等相和攪令勻

於銀器中以慢火煎成膏每於食後含半

棗大燕津

又方百部根

五斤生者

右件藥搗絞取汁入蜜一斤煎之如飴每

服壹匙以溫粥飲調服日三四服○衛生

易簡方百部根搗自然汁和蜜等分沸煎

成膏每服方寸七日三服

又方欵冬花

壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如半棗大以

蘇裏壹丸含嚙津日四五服

治咳嗽久不差神驗方

皂莢五挺不艸者去黑皮塗酥炙令黃焦去子

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每於食後以桑白皮湯下十九

治積年咳嗽諸方

夫肺感於寒即成咳嗽或藏腑氣虛形寒飲冷而傷於肺肺氣不足為邪所乘連滯歲月傳於五藏六腑嗽而不已則積年不差

也其候嗽而腹滿不欲飲食寒氣聚於內而攻於肺胃中滿急氣逆不順故令咳嗽不止也

治積年咳嗽宜服川椒丸方

川椒一兩去目及閉口者微炒去汗桑根白皮壹兩芫花

根皮壹兩款冬花壹兩柴苑壹兩代赭壹兩

細辛壹兩伏龍肝壹兩

右件藥搗羅為末用煮熟精羊肉研爛和丸如梧桐子大每於食後以溫粥飲下二

十九

治積年肺氣喘嗽宜服含化蜜陀僧九方

蜜陀僧 二兩綿裏用蘿蔔煮一炊時 銀薄 五十片 黃丹 兩

炒令紫色 菜豆粉 半兩 膩粉 半兩 胡粉 半兩 金薄 兩

五片 葛粉 兩

右件藥都研為末煮棗肉和丸如半棗大

每臨卧時懸裏壹九含嚙津

治積年咳嗽肺氣不利喘急宜服此方

梟黃 兩 貝母 一兩煨 亂髮 半兩 甜葶藶 兩

隔紙炒令紫色

右件藥擣羅為末鎔蠟和丸如半棗大每

夜懸裏壹九含嚙津

治積年欬嗽喉中啞聲宜服芫花根丸方

芫花根皮 三分 貝母 壹兩煨 欵冬花 三分

部根 兩 杏仁 三分 湯浸去皮 炒 五味子 三分 蜈蚣 兩

蚣 兩 桑根白皮 壹兩 麻黃 壹兩 皂莢 兩

炙微黃 焦去子 紫苑 壹兩

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣五七百杵丸

如梧桐子大每服煎棗湯下十九日三四服

治積年咳嗽氣奔宜服含化海藻丸方

海藻三分湯洗麥門冬壹兩半焙昆布三分湯洗

去鹹乾薑裂剉兩炮細辛兩文蛤兩半桂心兩

川椒半兩去目及閉口者微炒汗

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二五百杵丸

如半棗大不計時候以絰裹壹丸含嚙津

治積年咳嗽方

皂莢二兩刮去黑皮塗乾薑壹兩炮桂心壹兩

酥炙微黃焦去子

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食後以粥飲下五丸

又方特生礬石壹兩黃泥裹燒半日欬冬花兩壹鼓二百

巴豆十枚去皮心研紙裏壓去油

右件藥搗羅為末研入巴豆合勻鍊蜜和

丸如棗豆大每日空心以粥飲下三丸

治咳嗽積年不差胃膈乾痛不利宜服此方

紫苑

二兩去苗土
搗羅為末

杏仁

二兩湯浸去皮尖
雙人麩炒微黃別

搗如膏白蜜四兩酥二兩

右件藥都入銀器內以慢火煎成膏不計

時候服半棗大含化嚥津

又方葇蓉子

一兩水淘去浮者水煮令芽酥
出候乾却炒令黃黑色搗末酥

兩棗

右件藥都入銚子內以慢火煎候棗皮焦

取棗去皮核食七枚日二服

治積年冷嗽芫花煎方

芫花

二兩醋拌
炒令乾

乾薑

三兩炮裂剉
搗羅為末

右先以水五升煮芫花取汁壹升去滓內

乾薑末入蜜壹升合煎之如膏每於食後

以溫粥飲調半茶匙服之

治卒咳嗽諸方

夫肺主於氣通於皮毛若人氣血不足腠理
開踈或觸冒風寒為邪所中或運動勞役汗
出傷風邪冷之氣忽搏於肺故令卒咳嗽也
治卒咳嗽脅膈不利痰涎喘急宜服貝母煎

方

貝母壹兩煨 紫苑壹兩去 五味子半 百部兩
微黃 杏人兩 湯浸去皮尖 甘草半兩炙 桑
兩 杏人雙 人麩炒微黃 根白皮壹兩 白前兩
右件藥並細剉以水五大盞煎至壹大盞
半 聖濟總錄以水 去滓入生地黃汁五合
七 盞煎至四盞 生麥門冬汁三合白蜜二合酥二兩於銀
鍋內以慢火煎成膏收於不津器中不計
時候服一茶匙含化嚙津

治卒欬嗽胃膈不利宜服此方

豉兩 乾薑半兩炮 杏人壹兩湯浸 皮尖
裂剉 右件藥都擣篩為散以水三大盞煎至壹
盞半去滓內飴糖壹兩更煎令化分為三
服一日服盡

治卒欬嗽肺壅面腫心胃不利方

甜亭麗壹兩隔紙炒 大棗壹十枚
令紫色擣 右件藥以水二大盞煎至壹盞去滓分為
三服不計時候溫服

治卒咳嗽肺壅痰滯上焦不利方

松木屑兩皂莢二兩去黑皮塗酥炙微黃燻去子

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以粥飲下十九日三四服

治卒欬嗽日夜不止方

杏人五兩湯浸去皮尖生薑二兩去皮切

右件藥入鍊了蜜和熟搗丸如梧桐子大每服以粥飲下二十九日四服

治卒欬嗽不止方

白蜆殼不計多少淨洗

右搗研令細每服以粥飲調下壹錢日三四服

又方浮石二兩

右搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以粥飲下十九日三四服

又方右取梨去皮核搗絞取汁壹大盞入椒四十九粒煎五七沸去滓又內黑飭四兩更煎成膏不計時候服壹茶匙含化嚥津

治肺寒卒咳嗽方

細辛牛兩搗為末杏人半兩湯浸去皮尖雙

右件藥於鐺中鎔蠟半兩次下酥一分入

細辛杏人丸如半棗大不計時候以絲裏

壹丸含化嚙津

又方杏人一兩湯浸去皮尖雙甘草一分炙

桂心兩半

右件藥搗羅為末與杏人同研令勻鍊蜜

和丸如半棗大不計時候以絲裏壹丸含

化嚙津以差為度

又方桂心半兩炮裂附子一兩炮裂

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如半棗大不

計時候以絲裏壹丸含嚙津

治卒咳嗽不止胃膈氣壅滯方右取桃人壹

升去皮尖麩炒令黃細研內瓶中盛以酒

五升浸密封三日後每服煖一小盞飲之日

三四服

治氣嗽諸方

夫肺主於氣若肺虛則風寒入於經絡而成欬嗽也此皆由藏腑不調陰陽否塞陽氣外虛陰氣內積邪冷之氣上攻於肺肺氣不足為邪所搏則嗽而多氣故曰氣嗽

治氣嗽腸胃中痛邪冷氣上攻肺藏不調宜服訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩 熟乾地黄壹兩 附子三分
甘草半兩 桂心三分 黃耆三分 紫苑三分
去苗五味子三分 木香二分 人參三分 去桃人

二分湯浸去皮尖 當歸三分

右件藥擣篩為散每服四錢以水壹中煮入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服日三服

治氣嗽呼吸短氣心胃不利可思飲食宜服乾薑散方

乾薑牛兩 炮 桂心半兩 欬冬花半兩 細辛叁分
木香叁分 甘草壹分 附子壹兩 炮裂 五味子叁分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入參二枚煎至六分去滓溫服日三服

治氣嗽心胃滯悶四肢不和宜服人參散方

人參膏兩去杏仁參分湯浸去皮尖乾薑

參分炮麻黃參分去桂心兩甘草半兩炙

五味子參分紫苑參分去陳橘皮參分湯浸

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入棗二枚煎至六分去滓溫服日三服

治氣嗽胃滿短氣不欲飲食宜服五味子散

方

五味子兩桂心兩甘草參分炙細辛參分乾

薑參分炮紫苑參分去麻黃參分去陳橘

皮半兩湯浸

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入棗二枚煎至六分去滓溫服日三服

治氣嗽心胃不利少思飲食方

乾薑參分炮紫蘇子壹兩甘草半兩炙桔

梗參分去杏仁參分湯浸去皮尖陳橘皮

膏兩湯浸
去白麵焙

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中
煮入棗二枚煎至六分去 溫服日三服

治氣嗽兼下膈虛憊冷氣上攻胃膈喘滿不

下飲食宜服紫苑丸方

紫苑壹兩去苗土 貝母壹兩煨 百部壹兩 款冬花

壹兩湯洗 射干壹兩 芫花

根皮壹兩去土 紫蘇子壹兩微炒 乾薑壹兩炮 陳橘

皮壹兩湯浸 白石英二兩細研 鍾乳粉二兩

杏仁二兩湯浸去尖
雙入麩炒微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵

如梧桐子大每服以粥飲下三十丸日三服

治氣嗽不止下膈風冷上攻於肺心胃短氣
四肢羸弱飲食無味虛損不足宜服熟乾地
黃丸方

熟乾地二兩 桂心壹兩 山茱萸壹兩 五味子壹兩

肉蓯蓉壹兩酒浸令乾 丹參壹兩 澤瀉壹兩

甘草一兩判 鍾乳粉二兩 白茯苓二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以溫水下三十九日三服

治氣嗽心胃不利喘息短氣宜服杏人煎方

杏人五兩湯浸去皮尖 五味子二兩搗白

蜜五兩 酥壹兩 生薑汁一合 貝母二兩煨微 紫蘇

子二兩以水五合研濾取汁

右件藥先研杏人如膏都與諸藥合煎令

稠不計時候服一茶匙含化嚥之

治暴熱咳嗽諸方

夫肺主於氣氣為陽陽盛則生熱也此皆藏腑不調經絡否澁邪熱客於上膈氣道不利痰實積聚胷中煩滿故令咳嗽也

治暴熱咳嗽氣促背膈勞痛飲食減少宜服

紫苑散方

紫苑壹兩去 麥門冬壹兩去心 川升麻壹兩 木通

壹兩前胡壹兩半 赤茯苓二兩 貝母壹兩煨

大腹皮壹兩 子芩兩 甘草三分炙

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治肺氣暴熱咳嗽氣滿喘急宜服百部散方

百部壹兩 赤茯苓兩 百合兩 桑根白皮壹兩

木通一兩 甘草兩 柴胡兩 枳殼兩

製炒微黃去糝 赤芍藥三分 郁李人三分 湯浸

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治暴熱咳嗽心肺氣壅胃膈煩疼四肢無力

宜服白前散方

白前三分 杏仁半兩 湯浸雙入 麩炒微貴 紫苑半兩

土桑根白皮三分 甘草半兩 麥門冬一兩

心紫蘇葉三分 陳橘皮三分 湯浸去白 皸皸

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治暴熱欬嗽牽引腹脇及頭痛方

貝母壹兩微黃石膏二兩紫苑一兩去川升麻二兩

杏人壹兩雙兩湯浸去皮尖天門冬去二兩心

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞入生薑半分白錫半分煎至五分去滓不

計時候溫服

治肺氣暴熱大便不通時時咳嗽喘息促急

宜服柴胡散方

柴胡壹兩甘草半兩炙桑根白皮兩釐

甲壹兩塗醋炙檳榔一兩旋復花半兩川大黃

二兩到桔梗壹兩去碎微炒蘆頭

右件藥搗篩羅為散每服五錢以水壹大

盞入生薑半分煎至五分去滓放溫不計

時候服之

治肺氣暴熱咳嗽心胃不利或時煩喘天門

冬丸方

天門冬二兩去射干半兩肉桂半兩去黃耆

三分杏仁壹兩湯浸去皮尖 菰蘆根壹兩
剉雙人麩炒微黃 參半遠志半兩去心 百部壹兩 紫苑壹兩去苗土 馬兜零壹兩

零壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵九
如梧桐子大每服以溫水下二十九日四
五服

治暴熱咳嗽心腎煩悶口舌乾燥上膈壅滯

宜服麥門冬煎方

牛麥門冬汁四合 生地黄汁壹升○神巧萬全方用天門冬

汁酥三合 生薑汁二合 白沙糖三合 白蜜五合 貝母

二兩煨 五味子二兩 赤茯苓二兩 射干壹兩 杏

微黃 人二兩湯浸去皮尖雙人 麩炒微黃別搗如膏

右件藥先搗羅貝母等四味為末入麥門
冬汁杏仁膏等於銀鍋內都攪令勻以慢
火煎成膏收於不津器中不計時候取壹
茶匙含化嚥津

治心肺暴熱咳嗽不止宜服生地黄煎方

生地黄汁五合 生薑汁壹合 白蜜二兩 麻黃二兩去根

節杏人二兩湯浸去皮尖白前兩甘草兩

炙散赤劉

右件藥先擣羅麻黃白前甘草三味為末於銀鍋中內地黃汁等下諸藥末以慢火熬成膏收於不津器中不計時候服壹茶匙含化嚥津

治欬嗽喘急諸方

夫五藏皆稟氣於肺若肺氣虛為風冷所乘使經絡否澁氣不宣通則肺壅脹脹則氣逆

則心胃滿塞故令咳嗽喘急也

治咳嗽喘急胃膈煩悶宜服馬兜零散方

馬兜零兩桑根白皮壹兩川升麻半兩燈心

三分甘草三分大腹皮一分赤茯苓兩枳

殼兩蘇兩微黃去瓢

右件藥擣篩為散每服五錢以水壹大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治咳嗽喘急咽喉不利胃中似物妨塞紫苑

藥學原

散方

紫苑壹兩去桑根白皮壹兩欵冬花半兩葳

蕤半兩柴胡三分桔梗壹兩去甘草半兩

赤茯苓兩川升麻三分射干半兩枳殼壹兩

右件藥搗籠羅為散每服五錢以水壹大

盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候

溫服

治咳嗽喘急面目四肢浮腫宜服馬兜零散

方

馬兜零兩人參壹兩貝母壹兩煨甘草

壹兩炙杏仁壹兩湯浸壹兩去皮壹兩甜葶藶壹兩

隔紙炒麻黃壹兩去根節壹兩知母壹兩皂莢壹兩

酥炙壹兩五靈脂壹兩葳靈仙壹兩桑根白皮壹兩

欵冬花壹兩陳橘皮壹兩黃明膠二兩

搗碎令黃燥

右件藥搗籠羅為散每服五錢以淡漿水

壹中盞煎至六分去滓不計時候溫服

頭聚

卷

治咳嗽喘急坐臥不得宜服此方

漢椒一本麻目及閉口者炒令汗出猪牙皂莢宜兩片黑皮金酥炙

微黃焦乾薑二分炮裂剉甜葶藶三分兩紙炒令紫色

右件藥擣羅為末用棗肉和丸如梧桐子

大如那不計時候以桑根白皮湯下二十

丸

治咳嗽喘急腹脇堅脹小便不利宜服杏仁

丸方

杏仁三兩湯浸去皮尖雙人桂心一馬兜

零一枳殼壹兩炒微黃甜葶藶壹兩隔紙炒令紫色蘧麥

穗壹兩木通壹兩大腹皮壹兩

右件藥擣羅為末以杏仁膏入少鍊蜜同

和丸如梧桐子大每服不計時候煎棗湯

下三十九

治咳嗽喘急方

雌黃壹分雄黃壹分杏仁七枚湯浸去皮尖

右件藥細研為末以蟾酥和丸如粟米大

不計時候以燈心煎湯下三九

治咳嗽喘急形體虛羸不思食飲宜服紫蘇子煎方

紫蘇子五合生地黄汁壹升麥門冬汁二合白

前兩生薑汁二合貝母壹兩煨人參壹兩大

杏人五兩湯浸去皮尖雙白蜜壹升紫苑兩

去土味子兩

右件藥六味搗羅為末以諸藥汁及杏人膏等同於銀鍋中攪令勻以慢火煎成膏於不津器中盛不計時候服壹茶匙含化

嗽津

治咳嗽上氣喘急方

甜葶藶壹兩隔紙壹兩桑根白皮壹兩

右件藥博細羅為散每以水壹中盞入燈

心壹黍大棗五枚煎至六分去滓每於食

後調下散藥二錢

治咳嗽短氣諸方

夫肺主於氣候於皮毛氣虛為寒客於皮毛入傷於經絡肺氣不足則成咳嗽天氣溫則

宜和得寒則否虛則氣不足而為寒所迫
聚於肺間不得宣發故令咳嗽而短氣也
治咳嗽胃中不利痞滿短氣心中時悸手足
煩不欲食時惡寒海藻散方

海藻宣兩洗去鹹味赤茯苓宣兩半夏三分湯洗五

味子宣兩細辛三分杏仁三分湯浸去皮尖

右件藥搗篩為散每服三錢以水壺中煮
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服○朱氏集驗方海藻赤茯苓五味子各

兩半夏北細辛杏仁錢合三右咬咀生薑煎
食後服甚妙

治咳嗽胃膈中寒短氣不足宜服五味子散
方

五味子一兩前胡一兩半紫苑三分去甘草

三分炙桂心三分吳茱萸半兩湯浸七

右件藥搗篩為散每服三錢以水壺中煮
入生薑半分煎至六分去滓不計
時候溫服

治咳嗽短氣腹脇痛宜服阿梨勒散方

訶梨勒皮三分陳橘皮三分湯浸人參壹兩

頭桔梗三分去吳茱萸半兩湯浸甘草

半兩炙杏仁三分湯浸去皮尖

微赤剉雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服 治欬嗽短氣體虛煩熱發作無時宜服紫蘇

散方

紫蘇莖葉壹兩貝母三分煨紫苑三分去麥

門冬三分去心陳橘皮半兩湯浸甘草半兩炙

桑根白皮三分剉赤茯苓三分五味子三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

又方麻黃三兩去桂心半兩甘草半兩炙乾薑

壹分炮杏仁三分湯浸去皮尖

裂剉雙人麩炒微黃 右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治欬嗽短氣不得喘息時發寒熱胃中迫滿
方

五味子壹兩甘草壹兩炙紫苑一兩去苗土桂心

壹麻黃壹兩去根節乾薑半兩炮細辛半兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水壹中

煮入棗二枚煎至六分去滓不計時候溫

服

治欬嗽短氣不能飲食胡椒理中丸方

胡椒壹兩葶芩壹兩乾薑壹兩炮欬冬花壹兩

草壹兩炙陳橘皮壹兩湯浸去白高良薑壹兩

細辛壹兩白朮壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵丸

如梧桐子大不計時候以粥飲下二十九

○和劑局方治肺痿虛寒氣不宜通咳嗽

喘急逆氣虛痞胃膈噎悶腹脇滿痛迫塞

短氣不能飲食嘔吐痰水不止欬冬花壹兩

梗壹兩撥陳皮壹兩白乾薑壹兩炮高良薑壹兩炒甘草壹兩

細辛去苗胡椒各四兩御醫白朮五兩

兩右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三

十圓至五十圓管見大令良方撮要每服

九溫湯下溫酒米飲亦得醫方集成南此

方同不拘時候日二服

治肺氣欬嗽氣短不得睡臥紫苑丸方

紫苑一兩去苗土漢防已一兩貝母宜兩煨人參

壹兩去苗土款冬花宜兩桑根白皮宜兩天門冬

一兩半木香一兩甜葶藶青兩紙紙甘草半

去心焙赤微杏仁半兩湯浸去皮尖檳榔宜兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大不計時候以粥飲下二十九

治欬嗽短氣喘急宜服此方

麻黃二兩去根節甘草宜兩炙甜葶藶宜兩隔

色赤茯苓杏仁宜兩湯浸去皮尖雙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二

十九

類聚百卷

類聚百卷

類聚百卷

治欬嗽上氣諸方

夫欬嗽上氣者為肺氣有餘也肺感於寒甚者則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得宣發是為有餘故欬嗽而上氣也其狀喘嗽上氣多涕唾而目浮腫而氣逆也

治欬嗽上氣宜服麻黃散方

麻黃壹兩去根節 甘草半兩炙 阿膠一兩擣碎炒令黃燥
乾薑三分炮裂 杏仁一兩湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服之

治欬嗽上氣肺寒鼻中不利宜服杏仁散方

杏仁壹兩湯浸去皮尖雙入麩炒微黃 五味子二兩 甘草半兩
赤微 麻黃壹兩去根節 陳橘皮三分易浸 欬冬三分
花三分 厚朴三分去麩皮塗生 紫苑三分去
乾薑三分炮裂 桂心二分

右件藥擣篩為散每服五錢以水壹大盞

入棗三枚煎至五分去滓不計時候温服

治欬嗽上氣胃膈不利宜服陳橘皮散方

陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙杏仁三分湯浸去皮尖

甘草壹分炙紫蘇莖葉壹兩

右件藥持篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候温

服

治欬嗽上氣肺脹喘急胃中滿悶宜服大腹

皮散方

大腹皮三分杏仁壹兩湯浸去皮尖甜亭

歷壹兩隔紙百合半兩紫苑三分去苗土半夏半兩

湯洗七赤茯苓壹兩桔梗三分去蘆頭桑根白皮

對壹兩甘草壹兩

右件藥持篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候温

服

又方紫蘇莖葉壹兩陳橘皮二兩湯浸去白瓢焙乾薑半兩

炮裂

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服治欬嗽上氣語不出聲心煩悶亂方

桂心壹兩杏人壹兩湯浸去皮尖雙乾薑壹分

炮裂

右件藥搗羅為末入杏人同研令勻以棗肉和丸如半棗大不計時候以絲裏壹丸

含嚥津

治欬嗽上氣心膈煩悶胃中不利含化百合

丸方

百合壹兩紫苑壹兩洗壹兩桂心半兩麥門冬二兩

焙皂莢子人半兩微炒貝母壹兩煨五味子壹兩

杏人三兩湯浸去皮尖雙乾薑壹分訶梨

勒皮半兩甘草半兩赤剉

右件藥搗羅為末入杏人同研令勻以棗肉和丸如半棗大不計時候以絲裏壹丸

含嚥津

治欬嗽上氣心膈煩悶痰唾不利生地黃煎

方

生地黃汁升二生天門冬汁升二蜜五酥三生

薑汁合二貝母二兩煨微黃五味子二兩紫苑二兩去苗

土甘草壹兩炙微赤剉鹿角膠五兩擣碎杏仁三兩

湯浸去皮尖雙人剉炒微黃研

右件藥擣羅諸藥為末研令極細後取諸

藥汁及杏入酥蜜等同於銀器中以慢火

熬不住手攪候如膏即收於不津器中不

許時候含壹茶匙嚥津

治久欬嗽上氣諸方

夫久欬嗽上氣者由肺氣虛極風邪停滯故其病積月累年久不得差則胃背痛面腫而上氣唾膿血也

治久欬嗽上氣胃滿不能飲食頭面浮腫唾膿血宜服紫蘇散方

紫蘇子壹兩微炒五味子三分麻黃三分去根節細辛

三分紫苑苗三分去赤茯苓青黃芩半甘草半

炙陳橘皮青兩湯浸桂心兩甜葶藶兩

隔紙炒半夏三分湯洗桑根白皮壹兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫

服

治久咳嗽上氣坐卧不得咽喉不利胃中滿

悶宜服大腹皮散方

大腹皮壹兩麻黃兩半紫蘇莖葉壹兩

陳橘皮壹兩杏仁二兩湯浸去皮及

黃赤茯苓兩柴胡壹兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服
治久咳嗽肺塞上氣坐卧不安宜服麻黃散
方

麻黃壹兩去根節桑根白皮壹兩甜葶藶壹兩

炒令紫色五味子三分白前三分甘草半兩炙木通

三分湯浸川大黃壹兩碎微炒黃耆壹兩陳橘皮

去白剝焙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治久咳嗽上氣宜服含化丸方

杏人壹兩湯浸去皮尖白前半兩五味子半兩

桂心半兩貝母半兩陳橘皮半兩湯浸甘草半兩

皂莢子半兩人微炒

右件藥搗細羅為末以鍊了蜜及煮棗肉和搗為丸如彈子大常含壹丸嚥津

治久咳嗽上氣心胃滿悶喫食減少宜服皂莢丸方

皂莢一兩去黑皮塗酥炙令黃去子紫苑三分去苗上款冬花

陳橘皮三分湯浸細辛三分桂心半兩麥門

冬壹兩去焙紫蘇子三分乾薑三分當歸

三分剉甘草半兩炙川椒一兩去目及閉

杏人壹兩湯浸去皮尖雙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯下

三十九

治久咳嗽上氣涕唾稠黏頭面虛腫宜服紫苑煎方

紫苑三兩去苗土阿膠三兩搗碎射干三兩細辛

乾薑壹兩炮裂竹瀝壹兩芫花根半兩去土桑根

白皮三兩欵冬花二兩附子半兩炮裂甘草

半兩炙白蜜壹兩

右件藥搗篩為散先以水二斗於銀鍋中煎至壹斗去滓入蜜及竹瀝以慢火熬成

膏每服以溫粥飲調下半匙日三四服
治久咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血方

紫蘇子三兩微炒生薑汁壹兩白蜜一中鹿角膠

三兩搗碎杏仁三兩湯浸去皮尖生地黄

汁壹兩

右件三味都搗令熟入生薑地黃蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密收之每服以溫粥飲調下半匙日三四服

治欬嗽嘔吐諸方

夫五藏皆稟氣於肺肺感於寒則欬嗽也寒搏於氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五藏傷動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也是肺嗽連滯氣動於胃而嘔吐者也又有季夏脾王之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而欬嗽謂之脾嗽其狀嗽則右脇下痛陰陰引背膊甚則不可動動則嗽矣脾與胃合脾嗽不已則胃受之其狀欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸欬嗽甚則嘔吐

各隨證候明其腑藏以療之也

治欬嗽嘔吐心胃滿悶不下飲食宜服半夏

散方

半夏壹兩湯洗前胡壹兩去紫苑壹兩去

陳橘皮三分湯浸人參三分去訶梨勒皮

三杏仁三分湯浸去尖

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治欬嗽嘔吐寒熱不下飲食宜服厚朴散方

厚朴 二兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟 白朮 三分 貝母 三分

黃紫苑 壹兩去苗土 陳橘皮 壹兩湯浸去白瓤焙 人參 壹兩

去蘆 杏仁 一兩湯浸去皮尖 甘草 半兩炙

半夏 青兩湯洗七遍去滑 ○神巧

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治咳嗽嘔吐不下飲食心膈氣滯四肢不和

宜服此方

訶梨勒皮 三分 甘草 三分炙 乾薑 半兩炮 陳

橘皮 三分湯浸去白瓤焙 杏仁 三分湯浸去皮尖 白

朮 壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服

治咳嗽痰壅嘔吐不食心胃妨悶宜服人參

散方

人參 壹兩 赤茯苓 壹兩 半夏 半兩湯洗 甘

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服
治咳嗽痰壅嘔吐心胃不利氣逆食少宜服
白朮散方

白朮兩 訶梨勒皮兩 半夏半兩 湯洗七 甘草

兩 枳實兩 枳殼兩 枳實兩 枳殼兩 枳實兩 枳殼兩

陳橘皮兩 白朮兩 枳實兩 枳殼兩 枳實兩 枳殼兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治咳嗽心胃氣逆嘔吐不下食宜服紫蘇子

散方

紫蘇子兩 杏仁兩 雙兩 雙兩 雙兩 雙兩 雙兩 雙兩

煨微 五味子兩 訶梨勒皮兩 人參兩 蘆頭兩

木香兩 甘草兩 微赤 剉兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計
時候溫服

治欬嗽氣急不下食食則嘔吐心胃滿悶宜服前胡散方

前胡半兩去蘆頭 桔梗半兩去蘆頭 桑根白皮半兩

人參半兩去蘆頭 款冬花半兩 大腹皮半兩 半夏

半兩湯洗 杏仁半兩湯浸去皮尖 陳橘皮

七徧湯滑 甘草壹分炙 枳實三分 微黃

右件藥搗篩為散每服五錢以水壹大盞

入牛薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治欬嗽痰滯嘔吐不下食宜服半夏丸方

半夏三分湯洗 訶梨勒皮壹兩 桂心半 款冬

花二分 附子壹兩去皮臍 紫苑壹兩去苗土 人參三分

去蘆 枳殼壹兩去黃 陳橘皮壹兩湯浸 廿

草三分炙 杏仁壹兩湯浸去皮尖雙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下

三十九

治咳嗽面目浮腫諸方

夫肺主於氣候之皮毛而氣之行循環藏附
流注經絡若肺氣虛弱風邪所乘則肌膚不
寒使氣內壅與津液相并不得宣洩攻溢皮
膚故令欬嗽面目浮腫也

治欬嗽面目浮腫不得安卧涕唾稠黏宜服

甜葶藶散方

甜葶藶 一兩隔紙炒令紫色 木通 半兩 旋復花 半兩 紫苑 半兩 去 去 大腹皮 三分 檳榔 兩 郁李人 兩 湯浸去 皮微炒 桑根白皮 兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候温
服

治欬嗽面目浮腫或四肢腫氣促不得眠卧
宜服桑根白皮散方

桑根白皮 壹兩 柴胡 壹兩 大腹皮 三分 枳

殼 三分 麩炒 杏仁 壹兩 湯浸去皮尖 赤芍

藥 壹兩 赤茯苓 壹兩 黃耆 壹兩 陳橘皮 三分 湯

焙 麥門冬 三分 牛蒡子 壹兩 甘草 三分 炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治欬嗽喘急坐卧不得面目浮腫宜服澤漆
散方

澤漆兩半桑根白皮壹兩半赤茯苓壹兩半木通
宜兩陳橘皮三分湯浸紫蘇莖葉兩甘草
剉半兩炙大腹皮三分
微赤剉
右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
服

治喘嗽肺氣不順面目浮腫宜服牽牛子散
方

牽牛子半兩甜亭歷半兩隔紙陳橘皮半兩
湯浸去甘草半兩炙杏仁半兩湯浸去皮
白剉焙微赤剉杏人尖雙入麩炒微
黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
入生薑半分煎至六分去滓不計

時候溫服

治肺氣欬嗽而目浮腫喘息促急宜服雞舌香散方

雞舌香兩半 漢防已三分 木香三分 澤瀉壹兩 紫蘇

莖葉兩壹 桑根白皮二兩 附子半兩 裂壹兩 郁

李人壹兩 湯浸去皮 微炒 羌活半兩 檳榔壹兩 甘草半兩 炙微

赤剉

右件藥擣麤雜為散每服三錢以水壹中
蓋煎至六分去滓不計時候溫服

治肺藏氣壅閉隔不通致令面目浮腫欬嗽
喘急坐卧不安宜服漢防已散方

漢防已三分 桑根白皮壹兩 木通壹兩 赤茯

苓兩壹 澤漆兩半 百合兩壹 甜葶藶三分 隔紙紙 郁

李人三分 湯浸去皮 微炒

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水壹中
蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治肺氣欬嗽而目浮腫小便不通喘息促急

欲成水病宜服海蛤散方

海蛤壹兩細研澤漆葉壹兩漢防已壹兩桑根白皮

壹兩百合兩赤茯苓壹兩檳榔壹兩木通壹兩

生牽牛子壹兩甜葶藶壹兩郁李人壹兩

壹兩湯浸去皮微炒

右件藥搗羅維為散每服三錢以水壹中

蓋前至六分去滓不計時候溫服以利為

效

治欬嗽不差面目浮腫宜服漢防已丸方

漢防已壹兩苦葫蘆子半兩澤瀉三兩陳橘皮

半兩湯浸去白瓤焙甜亭歷壹兩隔紙壹兩紫色

夫右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以粥飲下三十九日三服

治肺氣欬嗽面目浮腫喘促眠臥不安是齋

得効方此下有步履艱難四字小便赤澁宜服甜亭歷丸方

甜亭歷二兩隔紙壹兩杏仁壹兩湯浸壹兩微黃壹兩

是齋醫方得効漢防已壹兩貝母壹兩微黃壹兩木

方二兩別研壹兩漢防已壹兩貝母壹兩微黃壹兩木

右件藥搗羅為末以棗肉和丸如梧桐子
大每服不計時候煎桑根白皮湯下三十
丸○是齋醫方又云徐七香元家方名防
已元無貝母木通添桑白皮四味等分同
為末白麪糊元

治欬嗽失聲諸方

夫欬嗽失聲者由風冷傷於肺之所為也肺
主氣五藏同受氣於肺而五藏有五聲皆稟
氣而通之氣為陽若溫暖則陽氣和宣其聲

通暢風冷為陰陰邪搏於陽氣使氣不通流
所以失聲也

治欬嗽上氣喘急失聲宜服貝母散方

貝母

壹兩煨

紫苑

三分去

麥門冬

一兩半去心焙

人參

三分去

杏仁

三分湯浸去皮尖

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日三服

治欬嗽聲不出宜服桂心散方

桂心

三分

訶梨勒皮

三分

乾薑

三分炮

去蘆 赤茯苓半兩 甘草壹分炙 杏仁三分湯洗去皮
尖雙人麩 炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中蒸入棗二枚煎至六分去滓溫服日三服

治欬嗽失聲語不出宜服杏仁煎方

杏仁二兩湯浸去皮尖雙 紫苑壹兩 木

味子壹兩 貝母壹兩 生薑汁二合 沙糖三兩 木

通四兩 桑根白皮壹兩 白蜜三合

右件藥搗羅為末川牛乳壹大盞入生薑

汁沙糖同煎令得所次入蜜以慢火熬成膏不計時候服壹茶匙含嚥之

治肺熱欬嗽聲不出天門冬煎方

生天門冬五合 生地黃汁三合 白蜜五合 牛酥

合二合 生薑汁壹合 白沙糖三兩 貝母壹兩 煨杏人

三兩 湯浸去皮尖雙 紫苑壹兩 木通兩

人麩 炒微黃研如膏 紫苑壹兩 木通兩

頭陳橘皮 二分湯浸 甘草二分 人參三分

右件藥貝母等細剉以水三大碗煎至壹

大椀去滓內天門冬汁地黃汁白蜜沙糖
生薑汁杏仁等熬成膏以瓷器中盛不計
時候服壹茶匙含嚥之

治急暴嗽失聲語不出杏仁煎方

杏仁貳兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃木

通壹兩得効方壹兩壹分紫苑一兩去苗

方五味子兩壹貝母方壹兩半微黃○三因

兩壹桑根白皮二兩到○得効白蜜合參白

沙糖合叁生薑汁一合○三因方已上此味

味各壹兩半

右件藥木通已下五味細剉以水二大盞

煎至壹盞三因方以水叁升去滓後入杏

人蜜糖薑汁等以慢火熬成膏不計時候

服壹茶匙含嚥之○得効方右剉散用水

三升煎至半升入杏仁砂糖薑汁再煎成

稀膏每服挑壹匙頭含化更加知母欬冬

花各壹兩效

治欬嗽氣促胸中滿悶語聲不出宜服五味

子煎方

五味子壹兩款冬花壹兩木通壹兩細辛兩杏

人雙兩湯浸去皮尖參三分去桂心三分

青竹茹兩苜蓿壹兩酥兩棗膏兩白蜜五生

薑汁壹合神巧萬全方

右件藥搗五味子已下九味為釐散以水

五火蒸煎至二大盞去滓下酥棗膏蜜生

薑汁等煎成膏不計時候服壹茶匙含嚥

之

治欬啞咽喉乾燥語無聲音宜服含化桂心
丸方

桂心壹兩杏仁壹兩湯浸去皮尖雙甘草壹

炙微乾薑壹分炮百合壹分麥門冬半兩去

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如半棗大不

計時候以絲裏壹九含嚥津

治欬嗽痰唾稠黏諸方

夫肺氣壅實上膈有熱飲水停留在於胃府

與熱相搏積滯而成痰也肺主於氣今邪熱

搏於氣氣道否澁不得宣通但心胃煩滿痰滯不利故令咳嗽痰唾稠黏也

治欬嗽涕唾稠黏心胃不利時有煩熱宜服

前胡散方

前胡壹兩去蘆頭 麥門冬一兩半去心 貝母壹兩煨微黃

桑根白皮壹兩生剉 杏仁半兩湯浸去皮尖 甘草微赤剉

草微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治咳嗽痰唾稠黏心胃壅滯飲食減少宜服

細辛散方

細辛壹兩 紫苑壹兩半去苗七 五味子三分 貝母壹兩煨微

黃杏三人雙人麩炒微黃 赤茯苓壹兩 人參壹兩

三分去蘆頭 甘草壹分炙 青橘皮三分湯浸去白瓢焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治肺氣咳嗽痰唾稠黏宜服桔梗散方

桔梗兩法紫苑壹兩去桑根白皮一兩

木通壹兩旋復花半兩檳榔壹兩欬冬花三分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水膏中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治欬嗽痰唾稠黏肩背壅悶喘促不食宜服

旋復花散方

旋復花兩紫苑壹兩半桔梗一兩射干壹兩

壹川升麻一分甘草三分炙陳橘皮三分湯

麵麻一分去大腹皮二分杏仁三分湯

尖雙人麩炒黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治欬嗽痰唾稠黏不散胃中壅悶宜服木通

散方

木通半兩麻黃半兩去甜葶藶半兩隔紙

藥集

九

松蘿膏兩 桔梗半兩 蘆頭三分 烏梅肉半兩 桑根白

皮半兩 甘草三分 微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水盞中蓋

煎至七分去滓溫服以吐為度虛羸人相

度服之

治肺藏壅熱欬嗽痰唾稠黏宜服天門冬九

方

天門冬二兩 百合三分 前胡三分 半夏

去心焙 桔梗三分 蘆頭三分 桑根

七分 湯洗貝 微黃

白皮二分 紫苑三分 漢防已二分 赤茯苓

三分 杏仁三分 湯浸去皮尖雙 生乾地黃三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服以生薑湯下二十九日

三服

治欬嗽上氣痰唾稠黏坐卧不得宜服皂莢

九方

皂莢三挺 長大者去黑皮 旋復花兩 杏仁

壹兩 湯洗去皮尖雙 人麩炒微黃 研如膏

人麩炒微黃 研如膏

頤聚百

九

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
 每於食後煮棗粥飲下十九神巧萬全方
 治咳嗽痰唾稠黏上氣促急心胃煩滿不能
 飲食宜服天門冬煎方

天門冬二兩半紫苑壹兩去苗土桔梗壹兩去蘆頭

貝母一兩半赤茯苓三兩桑根白皮壹兩木

通壹兩已上都搗羅為末

生地黃汁五合生麥門冬汁二合生薑汁壹合藕

汁三合酥二合白蜜三合

右將諸藥汁及酥蜜內於銀鍋中入諸藥
 末都攪令勻以慢火熬成膏不計時候以
 粥飲調下一茶匙

治咳嗽喉中作呀呷聲諸方

夫氣者肺之所主若肺虛為風冷所搏則經
 絡否澁氣道不利嗽而作聲也此由肺氣不
 足上膈壅滯痰飲留結在於胃府不能消滯
 嗽則氣動於痰上搏咽喉之間痰與氣相擊
 隨嗽動息故呀呷有聲也

治欬嗽心胃痰滯喉中作呀呷聲宜服前胡散方

前胡三分去木通三分半夏半兩湯洗旋

復花兩半紫苑半兩去款冬花兩半枳殼三分

微黃杏人三分湯浸去皮尖甘草半兩炙

去麩桑根白皮半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治欬嗽坐臥不得喉中作呀呷聲宜服白前散方

白前壹兩去紫苑壹兩去半夏壹兩湯洗大戟

一分判麻黃壹兩去甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服二錢以水壹中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治肺氣喉中作呀呷聲痰黏欬嗽胃膈短氣脇肋堅脹宜服赤茯苓丸方

麻人壹兩別郁李人三分湯浸紫苑三分

土

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大煎桑枝湯下二十九日三服

治欬嗽喉中呀呷聲宜服此方

桂心一兩不艸皂莢五挺去黑皮塗蘇蘇壹

完者炙甜葶塵壹兩隔紙

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

不計時候以粥飲下十五丸

治欬嗽喉中呀呷作聲無問年月遠近悉治之方

訶梨勒皮壹兩黃連壹兩露蜂房壹兩炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以溫漿水下三十丸

治欬嗽喘急喉中作呀呷聲方

肥皂莢二挺刮好酥

右取皂莢於慢火上炙以酥細細塗之仍

數數翻覆以酥盡為度炙令焦黃搗羅為

末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十九

治欬嗽喉中呀呷作聲積年不差者宜服此方

鱈魚殼半斤猪牙皂莢壹分去黑皮塗貝母

壹分煨桔梗壹分去微黃蘆頭

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如小彈子大每含壹丸旋嚙其汁服三丸即吐出惡涎便差

又方水牛鼻尖以慢火炙令乾

右件藥搗細羅為散每服用茶清調下壹錢不過五服差瑣碎錄同

又方蟬殼七枚碾末

右以粥飲調服之瑣碎錄同

治喉中久呀呷欬嗽方

葇荈子壹分水淘去浮者水煮令芽出候乾却炒令黃黑色木香壹分

雄黃半分細研

右件藥搗細羅為散入雄黃同研令勻以

羊脂塗青紙壹張以散藥攤於紙上用細
筋捲紙燒一頭令煙出當口薰之每薰嚙
十餘口日三四度差

醫方類聚卷之一百十五