

類聚類

卷一



重修政和經史證類備用本草卷第十增新類

戒部唐慎微續證類

衛全康州權使常龍德高總轄修建明宗殿西魏舉內醫官編纂聖濟經撰集醫學曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經

四種名醫別錄

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭謝附烏

天雄

何首烏

半夏

虎掌

由跋

蒼蘆

蒼蒿

狗吻

常山

白欵

白及

茵芋

羊躑躅

音義作蒿子續注青

附亦欵

饒音

三種海藥餘

感尾

桔梗

旋覆花

射干

蜀漆

青箱子

大戟

赭魁

釵子股

二十五種陳藏器餘

大黃

良薑

刺蘆

蛇含

甘遂

薤白

貫衆

及已

宜南草

藕車香

井口邊草

千金鏹草

百草灰

孝子衫襟灰

故蓑衣結

毛蓼

螺壓草

金瘡小草

朝生暮落花

独耳草

斷鐘草

產死婦人家上草

靈床下鞋履

故炊帚

蛇芮草

繼母草

鬼釵草

衝洞根

燈花末

狼把草

靈母草

天羅勒

萬一藤

甲煎

梓州附子



梓州附子花



附子味甘温大热有大毒

三風寒欲逆邪氣温中人金冷

腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又

附子春採為

附子味甘温大热有大毒三風寒欲逆邪氣温中人金冷

附子味甘温大热有大毒三風寒欲逆邪氣温中人金冷

附子味甘温大热有大毒三風寒欲逆邪氣温中人金冷

熟灰微炮參生薑相配者正補其毒故也俗方每用附子皆  
以蜜塗上醋浸之令蜜入內含之勿曬其汁生瘰癧  
圖經子條下

陳藏器云附子無八角陶強名之古方名用

雷公云子凡使頭先須細認苗長身烏黑少烏有傍尖天雄刺皮上木

炮令大豆許者即破八九箇雄周圖底皆無尖周西宜於文武火中

用並得側子色即是附子雄傍有皴後去皮尖底者是不宜製

治風痺神妙不斃若服令人家附子側中平有九角如鐵

色一箇重去兩用氣全堪用夫修事十兩於破於

下令欲地者上搖火勿用深木火只安於中一宿妙若陰製

夫欲地者上搖火勿用深木火只安於中一宿妙若陰製

東流令乾用凡使須陰制去皮尖了每十日兩用然後出五兩

聖惠方治丁瘡腫甚者用附子末醋和

外臺秘要一療偏風吹身內不遂酒中經附子一兩生用無灰酒

剗合

千金翼兩者二風冷痰得癰脹之酒諸痺等病用大附子一枚重半

再服以無所為度日

又方治口禁卒不開楊中附子末

百一方治卒未置管中吹內舌下即不開生

經驗方治逆氣胃用大附子二箇生薑

經驗後方治六人久患口瘡生附子為末醋

又方治皮膚癢分作水及下利身冷微發燥不止附子一枚

斗門方治過齶入生薑自然汁最大者坐於火上乾復濟之約

粟米汁可盡一半錢不許過三服為末用

治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以

益氣酒食無礙二錢鹽葱薑置同煎取一盞空心服六去

簡要濟眾生用搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再

消為度腫

孫用和治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍為

張仲文附子赤皮末如蠶屎不知行開又淚出不止劑

崔氏方之療耳聾風牙潤微劑一頭內耳中灸上十四壯令氣通

耳中即差

孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不飲飲水者是

水調下為一服而愈此逼散寒

又方治頭痛附子炮石膏煨等分

脩真秘旨同治頭風至內煮豆熟為度去附子服豆即立差每

治頭風至內煮豆熟為度去附子服豆即立差每

箇附子可煮五  
服後為未服之

頭烏州晉



頭烏州成



頭烏州邵



頭烏草州梓



頭烏府寧江



頭烏州龍



烏頭味辛甘温大熱有大毒

海效逆上氣欲積聚寒熱消曾上痰冷食不下心腹冷疾臍

間痛有明痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎

名身自殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸症癢堅及頭中風痺痛

名則守一名烏喙



益湯酒下少粥飲之  
如冷氣稍盛加數服之  
經後方取出地聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒烟絲盡  
每服三九赤痢用黃連下如瀉及肚瀉水吞下每於空心服之  
草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚瀉水吞下每於空心服之  
物熱

梅師方 治蛇蝎螫人易射

又方 治婦人血虛冷月後不勻或兩脚心煩熱或頭面  
中搗裂如桑椹色為度去皮臍子五靈脂四兩酒合湯下未入

亦治疾 夫風疾 補益元氣藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子合四兩

又方 補益元氣藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子合四兩

用好醋三升同藥傾入熱坑子內盆合之經一宿取出夫

九如梧桐子大空婦人冷酒下 藥同炒冷赤黃色并為未醋麥

又方 治癱瘓龍丹川烏頭去皮麻了五靈脂各五兩右為未入

龍腦麝香研令細白滴水丸如彈子大每服一丸先以牛乳  
汁研化次煖酒調服之 二日兩服空心食前服治一人只  
三十得九服得五九可以便覺擡得

勝金方 治頭暈目眩未少 擡頭

靈苑方 治以生烏頭未痛漸甚宜急療之連則毒深難

初虞世 治頭黃藥等分未洗了此藥烏

脩真秘訣 治燒存性初為末以醋麥糊丸一兩生一兩熱炒五

白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣 治陰毒傷寒手足心熱下

轉色放冷一再搗為細散每服錢

古今錄驗 治癰疽疔毒有瘡者烏頭五枝

揚氏產乳 治苦酒三升漬三日洗之夜三四度

唐李寶臣 臣飲之即音三日液寶



唐武后置葶于食賀

衍義曰鳥頭鳥象天雄附子後世補虛寒則須用附子止依大  
其用亦取其大者以其尖角多熱性不肯全就下故取散也用此  
其用鳥頭附子之炮製之法經方以著

天雄



雄味辛甘温大温有大毒主大风寒小治風濕脚痛拍響發  
一腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

勇力作不倦又墮胎一名白草生少室山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢云今採用八月月中旬天雄似附  
細而長是長也乃至三四寸許此與鳥頭附子三種本並  
出建平故謂之二建今宜都狼山最好謂為西建錢博問者  
謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝東白也其用  
灰後之時有水強巨兩切者不佳云天雄附子鳥頭等  
並以蜀道綿州龍州出者佳餘處雖有造得者力弱都不相  
似江南采者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按  
國語真葶于肉注云鳥頭也兩推云葶建平郭注云非也頭  
苗也此物本出蜀漢其本各復為水葶亦作建平葶之生又  
石龍為葉似葶故各水葶今復為水葶亦作建平葶之生又  
建平耶檢字書又無葶字其鳥頭本草音義亦論之天雄  
子側子並用八月採葶是鳥頭四月上旬今云二月採葶似  
非時也天雄天雄三枚內雄雞腸中拍切生食之能治一切風痺脚毒  
忌鼓汁大熱有大毒乾薑里制用之能治一切風痺脚毒  
能止咳喘促急熱禽蟲主丹云治一切風痺脚毒  
道暖水藏補腰膝益精明通九竅利皮膚調血脈四氣助陽  
遂破水藏癥結排膿止痛續骨消瘀血補冷虛損霍亂不  
筋散背脊痠痛消風痰下胃膈水發汗止陰汗治  
丸散炮去皮臍用飲藥和皮生使甚佳何  
雄大長少角刺而虛烏頭小於烏頭連聚生者名短有角平穩而  
實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名短有角平穩而

天雄一裔子母之類力氣乃有殊等

即宿根與嫩者耳已上並忌或汁

圖經子文條下陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼

用並

別說云謹按此數條子說前項悉備但天雄者始種烏頭而不  
養之忌生此以爲不利也

峽州側子



則子未辛大熱有大毒主腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻

又墮胎

此藥性寒... 治一切瘡毒... 氣多驗此三者脫取之昔時不用

而本經分生三處當各有少所宜故也方云少室天雄州汝

南郡今在國與附子非正生謂從鳥頭下共附子天雄州汝

下江左及山南高齊附子角爲側子理必不然若當陽州

北來京下皆用細附子有角未嘗取角持此爲用誠亦難充

應言八角不側子言取角用不近人情也若然方須入角附子

注云昔多不側子言取角用不近人情也若然方須入角附子

大者者附子取之蘇云以療脚氣甚效陶云側子即附子邊角

亦有此說今類附子無證據也烏頭下共附子同生小者爲側子

矣自根爲烏頭爲烏頭大棗核及檳榔已來者形明狀

天根根苗如芋散生者名附子傍連生者名側子三四寸者爲

今以龍州綿州者爲佳似石龍法以生熟湯浸半日勿令氣

出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟等並乾不及前

側子使能治冷風濕痺大風筋骨急

圖經曰鳥頭烏家生朗陵山谷今並出蜀土然瘦陸田耕是側子  
 所產其種出於龍州種之逐月至前將次年八月後成其  
 黑苗色如桑樹木只種附子棧物至成後有比四物德實小  
 前處造釀方成釀之法先於六月內造大醋小麩至收時仍  
 其醋不用預先成大酸日水攪之便將土附造醋去根難之於  
 生白而後不向慢風日中曬之二三日為者為側子天乾為  
 則皺而皮附子絕小者亦為者為側子天乾為側子若日曬  
 餘大側子皆附子絕小者亦為者為側子天乾為側子若日曬  
 夫皮脂使本經州彰明縣多角者為者為側子天乾為側子若日曬  
 採時月與本經州彰明縣多角者為者為側子天乾為側子若日曬  
 與此殊別今稀用謹按本經冬採為側子天乾為側子若日曬  
 雅云奚毒附子也一歲為天與冬採為側子天乾為側子若日曬  
 今附子種歲為烏頭力倍至故爾繁盛也然難藥力當緩於  
 主之者耳崔氏治寒症者去腹脅引痛及諸藥不可近者蜜煎  
 透潤取法用煎烏頭蜜汁以熟蜜九之湯五合解之飲三合  
 永除又法用煎烏頭蜜汁以熟蜜九之湯五合解之飲三合

雷公云側子只是附子傍有小只側子如棗核者是宜主用  
 者號曰木鱉子不入藥也木鱉子只是附子傍有小只側子如棗核者是宜主用  
 用若服之令人喪目  
 陳藏器云側子冷身風麻服  
 出候如渴更將別煎水與喫令人  
 冷候如渴更將別煎水與喫令人  
 片生薑六塊去滓作三片如  
 一升煎取六合去滓作三片如  
 如迷罔不知悟人急者用大為  
 如迷罔不知悟人急者用大為

齊州半夏



生微寒熱溫有毒  
 傷寒熱下  
 生微寒熱溫有毒  
 傷寒熱下

咽腫喉痛頭眩身脹寒熱腸鳴止消心腹背膈痰熱滿結效

嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痰黃悅澤

面目生令人吐熱令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名

地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾

射干為之使惡臭畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不尔戟人因

方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也勝然江南者大

乃經寸皆有生人特重之頃來互用功狀殊異問南人說苗乃是

由陶注云虎掌極似半夏夏注由踐乃說厥尾於此注中以

下痰又圖經云苗一莖葉有三葉有根相重上小下大五月

採則虛八月採則實大採得當以根重二日湯洗果乾之

十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰塗

脾止嘔吐去胃中痰下肺氣如而用之日華云味

消食反胃霍亂

腸腹冷痰癆

圖經曰生苗一莖葉三葉今在處有根以齊州者為佳二月

根以齊州者為佳二月

大然以圓根二日湯洗果乾之

由踐以圓根二日湯洗果乾之

或云即虎掌之小者為佳其一平尺許如鷄卵大者生於下

要張仲景治反胃嘔吐大相亂半夏湯百又三升冷嘔歲萬藥之

一升以水再亦治膈支飲又主嘔歲十通煮取三升半溫服

升升湯半服之又升主心下新半夏三兩切以物等分升前取

子大如湯及傷寒湯方用半夏一升主心下新半夏三兩切以物等分升前取

初合四五枚以三稍增至十如五彈枚旋服覺病減藥成

重合亦佳禁

食錫與羊肉

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

雷公云凡藥用若誤用白傍藥子真似半夏只是咬著微酸不

服不計時  
候溫服之  
又方治瘰癧五孔皆相通半夏

經驗後方治胃半夏內與藥攪勻南星二兩右以為末乾重碾令

細每至八分溫服至五服效

斗明方治生薑自帶去痰間餅子用半夏紙裹於慢火中煨為末

香眼能去兩盞用篩子逆大塵痰毒及治酒食所傷其功極驗

簡要濟衆治過久積冷每服三錢白麩一兩以水和投切五兩

子薑水調和為度用

古今錄駁黃白盛淳苦夏末方寸匕鷄子二枚頭開竅于去內

藥成置杯中稍暖燕之煎

錢相公篋中方以水研塗之取半夏

深晒方治傷寒病碗不止半夏熟洗

子母秘錄治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如

火炮之為末

又方治五絕凡五絕皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆內

鼻中愈心溫

產書治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸

御藥院治膈壅風痰半夏中即愈此是扁鵲法也

之再為末每五兩入生腦子乾搗為末漿水搜餅子日中乾

紫靈元君南嶽大夫內傳治卒死半夏研好茶或薄苛湯下丸

衍義曰濕濕則滯而困去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡

子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三

十枚水一升甕瓶中浸火燒為熟水時時呷數日便已

冀州虎掌



江州虎掌



味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁無名

月採陰乾蜀漆為之使惡莽草如虎掌今用多破之或三四

片尔方葉亦不正用也唐本云此葉是由跋宿者其苗一

莖莖頭一葉枝了音鴉映古切切莖根大者如拳小者如鷄

卵大都似扁狎四畔有圓牙着如虎掌故有云虎掌似半夏

由跋以半夏跋為半夏釋由跋苗全物為尾南人至今猶用

跋為半夏跋也臣禹錫詩跋跋跋跋跋跋跋跋跋跋跋跋跋跋

主疔疥癩腸痛生傷寒時疫強目轉

區經曰虎掌生漢中山谷及宛句今河北州郡亦其根圓及

尺餘獨莖上作穗有葉如瓜五六出亦布尖而圓一葉生七

時口上一莖作穗有葉如瓜五六出亦布尖而圓一葉生七

落布地一子失中有一葉如瓜五六出亦布尖而圓一葉生七

人菜園中種之亦呼為大南三星四葉州為一種草葉大如

青背紫四種有芽如虎掌生三星四葉州為一種草葉大如

此類同故附結實與

山跋主毒腫結熱烏髮而布地始與今都下亦種之狀如

即為頭也入餘藥唐本云跋根尋陶所注乃是為星根

澤中熟地由跋與為尾也陳藏器謂至眼半夏也由跋苗二

扁經夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

烏尾味苦平有毒主毒氣疔疔諸毒破癥瘕積聚去水

下三毒療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採  
方家云射干無尾之名主療亦異當別一種物方亦  
有用烏頭者即應是其根療體相似而本草不顯之  
云此草葉似射干而短人不抽長莖花紫碧色根似高良薑  
皮黃肉白有小毒食之載人抽喉與射干全別人家亦種  
在莖之射干花紅抽莖長根黃有白今陶云由跋正該烏尾  
根莖百藥圖經云射干似射干在皆右地生黑根似高良薑  
而節大數介相連今所在皆右地生黑根似高良薑  
圖經文具射干條下

陳臧器云烏尾主飛尸疔毒蠱毒口瘡中氣欲絕者以  
根削去皮肉喉中麻痺病處令血出為佳

右武尾一種古本所古政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃



天黃味苦寒大寒無毒主下血血閉寒熱破癥瘕積聚

留宿食滯積腸胃推積致利通利水穀調中化食安和五

減平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小

腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月

採根火乾得芍藥黃芩本批細辛茯苓療驚黃芩為之下悸無

所畏者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝

此部者日乾亦有火乾最者皮小焦不道而耐蛙以去痰非養  
性所須也火乾乃佳一月八日失烈不特燥即不堪矣  
而子莖並似天作時燒石使厚其根截者石上似宿之日者  
葉如莖長二天作時燒石使厚其根截者石上似宿之日者  
乃如莖長二天作時燒石使厚其根截者石上似宿之日者  
爆乃如莖長二天作時燒石使厚其根截者石上似宿之日者  
今出宕州涼州西蜀地者不及隴西誤矣今陳去熱當取河西  
多食不利人當分蜀地者不及隴西誤矣今陳去熱當取河西  
中似牛舌片緊硬者若取薄一快推陳去熱當取河西  
紋者凡有蒸有熟不取薄一快推陳去熱當取河西  
云葉經云鹿麻根如大芋傍生細根如牛黃小者亦如  
云圖經云鹿麻根如大芋傍生細根如牛黃小者亦如  
聚苦食利大食小腸通熱毒腫小候利寒熱時疾煩熱水氣  
留血不調溫瘴熱疾利氣調便并傳切瘡癰毒瘰癧  
馬蹄者次  
圖經曰有大黃生河川西錦谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆  
黃正月內生青葉似牛黃小者亦如羊角根開黃花亦有青紅  
一尺傍生細根如牛黃小者亦如羊角根開黃花亦有青紅

似蕎麥花者莖青紫色形如竹結二月八月採根去黑皮以商陸  
江黃出者曰黃紫二月形如竹結二月八月採根去黑皮以商陸  
而狹者曰黃紫二月形如竹結二月八月採根去黑皮以商陸  
如蕎麥而輕小於物生苗葉如羊蹄累年長大葉同色結實  
月收實並陰乾九月月熟根破之亦有錦紋日乾之亦乎為土  
大黃一收微燥乃法穿眼之至乾今土蕃大黃往截著石上  
曾之若火等本紅黃乃繩穿眼之至乾今土蕃大黃往截著石上  
用之若火等本紅黃乃繩穿眼之至乾今土蕃大黃往截著石上  
秀為散用仲景治傷寒用處百病其方用大黃急瀉巴豆各  
者小量之新為好散不搗及九密也若中煖客心服脹滿卒痛  
錐刀刺痛氣急喉下須更差未死更與三煖水若酒服脹滿卒痛  
便愈苦口已禁亦須更差未死更與三煖水若酒服脹滿卒痛  
無幸因癖瘰癧或頭乾黃聲或藥如喉差腹當鳴轉即吐下  
煎主之篩大黃散以兩好新實者若微朽即不中劑去蒼皮  
乃秤搗篩大黃散以兩好新實者若微朽即不中劑去蒼皮  
浮湯上炭火為散以兩好新實者若微朽即不中劑去蒼皮  
於小釜器中貯兒年三歲以下者以竹木篋攪中於大釜中  
青赤膿為重者或不至下膿或下膿少者本稍大如小兒以意量之  
又頭減病重者或不至下膿或下膿少者本稍大如小兒以意量之



此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者兩乳母亦同  
忌法崔元亮海上方治腰脚冷風氣以黃焦則無餘湯去蓋  
子每和少空酥炒以水三入藥中切生薑兩片如錢煎十餘沸去蓋  
未湯大黃徐徐兩錢之令盡當下冷膿及惡物等病即差頭止服古  
薑湯徐徐病必隨人欲服大黃而處置非一切而用也姚僧垣初  
仕梁武帝因發熱欲服大黃僧垣曰帝常有心腹疾非諸醫至年  
高不可用帝宣從僧幾至委頓洪而實此有宿疾非用大黃謂  
宜用平藥可漸宣通僧垣曰洪而實此有宿疾非用大黃謂  
無差理帝從而遂愈神其差誤乃醫不言用藥之失交此者  
偶中病便謂此方之神其差誤乃醫不言用藥之失交此者  
衆疾可哉

唐本云藥似芫麻根如大等傍生細根如牛  
雷公云凡使細切內紋如木旋如班此蒸七度曬乾已至未熟乾

小再蒸一日伏時其大黃管如鳥  
膏樣於日中乾用之為妙  
聖惠方以治時氣發乾用之為妙  
又方購熱病以治時氣發乾用之為妙

外甚秘要  
度小者  
千金方治產後惡血  
桐子大患者用溫酒  
九服之良久下亦治馬墜內損  
千金翼錄治婦人血癖痛大黃三兩搗  
經驗後方治風熱牽牛子四兩半生半熟為末煉蜜丸如桐  
子每冬每服茶下最宜服九如要微動喫十  
梅師方治卒和腎偏腫疼痛大黃  
斗門方治和腎偏腫疼痛大黃  
腰間如雞血物用盆器  
簡要濟衆生治吐血川大黃一兩搗羅為散每服一錢以  
廣利方煎取四合熱去滓空腹分為兩服如人行四五里再服

外甚秘要  
度小者  
千金方治產後惡血  
桐子大患者用溫酒  
九服之良久下亦治馬墜內損  
千金翼錄治婦人血癖痛大黃三兩搗  
經驗後方治風熱牽牛子四兩半生半熟為末煉蜜丸如桐  
子每冬每服茶下最宜服九如要微動喫十  
梅師方治卒和腎偏腫疼痛大黃  
斗門方治和腎偏腫疼痛大黃  
腰間如雞血物用盆器  
簡要濟衆生治吐血川大黃一兩搗羅為散每服一錢以  
廣利方煎取四合熱去滓空腹分為兩服如人行四五里再服

外甚秘要  
度小者  
千金方治產後惡血  
桐子大患者用溫酒  
九服之良久下亦治馬墜內損  
千金翼錄治婦人血癖痛大黃三兩搗  
經驗後方治風熱牽牛子四兩半生半熟為末煉蜜丸如桐  
子每冬每服茶下最宜服九如要微動喫十  
梅師方治卒和腎偏腫疼痛大黃  
斗門方治和腎偏腫疼痛大黃  
腰間如雞血物用盆器  
簡要濟衆生治吐血川大黃一兩搗羅為散每服一錢以  
廣利方煎取四合熱去滓空腹分為兩服如人行四五里再服

傷寒類要 療急黃病大黃內芒切消二兩水三升半清一宿平旦  
 和衆宿治小兒腦熱常閉目大黃餘者塗頂上乾水三合浸一  
 別說云 黃生大黃收採時皆以火燒石煖乾欲速也  
 行義曰 黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血瀉  
 補心湯 黃用大黃黃芩黃連或曰心氣不足則不當須而不用  
 其心蓋兩全之不足而客之故吐心氣以苦泄其熱就須以苦補  
 之無不效量虛實用藥者用

曹州葶藶



葶藶軍德成

丹州葶藶



寒無毒 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

腫身暴中風熱痺 膝痒利小腹久服令人虛 一名丁歷 一名

葶藶蒿 一名大蒿 一名大蒿 生葶藶城平澤及田野 夏後採

實陰乾得酒良 榆皮為之使惡 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

苦用之當熱 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

黃角生子黃細五月熱採 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

圖經曰 葶藶生葶藶城平澤及田野 今京東陝西河共州郡皆

白枝莖俱青 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

立夏後採實 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

治肺難齊葶藶之屬是也 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

後內一大彈丸更煎取一升 曹州葶藶 葶藶軍德成 丹州葶藶

足睡方... 氣救長... 引氣不得... 火熱或... 遍體氣腫... 或青... 五升... 或

其氣力取微利... 二初為度... 如患急... 困者不得... 待日滿... 亦可... 以

種苟細... 即服其... 下作單... 奇生角... 上葉長... 取出角... 須分... 別知... 又有... 一

知母也... 又茵中... 方治... 救含膏... 丸曹州... 葶藶子... 以新... 綿裏... 石

兩半之... 徐入... 藥中... 甚為... 不過... 三如... 彈丸... 每服... 亦多... 用之

雷公云... 蘆子... 使勿... 預苦... 凡使... 以真... 翻相... 似葶... 藶子... 只多... 用之

單熟去... 味... 聖惠方... 治上... 氣喘... 急遍... 身浮... 腫用... 甜葶... 藶一... 升隔... 紙炒... 今紫

服下... 抄日... 三四... 服... 又方... 治支... 飲久... 不差... 大腹... 水腫... 喘促... 不止... 用甜... 葶藶... 三兩... 隔入

又方... 治支... 飲久... 不差... 大腹... 水腫... 喘促... 不止... 用甜... 葶藶... 三兩... 隔入

外臺秘... 要三... 治食... 飲不... 得息... 葶藶... 子三... 兩熬... 內藥... 中每... 服如... 水

千金方... 治腹... 脹積... 聚癥... 瘕瘕... 葶藶... 子三... 兩熬... 內藥... 中每... 服如... 水

千金方... 治腹... 脹積... 聚癥... 瘕瘕... 葶藶... 子三... 兩熬... 內藥... 中每... 服如... 水

經方... 治腹... 脹積... 聚癥... 瘕瘕... 葶藶... 子三... 兩熬... 內藥... 中每... 服如... 水

使有神... 效... 擄師方... 治遍... 身腫... 浮小... 便葶... 藶子... 二兩... 大棗... 汁煎... 九如... 水

又方... 治肺... 壅氣... 喘急... 不得... 卧葶... 藶子... 二兩... 炒大... 棗三... 十

簡要濟... 衆治... 小兒... 水氣... 腹腫... 蕪下... 腐膿... 血小... 便葶... 藶子... 每服

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

五光... 湯下... 減心... 恥後

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

續十全... 方治... 一切... 毒入... 腹不... 可療... 及馬... 汗用... 葶藶... 子

崔氏治水氣葶藶三兩以物盛甌上蒸令熟即搗萬杵下  
 微利即停佳不可多服令人不堪美食若氣腫惟服此得差氣

傷寒類要治腎痺骨乾

子母秘錄治小兒白禿葶藶搗

姚和衆治水三合煎取一合生為末用

衍義曰葶藶用子之味有苦兩等其形則一也經既言

其世為用故曰服令人虛蓋取苦泄之義

解州桔梗



和州桔梗



成州桔梗



桔梗味辛苦微温有小毒主胃脘痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽  
 為惡悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療喉

咽痛下盡毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名

薺老生高高山谷及寃句二八月採根暴乾節皮為之使

怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽石黃石黃

處有葉名隱忍二月生可煮食之枯梗療毒甚驗俗方

非此結梗而葉甚相似但薺老能解藥毒所謂亂人參

主又三如八極頭有對者爾薺老亂人參苗似五加闊短

圓有根有差互者亦有葉三四對者皆二莖直上葉既相

惟以根有心為別爾薺老亂人參苗似五加闊短莖直上

腹中無毒能治下痢破血積氣消聚痰涎云肺氣切氣促

轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫補虛痰破

圖經曰桔梗生高山谷及寃句今在處有之根如小指大

對而八月採根細食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋

後結子嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋

無毛薺老也而薺老亦能解毒二物頗相亂但薺老葉小

似菊花為異開中結梗根黃頗似蜀葵根細青葉小光澤

首晝夜出血石餘四燕皆損心未毀或鼻破得死看取枯

朝暮取一升分再服是肺癰治之以不渴時特出清喘腥臭

每修事細到用百合水浸一分伏時作膏按於水中乾用

聖惠方治馬喉痺并毒氣壅塞一益去滓不計時分溫三頭

又方始入生薑三片煎至六分使去滓不計時分溫三頭

外臺秘要治卒飲眼仍香薷香如大豆許佳

千金方治喉閉并毒氣壅一升頭服

又方寸鼻日四五亦止吐下服

百一方發若被打擊瘀血在腸內久不消時

經驗後方治骨膈風牙痛腫估梗為末棗穰和丸

簡要濟衆 治痰嗽喘急不定 桂梗一兩半搗羅為散

子母秘錄 治小兒卒客忤死 服

杜壬 治上焦有熱 每服二錢水一盞煎六分去滓溫服食後

細呷之亦治肺壅

梅師方 治卒蠱毒下血 鵝肝七合佳

衍義曰 用此梗乃名薺薺氣奔別有薺薺所謂亂人參者便是

山桔梗也唐本云陶引薺薺亂人參今詳之非也 注以本

### 秦州荻蓉



良音 治癩狂風癩顛倒拘

秦州荻蓉 一名行唐生海濱川谷及

雍州五月採子 惟入秦癩狂方用

爾文服自無嫌 神健行足為大益而仙經不見用今方家

多作狼蒼 神藏器本草云荻蓉子疾瘳安心定忘聰

一耳目除邪 逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日穿腹水

盡暴乾 依前服之

行慈慈等 莖葉有細毛花白子

許青苗色 所在皆有六七月採子

單用味若 辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針去

年氣劑甚 溫有煖熱發用葉汁解之焦炒

圖經曰 荻蓉子生海濱川谷及雍州今處處有三指闊四莖高

花紫色至苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石  
 房中至苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石  
 本經云莢莖性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄川  
 王美人懷子而不乳意飲以浪藥一掃以酒飲旋乳且不乳  
 豈熱藥所治又古方主卒癲狂亦多單用莢莖一升漬數日  
 邪小品載治癩狂方取莢莖三升作末酒一升漬數日性寒  
 口以內汁和絞去滓湯上煎令可丸如小豆此並是差候未  
 之再服取盡神良又蘆中取汁二腸風相合銀取莢莖實一升  
 治之暴乾搗篩生薑半升取汁二腸風相合銀取莢莖實一升  
 酒二升投之上火煎令如稠錫每旦酒飲通下三九增至五  
 以不即止前令可丸如大如梧子每旦酒飲通下三九增至五  
 而失力止若丸服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾去利  
 亦止絕

雷公云凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無効時人  
 一鑑煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑  
 即是莢莖子大毒然乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶  
 張生  
 別說云謹按莢莖之功未見如所說而其毒有  
 謹按莢莖之功未見如所說而其毒有

蒿草



蒿草



草蒿味苦寒無毒主疥癬... 一名青蒿一名方漬生莖陰川澤

食之... 陳藏器本草蒿主鬼氣... 熱以病... 中服... 肉... 高... 野... 之... 蒿... 陸... 機... 云... 青... 蒿... 也... 荆... 蓀... 之... 間... 澤... 日... 萬... 一... 名... 菘... 詩... 小... 雅... 云... 荆... 蓀... 食...

之問謂高為蔽郭云今人呼  
能長髮心痛熱黃生搗汁  
燒灰和石灰煎治惡毒瘡  
明目開胃炒用治勞壯健人  
靈煎洗胃臭蒿子涼無毒  
名草蒿

圖經曰草蒿即青蒿也生華  
後開細葉並入藥用乾者  
根子勿使葉蒸使根勿使  
浸之良治骨蒸熱勞為取  
取生青蒿搗于小便五  
蒸氣取童子相煎一大  
淨洗金細乾再瀉汁安  
飲取時膽十枚相煎一  
服取時膽十枚相煎一  
雷公云使凡使勿使莖四  
同使然成痲疾採行

食療傳云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目自然  
醋渣為藟氣取子為末酒服之方寸差燒灰汁和石灰煎  
熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸差燒灰汁和石灰煎  
冷惡瘡  
百一方 治蜂螫人即差  
斗門方 治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升  
酒吞下既二日以温  
衍義曰草蒿今青蒿也在處有之得春最草人別以爲蔬根  
赤葉香今人謂之青蒿亦有別也但一類之中  
取其青色者陝西綏銀之間有青蒿葉白常蒿一  
迥然青色土人謂之香蒿莖葉白常蒿一  
青此蒿色深青故氣芬芳恐古人所用  
以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青

川澤今處處有之春生苗葉  
香葉食之至夏有之四五尺  
葉香米夫佳青蒿亦名方漬  
飲香米夫佳青蒿亦名方漬  
若同反者成氏得童子初傷  
多單用者萬氏得童子初傷  
止即愈元亮海上方蔡骨  
青蒿愈元亮海上方蔡骨  
中以綠火煎取三大斗過青  
微火煎可二大斗過青  
末以煎和搗一千許為丸空  
同使然成痲疾採行

夏元



**隨州旋復花**



旋復花味鹹耳溫微溫冷利有小毒主瘧氣腸下痛驚悸除  
 水去五藏積聚氣消胃上痰結唾如膠漆心腎痰  
 水膀胱留飲風氣濕痺及間死肉目中眩暗聾利太腸通  
 血脉益色澤一名戴椹一名金燒草一名盛德其根主風濕  
 生平澤川谷五月採花日乾二十日成亦有形似芍藥者惟合旋復花而大又別有  
生於河內非此旋復花根也唐本經云旋復花根在中原陶云苗

似薑根似高良薑而細此是山薑證不是必復根今復而從  
 北國來以芍藥等第與高良姜全無髣髴爾復根今復而從  
平九月採花旋復花葉似水蘊復花使味甘無毒王勳曾氣下寒  
 熱水腫注旋復花葉似水蘊復花使味甘無毒王勳曾氣下寒  
 云獲盜庚注旋復花葉似水蘊復花使味甘無毒王勳曾氣下寒  
 花當音福旋徐願取用根云無  
 毒明日治頭風通血葉止全瘡血云無  
 圖經曰旋復花生平澤川谷今所在有二尺已後生苗多  
 細六月開花如菊小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金  
 錢花七月八月採花暴乾一十錢大深黃色上黨田野人呼為金  
 錢花七月八月採花暴乾一十錢大深黃色上黨田野人呼為金  
 寒汗下後心下上意極易繁盛即此旋復代楷湯雜治婦  
 兩脅脹滿等旋復花丸用之尤多在  
 雷公云子花採得後去裏花藥殼皮并蒂  
 外臺秘要救急續斷筋法取旋復花二草根淨洗土  
 又方取筋者以旋復根搗汁壓瘡中家療效用封瘡上  
 經驗後方九治中風及壅滯以旋復花湯下五九至七九

梅師方復花苗傳瘡上  
 衍義曰子花復花葉如大菊又知艾蒿七八月有花六如香菊  
 行痰水去頭目風其味非此也第卷之藥也其族花  
 四月五月有花別一種非此也第卷之藥也其族花

解州藜蘆



解州藜蘆



藜蘆味苦寒微寒有毒  
 思治諸毒死肌癢  
 瘡不入湯  
 一名葱天  
 一名山葱生太山山谷三

月採根陰乾黃連為之使反細下為藥五參惡大黃用之止別

取根微炙之  
 荷等根若龍  
 月採根陰乾  
 農雷公辛有  
 小相連  
 大毒能主上

圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西一山東南州郡皆有之  
 色高五六寸許黃白色皮裏莖似根有花肉紅色根似馬蹄

水藜蘆今用者名葱白是生近水溪間有上根鬚百餘莖高  
 中入藥今用者名葱白是生近水溪間有上根鬚百餘莖高

山者為佳均州土俗亦呼為藜蘆根少只是三根鬚百餘莖高  
 痼病小兒輒用錢七一字則惡心吐人又用通頂令人噴而

亦謂之鹿葱其類全別主療亦詳今萱草  
 古經本草云濟區逆其效未詳今萱草

聖惠方治黑瘡生中盛以重湯煮令如黑膏以針微按破  
 雷公云凡採得去頭用糯米泔汁

瘡點之良不  
 過三遍神驗

千金翼 治牙疼內齦蘆末於

經驗後方 治中風下語喉中如拽鋸吉口中涎沫取蘆一

入棗醋二椀用生髮為丸如赤豆大每服三九溫酒下

白一方 治黃疸取蘆葦灰中炮之小變服

斗門方 治未以生油塗傳之

簡要濟眾 治中風不省人事牙關緊急者藜蘆二兩去蘆頭

為效如人溫水調下以吐再服

衍義曰 藜蘆為末 藜蘆為末 藜蘆為末

鬼疰蠱毒 破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸

一名野葛 折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳附高山

谷及會稽東野 鈎吻是野葛使惡黃本爾惡居云五符中亦云

作挽字牽挽人腸而絲之 胡草切事而言乃事兩物野葛

是根狀如牡月 亦自有毒飛鳥不得集之 今人謂合野葛

初生之無極類 鈎吻別是 草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色

本及後說參錯 不詳云何能殺人 物名陰命赤色野葛生柱

其子生山海中 最毒入口能殺人 云野葛生柱

州以南村墟間 甚有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻物根

有相代如此若 巴豆食則肥也陶云飛鳥不得集之 漢防已

皮節折之無塵氣 經年已後則有塵起根骨似狗亦有細孔

取者折之則塵氣 從孔中出不達之 言也且黃精直生如龍騰

煙起者折之則 活為良藥 對鈎吻蔓生葉如柿葉博何干鈎吻

澤泰兩葉或四 五葉精相 對鈎吻蔓生葉如柿葉博何干鈎吻

吻一名長赤箭 鬼箭等並一鬼名督郵鬼郵自是名野葛者亦

獨此也據陶注 云鈎吻似黃精而葉紫當心抽花黃色者

張老彙刊

似黃精而頭大處有兩毛苦鉤是也吳氏云秦鉤一名毒  
根神農辛雷公有毒藥人人生南越山或益州葉如葛赤莖大  
如箭根黃正月採葛葉方云鉤吻與食芹相似而生處無他  
草其莖有毛誤食之終人遺表錄異云野葛毒草也俗呼為  
胡蔓草誤食之  
則用羊血解之

陳藏器云食葉飲冷水即死以冷水發其毒也彼人以野葛  
滴地生菌子收之名苗藥烈  
於野葛胡蔓葉細長光潤

雷公云凡使勿用枯地精苗莖與物同其鉤吻治人身上  
自然才入膏中  
用勿誤解之

黃帝問天老陰之精也生豈有食之死者乎天老曰太  
博物志云鉤吻毒杜  
蘇州製



蘇州製

射始干味苦微温有毒主殺毒上氣喉痺酒不得消息

散結氣服中氣進食飲大熱療老血在心脾間效噤言語氣

臭散背中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏雅一名烏髮

一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

苦和似尔忍非烏髮者即其葉名矣又別有射干層干此不入  
作夜干字今射亦作夜音人言其葉是為尾而復有為頭此  
白莖長似射人之執干者故阮公詩云射干臨層干此不入

藥用根亦無塊惟有其質  
葉都似射干而花紫碧色不抽  
即其圖經云高二尺許根黃黑  
所其皆有一物相似人狗食人  
臨晉城此即獸是樹今之射干  
多種馬花草亦名鳳翼如鳥翅  
多種馬花草亦名鳳翼如鳥翅  
治痰喘水錯夜下花能通氣  
消痰破癥結胸膈高良薑大  
明目根稠亦有形似高良薑  
圖經曰射干音夜生南陽山谷  
張月開如翅羽狀故一名鳥翼  
六皮黃黑肉黃赤三月有細文  
多作葶藶干今射干亦作夜音  
似射干之執此說故尾公詩云  
用蘇恭射干此說故尾公詩云  
莖根似高良薑而內白根於高  
焉名曰射干莖長四寸生於高山  
非能長也其所立者然也楊倞注  
射之形其莖硬疎長正如長竿  
為疑且古字音多相通若漢官  
有別義也又射干多生山崖之  
荀子名木而蘇謂陶說為尾布  
射干之類非為尾也為尾布地  
紫碧色根如高良薑者是本經  
在處有大類巒薑也五月採一  
雷公云凡使葉先以米泔水浸  
外臺秘要治喉痺射干汁差一  
肘後方治小兒疳積發時腫痛  
衍義曰射干此乃荀子所說兩  
木金土而言之故儒者以草木  
土也灰火皆人也水地皆木也  
之獸及阮公所治肺氣喉為佳  
知草無疑今治肺氣喉為佳日  
得色之

非能長也其所立者然也楊倞注  
射之形其莖硬疎長正如長竿狀  
為疑且古字音多相通若漢官僕  
有別義也又射干多生山崖之間  
荀子名木而蘇謂陶說為尾布地  
射干之類非為尾也為尾布地而  
紫碧色根如高良薑者是本經云  
在處有大類巒薑也五月採一  
雷公云凡使葉先以米泔水浸  
外臺秘要治喉痺射干汁差一  
肘後方治小兒疳積發時腫痛如  
衍義曰射干此乃荀子所說兩方  
木金土而言之故儒者以草木皆  
土也灰火皆人也水地皆木也  
之獸及阮公所治肺氣喉為佳日  
知草無疑今治肺氣喉為佳日華  
得色之

本草綱目卷之八十八

興州蛇含



蛇含蛤字是味苦微寒無毒王驚癩與氣除熱金瘡疔瘡

風濕惡瘡心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒

生益州山谷八月採陰乾

字有之亦生黃土地不必背生石上也

本草云蛇含主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中及

下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生

所傷及眼赤用止血傷風

圖經曰地蜀中生益州亦近處亦有之生七石上或下濕

用細葉黃花者為佳八月採報陰乾古經錄於此中甚

為熱乃成赤癩得天熱則劇冷蛇則成是也古今諸丹毒瘡腫

恭著以或云若二物同根以不類故也醫家鮮用非識別

雷公云凡使勿用若誤服之此血不止速服其未別子解之

後方搗金瘡亦

又方治蜈蚣咬人蛇

斗門方治產後癩用甚效

抱朴子云蛇街膏連

己斷之指

已斷之指

已斷之指

晉異死云有田父見一蛇被傷又見蛇行一草着其落上蛇經  
 翰

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫瘧鬼毒瘡中  
 痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘦一名互草生益

州川谷及漢中八月採根陰乾平畏玉乳附子黃者為出宜都建

用最勝五月結實青圓三子若長生山兩葉相者不月生

色而破今出金州房州深州五月六月高四入根似荆根黃

你葉二味合煮小兒甚良主瘧治酒吐痰不可進寒熱令人大

草吐治項下瘰癧瘰癧云得甘

圖經文具蜀

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用時使酒浸之切忌明漉

外臺秘要宿治瘡常一山三兩後以漿水服三升後微吐

肘後方治疔病常山三兩每服三升以鷄子

衍義曰瘧此疾如鷄骨也

漆蜀州明



漆蜀州海



蜀漆味辛平微温有毒主瘧及久逆寒熱腹中澀堅痞結積

聚飛乘蠱毒鬼疰療胃中邪結氣吐出生江林山川谷及

蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾括搗為之使惡貫衆同煎

異者江林山即益出江陽山名故是微羹則巴東暴使燥色

青白甚用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作乃除餅非蜀漆也

使畏暴吾味苦有小毒常山苗也主能治瘰癧瘰癧主堅瘰癧下肥氣

去寒熱瘰癧治温瘰癧寒熱不可多進令人吐逆主瘰癧瘰癧主堅瘰癧下肥氣

積聚瘰癧云枯梗為使日蜀漆治瘰癧瘰癧主堅瘰癧下肥氣

雞屎草鴨屎草李含光云常山苗也八月九月採之

圖經曰蜀漆生江蘇中蜀漆根也江蘇山即益州江陽山名益州

同處耳今有節三四月生紅花青萼五月結實圓若而狹為房西

高者不過三四尺根似荆黃子而小五月採葉似八月採根陰

有花紅白過色子碧似山棗仲景蜀漆散用蜀漆八月採根陰

等分此二味為治瘰癧之要張仲景蜀漆散用蜀漆八月採根陰

分臨發時服一錢匕今蜜又名山出蜜香草性亦涼飲之益人非


山此也常

雷公云凡採得後和振苗臨用時即去根收莖葉同拌其

又蒸了兩細切又拌甘草水勻

衍義曰蜀漆常山苗也治瘰癧多異論故預云餘未見所長此

江寧府甘遂



甘遂味甘寒大寒有毒主大腹如瘕腹瀉面目浮腫留飲

瘕音積聚利水藥也下五水散膀胱留熱皮中痞

執氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名

生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂為之使惡遠志反其第

一本出太山江東比來州京口者大不相似亦皮者勝白皮

者都下亦有名草其遂殊惡蓋謂贗音鴈為之草也房本注

云所謂草其遂者乃蚤也麻鬼白葉生食一升亦能利大瘰

瘰癧蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠買重者良小無



云小甘遂味苦能瀉十二腫水疾能治心腹堅滿下水和  
皮草節  
皮切之

經曰甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出  
根皮赤肉白作連珠又似一種草甘遂苗一莖端六七葉如蔞乾

以實重者為勝又有一種草甘遂苗一莖端六七葉如蔞乾  
鬼白葉用之殊惡生食一升亦不能下唐注云草甘遂即蚤

小也蚤體自有條古方亦單用下水小品療姓娠小腹痛大  
皮甘遂不利氣急已服猪苓散兩和九散如大豆散下方赤

得微下者七日以微下為度中間散也猪苓散不得下日再服漸加  
雷公云凡採得後去莖於塊上細剉用生甘草湯小養

東流小海六七次令水清為度  
鹿出於土器中熬令脆用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚分  
當覺腹脹  
烏小便利

楊氏產乳五服腹滿大小便不利氣急甘遂二分  
治腹滿大小便不利氣急甘遂二分

初義曰甘遂今惟用者然經中不言此  
藥專於行水攻決為用入藥須斟酌

滁州白敏



味甘平微寒無毒  
一名白根一名白根一名白根

一名白根一名白根一名白根  
一名白根一名白根一名白根

一名白根一名白根一名白根  
一名白根一名白根一名白根

一名白根一名白根一名白根  
一名白根一名白根一名白根

一名白根一名白根一名白根  
一名白根一名白根一名白根

一名白根一名白根一名白根  
一名白根一名白根一名白根

止痛

圖經曰白敏生衡山山谷今江淮州郡及荆襄懷孟商齊諸

五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同窠皮黑肉白濠

州有一種赤敏但表裏俱赤可同治風金瘡及面藥方多用之濠

聖惠方白敏丁瘡以水調肘心方未傳並良白敏

外臺秘要用白敏治湯火灼爛方少有用者

衍義曰白敏及古方中服之倒物多相而行

滁州青箱子



青箱子味苦微寒無毒... 氣及...

惡瘡疥蝨痔蝕下部... 瘡子...

平公道傍二月... 葉陰乾五月六月採子

草... 葉細軟花紫白色實作角子黑而

葉... 五月荆襄人各為崑崙草

葉... 青箱子一名草葉

葉... 青箱子一名草葉

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之六月

而白直下獨生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠

雷公云凡用勿使思真子并鼠細子其二件真似青箱子只是木

廣利方治鼻血不止以青

三國志云魏略初平中有青牛先生常服青箱子年

行義曰熱毒衝眼赤障青育治眼明耳不與經意相當

音完音甘平微温有小毒主心痛温中云長蟲白痰

音饒音蝮去蛇蟲寸白惡瘡一名

生東海池澤及渤海章武八月採陰乾得酒良畏雞子

亦無有形狀似菌云鶴屎所化生一名鶴菌今出渤海單未之猪肉臠

和食可造云鶴屎所化生一名鶴菌今出渤海單未之猪肉臠

地自相與云鶴屎所化生一名鶴菌今出渤海單未之猪肉臠

者良云鶴屎所化生一名鶴菌今出渤海單未之猪肉臠

食療子有數散掘搗上生者良野田中者恐有身殺人多發冷氣

外臺秘要兩治蛇蟲以攻心如刺以清汁灌頭服佳

金匱玉函耳音色及仰生者不可合

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡疽傷陰死肌胃中

氣賊風毒瘰癧疔除白癬疥蟲

生北山川谷又寬甸及越山紫石英為之使惡理石畏

處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以

作糊云此物山野人患手足皸音軍折音以塗之有

效音錫音并欄音呂攪也及藜蘆云反烏頭又圖經云葉似初主

熟黃黑色冬凋根似菱三角白一角頭生芽今出申州七月實

莖葉似生薑藜蘆云神農本草經云華直上紫赤根白連二月八月

採云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上點

令人肌滑... 背痠... 風痺... 止痛... 云味甘辛止驚邪血邪痼疾血痢湯火瘡生肌

圖經曰白及生北山山谷又寬句及越山今江往河陝漢

藜蘆色至冬葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七

月採根今醫治金瘡不... 差及癰疽方中多用之

經驗方末治鼻衄不止甚者白及為... 行義白及條下

行義白及條下

灤州大戟



河中府大戟



信州大戟



并州大戟



大戟... 生常山十二月採根陰乾... 頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸

生常山十二月採根陰乾... 云近道處處皆有

根用... 苦辛有大毒... 破新陳云大戟

小血... 惡毒... 治痰血能墮胎... 破新陳云

圖經曰長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月

開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃  
 白色秋冬採根陰乾准向出者莖圓高三四尺花黃葉至心  
 亦腫如百合苗江南生者葉似芍藥醫家用治隱疹風及風毒  
 無問年二月淺深雖腹脹亦主之  
 切以水二大升煮取七合頓服利水二載三當歸橋皮各一大  
 再服便差禁毒食一年水下後  
 便服亦不作此方出張尚客  
**雷公云** 凡使勿用附生者若服細到氣不禁即煎薺若子湯  
 已至申去羊  
 葉晒乾用之  
**太上八帝玄變經** 必大戟

**冀州澤漆**



**澤漆味苦辛微寒無毒**

**丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生**

**太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾**

此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能噉人肉  
 錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾用藥性論云澤漆使治  
 皮肌熱利小便有莖細小者有葉花黃葉似嫩菜五月採之  
 戰花川澤漆中有莖細小者有葉花黃葉似嫩菜五月採之  
**圖經曰** 澤漆道有之生時摘葉有白汁故名澤漆亦能噉人肉  
 張仲景治肺癆吐氣升然後用澤漆湯主之澤漆三斤以東流  
 水五升煎取五升參桂心各三兩半夏半升紫參三斤白前各  
 澤漆汁中煎取五升參桂心各三兩半夏半升紫參三斤白前各  
 唐本餘水主毒逐

**聖惠方** 治竹種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水  
 內收每日常以愈為度

下收每日常以愈為度

絳州茵芋



茵芋味苦温微温有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡

作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一名莞

一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾者出彭城

亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之其連細莖方用甚

以合療風濕散如蘇草而細軟取用之其連細莖方用甚

拘急擊痛治苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘡諸關節

切冷風筋骨怯弱羸瘦入藥灸用出自海鹽形

似石南莖生葉

同經曰生苗高三四尺葉赤今雍州絳州華州杭州亦有之

四月開細花白五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾

其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防已躑躅石南細

辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬上

日合三日漸增之以微痺為度

藉者味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

如斗小者如小羊子肉杜蘅黃蘗生草木上有小毒陶所說者

土州尔不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非藉也

黑肉黃赤大者輪困者如升小者若拳今所在有之據本經

云無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒

明矣乃陶說為是也陳藏器云按土卯蔓生如芋人以灰小煮食之不聞有功也

本草綱目 卷之四 頁十四

淄州貫衆



貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒枝二兩去寸白玻

癩瘕除頭風止金瘡

化瘰癧瘡令人洩一名貫衆一名貫衆一名貫衆一名貫衆

名伯萍一名藥藻此謂草鴉頭生玄山山谷及

元句少室山二月八月採根陰乾道亦有葉如大蕨其根形

如毛芒全似老鴉頭故呼為草鴉頭一名貫衆一名貫衆一名貫衆

節多披皮黑肉赤者名貫衆一名貫衆一名貫衆一名貫衆

陰處赤小者名貫衆一名貫衆一名貫衆一名貫衆

圖經曰貫衆生玄山山谷及宛句少室山今陝西河東州郡

莖下有三稜葉綠色似似小雞翎又似老鴨翎

葉員銳莖毛黑布地冬不凋外廣雅謂之貫衆是也三月採

根曬乾末治辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下血水破積聚

大醫方廣濟湯湯中當

欬嗽生成陽川谷及河南平年六月採花陰乾

從河上表形似荒花而極細白色北來隔絕始不可得唐本

注云此藥苗似胡荽莖無刺花細黃色四月五月收與荒花

原上相似也三州者好藥性論云荒花使治欬逆

行義曰以其行水也水去則利止其意如此然今人以用暗當

以意斟酌不可使過與不及也仍須有是證者方可用之

### 江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主氣熱氣亦瘡惡癩疥去白蟻

狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及宛句

八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

處有之其根牙亦似獸牙色根萌也臣禹錫等謹按蜀本圖

二月三月採牙厚乾之根牙若獸之牙今所存自

煎

經曰牙子多有三齒似蛇剪而厚大深綠色根黑若獸之齒

以名之三月八月採根上立善方多用治蛇毒法取

藥以厚乾之根牙若獸之牙今所存自

聖惠方治陰瘡洗方用狼牙五兩搗末蜜丸如麻

外臺秘要子注治寸白蟲方以狼牙水兩搗末蜜丸如麻

又方治金瘡狼牙草葉

又方治婦人陰如雞子爛傷狼牙三兩以水四升煮去

千金方治小兒陰瘡狼牙草葉

及已味苦平有毒主諸惡瘡疥癩蝕及牛馬諸瘡

多用以合瘡膏甚驗

圖經云二月三月採根日乾之



疥癬皮膚痒蟲可煎汁浸并傳

海州羊躑躅



潤州羊躑躅



羊躑躅味辛温有大毒主賊風在皮膚中法法痛温瘡惡毒

諸溼邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及姓南山三

月採花陰乾食其葉躑躅而道諸山皆有名之花苗似鹿葱羊誤

云玉支躑躅一名似鹿葱正似旋藟花子黃者也今躑躅其苗樹生高三尺

葉似桃葉似挑葉花似山石榴似瓜花三月四月採花日乾今所生

有之藥性論云羊躑躅惡

諸石及繩不入湯服以

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生

石榴旋藟而正黃色今嶺南蜀道山谷蘊生皆深紅色如錦

三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷蘊生皆深紅色如錦

秀然或云山種不入藥古大方多用躑躅方皆雜用之

散及治五款四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之

病風濕等毒正酒中亦用躑躅花散甚勝湯

中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝湯

三種海藥餘

魏香謹按陳截器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天

行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善洗水腫浮氣與

土薑芥子等煎浴湯風瘧甚驗也

宜南草謹按廣州記云生廣南山山谷有莖長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藕藉車香味辛温主鬼氣去臭及蟲魚蛙蚰生彭城高數尺  
白花爾雅曰藕車芝錯輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主煎此香冷淋之善辟蛙蚰也

朝生暮落花主惡瘡疽腫疥癰蟻癩等並日乾末和油塗之  
生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺莖又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地

紅秋兩生菌重莖名仙人曰明大主血

衝洞根味苦平無毒主熱主蛇大蟲癰瘡等毒功用同陳家

白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥謹按廣州記云苗蔓如土瓜根相似味辛温無毒主一切毒氣及毒便並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知

狍耳草主溪毒射工絞取汁服淳傳瘡上血百一方狍耳

未名知何是拔菜白葉者亦名純耳類氏家訓馬莧

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不尔得

錢之兆也

千金鏗草主蛇蝎蟲咬等毒取草搗傳瘡上生飢止痛生江

南高二三尺也

斷籬草主丁瘡合白牙重耻六反羊菜青苔半夏地骨皮蜂

窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕下根出也

狼把草



狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖經曰  
俗間類服有療丈夫血痢者取草二斤若患積年痢即其枝  
無生者但收取苗陰乾為散患痢者取散重者不過三服若  
木半蓋服之臣禹錫等謹按狼把草不出近道傍然未甚詳悉  
者雖陳藏器嘗言其黑入髮髮令不老

太宗皇帝御書詩曰：王慶其為精石  
蓮川書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日搽露取之一百種陰乾燒  
灰作以井花水為團垂燒令白以醞醋和為餅腋下按之乾  
即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度  
又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傅瘡上用  
產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿向顧作浴湯洗之不  
過三度佳

孝子杉襟灰傅面點

蚩毋草葉卷如實中有血蟲羽化為蚩便能咬人生塞其

葉如葵以葉合和柱杵為末傅人馬山行無復蚩來

故蓑衣結燒為灰和油傅蠹蝨溺瘡佳

故炊簞主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合

為泥傳之

天羅勒主溪毒母按碎傳之瘡上天羅勒生江南平地毛藜主癰腫疔瘦瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏藜葉上有毛冬根不死也

蛇芎草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水生

平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖

圓似芋亦傳蛇毒○百一方東關有草狀如芋莖方鮮赤按

草按能土蛇未知何者鼠是又有鼠荷

萬一籐主蛇咬杵篩以水和如泥傳壅上籐管如小豆生嶺

南亦名萬吉

螺麝草主癰腫風癩脚氣腫搗傳之亦煮湯洗腫處藤生石

上似螺麝微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧花花有角角上

有刺蒿之類也亦名石繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍所螫

疼小兒頭瘡吻瘡其後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒

成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同二年考治蟲雜瘡及口

旁癢瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉

按碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傳亦煮服齧血

痰及卒下血生江南落野田間下濕地高一二寸許如薺葉

短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁根

生池畔葉有梗方莖子作釵脚着人衣如針此人呼為鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十

