

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多變症

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋攣

遍身疼痛

產後腰痛

產後腹痛兒枕痛

產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血瘕

虛煩發熱

產後血渴

產後乍寒乍熱

產後癰疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑鼻衄

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢

大便秘滯

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不閉

乳少或止 婦人繭唇

赤水玄珠婦人門第二十四卷

耳

結核方論

赤白遊風

婦人痃疾

鶴膝風

足跟瘡腫

肺癰

腸癰

乳癰乳岩

赤水玄珠婦人門第二十二卷

新安生生子孫一奎著輯

產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語譖妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用柏子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附卽炙鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散益甚痰

涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時見怪

沒藥 琥珀 桂心各一錢 細辛

麝香少許 白芍炒 當歸各七分

柏子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

柏子仁 遠志 人參 桑寄生 防風 當歸炒

生地 甘草炙 各等分用白羊心壹個水三盞煮清

汁七分入藥五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心心之所主者血心血一虛神氣不

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸方妙香散隨效再
患服之其症益甚而脉浮大按之如無發熱惡寒此血
氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈
後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黃丸 治產婦惡露未盡胸腹作痛或小便不利

琥珀 延胡索

糯米同炒去米

川歸各一兩

蒲黃四兩

生地

研取汁留滓

生姜各二斤研取汁留滓生姜汁石銀器內

炒地黃滓以地黃汁炒生姜滓各乾爲

度

右爲末蜜丸如彈子大每服一丸當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂

琥珀

沒藥

當歸

等分

右爲末每服二錢空心日

午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂爲細末每以酒調

下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神
恍惚怔忡不寢

薛氏曰當大補氣血爲主而佐以後方爲善蓋風乃虛極
之假象也固其本元諸病自退若專治其風則速其危

矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷

此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾

二湯始應後因勞怒發厥昏憒左目牽緊兩唇抽動小

便自遺作肝火熾盛用十全大補加鈎藤山梔而安再

用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧

石菖蒲

遠志

云心芦用
甘草湯煮

人參 茯神

辰砂

各一錢

川芎

山藥

鐵粉

麥冬

細辛

天麻

半夏

南星

白附子

各一兩

爲末姜汁糊爲丸菉荳大別以

硃砂爲衣每服三十九姜湯送下

產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出自
眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加附子鈎
藤鈎若肝經血虛用逍遙散加鈎藤經云脾之榮在唇

赤水車環 卷之三
心之液爲汗乃心脾二臟虛極急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹疼以爲陽氣虛寒用六君子姜附各加至五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍前腸鳴腹痛後炙開元穴百餘壯及服十全大補湯方效

濟危上丹

乳香 五靈脂 硫黃

玄精石

阿膠

卷柏

桑寄生

陳皮

各等分

將上四味入石器微火

炒再研入餘末用生地黃汁丸梧子大每服三十九食

前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯

治產後腹痛拘急痛連腰背自汗少食

當歸

桂心

各三兩

白芍

六

炙甘草

二

每服五錢

姜苓水煎方食糊一匙以效爲山

獨參湯 一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於氣補氣者乃陽生而陰長也

產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頃虛腠理不密而津液妄洩也若遇風則變瘡縱虛乏短氣則身體消瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附耆附湯恐汗多亡陽發瘡尤當用之王好古曰頭汗出至頸而還額上漏多蓋額爲六陽之所會也由虛熱薰蒸而

出竊謂前症當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心治者審之

一產婦略聞音响其汗如水而昏曠諸藥到口卽嘔作脾氣虛憊用參附末爲細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致癱瘓神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯 產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安 當歸

黃芪炒 麻黃根 牡礪煅 炙甘草 人參

各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸 炙甘草

附子

炮五錢

桂心

白芍

炒各一兩五錢

每服三五錢加姜

棗水煎服以效爲止

止汗散

牡礪

煅五錢

小麥麩

炒八兩

右爲細末每服三

五錢猪油汁調下

人參湯

產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症

人參

當歸

等分爲末猪腰子一枚切片水二鍾糯

米半合葱白二根煮汁取八分入藥三錢煎服

當歸六黃湯

治氣血虛熱盜汗不止如不應加人參白

朮心血不足加炒酸棗仁

當歸

熟地

黃芪

炒各二錢

水煎服

生地

黃柏

炒黑

黃芩

炒黑各一錢

黃連

炒黑各一錢

水煎服

參附湯

治陽氣虛寒、自汗惡寒、手足逆冷、大便自利
或臍腹疼痛、吃逆不食、或汗多發癰等症

人參一兩

大附子五錢

作一服加姜東

水煎徐飲下

當歸補血湯

治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脈洪大而虛重按至全無者

當歸三錢

炙黃芪一兩

水煎服

芪附湯

治陽氣虛脫惡寒、自汗或口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證

黃芪一兩

大附子五錢

作一服

加薑東水煎如不應

汗多變症

產後汗多變症因氣血虧損肉理不密風邪所乘口噤背強如癇或搖頭馬嘶不時舉發氣息如絕宜速灌小續命湯若汗出兩手拭不及者不治

薛氏曰此因去血過多元氣虧損或外邪相搏以致牙閔

緊急四肢痙攣或陰火內動或腰背反張肢體抽搐若
有汗而不惡寒者曰柔痉若無汗而惡寒者曰剛痉由
亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多及潰瘍而膿血
大泄者多患此乃敗症也急以十全大補湯治之如不
應急加大附子多有復甦者

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血
過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮姜一劑而
甦數劑而安

小續命湯 治創痙或腳氣痺弱不能轉舒行步欹側或

口眼喎邪牙關緊急角弓反張 麻黃 桂心 甘草

各五 錢防風 白芍 白朮 炒 人參 川芎

大附子

炮 防已

酒 洗

黃岑 炒各等分

每用五錢水煎入

姜汁少許溫服若自汗爲柔痙者去麻黃有熱去附子

減桂一半盛冬初春去黃芩

產後口噤腰背反張

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之筋循結于頸得風冷則筋急故致口噤腰背掣急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

薛氏曰若因血氣耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血爲主佐以本方丹溪謂產後當大補氣血爲先雖有它証以未治之如惡寒發熱等症乃氣血虛甚之極也宜大劑參芪歸朮肉桂以培養之如不

應急用炮附子再不應用人參二兩附子二三錢名參附湯倘猶不應乃藥力未能及也宜多用之

婦人產後不省人事吐涎癆癥 當歸 荆芥穗 等分

三錢水一盞酒少許煎灌之下卽甦倘未應者當改用

大補氣血藥

張文仲治前症用白朮四兩以酒濃煎頓服

產後中風

產後中風或氣血未復風寒所感以致筋挛拘急口眼歪斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽中云產後強力下床或悞入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脈辯而治之若努力下床月內入房憂怒者着艾非中風類

乃蓐勞火邪之症

薛氏曰若果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣爲主稍佐以治病之藥若強力下床月內入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復甦者若悞投風藥乃促其危也

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘挛不時驚悸 川芎
羌活 羚羊角 酸棗仁炒 芍藥炒各 桑白皮一
錢五分 防風一兩二
錢五分 每服六七錢水煎服

治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服卽愈

產後中風煩渴用紅荳子五合
炒 水煎徐徐呷之

產後四肢筋攣

產後中風四肢筋脉攣急乃氣血俱虛或風邪客於皮膚
則頑痺羸乏若入於筋脉則四肢牽急皆由大經空虛
風寒乘虛而漸入也

薛氏謂肝屬木而主筋若肝經風熱血燥用加味逍遙散
如不應當用六味丸以補腎水

一產婦筋攣臂軟筋肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十
全大補湯而安

一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠乃氣血虛弱
以十全大補湯加炮姜數劑漸愈去姜繼服而安

產後遍身疼痛

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張血流骨節以致肢體

沉重不利筋脉引急發熱頭痛宜用趨痛散治之陳無擇云若兼感寒傷食宜用五積散若誤作傷寒發汗則筋脉抽搐手足厥冷則變爲瘓當補氣血爲主

薛氏曰若以手按而痛益甚是血瘀滯也用四物炮姜紅花茺蔚澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物炮姜人參白朮補而養之

趨痛散 產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉 牛膝酒炒
甘草炙 薤白各一兩 當歸 桂心 白朮炒 黃芪炒
獨活 生姜各半 每用五錢水煎服

五積散 治風寒所傷遍身疼痛脚氣疼痛或寒熱拘急
嘔吐不食等症 當歸浸 白芍 川芎 桔梗各

厚朴

炒姜

乾姜

人参

茯苓

陳皮

白芷

蒼朮

半夏

姜制

肉桂

麻黃

炙甘草

各五分

入姜棗水煎服

產後腰痛

腎主腰脚產後腰痛者蓋腎爲胞胎所繫此因產勞傷腎以致風冷客之若連背脊痛久未已後遇有孕必至薛氏曰若真氣虛而邪乘之者當歸黃芪湯或十全大補爲主佐以寄生湯如不應須十全大補加附子

一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔乃脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲一匙四劑後漸安服百劑全愈

如神湯

卽生料五積散

加茺蔚逐敗血去風溫

產後惡露不盡腰重痛或兩股痛如錐刺宜服茺朮仁湯若作癟用五香連翹湯

桃仁湯 治產後惡露不盡腹中作痛或流注腿股作痛急用此湯治之如未應多變作癟須用五香連翹湯

桃仁去皮尖

蘇木

生地各半兩

蟲虫去足

水蛭

炒各十枚

每服五錢姜水煎空心熱服以惡露下爲度

五香連翹湯 木香 丁香 沉香 射香 升麻

獨活

連翹

木通

桑寄生

各二兩

每劑五錢水煎

八竹瀝少許服

當歸黃芪湯 治腰痛不可轉側或汗出吐熱氣短

黃芪

炒

白芍藥

炒各二兩

當歸

三

每劑五錢水煎服

產後腰痛兒枕痛

產後腹痛或因外感內傷瘀血壅滯所致瘀血以失笑散
風寒外感以五積散內傷飲食以養胃湯加山楂治之
產後兒枕痛者乃母胎中宿血也其痛在小腹大抵小腹
痛多由惡露凝滯或外寒相搏若久而不散必成血瘕
月水因之而不調也

生生子曰設以手按之痛甚者瘀血也按之而痛緩者或
喜熱物熨之者此虛中有寒也當補而溫之

山楂濃煎汁入砂糖少許服之極治兒枕痛以其能消瘀
血故痛止也

隱居澤蘭湯

產後惡露腹痛或胸滿少氣

澤蘭

生地

當歸

芍藥

炒

生姜

各一錢

甘草

炙五分

大東

四枚

水煎服

失笑散

治心腹痛產後瘀血上攻心腹疼痛而牙關緊

急一服而愈

五靈脂

蒲黃

各一錢

醋水煎服五靈

脂一味尤妙

天岩密湯 治陽氣虛寒心腹作痛不食四肢厥冷

生地

當歸

獨活

吳茱萸

炮姜

白芍藥

炒

甘草

炙

桂心

小草

各二兩

細辛

半兩

每帖五錢

水煎服

延胡索散 產後惡血凝滯臍下作痛或作寒熱

延胡索

桂心

各半兩

當歸

一兩

爲末食前熱酒調下

二錢

失笑散

尤佳

當歸養血丸 產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸 赤芍 丹皮 延胡索炒各二兩 桂心一兩

爲末蜜丸梧子大每服五十九溫酒下

金黃散 治惡露上沖肚腹作痛或發熱口渴 延胡索

蒲黃各一錢 桂心二分 為末酒調下

產後寒疝腹痛

良方曰產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳無擇云若產當寒月人門臍下脹痛手不可近者用羊肉湯治之

生生子曰若驗其無瘀血而果爲寒氣所侵蟠葱散亦佳如小水短濶口渴內熱以龍胆瀉肝湯加青蒿微其熱

從小便出也亦有陽氣下陷者以補中益氣湯加芍藥
桂心荔枝核

羊肉湯 產後脾虛寒邪所乘以致腹痛或頭眩胸脅急痛
精羊肉四兩 當歸 川芎各半兩 生姜一兩 水十盞前
四盞分四次服

蟠葱散 方見

產後兩脇脹痛

良方曰此因惡露不盡或肝經血虛或肝經氣滯當分而
治之宜與脇痛門參治

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛乃
氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮姜而血頓止又用十

全大補湯而寒熱退

此症苟非姜桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施其功而反助其

耳 脹

經效方 治產後肝經氣滯不平脇肋腹痛或寒熱往來

內熱嘔熱

當歸

一錢半

芍藥

炒各

苦梗

炒

枳郎

枳壳

各入分

桂心

青木香

柴胡

各六分

水煎服

當歸散

治產後陰血虛弱或氣滯血凝以致發熱腹痛

或腹脇脹滿以當歸于姜等分每服二錢水煎服

產後血瘕

良方曰產後瘀血與氣相搏名曰瘕謂其痛而無定處此

因風有風冷而輕則否澁重則不通

薛氏曰前症乃寒邪乘客氣血壅滯此因氣病而血病也

當補養胃氣調和月經寬緩靜養爲善難經云任脈爲病男子內結七疝女子爲瘕聚然當與瘕聚門參治

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱体倦

當歸八分

桂心

芍藥

炒

血竭

蒲黃

炒各六分

延胡索

炒四分

爲末空心酒調分二次服

葛氏方 治前症桂心爲末每服一錢空心酒調下

產後發熱

大全人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參

當歸

等分爲末以豬腰子一具去脂膜切小片子以

水三升粳米半合葱白二條煮米熟取清汁一盞入藥

末二錢煎至八分不拘時溫服

羅氏犀角飲子

治產後亡津液虛損時自汗出發熱困

倦唇口乾燥

犀角

麥冬

白朮

各半

柴胡

一兩

枳壳

炒

生地

地骨皮

各七錢

炙甘草

當歸

人參

茯苓

黃芩

黃芪

各七錢

右每服六錢入浮小麥七

十粒姜三片水煎服

產後發熱多屬不足虛中有寒丹溪每以乾姜加入補藥
中取効不可不知

產後虛煩發熱

薛氏曰虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩
燥作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴
面赤宜用當歸補血湯若誤認爲火症投以涼劑禍在

反掌王水先生云大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱取於內又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也 治法前症無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯或十全大補湯人參當歸湯 治產後虛煩短氣發熱 人參當歸

麥冬

桂心

生地

各二錢

大枣

梗米

一合淡竹葉

二錢

芍藥

炒一錢

水煎服

產後血弱虛煩四物加茯神遠志服之

產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲二二盞甚效

竹瀝亦佳

竹葉湯 產後短氣欲絕心中煩悶以此補之 竹葉

麥冬

小麥

各一升

甘草

一兩

生姜

二兩

大枣

十四枚

水一斗煮小麥竹葉至八升去渣細餘藥煮取三升去

渣溫服 虛悸加入參二兩氣力少加糯米五合

產後血渴

薛氏曰若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮
麥冬丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛虛發
熱用八珍加麥冬五味若血脫發熱煩躁用當歸補血
湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

七味白术散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐

瀉所致 人参 白术 炒 白茯苓 木香 灸甘草

藿香 葛根 各一水煎服

錢

竹葉歸薑湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食 竹葉

半錢 當歸一錢 黃芪二錢 白术 人參各一錢 麥冬七分

炙甘草 五分 水煎服

產後亡寒亡熱

產後亡寒亡熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則亡寒陽

勝則亡熱宜用增損四物湯若因敗血不散腹內作痛

宜用奪命丹後用增損四物湯隨病加減陳無擇云敗

血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散

薛氏謂陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於陰中而發熱者用六味丸若氣血不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯

一產婦惡寒發熱此血氣虛寒用十全大補加炮姜而寒熱愈繼以補中益氣而肢體安

增損四物湯 人參 當歸 芍藥炒 川芎 乾姜各炒
兩 甘草四錢 每劑五錢姜水煎服

大調經散 治產後惡露未消寒熱自汗或肚腹作痛

大荳炒去皮 一兩半 荸神一 真琥珀錢 為末每服一錢

赤水玄珠 卷二十三 空心濃煎烏豆紫蘇湯調下

產後瘧疾

郭稽中曰產後乍寒乍熱者多是敗血爲害或陰陽不和若繫作瘧疾治之誤矣

陳無擇曰產後寒熱或一二日或二三日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草果飲生熟飲四獸飲選而用之

薛氏曰此症當以補胃氣爲主佐以草果飲之類若胃氣稍充以草果飲爲主佐以補胃之劑大抵產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪

所伏審係飲食用六君子加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用參養胃湯勞役所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮姜中氣虛寒用六君加姜桂元氣脫陷急加附子蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退

增損柴胡湯 產後虛熱寒熱如瘡食少腹脹 柴胡
人参 甘草炙 半夏 陳皮 川芎 白芍炒

各等分每帖七錢入姜枣水煎

白茯苓散 產後蓐勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

赤水玄珠

卷二十三

白茯

一兩

當歸

川芎

桂心

白芍

炒

黃芪

炒

人參

各五錢

熟地

四錢

右先以水三盞入猪腎一隻姜

東各三煎至二盞入前藥半兩再煎至一盞許服之

豬腰子粥

產後蓐勞發熱用豬腰子一枚去膜切片用

鹽酒拌先用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪

在碗底以熱粥傾蓋之如作盒生狀空心服

黃芪建中湯

產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛 黃芪

一兩 白芍 炒

甘草

七錢

肉桂

一兩

每服五錢姜枣水煎日

二三服虛甚者須加附子爲要

藿香正氣散

治外感風寒內傷飲食頭痛寒熱或霍亂

泄瀉或作瘧疾 藿香

一錢

桔梗

炒

大腹皮

炒

紫蘇

半夏曲茯苓

白芷

陳皮

白朮

厚朴

制各一錢

炙甘草

五分

加姜枣水煎服

人參當歸散

治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節作

痛或虛煩咽燥有似瘧者

人參

當歸

生地

桂心 麥冬 白芍

酒炒

各等分粳米一合竹葉十片

水三鍾煎二鍾納前藥五錢枣二枚煎至八分服虛甚

者用熟地

生生子曰按病机机要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上中二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下之早証利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥治之方法能無犯

此三禁則營衛自和而寒熱自釋矣

又有惡露不盡或風邪柔虛陷入血室者則晝日清明夜
則譫語寒熱或只發熱如見鬼狀此爲熱入血室用小
柴胡湯加生地丹皮或四物加柴胡茺仁

嘔吐腹脹及嘔逆不食

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致
宜用抵聖湯治之

薛氏謂若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜
用六君子湯或加砂仁神曲之類大凡損其脾者當節
其飲食爲善

抵聖湯 赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參 陳皮

炙甘草

各一錢

生姜

五錢

水煎極效

胃爲水穀之海以養臟府產後胃氣虛弱飲食所傷必致嘔逆不食也治法不過溫養脾胃審其所傷之物而推治之或有陽氣衰微火不生土者八味丸若嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃虛寒極矣急用理中湯加附子桂心而甦者

一產婦朝吐痰夜發熱日夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚詎思早吐痰脾氣虛夜發熱肝血虛晝夜無寐脾血耗也遂用六君子加逍遙散歸脾湯以次調補而痊

開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

訶子肉

半兩

人参一
炙甘草半
每劑五錢姜水煎服

兩

半

產後胃虛嘔逆
橘紅一
半夏
炙甘草各半

藿香三
兩

每劑五錢姜水煎服

治產後嘔逆不食
白朮五
生姜六
錢

錢

水煎徐徐溫服

石蓮散
產後胃寒咳嗽嘔吐不食或腹作脹
石蓮肉

一
兩

茯苓一
兩

半

丁香
爲末每一錢姜湯或米飲

調下日三次

錢氏益黃散
脾土虛寒水反來侮以致嘔吐不食或肚

腹作痛或大便不時手足逆冷等証
陳皮一
青皮

一
兩

青皮

訶子肉
炙甘草
丁香各二
每服四五錢水煎服

錢

各二

人參養胃湯
治外感風寒內傷飲食寒熱頭痛或變瘧

疾 半夏 厚朴 制 橘紅

谷八 分

藿香葉 草果

草果

茯苓 人參

各三 分

蒼朮

一錢

炙甘草

三分

右姜七片

烏梅一箇水煎服

產後喉中氣急喘促

產後喉中氣急喘促因營血暴竭衛氣無主獨聚於肺名曰孤陽宜爲難治若因敗血停凝服奪命丹若因營血暴絕服芎薑湯若因風寒所傷服旋覆荳湯因氣鬱結小調經散若傷飲食服見現丸

薛氏曰若脾胃氣虛用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇中氣虛寒補中益氣加炮姜肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲

一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫
用參附湯四劑而愈

二味參蘇飲 治產後血入於肺而黑發喘欲死 人參

一兩 蘇木 二兩 水煎頓服

旋覆荳湯 治傷風寒暑濕喘嗽太盛坐卧不寧

旋覆荳 赤芍藥 半夏曲 前胡 甘草 荆芥穗
五味子 茯苓 麻黃 杏仁 各等分每以五錢姜
枣水煎服有汗者勿服

五味子湯 治產後喘促脉伏而厥 五味子

杵炒

人參

杏仁

各三錢

麥冬

陳皮

各一錢

右姜三片枣二枚水

煎服

芎藶湯

芎藶

當歸

白芍

等分

每五錢水煎服

產後口鼻黑

產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脈之海起於鼻交額中還出頰口交人中左之右右之左此產後氣虛營血散亂胃絕肺敗之症也急取緝線一條并產婦項心髮二根緊繫中指節更無可療

薛氏曰按胃脉俠口繞承漿蓋鼻准屬脾土鼻孔屬肺金誠胃虛肺損氣脫血死之症急用二味參蘇飲加附子五錢亦有獲生者

產後月水不通

產後乳子周歲而經不行是其常也若半歲而經行此血有餘也若一二歲不行而無疾不必服藥若肢體倦怠

赤水經珠 卷之三
食少內熱是血少也宜健脾胃若以藥通之則誤矣

薛氏曰脾胃虛弱用六君子若兼鬱火傷脾用歸脾湯加丹皮山梔若怒火傷血宜四物合小柴胡氣血俱虛八珍湯加丹皮

產後四肢浮腫

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注宜用小調經散陳無擇云若風邪乘於氣分皮膚腫而浮虛乃氣也若皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜發汗水腫者宜利小便

薛氏謂若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣仍參水分血分而治

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫乃中氣不足朝

用補中益氣湯夕用六君子而愈後因怒腹脹誤服沉
香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮
腫用金櫃加減腎氣丸而愈

小調經散 没藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸各一錢

爲末每服五分姜汁溫酒調

大調經散 最治腫滿喘急煩渴小便不利

方具仨寒仨熱卷

治血虛氣腫水腫 澤蘭葉 防已等分 爲末每以二錢
溫酒調下或醋湯亦可

金櫃加減腎氣丸 治脾腎虛寒腰重腳腫濕飲留積小
便不利或肚腹脹腫四肢浮腫氣喘痰甚或已成水症

其效如神

白茯苓

三

牛膝

附子

五

桂心

車前子

山茱萸

肉

丹皮

山藥

澤瀉

各一

熟地黃

四

爲末煉蜜丸梧子大每服七八十九丸空心

米飲下

產後腹痛瀉利

產後腹痛瀉利因腸胃虛弱寒邪乘襲或水穀不化洞泄
腸鳴或手足逆冷用調中湯治之陳無擇謂若六淫七
情而致者當隨所感而治之若胸膈飽脹或惡食吞
酸此飲食停滯用六君枳實山楂以消導若食既消而
仍痛更或頭痛熱渴惡寒欲嘔此中氣被傷用補中益

氣半夏茯苓以益脾胃

調中湯

良姜

當歸

桂心

芍藥

附子

川芎

各一

甘草

炒五錢

每服五錢水煎

五味子散

產後泄瀉或腎泄在五更侵晨作瀉飲食不進或大便不實登廁無時

五味子

炒三兩

吳茱萸

炒五錢

共爲末每以二錢白湯調下爲丸尤妙

四神丸

治脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不思食而不化大便不實

破紙故

炒四兩

肉荳蔻

生用二兩

五味子

二兩

吳茱萸

炒四兩

爲末用大紅棗四十九枚生姜四兩以水

共煮爛去姜以棗肉和藥搗爲丸梧子大空心鹽湯下

二神丸 治同卽前四神丸減去五味子吳茱萸

產後赤白痢

產後痢疾因飲食六淫七情傷於脾胃或滲入腸皆爲難治若飲食不進謂之虛痢氣宇不順謂之氣痢寒熱溫良升降調補各隨所宜而施治之○白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用六君加穀蘖若麵食所傷加麥蘖若肉食所傷加山楂神曲凡兼嘔吐俱加藿香若兼嘔酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木犯脾土用六君加柴胡炮姜若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真色宜加木香肉荳蔻若屬脾土虛寒六君加木香姜桂若脾腎虛寒用補中益氣湯及四神丸若下元虛寒用八味丸以補土毋若以小便澁滯肢體漸腫

或兼喘咳用金櫃腎氣丸以補腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫腫須補胃爲主若久而不愈是氣虧損也必用四神丸六味丸八味丸三方以補足三陰若用分利導水之劑是虛其虛也

產後痢疾作渴者乃內亡津液或胃氣虛不生津液但止其渴其痢自瘥。若渴而不喜冷飲屬胃氣虛故無津液宜用七味白朮散或錢氏白朮散如夜間發熱口渴屬腎氣虛而不能潤宜六味丸並佐以益氣湯以滋化源一產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌脈消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣乃脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子二月餘而痊

一產婦患前症形神倦怠飲食不進與死爲鄰此脾胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

產後大便秘澀

產後大便秘澀因腸胃虛弱津液不足若小腹悶脹宜服麻仁丸潤之若用寒藥則促其危矣

薛氏曰若計其日期飲食數多卽用藥通之禍在反掌之間必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪胆汁導而潤之若服苦寒疏通反傷中氣通而不止或成痞症若去血過多宜用十全大補血虛火燥用加味四物氣血兩虛用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加杏仁桃仁治之若泥其日期飲食而強

通之則誤矣

一產婦大便七日不通飲食如常腹中如故此腹未滿也
用八珍加杏仁至二十一日腹滿欲行用豬胆汁潤
去而安

一婦大便秘澁諸藥不應若不可言飲人乳而安

麻仁丸 火麻仁

研如泥

人參各四分

枳壳四分

大黃二分

右爲末入麻仁煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心溫
酒下未通漸加不可過服

阿膠枳壳丸 治產後大便秘澁以阿膠枳壳二味等分

爲末蜜丸梧子大滑石末爲衣白湯送下二十九

未行再服

產後大小便不通

良方曰此因腸胃虛弱津液枯竭故也

宜參前秘
結門詳治

一產婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍

通三日而痊人乳尤善

茺花散

治膀胱氣滯大小便秘

茺仁

葵子

滑石

枳郎各等分爲末每以三錢空心葱白煎湯調下

產後遺糞

良方取故燕窠中草燒爲末或枯礬牡礪或白斂芍藥名等分爲末俱用酒調服或用固腸亦可

薛氏曰若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯爲主虛寒加肉荳蔻補骨脂或四神丸若脾腎虛寒兼八味丸

仍佐前二方

一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先
用六君子湯二劑又用五苓散一劑而痊循常

腸交亦可微治

還少丹 治脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁又

治真氣虧損肌體瘦弱等症 肉蔻蓉 遠志

去心茴香

巴戟 山藥 牛膝 熟地 枸杞子 石菖蒲

山茱萸

肉

楮棗子 五味子 杜仲

去皮姜炒

白茯苓

各二兩 各另爲末棗肉百枚加煉蜜爲丸如梧子大每

服五七十丸空心酒下

產後諸淋

良方謂乃熱客於脬虛則頻數熱則澁痛氣虛兼熱血入胞中則血隨小便出而爲血淋也

薛氏云若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋
陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源也與小便淋疊

頻數卷參治

滑石散治熱淋

滑石

五分

通草

車前子

葵子

各四分

右爲細末漿水調服

治小腸有熱小便澀痛或爲血淋

瞿麥

黃芩

冬葵子

各二兩

通草

二兩

大枣

十二枚

右水六升煎

升半分二服

治脾氣不利小便不通

橘紅爲末以一錢空心溫酒下

治肺氣不利小便不通

杏仁

十四枚

去皮尖炒食之

治脬轉小便不利

滑石

一钱半

寒水石

一钱

煎服

一座婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈
此肺腎氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而痊
凡產婦小便頻數者乃氣虛不能制也

小便不禁

廣濟方治產后小便不禁用雞毛燒灰千金翼用白薇芍藥爲末俱用溫酒下日三服或桑螵蛸半兩龍骨一兩爲末每二錢粥飲調下

薛氏謂若脾肺氣虛用補中益氣湯若肝腎陰虛六味地黃丸若肝腎虛寒用八味丸

補脬飲 治胞破小便淋瀝 生絹黃色者一尺 白牡丹用根一錢 水一碗煎至絹爛溫服服後忌言語
皮 白芨各一錢 水一碗煎至絹爛溫服服後忌言語

否則無功

雞內金散 治氣虛溺床用雄雞肫脰并腸燒爲末以溫酒調下

產後小便出血

此因虛熱血添於脬也以亂髮洗淨燒爲末米飲調服或滑石末一錢生地黃汁調下

一產婦尿血面黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味逍遙補中益氣兼服而愈後爲懷抱不禁食少脉倦驚悸無寐便血復出用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑于眾論服犀角地黃湯諸症復作仍守前湯而愈

產後陰脫玉門不閉

此因坐產努力舉動房勞所致或脫肛陰挺逼迫腫痛小

便淋瀝

薛氏謂氣血虛弱宜用十全大補湯若腫脹焮痛肝經虛熱也加味逍遙散若憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若暴怒肝火血傷也龍胆瀉肝散

一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五味子數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉矣
硫黃散 產後臥氣虛寒 硫黃 烏賊魚骨 五味子
各半兩 爲末摻患處 一方蛇床子一升炒熟帛包熨患處
亦治陰腫

產後乳少或止

乳汁乃氣血所化若元氣虛弱則乳汁短少初產乳房嫩

卷之三
脹此乳未通若暴怒乳出肝經風熱若累產無乳此內亡津液蓋乳汁資於衝任若婦人疾在衝任乳少而色黃生子則怯弱而多疾

薛氏云此氣血虛弱而不能化生宜壯脾胃怒動肝胆而乳腫汁出宜清肝火屢產無乳或大便澁滯當滋化源氣血旺則乳汁溢

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴此氣血虛以玉露散補之而愈

湧泉散 能通乳

王不留行

麥門冬

蘆薈

龍骨

各二錢

右用豬蹄汁一碗酒一杯煎服良久以木梳于

乳房上梳下忌姜椒辛辣

玉露散 乳脈不通身肢壯熱頭目昏痛大便滯滯

人參 茯苓 桔梗炒 芍藥各一錢 吉草炙六分

右㕮咀水煎服愈

凡未產而乳先出謂之乳泣生子多不育

產婦氣血方盛乳房作脹或無兒飲因而脹痛增寒發熱
用麥芽二三兩炒熟水煎服之立消

一產婦勞役或乳汁來如湧泉昏昧吐痰此陽氣虛而厥
也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯數劑而安矣

一婦乳頭裂破以秋茄子裂開者陰乾燒存性爲末水調
塗之而愈

婦人癰唇

內經曰脾氣開於口又曰脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂
風則濶塞則揭若腫起白皮皺裂如蚕繭名曰繭唇有
腫重出如繭者有本細末大如繭如瘡者其因或胎產
經行而陰血損或七情動火而榮血虧或心火傳授脾
經或厚味積熱傷脾六要審本症察兼症補腎水生脾
血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者
不察內用清熱消毒之藥外用追蝕線結之法反爲敗
症慎哉

一婦懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不調晡熱
食少脉倦脣腫已年餘矣此脾經鬱火傷血用歸脾湯
加姜汁炒黃連山梔少佐吳茱萸嘈辣頓去飲食少進
乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常又用加味

逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇瘡愈

一婦月經不調兩足發熱至年餘而身亦熱勞則足腿痠疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血形躰瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗此肝脾血虛火症也彼不信用通經藥而歿

一婦口苦脇脹此肝火之症也用小柴胡加山梔黃連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡調補脾胃而瘥

一婦每怒口苦發熱晡熱此肝火盛而血傷也以小柴胡合四物二劑以清火而生血更以四物加柴胡白朮茯苓丹皮生血健脾而安

一婦因怒齒痛塞熱作嘔用清胃等藥益甚乃肝火傷胃

寒涼復傷故也用六君子加芍藥柴胡山梔而安

一婦胃中嘈辣甚則熱痛後患齒痛此胃中痰火也以二

陳加芩連吞越鞠丸而瘳

一婦因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加芩歸苓
木山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒熱退

清胃散 治醉酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛或連頭面

頸項作痛 黃連炒一錢半川歸 生地 丹皮各一錢 升麻

二錢 右水煎服如寢熱便秘加大黃

加味清胃散 卽前方加犀角甘草連翹

涼膈散 治積熱煩渴面赤內熱頭昏嘯痛便溺赤澁狂

言譖語睡卧不安 大黃

朴硝各一錢

一

甘草一錢連翹

錢

梔子

黃芩

薄荷

各一

水煎服

補黃散 治脾胃虛熱口舌生瘡畏冷飲食 人參

白朮

炒各一錢

白芍

炒

陳皮

甘草

炙各五分

右姜枣水煎服

四順清涼飲 加山梔大力子名加味清涼飲 治臟腑

寢熱秘結口舌生瘡

當歸

赤芍

甘草

大黃

各一錢

右水煎服

人參安胃散 治服峻劑損脾胃口舌生瘡 人參

茯苓

各一錢

黃耆

炒二錢

生甘草

炙甘草

黃連

炒各五分

白芍

七分

水煎服

溫中丸 一名人參理中丸 治中氣虛熱口舌生瘡不

喜飲冷肢躰倦怠少思飲食 人參 炙甘草 白朮

炒各爲末姜汁糊爲丸梧子大每服五十九白湯送下
等分

柳華散

治熱毒口瘡

黃柏

炒

蒲黃

青黛

人中白

服

右等分爲細末敷之

四物湯

治血熱口舌生瘡或牙齦腫潰發熱煩躁不安

加味四物湯

卽四物加丹皮柴胡山梔

四物二連湯

治血熱口舌生瘡或夜發寒熱

當歸

熟地

白芍

炒

川芎

六

胡黃連

川連

炒各

一錢水煎

服

甘桔湯

治咽喉腫痛

甘草

錢

苦梗

三

右水煎服

其

知自無同

書林貞館

赤水玄珠婦人門第二十四卷

新安生生子孫一奎箸輯

耳

立齋曰耳瘡屬手少陽三焦及足厥陰肝經血虛風熱或怒動肝火而致若發熱歎痛屬三焦厥陰風熱用柴胡清肝散若寒熱作痛或作嘔吐乃肝火傷脾用益脾清肝散若口乾足熱爲肝腎陰虛用益陰腎氣丸若月經先期爲血熱用加味逍遙散過期爲血虛用八珍湯食少神倦爲鬱火加味歸脾湯惡寒發熱肢神倦怠爲氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火

傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味逍遙散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脈上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味逍遙散調補肝脾而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯 治肝胆經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳嗽或吐酸食苦水皆用

此藥主之 柴胡錢 黃芩錢 一人參 半夏各七分

炙甘草五錢 姜三片水煎服

加味小柴胡湯 治肝胆經風熱前後腫痛或結核煥痛
或寒熱晡熱或經候不調等症

卽前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散 治肝經之症寒熱肺痛脾胃虛弱 人參

白朮炒各一錢 茯苓各一錢 炙甘草 柴胡各五分 川芎 川歸

黃耆各一錢 丹皮七分 水煎服

梔子清肝散 治三焦及肝膽經風熱目內作痒或生瘡

出水或脇肋胸乳作痛寒熱往來 柴胡 山梔炒各七分

丹皮各一錢 茵苓 川芎 芍藥 當歸 牛蒡子炒各七分

白术

炒

甘草

各五分

水煎服

柴胡清肝散

治肝胆三焦風熱怒火以致項胸作痛或

頭目不清或耳前後腫痛或寒熱躉痛

柴胡

黃芩

炒

甘草

各五分

人参

山梔

炒

川芎

錢

連翹

桔梗

各八分

水煎服

犀角地黃湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或血妄行或

吐衄或下血

犀角

生地

白芍藥

黃芩

炒

牡丹皮

黃連

炒各一錢

水煎服

因怒而患者加柴胡梔

犀角升麻湯

治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手足

少陰經風熱連耳作痛

犀角

升麻

防風

羌活

錢各一分

白附子

五分

川芎

白芷

黃芩

炒各七分

甘草

五分

水煎服

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內痒

痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或經水不調胸膈

不利腹脇痞痛小便不調

當歸

川芎

柴胡

白朮

炒

芍藥

炒各一錢

山梔

炒二錢

丹皮

茯苓

各八分

蔓荆子

甘草

各五分

水煎服

雜方

加味地黃丸

治肝腎陰虛諸症或耳內痒痛出水或眼

昏痰喘或熱渴便澁等症

乾山藥

山茱萸

澤瀉

牡丹皮

柴胡

白茯苓

熟地黃

生地

五味子

各等分

爲末

右將煉蜜爲丸梧子大每服百丸空心白

湯下如不應用加減八味丸

人參養榮湯 治潰瘍寒熱四肢倦怠體瘦少食面黃氣短不能收斂大瘡愈後多服之庶不變他症也

白芍藥

一錢五分

人參

陳皮

黃耆

炒

桂心

川歸

白朮

炒

炙甘草

各一錢

熟地

五味

炒

茯苓

各七分

遠志

去心炒五分

入姜枣水煎服

瀉青丸

治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱大便秘結

川歸

龍胆草

炒焦

川芎

山梔

炒

大黃

炒

羌活

防風

各等分

右爲末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下

○若陰血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍遙散加丹皮山梔○若腎水虧損不能生肝木而筋挛結

核或肢節掣搐或側中風涎痰上湧用六味丸料煎服

生地黃丸 治師尼寡婦室女寒熱或頸間結核肝

脉弦長直出魚際 生地

秦艽

黃芩

硬柴胡

各五分

分

赤芍藥一兩

右煉蜜爲丸

梧子大

每服三十九

烏梅湯下

連翹飲子

治肝胆經氣滯癥癰結核或乳內結核者

連翹

川芎

瓜萎仁

橘葉

皂角刺炒

青皮

甘草節

桃仁各一錢

水煎服

散腫潰堅湯

治療癰癧堅硬氣血無虧者

升麻

連翹

川歸尾

白芍

葛根

三稜

酒拌廣朮微炒各三分

龍膽

桔梗

炒

昆布

知母炒酒

瓜萎仁各五分

柴胡四分

黃芩酒炒

五分

炙甘草

二分

右水煎服

必効散 治瘰癧未成者消已潰者欵須元氣無虧者可

服孕婦勿服

南蓬砂

二錢半

輕粉

一錢

斑貓

四十枚去頭足同稭米炒

去米射香

五分

巴豆

五粒去壳心膜

白枳榔

一枚

右爲末每服

一錢五更用滾湯調下如小水滯滯或微疼此癧毒

欲下也進益元散一服卽下此方斑貓巴豆似爲

峻厲然用巴豆乃解斑貓巴豆用者勿畏也

益元散

滑石

飛六錢

甘草

各爲末每服一二錢白

湯調下

琥珀膏

治頸項或腋下初結小核漸如連珠潰而膿

水不絕或漏症者

琥珀

一兩

丁香

桂

硃砂

木香

松香

俱爲末

白芷

防風當歸

木通

木劄子肉

各五錢

麻油

二斤

將后五味入油煎熬藥焦

瀘去渣徐徐入黃丹再熬軟硬得所入前末藥卽成

膏矣

針頭散 治一切頑瘡內有瘀肉或癰核不化瘡口不

合宜此藥腐之 赤石脂

五錢

乳香 白丁香

砒霜

生用

黃丹

各一錢

輕粉 射香

各五錢

蜈蚣

一條

爲末搽瘀肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細條
陰乾紙之凡瘡久不合者內有膿管必須用之

結核方論

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失於調護
或因暴怒觸動肝火若結於項側耳前後或胸脇腫痛
或發寒熱屬胆經風熱怒火宜用柴胡清肝散加鈞藤

山梔以養血氣清肝火若結于肉理其色不變晡熱內
熱屬肝火血虛宜加味道遙散加龍胆草以養肝血清
肝火或結于肢節或累累如貴珠其色不變亦肝火血
燥而筋攣宜用柴芍參芩散加鈎藤以養血氣佐以六
味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾
六君二湯以調和肺脾之氣並佐以海藻丸若潰而核
不腐或肉不生或膿水清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱
內熱面色痿黃食少脉倦便利不調者五臟皆虛也但
用補中益氣加味六君子二湯調補脾胃以滋諸臟則
各症自退故經云形傷則痛氣傷則腫慎不可輕用行
氣破血而復傷也

一婦項結核寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便頻數屬
肝火血虛用加味四物而愈又用加味道遙散調補肝
脾而安

一婦耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不調此肝
胆經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮及六味丸而愈
一婦項患五核時常寒熱肝脉弦長而出寸口此血盛無
偶之症也用小柴胡湯加生地烏梅而愈

加味道遙散

治肝脾血虛有熱遍身搔痒或口燥咽

乾發熱盜汗食少嗜卧小便澀滯等症又治療癰流注

虛熱等瘡

炙甘草

當歸

炒

芍藥

酒炒

茯苓

白朮

炒各

錢

柴胡

牡丹皮

山梔

炒分五

水煎服

逍遙散

卽前方減丹皮山梔

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不

能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾血虛發熱或肢脉作痛大便不調或經候不准晡熱內熱或瘰癧流注不能消散潰歎

人參

白朮炒

黃蓍炒

茯苓

當歸

遠志

酸棗仁

炒各一錢木香

炙甘草

各五分龍眼肉

三枚姜棗水

煎服

加味歸脾湯

卽前方加山梔柴胡

柴木參芩湯

治肝火血熱遍身搔痒或起赤暈或筋

牽結核

白朮

人參

茯苓

各一錢

柴胡

川芎

山梔炒

芍藥炒

甘草

炒各五分熟地

八分當歸

八分水煎服

柴芍參芩散 治肝胆經部分結核瘰癧瘤癥等症或肝

血燥脾氣虛弱發熱少食

柴胡

芍藥炒

人參

茯苓

白朮

炒

山梔

炒

陳皮

當歸

甘草

各五分

姜棗水煎服

清肝益榮湯

治肝膽經風熱血燥筋牽結核或作疾

子

柴胡

薏苡仁

茯苓

木瓜

熟地

各一錢

山梔

龍胆草

白朮

炒各五分

川芎

川歸

芍藥

炒各一錢

甘草

三分

水煎服

清熱涼血飲

治風熱血燥丹毒等症大便秘結

當歸

川芎

大黃

炒

芍藥

炒

生地

各一錢

水煎服

神妙開核散

消癰塊甚效

沉香

木香

各二錢

橘紅

四兩

珍珠

四十九粒入灌封固服

赤存性出火毒

四十九枚豚
豬膽子

猪生項間如

大枣子

爲末每服一錢臨卧酒調徐徐嚥下輕者三五服重者十服可愈切忌酸鹹油膩滯氣之物須用除日于靜室修合

海藻散堅丸

治肝經癰瘤

海藻

昆布

各二

小麥

四兩

醋

柴胡

二

龍胆

酒拌炒

焦

二

爲末蜜丸梧子大

每服

三十九臨卧白湯送下噙化嚥之尤妙。凡患瘰癧

服調治之藥未應宜佐以前二藥

益氣養榮湯

懷抱抑鬱瘰癧流注或四肢患腫肉色

不变或日晡發熱或潰而不欬

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附

川歸

川芎

黃耆

鹽水

熟地

芍藥

炒各
一錢 炙甘草 桔梗

炒各
五分

白术

炒各
一錢

白姜水煎服

木香餅 治氣滯結腫門胸風寒所傷作痛 木香

五錢
爲末

生地

兩

搗地黃膏和勻量患大小作餅子置患處以

熱熨斗熨之腫痛悉退

當歸飲 治熱血癰疹痒痛膿水淋漓發熱等症

當歸

白芍藥

川芎 生地

白芍藥

炒黃耆

各一
錢

防風

荆芥

何首烏

忌

甘草

各五
分

水煎服

赤白遊風

婦人赤白遊風屬肝經鬱火血燥生風或脾經鬱結血虛生熱或腠理不密風邪外襲其症或疙瘩癩痒或膿水淋漓白屬氣而赤屬血曰得風而遊行也若肝經血燥

用柴胡清肝散肝經怒火用梔子清肝散肝經血熱用
加味四物湯肝火血虛六味丸脾經鬱熱加味歸脾湯
肝脾血虛風熱加味逍遙散若因風邪鬱熱所致用荆
防敗毒散或專用祛風之剷肝血愈燥則血隨火化反
爲敗症矣

一婦身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈晡時益甚用加
味逍遙散而愈

一女赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地連翹丹
皮而愈○大凡女子天癸未至婦人月經不調受驚着
惱多有此症

消風散 治風寒癰疹痒痛或膿水淋漓頭皮腫庠

荆芥穗

炙甘草

陳皮

人參

茯苓

白姜

桑葉

防風

芎窮

霍香

羌活

蟬蛻

各一錢

厚朴

姜制五分

水煎服

大連翹飲

治風熱熱毒赤白遊風表裏皆受患者

連翹

瞿麥

荆芥

木通

蟬蛻

甘草

赤芍

防風

柴胡

滑石

山梔

炒黃芩

川歸

一錢

水煎服

婦人痃痃

俗名便癟
一名癟子

一名便毒

婦人痃痃或肝經濕熱下注或鬱怒傷損脾肝其外症或拘小腹腫痛或玉門燥腫作痛或寒熱往來增寒壯熱其內症或小便澀滯或腹內急痛或小腹痞悶或上攻兩脇或晡熱重墜若兩拘小腹腫痛肝經濕熱壅滯也

用龍胆瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛也用加味逍遙散及龍胆瀉肝湯加木香若繫投散血攻毒之劑則誤矣一婦人拘中赤腫脹痛此膿內作用托裏消毒散加此數劑潰而膿清寒熱乃氣血復虛用托裏散而寒熱止用十全大補湯百餘劑而歟

一婦人腹拘腫痛寒熱口苦或時帶下此肝經濕熱不利也用龍胆瀉肝湯而腫痛消用加味逍遙散而寒熱退一婦人腹拘腫痛小水不利時或胸乳作痛脇腹作脹此肝火氣滯用四物柴胡青皮玄胡木香而愈

一婦人兩拘腫痛腹內一塊不時上攻月經不調小便不利余以爲肝脾氣滯而血傷以四君子加芎歸柴胡山

施而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿腹脹盜汗此肝木甚而傷脾土也用加味歸脾湯下蘆薈丸而痊

一婦人陰中如梗兩拘腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以爲肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山梔車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈

龍胆瀉肝湯

治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中疼痛或

小水澁滯等症

龍胆草

酒拌炒

澤瀉

各一錢

車前子

炒

生地黃

拌通木山梔炒

黃芩

甘草

各五分

右水煎服

九味柴胡湯

治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脹

肋結核及肝膽經部分一切瘡瘍或風熱結核瘰疬

柴胡

黃芩

炒各一錢

山梔

炒半夏

龍胆草

炒焦

川歸

芍藥

炒甘草各五分

右水煎服

蘆薈丸

治肝氣不和尅侮脾胃而患諸症或三焦肝

膽經風熱目生雲翳或疳熱癧瘻耳內生瘡寒熱作痛
肌膚消瘦發熱乍渴飲食少思肚腹不調或牙齦蝕落

煩腮腐爛下部生瘡等症

蘆薈

五錢

胡黃連

當歸

芍藥

炒

龍胆草

酒浸炒

川芎

蕪荑

各二兩

木香

甘草

炒各三錢

右爲末用米糊丸麻子大每服五十九滾湯下

鶴膝風

婦人鶴膝風症因胎產經行失調或鬱怒虧損肝脾而爲
外邪所傷或先腿脚牽痛先或肢筋掣既而膝漸大

腿漸細如鶴膝之狀而名之也若高腫赤痛者易治若
漫腫不赤痛者難治二三月潰而膿稠者易治半載後
潰而膿清者難治設先攻伐虧損元氣尤爲難治也大
要當固元氣爲主而佐以大防風湯若食少脉倦者六
君子湯爲主晡熱內熱者逍遙散爲主寒熱往來者八
珍湯發熱惡寒者十全大補湯不寐而驚悸者歸脾湯
月經過期者補中益氣爲主月經先期者加味逍遙散
爲主凡潰後當大補脾胃若膿出反痛或寒熱煩渴等
症皆屬氣血虧損一切主于補培庶保終吉

一婦患鶴膝兩拘中腿股筋牽作痛內熱寒熱此肝火氣
滯之症先用加味小柴胡湯四劑後以加味道逍遙爲主

佐以大防風湯而消又患癩後兩膝腫痛寒熱往來用

十全大補湯爲主佐以大防風湯而全消

大防風湯

治陰虛邪襲腿膝腫痛等症

防風

附子炮

牛膝

白朮炒

羌活

人參各一錢

川芎一錢

五分

桂心

黃耆

炒各一錢芍藥炒

杜仲

姜制各一錢

甘草分

熟地半

一錢水煎服

黑丸子

一名和風
定痛丸

治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫

或外感風寒肢節作痛若流注膝風初結服之自消若

潰而膿清與補氣血藥自歛孕婦勿服

百草霜

白芍各一兩

南星

川烏各一錢

牛膝六錢

白芍

赤小豆各一兩半

白芨

川歸

骨碎補炒各一錢

牛膝六錢

白芍

右爲末酒糊丸桐子大

每服三十九盃湯溫酒任下

聖愈湯 治血虛心煩睡卧不寧或五心發熱

熟地黃 生地黃 黃耆炒 人參 川芎 川歸各一錢

水煎服

八味丸 治火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注

鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化或
臍腹疼痛夜多漩溺益火之原以消陰翳卽此方也

熟地黃佳八兩 山茱萸肉 山藥各四兩 茯苓 牡丹皮

澤瀉各二兩

桂心

去粗皮能補腎而引虛火下行歸原一兩

大附子用一兩五錢重者切

四塊用童便浸數日火煨切看無白星爲度 右爲末蜜丸桐子大每服七八

十九滾湯下

婦人足跟瘡腫

足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失于調攝虧損足三陰經虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸爲主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散補熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡亦用前二藥以滋化源大凡發熱內熱晡熱自汗盜汗等症皆因虛假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也蓋足跟乃督脈發源之所腎一經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則悞甚矣然俗謂爲兔嘴瘡者蓋獵人被兔咬足跟久而不斂氣血瀝尽其人必死男子酒色過度者亦多患此症

一婦兩足發熱足跟作痛日晡熱甚此腎肝血虛用逍遙

散六味丸五十餘劑諸症悉退

六味丸

此壯水制火之劑治腎虛發熱作渴小便淋

秘痰壅失瘡咳嗽吐血頭目暉眩眼花耳聾咽喉燥痛

口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟虧損自汗盜汗便

血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也

此水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精血不足虛熱不能起床卽仲景八味丸去附子桂心

肺瘤

婦人肺瘤因外內蘊熱或七情鬱火誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項強胸脇脹滿呼吸

不利吐痰鼻濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龍湯咳嗽胸脹寒邪內壅也葶藶大棗瀉肺湯脅脹咳唾腥臭膿已成也桔梗湯咳嗽短氣或小便短少肺氣虛也佐以參耆補肺湯肺倦少食或喘嗽短氣脾肺虛也佐以參术補脾湯作渴飲冷午前嗽甚胃火盛也竹葉石膏湯作渴內熱午後嗽甚陰血虛也六味丸四物湯口乾飲湯肺倦少食胃氣虛也補中益氣湯加五味麥冬口乾內熱咳嗽痰涎腎水虛也六味丸益氣湯黃昏熱或嗽甚陰火熾也六味丸四物湯加五味麥冬五更嗽或痰甚脾肺虛也六君子湯嗽而不得眠及兩脇疼肝火虛也六味丸益氣湯大凡前症因外淫所

侵當祛邪而實上因心火太過當伐木而補金若肺氣虛弱當補脾土而生肺金若陰火上炎當補肺脾以滋腎水然而發熱喘嗽咳唾膿血飲食不入皆脾土不能生肺金肺金不能生腎水之敗症苟能純補脾土而生諸臟多有復生者若用寒涼脾胃復傷則肺金失養腎水益涸虛火上炎薰蒸于肺吾未見其能生之者其唾膿血脈浮大面色赤者俱難治若陰火妄動或勞嗽吐膿血者尤難治若膿自止脉浮短濶及始萌者易治一婦素血氣發熱咳嗽服痰火之劑後吐膿血面赤脉數其勢甚危此膿成而氣血虛也用八珍湯補元氣桔梗湯治肺瘡而愈

青龍湯

肺受風邪咳嗽喘急

半夏

乾姜

細辛

麻黃

去根節

肉桂

芍藥

炙甘草

各一錢

五味子

炒五分

大附子

炮五分

水煎服

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰胸膈脹滿上氣喘急或身

面浮腫鼻塞声重用葶藶炒黃研末每服三錢先用棗

十枚水煎入藥再煎食後服

桔梗湯

治肺癰咳而胸膈隱痛胸次腫滿咽乾口燥

煩悶作渴濁唾腥臭

桔梗

枳壳

以仁

桑皮

各一錢

當歸

貝母

瓜萎仁

甘草節

防已

去皮各一錢

黃耆

各一錢

炒百合

蒸各一錢半

五味子

炒甜葶藶

炒地骨皮

知母

各五分

姜水煎服

炒杏仁

各五分

人參補肺湯 治肺瘦腎水不足虛火上炎咳嗽膿血

發熱乍渴小便不調 人參 黃芪 炒 白朮 茯苓

陳皮 川歸各一錢 山茱萸 山藥各二錢 五味子 麥冬

炙甘草各七錢 丹皮一錢 熟地一錢半 姜水煎服

參芪補脾湯 治肺症因脾氣虛弱咳嗽膿涎中滿不食
宜兼服此藥以補脾土生肺金 人參 白朮各二錢

黃芪炙二錢半 茯苓 川歸 陳皮各一錢 升麻三分 五味子四分

炙甘草 姜水煎服

人參平肺散 治心火犯肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰涎

壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

方見嗽門

婦人腸癟因經行產後瘀血或七情飲食所致其証小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按之軟如腫狀或腹脹大轉側有水声或繞脅生瘡或大便出膿其脉遲緊者膿未成用活命飲以解其毒脉滑數者膿已成用雪母膏以下其膿若二年間遍身微腫大便與脅出膿此息積之症也多致不救內經云腸癟爲病不可驚驚則腸斷而死其坐卧轉側宜徐緩時常少飲稀粥淨餐調理庶可保生

一婦人小腹腫痛小便如淋此毒結于內用神效瓜萎散劑少愈又以薏仁湯二劑乃痊

一婦人小腹痛而有塊脉芤而濇此瘀血爲患以四物加玄

胡索紅花菟仁牛膝木香二劑血下而愈

一婦小腹脹痛大便秘滯轉側有水聲脉洪數用薏苡梅
仁湯一帖下去瘀血諸症頓退以薏苡仁湯二帖而瘥
一婦小腹脹痛小便不利脉滑數此膿已成服太乙膏五
錢膿大下脹痛悉退以瓜萎散蠟丸托裏藥而安
婦因經水多服藥止之致腹作痛以失笑散二帖而瘳
又用加味逍遙散數劑而經調

一產婦惡露停滯小腹作痛服瓜仁湯下瘀血而痊凡瘀
血停滯急宜行之緩則腐化爲膿最爲難治若流注關
節則患骨疽多爲敗症

瓜子仁湯 治惡露未尽或經行瘀血停滯小腹作疼

或成腸瘻等症

方在孕瘻卷

敗醬散

治脈數身無熱腹無積聚按之軟濡此爲腸

瘻乃久積陰冷所成 以仁

二兩

附子

炮半兩

敗醬草

兩

二錢半

每服四錢小煎服以小便利爲度

牡丹湯

即牡丹皮

散

治腸瘻腹軟而痛時下膿血

方在孕瘻卷

千金大黃牡丹湯

治腸瘻小腹堅腫按之則痛肉色

如故或歟赤微腫小便頻數汗多增寒脉遲緊未成膿

者宜服之

梅仁湯

治腸瘻壅痛大便秘澁

二方在外

科腸瘻門

神仙蠅礬丸

最解毒止痛

方在瘻疽門

失笑散

產後心腹絞痛或血迷心竅不知人事及尋

常腹內瘀血積血作痛

五靈脂

炒

蒲黃

分

等爲末

每服二錢酒調下

乳瘡乳岩

經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足太陽胃經若乳房忽壅腫痛結核色赤數日之外焮痛脹潰稠膿湧出膿尽而愈此屬胆胃熱毒氣血壅滯名曰乳瘡爲易治若初起內結小核或如鰲棋子不赤不痛積之歲月漸大巉岩崩破如熟榴或內潰深洞血水滴瀝此屬肝脾鬱怒氣血虧損名曰乳岩爲難療治法焮痛寒熱宜發表散邪腫焮痛甚宜諫肝清胃或不作膿成不潰宜用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿出反痛惡寒發

熱宜補氣血或腫瘍作痛。瞞熱內熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或勞碌腫痛宜補氣血怒氣痛腫宜養肝血甚不可用慾伐之劑復傷脾胃也。乳岩初患用益氣養榮湯加味逍遙加味歸脾可以內消若用行氣破血之劑則速其亡。

一婦內熱脇脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若卧而起急則臍下牽痛此帶脉病也。小柴胡加青皮黃連山梔二劑而安。

一婦先熱渴尤甚後兩乳忽腫肝脉洪數乃熱入血分用加味小柴胡湯而愈。

一婦膿清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月經不行
此肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法而消

一婦久鬱左乳內結核如杏三月不消心脉濇脾脈大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘帖而消

一婦右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木香餅熨之年餘血氣復而愈

一婦乳內結核年餘晡熱食少此血氣不足欲用益氣養榮湯彼欲效速另服行破之劑潰出清膿而歟

一婦乳內結核如粟亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血
神效瓜蒌散 治乳瘡及一切瘡疽初起 痰成即消水而殺
體

出則愈

瓜蒌

一箇
爛研

生粉草

當歸酒洗各半兩

乳香

沒藥各一錢

用酒煎服良久再服若肝經血虛結核久而不消佐以四物柴胡升麻白朮茯苓甘草若肝脾氣血虛弱佐以四君芎歸柴胡升麻若憂鬱傷脾氣血虧損

佐以歸脾湯

玉露散

治產後乳脈不行或身熱壯熱頭目昏痛大便澀滯等症

人參

茯苓

桔梗炒

川芎

白芷

當歸

芍藥

各一錢

甘草五分

右水煎服

乳瘡初發

貝母爲末每服二錢熱酒卽以二手覆接

卓上垂二乳向下良久自通

終