



• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 JAPAN Tama

門七
武九
卷之七

三因極一病證方論卷之七

疝叙論

小文系

森氏開萬
冊序之記

經論雖云七疝，諸疝等更不見名狀。但出寒疝類疝而已。唯太奇論列五臟脉爲五疝，證所謂腎脉大急沉，爲腎疝。肝脉大急沉，爲肝疝。心脉搏滑急，爲心疝。肺脉沉搏，爲肺疝。三陰急，爲脾疝。三陰即太陰脾脉也。太抵血因寒泣，則爲瘕氣。因寒聚，則爲疝。但五臟脈理不同，不可不辨。且腎脉本沉，心脉本滑。受寒則急於理，乃是肝脉本弦，肺脉本瀦並謂之疝，未爲名義。又脾不出本脉，但云急爲疝，亦文不義之錄也。凡云

急者緊也緊爲寒亦可類推且賊風入腹未爲疝冒暑寢違皆能爲疝當隨四氣改易急字風則浮弦暑則洪數溫則緩細於理甚明要知疝雖兼臟氣皆外所因也

諸疝證治

疝之爲病隨臟氣虛實感傷外邪寒汎風散暑鬱濕着絃刺擊搏无有定處倉卒之際痛不堪忍世人稱爲橫弦堅弦膀胱小腸氣暎風入腹等名義不同證狀則一寒則溫之風則散之暑則利之湿則燥之各有成法

大烏頭桂枝湯治風寒疝腹中痛连冷手足不仁鼻
脣疼痛攻刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟
拘急不得轉側發作呻吟陰縮悉主之

大烏頭

伍枚實者去皮尖蜜一大盞煎減半

出湯切洗

桂心

芍藥

各三錢三字

耳草

一分

右爲剉散每服四大錠水一盞半薑五片大棗二箇入前煎烏頭蜜半合同煎至七分盞去滓食前服一法用附子一箇不復烏頭爲蜜附湯

走馬湯治卒疝无故心腹痛陰縮手足厥逆并治飛尸鬼擊

巴豆

二箇去皮心炒

杏仁

二箇去皮尖

右二味取綿纏搘令碎

熱湯二合搘取白汁飲之當下老少量與

倉卒散治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣絞刺

脾腎氣攻亦手急極痛不可忍屈伸不能股中冷重如石白汗出

山梔子

四十玖箇燒半過

附子

一枚炮

右爲末每服二錢水一盞酒半盞煎至七分入鹽

一捻溫服即愈

葱白散治一切冷氣不知及本臟膀胱氣攻刺疼痛

及治婦人產前產後腹痛胎不安或血刺者兼能治血臟宿冷百骨節倦疼肌瘦怯弱傷勞帶癖久

腹盡除但婦人一切疾病最宜服之

川芎

當歸

枳殼

麸炒去穰

厚朴

姜製炒

官桂

皮去

青皮

乾薑

炮

茴香

炒

蓬木

醋侵宿焙

川練

炒

神曲

炒

麥糵

炒

三棱

炮

蓬木

各一

芍藥

木香

炮

乾地黃

兩各一

右爲末每服三盞水一盞葱白二寸煎七分入鹽少許熱服大便秘滯加大黃煎太便自利共加調子煎食前服

失笑散治小腸氣痛及婦人血痛心腹絞痛欲死
十餘日百藥不驗

五靈脂 蒲黃 炒等分

右末每服二錢先用釀醋一合，熬藥成膏水一盞煎至七分熱呷服

神應散治諸疝心腹絞痛不可忍

玄胡索 胡椒 等分

右爲末每服二大錢酒半盞水半盞煎七分食前溫服

大烏頭湯治寒疝繞脅發_平白汗出手足厥其脈沉弦

悉去之

大烏頭

伍箇洗淨細沙炒令黑不咬咀

右一味水三盞煎取八分去烏頭入蜜半盞已下煎七分兩上空腹服

牡丹圓治寒疝心腹刺痛休作无時及治婦人月病血刺疼痛

川烏頭

炮令焦黑去皮尖

牡丹皮

四

桂心

伍兩

桃仁

炒去皮尖五兩別研

右末煉蜜丸梧子大每服五十圓溫酒下婦人醋湯下

小茴香圓治小腸氣腹痛

茴香 胡椒等分

右爲末酒糊丸如梧子大每服五十圓空心溫酒下

苦練圓治肝腎氣虛風冷相搏心腹絞痛攻刺腰背不能禁受下注陰器腫痒疼痛久服養腎活血駐顏輕身奈老進羨飲食

川練一十一箇剉碎分三去一用巴豆七粒去皮同炒焦去班

黑色去巴豆不用又用班梔七箇同炒金砂七錢重同炒去海金炒不用

茴香炒破故紙炒

葫蘆巴

炒一兩炮各

烏藥二兩

右爲末酒糊丸如梧子大每服三五圓湯酒任下補腎湯治寒疝入腹上賣下虛小腹疼痛時復泄瀉曾臍痞滿不進飲食常服溫脾補腎

人參 茯苓 白朮 黃芪

附子炮去皮附子各一兩

沉香四錢

木瓜一兩半

羌活半兩

甘草炙

芎藭各一分

紫蘇三分

右爲剉散每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分去滓食前服加半夏半兩添水作盞半姜七片煎

片煎

叙厥論

經云厥者逆也。有寒厥，有熱厥。有六經厥，有尺厥，寒厥者，陰氣起於足五指之裏，集於膝下，聚於膝上，故陰氣勝，則從五指至膝上寒。陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在故手足爲之寒。名曰寒厥。熱厥者，陽氣起於足五指之表，集於足下，聚於足心，故陽氣勝，則從五指至足心熱。熱入於胃絡，脉滿經脈虛，陰虛陽入，腎氣襄陽，氣獨勝，故手足爲之熱。名曰熱厥。六經厥者，頭重足弱，發爲瞋仆，名曰太陽厥。妄言走呼，腹滿面赤，名曰陽明厥。暴聾，頰腫，脣腫，腸筋拘痛，名曰少陽厥。腹脹後閉食，則寒嘔，名曰太陰厥。口乾渴，赤脣滿陽，則陽氣亂而不知人矣。名曰少陰厥。經論如此，雖想分六經殊不出寒熱二證。所因欲求備治，當歷明之。寒厥則因多慾而奪其精，故致陽襄陰盛，熱厥則因醉飽入房，精虛則熱入，故致陰虛陽盛。攷其厥因，多以不勝乘其所勝氣不得行，遂致於逆。如腎移寒於脾，則水乘土，土水既不行，乃成寒厥。如心移熱於腎，則火乘干水，火既不行，乃成熱厥。六經皆然，可次第。

心痛，名曰陰厥。溼潤不利，肺熱陰縮，名曰厥陰厥。尺厥者，脹滿暴不知人，或至半日，遠至一日。此以陰氣盛於上，則下虛。下虛則腹脹。腹脹則下氣重上，而邪氣逆逆，則陽氣亂而不知人矣。名曰少陰厥。經論如此，雖想分六經殊不出寒熱二證。所因欲求備治，當歷明之。寒厥則因多慾而奪其精，故致陽襄陰盛，熱厥則因醉飽入房，精虛則熱入，故致陰虛陽盛。攷其厥因，多以不勝乘其所勝氣不得行，遂致於逆。如腎移寒於脾，則水乘土，土水既不行，乃成寒厥。如心移熱於腎，則火乘干水，火既不行，乃成熱厥。六經皆然，可次第。

論也所謂得其要者。下言而終矣。尸厥亦然。正由藏氣相刑。或與外邪相忤。則氣遏不行。閉於經絡。諸脉匿伏昏不知人。唯當隨其臟氣而通之。寒則熱。熱則寒。閉則通。如經所謂盛則瀉虛則補。不盛不虛。以經取之。其肯一也。經中以數醉爲熱厥之因。學者不可拘此。蓋傷寒溫病皆有熱厥。仲景所謂熟深厥。深聖意以酒能發百脉。熱放舉此以爲例耳。不可不知。

陰陽厥脈證治

陰陽相乘而生寒熱厥者。脈證似同。而大異。寒厥者初得之。四肢冷。脉沉微。而不數。多惡寒。引衣自覆。下

利清穀。外證多惺惺熱厥者。初得之必發熱頭疼。脉雖沉伏。按之必數。其人或畏寒喜冷。揚手掉足。煩躁不眠。大小便秘。赤外證多昏冒。傷寒亦然。治之各有方。

四逆湯治寒厥。或表熱裏寒。下利清穀食入。則吐。或乾嘔。或太汗。大吐。太下之後。四肢冰冷。五內拘急。舉躰疼痛。不渴。脉沉伏。

大附子去皮膚生用半兩

乾姜半兩

耳草炙一分

右剉散。每服四錢水二盞煎七分。去滓食前溫服。併進取效。

白虎湯 治熱厥腹滿身重，難以轉側。面垢譫語遺溺。

手足厥冷自汗脉沉滑裏有熱也。

石膏

四兩推碎

知母

半兩

耳草

炙半兩

右爲剉散每服四大錢水二盞粳米一撮煮采熟去滓取十分清汁服可併進服。

兼氣湯 亦治熱厥方見傷寒門舉此爲例當觀病淺深量多寡以飲之方見第四卷

卒厥尺厥脉證治

追魂湯 治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸奄忽氣絕不覓口禁

麻黃

去節三兩

杏仁

去皮尖二百八十箇

耳草

炙一兩

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓灌之通治諸感忤或口噤拗口不開去齒上湯湯入口活歪下分病人髮左右捉擗肩引之藥下漸令服盡取効千金有桂心二兩金匱云寸脉沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入臟則死入腑則愈若卒厥唇口青身冷爲入臟即死身和汗出則愈。

內鼻散 治尸厥脈動而无氣氣閉不通靜而若死亦名卒厥。

菖蒲

右爲末，內兩鼻孔中吹之，令入仍以桂末安舌下。

眩暉證治

方書所謂頭面風者，即眩暉是也。然眩暉既涉三因，不可專爲頭面風。如中傷風寒暑濕，在三陽經，皆能眩暉，人頭重，項強，但風則有汗，寒則掣痛，暑則熱悶，濕則重着吐迷，眩例屬外所因。喜怒憂思致藏氣不行，鬱而生所涎結，爲飲隨氣上竅，伏留陽經，亦使人眩暉，嘔吐眉自疼痛，眼不得開，屬內所因。或飲食飢飽，甜膩，所傷房勞過度，下虛上實，拔牙金瘡吐衄便利。

去血過多及婦人崩傷，皆能眩暉，眼華，屋轉起，則眩倒，屬不内外因，治之各有法。

大豆紫湯 治中風頭眩惡風，自汗吐水，及產後百病，或中風癥，瘡背強口噤，直視煩熱。

獨活一兩半 大豆半升 酒三升

右先以浸，獨活煎一二沸，別炒大豆，極焦煙出，急投酒中，蜜封候，零去豆，每服一二合，許得少汗，則愈。日數十服，此湯能去風消血結，如姪娘折傷胎死，腹中服此得瘥。

三五七湯 治感寒頭眩惡寒，口眼喎斜，耳聾。

大附子

三兩炮
去皮勝

山茱萸

五兩

山藥

七兩

右爲末每服二錢匕酒調服或咬咀每服四大錢水盞半薑五片棗一箇煎十分去滓服

黃龍圓

治感暑眩暈昏不知人

方見中暑門

麴木散

治冒濕頭眩暈經久不差嘔吐涎沫飲食無味

生地之

神曲

二兩炒

白朮

三兩

右爲末每服二錢生姜煎湯調下或以酒糊圓如梧子大每服三五十圓湯飲任下

暑瀆湯

治七情一臟氣不行鬱而生涎涎結爲飲隨

氣上厥伏留陽經心中忪悸四肢緩弱翕然而熱頭目眩冒如欲搖動

署瀆

人参

麥門冬

去心各四兩

前胡

白芍藥

熟地黃

各二兩

枳殼

麸炒去穰

遠志

去心姜引製各三分

白茯苓

茯神

各一半兩半

半夏

湯洗去骨一兩一分

甘草

半兩炙

黃芪

一兩炙

右爲剉散用千里流水一盞半薑十片秫米一撮煎七分去滓食前服

白散子

治上實下虛眩暈昏塞

方見中風門

芎窩湯

治產後去血過多運悶不省及傷胎去血多

崩中去血多，金瘡去血多，拔牙齒去血多，不止，懸

虛心煩，眩暉頭重，目暗，耳聾舉頭欲倒。

芎窮

三兩

當歸

三兩

去土切，焙乾。

右爲剉散，每服四錢水一盞半煎，七分去滓熱服。

不以時候。

黑錫丹

治陰陽不升降，上熱下冷，頭目眩暉病。

篤或服暖藥，僭上愈甚者，當服此藥。已經增損。

硫黃

二兩

推如皂

夾子大候

鉢成

汁入硫黃

在內

地坑

勿令

焰起俟硫黃化

領出於九重紙內入一

蓋火出

盆以益

川練子

里鉢

不夾錫者先審

成汁各二兩

陽起石

股

木香

沉香

青皮

炒各半兩

肉荳蔻

一兩

茴香

炒

官桂

去皮見火

不

附子

炮去皮臍

葫蘆巴

炒

破故紙

一兩

烏藥

去木剉

右爲細末酒糊爲丸，如梧子大，每服三五十圓，至一百圓，濃煎，人參茯苓薑棗湯吞下，食前服。

瘡叙論

瘡亦作癰

夫人之節各隨經絡結束於身，血氣內虛外爲風寒，濕熱之所中則瘡。故寒則緊縮，熱則弛張，風則弦急，濕則脹緩。四氣兼并當如常說，以風散氣，故有汗而不惡寒，曰柔瘡；寒並血，故无汗而惡寒，曰剛瘡。熱消氣，故爲癰。縱濕溢血，故爲緩弱。經中所謂太筋緩短，

小筋弛長，經短爲拘，弛長爲痿，皆濕熱不攘之所爲也。原其所因，多由亡血筋无所營，故得以襲之。所以傷寒汗下過多，與夫病瘡人及產後致斯病者，槩可見矣。診其脉，皆沉伏弦緊，但陽緩，陰急則兀兀拘牽，陰緩陽急則反張強直，二證各異，不可不別。

痓叙例治法

破傷風 破傷濕並附

病者身熱足寒，頭項強急惡寒時，頭熱面赤目脈赤，獨頭動搖，卒口噤，背反張，以發熱惡寒不惡寒，有汗無汗分剛柔者，風寒痓也。脉沉細，即爲濕痓，瘡瘍未合，風入爲破傷風，溫入爲破傷濕，二者害人最急，倉卒不知其因，甚難忍。癰疽瘻瘍，瘻潰之後尤宜，蓋之。

產婦汗多，或因怒厥，皆成此病，治之各有方。治

括搘桂枝湯

治柔痓身體強兀兀然脉反沉遲自汗

括搘根

二兩

桂心

白芍藥

各三兩

甘草

炙二兩

右爲剉散，每服四大錢水，盡半薑五片棗二枚煎七分去滓，溫服，汗不出，食頃啜熱粥，發之。

葛根麻黃湯

治剛痓无汗小便少氣上衝，口噤不能語主之

葛根

四兩

麻黃

去節三兩

桂心

白芍藥

甘草

右剉散，每服四大錢水，盡半薑五片棗三枚煎七

分去滓食前服

大承氣湯 治剛痓 胃滿 口噤卧 不着席 脚癱急齒齒
舌之方

大黃

四兩
蒸

厚朴

炒兩
姜製

枳殼

二兩
炒去穰

右剉散每服四大錢水盞半煎七分去滓入芒硝二錢匕煎鎔服得利止後服此以陽明養宗筋陽明者胃也風濕寒入于胃則熱甚宗筋无以養故急直利陽明以治其能養也

參桂湯 治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身躄冷或智或癡或身強直不語或生或死狂言不可名

狀角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利悉主之

人參

桂心

當歸

獨活

黃芩

乾姜

炮

甘草

炙各一
分

石膏

一兩
半

杏仁

一
伯六十箇

麸炒去皮尖

右剉散

每服四大錢水

一盞半煎

七分去滓服

元

汗加麻黃去節三分

倉公當歸酒

主賊風口噤角弓反張痓者

當歸

防風

各三
分

獨活

一兩
半

麻黃

去節一
兩

細辛

去苗半
兩

附子

一固六錢
泡去皮臍

右爲剉散

每服四錢水酒各半盞同煎

七分去滓

口不開者，挾開口內湯一服，蘇二服，少汙三服，大汙愈。

破傷風濕治法

防風散 治風自諸瘡口入爲破傷風，項強牙閼緊，欲死。芝ト

防風去叉 天南星湯各等分

右爲末，每服三錢，童子小便一太盞煎至七分熱

服。

牡礪散 治破傷濕口噤強直

牡礪取未粉付瘡口仍以末二錢煎草湯調下

香膠散 治破傷風，口噤強直。
魚膠燒七分留性

右研細，入麝香少許，每服二錢酒調下，不飲酒，米

湯下。又一方以蘇木煎酒下。

三因極一病證方論卷之七

終

三因極一病證方論卷之八

內所因論

夫臟腑合手足三陰三陽爲十二經各有所生故爲十二官心者君主之官神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉脾者諫議之官公平正出焉腎者作強之官伎巧出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉小腸者受盛之官化物出焉太腸者傳送之官變化出焉胃者倉廩之官五味出焉三焦者津瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故五臟爲陰六

府爲陽此十二官不得相失者正由陰陽消息盈虛當隨四序而調養之不可使其偏勝偏勝則偏復偏復則偏害勝剋流變則真病生焉夫陰陽虛實者乃臟腑更相勝復也若其子母相感則母虛能令子虛子實能令母實經曰實則漏其母虛則補其子如肝實則漏腎肝虛則補心如百姓足君孰與不足此經虛補用酸助用焦苦益用耳味之藥酸入肝焦苦入心耳入脾脾能制腎腎氣微弱則水不行水不行則心火盛心火盛則肺金受制肝氣乃舒肝氣舒則肝

病自愈此補子之意也虛肝則用此實則反之千金亦云肝虛當補心心旺則感於肝皆此類也此正本藏十二官冷熱盈虛而爲病非外感淫邪及故爲背理者之比然內所因惟屬七情交錯愛惡相勝而爲病能推而明之此約而不濫學者宜留神焉

內所因治說

論云治傷寒有法醫雜病有方方即義方法即法令外病用法令猶奸邪外擾非刑不除內病用義方猶父兄子弟不足以禮格之而已故內外之治由是而介外邪難辨當以例明內證易知只叙方證學者不

卷之三
可不審

肝膽經虛實寒熱證治

泻肝湯 治肝實熱陽氣伏邪脇痛怠怠悲憤發熱喘

逆滿悶目痛視物不明狂憤悲意而言乍寬乍急

所作支奇反常

前胡去苗

柴胡

秦皮去鹿

細辛去苗

梔子仁

黃芩

升麻

蕤仁

決明子各等分

右剉散每服四錢水兩盞苦竹葉車前葉五片各煎至盡半內藥再煎至八分去滓入芒消壹錢匕

煎鎔不以時服

瀉膽湯 治膽實熱反洒洒惡寒股中氣滿脣干硬口苦咽乾頭疼不欲食

半夏

三兩湯洗去滑

生地黃

五兩

酸棗仁

二兩半

黃芩

一兩

遠志

去心姜汁合炒

茯苓

各二兩

耳草

灸一兩

右剉散長流水壹斗糯米一升煮鱠眼沸湯二十三

千遍澄清每用二盞抄藥四錢匕薑七片煎七分

去滓不以時服

補肝湯 治肝虛寒兩脇滿筋急不得太息寒熱腹滿不欲飲食恍恍不樂四肢冷發捨心腹痛目視睂睂或左脇偏痛筋萎脚弱及治婦人心痛乳癰脇

熟消渴瓜甲枯口面青，

山茱萸

耳草炙

桂心各一

細辛去苗

茯苓

桃仁炒去皮尖

柏子仁

防風各一

川烏頭炮去皮半兩

右剉散每服四大錢水盞半盞五片棗三枚煎至

七分去滓空心服

溫膽湯

治膽虛寒眩厥足痿指不能搖臂不能起僵

什目黃失精虛勞煩擾因驚膽懾奔氣在胃喘滿

浮腫不 脣

半夏湯洗去滑

麥門冬去心各一兩半

茯苓二兩

酸棗仁

三兩 炒耳草炙

桂心

遠志去心姜汁合炒

黃芩

草薢人參各一兩

右爲剉散每服四大錢用長流水一斗糯米煮如

漏膽湯法

一方見虛煩門

心小腸經虛實寒熱證治

漏心湯

治心實熱心下痞滿身重發熱乾嘔不安

腹中雷鳴滯溲不利本穀不消欲吐不吐煩悶喘急

黃連去毛二兩

半夏湯洗七次三兩

黃芩

耳草炙

人參各一兩

乾姜炮一兩半

右爲剉散每服四大錢水兩盞棗三枚煎七分去

滓服並治霍亂若寒加附子一枚炮去皮臍若渴

加桔梗根 嘔加橘皮 痛加當歸客熱以生薑代乾
薑

清肺湯治小腸實熱身熱手足心熱汗不出心中煩
滿結塞不通口瘡身重

柴胡 澤瀉 橘皮 芒消 枳實麸炒去穰 黃芩

升麻 旋覆華 生地黃各等分

右剉散每服四錢水盞半煎十分去滓下芒消再
煎熟服不以時

茯苓補心湯治心虛寒病苦憐恐不樂心腹痛難以
言心寒恍惚喜悲愁恚怒血面黃煩悶五心熱

渴獨語不覺咽喉痛舌本強令汎出善忘恐走及
治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暉四肢怠惰全不納食
白茯苓 人參 前胡 半夏湯洗七次去滑 川芎各三
橘皮 枳殼麸炒去穰 紫蘇 桔梗 耳草炙
乾薑各半兩 當歸三分一兩 白芍藥二兩 熟地黃一兩半
右剉散每服四大錢水盞半薑五片棗一枚煎七
分去滓食前服

分氣補心湯治心氣鬱結忪憊喧悶四肢浮腫上氣
喘急

大腹皮炒 香附炒去毛 白茯苓 桔梗各一

木通 耳草 炙 川芎 前胡 苗 去 青橘 炒

枳殼

麸炒去穰

白朮 各三 分

細辛 去苗

各一

木香 各半兩

右剉散每服四大錢水一盞薑三片棗一枚煎紫

分去滓食前溫服

溫脾湯治小腸虛寒苦頭偏痛耳頰疼下荆赤白腸滑腹中疼痛裏急後重

乾薑 半兩

當歸

黃葉 地榆 各二兩

阿膠 炒

茴香 炒

石榴皮

黃連 各一兩

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓溫服

脾胃經虛實寒熱證治

清脾湯治脾實熱病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得卧舌本強脉重面黃頭痛右腳滿痛偏脹口唇乾裂寒熱如瘡

茯苓 橘皮

草薢 去皮

白朮 各二兩

人參

桂心

白芷

耳草 炙

川芎 各一兩

半夏 三兩洗七次

右爲剉散每服四大錢水二盞七次紫蘇三葉煎七分去滓服欲通利加大黃

平胃散治胃實熱口唇乾嘔噦煩悶大小便祕澁及熱病後餘熱不除畜干胃中四肢發熱口渴曾溼

元汗

厚朴 去皮 姜 製炒

射干 米 池 浸

升麻

茯苓 各 半

芍藥 二 两

枳殼 麸炒 去穰

大黃 蒸

耳草 炙 各 一 两

補脾湯 治脾虛寒病。泄濁腹滿氣逆嘔吐心煩，不得
卧，腸鳴虛脹飲食不消勞倦虛羸喜噫，四肢逆冷，
多卧少起情意不樂。

人參 茯苓 草菓 去 皮 乾姜 炮 各 一 两

麥蘖 炒

耳草 炙 各 二 两半 厚朴 去 皮 姜 製炒

橘皮

白朮 各 三 分

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前

服

大朴散 黃芩 菊子 藥支

葛根 各 半

養胃湯 治胃虛寒、脰寒、不得卧，淅淅惡風，洒洒惡寒，
腹中痛，虛鳴寒熱，如瘧，唇口乾，面白虛浮，嘔噦吐

瀉，四肢疼痛，不思飲食，或傷寒濕，骨節皆痛。

厚朴 姜 製炒

藿香 梗 去 池

半夏 湯洗 七 次

茯苓 各 一 两

人參 耳草 炙

附子 炮 去 皮 脖

橘皮 各 三 份

草菓 去 皮

白朮 各 半

右剉散每服四錢水，蓋半盞，五片棗一枚，烏梅半
箇，煎七分去滓，空心服，常服，溫胃消痰，進食，下氣。

辟寒疫

肺大腸經虛嘯寒熱證治

清肺湯治肺實熱肺壅汗出若露上氣喘逆咳嗽咽中塞如嘔狀短氣客熱或唾膿血

薏苡仁 防已 杏仁 冬瓜子仁 三分

雞子白皮 一分

右爲剉散每服四錢先以葦葉切半握水二盞煎盡半入藥同煎至七分去滓食前服

瀉白湯治太腸實熱腹脹不通俠脅痛食不化喘不能久立口生瘡

橘皮 淡竹茹 黃芩 梭子仁 藥皮 各半

茯苓 芒消 各一 生地黃 五兩

右爲剉散

每服四錢水盡半姜棗煎七分空心服

補肺湯

治肺寒虛逆涌上氣咽中間塞寒從背起口

中如含冰雪語无音聲舌本乾燥吐沫唾血不能飲食

款冬華 桂心 各一 桑白皮 火四 人参

紫苑草 一

白石英 一

五味子

鍾乳粉 各一

麥門冬 去心

二兩

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚粳米一撮同煎七分去滓食前服

固腸湯 治大腸虛寒利下青白腸中雷鳴相逐大便不節小便赤黃氣上衝會不能久立身腫腹急當

膀胱悉主之

酸石榴皮 半兩

黃連 炒

地榆 各一兩

蜜粟殼 炙

茯苓 各二兩半

右剉散 每服四錢水盞半薑五片烏梅一箇煎七

分去滓心服

腎膀胱經虛實寒熱證治

青原湯

治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾骨熱小便赤黃腰脊離解及伏水等

茯苓 **黃芩** **菖蒲** 各五兩
大黃 水浸一宿 **耳草** 炙各二兩
右爲剉散 每服四錢水一盞煎七分去滓熟服

漏浮湯

治膀胱寒熱腰脊痛閉塞不通舌乾咽腫悉

主之

茯苓 **梔子仁** **知母** 各三兩

生地黃 **淡竹葉**

各五兩

石膏 八兩煅

右爲剉散 每服四錢水盞半煎七分入蜜半匙煎

兩沸熟服須利加芒消一錢匕

溫腎散 治腎虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱足腰不可

脬

以按語音混濁陽氣頓絕

熟乾地黃一斤

蕷蓉酒浸

麥門冬去心

牛膝酒浸

五味子

巴戟心炮各

耳草八兩炙各

茯神木去皮

乾姜五兩

杜仲去龜皮剉姜汁淹炒絲斷三兩

右爲末每服二錢溫酒調下空心且二三服

補脬湯治膀胱虛冷脚筋急腰痛引腰背不可屈伸

耳聾自曉曉坐欲倒小便數遺白面黑如炭

黃芪白茯苓各一兩半

杜仲去皮剉姜汁淹炒斷絲各三兩

磁石煅淬五味子各三兩

白朮白石英各三兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓空心溫

心主三焦經虛寢寒熱證治

清腫湯

治右腎實熱身熱脊腸相引痛足多小便黃赤如梔子藥汁每飲小便即革頭扁

榆白皮冬葵子各五兩

石葦四兩去毛

黃芩

通草瞿麥各三兩

右爲鹿末先以水二盞入車前葉數片煎至盞半

入藥末四錢再煎七分去滓熱服

潤焦湯

治三焦寢熱目充皆急痛腰脇熱脊背連腫中煩悶飲食未定頭面汗出閑格不通不吐不下

或氣逆不續走嘯不禁或泄瀉澀澁遺瀝

地骨皮

半夏

湯洗
次

柴胡

澤瀉

各五
兩

茯苓

麥門冬

去心

甘草

人參

各一
兩

右剉散

每服四錢水二盞姜五片竹茹大

如指
大

煎七

分去滓空心服

益志湯

治右腎虛寒小便數腰脂引痛短氣欬逆四肢

煩疼耳鳴面黑骨間熱夢遺白濁目眩諸虛困

乏

鹿茸

酸

灸

巴戟

去心

熟乾地黃

酒浸

枸杞子

蕤

酒

牛膝

酒

附子

炮去
皮脐

桂心

不焙

荳蔻

浸

牛膝

浸

附子

炮去
皮脐

桂心

不焙

山茱萸 白芍藥 防風

去叉
等分

山茱萸 白芍藥 防風

各各
等分

右剉散每服四大錢水盞半姜五片鹽少許煎七分去滓食前服

安中散

治三焦虛寒短氣不續腹不安食隨即洞下

小便赤濁精洩不禁脚脰酸疼小腹脹滿

熱地黃

巴戟天

去心

龍骨

各二
半

遠志

去心

茯苓

各三
兩

天雄

炮去
皮臍

五味子

山藥

各各
兩半

蕤

浸
酒

續斷

各四
兩

蛇床子

畧炒
兔絲子

酒浸各
四兩半

右爲細末每服二錢匕溫酒調下夫三焦屬精腑臟精以養真係累于心肺腎三經人多以醉飽心

藏

虛而合陰陽故此病作唯謹之爲得

三焦精府辨正

古人謂左腎爲腎藏其腑膀胱右腎爲命門其腑三焦三焦者有脂膜如手大正與膀胱相對有二白脉自中出來脊而上貫于腦所以經云丈夫藏精女子繫胞以理推之三焦當如上說有形可見爲是扁鵲乃云三焦有位无形其意以爲上中二焦如漚如霧下焦如瀆不可遍見故曰有位無形而王叔和輩失其肯意遺云无狀空有名號後輩承繆不已且名以召寔元寔奚召果其无形尚何以藏精繫胞爲哉其

所謂三焦者何也上焦在膻中內應心中焦在中脘內應脾下焦在脐下即腎間動氣介布人身有上中下之異方人湛寂慾想不起則精氣散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火熾然翕撮三焦精氣流溢並命門輸寫而去故號此府爲三焦耳學者不悟可爲長太息

痼冷積熱證治

夫以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方論中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也多因真氣既微胃氣不寔後啖生冷冰雪之屬致腸胃虛寒

陰既停，陽不能正。大便洞泄，小便頻，併鼻多清涕。
滙吐涎沫，水穀不化，洒洒淅淅，皆陽虛陰盛之所爲。
也積熱者，臟腑燥也。多因精血既衰，三焦煩壅，後歸
丹石酒炙之屬，致腸胃蘊毒。陽既熾盛，陰不能制，太
便秘澁，小便赤淋，口苦咽乾，涎稠眵淡，飲食元度，揮
揮熇熇，皆陰虛陽盛之所爲也。治各有方。

金液丹固真氣，暖丹田，堅筋骨，壯陽道，除久寒痼。
補勞傷，虛損治男子腰腎久冷心腹積聚，肠下冷
癖，腹中諸虫失精遺溺，形羸力弱，脚膝疼痛，冷風
頑痺，上氣血，血喫逆寒熱，霍亂轉筋，虛滑下利，又

治痔瘻，濕蟲生瘡，下血不止，及婦人血結寒熱，陰
蝕。

硫黃一十斤，先飛凍去砂石，秤研爲末，用蜜合盛。
以水和赤石脂，封口，塗泥，固濟，驅地內先
理。壹小罐子，盛水令滿，安合子在正用，泥固濟，訖
侵火養七日，七夜候足，加頓火一煅候，冷取出。
右研爲細末，每一兩用炊餅一兩，湯浸，搗去水，所
爲丸，如梧子大，每服三十丸，多至一百圓，溫米飲下。
空心服之，又治傷寒，陰證，身冷，脉微，手足厥逆，或
吐，或利，自汗不止，或小便不禁，不拘，圓數，併服得
身熱，脈出爲度。

震靈丹補虛壯氣，暖腎，祛邪，益精髓，溫脾胃，進飲食。

悅顏色治真氣虛憊膝腹冷痛肢軟酸疼腰背拘急腳膝緩弱面色痿黃目眩耳鳴心忪氣短大使自利小便頻數口乾煩渴飲食无味大治婦人崩中帶下參拾陸病小兒驚癲及一切痼冷風虛悉去之常服育神養氣輕身延年此藥制全陰陽功侔造化留心服餌百病不生真濟世衛生之寶也

丁頭代赭石 禹餘糧石

棟紅紫色
无金朱者

紫石英

赤石脂 各四兩

右各爲細末並入砂合內用赤石脂固口縫以炭一秤簇頂煅候火消及七分存三分火取出合子

令冷開却答先於地上掘一坑深尺餘用厚紙兩重襯定傾藥在上以新瓦盒子覆之四畔將黃土遍壅一宿取出再入乳香沒藥二兩五靈脂二兩都爲細末一處將前藥合和自毋研極細煮糯米糊和成丸數千十圓如雞頭大每服二圓或伍圓空心濃煎薑棗湯下忌六畜血

涼膈散治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頭頸煩結硬口舌生瘡瘍實不利涕唾稠粘睡卧譶妄及腸胃燥滯便潤秘結一切風壅

大黃蒸 朴消 甘草各三 山梔子仁 黃芩

薄荷各一 連翹四兩

右爲末每服二錢水一盞竹葉七片蜜少許同煎
七分去滓食後服

洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼
熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠
粘心神煩躁眼澁睛疼及大小便秘澁至

大黃蒸 耳草燜 當歸 茵藥 麻黃去節

荆芥穗各一兩 白朮半

右爲末每服一錢水一盞生薑薄荷各少許煎七

分去滓溫服小兒豆瘡欲發先在語多渴及發瘧風
積熱可服一錢臨卧服如大人五臟壅實欲要薄
轉加至四五錢乘熱服

五積證治

五積者五臟之所積皆臟氣不平遇時相逆而成其
病如夏傷肺肺之所勝傳肝遇長夏脾王傳剋不行
故成肝積名曰肥氣肥氣者以其積氣藏於肝木之
下猶肥道於山林也失志傷腎腎之所勝傳心遇秋
肺王傳剋不行故成心積名曰伏梁伏梁者以其積
氣橫架於肓原也怒則傷肝肝之所勝傳脾遇冬腎

王傳剋不行故成脾積名曰痞氣者以積氣痞塞中
脘也喜則傷心心以所勝傳肺遇春肝王傳剋不行
故成肺積名曰息責息責者以積氣喘息責溢也思
則傷脾脾以所勝傳腎遇夏心王傳剋不行故成腎
積名曰奔豚奔豚者猶水畜奔衝於心火也難經以
肥氣成於戊己伏梁成於庚辛以至奔豚成於丙十
者正合陰陽施化休王乘剋之大義也又論曰病有積
聚有鑿氣積者藏病也終始不移聚者府病也發无
定處展轉痛移爲可治鑿氣者即宿食也由鑿雖之
邪從口入更有息積病乃氣息癖滯於腸上非道引
邪

不行

肥氣圓治肝之積在左脇下如囊杯有頭足如龜鱉
狀久不愈姦欬逆嘔癰瘡連歲月不已其脉弦

而細

青皮炒二兩

當歸鬚

蒼朮各一兩半

蛇含石煅醋淬七分

蓬木切三棱

鐵孕粉各三兩

同入醋煮三

桂木一伏時

右爲末醋煮米糊丸

大

每服四十圓當歸浸

酒下

伏梁圓治心之積起於膻上上至心大如臂久久不
已病煩心身躬髀股皆腫環膚而痛其脉沉而芤

茯苓

厚朴

姜汁
製炒

人参

枳殼

麸炒
去穰

白朮

半夏

湯洗
七次

三稜

慢火煨熟
乘熱溫治

右等分爲末

煮糊丸梧子大

米飲下二十丸

食前

痞氣圓

治脾之積在胃管囊大如盤，久久不愈病四

肢不收黃疸飲食不進爲肌膚心痛徹背

背痛徹心

脈浮大而長

大烏頭

一分炮
去皮尖

附子

半兩炮
去皮臍

赤石脂

煅醋淬

川椒

汗炒出

乾薑

炮各半兩

桂心

半兩

右爲末

蜜丸梧子大朱砂爲衣每服五七丸米

湯下漸至十圓

息賁湯

治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈病

酒洒

寒熱氣逆喘咳發爲肺癰其脉浮而毛

半夏

湯七次

吳茱萸

湯洗

桂心

各二兩半

耳草

桑白皮

炙

葛歷

炒半兩

右爲剉散每服四錢水一盞半姜七片棗兩枚煎

七分去滓食前服

奔豚湯

治腎之積發於小腹上至心如豚奔走之狀

上下无時不久不已病喘逆骨痿少氣其脉沉而

滑

耳季根皮

李根皮

倍

乾葛

各一兩

當帰

川芎

白芍藥

耳草

炙

黃芩

各二兩

半夏

湯洗七次四兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓服

六聚證治

六府者大小腸胃膽膀胱三焦者也屬於三陽太陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣如都會之府主轉輸以爲常也六府失常則壅聚不通故實而不轉虛而輸隨氣往來痛无定處在上則格在下則脹傍攻兩脇如有坏塊易於轉變非五臟比

散聚湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時

心腹絞痛攻刺腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹膜脹大小便不利或後泄瀉淋澀無度遺精白濁狀

若虛勞

半夏

湯洗十次

檳榔

當帰

各三分

橘皮

杏仁

炒

去皮尖

桂心

各二兩

茯苓

耳草

炙

附子

炮去皮

川芎

枳殼

麸炒去穰

厚朴

姜汁製

吳茱萸

湯洗壹兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

大便不利加大黃

息積證治

病者肠下滿氣逆息難頻歲不愈名曰息積因氣留

滯癖於腸下不在臟腑榮衛之間積久而成氣不干
胃故不妨食食之則火熱內燦刺之則反動其經雖
服消化之藥不能獨治須積以導引助而行之

磨積圓

治腸胃因虛氣癖於肓膜之外流於季脇氣

逆息難忍日頻年醫所不治久則榮衛停凝一旦

敗濁潰爲癰膿多致不救

胡椒壹伯伍十粒 木香一分 全蝎十个去

右爲末粟米飲圓如棗豆大每服十五圓橘皮湯

下

化氣湯

治息積癖于腹脇之下偏脹彭滿不妨飲食

鐵藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈丈小
腸氣婦人脾血氣

縮砂仁

桂心

木香各一分

甘草炙

茴香炒

丁香皮

青皮炒

陳皮

生薑乾

蓬朮

泡各半兩

胡椒

沉香各一字

右爲末每服二錢姜蘇鹽湯調下婦人醋湯調服

導引法

以兩手母指壓無名指本節依舉按髀趺坐摺齒
三十六屏氣二十一息放氣三口再屏息無放如
是三作以氣通爲效遇子牛卯酉時則行然按摩

導引之法甚多，隨意行之，皆可不必拘此法。

五勞證治

五勞者，皆用意施爲過傷。五臟使，五脾不寧而爲病。故曰五勞。以其尽力，力謀慮則肝勞，曲違神機則心勞，意外致思則脾勞，預事而憂則肺勞，矜持志節則腎勞。是皆不量稟賦，臨事過差，遂傷五臟。以臟氣本有虛實，因其虛實而分寒熱。世醫例以傳戶胃蒸爲五勞者，非也。彼乃察疾各門類，不可不知。

猪膏湯 治肝勞實，熱閑格牢，澁閉塞不通，毛悴色失

猪膏

生薑汁

各二升

青蒿汁

天門冬汁

各一升

右以微火銀石器內熬成膏，每服一匙酒湯調下。不拘時候。

虎骨酒

治肝勞虛寒口苦，關節疼痛，筋癱，縮煩悶。

虎骨

立兩炙焦碎如豆大

丹參

兩

地骨皮

乾薑

芎窮

各一兩

熟地黃

一分

猪椒根

五加皮

枳實

麸炒去穰

白朮

各兩

右爲剉散，以鴉袋盛，淳酒四升浸四月初服二三合，漸加至一盞，日無服食前。

泄熱湯

治心勞實熱口舌生瘡，大便閉溢不通，心滿痛小腸熱。

通串 卷之六

三十一

澤瀉 桔子仁 黃芩 各三

桂心 十 通草 各二

石膏 八兩

大黃 蒸

耳草 炙 各一兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食後熟
盛者煎熟加芒消一錢煎不以時服

定心湯

治心勞虛寒驚悸恍惚多忘夢寐敬驚魔神志
不定

茯苓 四兩

桂心

耳草 炙

白芍藥 乾薑 炮

遠志 炒去心

人參 各二兩

右剉散每服四錢水盞半棗兩枚煎七分去滓食
前溫服

半夏湯 治脾胃實熱四膈不和五臟壅悶脹滿肩息
氣急不安

茯苓

白朮

杏仁

炒去皮尖各一兩半

橘皮

芍藥 各二兩

半夏 湯洗七次四兩

右剉散每服四錢水盞半生薑七片棗兩枚煎七
分去滓不以時服

茱萸膏 治脾勞虛寒氣脹咽滿食不下通噫宿食臭
吳茱萸 湯洗一分兩三分

白朮 五兩一分 猪膏 五兩宿姜汁 八兩

右擣茱萸白朮二味爲末內薑汁膏中煎成膠餽
每服一丁大匙食前溫酒調下

引氣湯治肺勞實熱氣喘鼻張面目苦脣

橘皮半

細辛去苗

白朮

桂心各三

紫蘇兩

麻黃去節

湯洗去滑各

杏仁皮尖

炒去

石膏八兩

半夏湯洗

右剉散每服四錢水兩盞姜七片竹葉五片煎七分去滓食後服

人參厚朴湯

治肺勞虛寒心股冷氣逆遊氣胃腸氣滿從留達背痛嘔逆飲食即吐虛乏不足

人參厚朴

姜製炒

耳草二兩

桂心四兩

半夏

湯洗

橘皮

麥門冬去心各三兩

右剉散每服四錢水兩盞姜七片去滓食前服腹痛加當帰

梔子湯

治腎勞實熱小腹脹滿小便赤黃未有餘瀝數而少蓋中痛陰囊生瘡

梔子仁

芍藥通草

石韋各三兩

渭石八兩

紫芩四兩

熟地黃

榆白皮各五兩

右剉散每服四錢水盞半淡竹葉七片同煎七分去滓不以時服

五加皮湯

治腎勞虛寒恐懼失志傷積損髓吸短氣遺泄自濁小便赤黃陰下濕痒腰脊如折顏色

枯悴

五加皮兩十 丹參八兩 石斛酒浸六兩 杜仲酒浸炒絲斷
附子炮去皮脂各五兩 牛膝酒浸 秦艽 川芎 防風
桂心 獨活兩各四 茯苓四兩 麥門冬去心六兩 地骨皮
各三兩 蒼朮仁一兩

右爲剉散每服四大錢水盞半姜五片大麻子一撮研破同煎七分去滓食前服

六極證治

臟猶庫藏主秘藏腑如會府主轉輸藏實則腑无不實腑虛則臟亦因而致虛故六極者由腑虛致臟虛

陰陽失度榮衛走本元以養筋脉皮肉骨髓故六物皆極極者窮絕之謂也與洪範六極同意

犀角地黃湯治筋實極熱而兩脇下痛不可轉動脚下痛不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急煩滿

生地黃

犀角銘各分

乾葛

玄參

梔子仁

升麻各三分

大黃一兩半兩

芍藥

一兩半

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服恩寒熱痛加麻黃頭疼加石膏煎半兩

烏麻酒治筋虛極好悲思四肢噦吸腳手拘攣伸動

縮急股內轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌卷即縮唇青面色蒼白不得飲食

烏麻十兩炒出
丹參署蕷
大棗鍾乳粉
麻黃去節
右爲剉散用清酒二斗半同浸五宿溫服三合日再服

地黃湯治脈實極氣裏血焦髮落好怒唇舌赤甚則

言語不快色不澤飲食不爲肌膚

麥門冬去心
各三
萎蕤四兩
白朮三兩

生地黃乾各五兩
人參
石膏八兩
遠志去心十兩

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服
防風圓治脉虛極則欬欬則心痛喉中介介如梗甚
則咽腫

防風 桂心 通草 茯苓 人參 遠志去心炒
耳草炙 白石英 麥門冬去心
右爲細末蜜丸如梧子大食前酒服一丸

石南散 治肉實極肌痺淫淫如鼠走津液脫腠理開汗大泄或不仁四肢急痛或後緩弱唇口壞皮膚變色

石南一兩 天雄炮去皮臍 山藥 桃仁製炒去皮尖
芍藥 茄菊花 耳草炙各一兩 升麻 萎蕤各二兩半
黃芪 辰砂別研各三分 石膏煅二兩 山茱萸一兩半
右爲細末每服二十太錢食前溫酒調下
大黃芪湯 治肉虛極躰重怠惰四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰引背及肩不可轉動

黃芪 桂心 巴戟去心 石斛酒浸 澤瀉 茯苓
乾薑炮各三兩 防風 獨活 人參各二兩 天雄炮去皮臍
芍藥 附子炮去皮脂 半夏湯洗七次 細辛去苗 白朮
黃芩 枸櫞根各二兩
右爲剉散每服四錢水一盞生姜七片煎七分去滓食前服

前胡湯 治氣實極喘息衝冒常欲自憇心腹滿痛內外有熱煩嘔不安甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾

前胡 桔梗 半夏湯洗七次去滑 麻黃去節 芍藥各二兩

黃芩 三兩 枳實 炒去殼一兩

右剉散，每服四錢水二盞，姜七片，棗一个，煎七分，去滓，不以時服。

鍾乳散 治氣虛極，皮毛焦津液不通，力乏腹脹甚，則喘急，氣短，息塞，晝夜甚。

鍾乳

散

別研

乾薑 炮

半

桔梗

茯苓

附子 炮去皮脂

細辛 去苗

各一兩

桂心

人參 各一分

白朮 一兩

防風

牡礪 煅

桔梗根 各二兩半

右爲末，每服二大錢溫酒調下，食前。

竹葉湯 治精實極，眼視不明，齒焦，髮落，形衰，通身虛

熟甚，則胷中痕痛煩悶，泄精。

生乾地黃 五兩

四兩

芍藥

四兩

黃芩

茯苓

澤瀉

耳草 炙去心，各三兩

麥門冬 去心，各三兩

右剉散，每服四錢水燉半盞，姜三片，淡竹葉十片，煎

七分，去滓，不以時服。

磁石圓 治精虛極，腰羸，驚悸，夢中遺泄，尿後遺瀝，小便白濁，甚則莖弱核微，小腹裏急

磁石 煅醋淬

龍齒 煅

蕤

荳蔻 浸酒

茯苓 各二兩

人參

麥門冬 去心，各一兩半

遠志 去心

續斷

赤石脂 煅醋淬

鹿茸 酥炙，各三兩

地黃 乾者，各三兩

韭子 炒

柏子仁

三國志

卷之六

七

丹參各一兩

右爲末，蜜丸梧子大，食前溫酒三十圓至五十圓。
三黃圓治滑，竇極熱耳鳴，面色焦枯，隱曲膀胱不通。

牙齒腦髓苦痛，手足酸疼，大小便閉。

黃芩

大兩冬用六
兩秋用二兩

大黃

二兩冬用四
兩夏用三兩

黃連

春用七
兩夏用

右三味搗和，蜜丸豆大，每服十圓至十五圓，米飲

下。

鹿角圓治骨虛極，面腫垢黑，脊痛不能久立，氣衰，髮落，齒槁，腰背相引痛甚，則喜唾，不口見五癰門。

七氣叙論

夫五臟六腑陰陽升降非氣不生，神靜則寧，情動則亂，故有喜怒憂思悲恐驚七者，不同各隨其本臟所生，而爲病，故喜傷心，其氣散，怒傷肝，其氣擊，憂傷肺，其氣聚，思傷脾，其氣結，悲傷心胞，其氣急，恐傷腎，其氣怯，驚傷膽，其氣亂，雖七診自殊，无踰於氣黃帝曰：余知百病生於氣也。但古論有寒熱憂恚而无思悲恐驚，似不倫類於理，未然然六府无說，唯膽有者，蓋是竒恒淨府，非轉輸例，故能蓄驚而爲病。

七氣證治

夫喜傷心者自汗不可疾行不可久立故經曰喜則氣散怒傷肝者上氣不可忍熱來盪心短氣急絕不得息故經曰怒則氣擊一作上憂傷肺者心系急上焦閉榮衛不通夜卧不安故經曰憂則氣聚思傷脾者氣留不行責聚在中脘不得飲食腹脹滿四肢怠惰故經曰思則氣結悲傷心胞者善忘不識人置物在鬼還取不得節憲四肢浮腫故經曰悲則氣急恐傷腎者上焦氣閉不行下焦回還不散猶豫不決嘔逆恶心故經曰恐則精却驚傷膽者神无所歸慮无所定說物不寬而迫故經曰驚則氣亂七者雖不同本末

乎工氣藏氣不行鬱而生淫隨氣積聚堅大如塊在心胸中或塞咽喉如粉絮吐不出嚥不下時去時來每發欲死狀如神靈所作延害飲食皆七氣所生所成治之各直方

七氣湯治藏腑神氣不守正位爲喜怒憂思悲恐驚忤鬱不行遂聚涎飲結積堅牢有如壞塊心腹絞痛不能飲食時發時止發則欲死

半夏湯洗去滑五兩

人參 桂心 耳草炙各一兩

右剉散每服四錢水煎半七片棗一枚煎七分去滓食前服

大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振

驚致藏氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上

塞咽喉有如炎喬吐嚥不下皆七氣所生

半夏湯洗七次五兩

白茯苓四兩

厚朴姜製炒三兩

紫蘇二兩

右剉散每服四錢水盞半姜七片煎七分去滓食

前服

五噎證治

夫五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎雖五種不同皆以氣爲主所謂氣噎者心悸上下不通噫噯不徹胃背痛憂噎者遇天陰寒手足厥冷不能自溫勞噎

者氣上鬲腸下支滿胸中填塞攻背疼痛思噎者心怔慄喜忘目視眴眴食噎者食无多少胷中苦寒疼痛不得喘息皆由喜怒不常憂思過度恐懼无時鬱而生涎涎與氣搏外而不降逆害飲食與五臟同但此在咽喉故名五噎

五噎散治五種噎食飲不下胷背痛嘔噦不徹攻刺疼痛淚與涎俱出

人参 茯苓 厚朴去龐皮剉去龐皮剉

枳殼麸炒

桂心 耳草去梗

訶子炮去核

白朮

橘皮

白薑炮

三稜炮

神曲炒

麥蘖炒各二兩

木香炮

檳榔 蓬木

炮各半兩

右爲末每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚煎七分空心溫服塗湯點亦得

沉香散

治五噎五膈胃中久塞諸氣結聚嘔逆噎塞食餕不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食

白朮 茯苓

各半兩

木通 當歸 橘皮 青皮

大腹子

大腹皮

檳榔

芍藥

各一兩

甘草

一兩半

白芷

三兩

紫蘇葉

四兩

枳殼

炒去穰取三兩

右爲末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分

空腹溫服

嘉禾散

治中滿下虛五噎五膈脾胃不和曾膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不思飲食如中焦虛痞不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因病氣衰不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之

枇杷葉

去毛姜汁塗炙

薏苡仁

微炒

縮砂仁

人参

茯苓

各一兩

石斛

細刻用酒拌和微炒

大腹子

炒

沉香

木香

藿香

杜仲

去皮金炙炒焦

佐風子

如意元陳曉系公訂子代各三分

穀蘖

微炒

白荳蔻

微炒

五味子

炒微

桑白皮

丁香

檳榔

青皮

各半兩

半夏餅

炙

神曲

各一分

耳草

炎半兩

陳皮

三分

白朮

炒二兩

右爲末每服二錢水一盞生姜三片棗三枚煎至
七分溫服不計時五噎入乾柿一枚同煎拾服見
效膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎

塗津圓治五噎小痞

獨頭蒜

不拘多少每个開七竅入去皮江子七粒溫赤裏煨研爲膏非大蒜也

丁香

橘紅

木香

草撥

胡椒

右等分爲末用蒜膏爲丸如梧子大先嚼塗少許
令生津液乾嚥二粒漸加至三五圓臨卧服

廣五行記永徽中有僧維則病噎不能食語弟子曰

吾死之後便可開吾曾喉視有何物言絕而卒弟子

果開視曾中得一物形似魚而有兩頭遍身皆肉鱗
弟子置器中跳躍不正戲以諸味皆隨化尽時夏中
藍盛作漬有一僧以漬置器中此虫遂逃器中走須
臾化爲水此乃生痰非五噎比後人因以藍治噎誤
矣

五膈證治

病有五膈者曾中氣結津液不通飲食不下羸瘦短
氣名憂膈中脘實滿噫則醋心飲食不消大便不利
名曰思膈曾膈逆滿嘔塞不通嘔則筋急思聞食臭
名曰怒膈五心煩熱口舌生瘡四肢倦重身常發熱

胃痺引背不能多食名曰喜膈心腹脹滿欬嗽氣逆
腋下若冷雷鳴遠脅痛不能食名曰恐膈此皆五情
失度動氣傷神致陰陽不和結于胃膈之間病在膻
中之下故名五膈若在咽嗌即名五噎治之五病同
法

五萬圓治憂恚思慮膈塞不通及食啖物即發其病
若心病不得氣息引背痛妙刺心下堅大如粉絮
緊痛欲吐吐即差食飲不下甚者手足冷短氣或
上氣喘急嘔逆主之

麥門冬

去心

耳草

炙各五兩

人參

四兩

川椒

炒出

遠志

去心炒一兩

細辛

去苗

桂心

各三兩

乾薑

炮二兩

附子

炮一兩

右爲末蜜圓彈子大含化日三夜二會中當熟七
日愈亦可凡如梧子大米湯下二三十圓延年方
夏加麥門冬耳草人參各一兩經心錄以吳茱萸
代桂治遇寒季則心痛咽中有物吐不出嚥不入
食飲減少並可服之不拘時候

寬萬圓治氣不升降胃膈結痞

木香

京三棱

炮

青皮

各半兩

半夏

洗十次三兩湯

大腹子一分

右爲細末姜汁糊爲丸梧子大食後水湯下二二二

十圓

嘉禾散

沉香散並治五萬

方見前五噎門

三因極一病證方論卷之八

終

