



皇齊編

内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 (163)
函號	300 212





大學東
校典藉
局之印



大德重校聖濟總錄卷第一百六十五
產後門

產後下痢

產後腫滿

產後小便不通

產後大便不通



產後下痢
 論曰冷熱不調則水穀之精不化不化則腸胃虛弱冷
 熱之氣乘虛入客故為痢也婦人產後血氣不足腸胃
 俱虛冷熱之氣易為傷動故冷則色白熱則色赤二者
 兼之則赤白俱下
 治產後赤白痢臍腹撮痛當歸湯方
 當歸切 犀角屑 黃芩去黑心
 黃連去須 各壹兩
 右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫
 服不拘時



產後下痢 論曰冷熱不調則水穀之精不化不化則腸胃虛弱冷

熱之氣乘虛入客故為痢也婦人產後血氣不足腸胃

俱虛冷熱之氣易為傷動故冷則色白熱則色赤二者

兼之則赤白俱下

治產後赤白痢臍腹撮痛當歸湯方

當歸切 犀角屑 黃芩去黑心

黃連去須 各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時

治產後冷熱痢腹痛駐車丸方

乾薑貳兩 微炮

黃連去須 陸兩

阿膠炒別 為末

當歸剉各 參兩

右四味除膠外搗羅為末用多年陳醋消膠令鎔和為丸併手丸如梧桐子大每服三十丸以陳米飲下兼日再服甚者加丸數

治產後赤白痢久不止臍腹疔痛地榆飲方

地榆剉焙 乾

酸石榴皮各壹兩 黃連去須 參兩

當歸剉炒 貳兩

右四味搗為麤散每服三錢匕水一盞煎至七分去

洋食前溫服

治產後脾胃虛冷水穀不化脹滿或時寒極及下痢溫

脾丸方

乾薑炮

人參

桔梗炒

甘草炙剉各 參兩

法麴伍合 炒

桂去麤皮 伍兩

附子炮裂去 皮臍

細辛去苗葉 各貳兩

枳實參枚去 剉炙

吳茱萸湯洗焙 乾炒 伍兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九溫酒下加至三十九日三

治產後下痢赤白腹痛煩熱當歸湯方

當歸剉

厚朴去麤皮生薑汁炙令香

黃連去須各壹兩半

肉豆蔻去殼伍枚炮 甘草炙剉壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前

治產後下痢赤白心煩腹痛芍藥飲方

芍藥剉

甘草炙剉

阿膠炙令燥

艾葉炙

當歸剉炒各壹兩

生乾地黄兩剉

右六味搗為麤散每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時

治產後冷熱痢久下不止烏梅丸方

烏梅參百枚

當歸剉肆兩

乾薑微炮拾兩

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍各陸兩 黃連去須拾陸兩

蜀椒去目并閉口者炒出汗肆兩

細辛去苗葉

人參

黃蘗各陸兩剉

右二十味除烏梅外各搗羅為末再合和勻以苦酒

漬烏梅一宿去核蒸之搗如泥盤中與藥按令相得

鍊蜜和杵二千下丸如梧桐子大每服十九丸食前米

飲下加至二十九日三

治產後赤白痢日久不止腸痛阿膠丸方

阿膠炒令燥

黃連去須

赤茯苓去黑皮

當歸炒

黃蘗各壹兩

乾薑參分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下食前日再

治產後赤白痢腸腹疔痛烏梅黃連丸方

烏梅去核炒

黃連去須

當歸炒

阿膠炒令燥各壹兩

蠟壹兩

右五味除蠟外搗羅為末鍊蠟乘熱和丸梧桐子大每服三十丸米飲下日三服

治產後赤白痢腸鳴腹痛黃連丸方

黃連去須

當歸炒

胡粉

阿膠

炒令燥各壹兩半

無食子貳枚

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下

治產後赤白痢日久臍腹冷疼茱萸丸方

吳茱萸

壹兩黑豆汁浸炒乾

黃連

去須壹兩半

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎芍藥湯下空心食前服

治產後赤白痢膿血相兼疔痛黃耆湯方

黃耆剉壹兩

赤石脂壹兩半

阿膠炒令燥

黃連去須各壹兩

黃蘗參分

白朮

壹兩剉炒

龍骨壹兩半
火燒紅

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日二夜一

治產後赤白痢臍腹痛當歸芍藥湯方

當歸剉炒

芍藥

地榆

龍骨火燒
紅

黃連去須各
壹兩

艾葉炙

甘草炙

黃芩去黑
心

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑
汁炙各參分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓

溫服食前日二

治產後下痢赤白日久羸瘦黃連湯方

黃連去須

甘草炙

熟艾炙

芍藥

乾薑炮

當歸剉炒

人參各壹
兩

右七味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前日三

治產後血痢結澀疔痛當歸丸方

當歸剉炒

白朮

甘草炙剉各
壹兩半

桂皮去麤
皮

人參各參
分

桑根白皮剉

乾薑炮

細辛去垢葉
各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下空心食前日三服

治產後痢赤如血煩熱渴躁腹疼阿膠散方

阿膠炒令燥 黃連去須 黃蘗

芍藥日三 地榆剉 甘草炙

虎杖酒浸剉 艾葉各壹兩半

右八味搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前日再服

治產後血痢腹痛不止訶梨勒散方

訶梨勒炮去核 阿膠炒令燥 黃蘗

地榆 甘草炙

右五味等分搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前

日三

治產後血痢不止牛角鰓散方

黃牛角鰓貳兩半燒灰 橡實壹兩炒

側柏葉半兩剉焙

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲調下空心食前

服

治產後腸胃氣虛泄痢水穀燥濕丸方

黃連去須參分 烏梅肉熱貳分半 酸石榴皮

當歸剉焙

赤石脂各半兩

乾薑炮壹分半

右六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大空腹米飲下二十九丸加至三十丸

治產後下痢赤白當歸湯方

當歸切焙

醋石榴皮炒

地榆各參兩

大豆黃炒伍合

糯米炒貳合

甘草炙剉半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入薤白二寸切同煎至八分去滓空心食前溫服

治產後下痢赤白久不差甘草散方

甘草半生半炙

黃連去須炒各貳兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫漿水調食前服

治產後痢不止木香散方

木香參分

訶梨勒皮酥炒令黃壹兩半

右二味搗羅為散研勻每服二錢匕米飲調下

治產後冷痢疾桂薑散方

桂去麤皮以薑汁半合塗炙令薑汁盡

阿膠炙令燥

當歸切焙各半兩

右三味搗羅為細散空心以陳米飲調下二錢匕日再服

治產後痢疾春蕨散方

右取新生蕨菜不限多少陰乾為細散每日空心陳米飲調下三錢匕

治產後冷痢疾乳薑散方

右以乾薑二兩炮擣羅為細末以人乳汁和作餅以慢火炙令黃熟研為細散每服空心陳米飲調下三

錢匕

治產後下痢久不止芸薑食方

芸薑不拘多少淨洗

右一味爛煮飽食佳

治產後血痢不止檮皮丸方

臭檮根皮剉炒

右一味擣羅為末水和丸如棗核大以麩裹捏作小餽飽二七枚煮熟空腹吞之日再

治產後冷痢不止黃連散方

黃連去須炒

乾薑炮

訶梨勒麩裏煨去核

地榆炙剉各壹兩

甘草炙剉半兩

烏梅肉炒參分

右六味搗羅為散每服二錢匕陳米飲調下食前服

治產後氣痢不止腹痛木香散方

木香剉分

訶梨勒半生半煨並去核壹兩壹分

當歸切

白朮

肉豆蔻去殼各半兩

右五味擣羅為散每服二錢匕陳米飲調下

治產後水瀉不止厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙 白茯苓去黑皮 黃連去須各半兩

當歸剉焙壹分 枳殼去瓢麤炒壹分半

右五味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓空腹溫服

治產後下痢赤白兼下血赤石脂湯方

赤石脂剉 黃連須去 地榆各參分

甘草炙壹分半 厚朴去麤皮生薑汁炙到貳分半

乾薑炮裂壹分半 當歸切焙半兩

右七味麤擣篩每服三錢匕水一盞入薤白三寸切

同煎七分去滓食前溫服

治產後下痢赤白久不止身面虛腫大豆飲方

大豆炒壹升 小麥半升 蒲黃兩

吳茱萸炒壹兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治產後心腹脹滿飲食不消時作水痢白朮湯方

白朮 厚朴去麤皮生薑汁炙 草豆蔻去皮

枳殼去瓢麤炒 白茯苓去黑皮 木香

人參各半兩

右七味細剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

三片同煎至八分去滓溫服日二

治產後冷痢臍下痛羸瘦不能食白朮散方

白朮

芍藥炒各分

木香半生炒

縮沙人

黃連去須炒各半兩

陳麴炒壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕煎乾薑米飲調下

治產後赤白痢臍下疔痛當歸飲方

當歸煨切

赤芍藥

艾葉炒

地榆

白龍骨

黃耆剉各壹兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙

黃芩去黑心

乾薑炮

甘草炙各分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓不拘時溫服

治產後赤白痢黃連丸方

黃連

去須炒壹兩

阿膠炙燥

當歸煨切

乾薑

炮各分

赤茯苓

去黑皮半兩

甘草炙剉壹分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心米飲下

治產後冷痢臍下痛不能食白豆蔻散方

白豆蔻

白朮

甘草

肉豆蔻人

芍藥

白茯苓

桂皮去麤

陳橘皮

去白焙各半兩枳殼去瓢炒壹分

右九味搗羅為散每服二錢匕空腹米飲調下

治產後血痢不止臍腹疔痛地榆湯方

地榆

芍藥各參分

木香

當歸焙切

甘草炙

阿膠

乾薑炮裂壹分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治產後赤白痢芍藥丸方

芍藥炒

艾葉各壹兩

地榆炒

當歸切

白朮各參分

龍骨碎

乾薑炮各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治產後痢疾紫桂丸方

桂皮去麤

甘遂

丁香

芫花醋炒焦

木香

巴豆去心皮

硃砂各等分

右七味搗羅為細末醋麩糊為丸小菘豆大每服二丸至三丸溫水下加減更量虛實此丸取積最勝不以久近皆能化逐產後逐積滯尤妙

產後腫滿

論曰產後氣血俱虛寒濕客搏致脾胃怯弱不能播散諸氣使水血不分流溢肌膚故為腫滿利其小水則病可愈

治產後通身腫滿氣喘煩悶防已湯方

防已

枳殼去瓤炒

桑根白皮剉

芎藭

萎蕤

當歸切焙各壹兩

葶藶

隔紙炒壹分

木香兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘破煎至七分去滓溫服以踈利腫消為度

治產後腫滿因宿有抑鬱滯氣留結不散變為浮腫煩悶欬逆惡血不行大腹皮湯方

大腹皮

赤茯苓皮去黑

當歸切焙

紫蘇莖葉

青橘皮湯浸去白炒

甘草剉炙

木通剉各壹兩

桑根白皮剉

木香

檳榔剉

大黃剉炒各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

治產後浮腫煩悶羌活湯方

羌活去蘆頭

青橘皮去白麩炒各半兩

枳殼去瓤麩炒

芎藭

生乾地黄焙

白木剉

桑根白皮各壹兩

木香

牽牛子炒

訶梨勒皮微炒

赤茯苓去黑皮各半兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治產後腫滿喘欬防已枳殼湯方

防已壹兩

枳殼去瓤麩炒貳兩

桑根白皮剉

當歸切焙各壹兩

木香半兩

紫蘇莖剉

檳榔剉各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候

治產後腫滿喘急欬嗽貝母湯方

貝母去心

桑根白皮剉

紫苑

赤茯苓去黑皮

五味子各壹兩

杏人去皮尖雙別研

人參各壹兩半

葶藶隔紙炒半兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後遍身腫滿牽牛子丸方

牽牛子半生半熟

枳殼去瓢炒

當歸切焙

生乾地黃焙

芎藭

桑根白皮剉

木香炮

防已

訶梨勒炮去核各半兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

煎桑根白皮湯下不拘時

治產後腫滿心煩氣悶腸胃不利羚羊角湯方

羚羊角屑

延胡索

枳殼去瓢炒

芍藥

劉寄奴

獼榔剉

桑根白皮剉等分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治產後腫滿煩悶喘欬枳殼丸方

枳殼去瓢炒

防已各貳兩

訶梨勒皮半兩

大黃炒壹兩

當歸切焙貳兩

郁李人去皮別研半兩

桑根白皮剉壹兩

右七味除研外搗羅為末拌勻鍊蜜丸如梧桐子大

每服二十九生薑紫蘇湯下不拘時

治產後通身暴腫煩悶不食商陸湯方

商陸根兩到貳 防風壹去又 甘草兩炙半

附子炮裂壹枚 赤小豆貳合 麻子人合參

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎取一盞去滓溫服不拘時

治產後偏身頭面浮腫乾地黃湯方

生乾地黃焙 白朮 芍藥

赤茯苓去黑皮各壹兩 桑根白皮到貳兩 甘草到半兩

赤小豆伍合 黃耆到 商陸根到各貳兩

右九味並生用麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治產後頭面四肢腫滿氣喘欬嗽貝母丸方

貝母去心 赤茯苓去黑皮各貳兩 紫苑

桑根白皮到 五味子 杏人去皮尖雙人炒別研膏

人參各壹兩 大棗壹拾枚煮熟去皮核別研膏

右八味除研二味外擣羅為末以杏人棗膏拌如乾更入鍊蜜少許丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸濃煎商陸根湯下不拘時

治產後頭面浮腫兩脇痛枳殼丸方

枳殼去瓤壹兩壹分 訶梨勒煨去核 當歸切

大黃到炒 防已 芍藥微炒各參分

郁李人酒浸去皮壹兩木香

芎藭

甘草炙剉各半兩

牽牛子壹兩炒搗取半兩用

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二

十九煎桑白皮棗湯下加至三十九

治產後腫滿不能食防已湯方

防已兩貳

防風去

芎藭

附子炮裂去皮臍

甘草炙剉

當歸切焙

陳橘皮去白焙

赤小豆揀貳各壹兩合

右八味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑三

片同煎至六分去滓食前溫服

治產後血風通身浮腫柘黃湯方

柘黃

枳殼去麩炒

白朮

地丁各壹兩半

黃耆剉

人參

欬冬花

桔梗炒各貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時

產後小便不通

論曰產後氣血俱弱津液虛少將溫過度熱入膀胱氣
脉内燥壅塞不通始則淋瀝甚則不通令人少腹繞臍
脹痛氣滿於内亦令胞轉治法使氣得通則愈

治產後小便不通澤瀉散方

澤瀉剉 井泉石半兩 車前子洗焙

赤茯苓去黑皮 當歸切炒各壹兩半 葶藶子紙上炒

甘遂生各半兩

右七味搗羅為散每服一錢匕蜜湯溫調下食前日

再服

治產後小便不通煩悶滑石湯方

滑石 當歸切 木通剉各壹兩

冬葵子炒 黃芩去黑心 麥門冬去心焙各參分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服空心食前服

治產後小便不通木通湯方

木通細 黃芩去黑心 石韋去毛各壹兩

榆白皮細切 冬葵子炒各貳兩 甘草炙參分

白朮壹兩半剉

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前日二

治產後小便不通葵根湯方

葵根貳兩洗剉 亂髮灰兩半 大黃

桂皮去麤皮 滑石 木通剉

當歸剉炒各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服食前日再

治產後小便不通髮灰湯方

亂髮燒灰

車前子

大黃剉炒

桂去麤皮

當歸剉炒

滑石各壹兩

冬瓜子伍合

木通剉壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日二夜一

治產後小便不通黃芩湯方

黃芩去黑心

瞿麥取穗

當歸剉炒

冬葵子炒

木通剉各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服日三

治產後小便不通車前子湯方

車前子洗焙

瞿麥取穗

當歸剉炒各壹兩

黃芩去黑心洗

鬱金各半兩剉

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服不拘時日二

治產後小便不通葵子湯方

葵子炒石膏生

貝齒肆阿膠炒令燥

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治產後小便秘澁小腹疼痛當歸湯方

當歸切焙白芷剉微紫葛

芎藭各半白茅根 胡荽各參

右六味細剉每服五錢匕水一盞半入葱白五寸同

煎至八分去滓溫服食後夜臥

治產後小便秘澁小腹疼痛榆白皮散方

榆白皮剉木通剉黃芩去黑

葵子炒各芎藭 芍藥炒

滑石搗蒲黃各參

右八味搗研為散每服二錢匕濃煎木通湯調下

產後大便不通

論曰大腸者傳道之官變化出焉產後津液減耗胃中
枯燥潤養不足糟粕壅滯故大便難而或致不通凡新
產之人喜病此者由去血多內亡津液故也
治產後大便秘澁不通臍腹堅痛十聖丸方

檳榔剉 木香 芎藭

羌活頭去蘆

桂去麤皮 各壹兩

大黃剉 蒸

郁李人去皮尖別 研如膏

當歸切 焙

熟乾地黄焙

人參各貳 兩

右一十味除郁李人外擣羅爲末入郁李人和勻鍊

蜜爲丸梧桐子大每服二十九丸米飲下不拘時以利

爲度

治產後大便不通三脘湯方

大腹皮剉

紫蘇莖葉

羌活去蘆 頭

甘草炙

木瓜切 焙

芎藭

陳橘皮去白 切炒

檳榔剉

沉香

白朮

木香各壹 兩

右一十一味麤擣篩每服二錢匕水一盞煎七分去

滓溫服不拘時

治產後大便秘澀不通訶梨勒丸方

訶梨勒煨去 核

大黃剉 炒

當歸切 焙

熟乾地黄焙

大麻人別研 如膏

人參各壹 兩半

右六味擣羅五味爲末與大麻人同研令勻鍊蜜和
丸如梧桐子大每服三十丸米飲下不拘時服

治產後大腸虛結秘澀不通厚朴丸方

厚朴去麤皮生 薑汁炙透

陳橘皮去白 焙

大黃剉 郁李人去皮別研如膏各壹兩

右六味搗羅五味爲末入郁李人膏同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫水下不拘時

治產後大便不通人參丸方

人參 檳榔剉各壹兩半 當歸切焙壹兩

厚朴去麤皮生薑汁炙透參分 郁李人去雙人皮尖研如膏

兩半

右五味搗羅四味爲末入郁李人膏同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫水下加至三十九

不拘時

治產後大便秘澀不通大黃丸方

大黃剉 赤芍藥 當歸切焙

厚朴去麤皮生薑汁炙透各壹兩 枳實去蘗炒

大麻人別研如膏 生乾地黄焙各參分

右七味搗羅六味爲末與麻人膏同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下不拘時服

治產後大便秘澀不通調胃散方

大黃剉 當歸切焙 麥門冬去心焙

桃人去雙人皮尖燻炒 生乾地黄焙 菖蒲剉

鼈甲醋炙去裙襖 芫胡去苗各壹兩 厚朴去麤皮生薑汁炙透

秦艽去苗 黃連去須各參分 桂去麤皮半兩

吳茱萸湯洗去涎焙乾炒半兩

右一十三味搗羅為散每服二錢匕溫水調下空心

食前服

治產後風熱大便秘澀大黃丸方

大黃剉 大麻人膏研如膏 當歸切焙各參兩

生乾地黄焙等兩

右四味搗羅三味為末與麻人膏研令勻鍊蜜和丸

如梧桐子大每服二十九丸米飲下以利為度

治產後腸胃燥熱大便秘澀郁李人飲方

郁李人去雙人皮尖研如膏 朴消研各壹兩

當歸切焙 生乾地黄焙各貳兩

右四味將二味麤搗篩與別研者二味和勻每服三

錢匕水一盞煎至七分去滓溫服未通更服

治產後大便秘澀升麻湯方

升麻 大黃剉各壹兩 當歸切焙貳兩

生乾地黄焙參兩 前胡去蘆頭貳兩半 山梔子人微炒貳兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治產後熱燥大便秘澀升麻湯方

升麻

枳實去瓢 麩炒

黃芩去黑心 各參分

大黃剉

梔子人

杏仁去雙皮 尖麩炒

當歸切

人參

甘草炙

生乾地黄焙各 壹兩

右一十味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去

滓食前服

治產後大便不通皂莢內藥方

豬牙皂莢生

杏仁湯退去 皮尖生

蛇蛻皮微

乾薑炮各 壹分

蜜兩半

右五味先搗前四味細羅為末於銚子內熬蜜三兩沸後下藥末不住手攪候可丸即丸如棗核大每一丸用綿子裹藥以麻油潤藥上內下部中仰臥便通未通再內

治產後熱毒氣結燥大便不通壅滯氣悶疼痛腰重脇脹大腹皮湯方

大腹皮伍枚 細剉

枳殼去瓢 麩炒

赤芍藥剉各 壹兩

秦艽去苗 土

羌活去蘆頭 各半兩

天門冬去心 焙 乾參分

生乾地黄焙壹 兩

甘草炙參 分

郁李人去皮 兩炒半

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服得利爲度

治產後大腸結燥秘澁氣壅脹悶欲死宜蜜煎導方

蜜半

右一味銚內微火煎之攪令稠如餈取出搓如手指

大小約長二寸內下部中須臾即通未通再內不妨

治產後大便不通大腸結燥腹中壅脹內藥方

皂莢不艸者壹槌去皮

白蜜壹合

鹽豉半合研細

右三味先熬蜜令消次下鹽豉皂莢末慢火煎不住手攪候如餈即止丸如棗核大內一丸入下部中未

通可內三五丸不妨藥在內自化如得通利即隨出

治產後下部閉塞大便秘結不通以烏梅導方

烏梅拾肆枚

右一味溫湯浸取肉擣丸如小檳榔大每用一枚內

下部中立通

治產後大腸熱燥糟粕結鞭藥勢不入大便不通宜以

皂莢導方

皂莢肥不艸者去皮子壹槌

右一味搗羅爲末鍊蜜和丸如棗大取一丸內下部

中須臾即通

治產後大便不通七八日以上者溫中丸方

硫黃用柳木細研飛過生用

右一味用水浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十九

或三十九丸用木香少許煎湯吞下即効

治大便不通不問老幼皆可喫中和散方

附子壹兩一半生炒 大黃壹兩一半生炒

右二味同碾為散每服二錢匕溫米飲調下臨臥服

大德重校聖濟總錄卷第一百六十五

