

東京山全書


德集 卷五十一

十八

漢書門		一 二 六 五	五 〇	類
二 四	一 五	函	架	冊

內閣文庫		三 〇	二 三 六 五	漢書
函	架	冊	號	類

內閣文庫		番號	漢 12650
冊數	24	(18)	
函號	301	29	



醫學部藏書

醫學部
典籍方

景岳全書新方八陣目錄

德集

卷之五十

新方引

八畧

一補畧

和畧

三攻畧

四散畧

五寒畧

六熱畧

七固畧

八因畧

卷之五十一

補陣

大補元煎

左歸飲

目錄

補陣

景岳全書

右歸飲 三

左歸丸 四

右歸丸 五

五福飲 六

七福飲 七

一陰煎 八

加味一陰煎 九

二陰煎 十

三陰煎 十一

四陰煎 十二

五陰煎 十三

大營煎 十四

小營煎 十五

補陰益氣煎 十六

舉元煎 十七

兩儀膏 十八

貞元飲 十九

當歸地黃飲 二十

濟川煎 二一

地黃醴 二二

歸腎丸 二三

贊化血餘丹 二四

養元粉 二五

玄武豆 二六

蟠桃果 二七

王母桃 二八

休癩飲 二九

和陣

金水六君煎 一

六安煎 二

和胃二陳煎 三

苓朮二陳煎 四

全書卷五十一

和胃飲 五

排氣飲 六

大和中飲 七

小和中飲 八

大分清飲 九

小分清飲 十

解肝煎 十一

二朮煎 十二

廓清飲 十三

掃虫煎 十四

十香丸 十五

芍藥枳朮丸 十六

蒼朮丸 十七

貝母丸 十八

括痰丸 十九

神香散 二十

攻陣

吐法 一

赤金豆 二

太平丸 三

敦阜丸 四

蠟虫丸 五

百順丸 六

散陣

一柴胡飲 一

二柴胡飲 二

三柴胡飲 三

四柴胡飲 四

全書卷五十一 新方 目錄

三

五柴胡飲 五

正柴胡飲 六

麻桂飲 七

大溫中飲 八

柴陳煎 九

柴芩煎 十

柴芩飲 十一

柴胡白虎煎 十二

歸葛飲 十三

柴葛煎 十四

秘傳走馬通聖散 十五

秘傳白犀丹 十六

歸柴飲 十七

寒陣

保陰煎 一

加減一陰煎 一

抽薪飲 二

徙薪飲 四

大分清飲 五

清流飲 六

化陰煎 七

茵陳飲 八

清膈煎 九

化肝煎 十

安胃飲 十一

玉女煎 十二

太清飲 十三

綠豆飲 十四

玉泉散 十五

雪梨漿 十六

滋陰八味丸 十七

約陰丸 十八

服蠻煎 十九

約營煎 二十

熱陣

四味回陽飲 一

六味回陽飲 二

理陰煎 三

養中煎 四

溫胃飲 五

五君子煎 六

六味異功煎 七

參薑飲 八

胃關煎 九

佐關煎 十

抑扶煎 十一

四維散 十二

鎮陰煎 十三

歸氣飲 十四

煖肝煎 十五

壽脾煎 十六

三氣飲 十七

五德丸 十八

七德丸 十九

復陽丹 二十

黃芽丸 二十一

一炁丹 二十三

九炁丹 二十三

溫臟丸 二十四

聖術煎 二十五

固陣

秘元煎 一

固陰煎 二

兔絲煎 三

惜紅煎 四

苓朮兔絲丸 五

固真丸 六

粘米固腸糕 七

玉關丸 八

鞏隄丸 九

敦阜糕 十

因陣

逍遙飲 一

決津煎 二

五物煎 三

調經飲 四

通瘀煎 五

胎元飲 六

固胎煎 七

涼胎飲 八

滑胎煎 九

殿胞煎 十

脫花煎 十一

九密煎 十二

清化飲 十三

毓麟珠 十四

贊育丹 又十四

柴歸飲 十五

疎邪飲 十六

涼血養營煎 十七

柴葛煎 十八

搜毒煎 十九

六物煎 二十

六氣煎 二十一

九味異功煎 二二二

透邪煎 二二三

牛膝煎 二二四

何人飲 二二五

追瘡飲 又二二五

木賊煎 二二六

牙皂散 二二七

荔香散 二二八

豕膏 二二九

菴傷寒結胸法 三二〇

連翹金貝煎 三二一

連翹歸尾煎 三二二

桔梗杏仁煎 三二三

當歸蒺藜煎 三二四

芍藥蒺藜煎 三二五

降癰散 三二六

百草煎 三二七

螻蛄散 三二八

腸癰秘方 三二九

槐花蕊 四一〇

飛丹散 四一一

綿花瘡點藥 四一一

鷄子黃連膏 四三三

金露散 四三四

二辛煎 四三五

冰玉散 四三六

冰白散 四三七

代匙散 四三八

三香散 四三九

固齒將軍散 四三九

薰疥方 四四〇

杖丹膏 四四一

銀硃烟 四四二

雷火鍼 四四二

疥瘡光 四四三

鷺掌瘋四方 四四三

秘傳水銀膏 五七 附二十 廉瘡隔紙膏 五八

收瘡散 五九

四味敗毒散

景岳全書新方八陣卷之五十

德集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 曾 超 謙庵訂

新方八畧引

藥不執方合宜而用此方之不必有也方以立法法以制宜此
方之不可無也夫方之善者得其宜也得其宜者可為法也方
之不善者失其宜也失其宜者可為鑑也第法有善不善人有
知不知必善於知方者斯可以執方亦可以不執方能執方能
不執方者非隨時之人不能也此方之所不可廢者正欲以啟

發其人耳余因選古方之得宜者共若干首列爲八陣已不爲不多矣第以余觀之若似猶有未盡因復制新方八陣此其中有心得焉有經驗焉有補古之未備焉凡各方之下多附加減等法及分兩之數俱有出入不一者正以見方之不可執也八陣之中如攻方寒方之不多及者以古法旣多不必更爲添足也大都方宜從簡而余復冗之不尤鄙乎正意在冗中求簡耳此制方之意也然用方之意則猶有說焉夫意貴圓通用嫌執滯則其要也若但圓無主則雜亂生而無不可矣不知疑似間自有一定不易之道此圓通中不可無執持也若執一不反則

偏拘生而動相左矣不知倏忽間每多三因難測之變此執持中不可無圓活也圓活宜從三思執持須有定見旣能執持又能圓活其能方能圓之人乎而人其爲誰哉

一補畧

一補方之制補其虛也凡氣虛者宜補其上人參黃芪之屬是也精虛者宜補其下熟地枸杞之屬是也陽虛者宜補而兼煖桂附乾薑之屬是也陰虛者宜補而兼清門冬芍藥生地之屬是也此固陰陽之治辨也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又有陽失陰而

離者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以
甦垂寂之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰
中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰
則陰得陽升而泉源不竭余故曰以精氣分陰陽則陰陽不
可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽邪正之離合
也故凡陽虛多寒者宜補以甘溫而清潤之品非所宜陰虛
多熱者宜補以甘涼而辛燥之類不可用知宜知避則不惟
用補而八方之制皆可得而貫通矣

二和畧

一和方之制和其不和者也凡病兼虛者補而和之兼滯者行
而和之兼寒者溫而和之兼熱者涼而和之和之爲義廣矣
亦猶土兼四氣其於補瀉溫涼之用無所不及務在調平元
氣不失中和之爲貴也故凡陰虛於下而精血虧損者忌利
小便如四苓通草湯之屬是也陰虛於上而肺熱乾欬者忌
用辛燥如半夏蒼朮細辛香附芎歸白朮之屬是也陽虛於
上忌消耗如陳皮砂仁木香檳榔之屬是也陽虛於下者忌
沉寒如黃蘗知母梔子木通之屬是也大便秘泄者忌滑利
如二冬牛膝菴蓉當歸柴胡童便之屬是也表邪未解者忌

收斂如五味棗仁地榆文蛤之屬是也氣滯者忌閉塞如黃
芪白朮薯蕷甘草之屬是也經滯者忌寒凝如門冬生地石
斛芩連之屬是也凡邪火在上者不宜升火得升而愈熾矣
沉寒在下者不宜降陰被降而愈亡矣諸動者不宜再動如
火動者忌溫煖血動者忌辛香汗動者忌蕪散神動者忌耗
傷凡性味之不靜者皆所當慎其於剛暴更甚者則又在
言可知也諸靜者不宜再靜如沉微細弱者脉之靜也神昏
氣怯者陽之靜也肌體清寒者表之靜也口腹畏寒者裏之
靜也凡性味之陰柔者皆所當慎其於沉寒更甚者又在不

言可知也夫陽主動以動濟動火上添油也不焦爛乎陰主
靜以靜益靜雪上加霜也不寂滅乎凡前所論論其畧耳而
書不盡言言不盡意能因類而廣之則存乎其人矣不知此
義又何和劑之足云

三攻畧

一攻方之制攻其實也凡攻氣者攻其聚聚可散也攻血者攻
其瘀瘀可通也攻積者攻其堅在藏者可破可培在經者可
鍼可灸也攻痰者攻其急真實者暫宜解標多虛者只宜求
本也但諸病之實有微甚用攻之法分重輕大實者攻之未

及可以再加微實者攻之太過每因致害所當慎也凡病在陽者不可攻陰病在腑者不可攻臟若此者邪必乘虛內陷所謂引賊入寇也病在陰者勿攻其陽病在裏者勿攻其表若此者病必因誤而甚所謂自撤藩蔽也大都治宜用攻必其邪之甚者也其若實邪果甚自與攻藥相宜不必雜之補劑蓋實不嫌攻若但畧加甘滯便相牽制虛不嫌補若但畧加消耗偏覺相妨所以寒實者最不喜清熱實者最不喜煖然實而誤補不過增病病增者可解虛而誤攻必先脫元元脫者無治矣是皆攻法之要也其或虛中有實實中有虛此

又當酌其權宜不在急宜攻急宜補者之例雖然凡用攻之法所以除兇剪暴也亦猶亂世之兵必不可無然惟必不得已乃可用之若或有疑寧加詳慎蓋攻雖去邪無弗傷氣受益者四受損者六故攻之一法實自古仁人所深忌者正恐其成之難敗之易耳倘任意不思此其人可知矣

四散畧

一用散者散表證也觀仲景太陽證用麻黃湯陽明證用升麻葛根湯少陽證用小柴胡湯此散表之準繩也後世宗之而復不能用之在不得其意耳蓋麻黃之氣峻利而勇凡太陽

經陰邪在表者寒毒既深非此不達故制用此方非謂太陽
經藥必須麻黃也設以麻黃治陽明少陽之證亦寒無不散
第恐性力太過必反傷其氣豈謂某經某藥必不可移易亦
不過分其輕重耳故如陽明之升麻乾葛未有不走太陽少
陽者少陽之柴胡亦未有不入太陽陽明者但用散之法當
知性力緩急及氣味寒溫之辨用得其宜諸經無不妙也如
麻黃桂枝峻散者也防風荆芥紫蘊平散者也細辛白芷生
薑溫散者也柴胡乾葛薄荷涼散者也羌活蒼朮能走經去
濕而散者也升麻川芎能舉陷上行而散者也第邪淺者忌
峻利之屬氣弱者忌雄悍之屬熱多者忌溫燥之屬寒多者
忌清涼之屬凡熱渴煩躁者喜乾葛而嘔惡者忌之寒熱往
來者宜柴胡而泄瀉者忌之寒邪在上者宜升麻川芎而內
熱炎升者忌之此性用之宜忌所當辨也至於相配之法則
尤當知要凡以平兼清自成涼散以平兼煖亦可溫經宜大
溫者以熱濟熱宜大涼者以寒濟寒此其運用之權則毫厘
進退自有伸縮之妙又何必膠柱刻舟以限無窮之病變哉
此無他在不知仲景之意耳

五寒畧


一寒方之制爲清火也爲除熱也夫火有陰陽熱分上下據古
方書咸謂黃連清心黃芩清肺石斛芍藥清脾龍胆清肝黃
栝清腎今之用者多守此法是亦膠柱法也大凡寒涼之物
皆能瀉火豈有涼此而不涼彼者但當分其輕清重濁性力
微甚用得其宜則善矣夫輕清者宜以清上如黃芩石斛連
翹天花之屬是也重濁者宜於清下如梔子黃栝龍膽滑石
之屬也性力之厚者能清大熱如黃連蘆薈苦參山豆
根之屬也性力之緩者能清微熱如地骨皮玄參貝母石斛
童便之屬也以攻而用者去實鬱之熱如大黃芒硝之屬也

以利而用者去癰閉之熱如木通茵陳猪苓澤瀉之屬也以
補而用者去陰虛枯燥之熱如生地二冬芍藥梨漿細甘草
之屬也方書之分經用藥者意正在此但不能明言其意耳
然火之甚者在上亦宜重濁火之微者在下亦可輕清夫宜
涼之熱皆實熱也實熱在下自宜清利實熱在上不可升提
蓋火本屬陽宜從陰治從陰者宜降升則反從其陽矣經曰
高者抑之義可知也外如東垣有升陽散火之法此以表邪
生熱者設不得與伏火內炎者並論

六熱畧

一熱方之制為除寒也夫寒之為病有寒邪犯於肌表者有生
冷傷於脾胃者有陰寒中於臟腑者此皆外來之寒去所從
來則其治也是皆人所易知者至於本來之寒生於無形無
嚮之間初無所感莫測其因人之病此者最多人之知此者
最少果何謂哉觀丹溪曰氣有餘便是火余續之曰氣不足
便是寒夫今人之氣有餘者能十中之幾其有或因稟受或
因喪敗以致陽氣不足者多見寒從中生而陽衰之病無所
不致第其由來者漸形見者微當其未覺也孰為之意及其
既甚也始知治難矧庸醫多有不識每以假熱為真火因復

斃於無形無嚮者又不知其幾許也故惟高明見道之士常
以陽衰根本為憂此熱方之不可不知也凡用熱之法如乾
薑能溫中亦能散表嘔惡無汗者宜之內桂能行血善達四
肢血滯多痛者宜之吳茱萸善煖下焦腹痛泄瀉者極妙肉
豆蔻可溫脾腎飡泄滑利者最奇胡椒溫胃和中其類近於
萸撥丁香止嘔行氣其煖過於豆仁補骨脂性降而善閉故
能納氣定喘止帶濁泄瀉製附子性行如酒故無處不到能
救急回陽至若半夏南星細辛烏藥良薑香附木香茴香仙
茅巴戟之屬皆性溫之當辨者然用熱之法尚有其要以散



兼溫者散寒邪也以行兼溫者行寒滯也以補兼溫者補虛寒也第多汗者忌薑薑能散也失血者忌桂桂動血也氣短氣怯者忌故紙故紙降氣也大凡氣香者皆不利於氣虛證味辛者多不利於見血證所當慎也是用熱之槩也至於附子之辨凡今之用者必待勢不可爲不得已然後用之不知回陽之功當用於陽氣將去之際便當漸用以望挽回若用於既去之後死灰不可復然矣尚何益於事哉但附子性悍獨任爲難必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其勇以補培之無往不利矣此壺天中大將軍

也可置之無用之地乎但知之真而用之善斯足稱將將之手矣

七固畧

一固方之制固其泄也如久嗽爲喘而氣泄於上者宜固其肺久遺成淋而精脫於下者宜固其腎小水不柰者宜固其膀胱大便不禁者宜固其腸臟汗泄不止者宜固其皮毛血泄不止者宜固其營衛凡因寒而泄者當固之以熱因熱而泄者當固之以寒總之在上者在表者皆宜固氣氣主在肺也在下者在裏者皆宜固精精主在腎也然虛者可固實者不

可固久者可固暴者不可固當固不固則滄海亦將竭不當固而固則閉門延寇也二者俱當詳酌之

入因畧

一因方之制因其可因者也凡病有相同者皆可按證而用之是謂因方如癰毒之起腫可敷也蛇虫之患毒可解也湯火傷其肌膚熱可散也跌打傷其筋骨斷可續也凡此之類皆因證而可藥者也然因中有不可因者又在乎證同而因不同耳蓋人之虛實寒熱各有不齊表裏陰陽治當分類故有宜於此而不宜於彼者有同於表而不同於裏者所以病雖

相類而但涉內傷者便當於血氣中酌其可否之因不可謂因方之類盡可因之而用也因之爲用有因標者有因本者勿因此因字而誤認因方之義

景岳全書新方八陣卷之五十一

德集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙庵訂

補陣

大補元煎

治男婦氣血大壞精神失守危劇等證此回

天贊化救本培元第一要方○本方與後右歸飲出入互用

人參

補氣補陽以此為主少則用一二錢多則用一二兩

山藥

炒二錢

熟地

補精補陰以此為主少則用一二錢多則用二三兩

杜仲

二錢

當歸

二三錢右泄瀉者去之

山茱萸

一錢如畏酸吞酸者去之

枸杞

二三錢

炙甘草

一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如元陽不足多寒者於本方加附子肉桂炮薑之類隨宜用之○如氣分偏虛者加黃芪白朮如胃口多滯者不必用○如血滯者加川芎去山茱萸○如滑泄者加五味故紙之屬

左歸飲

此壯水之劑也凡命門之陰衰陽勝者宜此方

加減主之○此一陰煎四陰煎之主方也

熟地

二三錢或加至一二兩

山藥

二錢

枸杞

二錢

炙甘草

一錢

茯苓

一錢半

山茱萸

一二錢畏酸者少用之

水二鍾煎七分食遠服○如肺熱而煩者加麥冬二錢血滯者加丹皮二錢○心熱而躁者加玄參二錢○脾熱易饑者加芍藥二錢○腎熱骨蒸多汗者加地骨皮二錢○血熱妄動者加生地二三錢○陰虛不寧者加女貞子二錢上實下虛者加牛膝二錢以導之○血虛而燥滯者加當歸二錢右歸飲 三 此益火之劑也凡命門之陽衰陰勝者宜此方加減主之○此方與大補元煎出入互用如治陰盛格陽真

寒假熱等證宜加澤瀉二錢煎成用涼水浸冷服之尤妙

熟地

用如前

山藥

炒二錢

山茱萸

一錢

枸杞

二錢

甘草

炙一錢

杜仲

薑制二錢

肉桂

一二錢

制附子

一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如氣虛血脫或厥或昏或汗或運或虛狂或短氣者必大加人參白朮隨宜用之○如火衰不能生土為嘔噦吞酸者加炮乾薑二三錢○如陽衰中寒泄瀉腹痛加人參肉豆蔻隨宜用之○如小腹多痛者加吳茱萸五七分○如淋帶不止加破故紙一錢○如血少血滯腰膝軟痛者加當歸二三錢

左歸丸

四

治真陰腎水不足不能滋養營衛漸至衰弱或

虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸原或虛損傷陰或遺淋不禁或氣虛昏運或眼花耳聾或口燥舌乾或腰痠腿軟凡精髓內虧津液枯涸等證俱速宜壯水之主以培左腎之元陰而精血自充矣宜此方主之

大懷熟

八兩

山藥

炒四兩

枸杞

四兩

山茱萸

肉四兩

川牛膝

酒洗蒸熟三兩
精滑者不用

兔絲子

制四兩

鹿膠

敲碎炒珠四兩

龜膠

切碎炒珠四兩
無火者不必用

右先將熟地蒸爛杵膏加煉蜜九桐子大每食前用滾湯或

淡塩湯送下百餘丸

如真陰失守虛火炎上者宜用純陰至靜之劑於本方去枸
杞鹿膠加女貞子三兩麥冬三兩○如火燥肺金乾粘多嗽
者加百合三兩○如夜熱骨蒸加地骨皮三兩○如小水不
利不清加茯苓三兩○如大便燥結去兔絲加肉蓯蓉三兩
○如氣虛者加人參三四兩○如血虛微滯加當歸四兩○
如腰膝痠痛加杜仲三兩塩水炒用○如藏平無火而腎氣
不充者加破故紙三兩去心蓮肉胡桃肉各四兩龜膠不必
用○右凡五液皆主於腎故凡屬陰分之藥無不皆能走腎

有謂必須導引者皆見之不明耳

右歸丸 五

治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命

門火衰不能生土而為脾胃虛寒飲食少進或嘔惡膨脹或
番胃噎膈或怯寒畏冷或臍腹多痛或大便不實瀉痢頻作
或小便自遺虛淋寒疝或寒侵谿谷而肢節痺痛或寒在下
焦而水邪浮腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不寧
或四體不收或眼見邪祟或陽衰無子等證俱速宜益火之
原以培右腎之元陽而神氣自強矣此方主之

大懷熟 入兩

山藥 炒四兩

山茱萸 微炒三兩

枸杞 微炒四兩

鹿角膠炒珠 兔絲子製四兩 杜仲薑湯炒四兩 當歸三兩便

肉桂二兩漸可加至四兩 製附子自二兩漸可加至五六兩

右丸法如前或丸如彈子大每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

如陽衰氣虛必加人參以為之主或二三兩或五六兩隨人虛實以為增減蓋人參之功隨陽藥則入陽分隨陰藥則入陰分欲補命門之陽非加人參不能捷效○如陽虛精滑或帶濁便溏加補骨脂酒炒三兩○如飧泄腎泄不止加北五味子三兩肉豆蔻三兩麩炒去油用○如飲食減少或不易

化或嘔惡吞酸皆脾胃虛寒之證加乾薑三四兩炒黃用○如腹痛不止加吳茱萸二兩湯泡半日炒用○如腰膝酸痛加胡桃肉連皮四兩○如陰虛陽痿加巴戟肉四兩肉苁蓉三兩或加黃狗外腎一二付以酒煮爛搗入之

五福飲六 凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之

最

人參隨宜 熟地隨宜 當歸二三錢 白朮炒一錢

炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服○或加生薑三五片○凡治氣血

俱虛等證以此為主或宜溫者加薑附宜散者加升麻柴葛
左右逢源無不可也

七福飲 七

治氣血俱虛而心脾為甚者

即前方加棗仁二錢

遠志三五分製用

一陰煎 八

此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水真陰虛

損而脉證多陽虛火發熱及陰虛動血等證或瘧疾傷寒屢
散之後取汗既多脉虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以
汗多傷陰水虧而然也皆宜用此加減主之

生地 二錢

熟地 三五錢

芍藥 二錢

麥冬 二錢

甘草 一錢

牛膝 一錢

丹參 二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如火盛躁煩者入真龜膠二三

錢化服○如氣虛者間用人參一二錢○如心虛不眠多汗

者加棗仁當歸各一二錢⊕如汗多煩躁者加五味子十粒

○或加山藥山茱萸○如見微火者加女貞子一二錢○如

虛火上浮或吐血或衄血不止者加澤瀉一二錢茜根二錢

或加川續斷一二錢以瀝之亦妙

加減一陰煎 九

治證如前而火之甚者宜用此方

生地

芍藥

麥冬

熟地

各二錢

炙甘草 五七分 知母

地骨皮 各一錢

水二鍾煎服○如躁煩熱甚便結者加石膏二三錢○如小

水熱澀者加梔子一二錢○如火浮於上者加澤瀉一二錢

或黃芩一錢○如血燥血少者加當歸一二錢

二陰煎 十 此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚

狂失志多言多笑或瘍疹煩熱失血等證宜此主之

生地 二二三錢

麥冬 二二三錢

棗仁 二錢

生甘草 一錢

玄參 一錢

黃連 或一錢

茯苓 一錢

木通 一錢

水二鍾加燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠服○如痰

勝熱甚者加九制膽星一錢或天花粉一錢五分

三陰煎 十

此治肝脾虛損精血不足及營虛失血等病故

曰三陰凡中風血不養筋及瘧疾汗多邪散而寒熱猶不能

止是皆少陽厥陰陰虛少血之病微有火者宜一陰煎無火

者宜此主之

當歸 二三錢

熟地 三五錢

炙甘草 一錢

芍藥 酒炒二錢

棗仁 二錢

人參 隨宜

水二鍾煎七分食遠服○如嘔惡者加生薑三五片○汗多

煩躁者加五味子十四粒○汗多氣虛者加黃芪一二錢○

小腹隱痛加枸杞二三錢○如有脹悶加陳皮一錢○如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

四陰煎

二十

此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩渴欬吐衄多熱等證

生地 二二三錢

麥冬 二錢

白芍藥 二錢

百合 二錢

沙參 二錢

生甘草 一錢

茯苓 一錢半

水二鍾煎七分食遠服○如夜熱盜汗加地骨皮一二錢○如痰多氣盛加貝母二三錢阿膠一二錢天花粉亦可○如金水不能相滋而乾燥喘嗽者加熟地三五錢○如多汗不

眠神魂不寧加棗仁二錢○如多汗兼渴加北五味十四粒

○如熱甚者加黃柏一二錢塩水炒用或玄參亦可但分上

下用之○如血燥經遲枯澁不至者加牛膝二錢○如血熱

吐衄加茜根二錢○如多火便燥或肺乾欬咯者加天門冬

二錢或加童便亦可○如火載血上者去甘草加炒梔子一

二錢

五陰煎

三十

凡真陰虧損脾虛失血等證或見溇泄未甚者所重在脾故曰五陰忌用潤滑宜此主之

熟地

五七錢
或一兩

山藥

炒二錢

扁豆

炒二錢

炙甘草

一二錢

茯苓一錢半 芍藥炒黃二錢 五味子廿粒 人參隨宜用

白朮炒一錢二錢

水二鍾加蓮肉去心二十粒煎服

大營煎十 治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨

疼痛或氣血虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢或五錢 熟地三五錢 枸杞二錢 炙甘草一二錢

杜仲二錢 牛膝一錢半 肉桂一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如寒滯在經氣血不能流通筋

骨疼痛之甚者必加製附子一二錢方效○如帶濁腹痛者

加故紙一錢炒用○如氣虛者加人參白朮○中氣虛寒嘔

惡者加炒焦乾薑一二錢

小營煎十 治血少陰虛此性味平和之方也

當歸二錢 熟地二三錢 芍藥炒酒二錢 山藥炒二錢

枸杞二錢 炙甘草一錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如營虛於上而為驚恐怔忡不

眠多汗者加棗仁茯神各二錢○如營虛兼寒者去芍藥加

生薑○如氣滯有痛者加香附一二錢引而行之

補陰益氣煎十 此補中益氣湯之變方也治勞倦傷陰精

不化氣或陰虛內乏以致外感不解寒熱痰癥陰虛便結不通等證凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升散無不神效

人參 一二三錢 當歸 二二三錢 山藥 酒炒二錢 熟地 三五錢或一二兩

陳皮 一錢 炙甘草 一錢 升麻 三五分火浮於上者去此不必用

柴胡 一二錢如無外邪者不必用

水二鍾加生薑三五七片煎八分食遠溫服

舉元煎 七 治氣虛下陷血崩血脫亡陽垂危等證有不利

於歸熟等劑而但宜補氣者以此主之

人參 黃芪 各二三錢 炙甘草 一二錢 升麻 五七分炒用

白朮 炒一錢

水一鍾半煎七八分溫服○如兼陽氣虛寒者桂附乾薑隨

宜佐用○如兼滑脫者加烏梅二個或文蛤七八分

兩儀膏 八 治精氣大虧諸藥不應或以克伐太過耗損真

陰凡虛在陽分而氣不化精者宜參朮膏若虛在陰分而精不化氣者莫妙於此其有未至大病而素覺陰虛者用以調

元尤稱神妙

人參 半斤或四兩 大熟地 一斤

右二味用好甜水或長流水十五碗浸一宿以桑柴文武火

煎取濃汁若味有未盡再用水數碗煎粗取汁并熬稍濃乃入磁罐重湯熬成膏入真白蜜四兩或半斤收之每以白湯點服○若勞損欬嗽多痰加貝母四兩亦可

貞元飲十

治氣短似喘呼吸促急提不能升嚥不能降氣

道噎塞勢劇垂危者常人但知為氣急其病在上而不知元海無根虧損肝腎此子午不交氣脫證也尤為婦人血海常虧者最多此證宜急用此飲以濟之挽之敢云神劑凡診此證脉必微細無神若微而兼緊尤為可畏倘庸眾不知妄云痰逆氣滯用牛黃蘓合及青陳枳殼破氣等劑則速其危矣

熟地黃七八錢甚者一二兩

炙甘草一二三錢當歸一二三錢

水二鍾煎八分溫服○如兼嘔惡或惡寒者加煨薑三五片○如氣虛脉微至極者急加人參隨宜○如肝腎陰虛手足厥冷加肉桂一錢

當歸地黃飲十二 治腎虛腰膝疼痛等證

當歸二錢

熟地三五錢

山藥二錢

杜仲二錢

牛膝一錢半

山茱萸一錢

炙甘草八分

水二鍾煎八分食遠服○如下部虛寒加肉桂一二錢甚者仍加附子○如多帶濁去牛膝加金櫻子二錢或加故紙一

錢○如氣虛者加人參一二錢枸杞二三錢

濟川煎二 凡病涉虛損而大便閉結不通則稍黃攻擊等

劑必不可用若勢有不得通者宜此主之此用通於補之劑也最妙最妙

當歸 三五錢

牛膝 二錢

肉苁蓉 酒洗去鹹 二二三錢

澤瀉 一錢半

升麻 五七分 或一錢

枳殼 一錢虛甚者不必用

水一鍾半煎七八分食前服○如氣虛者但加人參無碍○如有火加黃芩○如腎虛加熟地

地黃醴二 治男婦精血不足營衛不充等患宜製此常用

之

大懷熟

取味極甘者烘晒乾以去水氣八兩

沉香

一錢或白檀三分亦可

枸杞

用極肥者亦烘晒以去潤氣四兩

右約每藥一斤可用高燒酒十斤浸之不必煮但浸十日之外即可用矣凡服此者不得過飲服完又加酒六七斤再浸半月仍可用

歸腎丸二

治腎水真陰不足精衰血少腰痠脚軟形容憔悴遺泄陽衰等證○此左歸右歸二丸之次者也

熟地 八兩

山藥 四兩

山茱萸

肉四兩

茯苓 四兩

當歸 三兩

枸杞 四兩

杜仲 鹽水炒 四兩

兔絲子 制 四兩

煉蜜同熟地膏為丸桐子大每服百餘丸饑時或滾水或淡

鹽湯送下

贊化血餘丹 二四

此藥大補氣血故能烏髮壯形體其於

培元替育之功有不可盡述者

血餘 八兩

熟地 八兩 蒸烏

枸杞

當歸

鹿角膠 炒 珠

兔絲子 制

杜仲 鹽水炒

巴戟 肉酒浸 剉炒乾

小茴香 畧炒

白茯苓 乳拌 蒸熟

肉蓯蓉 酒洗去 鱗甲

胡桃肉 各四兩

何首烏 小黑豆汁拌蒸七次如無黑豆 或人乳牛乳拌蒸俱妙四兩

人參 隨便用 無亦可

右煉蜜丸服每食前用滾白湯送下二三錢許○精滑者加

白朮山藥各三兩○便溏者去蓯蓉加補骨脂酒炒四兩○

陽虛者加附子肉桂

養元粉 二五

大能實脾養胃氣

糯米 一升水浸一宿 瀝乾漫火炒熟

山藥 炒

芡實 炒

蓮肉 各三兩

川椒 去目及閉口者炒出 汗取紅末二三錢

右為末每日饑時以滾水一碗入白糖三匙化開入藥末一二兩調服之或加四君山查肉各一二兩更妙

玄武豆二六

羊腰子五十個 枸杞二斤

補骨脂一斤

大茴香六兩

小茴香六兩

肉苻蓉十二兩大便滑者去之

青鹽八兩如無苻蓉此宜十二兩

大黑豆一斗圓淨者淘洗淨

右用甜水二斗以砂鍋煮前藥七味至半乾去藥渣入黑豆
勻火煮乾為度如有餘汁俱宜拌滲於內取出用新布攤晾
晒乾磁瓶收貯日服之其效無窮如無砂鍋即鐵鍋亦可若
陽虛者加制附子一二兩更妙

蟠桃果二七

治遺精虛弱補脾滋腎最佳

芡實一斤炒

蓮肉一斤去心

膠棗肉一斤

熟地一斤

胡桃肉二斤去皮

右以猪腰六個搽大茴香蒸極熟去筋膜同前藥末搗成餅
每日服二個空心食前用滾白湯或好酒一二鍾送下此方
凡人參制附子俱可隨意加用

王母桃二八

培補脾腎功力最勝

白朮

用冬朮腿片味甘者佳苦者勿用以米泔浸一宿切片炒

大懷熟蒸搗上二味等分

何首烏九蒸

巴戟甘草湯浸剝炒 枸杞子上三味減半

右為末煉蜜搗丸龍眼大每用三四丸饑時嚼服滾湯送下

○或加人參其功尤大

休癰飲二九

此止癰最妙之劑也若汗散既多元氣不復或以衰老或以弱質而癰有不能止者俱宜用此此化暴善後之第一方也其有他證加減俱宜如法

人參

白木炒

當歸各三錢

何首烏制五錢

炙甘草八分

水一鍾半煎七分食遠服渣再煎或用陰陽水各一鍾煎一鍾粗亦如之俱露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾○如陽虛多寒宜溫中散寒者加乾薑肉桂之類甚者或加

制附子○如陰虛多熱煩渴喜冷宜滋陰清火者加麥冬生地芍藥甚者加知母或加黃芩○如腎陰不足水不制火虛煩虛餒腰痠脚軟或脾虛痞悶者加熟地枸杞山藥杜仲之類以滋脾腎之真陰○如邪有未淨而雷連難愈者於此方加柴胡麻黃細辛紫蘊之屬自無不可○如氣血多滯者或用酒水各一鍾煎服或服藥後飲酒數杯亦可

和陣

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛血氣

不足外受風寒欬嗽嘔惡多痰喘急等證神效

當歸^{二錢} 熟地^{三五錢} 陳皮^{一錢半} 半夏^{二錢}

茯苓^{二錢} 炙甘草^{一錢}

水二鍾生薑三五七片煎七八分食遠溫服○如大便不實而多濕者去當歸加山藥○如痰盛氣滯胸脇不快者加白芥子七八分○如陰寒盛而嗽不愈者加細辛五七分○如兼表邪寒熱者加柴胡一二錢

六安煎^二 治風寒欬嗽及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮^{一錢半} 半夏^{二三錢} 茯苓^{二錢} 甘草^{一錢}

杏仁^{一錢} 白芥子^{五七分}
皮尖切 老年氣弱者不用

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食遠服○凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者多不易散宜加北細辛七八分或一錢○若冬月嚴寒邪甚者加麻黃桂枝亦可○若風勝而邪不甚者加防風一錢或蘓葉亦可○若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆可○若兼寒熱者加柴胡蘓葉○若風邪欬嗽不止而兼肺胃之火者加黃芩一二錢甚者再加知母石膏所用生薑止宜一片○凡寒邪欬嗽痰不利者加當歸二三錢老年者充宜若氣血不足者當以金水六君煎與此參用○

凡非風初感痰勝而氣不順者加藿香一錢五分兼脹滿者加厚朴一錢暫開痰氣然後察其寒熱虛實而調補之若氣虛猝倒及氣平無痰者皆不可用此

和胃二陳煎

治胃寒生痰惡心嘔吐胸膈滿悶噎氣

乾薑

炒一錢

砂仁

四五分

陳皮

半夏

茯苓

各一錢半

甘草

各七分

水一鍾半煎七分不拘時溫服

苓木二陳煎

治痰飲水氣停畜心下嘔吐吞酸等證

猪苓

一錢半

白朮

一二錢

澤瀉

一錢半

陳皮

一錢

半夏

二三錢

茯苓

一錢半

炙甘草

八分

乾薑

炒黃一錢二錢

水一鍾半煎服○如肝腎兼寒者加肉桂一二錢

和胃飲

五

治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清

嘔惡脹滿腹痛等證○此即平胃散之變方也凡嘔吐等證

多有胃氣虛者一聞蒼朮之氣亦能動嘔故以乾薑代之

陳皮

厚朴

各一錢半

乾薑

炮一錢二錢

炙甘草

一錢

水一鍾半煎七分溫服○此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若胸腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡

排氣飲六

治氣逆食滯脹痛等證

陳皮 一錢五分 木香 七分或一錢 藿香 一錢五分 香附 二錢

枳殼 一錢五分 澤瀉 二錢 烏藥 二錢 厚朴 一錢

水一鍾半煎七分熱服○如食滯者加山查麥芽各二錢○如寒滯者加焦乾薑吳茱萸肉桂之屬○如氣逆之甚者加白芥子沉香青皮檳榔之屬○如嘔而兼痛者加半夏丁香之屬○如痛在小腹者加小茴香○如兼疝者加荔枝核煨熟搗碎用二三錢

大和中飲七

治飲食留滯積聚等證

陳皮 一錢二分 枳實 一錢 砂仁 五分 山查 一錢

麥芽 二錢 厚朴 一錢半 澤瀉 一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服○脹甚者加白芥子胃寒無火或惡心者加炮乾薑一二錢疼痛者加木香烏藥香附之類多痰者加半夏

小和中飲八

治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

陳皮 一錢五分 山查 二錢 茯苓 一錢半 厚朴 一錢五分

甘草 五分 扁豆 炒二錢

水一鍾半加生薑三五片煎服○如嘔者加半夏一二錢○

如脹滿氣不順者加砂仁七八分○如火鬱於上者加焦梔
子一二錢○如婦人氣逆血滯者加紫蘇梗香附之屬○如
寒滯不行者加乾薑肉桂之屬

大分清飲九 方在寒陣五

小分清飲十 治小水不利濕滯腫脹不能受補等證此方

主之

茯苓二三錢 澤瀉二三錢 薏仁二錢 猪苓二三錢

枳殼一錢 厚朴一錢

水一鍾半煎七八分食前服○如陰虛水不能達者加生地

牛膝各二錢○如黃疸者加茵陳二錢○如無內熱而寒滯
不行者加肉桂一錢

解肝煎十一 治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼肝火者

宜用化肝煎

陳皮 半夏 厚朴 茯苓各一錢半

蘓葉 芍藥各一錢 砂仁七分

水一鍾半加生薑三五片煎服○如脇肋脹痛加白芥子二
錢○如胸膈氣滯加枳殼香附藿香之屬

二木煎十二 治肝強脾弱氣泄濕泄等證

白朮

炒二錢
或三錢

蒼朮

米泔浸
炒二錢

芍藥

炒黃
二錢

陳皮

炒一錢
五分

炙甘草

一錢

茯苓

一二錢

厚朴

薑湯炒
一錢

木香

六七分

乾薑

炒黃
二錢

澤瀉

炒一錢
半

水一鍾半煎七分食遠服

廓清飲 十三

治三焦壅滯胸膈脹滿氣道不清小水不利年

力未衰通身腫脹或肚腹單脹氣實非水等證

枳殼

二錢

厚朴

半一錢

大腹皮

一二錢

白芥子

五七分或
一二錢

蘿蔔子

生搗一錢如中不甚
脹能食者不必用此

茯苓

連皮用
二三錢

澤瀉

二三錢

陳皮

一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服○如內熱多火小水熱數者加

梔子木通各一二錢○如身黃小水不利者加茵陳二錢○

如小腹脹滿大便堅實不通者加生大黃三五錢○如肝滯

脇痛者加青皮○如氣滯胸腹疼痛者加烏藥香附○如食

滯者加山查麥芽

掃虫煎 十四

治諸虫上攻胸腹作痛

青皮

一錢

小茴香

炒一錢

檳榔

烏藥

各一錢半

細樞肉

三錢
敲碎

吳茱萸

一錢

烏梅

二個

甘草

八分

硃砂

各五分俱
為極細末

雄黃

各五分俱
為極細末

右將前八味用水一鍾半煎八分去粗隨入後二味再煎三四沸攪勻徐徐服之○如惡心作吐加炒乾薑一二錢○或先啖牛肉脯少許俟一茶頃頓服之更妙

丁香丸 十五

治氣滯寒滯諸痛

木香

沉香

澤瀉

烏藥

陳皮

丁香

小茴香

香附

酒炒

荔枝 煨焦各等分

皂角

微火燒烟盡

為末酒糊丸彈子大者磨化服丸桐子大者湯引下○癩疔之屬溫酒下

芍藥枳朮丸 六

治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛

脾胃不和等證○此方較之枳朮丸其效如神

白朮

二兩 麵炒

赤芍藥

二兩 酒炒

枳實

一兩 麵炒

陳皮

一兩

荷葉湯煮黃老米粥為丸桐子大米飲或滾白湯任下日餘丸○如臍寒加乾薑炒黃者五錢或一二兩○如脾胃氣虛

加人參一二兩

蒼朮丸 十七

治寒濕在脾泄瀉久不能愈者

雲苓

四兩

白芍藥

炒黃 四兩

炙甘草

一兩

川椒

去閉口者 炒出汗

小茴香

炒各 一兩

厚朴

三兩 薑汁炒

真茅山蒼朮

八兩 米泔浸一宿切炒如無卽以好

白木代之

破故紙

酒浸二日晒乾炒香四兩

右為末糯米糊為丸桐子大每食遠清湯送下七八十九

貝母丸

八十

消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母一兩為末用沙糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之

○若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎蓬砂天竺黃

一錢佐之尤妙如無百藥煎即醋炒文蛤一錢亦可或粟殼

亦可酌用○若治肺癰宜加白礬一錢同貝母丸服如前最

妙

括痰丸

九十

治一切停痰積飲吞酸嘔酸胸脇脹悶疼痛等

證

半夏

製二兩

白芥子

二兩

乾薑

炒黃一兩

猪苓

二兩

炙甘草

五錢

陳皮

四兩切碎用鹽二錢入水中拌浸一宿晒乾

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服一錢許滾白湯送下○

如胸脇疼痛者加台烏藥二兩

神香散

十二

治胸脇胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲膈

噎諸藥不效者惟此最妙

丁香

白荳蔻

或砂仁亦可

二味等分為末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘○

若寒氣作痛者薑湯送下

攻陣

吐法 此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或食或氣逆不通等證皆可以此吐之

用蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃即當吐出即有吐不盡者亦必從下行矣○又法以蘿蔔子為末溫水調服一匙良久吐涎沫愈

一法用鹽少許於熱鍋中炒紅色乃入以水煮至將滾未滾

之際攪勻試其滋味稍淡乃可飲之每用半碗漸次增飲自然發吐以去病為度而止○一法凡諸藥皆可取吐但隨證作湯劑撰而吐之無不可也

赤金豆 二 ○亦名八仙丹○治諸積不行凡血凝氣滯疼痛

腫脹虫積結聚癥堅宜此主之此丸去病捷速較之補黃稜莪之類過傷臟氣者大為勝之

巴霜 去皮膜畧去 油一錢半
皂角 炒微焦 輕粉 一錢
丁香 木香

天竺黃 各三錢
硃砂 二錢 為衣

新方 攻陣

右為末醋浸蒸餅為丸蘿蔔子大硃砂為衣欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服一二十九丸用滾水或煎藥或薑醋茶密茴香史君煎湯為引送下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得冷則止也○如治氣濕實滯鼓脹先用紅棗煮熟取肉一錢許隨用七八丸甚者一二十九丸同棗肉研爛以熱燒酒加白糖少許送下○如治虫痛亦用棗肉加服止用清湯送下

太平丸 三

治胸腹疼痛脹滿及食積氣積血積氣癰血疝邪實秘滯痛劇等證○此方借些微巴豆以行群藥之力去

滯最妙如欲其峻須用巴豆二錢

陳皮

厚朴

木香

烏藥

白芥子

草豆蔻

三稜

蓬朮 煨

乾薑

牙皂

炒斷

澤瀉

各三錢

以上十一味俱為細末

巴豆 用滾湯泡去皮心膜穢足一錢用水一碗微火煮至半碗將巴豆撈起用乳鉢研極細仍將前湯攪入研勻然後量藥多寡人蒸餅浸爛搗丸前藥如綠豆大每用三分或五分甚者一錢

右隨證用湯引送下○凡傷食停滯即以本物湯下○婦人血氣痛紅花湯或當歸湯下○氣痛陳皮湯○疝氣茴香湯○寒氣生薑湯○欲瀉者用熟薑湯送下一錢○未利再服○利多不止用冷水一二口即止

敦阜丸 四

治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香

山查

麥芽

皂角

丁香

烏藥

青皮

陳皮

澤瀉

各五錢

巴霜

一錢

右共為末用生蒜頭一兩研爛加熱水取汁浸蒸餅搗丸綠

豆大每服二三十丸隨便用湯引送下如未愈徐徐漸加用之

獵虫丸 五

治諸虫積脹痛黃瘦等病

蕪荑

雷丸

桃仁

乾漆

炒剉盡

雄黃

微炒

錫灰

皂角

燒烟盡

楨榔

史君子

各等分

輕粉

減半

細雁肉

加倍

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五七分滾白湯下陸續服之○如虫積堅固者加巴豆霜與輕粉同

百順丸 六

治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒

實熱秘結等證但各為湯引隨宜送下無往不利

川大黃錦紋者一斤

牙皂角炒微黃一兩六錢

右為末用湯浸蒸餅搗丸綠豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜為丸亦可

散陣

一柴胡飲一 一為水數從寒散也○凡感冒時不正之氣

或為發熱或為寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或產後經後因冒風寒以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者

須從涼散宜此主之

柴胡二三錢

黃芩一錢半

芍藥二錢

生地一錢半

陳皮一錢半

甘草八分

水一鍾半煎七八分溫服○如內熱甚者加連翹一二錢隨宜○如外邪甚者加防風一錢佐之○如邪結在胸而痞滿者去生地加枳實一二錢○如熱在陽明而兼渴者加天花粉或葛根一二錢熱甚者加知母石膏亦可

二柴胡飲二 二為火數從溫散也○凡遇四時外感或其

人元氣充實臟氣素平無火或時逢寒勝之令本無內熱等

證者皆不宜妄用涼藥以致寒滯不散則為害非淺宜此主之

陳皮 一錢半

半夏 二錢

細辛 一二錢

厚朴 一錢半

生薑 三五片

柴胡 一錢半或二三錢

甘草 八分

水一鍾半煎七八分溫服○如邪盛者可加羌活白芷防風紫蘊之屬擇而用之○如頭痛不止者加川芎一二錢○如多濕者加蒼朮○如陰寒氣勝必加麻黃一二錢或兼桂枝不必疑也

三柴胡飲

三為木數從肝經血分也○凡人素稟陰分

不足或肝經血少而偶感風寒者或感邪不深可兼補而散者或病後產後感冒有不得不從解散而血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡 二三錢

芍藥 一錢半

炙甘草 一錢

陳皮 一錢

生薑 三五片

當歸 二錢 溲泄者易以熟地

水一鍾半煎七八分溫服○如微寒欬嘔者加半夏一二錢

四柴胡飲

四為金數從氣分也○凡人元氣不足或恐

饑勞倦而外感風寒或六脉緊數微細正不勝邪等證必須培助元氣兼之解散庶可保全宜此主之若但知散邪不顧

全書卷五十一

新方 散陣

三

根本末有不元氣先敗者察之慎之

柴胡 一二三錢
炙甘草 一錢
生薑 三五七片
當歸 二三錢 瀉者少用

人參 二三錢或五七錢 酌而用之

水二鍾煎七八分溫服○如胸膈滯悶者加陳皮一錢

五柴胡飲 五 五為土數從脾胃也○脾土為五臟之本凡

中氣不足而外邪有不散者非此不可此與四柴胡飲相表裏但四柴胡飲止調氣分此則兼培血氣以逐寒邪尤切於時用者也神效不可盡述凡傷寒瘧疾痘瘡皆所宜用

柴胡 一二三錢
當歸 一二三錢
熟地 三五錢
白朮 二三錢

芍藥 錢半 炒用
炙甘草 一錢
陳皮 酌用或不必用

水一鍾半煎七分食遠熱服○寒勝無火者減芍藥加生薑

三五七片或炮乾薑一二錢或再加桂枝一二錢則更妙○

脾滯者減白朮○氣虛者加人參隨宜○腰痛者加杜仲○

頭痛者加川芎○勞倦傷脾陽虛者加升麻一錢

正柴胡飲 六 凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛瘧疾初起

等證凡血氣平和宜從乎散者此方主之

柴胡 一二三錢
防風 一錢
陳皮 一錢半
芍藥 二錢

甘草 一錢
生薑 三五片

水一鍾半煎七八分熱服○如頭痛者加川芎一錢○如熱而兼渴者加葛根一二錢○如嘔惡者加半夏一錢五分○如濕勝者加蒼朮一錢○如胸腹有微瀯者加厚朴一錢○如寒氣勝而邪不易解者加麻黃一二三錢去浮沫服之或蘓葉亦可

麻桂飲七

治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不能散者非此不可無論諸經四季凡有是證卽宜是藥勿謂夏月不可用也不必厚蓋但取津津微汗透徹爲度此實麻黃桂枝二湯之變方而其神效則大有超出二方者不可不爲細察

爲細察

官桂

一二錢

當歸

三四錢

炙甘草

一錢

陳皮

隨宜用或不用亦可

麻黃

二二三錢

水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫不拘時服○若陰氣不足者加熟地黃三五錢○若三陽併病者加柴胡二三錢○若元氣大虛陰邪難解者當以大溫中飲更迭爲用

大溫中飲入

凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑之氣身雖熾熱時猶畏寒卽在夏月亦欲衣被覆蓋或喜熱

湯或兼嘔惡泄瀉但六脉無力肩背怯寒邪氣不能外達等證此元陽大虛正不勝邪之候若非峻補托散則寒邪日深必致不救溫中自可散寒卽此方也服後畏寒悉除覺有躁熱乃陽回作汗佳兆不可疑之畏之○此外凡以素稟薄弱之輩或感陰邪時疫發熱困倦雖未見如前陰證而熱邪未甚者但於初感時卽速用此飲連進二三服無不隨藥隨愈真神劑也○此方宜與理陰煎麻桂飲相參用

熟地

三五七錢

冬白朮

三五錢

當歸

三五錢如泄瀉者不宜用或以山藥代之

人參

二錢甚者一兩或不用亦可

炙甘草

一錢

柴胡

二三四錢

麻黃

一二三錢

肉桂

一二錢

乾薑

炒熟一二錢或川椒生薑三五七片亦可

水二鍾煎七分去浮沫溫服或畧蓋取微汗○如氣虛加黃芪二三錢○如寒甚陽虛者加製附子一二錢○頭痛加川芎或白芷細辛○陽虛氣陷加升麻○如肚腹泄瀉宜少減柴胡加防風細辛亦可○嘗見傷寒之治惟仲景能知溫散如麻黃桂枝等湯是也亦知補氣而散如小柴胡之屬是也至若陽根於陰汗化於液從補血而散而雲騰致雨之妙則仲景猶所未及故予制此方乃邪從營解第一義也其功難悉所當深察

柴陳煎九

治傷風兼寒欬發熱痞滿痰等證

柴胡 二三錢

陳皮 一錢半

半夏 一錢

茯苓 二錢

甘草 一錢

生薑 三五片

水一鍾半煎七分食遠溫服○如寒勝者加細辛七八分○

如風勝氣滯者加蘓葉一錢五分○如冬月寒甚者加麻黃

一錢五分○氣逆多嗽者加杏仁一錢○痞滿氣滯者加白

芥子五七分

柴芩煎十

治傷寒表邪未解外內俱熱瀉痢煩渴喜冷氣

壯脈滑數者宜此主之及瘧痢並行內熱去血兼表邪發黃

等證

柴胡 二三錢

黃芩

梔子

澤瀉

木通 各二錢

枳殼 一錢五分

水二鍾煎八分溫服○如瘧痢並行鮮血純血者加芍藥二

錢甘草一錢○如濕勝氣陷者加防風一錢

柴苓飲十一

治風濕發黃發熱身痛脈緊表裏俱病小水不

利中寒泄瀉等證

柴胡 二三錢

猪苓

茯苓

澤瀉 各二錢

白朮 二三錢

肉桂 一二三錢

水一鍾半煎服○如寒邪勝者加生薑三五片○如汗出熱不退者加芍藥一二錢

柴胡白虎煎二十 治陽明溫熱表邪不解等證

柴胡二錢 石膏三錢 黃芩二錢 麥冬二錢

細甘草七分

水一鍾半加竹葉二十片煎服

歸葛飲三十 治陽明溫暑時證大熱大渴津液枯涸陰虛不

能作汗等證

當歸二五錢 乾葛二三錢

水二鍾煎一鍾以冷水浸涼徐徐服之得汗即解

柴葛煎十四 方在因陣十八

治瘟疫表裏俱熱

秘傳走馬通聖散十五 治傷寒陰邪初感等證○此方宜用

於倉卒之時其有質強而寒甚者俱可用

麻黃 炙甘草各一兩 雄黃二錢

右為細末每服一錢熱酒下即汗○或加川芎二錢

秘傳白犀丹十六 發散外感瘟疫癰毒等證

白犀角 麻黃去節 山茨菇 玄明粉

散陣

血竭

甘草 各一錢

雄黃 八分

右共為末用老薑汁拌丸如棗核大外以紅棗去核將藥填入棗內用薄紙裹十五層入砂鍋內炒令烟盡為度取出去棗肉每藥一錢入冰片一分麝香半分研極細磁碟收貯用時以角簪蘸麻油粘藥點眼大角輕者只點眼角重者仍用些須吹鼻男先左女先右吹點皆同如病甚者先吹鼻後點眼點後踈脚坐起用被齊項煖蓋半炷香時自當汗出邪解如汗不得出或汗不下達至腰者不治

又一製法將前藥用薑汁拌作二丸以烏金紙兩層包定外搗紅棗肉如泥包藥外約半指厚晒乾入砂鍋內再覆以砂盆用鹽泥固縫但留一小孔以候烟色乃上下加炭火先文後武待五色烟盡取出去棗肉每煖過藥一錢止加水片二分不用麝香○忌生冷麵食魚腥七情

右藥凡傷寒瘟疫及小兒痘毒壅閉癰毒吼喘及陰毒冷氣攻心或婦人吹乳或眼目腫痛鼻壅閉塞並皆治之

歸柴飲

七十

治營虛不能作汗及真陰不足外感寒邪難解者此神方也○如大便多澇者以冬木代當歸亦佳

當歸 一兩

柴胡 五錢

炙甘草 八分

水一鍾半煎服○或加生薑三五片○或加陳皮一錢○或
加人參

寒陣

保陰煎

治男婦帶濁遺淋色赤帶血脈滑多熱便血不

止及血崩血淋或經期太早凡一切陰虛內熱動血等證

生地

熟地

芍藥

山藥

川續斷

黃芩

黃柏

生甘草

水二鍾煎七分食遠溫服○如小水多熱或兼怒火動血者

各一錢半

一錢

加焦梔子一二錢○如夜熱身熱加地骨皮一錢五分○如

肺熱多汗者加麥冬棗仁○如血熱甚者加黃連一錢五分

○如血虛血滯筋骨腫痛者加當歸二三錢○如氣滯而痛

去熟地加陳皮青皮丹皮香附之屬○如血脫血滑及便血

久不止者加地榆一二錢或烏梅一二個或百藥煎一二錢

文蛤亦可○如少年或血氣正盛者不必用熟地山藥○如

肢節筋骨疼痛或腫者加秦艽丹皮各一二錢

加減一陰煎二

方在補陣九

治水虧火勝之甚者

抽薪飲^三

治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩

石斛

木通

梔子

炒

黃柏

各一錢

枳殼

錢半

澤瀉

錢半

細甘草

三分

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者冷服更佳○如熱在經絡肌膚者加連翹天花粉以解之○熱在血分大小腸者加槐蕊黃連以清之○熱在陽明頭面或躁煩便實者加生石膏以降之○熱在下焦小水痛澀者加草龍膽車前以利之○熱在陰分津液不足者加門冬生地芍藥之類以滋之○熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徒薪飲^四

治三焦凡火一切內熱漸覺而未甚者先宜清

以此劑其甚者宜抽薪飲

陳皮

八分

黃芩

二錢

麥冬

芍藥

黃柏

茯苓

牡丹皮

各一錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服○如多鬱氣逆傷肝脇助疼痛或致動血者如青皮梔子

大分清飲^五

治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛

或濕熱下利黃疸濁血邪熱畜血腹痛淋閉等證

茯苓

澤瀉

木通

各二錢

猪苓

梔子或倍之

枳殼

車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服○如內熱甚者加黃芩黃柏草龍膽之屬○如大便堅鞭脹滿者加大黃二三錢○如黃疸小水不利熱甚者加茵陳二錢○如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮各一錢五分

清流飲六

治陰虛挾熱瀉痢或發熱或喜冷或下純紅鮮

血或小水痛赤等證

生地

芍藥

茯苓

澤瀉各二錢

當歸一二錢

甘草一錢

黃芩

黃連各錢半

枳殼一錢

水一鍾半煎服○如熱甚者加黃柏○小水熱痛者加梔子

化陰煎七

治水虧陰涸陽火有餘小便癃閉淋濁疼癢等

證

生地黃

熟地黃

牛膝

猪苓

澤瀉

生黃柏

生知母各二錢

綠豆三錢

龍膽草錢半

車前子一錢

水二鍾加食鹽少許用文武火煎八分食前溫服或冷服○若水虧居多而陰氣大有不足者可適加熟地黃即用至一

一二兩亦可

茵陳飲^八

治挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利黃疸濕

熱閉澀等證

茵陳

焦梔子

澤瀉

青皮

各三錢

甘草^{一錢}

甘菊花^{二錢}

用水三四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一服可愈

清膈煎^九

治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮^{錢半}

貝母

二三錢

膽星

一二錢

海石

一錢

白芥子

五七分

木通

二錢

水一鍾半煎七分溫服○如火盛痰不降者加重便一小鍾

○如渴甚者加天花粉一錢○如熱及下焦小水不利者加

梔子一錢半○如熱在上焦頭面紅赤煩渴喜冷者加生石

膏二三錢○如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢○

如痰火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢或朴硝一

二錢酌宜用之

化肝煎^十

治怒氣傷肝因而氣逆動火致為煩熱脇痛脹

滿動血等證

青皮

陳皮

各二錢

芍藥

二錢

丹皮

梔子炒

澤瀉

各錢半如血見下部者以甘草代之

土貝母

二二三錢

水一鍾半煎七八分食遠溫服○如大便下血者加地榆小便下血者加木通各一錢五分○如兼寒熱加柴胡一錢○如火盛加黃芩一二錢○如脇腹脹痛加白芥子一錢○脹滯多者勿用芍藥

安胃飲十一

治胃火上衝呃逆不止

陳皮

山查

麥牙

木通

澤瀉

黃芩

石斛

水一鍾半煎七分食遠服○如胃火熱甚脉滑實者加石膏

玉女煎十一

治水虧火盛六脉浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神如神若大便溏泄者

乃非所宜

生石膏

三五錢

熟地

三五錢或一兩

麥冬

二錢

知母

牛膝

各錢半

水一鍾半煎七分溫服或冷服○如火之盛極者加梔子地骨皮之屬亦可○如多汗多渴者加北五味卡四粒○如小便不利或火不能降者加澤瀉一錢五分或茯苓亦可○如金水俱虧因精損氣者加人參二三錢尤妙

全書卷五十二
新方
太清飲三十

治胃火煩熱發斑嘔吐等證可與白虎湯出入

酌用

知母

石斛

木通

各一錢半

石膏

生用五錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服○或加麥門冬

綠豆飲四十

凡熱毒勞熱諸火熱極不能退者用此最妙

用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜亦可待水

冷或厚或稀或湯任意飲食之日或三四次不拘此物性

非苦寒不傷脾氣且善於解毒除煩退熱止渴大利小便

乃淺易中之最佳最捷者也若火盛口甘不宜厚味但畧

煮半熟清湯冷飲之尤善除煩清火

玉泉散五十

亦名一六甘露散

治陽明內熱煩渴頭痛一便

閉結溫疫斑黃及熱痰喘嗽等證○此益元散之變方也其

功倍之

石膏

六兩生用

粉甘草

一兩

右為極細末每服一二三錢新汲水或熱湯或人參湯調下

○此方加硃砂三錢亦妙

雪梨漿六十

六

解煩熱退陰火此生津止渴之妙劑也

用清香甘美大梨削去皮別用大碗盛清冷甘泉將梨薄切

浸於水中少頃水必甘美但頻飲其水勿食其粗退陰火極速也

滋陰八味丸七十治陰虛火盛下焦濕熱等證○此方變丸

為湯即名滋陰八味煎

山藥四兩 丹皮三兩 白茯苓三兩 山茱萸肉四兩

澤瀉三兩 黃柏鹽水炒三兩 熟地黃八兩 知母鹽水炒三兩

右加煉蜜搗丸梧桐子大或空心或午前用滾白湯或淡鹽

湯送下百餘丸

約陰丸八十治婦人血海有熱經脈先期或過多者或兼腎

火而帶濁不止及男婦大腸血熱使紅等證

當歸 白朮炒 芍藥酒炒 生地

茯苓 地榆 黃芩 白石脂醋煨

北五味 丹參 川續斷各等分

右為末煉蜜丸服○火甚者倍用黃芩○兼肝腎之火甚者仍加知母黃柏各等分○大腸血熱便紅者加黃連防風各等分

服蠻煎九十此方性味極輕極清善入心肝二臟行滯氣開

鬱結通神明養正除邪大有奇妙

生地

麥門冬

芍藥

石菖蒲

石斛

川丹皮

極香者 茯神 各二錢

陳皮 一錢

木通

知母 各一錢半

水一鍾半煎七分食遠服○如痰勝多鬱者加貝母二錢○

痰盛兼火者加膽星一錢五分○陽明火盛內熱狂叫者加

石膏二三錢○便結脹滿多熱者玄明粉二三錢調服或暫

加大黃亦可○氣虛神困者加人參隨宜

約管煎 十二

治血熱便血無論脾胃小腸大腸膀胱等證皆

宜用此

生地

芍藥

甘草

續斷

地榆

黃芩

槐花

荆芥穗

炒焦

烏梅 一個

水一鍾半煎七分食前服○如下焦火盛者可加梔子黃連

龍膽草之屬○如氣虛者可加人參白朮○如氣陷者加升

麻防風

熱陣

四味回陽飲

治元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩 製附子二二錢 炙甘草一二錢 炮乾薑二二三錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲二 治陰陽將脫等證

人參一二兩 或數錢 製附子二二三錢 炮乾薑二二三錢 炙甘草一二錢

熟地五錢或一兩 當歸身三錢 以冬木易之多多益善

水二鍾武火煎七八分溫服○如肉振汗多者加炙黃芪四

五錢或一兩或冬白朮三五錢○如泄瀉者加烏梅一枚或

北五味二十粒亦可○如虛陽上浮者加茯苓二錢○如肝

經鬱滯者加肉桂二三錢

理陰煎三 此理中湯之變方也○凡脾腎中虛等證宜剛

燥者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營之類欲

知調補當先察此○此方通治真陰虛弱脹滿嘔噦飲惡

心吐瀉腹痛婦人經遲血滯等證○又凡真陰不足或素多

勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或

面赤舌焦或雖渴而不喜冷飲或背心肢體畏寒但脈見無

力者悉是假熱之證若用寒涼攻之必死宜速用此湯照後

加減以溫補陰分托散表邪連進數服使陰氣漸充則汗從

陰達而寒邪不攻自散此最切於時用者也神效不可盡述

熟地 三五七錢
或一二兩

當歸 二三錢或
五七錢

炙甘草 一二錢
乾薑 炒黃色一
二三錢

或加桂肉 一二錢

水二鍾煎七八分熱服○此方加附子即名附子理陰煎再
加人參即名六味回陽飲治命門火衰陰中無陽等證○若
風寒外感邪未入深但見發熱身痛脈數不洪凡內無火證
素稟不足者但用此湯加柴胡一錢半或二錢連進一二服
其效如神若寒凝陰盛而邪有難解者必加麻黃一二錢放
心用之或不用柴胡亦可恐其清利也此寒邪初感溫散第
一方惟仲景獨知此義第仲景之溫散首用麻黃桂枝二湯

余之溫散即以理陰煎及大溫中飲為增減此雖一從陽分
一從陰分其跡若異然一逐於外一托於內而用溫則一也
學者當因所宜酌而用之○若陰勝之時外感寒邪脈細惡
寒或背畏寒者乃太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加
附子一二錢真神劑也或并加柴胡以助之亦可○若陰虛
火盛其有內熱不宜用溫而氣血俱虛邪不能解者宜去薑
桂單以三味加減與之或止加人參亦可○若治脾腎兩虛
水泛為痰或嘔或脹者於前方加茯苓一錢半或加白芥子
五分以行之○若泄瀉不止及腎泄者少用當歸或并去之

加山藥扁豆吳茱萸破故肉豆蔻附子之屬○若腰腹有痛
加杜仲枸杞○若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁之屬

養中煎四

治中氣虛寒為嘔為泄者

人參一二三錢

山藥炒二錢

白扁豆炒二錢

炙甘草一錢

茯苓二錢

乾薑炒黃一錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如噎膈氣滯者加陳皮一錢或
砂仁四分○如胃中空虛覺餒者加熟地三五錢

溫胃飲五

治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臍寒

嘔惡胎氣不安等證

人參一二三錢

或一兩

白朮炒一二錢

或一兩

扁豆二錢

炒

陳皮一錢

或不用

乾薑炒焦一錢

二三錢

炙甘草二錢

當歸一二錢

滑泄者勿用

水二鍾煎七分食遠溫服○如下寒帶濁者加破故紙二錢
○如氣滯或兼胸腹痛者加藿香丁香木香白豆蔻砂仁白
芥子之屬○如兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加
柴胡○如脾氣陷而身熱者加升麻五七分○如水泛為痰
而胸腹痞滿者加茯苓一二錢○如脾胃虛極大嘔大吐不
能止者倍用參朮仍加胡椒二三分許煎熟徐徐服之

五君子煎 六

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉而兼濕者

人參 二三錢

白朮

茯苓 各二錢

炙甘草 一錢

乾薑 炒黃一錢

水一鍾半煎服

六味異功煎 七

治證同前而兼微滯者

即前方加陳皮一錢○此即五味異功散加乾薑也

參薑飲 八

治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽氣短小兒吐乳等

證

人參 三五錢或倍之

炙甘草

三五分

乾薑

炮五分或一二錢或用煨生薑三五片

水一鍾半煎七八分徐徐服之○此方或陳皮或草撥或茯苓皆可酌而佐之

胃關煎 九

治脾腎虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢

等證

熟地 三五錢或一兩

山藥 炒二錢

白扁豆 炒二錢

炙甘草 一二錢

焦乾薑 一二三錢

吳茱萸 裝五七分

白朮 炒一二三錢

水二鍾煎七分食遠溫服○瀉甚者加肉豆蔻一二錢麩炒用或破故紙亦可○氣虛勢甚者加人參隨宜用○陽虛下脫不固者加製附子一二三錢○腹痛甚者加木香七八分

或加厚朴八分○滯痛不通者加當歸二三錢○滑脫不禁者加烏梅一個或北五味子二十粒○若丹邪侮脾者加肉桂一二錢

佐關煎十 治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒濕安脾胃此胃關煎之佐者也

- 厚朴炒一錢
- 陳皮炒一錢
- 山藥炒二錢
- 扁豆炒二錢
- 炙甘草七分
- 猪苓二錢
- 澤瀉二錢
- 乾薑炒一錢
- 肉桂一二錢

水一鍾半煎服○如腹痛甚者加木香二五分或吳茱萸亦

可○如瀉甚不止者或破故紙或肉豆蔻皆可加用

抑扶煎十 治氣冷陰寒或暴傷生冷致成瀉痢凡初起血氣未衰脾腎未敗或脹痛或嘔惡皆宜先用此湯此胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒濕傷臟霍亂邪實者最宜用此

- 厚朴
- 陳皮
- 烏藥各一錢五分
- 猪苓二錢
- 澤瀉二錢
- 炙甘草一錢
- 乾薑炮一錢
- 吳茱萸製五分

水一鍾半煎七分食遠溫服○如氣滯痛甚者加木香五七分或砂仁亦可○如血虛多痛者加當歸二錢○如寒濕勝

者加蒼朮一錢半

四維散

治脾腎虛寒滑脫之甚或泄痢不能止或氣虛

下陷二陰血脫不能禁者無出此方之右

人參 一兩

製附子 二錢

乾薑 炒黃 二錢

炙甘草 一二錢

烏梅肉

五分或一錢酌其味之微甚隨病人之意而用之或不用此即四味回陽飲也

右為末和勻用水拌濕蒸一飯頃取起烘乾再為末每服一

二錢溫湯調下

鎮陰煎

治陰虛於下格陽於上則真陽失守血隨而溢

以致大吐大動六脉細脫手足厥冷危在頃刻而血不能止

者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如治格陽喉痺上熱

者當以此湯冷服

熟地 一二兩

牛膝 二錢

炙甘草 一錢

澤瀉 半錢

肉桂 一二錢

製附子 五七分或一二三錢

水二鍾速煎服○如兼嘔惡者加乾薑炒黃一二錢○如氣

脫倦言而脉弱極者宜速速多加人參隨宜用之

歸氣飲

治氣逆不順呃逆嘔吐或寒中脾腎等證

熟地 三五錢

茯苓 二錢

扁豆 二錢

乾薑 炮

丁香

陳皮 各一錢

藿香 五分

炙甘草 八分

水一鍾半煎七分食遠溫服○中氣寒甚者加製附子○肝腎寒者加吳茱萸肉桂或加當歸

煖肝煎

十五

治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣等證

當歸

二二三錢

枸杞

三錢

茯苓

二錢

小茴香

二錢

肉桂

一二錢

烏藥

二錢

沉香

一錢或木香亦可

水一鍾半加生薑三五片煎七分食遠溫服○如寒甚者加

吳茱萸乾薑再甚者加附子

壽脾煎

十一

一名攝營煎

治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱

怒積勞及誤用攻伐等藥犯損脾陰以致中氣虧陷神覓不

寧大便脫血不止或婦人無火崩淋等證凡兼嘔惡尤為危候速宜用此單救脾氣則統攝固而血自歸源此歸脾湯之變方其效如神若犯此證而再用寒涼則胃氣必脫無不即斃者

白朮

二二三錢

當歸

二錢

山藥

二錢

炙甘草

一錢

棗仁

錢半

遠志

制三五分

乾薑

炮一二三錢

蓮肉

去心炒二十粒

人參

隨宜一二錢

急者用一兩

水二鍾煎服○如血未止加烏梅一個凡畏酸者不可用或加地榆一錢半亦可○滑脫不禁者加醋炒文蛤一錢下焦

虛滑不禁加鹿角霜二錢爲末攪入藥中服之氣虛甚者加炙黃芪二三錢○氣陷而墜者加炒升麻五七分或白芷亦可○兼溲泄者加補骨脂一錢炒用○陽虛畏寒者加製附子一二三錢○血去過多陰虛氣餒心跳不寧者加熟地七八錢或一二兩

三氣飲七 治血氣虧損風寒濕三氣乘虛內侵筋骨歷節痺痛之極及痢後鶴膝風痛等證

當歸

枸杞

杜仲

熟地

各二錢或五錢

牛膝

茯苓

芍藥

肉桂

各一錢

北細辛

或代以獨活

白芷

炙甘草

各一錢

附子

隨宜一二錢

水二鍾加生薑三片煎服○如氣虛者加入參白朮隨宜○風寒勝者加麻黃一二錢○此飲亦可浸酒大約每藥一斤可用燒酒六七升浸十餘日徐徐服之

五德丸

十八

治脾腎虛寒飧泄驚漉等證或暴傷生冷或受

時氣寒濕或酒濕傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

補骨脂

四兩酒炒

吳茱萸

製二兩

木香

二兩

乾薑

四兩炒

北五味

二兩或以肉豆蔻代之
麩炒用或用烏藥亦可

湯浸蒸餅丸桐子大每服六七十九甚者百餘丸滾白湯或
人參湯或米湯俱可下○腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

七德丸

九 治生冷傷脾初患瀉痢肚腹疼痛凡年壯氣血

未衰及寒濕食滯凡宜和胃者無不神效此即佐關煎之偏
裨也

台烏藥

吳茱萸

乾薑

蒼朮

木香

茯苓

補骨脂

神麩糊丸桐子大每服七八十九或百丸滾白湯送下

復陽丹

治陰寒嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證

附子

炮薑

胡椒

北五味

炙甘草

各一兩 白麩

右為末和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證用藥引送

下

黃芽丸

治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞

酸嘔吐等證此藥隨身常用甚妙

人參

焦乾薑

煉白蜜為丸芡實大常嚼服之

一 烝丹

治脾腎虛寒不時易瀉腹痛陽痿怯寒等證○

此即參附湯之變方也

人參

製附子

各等分

煉白蜜丸如綠豆大每用滾白湯送下三五分或一錢凡藥

餌不便之處或在途次隨帶此丹最妙

九 烝丹

治脾腎虛寒如五德丸之甚者

熟地

八兩

製附子

四兩

肉豆蔻

麪炒二兩

焦薑

吳茱萸

補骨脂

酒炒

萆薢

炒

五味子

炒各二兩

粉甘草

炒一兩

煉白蜜為丸或山藥糊丸如桐子大每服六七十丸或百丸

滾白湯下○如氣虛者加人參或二兩或四兩尤妙甚

溫臟丸

二四

治諸虫積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫

健脾胃以杜其源此方主之

人參

隨宜用無亦可

白朮

米泔浸炒

當歸

各四兩

芍藥

酒炒

茯苓

川椒

去合口者炒出汗

細樵肉

史君子

煨取肉

檳榔

各二兩

乾薑

炮

吳茱萸

湯泡一宿炒各一兩

右為末神麪糊為丸桐子大每服五七十丸或百丸饑時白

湯下○如臟寒者加製附子一二兩○臟熱者加黃連一二

兩

聖木煎二五

治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞滿或脇肋疼痛
或過用剋伐等藥致傷臟氣有同前證而脈息無力氣怯神
倦者速宜用此不得因其虛痞虛脹而畏膠白朮此中虛實
之機貴乎神悟也若痛脹覺甚者即以此煎送神香散最妙
若用治寒濕瀉痢嘔吐尤為聖藥

白朮

用冬朮味甘佳者五六七八錢炒或一二兩

乾薑炒

肉桂

各一錢

陳皮

酌用或不用

水一鍾半煎七分溫熱服○若治虛寒瀉痢嘔吐等證別入

參炙甘草之類當任意加用○若治中虛感寒則麻黃柴胡亦任意加用

固陣

秘元煎

治遺精帶濁等病此方專主心脾

遠志

八分炒

山藥

二錢炒

芡實

二錢炒

棗仁

炒搗碎二錢

白朮

炒

茯苓

各錢半

炙甘草

一錢

人參

一錢

五味

十四粒畏酸者去之

金櫻子

去核二錢

水二鍾煎七分食遠服○此治久遺無火不痛而滑者乃可

用之○如尚有火覺熱者加苦參一二錢○如氣大虛者加黃芪一二三錢

固陰煎

治陰虛滑泄帶濁淋遺及經水因虛不固等證

此方專主肝腎

人參

隨宜

熟地

三五錢

山藥

炒二錢

山茱萸

一錢半

遠志

七分炒

炙甘草

一二錢

五味

十四粒

兔絲子

炒香二錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如虛滑遺甚者加金櫻子肉二三錢或醋炒文蛤一錢或烏梅二個○如陰虛微熱而經血不固者加川續斷二錢○如下焦陽氣不足而兼腹痛溇泄

者加補骨脂吳茱萸之類隨宜用之○如肝腎血虛小腹瀉而血不歸經者加當歸二三錢○如脾虛多濕或兼嘔惡者加白朮一二錢○如氣喘不固者加炒升麻一錢○如兼心虛不眠或多汗者加棗仁二錢炒用

兔絲煎

治心脾氣弱凡遇思慮勞倦即苦遺精者宜此

主少

人參

二三錢

山藥

炒二錢

當歸

錢半

兔絲子

製炒四錢

棗仁

炒

茯苓

各錢半

炙甘草

一錢或五分

遠志

製四分

鹿角霜

為末每服加入四五匙

右用水一鍾半煎成加鹿角霜末調服食前○或加白朮一

二錢

惜紅煎四

治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血等證

白朮

山藥

炙甘草

地榆

續斷炒

芍藥炒

北五味十四粒

荆芥穗炒

烏梅一枚

水一鍾半煎七分食遠服○如火盛者加黃連黃芩○如脾

虛兼寒脾泄者加破故紙人參

苓朮兔絲丸五

治脾腎虛損不能收攝以致夢遺精滑困

倦等證

白茯苓

白朮

米泔洗炒

蓮肉

去心各四兩

五味

二兩酒蒸

山藥

炒二兩

杜仲

酒炒三兩

炙甘草

五錢

兔絲子

用好水淘淨入陳酒浸一日文火煮極爛搗為餅焙乾為末 十兩

右用山藥末以陳酒煮糊為丸桐子大空心滾白湯或酒下

百餘丸○如氣虛神倦不能收攝者加人參三四兩尤妙

固真丸六

治夢遺精滑

兔絲子

一斤淘洗淨用好酒浸三日煮極熟搗膏曬乾或用淨白布包蒸亦佳

牡蠣

煨四兩

金櫻子

去子蒸熟四兩

茯苓

酒拌蒸晒四兩

右蜜丸空心好酒送下三錢或塩湯亦可

粘米固腸糕七 治脾胃虛寒或因食滯氣滯腹痛泄瀉久

不止者多服自效

用白糯米滾湯淘洗炒香熟爲粉每粉一兩加乾薑末炒熟者二分半白糖二錢拌勻於饑時用滾水調服一二兩如有微滯者加陳皮炒末二分或砂仁末一分俱妙○一法用陳老米粉亦妙○此與古方固類四十九泄瀉經驗方大同小異并補陣養元粉畧同

玉關丸八 治腸風血脫崩漏帶濁不固諸藥難效者宜用

此丸兼煎藥治之及瀉痢滑泄不能止者亦宜用此

白麩炒熟四兩 枯礬二兩 文蛤醋炒黑二兩 北五味炒一兩

訶子二兩半生半炒

右爲末用熟湯和丸梧子大以温補脾腎等藥隨證加減煎湯送下或人參湯亦可○如血熱妄行者以涼藥送下

鞏隄丸九 治膀胱不藏水泉不止命門火衰小水不禁等

證

熟地二兩 兔絲子酒煮二兩 白朮炒二兩 北五味

益智仁酒炒 故紙酒炒 附子製 茯苓

家韭子 炒各一兩

右為末山藥糊丸如桐子大每服百餘丸空心滾湯或溫酒下○如兼氣虛必加人參一二兩更妙

敦阜糕 十

治久瀉久痢腸滑不固妙方及婦人帶濁最佳

白麪 炒黃二兩

冬白木 炒黃一兩

破故紙 炒五錢

右共為末臨服時加白糖隨宜用清滾湯食前調服如糕法如胃寒者每一兩加乾薑炒末五分或一錢如氣有不順或痛或嘔每末一兩加丁香一錢 如滑泄不禁者每兩加粟殼末炒黃一錢 若以作丸則宜三味等分用即名敦阜丸

因陣

逍遙飲 一

治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日

枯漸至經脈不調者

當歸 二三錢

芍藥 錢半

熟地 三五錢

棗仁 二錢

茯神 錢半

遠志 製三五分

陳皮 八分

炙甘草 一錢

水二鍾煎七分食遠溫服○如氣虛者加人參一二錢○如經水過期兼痛滯者加酒炒香附一二錢

决津煎 二

治婦人血虛經滯不能流暢而痛極者當以水

濟水若江河一決而積垢皆去宜用此湯隨證加減主之○
此用補為瀉之神劑也如氣虛者宜少用香陳之類甚者不
用亦可

當歸 三五錢 澤瀉 一錢 牛膝 二錢 肉桂 一二三錢

熟地 二三錢或五七錢或不用亦可 烏藥 一錢如氣虛者不用亦可

水二鍾煎七八分食前服○如嘔惡者加焦薑一二錢○如
陰滯不行者非加附子不可○如氣滯而痛脹者加香附一
二錢或木香七八分○如血滯血澁者加酒炒紅花一二錢
○如小腹不煖而痛極者加吳茱萸七八分○如大便結澀

者加肉蓯蓉一二三錢微者以山查代之

五物煎 三 治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹痛急產難經

滯及痘瘡血虛寒滯等證神效○此卽四物湯加肉桂也

當歸 三五七錢 熟地 三四錢 芍藥 二錢酒炒 川芎 一錢

肉桂 一二三錢

水一鍾半煎服○兼胃寒或嘔惡者加乾薑炮用○水道不
利加澤瀉或猪苓○氣滯者加香附或丁香木香砂仁烏藥
○陰虛痲痛者加小茴香○血瘀不行臍下若覆杯漸成積
塊者加桃仁或酒炒紅花○痘瘡血虛寒勝寒邪在表者加

細辛麻黃柴胡紫蘓之屬

調經飲 四

治婦人經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸 三五錢

牛膝 二錢

山查 一二錢

香附 二錢

青皮

茯苓

各一錢半

水二鍾煎七分食遠服○如因不避生冷而寒滯其血者加

肉桂吳茱萸之類○如兼脹悶者加厚朴一錢或砂仁亦可

○如氣滯者加烏藥二錢或痛在小腹者加小茴香一錢半

通瘀煎 五

治婦人氣滯血積經脈不利痛極拒按及產後

瘀血實痛并男婦血逆血厥等證

歸尾

三五錢

山查

香附

紅花

新者炒黃各二錢

烏藥

一二錢

青皮

錢半

木香

七分

澤瀉

錢半

水二鍾煎七分加酒一二小鍾食前服○兼寒滯者加肉桂

一錢或吳茱萸五分○火盛內熱血燥不行者加炒梔子一

二錢○微熱血虛者加芍藥二錢○血虛澁滯者加牛膝○

血瘀不行者加桃仁三十粒去皮尖用或加蘓木玄胡索之

類○瘀極而大便結燥者加大黃一二三錢或加芒硝蓬朮

亦可

胎元飲 六

治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減

用之或間日或二三日常服一二劑

人參 隨宜

當歸

杜仲

芍藥 各二錢

熟地 二錢

白朮 錢半

炙甘草 錢

陳皮 七分無滯者不必用

水二鍾煎七分食遠服○如下元不固而多遺濁者加山藥

補骨脂五味之類○如氣分虛甚者倍白朮加黃芪但芪木

氣浮能滯胃口倘胸膈有飽悶不快者須慎用之○如虛而

兼寒多嘔者加炮薑七八分或一二錢○如虛而兼熱者加

黃芩一錢五分或加生地二錢去杜仲○如陰虛小腹作痛

加枸杞二錢○如多怒氣逆者加石膏附無妨或砂仁亦妙○

如有所觸而動血者加川續斷阿膠各一二錢○如嘔吐不

止加半夏一二錢生薑三五片

固胎煎 七

治肝脾多火多滯而屢墮胎者

黃芩 二錢

白朮 一二錢

當歸

芍藥

阿膠 各錢半

陳皮 一錢

砂仁 五分

水一鍾半煎服

涼胎飲 八

治胎氣內熱不安等證

生地

芍藥 各二錢

黃芩

當歸 各一錢

甘草 生七分

枳殼

石斛 各一錢

茯苓 錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服○如熱甚者加黃柏一二錢

滑胎煎九

胎氣臨月宜常服數劑以便易生

當歸

三五錢

川芎

七分

杜仲

二錢

熟地

三錢

枳殼

七分

山藥

二錢

水二鍾煎八九分食前溫服○如氣體虛弱者加人參白朮
隨宜用之○如便實多滯者加牛膝一二錢

殿胞煎十

治產後兒枕疼痛等證如神

當歸

五七錢
或一兩

川芎

炙甘草

各一錢

茯苓

一錢

肉桂

一二錢或
五七分

水一鍾煎八分熱服○如脉細而寒或嘔者加乾薑炒黃色

一二錢○如血熱多火者去肉桂加酒炒芍藥一二錢○如

脉弱陰虛者加熟地三五錢○如氣滯者加香附一二錢或

烏藥亦可○腰痛加杜仲一二錢

脫花煎一

凡臨盆將產者宜先服此藥催生最佳并治產

難經日或死胎不下俱妙

當歸

七八錢
或一兩

肉桂

一二錢
或三錢

川芎

牛膝

各二錢

車前子

錢半

紅花

一錢

催生者
不用此味亦可

水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數杯亦妙○若胎死腹中

或堅滯不下者加朴硝三五錢即下○若氣虛困劇者加人參隨宜○若陰虛者必加熟地三五錢

九蜜煎十一 治產後陽氣虛寒或陰邪入臟心腹疼痛嘔吐不食四肢厥冷○此與大岩蜜湯略同而稍勝之

當歸

熟地

各三錢

芍藥

酒炒焦

茯苓

各錢半

炙甘草

乾薑

炒

肉桂

北細辛

各一錢

吳茱萸製五分

水二鍾煎服

清化飲十三

治婦人產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸火

不清等證

芍藥

麥冬

各二錢

丹皮

茯苓

黃芩

生地

各二錢

石斛

一錢

水一鍾半煎七分食遠溫服○如覺骨蒸多汗者加地骨皮一錢半○熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢○下熱使澀者加木通一二錢或黃柏梔子皆可隨證用之○如兼外邪發熱加柴胡一二錢○愚按丹溪云芍藥酸寒大伐發生之氣產後忌用之此亦言之過也夫芍藥之寒不過於生血藥中稍覺其清耳非若芩連輩之大苦大寒者也使芍藥猶

忌如此則他之更寒者尤為不可用矣余每見產家過慎者或因太煖或因年力方壯而飲食藥餌太補過度以致產後動火者病熱極多若盡以產後為虛必須皆補豈盡善哉且芍藥性清微酸而收最宜於陰氣散失之證豈不為產後之要藥乎不可不辨也

毓麟珠

十四

治婦人氣血俱虛經脈不調或斷續或帶濁或

腹痛或腰痠或飲食不甘瘦弱不孕服一二劑即可受胎凡種子諸方無以加此

人參

白朮

土炒

茯苓

芍藥

酒炒各二兩

川芎

炙甘草

各一兩

當歸

熟地

蒸搗各四兩

兔絲子

製四兩

杜仲

酒炒

鹿角霜

川椒

各二兩

右為末煉蜜丸彈子大每空心嚼服一二丸用酒或白湯送下或為小丸吞服亦可○如男子制服宜加枸杞胡桃肉鹿角膠山藥山茱萸巴戟肉各二兩○如女人經遲腹痛宜加酒炒破故肉桂各一兩甚者再加吳茱萸五錢湯泡一宿炒用○如帶多腹痛加破故一兩北五味五錢或加龍骨一兩醋煨用○如子宮寒甚或泄或痛加制附子炮乾薑隨宜○如多鬱怒氣有不順而為脹為滯者宜加酒炒香附二兩或

甚者再加沉香五錢○如血熱多火經早內熱者加川續斷地骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此或以湯引酌宜送下亦可

資育丹

治陽痿精衰虛寒無子等證妙方

熟地八兩 白朮用冬朮 當歸八兩 枸杞各六兩

杜仲酒炒 仙茅酒蒸 巴戟肉甘草湯炒 山茱萸

淫羊藿羊脂拌炒 肉苁蓉酒洗 韭子炒黃各四兩 蛇床子微炒

附子制 肉桂各二兩

右煉蜜丸服○或加人參鹿茸亦妙

柴歸飲

治痘瘡初起發熱未退無論是否疑似之

間均宜用此平和養營之劑以為先着有毒者可托有邪者可散實者不致助邪虛者不致損氣○凡陽明實熱邪盛者宜升麻葛根湯如無實邪則悉宜用此增減主之

當歸二三錢 芍藥或生或炒 柴胡一錢或錢半

荆芥穗一錢 炙甘草七分或一錢

水一鍾半煎服或加生薑三片○血熱者加生地○陰虛者加熟地○氣虛脈弱者加人參○虛寒者加炮薑肉桂○火盛者加黃芩○熱渴者加乾葛○腹痛者加木香砂仁○嘔

惡者加炮薑陳皮○若治麻疹或以荆芥易乾葛○陰寒盛而邪不能解者加麻黃桂枝

疎邪飲十六

治痘疹初起發熱凡血氣強盛無藉滋補者單

宜解邪用此方為主以代升麻葛根湯及蕪葛湯等方最為

妥當

柴胡倍用

芍藥倍用

蕪葉

荆芥穗

炙甘草減半

水一鍾半煎服○無火者加生薑三片○火盛內熱者加黃

芩○渴者加乾葛

涼血養營煎七

治痘瘡血虛血熱地紅熱渴或色燥不起

及便結溺赤凡陽盛陰虛等證悉宜用此

生地黃

當歸

芍藥

生甘草

地骨皮

紫草

黃芩

紅花

水一鍾半煎服量兒大小加減用之○渴加天花粉○肌熱無汗加柴胡○熱毒甚者加牛旁子木通連翹之屬○血熱毒不透者加犀角

柴葛煎八

治痘疹表裏俱熱散毒養陰及瘟疫等證

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

甘草 連翹

水一鍾半煎服

搜毒煎九

解痘疹熱毒熾盛紫黑乾枯煩熱便結純陽等

證

紫草

地骨皮

牛旁子杵

黃芩

木通

連翹

蟬退

芍藥等分

水一鍾半煎服○渴者加天花粉麥門冬○陽明熱甚頭面

牙齦腫痛者加石膏知母○大腸乾結實臍腹實脹者加大

黃芒硝○血熱妄行者加犀角童便○小水熱閉者加山梔

車前子○兼表熱者加柴胡

六物煎二

治痘疹血氣不充隨證加減用之神效不可盡

述并治男婦氣血俱虛等證

炙甘草

當歸

熟地

或用地

川芎

三四分 不宜多

芍藥

俱隨宜 加減

人參

或有或無隨虛實用 之氣不虛者不必用

右咀用水煎服○如發熱不解或痘未出之先宜加柴胡以

疎表或加防風佐之○如見點後痘不起發或起而不貫或

貫而漿薄均宜單用此湯或加糯米人乳好酒肉桂川芎以

助營氣○如氣虛痒塌不起加州山甲炒用○如紅紫血熱

不起宜加紫草或犀角○如脾氣稍滯者宜加陳皮山查○
 如胃氣虛寒多嘔者加乾薑炒用或加丁香○如腹痛兼滯
 者加木香陳皮○表虛氣陷不起或多汗者加黃芪○氣血
 俱虛未起未貫而先癢者加肉桂白芷○如元氣大虛寒戰
 咬牙泄瀉宜去芍藥加黃芪大附子乾薑肉桂

六氣煎二

治痘瘡氣虛癢癩倒陷寒戰咬牙并治男婦陽

氣虛寒等證

黃芪炙

肉桂

人參

白朮

當歸

炙甘草

右咀水煎服○加減法照前六物煎

九味異功煎二

治痘瘡寒戰咬牙倒陷嘔吐泄瀉腹痛虛

寒等證○用代陳氏十二味異功散等方

人參二三錢

黃芪炙一錢

當歸

熟地各二錢

炙甘草七分或一錢

丁香三五分或一錢

肉桂一錢

乾薑炮一錢

製附子一二錢

右量兒大小加減用水一鍾半煎七分徐徐與服之○如泄
 瀉腹痛加肉豆蔻麩炒一錢或加白朮一二錢

透邪煎二

凡麻疹初熱未出之時惟恐誤藥故云未出之

先不宜用藥然解利得宜則毒必易散而勢自輕減欲求安當當先用此方為主

當歸 二三錢 芍藥 酒炒一錢 防風 七八分 荆芥 一錢

炙甘草 七分 升麻 三分

水一鍾半煎服○如熱甚脈洪滑者加柴胡一錢○此外凡有雜證俱可隨宜加減

牛膝煎 二四 截瘧大效凡邪散已透而血氣微虛者宜此主之

牛膝 二錢 當歸 陳皮 各三錢

右用好酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎至八分溫服

何人飲 二五 截瘧如神凡氣血俱虛久瘧不止或急欲取效者宜此主之

何首烏 自二三錢以至一兩隨輕重用之 當歸 二三錢 人參 三五錢或一兩隨宜

陳皮 二三錢大虛者不必用 煨生薑 三片多寒者用三五錢

水二鍾煎八分於發前二三時溫服之○若善飲者以酒一鍾浸一宿次早加水一鍾煎服亦妙再煎不必用酒

追瘧飲 又二五 截瘧甚佳凡血氣未衰屢散之後而瘧有不止者用此截之已經屢驗

何首烏一兩 當歸 甘草 半夏

青皮 陳皮 柴胡各三錢

右用井水河水各一鍾煎一鍾粗亦如之同露一宿次早溫服一鍾飯後食遠再服一鍾

木賊煎二六 凡瘡疾形實氣強多濕多痰者宜此截之大效

半夏 青皮各五錢 木賊 厚朴各三錢

白蒼朮 檳榔各一錢

用陳酒一鍾煎八分露一宿於未發之先一時溫服

牙皂散二七 治胃脘痛劇諸藥不效者服此如神

用牙皂燒存性以烟將盡為度研末用燒酒調服一錢許即

效

荔枝散二八 治疝氣痛極凡在氣分者最宜用之并治小腹

氣痛等證神效○又心腹久痛方如後

荔枝核炮微焦 大茴香等分炒

右為末用好酒調服二三錢○如寒甚者加制過吳茱萸減半用之○凡心腹胃脘久痛屢觸屢發者惟婦人多有之用

荔枝一錢木香八分為末每服一錢清湯調服數服除根

豕膏二九 內經曰癰發於隘中名曰猛疽猛疽不治化為膿

膿不寫塞咽半日死其化為膿者寫則合豕膏塗其三日已
○此必以猪板油煉淨服之也

又萬氏方○治肺熱暴瘖○用猪脂一斤煉過以白蜜一斤
再煉少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈○按此方最能潤
肺潤腸凡老人痰嗽不利及大腸秘結者最宜用之

又千金方○治關格閉塞○用猪脂薑汁各二升微火煎至
二升加酒五合和煎分服之

愚意先以當歸半斤濃煎取汁煉過猪脂一斤同煉去其水
氣乃入白蜜一斤再煉少頃濾淨收貯不時挑服用治老人

之秘結及噎膈閉結等證必無不妙如果陽氣不行者仍加
生薑四兩同當歸煎入或宜酒者以酒送服亦可或氣有不
利者加杏仁二兩去皮尖同煎入皆妙或有滯者當以饒
代蜜更妙是即內經所謂以辛潤之也

菴傷寒結胸法三十 凡病傷寒結胸其有中氣虛弱不堪攻
擊內消者須以此法外菴之則滯行邪散其效如神

葱白頭

生薑

生蘿蔔

此味加倍如無以子代

右用葱薑各數兩蘿蔔倍之共搗一處炒熱用手中或白布
包作大餅菴胸前脹痛處此藥須分二包冷則輪換之無

不即時開通汗出而愈但不宜太熱恐炮烙難受也

又法以大蒜一二十頭搗爛攤厚紙或薄絹上貼於臍處少

頃卽散用治一切脹痛無不神妙

連翹金貝煎

治陽分癰毒或在臟腑肺膈胸乳之關者

此方最佳甚者連用數服無有不愈

金銀花

貝母

土者更佳

蒲公英

夏枯草

各三錢

紅藤 七八錢

連翹

一兩或五七錢

用好酒二碗煎一碗服服後煖臥片時○火盛煩渴乳腫者

加天花粉○若陽毒內熱或在頭項之間者用水煎亦可

連翹歸尾煎

治一切無名癰毒丹毒流注等毒有火者

最宜用之

連翹 七八錢

歸尾 二錢

甘草 一錢

金銀花

紅藤 各四錢

用酒煎服如前○如邪熱火盛者加槐蕊二三錢

桔梗杏仁煎

此桔梗湯之變方也○治欬嗽吐膿痰中

帶血或胸膈隱痛將成肺癰者此方為第一

桔梗

杏仁

甘草

各一錢

阿膠

金銀花

麥冬

百合

夏枯草

連翹 各二錢

貝母 三錢

枳殼 錢半

紅藤 三錢

水二鍾煎八分食遠服○如火盛兼渴者加天花粉二錢

當歸 蒺藜煎 三四

治癰疽瘡疹血氣不足邪毒不化內無實

熱而腫痛淋漓者悉宜用之此與芍藥 蒺藜煎相為音正也

當酌其詳

當歸

熟地

芍藥 酒炒

何首烏

各一錢

炙甘草

防風

川芎

荆芥穗

白芷

白蒺藜

炒鴉碎三錢或五錢

右或水或

用二鍾煎服然水不如酒或以水煎服後飲酒

數杯以行藥方亦可○陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加

乾薑附子○氣虛不化者加黃芪人參○毒陷不能外達者

加川山甲或皂刺

芍藥 蒺藜煎 三五

治通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡

神效外以蟬蛸粉敷之

龍膽草

梔子

黃芩

木通

澤瀉

各錢半

芍藥

生地

各二錢

白蒺藜

連刺梔碎五錢甚者

一兩

水二鍾煎八分食遠服○如火不甚者宜去龍膽梔子加當

歸茯苓薏仁之屬○如濕毒甚者加土茯苓五錢或一二兩

降癰散 二六

治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即消已成

者斂毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛勢凶者宜先用此方其解毒散毒之功神效最速 若堅頑深固者宜用後方

薄荷

辛佳者用葉

野菊花

連根葉各一握

土貝母

半之

茅根

一握

右乾者可為末鮮者可搗爛同貝母研勻外將茅根煎濃湯去粗用調前末乘熱敷患處仍留前劑湯頃煖不時潤於藥上但不可用冷湯冷則不散不行反能為痛約敷半日即宜

換之真妙方也

後方 凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

腦荷

倍用

生南星

土貝母

朴硝

各等分

石灰

風化者亦倍用或倍倍用之

右同為末用鹽酒調杵研粘敷患處經宿乾即易之不必留頭若膿成者留頭亦可或炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香或冰片少許更妙

百草煎 三七

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒

本草卷五十一

新方 因陣

三

濕氣留聚走注疼痛等證無不奇效

百草 凡田野山間者無論諸品皆可取用然猶以山草

為勝辛香者佳冬月可風乾者須預為收採之

右不論多寡取以多煎濃湯乘熱薰洗患處仍用布帛蘸熨良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘但以頻數為善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者可以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不利湯得藥性則湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以煎膏者其義亦此此誠外科中最要最佳之法亦傳之方外人者也○若

換之真妙方也

後方 凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方

腦荷 信用

生南星 無代 土貝母

朴硝 各等分

石灰 風化者亦信用或倍用之

右同為末用鹽酒調杵稠粘敷患處經宿乾即易之不必留頭若膿成者留頭亦可或炒熟攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用熟茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香或冰片少許更妙

百草煎 三七

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒

濕氣閉聚走注疼痛等證無不奇效
百草 凡田野山間者無論諸品皆可取用然猶以山草
為勝辛香者佳冬月可用乾者須預為收採之
右不論多寡取以多煎濃湯乘熱薰洗患處仍用布帛蘸慰
良久務令藥氣蒸透然後敷貼他藥每日二三次不拘但以
頻數為善蓋其性之寒者可以除熱熱者可以散寒香者可
以行氣毒者可以解毒無所不用亦無所不利湯得藥性則
湯氣無害藥得湯氣則藥力愈行凡用百草以前煎膏者其義
亦此此誠外科中最要最佳之法亦傳之方外人者也○若

洗水鼓腫脹每次須用草二三十斤煎濃湯二三鍋用大盆
盛貯以蓆簾遮風薰洗良久每日一次或二次內服廓清飲
分利等劑妙甚

蝶蛸散 三八

治濕熱破爛毒水淋漓等瘡或下部腎囊足股

腫痛下疳諸瘡無不神效○又海藏治下疳方在外科下疳
門

海蝶蛸 不必人中白 或人中黃礪
浸淡

右為細末先以百草多煎濃湯乘熱薰洗後以此藥摻之如
乾者以麻油或熬熟猪油或蜜水調敷之○若腫而痛甚者

加冰片少許更妙○若濕瘡膿水甚者加蜜陀僧等分或煨過官粉亦可或煨制爐甘石更佳

腸癰秘方

三九

凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止

者是若毒氣不散漸大內攻而潰則成大患急宜以此藥治之

先用紅藤一兩許以好酒一碗煎一碗午前一服醉臥之

○午後用紫花地丁一兩許亦如前煎服服後痛必漸止

為效然後服後末藥除根神妙

當歸 五錢

蟬退

僵蚕

各一錢

天龍

大黃

各一錢

石蠅

五錢此草藥也

老蜘蛛

一個促放新瓦上以

酒鍾蓋定外用火煨乾存性

右共為末每空心用酒調送一錢許日逐漸服自消

槐花蕊

四十

治楊梅瘡下疳神方

凡綿花瘡毒及下疳初感或毒盛經久難愈者速用新槐蕊揀淨不必炒每食前用清酒吞下三錢許早午晚每日三服服至二三升則熱毒盡去可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮此經驗神方也如不能飲即用滾水盪湯俱可送下但不及酒送之效捷也

飛丹散

四一

治寒濕風濕脚腿等瘡

飛丹

人中黃

白更妙

輕粉

水粉

各等分

為末凡濕爛者可以乾摻外用油紙包蓋○若乾陷者以猪骨髓或猪油調貼之○先以百草煎湯乘熱薰洗然後貼之日洗數次妙

綿花瘡點藥

四二

杏仁

取霜

輕粉

真者

二味等分為末敷於瘡上二三日即痂脫而落

又武定侯方用雄黃錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢同為

末用雄猪胆汁調敷之二三日即愈百發百中天下第一方

鷄子黃連膏

四三

治火眼暴赤疼痛熱在膚腠淺而易解者

用此點之數次可愈若熱由內發火在陰分者不宜外用涼藥非惟不能去內熱而且以閉火邪也用鷄子一枚開一小竅單取其清盛以磁碗外用黃連一錢研為粗末摻於鷄子清上用筋徹底速打數百使成浮沫約得半碗許即其度矣安放少頃用筋撥開浮沫傾出清汁用點眼皆勿得緊閉眼胞擠出其藥必熱淚湧出數次即愈○內加水片少許尤妙○若鷄子小而清少者加水二三匙同打亦可

金露散

四四

治赤目腫痛翳障諸疾

天竹黃

釋辛香者用

海螵蛸

不必浸洗

月石

各一兩

硃砂

飛

爐甘石

片子者佳煨淨童便七次飛淨各八錢

右為極細末磁瓶收貯每用時旋取數分研入水片少許諸目疾皆妙○若治內外眥障取一錢許加珍珠八厘膽礬三厘內珍珠須放豆腐中蒸熟用○若爛絃風眼每一錢加銅綠飛丹各八厘○如赤眼腫痛每一錢加乳香沒藥各半分二辛煎四五治陽明胃火牙根口舌腫疼不可當先用此湯漱之漱後傳以三香散或仍服清胃等藥以治其本

北細辛

二錢

生石膏

一兩

右二味用水二碗煎一碗乘熱頻嗽之

水玉散

四六

治牙疳牙痛口瘡齒齲喉痺

生石膏

一兩

月石

七錢

水

三分

殭蚕

一錢

右為極細末小磁瓶盛貯敷之吹之

水白散

四七

治口舌糜爛及走馬牙疳等證

人中白

倍用之

水片

少許

銅綠

用醋制者

杏仁

二味等分

右為細末敷患處○此方按之古法有以人中白七分與枯礬三分同用者○又有以蜜炙黃柏與人中白等分仍加水

片同用者是皆可師之法諸當隨宜用之

代匙散 四八

治喉痺

月石

石膏

各一錢

腦荷

五分

膽礬

五分

粉草 三分

殭蚕

炒五分

冰

一分

皂角

炙烟盡五分

右為細末用竹管頻吹喉中○加牛黃五分更佳

三香散 四九

治牙根腫痛

丁香

川椒

取紅等分

冰片

少許

右為末敷痛處○如無川椒以萆撥代之亦可

固齒將軍散 五十

治牙痛牙傷胃火糜腫久之牢牙固齒

錦紋大黃

炒微焦

杜仲

炒半黑各十兩

青塩

四兩

右為末每日清晨擦漱火盛者嚙之亦可

薰芥方 五一

硃砂

雄黃

銀硃

各三分同研

大楓子

木别子 各三個

右將大楓木别先搗碎乃入前三味拌勻外以乾艾鋪捲成

筒約長二寸許足矣凡薰時須將徧身疥痂悉行抓破薰之

始效後五六日復薰一筒無不悉愈

杖丹膏 五二

猪板油 半斤 黃占 二兩 輕粉 三錢 水銀 三錢

冰片 三分

先將水銀輕粉同研細俟猪油熬熟去滓先下黃占鎔化後入末藥攪勻收貯以水浸二三時令出火毒用竹紙攤貼覺熱即換輕者即愈重者不過旬日

銀硃烟 五三 治頭髮生虱及諸瘡之有虫者

用銀硃四五分揩擦厚紙上點着置一乾碗中上用一濕碗露縫覆之其烟皆着於濕碗之上乃用指揩擦髮中覆以毡帽則蟣虱皆盡矣○此烟以棗肉和捻作餅或作丸或擦於

猪鷄熟肝之間用貼諸瘡癬之有虫者及虫蝕肛門者以綿裹棗丸納肛門中一宿無不神效須留綿帶在外以便出之

雷火鍼 五四 治風寒濕毒之氣留滯經絡而為痛為腫不能

散者

五月五日取東引桃枝去皮兩頭削如鷄子尖樣長一二寸許鍼時以鍼向燈上點着隨用紙三五層或布亦可貼蓋患處將熱鍼按於紙上隨即念呪三遍病深者再燃再刺之立愈○呪曰天火地火三昧真火鍼天天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人人得長生百病消除萬病消滅吾奉 太上老君急

急如律令

又雷火鍼新方乃以藥爲鍼者其法更妙

白芷

獨活

川芎

細辛

牙皂

川山甲

炮倍用

丁香

枳殼

松香

雄黃

乳香

沒藥

杜仲

桂枝

各一錢

硫黃

一錢

射香

不拘

熟艾

二三兩

右搗爲粗末和勻取艾鋪底摻藥於上用上好皮紙捲筒先須用線絆約兩頭防其伸長然後加紙再捍務令極實粗如

鷄子尖樣是其度也乃用鷄子清盡刷外層捲而裹之陰乾

用法如前○一方有巴豆仁八分班蝥三錢去頭足翅用

疥癬光 五五

治疥瘡搽上卽愈癬瘡亦妙

松香 一錢

水銀

硫黃

枯礬

各一錢

樟腦 各二錢此

麻油

右先將松香水銀加麻油少許研如糊後入三味研如膏擦之神效

鷺掌瘋四方 五六附錄

猪胰一具去油勿經水

花椒 三錢

右用好酒溫熱將二味同浸二三日取膜不時擦手微火烘之自愈

又方 用白砒三錢打如豆粒以麻油一兩熬砒至黑去砒用油擦手微火烘之不過二三次即愈

又方 用葱五六根椎破再用花椒一把同入磁瓦罐中入醋一碗後以滾湯衝入薰洗數次即愈

又方 用穀樹葉煎湯溫洗以火烘乾隨用柏白油擦之再以火烘乾少頃又洗又烘如此日行三次不過三五日即愈

秘傳水銀膏 五七

擦治楊梅瘋毒潰爛危惡多年不愈者經

驗神方

黃蘗

黃連

各一錢

川大黃

五分二味另研

雄黃

膽礬

青黛兒茶

銅青

各三分

輕粉

枯礬

各四分

大楓子

去油取淨霜五分黑者勿用

珍珠

一分半生用

水

一分半二味另研

人言

人壯者七厘弱者半分中者六厘

右十四味為極細末分作三分每分約一錢八分

番打麻 另為末若瘡重而人壯能食者每分用五分人

弱不起者每分用三分中者四分以末入前藥各分內

研勻

水銀 人健者每分用一兩或八九錢中者或五六錢卧床不起而極弱者只可用三錢決不可再多矣

石先將麻末并前藥各一分俱入蓋內再入真芝麻油少許用手指研開務使汞藥混為一家漸次增油久研以不見汞星為度大約如稀糊可矣○一擦法用此藥擦手足四腕動脈處每藥一分務分擦三日每日早晚各擦一次每次以六七百數為度擦完用布包之擦藥時凡周身畧有破傷處俱用無麝膏藥貼之膏藥須厚攤每二日一換換時不可經風

常須避帳幔中冬月須用厚被煖炕他時亦須常煖南方則多用被褥蓋墊可也擦至七日毒必從齒縫中發出口吐臭涎若口齒破爛出血但用甘草蜂房煎湯候冷漱解不可嚥下輕者只以花椒湯漱之亦可擦處必皮破不可畏疼而少擦也○忌葷十餘日多更好并魚腥生冷動氣發風等物一個月尤忌房事外如牛肉燒酒團魚之類須忌二三年惟蕎麥麪羊肉則終身忌之○治楊梅瘡初發者五六日可愈但每分用汞四五錢足矣○若治蛀蝕疔瘡或咽喉潰爛或遍身牛皮瘡癬俱照前中治法○若治久爛癩瘡爛處難擦則

擦脚心俱照前中治法亦布包貼膏如前○一自擦起之日
卽當服後敗毒散至七日後發口則止

二十四味敗毒散 隨前水銀膏

當歸 川芎 生地 熟地

芍藥 牛膝 防風 荆芥

白芷 防已 忍冬 桔梗

羌活 獨活 白癬皮 薏仁

連翹 木通 陳皮 粉草

黃蘗 知母 梔子 黃連

右每貼加土茯苓乾者四兩鮮者須半斤用水六碗煎三碗
分三次每日早午晚各服一碗○右方後四味須察其人陰
陽寒熱酌而用之

按右水銀膏方凡用此者其於筋骨經絡無處不到既能追
毒亦善殺蟲若用治大麻瘋證必有奇效但未經試故表諸
此以俟後人試用之或於大瘋條釋煎劑之相宜者同用尤
妙倘獲濟人其幸多矣

廉瘡隔紙膏 五八

黃占 五兩 飛丹 鉛粉 各四兩 輕粉

因陣

乳香

沒藥

各二錢

水

三分

麻油

春夏二兩
秋冬三兩

右先將占油煎五六沸下乳沒再二三沸下輕粉隨下丹粉槐柳枝攪十餘沸取起冷定後下水攪勻瓶盛浸水中一宿出火毒先以苦茶洗瘡淨將膏用薄油紙刺孔厚攤間日番背面貼之三日一換三貼即可愈

完瘡散

五九

治濕爛諸瘡肉平不斂及諸瘡毒肉肉既平而

口有不收者皆宜用此最妙

滑石

飛一兩


赤石脂

飛五錢

粉甘草

三錢

右為末乾摻或用麻油調敷 或加枯礬一錢痒者極宜



3

