

治天行時疫，每以生姜汁少許，加蜂蜜調勻服之，有神功。

潭元汁 即紫河車，不拘男女。初胎者尤妙。入新瓦罐內，封固其口，上以碗覆埋於土中，久則化而為水，是也。

專治氣虛血熱，痘色紅紫乾枯，黑陷等症。以此汁清而補之，其効立見。氣虛甚者，人參紫草煎濃湯，冲入服之。已上二方，有力之家，可多收貯，愈久愈佳。臨症極便。勝如積金寶，造浮屠也。

李氏敗毒散 治初熱壯盛等症。

即前敗毒散，加升麻、荆芥、牛蒡子、蝉退、山楂、地骨皮、薄荷、紫蘿、紫草、減獨活、紫胡蘂、卷人參。右姜一片，水煎，臨服加葱白汁五茶匙。如熱甚，加紫胡蘂、夏加香薷、冬加麻黃。瀉加猪苓澤瀉。

蘿解散 治痘初生，熱頭疼，腰痛，腹疼，作脹，一切熱毒甚者。

紫蘿 葛根 防風 荆芥 白芷 蝉退 升麻 牛子 木通 甘草 各等分

加灯心葱白各十根水煎热服

升麻葛根湯 治初熱壯盛疑似未明服此或痘已出而表熱甚不退 李氏加紫蘇五分紫尖山楂牛子各一錢冬月加麻黃一錢令痘易出

易歟

和解湯 解表和中

升麻 乾葛各一錢 人參 防風各七

川芎八分 甘草五分

鮮毒疎痘湯 預眼癰熱去毒又治紅紫口乾半熱譯語 姜一片水煎服

已出鮮熱毒斑疹

防風 荆芥 羌活 紫胡 川芎 白芷
當歸 連翹 黃芩 黃連 麻黃 紫草
蟬退 右姜葱水煎服
加味葛根湯 治痘失養發熱譯語
升麻 葛根 赤芍 甘草 桔梗 紫胡
荆芥 防風 連翹 牛蒡子 木通
右水煎服

大靈丹 治壯熱顛狂驚搐譯語紅紫斑焦乾陷
一切惡忘

白滑石

飛過
三兩

雄黃

飛過
各一錢

犀角

各三錢
辰砂

飛過
三錢

牛黃

水片
各一錢

射香

五分

子

及黑陷黑痘等症

無比散 初熟服之，甚能驅痘。又治痘夾黑點子，及黑陷黑痘等症。

右研細末，一歲兒服一錢，大者五分，刺豬尾血三兩，點新汲水調和送下，取下惡毒如爛魚腸葡萄穗狀，即愈。

小無比散 治痘壯熱口渴，小水澁太便秘，口氣熱，煩躁，不寧，或焦紫或紅斑，自發熱至起壯時，有熟者皆可用。痘後餘熱亦可用。

桂府滑石

飛過
六兩

石膏

飛過
一兩

粉草

寒水石

辰砂

鐵一錢

水片

射香

牛黃

各五分
黃用牛胆南星
牛膽各半錢

代膩粉

鐵二錢

丁方

有蟾酥

右研細末，一歲兒服一錢，大者五分，刺豬尾

血三兩，點新汲水調和送下，取下惡毒如爛魚腸葡萄穗狀，即愈。

桂府滑石

飛過
六兩

石膏

飛過
一兩

粉草

寒水石

各
錢

五
麝金

蟬肚小者
煮乾為末
甘草湯
右俱製淨末和

勺每五歲者服二錢大人再加
冬月灯心

湯下

夏月井水調下

熱甚不解者井水

磨犀角汁調下

若紅紫頂陷不起加川山

甲未一分射香半分紫草煎湯加酒一二匙

調下即起

大無比散

治熱毒大甚驚狂譖語引飲瘡瘍紅

紫黑陷

桂府滑石

飛過

粉草一

辰砂

飛三

雄黃

飛一

錢

右末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗毒散調下亦能稀痘若報痘後用

燈心湯下

退火回生散

治痘熱甚發渴紅紫黑陷

滑石一

辰砂分

水片三

厘

右末冷水調下

得睡少時神安氣靜痘轉紅活

龍腦膏

痘毒出不透心煩狂亂如見鬼神或已

出未出番伏黑惡毒等症

水片

研末新宰豬心血和丸貯眼核大小

兒服半丸大人服二三丸凡狂妄煩躁者
心經毒盛也紫草湯下昏聶不醒者伏熱
在心經也井花水下血疱漿不回者紫草
湯下漿坐疱陷者溫酒化下

天真膏治黑陷乾枯紅紫及斑不退用吳茱萸之
十全四五

初生小兒解下黑糞用磁礮收貯加水銀二兩
射香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久
則化而為水每遇前症看兒太小熱毒盛者

量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之
立時紅潤活潑真秘方也較之天靈蓋枯臭
無益之物萬勿矣緣此糞原係母之真血所
化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故
能解毒百日內小兒熱而煩躁啼哭不止
用少許點入眼角二三次便能神安氣和而
睡蓋又能清心熱也

猪尾膏治全龍腦膏但火二方俱以龍腦為劑
虛寒者不可用惟實熱則有功

凡痘過服熟藥昏昧不知人事者取豬尾血以
龍腦和為丸真眼核大溫酒化下按猪尾乃動
之使毒活動化藥而達於外也

一凡痘倒屬心神不安者片腦五分辰砂一錢猪
尾血爛研膏用木香磨湯化下

一凡痘不化漿倒屬者片腦一分猪尾血一錢同
研新汲水調下

歲靈龍腦散 治痘黑陷

歲靈仙一錢炒為末片腦分右用濕水調下取半

瘡癰為効

獨聖散 痘不起頂或紫黑陷倒屬服以即時紅
活起發有起死回生之功又名奪命丹

川山甲

酒炒成珠前足及嘴角者佳

麝香

右末每小兒三分大者五分用木香煎湯入
少酒調下熱甚者紫草湯下

宋杏庄方內加炒紅麴川烏炒焦各五分名曰丁
七金葱湯下

大成散 治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切

不起發之症俱可用之

川山甲

酒炒一兩

甘草末二錢

雄黃

硃砂各一錢半

紫草

錢三射香二分

右每五歲兒用二分冷症熱

酒調下

熟瘡紫草湯下

寒者加入治中散內用

散內用

熱症加入小無比散內

人牙散

治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒

戰

人牙

自落者不拘多少火燄存性淬入韭
未入射香一分或加紅麵三分

右用雞冠血調成膏好酒半

盞人乳半盞入葱白一撮煎湯送下

凡服牙齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出
於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡
泄急以四君子加芎歸服之

無憂散

治臨危痘症寒戰咬牙

人牙

如上製

雄黃

珍珠各五分

一方有牛黃五

分

右朱每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

無價散

治黑陷欲死者

一方加射香米片少許

用無病小兒糞臘月將傾銀罐二箇上下合定

鹽泥固濟火煅通紅

取出為末蜜水調服一錢

烏金膏 治發熱至七日已前或因風寒痘不起
發或紅紫或驚搐俱可用

姜參

酒洗

全蝎

去足尾酒洗

甘草

紫草

白附子

味苦內白者真洗淨

右為末

將紅花紫草各一兩好酒二錢

川山甲

炒末二錢半

蟬退

去頭足酒

熬去太半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成珠為度丸如龍眼核大每服一丸灯心湯化下

紫金散 治出不快及倒醫亦治遠年不愈惡

瘡 紫草 蛇退

炒牛旁子

炒各五錢

右為細末每服一錢水半鐘煎減半溫服

連翹升麻湯

治痘一發密如針頭形勢重者當

轉其表而涼其內

連翹 升麻 黃芩

葛根

各一分

麥門冬

去心二錢

右水煎服

清地退火湯

治痘帶熱而出名為火裏苗急用此方以退其熱則後無青黑變隨

葛根

各八分

連翹

六分

當歸

五分

木通

三分

蟬退

二分

右加姜一片水煎服

如熱不退再服丁剷

或為末，灯心湯服。

紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂帽者，

紫草一錢升麻五分牛子 防風 荆芥 黃蓍各
分甘草三分木香五分右姜水煎服。如色紫腹

痛加蟬退一錢，

化毒湯 治痘已出而熱毒未解，宜清熱涼血，
一解名不致黑陷血，一涼名不致紅紫。

紫草 升麻 甘草 蟬退 地骨皮 黃芩
炒酒木通 各等分水煎服。

解毒散 治毒先發腫者，名為痘母，後發者，十有

九死先發者吉。

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ROC.

金銀花五兩

甘草一兩

木通

各等分水煎服。

防風 荆芥 連翹 牛子

各三錢

右用酒水各一鍾煎服。

如泄

大

如泄

小

如泄

大

如泄

消毒飲 痘已出上焦熱胸膈不快及痘後癰毒

麻疹熱毒 荆芥 牛子

各二錢

甘草

一錢

右姜二片水煎服

如聖湯 痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草

木通

猴梨

各等分加姜一片葱白三莖水煎熱服

心煩加麥冬赤芍芩煩渴加生脈散

七十八

九自身如火者加酒炒黃芩地骨皮

九

四聖散 黑附倒麝不起發不紅活小便不利

紫草 黃蓍 甘草 木通 右水煎服
甚色紫倍加紫草芩連紅花大便秘加枳壳

如常加糯米

加味四聖散 痘出不快及变陷倒麝小便赤身
熱未退或復冒風者

紫草 黃蓍 人參 甘草 川芎 蟬退

木通 木香 大便秘加枳殼 不秘加糯米

百粒水煎服

涼血解毒湯

痘出熱不退紅不分地或痘苗乾枯黑陷急用此方可起一壯灌漿水

紫草 鐵

生地

紫胡

各八

牡丹皮

七分

赤芍

蘿木

防風

荆芥

黃連

木通

各三

牛子

分四天麻

紅花

甘草

各二分

姜一片

灯心二十

根糯米百粒水煎服

惺惺散

治痘頭痛壯熱喘急，攻毒散熱之劑

人參

白朮

茯苓

甘草

桔梗

細辛

川芎

各五分

薄荷

一方無

川芎加天花粉

姜三片枣一枚水煎服

內托散

咬牙寒戰等症

根窠不紅或灰色

白色

人參

黃蓍

甘草

川芎

當帰

防風

白芷

桔梗

白芍

厚朴

木香

肉桂

右姜

一片

枣一枚

水煎服

色紅者

去肉桂

本香加紫草

蟬退一

漿不滿水酒各半煎

服，色淡白者去

防風白芷加糯米

木通

燥加人乳

蟬退膏

蟬退

酒洗去頭足

去當歸

防風

甘草

川芎

荆芥穗

升麻

白芍

各等分

右為末

煉蜜丸

芡實大每服一丸薄荷湯化下

粉紅丸 又名溫驚丸 治痘後癩癧症

牛膽南星

兩四

辰砂半

錢一

天竺黃五

錢五

冰片分

胭脂丕一錢

右為末

牛膽斗

和為丸

雞葷子大

每服一丸小者半丸沙糖溫水化下

大保元湯

治頂陷根窠雖紅而皮軟薄血有餘

而氣不足

黃芪

三錢

人參半

錢一

甘草

川芎

各一

錢官桂一分

加姜枣水煎服

如氣不行加木

香減去桂

若不食加人乳半鍾

又方加

白何首烏黑葷蒸過用

生脉健脾湯

淺漿既成皮軟色白乃氣不足也

甲則血生是

氣不足

當補氣血不足宜養脾胃

脾固其本也

黃芪一錢

人參一錢

炙甘草

官

桂三分

當帰

川芎

白芍

白朮

各八

茯苓

分五紫草

四分

姜一片

紅棗一枚

糯米五十粒

或

加酒洗紅花三分

通天散

治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參

陳皮

桂枝

各八

川芎

熟地

芍藥

各一錢

當歸

紫草

各一錢

紅花

木香

各三分

甘草

升天散 即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷
乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

升天散

即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷
乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參

六分

黃芪

山楂八分

白术

炒土當歸

川芎

橘紅

各五分

甘草

三分

淫羊藿

川山甲

土炒黃各二分

肉桂

三厘半引經之藥多則癢

木香

二分

姜一片

東一枚

水煎服

或為末服亦可

如嘔吐生姜湯

下漏米飲下肚痛神麴煎湯下煩躁
麥門冬湯下渴用麥冬五味煎湯下吐
漏霍香陳皮湯下痘不成漿多服數帖無
妨

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿三分多人參八分川山甲土炒黃芪一錢
枸杞子錢川芎五分當歸八分甘草五分木香
分白术土炒山楂八分陳皮五分官桂三
分三十筍尖三箇加姜枣糯米水煎服

一

方有白芷防風

補元湯 治痘項充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍酒炒 熟地各一錢 紫草
紅花各七分酒洗 陳皮 甘草各三分 白朮土炒半錢

酒水各半盞糯米五十粒枣二枚煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍酒炒 紫草 川芎 紅花各五錢
血竭一錢 木香二錢 右為末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下 热極血焦
不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛灰白色不灌膿面漿者

紫河車一具培爲末 龜板酥炙五錢

右末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下

血虛芍歸紫草煎湯下

渾元散 治全上

紫河車一具分作五七塊 用白糯米三合水淘淨入無油銚內同炒以米黃色為度同為末每用

五七分兒大者一錢極補氣血能助灌漿如
神緣糯米性溫得紫河車之氣純化為河車
故其補功最速譬之造酒米從麴化意也極
妙絕

異功散 以方調順陰陽充實表裏凡痘灰白癧
癩寒戰泄瀉腹脹並宜服之非虛寒者不可輕
用 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮
半夏 厚朴姜制 木香 丁香 肉果 大附
子 官桂 右姜枣水煎服

內助丹

黃蓍酒炒

人參酒炒

白朮

茯苓

當歸

陳皮

半夏 厚朴

肉桂

山楂

姜三片

枣一枚

糯米五十粒水煎服

如不食

加

人乳

一盃

痒甚加大附子

一

寒戰

不止

加附子

防風

渴加麥冬

一

瀉加澤瀉

猪苓

一

止加

阿子肉

果

助陽丹

痒塌不起根窠不紅

黃蓍

人參

白芍

各酒炒

甘草

三分

川芎

當歸各一錢

紅花五分

陳皮八分

官桂二分

姜棗水煎

服如食少加

山楂厚朴各五分，餘加全煎

回生起死丹 治痘瘡白寒氣逆上，不食腹脹嘔

吐肚痛泄瀉鴻清水手足俱冷

丁香九枚

乾姜一錢

水煎熟服，被蓋片時令脾胃

溫煖陰退陽回痘自紅活

治中散

虛寒漏利不進飲食

黃芪

人參

茯苓

白朮

川芎

當歸

肉桂各五錢

肉果

麵包

煨熟

丁香半錢

木香三錢

取去油

右末，每五歲用五分，好熱酒調下。衣被蓋，少頃痘變紅活而起。

和中湯

虛吐不止即鎮胃止吐湯，加入人參、

人參

茯苓

甘草各五分

白朮

半夏各八分

陳皮

藿香

砂仁各一錢

生姜水煎服

藿香正氣散

治初熱乾嘔

藿香

紫蘿

大腹皮

陳皮

桔梗

甘草

茯苓

半夏

厚朴

白芷

右姜東煎服

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛

神麴

香附各一錢

山楂二錢

良姜

當歸

甘草各五分

姜三枣二水煎服

手足逆冷加

大附子二分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝

炙甘草各一錢

白芍藥酒炒二錢

姜三片枣

二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升降陰陽 黃連 炙甘草 乾姜 桂枝各二錢

半夏 人參各八分 東二枚水煎服

益黃散

胃冷嘔吐而利

陳皮

青皮各二錢

丁香五分

木香三分

訶子七分

右水煎服 一方無木香有荳蔻一錢

堅腸湯

治痘泄瀉不止

黃芪

白朮各八分

肉果炮去油

各一錢

山楂七分

川芎

陳皮各五分

升麻三分

加牙東三枚水煎服

豆蔻丸

治痘灰白泄瀉清水不止 又方止用

龍骨訶子肉蔻三味治同

木香 砂仁 龍骨 訶子肉 肉果
赤石脂 枯礬各七錢半 右末麵糊丸
大每

服三十丸米飲下

加味犀角飲 痘已出不匀心煩壯熱口舌生瘡

犀角 牛子 荆芥 甘草 防風 升麻

桔梗 麥冬 水煎服

犀角地黃湯 治諸失血

犀角磨汁入 赤芍藥 生地 丹皮 各等分水

煎服

二寶散

治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂

語

犀角

玳瑁

千味

磨汁

斗頓

服即愈

斬閑散

痘紫發熱鼻紅不止

地黃

丹皮

黃芩

各五升

麻分

分

藕節

梔子仁湯

煩躁譫語驚狂發斑

梔仁

黃芩

石膏

各二錢

知母

杏仁

各一錢半

大青

糝胡

荳豉

赤芍

各一升

麻分

甘草 分五 水煎服

人參白虎湯 暑盛煩渴痘出不快又解麻痘斑
疮等熱毒 人參五分石膏四錢 知母一錢灸甘

草分三 加粳米一撮水煎服

竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小水赤澁
石膏 知母 甘草 麥冬 竹葉

右水煎服

麥門冬湯 治斑疹煩渴吐瀉及癥後餘熱
麥冬 人參 甘菊 赤芍 赤茯苓 升麻

生脉散 各一 甘草五分 石膏三分 水煎服
錢

止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥冬 水煎當茶飲

參苓白术散 治痘已癩未癩身熱不退煩渴不
正此藥極能清神生津乃治脾虛之聖藥也

人參 白术 茯苓 甘草 乾葛 木香

麥冬 霍香 各等分水煎服

紫胡麥門冬湯 治痘壯熱經日不退

紫胡 麥門冬 甘草 人參 玄參 龍胆

草水煎服熱退即止。一方無人參。

涼膈散 上鬲積熱口舌生瘡煩渴。

連翹 薄荷 黃芩 楔子 甘草 大黃

朴硝 各等分水煎服。如瘞火嗽加桔梗竹

葉蜜一匙。

四順飲 治太便秘。

大黃 當歸 茯苓 甘草 各等分水煎服。

通幽湯 太便秘結。

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻

甘草 火麻子 水煎服。

通腸散 太便秘結。

枳殼 當歸 大黃錢各二 芝麻錢三 牛膝分五

水煎服。

葱白湯 治頭疼。

連鬚葱白 生姜不拘多少水煎帶溫服。

當歸六黃湯 治自汗盜汗。

當歸 黃芪 黃芩 黃連 黃柏 生地

熟地 各等分水煎服。

甘露飲

治牙根腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌

生瘡

天冬

麥冬

生地

熟地

黃芩

枳殼

石斛

茵陳

枇杷葉

炙去毛

甘草

各等分水煎服

吹口丹

治口瘡

黃連

青黛

孩兒茶

冰片

為末吹之

赴筵散

口瘡神妙

薄荷

黃柏

等分為末入青黛少許

搽之

牙疳方

痘後餘毒

攻牙根疳腐

內宜服

甘露飲

人中白

鐵

枯礬

鹽梅

存性

射香

白蔻子灰

錢一

五穀虫

焙乾

為細末

先將葱

茶洗去腐肉

錢二

鮮血

然後搽藥

鈎藤湯

痘後口噤僵直

透臍腹痛

鈎藤

紅花

木香

川芎

當歸

白芍

甘草

白朮

青皮

黃連

官桂

生姜

各等分

水煎

不拘時服

消風散

治癰盛驚搐譫語

狂急口張目作上視

羌活

獨活

姜桑

藿香

枳壳

防風

天麻

地骨皮

蟬退

各八分

前胡一錢
柴胡

黃芩

天花粉

桔梗

各一錢

茯苓

荆芥

紫草

牛子

各一錢

人參

川芎

各七分

甘草

四分

姜枣水煎服

瓜萎散

治痘熱極生風發搐

瓜萎根

各二錢

白姜棗

各一錢

全防風

慢火全炒老黃色為

末每服二三分薄苛湯下

保命丹

一切驚風發熱

天麻

鬚金

全蝎

去尾

各五錢

防風

甘草

三分

鐵

天麻

鬚金

全蝎

去尾

各五錢

防風

甘草

三分

瓜萎散

治痘熱極生風發搐

青黛

三錢

白附子

炒姜棗

各一錢

炒姜汁

大半夏

五錢

大半夏

射香

五錢

鈎藤

牛黃

二錢

飛南星

各一兩

辰砂

製全上

飛五錢

桔梗

各五錢

右末

煉蜜為丸

芡實大

每服一丸

射香

五錢

鈎藤

牛黃

二錢

飛南星

各一兩

辰砂

製全上

飛五錢

桔梗

各五錢

右末

煉蜜為丸

芡實大

每服一丸

灯心湯

下

蝉花散

治痘發熱發痒抓破

蝉退

地骨皮各一兩

為末

每服二三匙白酒

服二三次

回癩散

治痘不收漿結痂

何首烏 白芍 黃蓍 人參 甘草 白朮

白茯苓 姜水煎服

象牙散 治同上

人參 黃芪 白朮各一錢 甘草七分 茯苓一錢半

何首烏二錢

右加糯米二錢東二枚水煎調下

象牙末一錢

玄參升麻湯

治溫毒發斑

玄參

升麻

甘草

水煎服

陽毒升麻湯

面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮

喉痛

升麻五錢

犀角

射干

黃芩

人參

甘草各二錢半

右水煎服

陰毒升麻湯

治陰斑

升麻當歸

川椒鱉甲

雄黃

甘草

右水煎服

四聖膏 治瘡疔挑破以火點之

七粒珍珠火上燒 碗蓋七七鍋內炒

不拘灰多少 加入胭脂真箇好

二聖散 治同上

雄黃

錢

紫草

錢

右研末用油胭脂調下

敷方

瘡後痘疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之

赤石脂

膩粉

黃柏

杭粉

炒血竭

各一錢

飛丹

分炒

八髮灰

分五錢

乳香

沒藥

各三分量

冰片

伏龍肝

錢一

蜜陀僧

飛過二錢

有臭氣加阿魏

三分量

四分

右為細末綿帛篩過敷之外用膏藥貼

內服

人參敗毒散

加川山甲蟬退連翹

人參敗毒散

治餘毒瘡腫

人參

赤茯苓

羌活

獨活

前胡

薄荷

紫胡

枳殼

川芎

桔梗

各等

甘草

減半

牛旁子

防風

荆芥

連翹

金銀花

即荆敗毒

散毒

頭上

加白芷升麻

上身倍加桔梗

手加薄桂

腰加杜仲

腿足加牛膝木瓜

金花散

痘後肥痺疥癬等瘡此能收水解毒

黃丹

黃柏

黃芪

黃連

大黃

輕粉

射香

右為細末

濕瘡乾

掺燥用臘猪油熬化

調敷

必勝膏

治腫毒

馬齒莧搗汁 猪脂膏 石蜜 三味熬膏塗之即消

三荳散

痘後瘡毒初起紅腫 黑豆 赤荳 荟荳用醋浸研漿時時以鷺翎刷上隨手可消

敗草散 治斑爛不止

爛茅草 不拘多少用曆年蓋牆屋者經露風霜年久感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不能盡述取來晒乾或焙乾為極細末敷瘡上

或攤在席上令兒坐卧於上即愈
又方 荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 多年敗茅 三味共為細末或搽或捲自能收水結痂

又方 黃荳壳燒白灰為末捲之 如痘風癰以荳殼煎湯洗

綿蠶散 治爛瘡 治身及肢節疳蝕瘡膿水不絕 蠶子不拘多少將生明礬末裝入滿火上燒令汁乾枯為末捲之

秘傳茶葉方

痘爛遍身無皮膿水流出粘拈

被

茶葉要多揀去粗梗入滾水一潔即撈起

再揀去梗

濕鋪床上用草席隔一層令兒睡

正一夜則膿皆乾

乳香韶粉散

痂欲落不落用以薄金當減瘢痕

又治熱

瘡瘋遍身膿水不絕

乳香

錢三

韶粉一

輕粉一

右末猪油拌鵝

翎敷上

地黃散

痘毒入眼腫痛赤縷或白膜遮睛

熟地

當歸

防風

蟬退

羌活

白芨

炒去
刺

穀精草

木賊各一

玄參五分

犀角末一
錢

黃連

大黃

炙甘草

木通各一

為細末

小兒每服一字大人二字羊肝湯食後調服

日三夜一忌口將息

蜜蒙花散

治痘入目翳膜遮睛

蜜蒙花

菊花

石決明

白蒺藜

木賊

羌活

右末每服二三錢茶清調下

兔糞散

治痘入眼

亦可煉蜜為丸酒送下

五十丸 兔糞炒黃為末用蟬退木通甘草煎

湯頓服

東糞丸 治痘入眼或生翳障

兔糞

炒

四兩

石決明

煅

各一錢

當歸

五錢

草決明

木賊

去節

白芍

防風

兩

各一錢

穀精草

二錢

右末蜜丸菉豆大每服三五十丸荆芥湯送

下

吹耳丹

輕粉

飛丹

為細末

左眼

翳吹右耳

右眼吹

左耳只吹一二次

又方

加雄黃射香少許

外用布燕子一對換

郎一對二味磨水常服

罩胎散

治姪婦出痘

一方有陳皮枳殼太熱

加鬱金

川芎

川歸

芍藥

人參

白朮

茯苓

甘草

紫胡

條芩

防風

荆芥

白芷

葛根

砂仁

紫草

阿膠

桔梗

糯米

水煎服

安胎散

川芎

當歸

白芍

人参

白术

白茯

甘草

條芩

陳皮

紫蘿

砂仁

炒阿膠

香附

艾葉

紫草

各等分加姜枣水煎服

安胎飲

大腹皮

酒洗

人參

陳皮

白茯

白芍

紫蘿

砂仁

香附

甘草

加糯米

水煎服

胎漏加阿膠百草霜

柳花散

室女發熱經行

柳花

五錢

紫草

一兩

升麻

九錢

歸身

七錢

半

右末每服七錢葡萄煎湯調下

鐵箍散

治痘後瘡毒

鳳凰退燒灰

醋調

圓四畔

頭出

毒氣

甚佳

蕎麥粉法

痘瘡破者用以敷之潰爛者以遍

撲之極佳

蕎麥粉以絹袋盛撲於瘡上或以

以襯於床褥上

溫粉撲法

治汗出不正

黃連

牡礪粉

貝母

各末五錢

粳米粉升和勻

絹袋盛周身撲之

蟬花散

治爛痘生疽魚

及夏月諸虫咬傷臭惡不可近者服之

虫皆化而為水

蒼蠅亦不敢近

蟬退

燒存

洗淨

青黛澄去灰土各五錢

北細辛半錢

蛇退半錢

右為細末每服三錢酒調下仍以生寒

水石細末摻之

青黛散治痘未行膿痛甚心鬲煩躁睡卧不安

並宜服之

真青黛如東核大水調服之即安

樟皮散治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樟皮木剉煎溫服之藥味苦平無毒若治乳癰取樟皮燒存性為末酒調服之立消

獨勝散治早晨微熱晚發大熱目黃脇動身熱

手冷發甚如驚者又名牛旁姜蚕散

牛旁子

五錢

白姜蚕

二錢

紫草

二七寸

水煎服速

進三四服其痘便出蓋姜蚕治遍身癰疹疼
痛牛旁發痘透肌紫草利竅要知痘疹無虛
寒証者服此痘立出也

蘿蔔湯 治痘疹出不快者

右用開花蘿蔔煎汁時時飲之。蓋痘疹氣均即出快。蘿蔔治喉定喘，下氣消脹解毒。

紫河車散 治小兒痘瘡毒氣不解，上攻咽喉，音不出舌頰，生瘡遏逆，煩悶潮熱面赤。

紫河車

即金線重樓

茜根

貫衆

各三錢

白芍藥

甘草

炙各五錢

右每服三錢生姜一片水煎服

丁方有牛蒡子

野通散 治痘瘡出不快及傷寒不語。

乾野人糞

即彌猴糞火燒存性

水片

真麝香各等分

右為細末，每服五分，看大小用新汲水入蜜調下。十歲以上者服一錢。按野人糞治蜘蛛咬瘡，治痘出不快，大効。蓋蜘蛛咬瘡久而不愈，其絲生皮膚延蔓遍身不愈者，加雄黃青黛水調以蜘蛛試之，立化為水，屢驗。蓋此三味是治瘡疹當用之藥。取山中者，若人家所養之猴，食物味雜，即不効。失其本真也。

南金散 治痘已出而復擗其勢甚危，諸藥不効。

者萬無一失本家印貼此方施人全活甚衆
紫背荷葉

霜後搭水
紫背者

白姜薑

洗去
炒乾

右為末等分每服看大小大者一錢小者五

分研羌荳汁和酒下米飲亦可治此症多
有用龍腦人牙者卒難措辦惟此無毒而効
且速但紫背者甚難得可於益舖內尋之

橄欖飲

治倒黴

橄欖後中截斷水服少許服之立發

乳香猪血膏

治痘不起發

乳香

未研

猪心血搗為丸櫻桃大每服一丸水

磨化下

鈎藤紫草散

治痘疹不快

鈎藤鈎子

紫草茸

等分為細末每服三五

分溫酒

調下蓋紫草滑竅利小便散十二經

毒氣鈎藤治

小兒寒熱十二驚癇

緣驚癇出

於心肝瘡疹亦心所主也

鴉片散

治痘當起脹灌膿時泄瀉不止諸藥不

効者如神

真鴉片

錢一錢肉炒一

右每服半分或一分米飲調下立止

葛根黃芩湯 治喘有汗發熱咳嗽

乾葛

黃芩

各二錢

黃連

芍藥

石膏各一錢

五味子湯

五味子粒

十一分

甘草

五分

水煎服

五味子湯 治喘促而厥

五味子湯

半錢

人參一錢

麥冬

杏仁

各二錢

右姜三片東三枚水煎服

清肺飲 治咽乾聲啞

麻黃半錢

一錢

麥冬二錢

知母

天花粉

荆芥

水煎入竹瀝姜汁服

天花散 治痘後失音

天花散

治痘後失音

訶子

葛蒲

各八分

桔梗錢

天花粉

桔梗

茯苓

訶子

石菖蒲

補肺散

治痘未出声啞

甘草

各等分

竹葉七片黃荆一寸水煎服

阿膠

蛤粉炒成珠一錢半

牛子

炒三分

杏仁

去皮尖三粒

甘草

半二分

馬兜鈴

黃芪

各五分

糯米

炒一錢

水煎食後時時嚥之

利咽解毒湯 治痘咽喉痛首尾皆可用

山荳根

麥冬各一錢

牛子炒

玄參

桔梗各

分 甘草二錢

防風五分

菉豆

四十粒

右水煎服

三黃熟艾湯 痘後咽塞喉痺

黃連

黃芩

黃柏

艾葉

各等分水煎服

玉鎖匙

咽喉腫痛或

帝鐘拖下不收及喉舌強

硬

硼砂一錢

朴硝五分

姜蚕一條

冰片半分

為末吹入

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

羌活當歸湯 治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活

當歸

獨活

各一錢

紫胡五分

桂枝分

防風

川芎

黃柏

各一錢

桃仁五分

紅花八分

酒水各半煎服 又方治腰痛有蒼朮漢防

已

如神湯 治腰痛

當歸

桂皮

玄胡索

各等分為末酒下二

三錢

活血解毒湯 治餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸 連翹

牛子 黃連 紫草 甘草 蒼朮 薄苟

川芎 木通 各等分水煎服

胎元散 瘡不起發不紅潤是血氣俱虛

胎元焙乾為末加射香少許酒調服三五分

水楊湯 治痘乾癩不起者

水楊柳

梗枝春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉經上有圓葉滿葉有白鬚散出俗名梅

右以枝葉切碎水煎七八沸先將二十分置盆內手拭不寒不熱令痘兒先服內托之

剝然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許乃以帛撲火照之繢然有起勢起處竟有暈暈有系乃漿影也如漿不滿再浴若弱者只浴頭面手足可也既不赤鱗不厭多洗燈照如無起勢乃氣血敗無生意矣

溫膽湯 治痘血寒顏色灰慘血凝不活腹脇脹滿面青筋縮嘔清水或鴻青菜色

白茯苓 橘紅 半夏 甘草 枳實炒各等分竹茹一錢姜東水煎服

陳氏木香散

治痘氣寒鼻流清涕咳嗽惡風自

汗身躰寒戰瘡色慄白

上

木香

臨時
磨服

大腹皮

黑荳汁
洗淨

人參

各一錢

赤茯苓

前胡

青皮

去穰
炒

半夏

炮
次

丁香

訶子肉

灸甘草

各二錢半

燈心

一半一錢

每服三錢

姜棗水

煎服看大小加減

中和湯 治全上

人參

黃蓍

厚朴

姜炒汁

白芷

川芎

當歸

粉草

桔梗

白芍

酒炒

肉桂

去粗皮

防風 霽香 各等分酒水各半姜棗煎服
瀉肺散 治痘氣熱鼻乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色
焦紫即瀉白散

桑白皮蜜炙地骨皮 甘草 各等分加竹葉二十

片灯心水煎服

清肺飲 治症全前

麥冬

桔梗

各二錢

知母

荆芥

天花粉

各一錢

錢石菖蒲

訶子肉

各八分

水煎服

清金湯

治口氣臭

升麻 葛根 連翹 紫草 地骨皮 水煎
入燒人屎服

四君快斑湯 治痘氣虛，溼熱

人參 黃蓍 白朮 土炒 茯苓 甘草 桂心
白芷 荆芥穗 防風 陳皮 白芍 酒炒
各等分水煎服

大補保命湯 治痘皮嫩，易破者，
人參 黃蓍 當歸 生地 川芎 赤芍
甘草 牛蒡子 防風 荆芥穗 連翹

知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草 天門冬
麥冬 馬兜鈴 木通 山梔 天花粉 各
等分水煎服

解毒托裏散 治痘稠密

桔梗 牛蒡子 人中黃 防風 荆芥穗
酒紅花 歸尾 蟬退 升麻 乾葛 赤芍
連翹去心 各等分水煎，入燒人屎調服

四物快斑湯 治痘火盛，乾燥

當歸 川芎 赤芍 生地 荆芥穗 牛子

官桂 水煎入燒人屎服

清金導赤飲 治痘熱乘肺金當瀉不瀉作喘煩躁譫語小水不利垂危

當歸 白芍 陳皮 貝母 軟石膏 白芍

苓

甘草 黃芩

酒炒

黃連

酒炒

杏仁

桑白

皮

蜜枳殼炒

木通

滑石

麥冬

車前子

人参 玄參

各等分水煎服

人参固肌湯 治痘表發太過致肌肉不密瘡

粘肉久不落者

人参 黃蓍 甘草 當歸 蟬退

各等分入糯米一撮水煎服

人参清神湯 治痘癰不落昏迷沉睡者

人参 黃蓍 甘草 當歸 白朮

炒麥冬

陳皮 酸棗仁 黃連

酒炒

茯苓

各等分加

東糯米水煎服

馬齒莧散 治痘癰不落成斑痕者

馬齒莧搗汁猪脂膏石蜜共熬膏塗腫處

當歸桂枝湯 治痘後手足不能屈伸

洗之，覩衣煮湯亦佳。

十三味敗毒散 治瘡毒

當歸

白芷

川山甲

土炒

金銀花

防風

乳香

製

甘草

陳皮

赤芍

皂角刺

貝母

沒藥

製

天花粉

各等分酒水各半

煎服

涼肝明目散 痘後羞明

當歸

龍胆草

密蒙花

川芎

紫胡

防風

酒連

各等分雄猪肝煮湯煎服

望月沙散

痘後暗室中不能開者

穀精草

密蒙花

酒洗

蟬退

去翅足各五錢

望月沙

一兩

右為末，雄猪肝一兩竹力批破用藥一錢，掺

入肝內，水煮熟，飲汁食肝効。

羊酮骨髓

治痘痂欲落不落瘢痕

羊酮骨髓

一兩

煉入輕粉一錢研成膏塗之

小靈丹

解毒發痘之聖藥，治紅斑黑陷不起，一切危惡如服此而不見効者，決無可生之理矣。

硃砂

雄黃各二錢

乳香

沒藥

各一錢半

大蟾蜍

取心肝五錢焙乾

射香三分

為細末取豬心

血雞冠血丸

皂子大每服一丸熟

無太熱

生酒化下

不飲酒紫草

火

心湯下即

時紅活而起

神功散治痘作渴

人參黃芪

甘草半旁子

紅花

生地

前胡

紫草白芍

水煎服

紅花湯治全上

紅花或子隨意煎湯

飲其渴即止絕口中如煙

飲之即止

加牛蒡子大妙

加味鳳粘子

治咽喉中有瘡作嘔

桔梗射干

山荳根防風

乾葛陳皮

荆芥連翹

水煎細細呷之

灯心竹葉湯

治乾嘔

竹葉三十片

灯心三十根

水煎服

潤腸湯

治虛秘

歸梢甘草

生地火麻仁

桃仁泥

水煎服

拔毒膏 治痘疔

雄黃研 胭脂重浸水令濃調雄黃點疔痘上立時紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血也

涼血地黃湯

室女出痘遇經不止熱入血室

當歸 川芎

白芍 生地

白朮 升麻

黃連 甘草

人參

山梔仁

玄參

水煎服

涼血解毒湯

治女人出痘非經期於發熱時而

血忽至

當歸一錢

二分

白芷五分

升麻四分

紫草一錢

半錢

紅花一分

赤芍一錢

桔梗八分

連翹三分

三

灯心二十根水煎服

當歸養心湯

治女人出血口瘡不能言者

人參 當歸

麥冬 甘草

升麻

生地

各等分加燈心水煎服

鴻肝散 女人經水不斷適逢出痘發熱昏沉言語狂妄

羌活

川芎 防風

各八分

當歸一錢

甘草 柴胡 各等分加東一枝水煎服 加
 丹皮山梔名加味逍遙散
 如聖散 嫦婦出痘安胎
 白术 黄芩 當歸 枳殼 黑豆 大腹皮
 砂仁 甘草 桑上羊兒藤即桑寄生 各等
 分水煎服
 黑神散 婦人出痘分娩後瘀血作痛
 當歸 川芎 熟地 炮姜 桂心 蒲黃炒
 香附童便 木香 青皮 黑豆 酒水各半

山梔仁 龍胆草各五 大黃酒蒸三
 水煎服 一方有木通紫胡黃芩
 歸脾湯 女人經閉不通血海乾涸適逢出痘以
 妥調其心脾不使血妄行加紫胡山梔名加味
 歸脾湯 人參 白术 茯神 黃蓍 遠志
 地骨皮各二分 一錢 甘草三分 木香五分 酸棗仁一錢
 姜棗煎服
 逍遙散 女人出痘寒熱不時經水不調服此其
 血不致妄動 白术 茯苓 當歸 芍藥

煎服

○原疹

生生子曰麻疹浙地呼為瘠牛又曰渺子吳地呼為疹子新安呼為麻總由有生初之滛火伏於命門之間命門具太極之理而陰陽五行繫焉臟腑之所由生也蓋五行一陰陽陰陽一太極也天之與人咸相感通由其通故天寒而人身寒天熱而人身熱也天之癟氣一動則所稟之毒隨感而發陽感之則疹出為陰感之則痘出

焉陽浮而淺故疹易出易歛陰凝而深故痘難出難歛陰陽二劫之毒尽出則向安矣余故曰人之出疹出痘猶蚕之一眠二眠三眠也痘雖出於陰而實藉於陰以血為之資也何見之痘非氣行則血不附安得結痂疹非血濟則氣失依焉能收歛斯陰陽升降之理一開必一闔血之附氣氣之依血陰根於陽陽根於陰陰陽互為其根也前人謂痘出於臟不知指何臟疹出於腑

不知指何腑而云之也。又謂疹出心肺，故鼻涕而咳嗽，余謂此皆臆度套詶，而非有真知。一定之見也。既曰疹出於腑，心肺獨非臟乎？按內經鼻為肺之門戶，通天氣陽毒上發，熱毒薰蒸，蓋心肺位尊高上，又肺主毛竅，毒從竅出，是于於肺而非出於肺也。要知痘之與疹，皆出於命門之陰陽也。

右釋麻疹

一發熱之初，妄似傷寒。惟疹則嗽咳噴嚏，鼻流清涕，眼泡腫，其淚汪汪，面浮腮赤，惡心乾嘔，為異

耳。但見此候，便宜謹避風寒，戒葷腥厚味，急表散之，使皮膚通暢，腠理開豁，而疹毒易出也。

一疹痘之發，雖曰胎毒，未有不由天行疠氣。故用藥必先明歲氣，兼之時令。如溫煖時月，以辛涼發之；如防風解毒湯，暄熱時月，以辛寒發之；黃連解毒湯，大寒月，以辛溫，熱劑發之；桂枝解毒湯，時寒時煖，以辛平之藥發之；升麻葛根湯，以因時投劑不可悞。作傷寒妄施汗下，而伐天和也。又須看人虛實，如太便秘結，煩熱甚，而發不

出者以酒大黃微利之吐利不止以參芍之類補之

二用前藥發散而疹隨見為美若發不出再加發乏如加味麻黃散之類外以芫荽酒糟蒸熟擦之若其疹自頭至足為之出齊頭面愈多為佳若遲延日久而不出則腹脹氣喘昏眩悶亂煩躁而死矣

三看疹之法又於耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而均淨淡紅為吉若色紅甚兼火

化也化斑湯主之入參白虎湯佐之如色白者此血不足也養榮湯如色紫赤乾燥暗晦乃火盛毒熾宜六一散解之四物湯加紫胡黃芩乾葛紅花牛蒡子連翹之類滋陰涼血而熱自除所謂養陰退陽之義也此亦五死一生之症外太青湯玄參解毒湯皆可選而用之若黑色者則熱毒尤甚為十死一生之症須明察之勿妄施治

二表後看疹隱隱然見於肌膚成片切忌風寒生

冷如一犯之則皮膚閉塞毒氣壅滯遂變為渾身青紫而毒反內攻煩躁腹痛氣喘悶亂諸症作矣欲出不出危亡立至

一疹已出而忽浸者乃風寒所逼而然也若不早治毒成內攻必致癰瘍而死急用消毒飲合升麻湯熱服則復出而安矣

一發熱之時遍身汗出者此毒從汗散玄府開疹易出也有鼻中血出者此毒從血解也俱不可遽止之若汗出太多血出不止者此又火甚逼

迫太過致液妄流妄行矣急宜當歸六黃湯加浮小麥以止汗茅花湯加玄參百草霜以止血遲則汗出多而元氣虛血出多而精神散為不治之症矣

一發熱之時或嘔吐或自利或滯下者此火邪內逼毒氣上行則吐下行則利毒甚則裏急後重而為滯下也吐者竹茹石膏湯利者升麻澤鴻湯滯下者芩芍藥湯加黃連生地木通人參枳殼或少加太黃微下之

一發熱之時未有不口渴者但宜以菉豆火心炒米湯飲之入參白虎湯佐之取生津解毒而已若恣飲冷水恐生水畜之症故水入於肺為喘為咳宜用葶苈子以洩肺中之水水入於脾為腫為脹為自利水入於胃為嘔為利宜用豬苓澤瀉茯苓以瀉脾胃之水水入於心為悸為驚宜赤茯苓灯心湯以洩心下之水水入於肝為腸痛用芫花以洩之水入腎與膀胱為小便不利為陰囊腫用車前子木通以洩之皆當隨症

而治

一疹出之時咽喉腫痛不能飲食者此毒火拂鬚上薰也宜甘桔湯加玄參牛蒡連翹更以十全散玉鎖匙吹之不可妄用鍼出血也

一疹出之際咳嗽口渴心煩者此毒在心肺發未尽也瀉白散加天花粉連翹玄參黃連以瀉之或黃連杏仁湯

一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者有吉有凶但要看其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅

色赤則為土星毒在大腸非瀉則毒不解惟用平胃散加葛根連翹以解之而已疹一發透依期而收瀉自止也若疹已收而瀉尤未止者駁其躰熱疹必未尽再用前藥加連翹黃連牛蒡木通澤瀉以分利之六一散亦妙絕若用調子肉果等滯滯之劑則變喘急腹滿痞脹不治之症矣若疹色淡而躰不熱口不渴大小便利飲食少進此為凶乃虛寒之症方可溫補或兼收滯

二疹出常以六時辰即收為率如子時為陽午後收午後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之妙也故漸出而漸收者其勢輕可若一出之後熱不退連綿三四日而不收者此毒火太盛外發未盡內有餘邪所致須以化班湯三味消毒飲加玄參石膏桔梗為治
一疹出後自然熱退若遍身既出而猶拂拂煩熱頻作嘔吐者此毒尚未尽畱連於肺胃之間宜化班湯如大便秘少加太黃微利之

十 痘已收去渾身反發熱日夜不退此毒未尽解邪火鬱於肌肉之間久則毛髮焦乾皮膚枯槁肌肉消瘦為骨蒸瘍瘍之症宜芳會肥兒丸加龍胆草當歸連翹等治之遲則有夜睡則露睛口鼻氣冷手足厥逆瘧癰慢脾風為不治之症矣

一 瘡收之後身雖不見羸瘦但時發壯熱煩躁不寧搐掣驚悸神昏悶亂者此陰血衰耗致餘毒入肝而傳於心也宜養血安神四物湯加麥門

冬酸枣仁淡竹葉灯心甘草石菖蒲龍胆草參神黃連辰砂為治或以前藥為末用餌餅豬心血為丸服亦可

二 瘡毒入胃久而不散致成牙齦黑爛血出為走馬疳傳於兩頰浮腫久而穿頰破腮缺唇破鼻為崩砂狐惑等危症矣外用文蛤散雄黃散搽之內用人中白芦薑子龍膽草黃連五灵脂餌餅為丸滾水服之以清胃火亦或有得生者但不妄見也

一 疱出之時，曾作鴻濶，未經清解，至疹退之後，變為休息痢，不問赤白，裏急後重，日夜無度。其餘毒在大腸也，湏分虛實治之。實者，三黃丸利之，或香連丸和之，後用黃芩湯虛者從補。

二 痒退之後，微有咳嗽者，以餘毒未盡也。用清肺飲加消毒飲主之。若咳甚，氣喘連声，不住，名為頓嗽，甚至飲食湯水俱嘔出，或咳出血者，以熱毒乘肺而然也。宜多服麥門清肺飲，加連翹君。見胸高如龜背，作喘血從口鼻出，搖首插頭面藥。

一 痒退之餘，聲啞不出，或咳或喘，或身熱不退，以致日久而不愈者，此熱毒未尽，肺金受耗故也。宜清金降火湯加竹懸姜汁主之。

二 痒退之後，飲食如常，動止如故，而卒然心腹絞

痛遍身汗出如水者此因元氣虛弱失於補養
外雖無病裏實虛損偶然為惡氣所中謂之中
惡以朝發夕死之症間有用蘿合香丸而甦者
一疹退之後有餘熱未尽或發瘡毒肢節疼痛者
以羌活散微汗微利

一疹退之後有餘熱未尽或熱甚而失血者犀角
地黃湯合解毒湯或四物湯加茵陳木通犀角
之類以利小便使熱氣下行而愈

二疹收之後餘熱未尽日夜煩躁譫語狂亂者犀

砂益元散灯心湯下或辰砂五苓散加芩連治
之若初起煩躁譫語者升麻葛根湯調辰砂益
元散主之

一麻疹一忘比之出痘似輕然調治失宜其禍反
不旋踵蓋痘由胎毒而發其形勢多少輕重吉
凶自可預斷至疹之出則雖由感受邪氣而發
然其輕者可重重者可輕皆在於調治有方故
其飲食禁忌比痘尤甚若誤食雞魚則終身皮
膚粟起如雞皮之狀但遇天行出疹之時又令

重出誤食猪肉，則每歲出疹之月必然下痢，膿血誤食鹽醋，致令咳嗽，則每臨出疹之月必復咳嗽，誤食五辛之物，則生驚熱，不時必待四十日，或百日後方無禁忌也。

一孕婦麻疹，但當以四物湯倍加白朮一條，參艾葉安胎，清熱為主，使胎無虞而疹易沒也。如胎氣上衝，急用苧麻根艾葉煎湯磨枳榔并服之，更多服上藥為妙。

○熟毒薰胎，胎多受傷，而母實無恙也。蓋疹與痘

不同，痘宜內實，故胎落而母亡，疹宜內虛，故胎下而母安。雖與其胎去而母存，孰若子母而全，足為愈也。

○麻疹輕重不治三症要訣

或熟或退五六日而後出輕，發透三日而暫沒者輕，頭面多而勻淨色澤者輕，頭面不出者重，紅紫暗燥者重，咽喉腫痛不食者重，冒風沒早者重，移熱大腸變痢者重，黑暗乾枯，一出即沒者不治，鼻扇口張目無神者。

不治。鼻清糞黑者不治。心前吸氣喘者不治。

○水痘癰

夫水痘亦類傷寒之狀。身熱二三日而出或咳嗽而赤眼光如或噴嚏或唾涕與正痘不同易出易膿不宜燥濕苟或燥之恐結痂多變成瘡之症。

麥湯散 古本只此一方或作湯服亦可。

地骨皮 活石 甘草 各五分 甜葶苈 麻黃

大黃 知母 茍活 人參各一錢 右為末每服五分用小麥七粒煎湯調下。

防風葛根湯治痘發癰疹及疹麻發熱。

防風 葛根 升麻 赤芍 甘草

各等分水煎服。

防風解毒湯 治麻痘初發熱如時令溫燒用此辛涼之藥發之。

防風 薄苛 荆芥 石膏 知母 桔梗 牛子 甘草 連翹 木通 枳殼 竹葉

灯心各等分水煎服

黃連解毒湯 治麻痘初發熱如時令暄熱用此

辛寒之劑發之

黃連 黃芩 黃柏 山梔 牛蒡子 甘草

防風 荆芥 知母 石膏 桔梗 玄參

木通 姜三片水煎服

桂枝解毒湯 治麻痘初熱如時令太寒用此辛溫熱之劑發之

桂枝 麻黃酒炒 赤芍 防風 荆芥 羌活

甘草 桔梗 人參 川芎 牛子

生姜水煎服

升麻解毒湯 治麻痘初熱如時煖時寒用此辛平之劑發之

升麻 葛根 羌活 人參 黽胡 前胡

甘草 桔梗 防風 荆芥 牛蒡子 赤芍

連翹 竹葉 水煎服

加味麻黃散 麻痘發不出以此發之

升麻酒洗 麻黃酒炒 人中黃 牛蒡子 蟬退

各等分水煎服

化班湯 治麻痘色紅

人參 知母 石膏 甘草 牛蒡子 連翹

升麻 地骨皮 竹葉 糯米 水煎服

養榮湯 治麻痘色白

人參 當歸 紅花 赤芍 炒水 甘草

水煎服

大青湯 麻痘紫赤暗晦乾燥

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻

石膏 木通 桔子仁 水煎入燒人屎服
如太便秘共加酒大黃
茅花湯 治麻痘鼻衄

茅花 歸頭 丹皮 生地 甘草 各等分

水煎服

竹茹石膏湯 治麻痘嘔吐

橘紅 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 甘草

右水煎服

升麻澤鴻湯 治麻痘自利

猪苓

澤瀉

滑石

赤茯苓

甘草

黃連

炒酒

升麻

各等分水煎服

黃芩

芍藥湯

治麻痘滯下

條芩

錢三

白芍

升麻

各二錢

甘草

錢一

水煎服

十全散

麻癰咽喉腫痛

黃芩

黃連

黃柏

苦參

各酒炒一錢

玄胡索

三分

硼砂

乳香

製各二分

孩兒茶

雄黃

各五分

共為細末每用少許吹入

芦會肥兒丸 麻後發熱日夜不退肌肉消瘦骨
蒸療

芦會

龍胆草

木香

芻皮

人參

麥芽

炒各三錢

使君子肉

各二錢

枳榔

黃連

酒炒五錢

白蕪荑

米飲下

右末

豬膽汁糊

為丸黍米大

每服五六十九

文蛤散

麻毒入胃牙肉黑爛出血走馬疳忘

雄黃

五錢

五棓子

二錢

枯丸

五分

蚕退瘡

燒存一